

1891

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

RESEARCH REPORT

NO. 100

BY

J. R. OPPENHEIMER

AND

H. Y. UHLENHUTH

CHICAGO, ILLINOIS

1951





ARCHIV
FÜR
NATURGESCHICHTE.

GEGRÜNDET VON A. F. A. WIEGMANN,

FORTGESETZT VON

W. F. ERICHSON, F. H. TROSCHEL,
E. VON MARTENS UND F. HILGENDORF.

HERAUSGEGEBEN

VON

Prof. Dr. W. WELTNER,
KUSTOS AM KÖNIGL. ZOOLOG. MUSEUM ZU BERLIN

ACHTUNDSECHZIGSTER JAHRGANG.

II. BAND. 2. Heft.

(Jahresberichte.)

Berlin 1902.

NICOLAISCHE VERLAGS-BUCHHANDLUNG

R. STRICKER.



ARCHIV

NATURGESCHICHTE

Abhandlung von J. G. W. Meyer

über die

Lebensgeschichte der

Wasserinsekten

und

von Dr. W. Meyer

in Göttingen

Verlag von Vandenhoeck und Ruprecht

in Göttingen

1852

Preis

1 Thaler 10 Schilling

1852

Inhaltsverzeichnis.

Erste Hälfte.

(Ausgegeben im Juni 1903.)

Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der Entomologie während des Jahres **1901.**

V. Insecta.

	Seite
Allgemeines von Dr. G. Seidlitz.	
Vorbemerkung	1
Autoren in alphabetischer Ordnung	1
Uebersicht nach Zeitschriften	26
Arbeiten nach Inhalt	36
Coleoptera von Dr. G. Seidlitz.	
Vorbemerkung	45
Autoren in alphabetischer Ordnung	46
Uebersicht nach Zeitschriften	95
Arbeiten nach Inhalt	108
Die behandelten Coleopteren nach Familien geordnet (Familien- übersicht s. p. 45)	122

Zweite Hälfte. 1. Lieferung.

(Ausgegeben im August 1906.)

Hymenoptera von Dr. R. Lucas.

Publikationen mit Referaten	285
Uebersicht nach dem Stoff	389
Systematischer Theil.	
Subordo Heterophaga	408
Subordo Phythophaga (Sessiliventres)	618
Nachtrag	632

Lepidoptera von Dr. R. Lucas.

Publikationen mit Referaten	633
Uebersicht nach dem Stoff	711
Systematischer Theil.	
Rhopalocera	753
Heterocera	821
Microlepidoptera	898
Nachtrag	971

Zweite Hälfte. 2. Lieferung.

(Ausgegeben im December 1906.)

	Seite
Diptera von Dr. B. W a n d o l l e c k.	
Publikationen mit Referaten	973
Systematik.	
Diptera orthorapha	998
Diptera cyclorapha	1010
Siphonaptera von Dr. B. W a n d o l l e c k.	1019
Trichoptera von Dr. R. L u c a s.	
Publikationen mit Referaten	1021
Uebersicht nach dem Stoff	1030
Systematischer Theil	1031
Panorpatae von Dr. R. L u c a s	1034
Neuroptera-Planipennia von Dr. R. L u c a s.	
Publikationen mit Referaten	1035
Uebersicht nach dem Stoff	1037
Systematischer Theil	1038
Rhynchota von Dr. Th. K u h l g a t z.	
Publikationen mit Referaten	1041
Uebersicht nach dem Stoff	1098
Systematik.	
Heteroptera.	1153
Homoptera	1178
Phytophthires	1189
Inhaltsverzeichnis (ausführlich)	1202
Mallophaga (Parasitica) von Dr. R. L u c a s	1203
Thysanoptera von Dr. R. L u c a s	1203
Corrodentia von Dr. R. L u c a s.	
Termitidae	1205
Embiidae.	1207
Psocidae	1207
Orthoptera von Dr. R. L u c a s.	
Publikationen mit Referaten	1213
Uebersicht nach dem Stoff	1243
Systematischer Theil	1247
Plecoptera von Dr. R. L u c a s	1281
Odonata von Dr. R. L u c a s.	
Publikationen mit Referaten	1285
Uebersicht nach dem Stoff	1290
Systematischer Theil	1292
Agnatha von Dr. R. L u c a s	1298
Dermatoptera (Forficulidae) von Dr. R. L u c a s	1300
Apterygogenea von Dr. R. L u c a s.	
Publikationen mit Referaten	1312
Uebersicht nach dem Stoff	1324
Systematischer Theil	1328

VI. Myriopoda von Dr. R. Lucas.

Seite

Publikationen mit Referaten	1357
Uebersicht nach dem Stoff	1376
Systematischer Theil.	
Chilopoda	1382
Pauropoda	1393
Diplopoda	1393

VII. Arachnida von Dr. R. Lucas.

Allgemeines	1416
Scorpiones	1417
Pedipalpi	1421
Palpigradi	1423
Araneae	1425
Solifugae	1504
Pseudoscorpiones	1509
Opiliones (Phalangida)	1511
Acarina	1514
Tardigrada	1577
Linguatulidae	1578

VIII. Prototracheata von Dr. R. Lucas 1579

Die in den Berichten mit einem * bezeichneten Arbeiten
sind den Referenten nicht zugänglich gewesen.



Bericht

über

die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der Entomologie während des Jahres 1901.

Allgemeines.

Bearbeitet von **Dr. G. Seidlitz**, Ebenhausen bei München.

Vorbemerkung.

In diese Abtheilung wurden nur diejenigen Arbeiten aufgenommen, die sich auf mehr als nur eine Insekten-Ordnung beziehen, im Ganzen 425. Von diesen mögen einige, die dem Ref. nur dem Titel nach bekannt wurden*), nicht hierher, sondern in die einzelnen Ordnungen gehören**). Als selbstständige Werke sind 52 Arbeiten, 373 dagegen in 144 verschiedenen Zeitschriften erschienen, von denen nur 31 entomologische Zeitschriften sind.

Uebersicht.

	pag.
A. Autoren in alphabetischer Ordnung	1
B. Uebersicht nach Zeitschriften	26
C. Die Arbeiten nach Inhalt	35

A. Autoren in alphabetischer Ordnung.

Absolon K. (1). Bericht über meine Forschungen in den Höhlen des mährischen Karstes im Jahre 1900. Ber. böhm. Franz-Josef-Akad. X p.? sep. 6 pp.

— (2). Beiträge zur Kenntniss der mährischen Höhlenfauna. Verh. naturf. Ver. Brünn 39 p.? sep. 9 pp. 1 tab.

*) Die Herrn Autoren geben sich nur ausnahmsweise die Mühe, ihre Arbeiten der Berichterstattung zugänglich zu machen.

***) Vielfach wählen die Herrn Autoren für ihre Arbeiten irreleitende Titel, durch welche der Inhalt nicht genau angegeben, sondern eher verschleiert wird. Eine Arbeit z. B. über Schmetterlinge soll nicht als Arbeit über „Insekten“ angekündigt werden.

- Acloque A.** (1). Les hôtes des fourmilières. Cosmos XLIII 1900 p. 393—397.
- Adelung N.** (1). Referat über Sharp 1899 (1). Zool. Centr. VIII p. 58—59.
- (2). Referat über Krulikowsky 1900 (1) und Schreiner 1900 (1). *ibid* p. 59—61.
- (3). Referat über Schreiner 1900 (2). *ibid* p. 61—62.
- (4). Referat über Tarnani 1900 (1). *ibid* p. 70—71.
- (5). Referat über Mysslowsky 1900 (1). *ibid* p. 513—514.
- Alté M.** (1). Interessante Beobachtungen an Insekten. Entom. Jahrb. 11 p. 216—223.
- Anglas J.** (1). Quelques caractères essentiels de l'histolyse pendant la metamorphose. Bull. Soc. ent. Fr. 1901 p. 301—304. (*Hym.*, *Dipt.*, *Col.*)
- Bachmetjew P.** (1). Experimentelle entomologische Studien vom physikalisch-chemischen Standpunkt aus. Mit einem Vorwort von Prof. Dr. Aug. Weismann in Freiburg. 1. Bd. Temperaturverhältnisse bei Insekten. Leipz. 1901, 160 pp. — Referat von Stichel 1. u. von Linden Zool. Centr. 1902 p. 465—469.
- (2). De la temperature vitale minima chez les animaux dont la temperature du sang est variable. Arch. Sc. biol. VIII p. ? 23 pp. — Referat von Schröder 26.
- Bacot A. W.** (1). Weismanism and Entomology. Ent. Rec. XIII p. 44—47.
- Baer A.** (1). Note sur les collections entomologiques existant en Suède et contenant les espèces typiques des auteurs suédois. Bull. Soc. ent. Fr. 1901 p. 186—188.
- (2). Le venin des Arthropodes. Rev. Scient. (4) XVI p. 247.
- Bálint S.** (1). Beobachtungen hinsichtlich der intracellulären Anordnung der Neurofibrillen im Facetten-Auge der Insekten. Sitzber. Siebenb. Museumver. 24. 1899, p. 18—19.
- Ballion P.** (1). Instinct de la propreté chez les Insectes. Interméd. Biol. I 1898, p. 160.
- Banks N.** (1). Bibliography of the more important contributions to American economic Entomology. P. VII. The more important writings published between December 31, 1896 and January 1, 1900. U. S. Dep. Agr. Div. Entom. Wash. 1901, 113 pp.
- (2). Notes on Entomology. Science XV p. 976—979.
- (3). Papers from the Hopkins Stanford Galapagos expedition, 1898—1899. Entomological results (5): *Thysanura* and *Termitidae*. Proc. Wash. Ac. III p. 541—546.
- Bargagli P.** (2). Commemorazione del Barone M. E. de Selys-Longchamps. Bull. Soc. Ent. Ital. 33. 1901 p. 36—39.
- Beauregard H.** (1). Matériel médicale zoologique. Histoire des drogues d'origine animale. Revisée par Coutière. Paris 1901, 396 pp.

- Bergh R. S.** (1). Referat über Heymons 2. Zool. Centr. VIII p. 591—604.
 — (2). Referat über Dewitz. 1. *ibid.* p. 863—864.
- Berlese A.** (1). Osservazione su fenomeni che avvengono durante la ninfosi degli Insetti metabolici. P. I. Tessuto adiposo. Mem. 1 (*Ditteri*), Mem. 2 (*Lepidotteri*, *Imenotteri*, *Neurotteri*, *Coleotteri*). P. II. Tessuto muscolare. Riv. Pat. veget. VI—IX, Mem. 1. 1898—1899, 155 pp. 6 tabb., Mem. 2 u. P. II 1901 288 pp. 8 tabb. — Referat von Mayer 1902 p. 48—49. (Ueber die Veränderungen des Fettkörpers und Muskelgewebes der Larven bei *Dipt.*, *Lep.*, *Hym.*, *Neur.*, *Col.*).
 — (2). Vorgänge, welche während der Nymphosis der metabolischen Insekten vorkommen. Zool. Anz. 24. p. 515—521. (Referat über Berlese 1).
 — (3). Intorno alla rinnovazione dell' epitelio del mesenteron negli Artropodi tracheati. Monit. Zool. Ital. XII p. 182—186.
 — (4). Uccelli entomologi e insetti parassiti delle forme nocive. Boll. Ent. Agr. VIII p. 86—?.
 — (5). Gli uccelli insettivori sono realmente utili in agricoltura? *ibid.* p. 104—?, 126—?, 153—?, 177—?, 220—?.
- Bethune J. C. S.** (1). Miss Eleanor A. Ormerod. Canad. Ent. 33. p. 241—242 u. Ann. Rep. Ent. Soc. Ontario 1901 p. 121—125. (Necrolog mit Portrait).
 — (2). Referat über Ormerod 1. *ibid.* p. 155—156.
 — (3). Referat über Howard 1. *ibid.* p. 238—239.
 — (4). Referat über Weed 1. *ibid.* p. 239—240.
 — (5). Caterpillars attended by Ants. *ibid.* p. 279—280. (Referat über Nicéville 1, Edwards 1878 u. Scudder).
 — (6). Some recent work in economic Entomology. Tr. R. Soc. Canada 1900, Sect. IV p. 3—17.
- Betten C.** Siehe Needham & Betten.
- Biolley P.** (1). Notas entomologicas III: Insectos destructores de los Rosales en Costa Rica. Bol. Instit. Fisic. Geogr. Costa Rica I 1901 p. 313—318.
- Biro L.** (1). (Entomologische Beobachtungen in Australien). Rov. Lap. VIII 3. p. 45—47, 4. p. 78—81. (Magyarisch. Deutscher Auszug p. 87 u. p. 9).
- Bogdanow E. A.** (1). Zur Biologie der Coprophagen. Allg. Zeit. Ent. VI p. 35—41. (*Dipt.*, *Col.*, Biologie u. Experimente über psychologische Fragen).
 — (2). Ueber Konservirung. *ibid.* p. 100—102. (Methoden zur Conservirung der natürlichen Farben, besonders an Larven).
- Bohn G.** (1). L'évolution du pigment. Scientia Biol. XI 1901 p. 2, 96 pp. und Compt. rend. Acad. Sc. 1901 no. 132 p. 173—175.
 — Referat von Nagel 1. u. von Schenkling 2.
- Bolivar** (1). Siehe Zichy.
- Bouvier E. L.** (1). Emile Blanchard. Notice nécrologique. 1 Portr. Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris II p. III—XXVIII.

- Brauer F.** (1). Ueber die von Prof. O. Simony auf den Canaren gefundenen *Neuropteren* und *Pseudoneuropteren*. Sitzb. Akad. Wien 108. Abth. I p. 464—477. (*Odon.*, *Ephem.*).
 — (2). Siehe Geschichte.
- Britton W. E.** (1). First Report of the State entomologist. Rep. Connecticut, exp. Stat. 1901 p. 277—278 tab. I—XI.
- Brogniart Ch.** (1). Aperçu sur les Insectes fossiles en général et observations sur quelques Insectes des terrains houillers de Commentry (Allier-France). Le Nat. V p. 266—?
- Browne J. M.** (1). Entomological Notes from Abbeyleix. Irish Nat. X p. 92.
- Brues C. T.** (1). Two new myrmecophilous genera of aberrant *Phoridae* from Texas. Am. Nat. 35. p. 337—356. — Referat von Escherich, Zool. Centr. 1902 p. 86—89. (*Dipt.*, *Hym.*).
- Brunetti E.** (1). On labelling Insects. Canad. Ent. 33. p. 207—208.
 — (2). On labelling Insects. The Entom. 34. p. 172—173.
 — (3). On labelling insects. Boll. Mus. Torino XVI no. 386, 2 pp.
 — (4). Ueber das Etiquettiren der Insekten. (Ueber Fundort-Angaben). Wien. ent. Z. 20. p. 231.
- Brunner** (1). Siehe Geschichte.
- Buckton G. B.** (1). Aphides in Ants' nests. Sc. Goss. VII p. 257 (*Rhynch.*, *Hym.*).
- Bütschlie O.** (1). Referat über „Geschichte der Botanik und Zoologie“. Zool. Centr. VIII 1901 p. 489—490.
- Burgess-Sopp** siehe Sopp.
- Buysson H. du** (1). Encore le cabinet d'élevage. Feuille. jeun. Nat. 31 p. 251—252, 271—272.
- Calvert P. P.** (1). Baron Edmond de Selys-Lomchamps. Ent. News XII 1901 p. 33—37, Portr.
- Cannon** siehe Davenport & Cannon.
- Carpenter G. H.** (1). The insects of the sea. III. Knowledge XXIV 1901 p. 114. — IV. Juli 1901 (*Col.*). — V. Sept. p. 194 (*Diptera*). — VI. Nov. p. 240 (*Rhynch.*).
 — (2). Report on Economic entomology for the year 1900. Rep. Dubl. Soc. 1900 p. 94—108.
- Carus V.** (1). Zoologischer Anzeiger. Bibliographia Zoologica. 1901 p. 57, 140, 265, 379, 486.
- Cecconi G.** (1). Contribuzioni alla cecidiologia italica colla descrizione di alcune galle nuove e colla indicazione di nuovi substrati. Le Staz. sperim. agr. Ital. 34 p. 729—744.
- Champville G. F. de** (1). Les ennemis du Blé. Essai d'Entomologie pratique. Paris 1901, 159 pp. 60 figg.
- Chapman T. A.** (1). *Acanthopsyche opacella*: instinct altered when parasitized. Ent. Mont. Mag. 36, 1900 p. 62—63. — Referat von Schröder, A. Z. Ent. VII 1902 p. 436—437. (*Lep.*, *Dipt.*)

- Chittenden F. H.** (1). Insects and the Weater during the Season of 1900. U. S. Dep. Agr. Div. Ent. Bull. 30 p. 63—74.
 — (2). Some Insects injurious to the Violet, Rose and other ornamental Plants. *ibid.* Bull. 97 p. ?, 114 pp., 4 tabb.
- Chobaut A.** (1). Insectes indigènes adoptés à un arbre d'origine exotique. Bull. Soc. Nimes 28 p. 71—72. (*Col.*, *Lep.*)
- Cholodkovsky N. A.** siehe Lampert 1.
- Claparède Ed.** (1). Referat über Wasmann 1900 (6). L'Ann. biol. V p. 550—551.
- Clément A. L.** (1). La nouvelle salle d'entomologie appliqué du Muséum d'histoire naturelle. La Nat. 29, 1901 p. 71—74.
- Cockerell T. D. A.** (1). Contributions to the Entomology of New Mexico. I. A Catalogue of the fossorial *Hymenoptera* of New Mexico. II. Some records of *Diptera*. Proc. Davenport Ac. VII p. 139—148, 149—156.
 — (2). Flower and Insect Records from New Mexico. Ent. News XII p. 38—43 (*Hym.*, *Dipt.*, *Rhynch.*, *Col.* auf 35 Pflanzenarten).
 — (3). Contributions from the News Mexico Biological Station. XI. New and littleknown Insects from New-Mexico. Ann. of Nat. Hist. (7) VII p. 333—337. (*Rhynch.*, *Hym.*)
 — (3 a). The New Mexico *Coccidae* of the genus *Ripersia*. *ibid.* VIII p. 51—57 (*Myrmecophilie*).
 — (4). Observations on Insects. N. Mex. Stat. Bull. 35, 27 pp.
- Comstock J. H. & Comstock A. B.** (1). Manual of a Study of Insects. 4. Ed. Ithaca 1901, 701 pp., 797 figg. 6 tabb.
- Connold E. T.** (1). British vegetable galls. An introduction to their study. Lond. 1901.
- Corti A.** (1). Le Galle della Valtellina. Prima contributo alla conoscenza della Cecidologia Valtellinese. Atti Mus. Mil. 40 p. 153—?
- Coupin H.** (1). Le Chant des Insectes. Rev. scient. XVI p. 782—786.
 — (2). L'industrie des insectes. Le Nat. 23 p. 242—244, 276—277.
- Coutière** siehe Beauregard.
- Csiki E.** (1). Photolector. Rov. Lap. VIII p. 31—36. (Magyarisch, deutscher Ausz. p. 3).
 — (2). Siehe Zichy 1.
- Cuénot L.** (1). Referat über Bordage 1899, 1 u. 2. L' Ann. biol. V p. 188—189.
 — (2). Referat über Cuénot 1900, 1. *ibid.* p. 212—214.
- Cuny y Martorell M.** (1). Relaciones de los plantas con los insectos. Barcelona 1901. 23 pp.
- Curo A.** (1). Dott. O. Staudinger. Bull. Soc. Ent. Ital. 33. 1901 p. 40—42.
- Daguin E.** (1). Les Insectes comestibles dans l'antiquité et de nos jours. Paris 1900 29 pp. — Referat von Kirkaldy 2.

Dahl Fr. (1). Siehe Rübsaamen.

DalGLISH & others (1). Insecta (in) Fauna, Flora and Geology of the Clyde area. p. 215—317. Glasgow 1901.

Darboux G. & Houard C. (1). Catalogue systematique des Zoocécidies de l'Europe et du Bassin méditerranéen. Bull. scient. Fr. et Belg. 34^{bis} p. 1—544, 863 figg. — Referat v. Schlechtendal 1. u. von Dalla Torre. Zool. Centr. 1902, p. 45—47. (Ausführl. umfass. Arb., auch separat Paris 1901).

Davenport Ch. B. (1). Zoology of the Twentieth Century. Science 14 p. 315—324.

Davenport Ch. B. & Cannon B. W. (1). On the Determination of the Direction and Rate of Movement of Organisms by Light. Journ. of Physiol. XXI p. 22—?

Davie siehe Gibson.

Delpino F. (1). Sugli Artropodi fillobii e sulle complicazioni dei loro rapporti biologici. Monit. zool. ital. XII p. 229.

Dewitz J. (1). Verhinderung der Verpuppung bei Insektenlarven. Arch. f. Entwicklmech. XI 1900 p. 690—699. — Referat von Schröder 25 u. von Bergh 2 (*Dipt., Hym.*)

Distant W. L. (1). Biological Suggestions; animal Sense Perceptions. The Zool. (4) V 1901 p. 321—338.

Donisthorpe H. St. J. K. (1). Siehe *Col.* Donisthorpe 1.

— (2). Siehe *Col.* Donisthorpe 8.

— (3). Siehe *Col.* Donisthorpe 10.

Doria G. & Gestro R. (1). Indice generale sistematica delle due prime serie, 1870—1901. Ann. Mus. Gen. 1901.

Dubois A. (1). Le Baron Edmond de Selys-Longchamps. Bull. Soc. Zool. Fr. 26 p. 24—28, Portr.

Duboscq O. (1). Referat über Hertwig 1. L'Ann. biol. V p. 129.

Dubourgais A. (1). Tables décennales alphabétiques. T. XI—XX 1892—1901. Rev. Ent. XX p. I—XXXI.

Duffek K. (1). Johannes Müller's Theorie „vom musivischen Sehen“ und ihre Gegner. Progr. Obergym. Wien II Bez. 1886.

Eckstein K. (1). Forstzoologie. Jahresbericht für das Jahr 1900. Allg. Forst- u. Jagdzeit. 1901. Suppl. p. ? 26 pp. (p. 17—19: Referate über Altum 1900 (1), Bachmetjew 1900 (7), Eckstein 1900 (3), Fabre 1898 (3), Keilhack 1900 (1), Märker 1900 (1), Reuter 1900 (1), Schewyrew 1900 (1), Schöyen 1900 (1), Sedlaczek 1900 (1), Sintenis 1900 (1), Smith 1900 (3), Tarnani 1900 (1), Thaler 1900 (1).

— (2). Das Auftreten forstlich schädlicher Thiere in den K. preussischen Staatsforsten im Jahre 1900. Zeitschr. f. Forst- u. Jagdw. 1901 p. 739. — Referat von Eckstein 1902 p. 4 (*Col., Lep., Hym., Dipt., Rhynch., Orth.*)

- Eimer G. H. Th.** (1). Die Entstehung der Arten auf Grund von Vererbung erworbener Eigenschaften nach den Gesetzen organischen Wachstums. III. Bd. Leipz. 1901 263 pp.
- Elliott E. A. & Morley Cl.** (1). Insects in Norfolk Broadland in June. The Ent. 34 p. 343—346. — (*Col., Hym., Lep., Dipt., Neur.*).
- Emery C.** (1). Ueber zoologisches Material vom Eliasberge in Alaska. Filippo de Fillippi, Forsch. Reise Prinz Savoyen in Alaska 1897. Uebers. von Locella p. 236—245, tab. — Referat von Krumbach 1. (*Dipt., Hym., Apt., Arachn., ausserdem Anneliden*).
- Escherich K.** (1). Das Insekten-Entoderm. Biol. Centr. 21 p. 416—431. — Referat von Meyer 1902 p. 49. (*Col., Dipt., Hym., Orth.* siehe Morphologie etc.)
- (1 a). Ueber die Bildung der Keimblätter bei den Insekten. Sitzb. naturf. Ges. Rostock 1900 p. ?, 4 pp. — Referat von Schröder 11 a.
- (2). Referat über Wasmann 1900 (5). *ibid.* 64—65.
- (3). Referat über Wasmann 1900 (3). Zool. Centr. VIII p. 420—422.
- (4). Referat über Weehler 1900 (2 u. 3) u. Wasmann (5) *ibid.* p. 526—528.
- (4 a). Referat über Wasmann 5. *ibid.* p. 808—812.
- (5). Referat über Redicorzew 1900 (1). Allg. Zeit. Ent. VI p. 11.
- (6). Referat über Folsom 1900 (1). *ibid.* p. 383.
- Ewart J. C.** (1). The experimental Study of Variation. Adress to the Zoological Section. Rep. Brit. Assoc. Glasgow 1901. Rep. 71 p. 666—680. — Referat von Schröder 1902. All. Z. Ent. VII p. 122.
- (2). On the cause of variation. Pres. Adress. Brit. Ass. Sect. D. Nat. 64 p. 482—?
- (3). L'Étude expérimentelle de la variation. Rev. Sc. XVI p. 545—?
- Fabre J. H.** (1). Insect Life. Souvenirs of a Naturalist. Translated from the French, edited by F. Merrifield, with a preface by D. Sharp. Lond. 1901, 320 pp., 16 tabb.
- Felt E. P.** (1). Some effects of Early Spring Applications of Insecticides on Fruit-Trees. U. S. Dep. Agr. Div. Ent. Bull. 26 p. 22.
- (2). The sixteenth report of the State entomologist on injurious and other Insects of the State of New York. Bull. New York State Mus. 36 VII p. 949—1063. — Referat von Kirkaldy 3.
- (3). Illustrated descriptive catalogue of some of the more important injurious and beneficial insects of New York State. *ibid.* 37. VIII. 1900 p. 1—48. (*Lep., Col., Rhyn., Hym., Dipt., Orth., Neur.*).

- Fettig** (1). Die Lepidopteren- und Coleopteren-Fauna des Elsasses. Mitth. Mühlh. Ent. Ver. 17. 1900 p. 1—5.
- Fletscher T. B.** (1). On Labelling Insects. The Entom. 34 p. 216—218.
- Fletscher J.** (1). Injurious Insects in Ontario during 1900. Ann. Rep. Ent. Soc. Ontario 31. 1900 p. 62—72, fig.
 — (2). Entomological Record. *ibid.* 32. 1901 p. 99—108.
 — (3). The value of Nature Study in Education. *ibid.* p. 21.
- Fleutiaux E.** (1). Première excursion entomologique au jardin colonial de Nogent sur Marne. Le Nat. 23, 1901, p. 115—117.
- Forel A.** (1). Die psychischen Fähigkeiten der Ameisen und einiger anderer Insekten; mit einem Anhang über die Eigenthümlichkeiten des Geruchsinnes bei jenen Thieren. Vorträge Zool.-Kongress zu Berlin. München 1901. 57 pp., 1 tab. — Referat von Stichel 2, von Escherisch 1902. Allg. Z. Ent. VII p. 26—27 u. von Mayer 1902 p. 47—48.
 — (2). Die Eigenthümlichkeiten des Geruchsinnes bei Insekten. Tagebl. Int. Zool. Congr. Berl. 1901. 8. p. 20.
- Fowler W.** (1). (President's Adress) Tr. ent. Soc. Lond. 1901 p. XXXIII—LIX. (Ueber Mimicry).
- French C.** (1). A handbook of the destructive Insects of Victoria. P. III 1900. 222 pp., 82 tabb.
- Friedländer R.** (1). Entomologische Litteraturblätter. Repertorium der neuesten Arbeiten auf dem Gesamtgebiete der Entomologie. I. Berlin 1901, 210 pp.
 — (2). Necrolog auf Alexander Becker. *ibid.* p. 116—117.
 — (3). Zoologisches Adressbuch. Namen u. Adressen der lebenden Zoologen, Anatomen, Physiologen und Zoopalaeontologen. Th. II. Nachtr. seit 1895. Berlin 1901, 517 pp.
- Fritsch A.** Die thierischen Reste der Perucer Schichten. Arch. naturwiss. Landesdurchf. Böhm. XI 1901 p. 163—180. — Referat von Meunier 1. u. von Speiser Allg. Z. Ent. VII 1902 p. 541. (*Phrygan.*, *Hym.*, *Orth.*, *Dipt.*, *Coleopt.*).
- Froggatt W. W.** (1). Entomological Work and Notes for 1900. Agr. Gaz. N. S. Wales XII p. 794—799.
 — (2). Typical Insects of Central Australia. *ibid.* p. 1203—1212 tab. — Referat von Speiser, Allg. Z. Ent. VII p. 514. (*Col.*, *Lep.*, *Orth.*, *Rhynch.*).
- Fruhstorfer H.** Tagebuchblätter. Ins.-Börse XVIII p. 3 4, 18—19, 42—43, 50—51, 58—59, 74—75, 81—83, 90—91, 98, 106—107, 114—116, 122—124, 130—131, 138—139, 145—146, 154—155, 161—162, 170—171, 178—179, 185—187, 194—195, 202—203, 210—211, 218—219, 226—227, 234—235, 241—242, 250—251, 258—259, 266—267, 274—275, 282—283, 298—299, 306—307, 313—314, 322—323, 330—331, 338—339, 346, 361—362, 370—371, 378—379, 386—387, 394—395, 402—403, 410—411. (Fortsetz. von 1900. Ob vielleicht nur *Lepid.*?).

- Fuente J. M. de la** (1). Siehe Col. Fuente 1. (Auch 1 *Rhynch.* aufgeführt.)
- Fuller C.** First report of the government entomologist. 1899—1900. Pietermaritzburg 1901, 150 pp.
- Fyles Th. W.** The Importance of Entomological Studies to the Community at large. 32. Ann. Rep. Entom. Soc. Ontario 1901 p. 13—21, figg.
- Gadeau de Kerville H.** (1). Le cinquième congrès international de Zoologie tenu à Berlin du 12 au 16 Août 1901. Le Natural. 1901 p. 221—222.
- (2). Recherches sur les faunes marine et maritime de la Normandie, 3^e voyage. Bull. Soc. Rouen 1900 p. 145—224. (p. 194—206 *Insect.*.)
- (3). Les Cécidozoaires et leurs Cécidies. Caus. Soc. zool. 1901 p. ?, 27 pp., 2 tabb.
- Ganglbauer L.** Siehe Geschichte.
- Garbowski T.** Referat über Niezabitowski 1900, 1. Zool. Centr. VIII p. 88—89.
- Garman H.** Enemies of Cucumbers and related Plants. Kentucky Agric. Exper. Stat. Bull. 91. p. 3—56. (*Col.*, *Rhynch.*, *Hym.*, *Lep.*, *Orth.*.)
- Gauckler H.** Die Neu-Aufstellung der Insekten-Sammlung im Grossherz. Naturalienkabinet zu Karlsruhe i. B. Insekt.-Börse XVIII p. 91—93, 98—100.
- Geschichte der Botanik und Zoologie** in Oestreich 1850—1900. Festschr. zool. bot. Ges. Wien 1901, 620 pp. 38 tab. — Referat von Bütschli 1. (*Neur.*, *Rhynch.*, etc. von Handlirsch, *Orthopt.* von Brunner, *Lepid.* von Rebel, *Dipt.* von Brauer, *Coleopt.* von Ganglbauer, *Hym.* von Kohl).
- Ghigi A.** Note biologiche e faunistiche. Bull. Soc. ent. Ital. 33. p. 183—196. (*Col.*, *Hym.*, *Dipt.*.)
- Giard A.** Notes bibliographiques sur les Insectes nuisibles aux livres et aux reliures. Bull. Soc. ent. Fr. 1901 p. 214—216.
- Gibson W. Ch.** Blossoms Host and Insect Guests: How the Heath Family, the Bluets, the Figworts, the Orchids, and similar Wild Flower welcome the Bee, the Fly, the Wasp, the Moth and other Faithful Insects. Ed. by Eleanor E. Davie. New York, London 1901.
- Gillette Cl. P.** (1). Objects of the Association of Economic Entomologists. U. S. Dep. Agr. Div. Ent. Bull. 26. p. 5—?.
- (2). Entomological Notes from Colorado. *ibid.* p. 76—?. (Ob dasselbe wie 1900, 1?).
- Girod P.** (1). Thierstaaten und Thiergesellschaften. Uebers. v. W. Marshall. Leipz. 1901, 278 pp. — Referat von Tümpel 1902, Allg. Z. Ent. VII p. 89.
- Goethe R.** (1). Bericht der Königl. Lehranstalt für Wein-, Obst- und Gartenbau zu Geisenheim a. Rh. für das Jahr 1900/01.

- Wiesbaden 1901, 150 pp. 1 tab. col. — Referat v. Schröder 1902, Allg. Z. Ent. VII p. 347—348 u. von Eckstein 1902 p. 23. (*Rhynch., Col., Dipt.*).
- Gregson P. B.** (1). The Principal Injurious Insects of the North-West for 1900. Ann. Rep. Ent. Soc. Ont. 31. 1900 p. 106—108.
- (2). Noticeable Insects of 1901 in Alberta. *ibid.* 32. 1901 p. 118—120.
- Guiart J.** (1). Cinquième Congrès International de Zoologie tenu à Berlin en Août 1901. Compte rendu sommaire. Bull. Soc. Zool. Fr. 29. p. 129—143.
- Hagen B.** (1). (Die Insekten am Vulkan Koba auf Sumatra). Globus 1901 no. 16, 17 p. ? — Referat von Schenkling 3 (*Hym., Lep., Col., Rhynch.*).
- Hamann** (1). Referat über Lucas 1900 (1 u. 2). Allg. Litteraturbl. X p. 185—186.
- Handlirsch** (1). Siehe Geschichte.
- Hanstein R. v.** (1). Referat über Hesse 1. Naturw. Rundsch. XVI p. 188—190.
- (2). Referat über Redikorzew 1900, 1. *ibid.* p. 188—190.
- Headley F. W.** (1). Problems of Evolution. Lond. 1900, 368 pp. — Referat von Speiser Allg. Z. Ent. 8. 1903 p. 17—18.
- Hecht E.** (1). Referat über Prowazek 1900 (1). L'Ann. biol. V p. 450.
- Henderson J.** (1). Entomological Notes from Rye. Entom. Rec. VIII p. 305. (*Lep., Col.*)
- Hertwig R.** (1). Mit welchem Recht unterscheidet man geschlechtliche und ungeschlechtliche Fortpflanzung? Sitzber. Ges. Morph. u. Phys. Münch. XV 1899 p. 142—153. (Auch Insekten erwähnt). Siehe Morphologie etc.
- Hesse R.** (1). Ueber die sogen. einfachen Augen der Insekten. Zool. Anz. XXIV 1901 p. 30—31. — Referat in R. Micr. Soc. Lond. 1901 p. 149. (*Dipt., Hym., Orth., Neur., Rhynch.* u. Larven der *Col.* vorläuf. Mittheil.).
- (2). Untersuchungen über die Organe der Lichtempfindung bei niederen Thieren. VII. Von den Arthropoden-Augen. Zeit. f. wiss. Zool. Bd. 70 Heft 3 p. 347—464, 465—473 tab. XVI—XXI. — Referat von Hesse, Zool. Centr. 1902 p. 79—82, und von Mayer 1902 p. 18—20. (Alle Ordn. siehe Morphologie).
- (3). Referat über Bachmetjew 1900 (1). Zool. Centr. VIII p. 113.
- (4). Referat über Redikorzew 1900, 1. *ibid.* p. 113—114.
- Heymons R.** (1). Referat über Folsom 1900 (1). Zool. Centr. VIII p. 241—245.
- (2). Referat über Berlese 1899 (1). *ibid.* p. 239—240.
- (3). Die Entwicklungsgeschichte der *Scolopender*. Zoologica. XIII. 33. 1901. 244 pp., 8 tab. Nachtrag: Die Keimblätter-

frage bei den Arthropoden im Lichte der neuesten Forschungen.
— Referat von Bergh 1. u. von Mayer 1902 p. 21—22. (Im
Nachtrag auch Allgemeines über Insekten).

Hollrung M. (1). Zehnter Jahresbericht der Versuchsstation für
Pflanzenschutz für die Provinz Sachsen in Halle. Halle 64 pp.

Hormuzaki C. v. (1). Einige Worte über sogenannte „Localfaunen“.
Verh. Zool. bot. Ges. Wien 1901 p. 368.

Horvath G. (1). Siehe Zichy.

Houard siehe Darboux & Houard.

Howard L. O. (1). The Insect-Book: a popular Account of the
Bees, Wasps, Ants, Grasshoppers, Flies and other North
American Insects, exclusive of the Butterflies, Moths, and
Beetles, with full Lifehistories, Tables, and Bibliographies.
New-York 1901, 429 pp., 7 tabb. — Referat von Bethune 3.

— (2). A contribution to the study of the insect fauna of human
excrement. Proc. Wash. Acad. Sc. II. 1900 p. 541—604,
2 tabb. — Referat von Speiser 1902 Allg. Z. Ent. VII
p. 30. (77 *Dipt.*, 44 *Col.*, 14 *Hym.*, 1 *Lep.*).

Hubbard H. G. (1). Letters from the Southwest. Insect Fauna in
the burrows of desert rodents. Pr. Ent. Soc. Wash. IV.
p. 361—364. (*Col.*, *Lep.*, *Orth.*).

— (2). Id. — Salton Lake in the Colorado Desert and its Insect
Fauna. *ibid.* p. 376—378. (*Col.*, *Rhynch.*)

— (3). Id. Insect Fauna of Dasyllirion. *ibid.* p. 381—383. (Haupt-
sächl. *Col.*, doch auch *Dipt.* erwähnt).

— (4). Insect life in Florida Caves. *ibid.* p. 394—396. (*Dipt.*,
Rhynch.)

Hudson G. V. (1). On entomological Field-work in New-Zealand.
Tr. N. Zealand Inst. 33 p. 383—395.

Imhof O. E. (1). Ocelli der Insekten. Biol. Centr. XXI p. 189
—192, 459—463. (*Dipt.*, *Neuropt.*, Aufzählung der Gattungen,
bei welchen Ocellen erwähnt worden).

— (2). Referat über Thomann 1. Biol. Centralbl. 21 p. 458.

Issel R. (1). Saggio sulla fauna termale italiana. Boll. Mus. Zool.
Gen. 1901 n° 100 p. 1—4. — Referat von Zschokke Zool.
Centr. 9. 1902 p. 38—39.

— (2). Osservazioni sopra alcuni animali della fauna termale
italiana. *ibid.* n° 106 p. 1—15 tab. I, II. — Referat von
Zschokke *loc. cit.* p. 39. (Auch Insekten genannt).

Jacobson A. (1). (Reise in die Abakan-Berge). Hor. ross. 35 p. V
—XIV. — Referat von Ssemenow 1. (Russisch. 248 *Mac-
rolep.* u. 375 *Col.* gesammelt, v. d. einige genannt).

Jacobson G. (1). (Die Convergenz der Merkmale. II. Die Flügel
einiger kleinen Insekten. III. Die ectoparasitischen Insekten).
Hor. ross. 35, p. XIX—XX. (Russisch. *Dipt.*, *Col.*, *Rhynch.*,
Hym., *Orth.*)

Johnson O. B. (1). A new Method for permanently mounting
Insects. Ent. News XII p. 136—138.

- Johnson W. G.** (1). *Aphelinus fuscipennis*, an important Parasit of upon the San José Scale in Eastern United States. U. S. Dep. Agr. Div. Ent. Bull. 26 (1900?) p. 73.
- Jordan D. St.** (1). The determination of the Type in composite Genera of Animals and Plants. Science XIII p. 498—501.
- Jourdain S.** (1). Sur les moyens employés par les insectes pour se défendre contre leurs ennemis. C. R. Ass. Fr. 29 I p. 190—191.
- Judd S. D.** (1). The food of nestling birds. Yearb. U. S. Dep. Agr. 1900 p. 411—436 tab. 49—53.
- Kaditsch O.** (1). Siehe *Col.* Kaditsch 1. (*Col.*, *Orth.* Vergl. Morphologie der Mundtheile).
- Keissler** (1). Referat über Zimmermann 1. Verh. Zool. bot. Ges. 1901 p. 542.
- Kellogg V. L.** (1). Insects and Spiders of the Galapagos Islands. Psyche IX p. 173—175.
— (2). The Homologies of the Mouth Parts of Insects with complete Metamorphosis. Abstr. Science 14. p. 627—628.
- Kertész** (1). Siehe Zichy.
- Kew H. W.** (1). Siehe *Col.* Kew 1.
- Kieffer J. J.** (1). Zoocécidies d'Europe. Misc. ent. VIII p. 30—?.
— (2). Synopsis des Zoocécidies d'Europe. Ann. Tr. p. 233—384. (*Rhynch.*, *Dipt.*, *Hym.* etc. Nach Pflanzen geordnet).
- Kirby W. F.** (1). *Hymenoptera*, *Hemiptera*, *Heteroptera*, *Homoptera*, *Neuroptera* and *Orthoptera* (in) Report on a collection. . . . British Guiana. Tr. Linn. Soc. Lond. VIII. 1901 p. 71—73.
- Kirkaldy G. W.** (1). Referat über Smith 1900 (2). The Ent. 34. p. 63.
— (2). Referat über Daguin 1. *ibid.* p. 211—212.
— (3). Referat über Felt 2. *ibid.* p. 233.
- Klapálek** (1). Siehe Zichy.
- Koca G.** (1). (Ueber die Fauna von Croatien?) Glas. Narav. XII 1900 p. ? — Referat von Speiser 1902. Allg. Z. Ent. VII p. 412—413. (*Col.*, *Lep.*)
- Kohl** (1). Siehe Geschichte.
- Kolbe H. J.** (1). Gartenfeinde und Gartenfreunde. Die für den Gartenbau schädlichen und nützlichen Lebewesen. Berlin 1901. 318 pp. 76 figg.
— (2). Ueber die Entstehung der zoogeographischen Regionen auf dem Kontinent Afrika. Naturw. Wochenschr. 1901 p. 145—150. — Referat von Schröder. Allg. Z. Ent. VII 1902 p. 187—188 und von Meisenheimer Zool. Centr. 1902 p. 311—312.
- Koningsberger J. C. & Zimmermann A.** (1). De dierlijke Vijanden der Koffiecultuur op Java. I. Batavia 1897. 85 pp. 6 tabb., II. 1901. 125 pp., 6 tab. col., 56 figg. Med. Plantentuin Java 44. 1901 p. 7—113.

- Kraepelin K.** (1). Ueber die durch den Schiffsverkehr in Hamburg eingeschleppten Thiere. Jahrb. Hamb. Anst. 18, 1901 Beih. 2 p. 183—209.
- Krause E.** (1). Die Lebenszähigkeit der Insekten. Prometh. XII p. 603—605, 610—612.
— (2). Musicirende Käferlarven. *ibid.* p. 750. (Referat über Gahan 1900, 1.)
- Krécsy B.** (1). (Der entomologische Unterricht in Amerika) *Rov. Lap.* VIII 2 p. 26—29.
- Krüger L.** (1). Michel Edmond de Selys-Longchamps †. *Stett. ent. Z.* 62 p. 214—217.
- Krumbach Th.** (1). Referat über Emery 1. *Zool. Centr.* VIII p. 812—813.
- Kuhlgatz Th.** (1). Siehe Lucas, Wandolleck & Kuhlgatz 1.
— (2). Siehe Rübsaamen.
- Kusnetzoff J. D.** (1). Siehe Lampert 1.
- Labbé A.** (1). Referat über Giardina 1900, 1. *L'Ann. biol.* V p. 77.
— (2). Referat über Launoy (1). *ibid.* p. 322.
- Laloy K.** (1). Instinct et intelligence chez les insectes. *Le Nat.* 1901 p. 24—26. — Referat von Schenkling 1.
- Lampa S.** (1). Berättelse till Kongr. Landbruksstyrelsen angående Verksamheten vid Statens entomologiska Anstalt, dess tjänstemäns Resor M. M. under År 1900. *Ent. Tids.* 1901 p. 1—56. (*Col.*, *Lep.*, *Hym.*, *Dipt.* etc.)
— (2). För finska faunan nya insekter. *ibid.* p. 158—159. (*Lep.*, *Col.*, *Dipt.*)
— (3). Eleanor Anne Ormerod †. *ibid.* p. 183—186. (Biographie.)
- Lampert K.** (1). (Das Leben der Binnengewässer. Die Thiere und Pflanzen des Süßwassers, deren Leben, Verbreitung und Bedeutung für den Menschen.) Uebers. mit Zusatz. bezügl. der russischen Fauna u. Flora unter der Redaction von N. A. Cholodkovsky u. J. D. Kusnetzoff. St. Petersburg. 1900 880 pp., 380 figg. u. 28 tabb. — Referat von Adelung *Zool. Centr.* IX 1902 p. 40—41. (Russische Uebers. von Lampert 1899, *Hem.*, *Neur.*, *Orth.*)
- Lanquardt H. T.** (1). Schmetterlinge und Ameisen. Beobachtungen über eine Symbiose zwischen *Lycaena Argus* L. und *Formica cinerea* Mayr. *Chur* 1901, 4 pp. 1 tab. — Referat *Allg. Zeit. Ent.* VI p. 123. (Dürfte Referat über Thomann 1. sein).
- Launoy L.** (1). Modifications des échanges respiratoires consécutives à la pigûre d'un *Hyménoptère* chez les larves de *Cétoine* dorée. *Bull. Mus. hist. nat.* 1900 p. 383—386. — Referat von Labbé 2. (*Hym.* u. *Col.*).
- Lebedinski J.** (1). (Zur Höhlenfauna der Krim). (Schr. d. Neuruss. Ges. XXIII 2. p. 47—64, 1 tab.). (Russisch. *Apt.*, *Dipt.*).

- Lécaillon A.** (1). Sur les diverses cellules de l'ovaire qui interviennent dans la formation de l'oeuf des Insectes. C. R. Acad. Sc. Paris 132. p. 586—588. — Referat Rev. Scient. XV p. 343. (*Apter.*, *Col.*)
- Lefevre G.** (1). The Advance of Zoology in the Nineteenth Century. Acad. St. Louis 11. p. 71—104.
- Léon N.** (1). Recherches morphologiques sur les pièces labiales des Hydrocores. Jassy 1901. 13 pp. fig. — Referat von Adelung, Zool. Centr. 1902 p. 748. (*Rhynch.*, die homologen Theile bei Mandibulaten nachgewiesen, *Orth.*, *Col.*)
- Leonardi G.** (1). Siehe Lunardoni (1).
- Lesne P.** (1). Note préliminaire sur les récoltes entomologiques de G. Thoiré dans la colonie de la Côte d'Ivoire. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris VII 1901 p. 396—397.
- Lindemann K. E.** (1). (Die Insekten der Obstbäume und Beeresträucher, sowie die Mittel ihrer Vertilgung). 3. Aufl. Moskau 1901. 135 pp. figg.
- Locella** siehe Emery.
- Lochhead W.** (1). A Plea for the systematik and economic Study of the forest Insects of Ontario. Ann. Rep. Ent. Soc. Ontar. 31. 1900 p. 34—37.
- (2). Insects of the Season of 1900. *ibid.* p. 72—75.
- (3). Injurious Insects of the Season of 1901. *ibid.* 32. 1901 p. 43—50.
- (4). The Hibernation of Insects. *ibid.* p. 75—78 figg.
- Lohde R.** (1). Inhalts-Verzeichniss der Deutschen Entomologischen Zeitschrift, Jahrgang 1893—1899. Deut. ent. Zeitschr. 1900, Beil. p. 1—36.
- Lounsbury C. P.** (1). Report of the Government Entomologist of the Cape of Good Hope for the year 1899. Capstadt 1900. 56 pp. 4 tabb.
- Lucas R.** (1). Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der Entomologie während des Jahres 1899. Allgemeines, p. 1—144. Arch. Nat. 66. II. 2. — Referat von Schröder 29.
- (2). Siehe Lucas, Wandolleck & Kuhlitz 1.
- Lucas R., Wandolleck B. & Kulitz Th.** (1). Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der Entomologie während des Jahres 1897. Arch. Nat. 64. II. 2. 2. p. 321—1029. — Referat von Schröder 1902 Allg. Z. Ent. VII p. 349—350. (*Hym.*, *Lep.* p. 321—759, *Neur.*, *Rhynch.*, *Corrodent.* p. 815—917 und *Plecopt.*, *Odonata* etc. p. 999—1029 von Lucas; — *Dipt.* p. 759—815 von Wandolleck; — *Orthopt.* p. 917—999 von Kuhlitz).
- Lucas Th. P.** (1). Coluration of Insects. Proc. Soc. Queensl. XI p. 66.
- Lunardoni A. & Leonardi G.** (1). Gli Insetti nocivi ai nostri orti etc. etc. IV. *Neurotteri*, *Emitteri*, *Fisapodi*, *Ortotteri* e

Pseudoneurotteri du Leonardi. Nap. 1901. (Schluss des Werkes. *Col.* u. *Lep.* von Lunardoni 1888 resp. 1894, *Hym.* u. *Dipt.* von Leonardi 1900).

- Marchal P.** (1). Referat über Henneguy 1899 (1). L'Ann. biol. V p. 134.
 — (2). Referat über Anglas 1900 (1), Bataillon 1900 (1 u. 2), Giard 1900 (8), Mesnil 1900 (1), Perez 1899 (2) u. 1900 (1), Rouget 1900 (1), Terre 1900 (1 u. 2), *ibid.* p. 227—230.
 — (3). Referat über Lameere 1899 (1). *ibid.* p. 230—232.
 — (4). Sur les Moeurs et le rôle utile de *Nabis lativentris* Boh. Bull. Soc. ent. Fr. 1900 p. 330—332. — Referat von Schenkling 4. (*Rhynch.*, *Lep.*).
- Marlatt C. L.** (1). The principal Insect Enemies of Growing Wheat. U. S. Dep. Agr. Div. Ent. Bull. 27 p. 40 pp.
- Marshall W.** (1). Katechismus der Zoologie. II. Aufl., Lpz. 1901. 612 pp. 297 figg. — Referat von Pfurtscheller 1.
 — (2). Siehe Girod 1.
- Masaraky V.** (1). (Excursionen in der Umgegend von St. Petersburg). Hor. ross. 35. p. XL—XLVII. (Russisch. *Col.*, *Lep.*, *Rhynch.*, *Hym.*)
- May W.** (1). Referat über Smith 1900 (3). Zool. Centr. VIII p. 165.
 — (2). Referat über Smith 1900 (2). *ibid.* p. 165—166.
- Mayer P.** (1). Zoologischer Jahresbericht für 1900, v. d. zool. Stat. Neapel 1901. *Arthropoda* p. 1—19, *Hexapoda* p. 38—56, Allg. Biologie p. 9 u. 11 mit Berichten über Cuénot 1900 (1), Folsom 1900 (1), Giardina 1900 (1), Janet (1), Knower 1900 (1), Lameere 1899 (1), Meves 1900 (1), Plateau 1900 (3), Redikorzew 1900 (1), Walton 1900 (1), Zschokke (4).
- Mc Lachlan R.** (1). Baron Michel Edmond de Selys-Longchamps. Ent. Mont. Mag. 37 p. 78—80.
- Mearns J.** (1). A contribution to the Entomology of Aberdeen. Ann. Scott. Nat. Hist. 1901 p. 92—99.
- Meijere J. C. H. de** (1). Ueber das letzte Glied der Beine bei den *Arthropoden*. Zool. Jahrb. Abth. Anat. XIV p. 417—476, tab. 30—37. Referat von Schröder 19. und von Mayer 1902 p. 47. (Alle Ord., besond. *Dipt.*).
- Meisenheimer J.** (1). Referat über Stoll 1899 (1). Zool. Centr. VIII p. 700—702.
- Mendelsohn M.** (1). Referat über Loeb 1899 (1). L'Ann. biol. V p. 466—469.
- Merrifield F.** (1). Experimental Entomology. Ent. Rec. XIII p. 26—31.
 — (2). Siehe Fabre 1.
- Meunier F.** (1). Referat über Fritsch 1. Allg. Zeit. Ent. VI p. 347.

- (2). Aperçu des principales publications d'entomologie agricole, horticole et forestière parues en France, en Allemagne et aux Etats-Unis pendant l'année 1900. Brüssel 1901. 14 pp. — Referat u. Kritik von Reh Allg. Z. Ent. VII p. 487.
- Mocsáry** (1). Siehe Zichy.
- Moffat J. A.** (1). Notes on the Season of 1900. Ann. Rep. Ent. Soc. Ontar. 31. 1900 p. 42—44.
- (2). Notes on the Season of 1901. *ibid.* 32. 1901 p. 50—53.
- Mokrshezki S. A.** (1*). (Schädliche Thiere und Pflanzen im Gouvernement Taurien nach Beobachtungen im Jahre 1900). Simferopol 1901, 95 pp. 1 tab. — Referat von Speiser, Allg. Z. Ent. VIII p. 435. (Russisch. *Col., Lep., Rhynch., Dipt., Hym.*).
- Moll J. W.** (1). Referat über Vries 1. Biol. Centr. 1901 p. 257—269, 289—305.
- Morley Cl.** (1). Siehe *Col.* Morley (1). (Auch *Rhynch., Dipt., Hym.* genannt).
- (2). Siehe Elliott & Morley.
- Morton K. J.** (1). *Trichoptera, Neuroptera-Planipennia, Odonata* and *Rhopalocera* collected in Norway in the summer of 1900. Ent. Mont. Mag. 37. p. 24—33. (*Neur., Orth., Lep.*).
- Mysslowsky, M. N.** (1). (Ueber einen neuen Parasiten des Maikäfers und Versuche, die Larven der Melolonthiden mit Schwefelkohlenstoff zu vernichten). („Unsere Wirthschaft“ no. 33) St. Petersburg. 1900. 9 pp. — Referat von Adelung, Zool. Centr. VIII p. 513—514. (Russisch. *Col., Dipt.*).
- Nagel W. A.** (1). Referat über Bohn 1. Zool. Central. VIII p. 458—458.
- Nassonow N.** (1). (Cursus der Entomologie. I. Die äusseren Decken der Insecten.) 4 tabb. Warschau 1901. 218 pp. 112 figg. u. 4 tabb. — Referat von Adelung Zool. Centr. 1902 p. 524—526. (Russisch. Inhaltreiches Handbuch).
- Needham J. G. & Betten C.** (1). Aquatic Insects in the Adirondacks, a Study conducted at the Entom. Field Station, Saranac Inn, N. Y. under the dir. of E. P. Felt. Bull. 47 of the N. York State Mus. p. 383—622, 36 tabb. — Referat Journ. R. Micr. Soc. Lond. 1902 II p. 179—180, u. von Speiser 1902. All. Z. Ent. VII p. 91—92. (*Orth., Neur., Dipt., Hym.*).
- Newstead R.** (1). The food of some birds inhabiting an orchard. Gard. Chron. 1901 p. 197, 217. — Referat von Reh 1902 Allg. Z. Ent. VII p. 28. (*Dipt., Lep., Col., Orth.*)
- Nicéville L. de** (1). The food-plants of the butterflies of the Kanara district of the Bombay Presidency, with a revision of the species of butterflies there occurring. Journ. Asiat.

*) Ueber die Orthographie des Autornamens vergl. Ber. 1900 p. 79.

Soc. Bengal. 69 p. 187—278. — Referat von Bethune 5. (p. 190 sind 20 *Lycaeniden* aufgezählt, deren Larven von Ameisen beleckt u. beschützt werden).

Nuove relazioni intorno ai lavori della R. Stazione di Entomologia agraria di Firenze, per cura della direzione. III 442 pp.

Ormerod E. A. (1). Report of injurious insects and common farm pests during the year 1900 with methods of prevention and remedy. 24 1901 111 pp. — Referat von Bethune 2.

Pavel (1). Siehe Zichy.

Pergande Th. (1). The ant-decapitating fly. Proc. ent. Soc. Wash. IV 1901 p. 497—502. — Referat von Escherich Zool. Centr. 1902 p. 86—89. (Kampf zwischen *Dipt.* u. *Hym.*)

Perrier E. (1). L'instinct. Le Nat. 1901 p. 257—260.

Pfurtscheller (1). Referat über Marshall 1. Verh. Zool. bot. Ges. Wien 1901 p. 623.

Pic M. (1). Siehe Coleopt. 11.

Plateau F. (1). Notice sur la vie et les travaux de Michel Edmond Baron de Selys-Longchamp. Annuaire Acad. Belg. 68 p. 45—157, Portr.

Poppius B. (1). Tre anmärkingsvärda Insekter. Meddel. Soc. Fauna Flora Fenn. 27. 1901 p. 73—74, 177, 178. (1 *Hym.*, 2 *Col.*)

— (2). Några för Finland nya eller anmärkningsvärda insekter. ibid. 24. 1900 p. 29—30, 184, 186. (3 *Lep.*, 1 *Col.*)

— (3). Tvenne för Finlands fauna nya Insekter. ibid. 25. 1900 p. 56, 135, 136. (*Col.*, *Rhynch.*)

— (4). (Tvenne för Finlands fauna nya Insekter. ibid. 26. 1900 p. 29, 218, 220. (*Col.*, *Lep.*).

Poulton E. B. (1). The Influence of Darwin upon Entomology. Ent. Rec. XIII p. 72—76.

Proceedings of the thirteenth annual meeting of the Association of economic entomologists. U. S. Dep. Agr. Ent. Bull. XXXI.

Proceed. ent. Soc. Wash. (1). Obituary of Henry Guernsey Hubbard. Proc. ent. Soc. Wash. IV p. 350—356.

— (2). The entomological writings of Henry G. Hubbard. ibid. p. 356—60. (68 Schriften.)

Prout L. B. (1). Orthographical and classical „emendations“ in nomenclature. The Ent. 34 p. 8.

Prowazek S. (1). *Pteromaliden*-Larven in Schildläusen. Allg. Zeitschr. Ent. VI, p. 289—291, 352, tab. IV. (*Hym.*, *Rhynch.*)

Pruvot G. (1). Referat über Viré 1899 (2). L'Ann. biol. V p. 436—437.

— (2). Referat über Absolon 1900 (1). ibid. p. 437—438.

Quail A. (1). Hymenopterous Parasite of Ovum of *Vánessa gonerilla* Trans. N. Zeal. Inst. 33. 1900 p. 153—154 tab. VIII. (*Hym.*, *Lep.*)

- Quedenfeldt** (1). (Ueber das Zahlenverhältniss von ♂ u. ♀ u. über Parthenogenesis). Berl. ent. Zeit. 1901, Sitzb. p. 29—30. (*Lep.*, *Orthopt.*)
- Radl E.** (1). Untersuchungen über die Lichtreaction der Arthropoden. Arch. f. ges. Phys. 87. 1901 p. 418—466. — Referat u. Kritik von Tümpel 1902. Allg. Z. Ent. VII p. 217—218 u. von Mayer 1902 p. 20—21.
- (2). Ueber den Phototropismus einiger Arthropoden. *ibid.* Biol. Centralbl. 1901 p. 75—86. (*Crust.*, *Dipt.*)
- (3). (Ueber die morphologische Bedeutung der Doppelaugen der *Arthropoden.*) Prag 1901. 56 pp. 1 tab. (Tschechisch.)
- Rebel** (1). Siehe Geschichte.
- Redikorzew W.** (1). Berichtigung. Zool. Anz. 24 p. 235.
- Reh L.** Referat über Wasmann 1899 (3). Allg. Zeit. Ent. VI p. 191.
- (2). Referat über Needham 1900 (2). *ibid.* p. 234.
- (3). Referat über Montandon 1900 (1). *ibid.* p. 237.
- (4). Referat über Sanderson 1. *ibid.* p. 383.
- (5). Schädigung der Landwirtschaft durch Thierfrass im Jahre 1900. Naturw. Wochenschr. 16. p. 417—424.
- (6). Ueber Verschleppung von Thieren durch den Handel. Sitz.-Ber. Gartenbau-Ver. Hamb. Altona. 1900—1901. 18 pp. — Referat von Schröder 28. (*Hym.*, *Rhynch.*, *Dipt.*, *Lep.*, *Col.*)
- Reitter E.** (1). Referat über Konow Zeitschr. für systematische Hymenopterologie und Dipterologie. Wien. ent. Zeit. XX p. 45.
- (2). Referat über Lucas 1900 (1) u. Seidlitz 1900 (1). *ibid.* p. 88.
- (3). Referat über Krancher 1. *ibid.* p. 232.
- Reuleaux F.** (1). Lehrbuch der Kinematik. Bd. II. Braunschw. 1900. — Referat von Thilo.
- Reuter E.** (1). Berättelse öfver skadeinsekters uppträdande i Finland år 1899. Landbrucks. Medd. 1900 p. ?, 44 pp.
- (2). Id. år 1900. *ibid.* 1901 p. ?, 41 pp. — Referat von Speiser Allg. Z. Ent. VII p. 435. (*Lep.*, *Dipt.*, *Apter.*)
- Rey** (1). (Ueber Mimicry bei europäischen Insekten) *ibid.* p. 12. (*Col.*, *Hym.*, *Dipt.*, *Lep.*)
- (2). (Ueber Mimicry). Berl. ent. Zeit. 1901, Sitzb. p. 13—14. (Hauptsächl. *Lep.*, aber auch *Hym.*, *Dipt.* erwähnt.)
- Ribaga C.** (1). Gli Insetti che danneggiano il Gelso. *Coleoptera e Lepidoptera.* Boll. Ent. agrar. Pat. veget. VIII p. 25—32, 49—57, 73—82, 97—104, 121—126, 145—153, 169—177, 193—199. — Referat von Speiser Allg. Z. Ent. VII p. 435. (*Rhynch.*, *Col.*, *Lep.*, *Hym.*, *Orth.*)
- (2). Principali Insetti nocivi alle piante da frutto in Italia. Boll. (2) III. Scuol. Agric. (2) III 1901. 48 pp., 50 figg. — Referat von Speiser 1902 All. Z. Ent. VII p. 253—254. (*Rhynch.*, *Col.* etc.)

- Ris F.** (1). Michael Edmond de Selys-Longchamps. Mitth. Schw. ent. Ges. X 8. 1901 p. 367—369 (Necrolog).
- Roman A.** (1). Siehe *Col. Roman* 1. (*Col.*, *Hym.*)
- Rosenstock R.** (1). Siehe Schmeil 1.
- Rudow F.** (1). Vögel und Insekten. Ins.-Börse XVIII p. 157—158 180—181. (*Lep.*, *Col.*, *Hym.*, *Orth.*, *Dipt.*, *Neur.*)
- Rübsaamen E. H.** (1). Bericht über meine Reisen durch die Tucheler Haide in den Jahren 1896 und 1897. Nebst Beiträgen von Fr. Dahl, Th. Kuhlitz und Fr. Thureau. Schrift. nat. Ges. Danz. X 1901 p. 79—148. — Referat von Speiser 1902, Allg. Z. Ent. VII p. 28—29. (38 spp. *Ara-neina* von Dahl, 118 spp. *Lep.* von Thureau, 20 *Orthopt.*, 28 *Odonat.*, 89 *Rhynch.* von Kuhlitz, 599 *Dipt.*, 259 *Zoocetidien* von Rübsaamen bestimmt).
- Sahlberg J.** (1). Anmärkningsvärda insektfynd gjorda under senhöster vid Helsingfors. Medd. Fauna Flora Fenn. 24. 1900 p. 10—11, 184, 186. (9 *Col.*, 1 *Lep.*)
- (2). (Några till finska samlingarna inlemnande insekter). *ibid.* 23, 1898, p. 46—47, 190, 191. (1 *Col.*, 2 *Lep.*)
- Saint-Remy G.** (1). Referat über Bachmetjew 1899 (2). *L'Ann. biol.* V p. 297.
- (2). Referat über Bachmetjew 1900 (1). *ibid.* p. 297—298.
- Salignac F. de** (1). Origine et distribution géographique de faune d'Europe. *Soc. hist. nat. de Toulouse* 1901 p. ? sep. 52 pp.
- Sanderson E. D.** (1). Report of the Entomologist. Rep. Delaware Exp. Stat. for 1899—1900 p. 142—238, 5 tabb. — Referat von Reh 4. (Hauptsächlich *Aphiden* behandelt, einige *Dipt.*, *Col.*, *Hym.* erwähnt).
- Sarudnyi N.** (1). (Eine Excursion nach Ost-Persien). (*Schr. russ. geogr. Ges.*) 36. 1901 p. 1—360. — Ref. von Grevé, *Zool. Centr.* 1902 v. 605—606. (Soll auch Insekten enthalten).
- Schenkling S.** (1). Referat über Laloy 1. *Ins.-Börse XVIII* p. 83—84.
- (2). Referat über Bohn 1. *ibid.* p. 244.
- (3). Referat über Hagen 1. *ibid.* p. 380—381.
- (4). Referat über Marchal 4. *ibid.* p. 140.
- Schlechtendal D. v.** (1). Referat über Darboux & Houard. *Allg. Zeit. f. Ent.* VI p. 349—350.
- Schmeil O.** (1). Text-book of Zoology. Treated from a biological Standpoint. Transl. by Rud. Rosenstock. Lond. 1901, 510 pp.
- Schmiedeknecht O.** (1). Subtropische Fauna und Flora im paläarktischen Gebiet. Reise-Erinnerung an Palästina. *Allg. Zeit. Ent.* VI p. 54—57. (*Hym.*, *Col.*)
- Schneider** siehe Sparre.
- Schröder Chr.** (1). Referat über Distant 1900 (1). *Allg. Zeit. Ent.* VI p. 10.
- (2). Referat über Berlese 1900 (4). *ibid.* p. 12.

- (3). Referat über Smith 1900 (1). *ibid.* p. 13.
 - (4). Referat über Giard 1900 (8). *ibid.* p. 14.
 - (5). Referat über Wasmann 1900 (4). *ibid.* p. 15.
 - (6). Referat über Prowazek 1900 (1). *ibid.* p. 28.
 - (7). Referat über Bachmetjew 1900 (2). *ibid.* p. 28.
 - (8). Referat über Ritzema-Bos 1900 (1). *ibid.* p. 29.
 - (9). Referat über Walton 1900 (1). *ibid.* p. 59.
 - (10). Referat über Oudemans 1900 (1). *ibid.* p. 61.
 - (11). Referat über Brunner 1900 (1). *ibid.* p. 76.
 - (11a). Referat über Escherich 1a. *ibid.* p. 79.
 - (12). Referat über Seurat 1900 (1). *ibid.* p. 104—105.
 - (13). Referat über Jühling 1900 (1). *ibid.* p. 108.
 - (14). Referat über Illidge 1900 (1). *ibid.* p. 155.
 - (15). Referat über Wasmann 1900 (3). *ibid.* p. 170.
 - (16). Referat über Lenz 1900 (1). *ibid.* p. 202.
 - (17). Referat über Stift 1900 (1). *ibid.* p. 203.
 - (18). Referat über Walton 1. p. 206.
 - (19). Referat über Meijere 1900 (2). *ibid.* p. 207.
 - (20). Referat über Ormerod 1900 (2). *ibid.* p. 236.
 - (21). Referat über Goethe 1900 (1). *ibid.* p. 260.
 - (22). Referat über Ritzema-Bos 1900 (3). *ibid.* p. 264.
 - (23). Referat über H. Goss 1900 (1). *ibid.* p. 267—268.
 - (24). Referat über Ritzema-Bos 1900 (2). *ibid.* p. 269.
 - (25). Referat über Dewitz 1. *ibid.* p. 984.
 - (26). Referat über Bachmetjew 1. *ibid.* p. 285—286.
 - (27). Referat über Simroth 1. *ibid.* p. 300—301.
 - (28). Referat über Reh 1. *ibid.* p. 317—318.
 - (29). Referat über Lucas 1. *ibid.* p. 318.
 - (30). Referat über Zehntner 1900 (3). *ibid.* p. 334.
- Schwarz E. A.** (1). On the Insect Fauna of the Mistletoe. *Pr. Ent. Soc. Wash.* IV p. 392—394. (*Rhynch., Col., Hym.*).
- (2). List of Insects hitherts known from the Pribiloff islands. *Rep. Fur. seal investigations III* p. 547—552.
- Scudder S. H.** (1). Some insects of special interest from Florissant, Colorado and other points in the tertiaries of Colorado and Utha. *Bull. U. S. Geol. Surv.* n^o 93, 1892, p. 1—25, tab. I—III. (*Neur., Rhynch., Col., Dipt., Lep., Hym.*).
- Seebold T. L. F.** (1). Notice necrologique sur le Dr. Otto Staudinger. *Ann. Soc. ent. Fr.* 70. p. 6—7.
- Sernander R.** (1). Den Skandinaviska Vegetationens Spridningsbiologi. Berlin 1901, 459 pp. 32 fig. — Referat von Dalla Torre 1. (Auch Insekten u. allg. Betracht. über Myrmecophilie u. Mimicry).
- Sharp D.** (1). *Zoological Record for 1900. Insecta.* p. 1—354. — Referat von Speiser 1902, *All. Z. Ent.* III p. 123—124.
- (2). Siehe Fabre 1.

- Sharpe E. M.** (1). On the Collections of Insects obtained by Dr. Donaldson Smith in Somali Land. The Entom. 34. Oct. Suppl. p. 1—8. (*Lep.*, *Col.*, *Pseud.*, *Neur.*).
- Shelford R.** (1). Observations on Mimicry in Bornean Insects. Rep. Brit. Assoc. Adv. Sc. 70. p. 795—797. (*Col.*, *Lep.*, *Neur.*, *Dipt.*).
- Silvestri F.** (1). Descrizione die nuovi *Termitofili* e relazioni di essi con gli ospiti. Boll. Mus. Tor. XVI no. 395 p. 1—6. (*Dipt.*, *Rhynch.*). — no. 398 p. 1—24 (*Col.*, *Thys.*).
- (2). Informe sobre los Insectos perjudiciales al Naranja, el Algodon, la Caña de azucar y el Tabaco en los Territorios de Misiones, Chaco y Formosa. Buen. Air. 1901, 19 pp. 2 tabb.
- Simony O.** (1). Bericht über die während der Expedition (Sokotra) gemachten (entomologischen) Sammlungen. Anz. Akad. Wien Math.-nat. Cl. 1899 p. 82—84.
- Simroth H.** (1). Abriss der Biologie der Thiere. Leipz. 1901, 163 pp. — Referat von Schröder 27. (Experimente auch an *Lep.*, *Dipt.*, *Hym.*, *Rhynch.*).
- (2). Die Ernährung der Thiere im Lichte der Abstammungslehre. Odenkirchen 1901, 42 pp. — Referat von Speiser 1902 All. Z. Ent. VII p. 124—125.
- Slingerland M. V.** (1). Three unusual Strawberry Pests and a Greenhouse Pest. Bull. 190. Cornell Exp. Stat. 1901 p. 145—164, 6 tab. — Referat von Reh 1902 Allg. Z. Ent. VII p. 58—59. (*Col.*, *Lep.*, *Rhynch.*).
- Slosson A. T.** (1). On a Florida Beach. Ent. News XII p 10—12. (*Col.*, *Dipt.*, *Orth.*, *Rhynch.*, *Sammelbericht*).
- Smith J. B.** (1). Concerning protests and other things. Can. Ent. 33. p. 276—279. (Polemik).
- (2). Report of the Entomological Departement of the New Jersey Agricultural College Experiment Station for the year 1900 p. 477—572, figg. — Referat von May Zool. Centr. 1902 p. 255. (*Lep.*, *Rhynch.* etc.).
- (3). Two strawberry pests. New Yersey Exp. Stat. Bull. 149. 1901 p. ? 17 pp., 2 tabb. — Referat von Reh All. Z. Ent. VII 1902 p. 159 und von May Zool. Centr. 1902 p. 255. (*Lep.*, *Rhynch.*).
- (4). The Entomologist's experiment orchard. N. Jersey exp. Stat. Bull. 155. p. 1—71. — Referat von May Zool. Centr. 1902 p. 369.
- Solla** (1). Pflanzenschäden durch Thiere verursacht. Auszug aus dem Jahresber. d. Deutsch. Staats-Oberrealschule 1899—1900 Triest 1900. — Referat von Eckstein 1900 p. 4. (*Col.*, *Hym.*, *Lep.*, *Rhynch.*).
- Sopp E. J. B.** (1). The Study of the Life History. The Entomol. 34 p. 93—97, 117—126 (Rede). (*Lep.*, *Col.*, *Dipt.*).

- Sparre-Schneider J.** (1). *Coleoptera og Lepidoptera ved Bergen og i naermestremegn.* Bergens Mus. Aarb. 1901 p. 217—223. (*Col., Lep., Rhynch., Hym.*).
- Speiser P.** (1). Referat über Verhoeff 1900 (1). Allg. Zeit. Ent. VI p. 60.
 — (2). Referat über Comstock & Needham 1899 (1). *ibid.* p. 142.
 — (3). Referat über Froggatt 1. *ibid.* p. 169.
 — (4). Referat über Giardina 1900 (1). *ibid.* p. 237.
 — (5). Referat über Lombroso 1900 (1). *ibid.* p. 366.
 — (6). Einiges über die Verbreitung und Verschleppung ekto-parasitischer Insekten. Ins.-Börse 18. 1901 p. 379—380. (Descendenztheoretisches).
- Ssemenow A.** (1). Referat über A. Jacobson 1. Hor. ross 35. p. 111—112.
 — (2). Referat über Masaraky 1. *ibid.* p. 112.
 — (3). Referat über Tarnani 2. *ibid.* p. 120.
 — (4). Referat über Zichy 1. *ibid.* p. 187—195.
 — (5). Referat über D. Sharp 1. *ibid.* p. 262.
 — (6). (Zum Andenken an E. Ballion. *ibid.* p. 297—299. (Russisch. Necrolog. 19 Schriften verzeichnet. *Col., Lep.*).
- Stephani-Perez Th. de** (1). Cecidozoi e Zoocecidii della Sicilia. Giorn. Sc. nat. e Econ. Pal. XXIII p. 204—?, 2 tabb.
 — (2). Contribuzione all' Entomocecidologia della Flora Sicula. Nuov. Giorn. botan. ital. VIII 1901 p. 441—556. — Referat von Speiser Allg. Z. Ent. VII 1902 p. 436. (*Hym., Rhynch.*).
- Steuer A.** (1). Referat über Zimmermann 1900 (5). Verh. Zool. bot. Ges. Wien 1901 p. 616—619.
- Stevenson Ch.** (1). Commercial Entomology, or Insects and Insect-Products met with in Commerce. Ann. Rep. Ent. Soc. Ontar. 32. 1901 p. 113—115.
- Stichel H.** (1). Referat über Bachmetjew 1. Berl. ent. Zeit. 1901 p. 555—556.
 — (2). Referat über Forel 1. *ibid.* p. 556—557.
- Stiles Ch. W.** (1). Insects as disseminators of disease. Virgin. Medic. Semi-Monthly IV. p. 53—58. (Vielleicht nur *Dipt.*?).
- Szépligeti** (1). Siehe Zichy.
- Tarnani J. K.** (1). Siehe *Col.* Tarnani 1.
 — (2). (Parasiten des Maikäfers, *Melolontha vulgaris*). Hor. ross. 35. p. LXIX—LXX. — Referat von Eckstein 1902 p. 25. (*Dipt., Col.*).
- Taschenberg E. L.** (1). Schutz der Obstbäume gegen feindliche Thiere. III. Aufl. 1901. 341 pp., 75 fig.
- Thaxter R.** (1). Preliminary Diagnoses of new Species of *Laboulbeniaceae*. I—V. Pr. Am. Acad. Arts Sc. Cambridge 1899, 1900, 1901 u. 1902 p. ? — Referat von Ludwig All. Z. Ent. VII 1902 p. 458—459. (Siehe Parasiten).

- Therese Prinzessin von Bayern** (1). Auf einer Reise in Südamerika gesammelte Insekten. III. *Lepidopteren*. IV. *Coleopteren*. Berl. ent. Zeitschr. 1901 p. 235—308 tab. IV u. V, p. 463—486 tab. VII. (*Lep.*, *Col.*).
- Thilo O.** (1). Referat über Reuleaux 1. Biol. Centralbl. 21. p. 513—528.
- Thobe** (1). Abnorme Fortpflanzung. Hubert. 1901 p. 615. — Referat von Eckstein 1902 p. 5.
- Thomann H.** (1). Schmetterlinge und Ameisen. Beobachtungen einer Symbiose zwischen *Lycaena Argus* L. und *Formica cinerea* Mayr. Jahresber. Ges. Graub. 44. 1901 p. 1—40, 1 tab. — Referat von Imhof (2), von Ins.-Börse 18. p. 69, von Escherich, Zool. Centr. 1902 p. 89—91 u. wahrscheinl. von Lanquardt 1.
- (2). Un cas de symbiose de Fourmis et de Chenille. C. R. Soc. Helv. 1900 p. 58—59.
- Thurau Fr.** (1). Siehe Rübsaamen 1.
- Tornier G.** (1). Siehe *Col.* Tornier 1. (Auch *Orth.*, *Neur.*, *Lep.*)
- Townsend C. H. T.** (1). New and little known *Diptera* from the Organ mountains and vicinity in New Mexico. Tr. Am. ent. Soc. 27. p. 159—164 (Mimikry zwischen *Dipt.* u. *Hym.*).
- Turner H. J.** (1). Desultory Days at Dawlish. Pr. South Lond. Ent. Nat. Hist. Soc. 1900 p. 21—30.
- Tutt J. W.** (1). Note zu Verrall 1. Ent. Rec. XIII p. 185—186.
- (2). Obituary: Baron Michel Edmond de Selys-Longchamps. ibid. p. 79—80, Portr.
- Velitchkovsky V.** (1). Faune du district de Walouyki du gouvernement de Woronège (Russie). I. *Coleoptera* par A. Jakowlew, G. Jacobson, E. König et V. Velitchkovsky. II. *Tenthredinidae* par A. Jakowlew, III. *Diptera* par Portchinsky. Charkow 1900, 1901. 63, 5 u. 16 pp. (*Col.*, *Hym.*, *Dipt.*, wahrscheinl. nur Verzeichnisse).
- Verhoeff C.** (1). (Ueber die systematische Eintheilung der *Arthropoden*). Berl. ent. Zeit. 1901, Sitzb. p. 27—28. (Wahrscheinl. dasselbe wie 1900, 2).
- Verrall G. H.** (1). The anterior and posterior Legs of Insects. Ent. Rec. XIII p. 184—185.
- (2). Names of Legs of Insects. Ent. Mont. Mag. 37. p. 64.
- (3). Names of Legs of Insects. The Entom. 34. p. 84.
- Vignon P.** (1). Recherches de Cytologie générale. Sur les épithéliums, l'appareil pariétal, protecteur ou moteur. Le rôle de la coordination biologique. Arch. Zool. exp. 1901 p. 371 —? tab. XV—XVIII. (*Dipt.*, *Lep.*, *Col.*).
- Vries H. de** (1). Die Mutationen und die Mutationsperiode bei der Entstehung der Arten. Leipz. 1901, 64 pp. — Referat von Moll 1, von Schröder, All. Z. Ent. VII 1902 p. 37, von Driesch, Biol. Centr. 1902 u. von Mayer 1902 Allg. Biol. p. 15.

- Waddington J.** (1). Yorkshire Naturalists at Wykeham near Scarborough. The Nat. 1900 p. 293—301.
- Wainwright C. J.** (1). *Diptera* and *Hymenoptera* in Norfolk. The Ent. 34, p. 201—303. (Mehrere Dipt. u. Hym. aufgeführt).
- Walker J. J.** (1). The „Curtis“ Collection of British Insects. Ent. Mont. Mag. 37. p. 76. (Ueber Curtis' Original-Sammlung, jetzt in Melbourne).
- (2). A collecting Trip in South Western-Ontario. Ann. Rep. Entom. Ontar. 32. 1901 p. 85—90.
- Walton L. B.** (1). The metathoracic Pterygota of the Hexapoda and their Relation to the Wings. Amer. Natural. 35. p. 357—362. — Referat von Schröder 18 u. von Mayer 1901 p. 46—47.
- Wandolleck B.** (1). Siehe Lucas, Wandolleck & Kuhlitz.
- Wasmann E.** (1). Siehe *Col.* 2.
- (2). Nervenphysiologie und Thierpsychologie. Biol. Centr. XXI 1901 p. 23—31. — Referat von Wandolleck, Allg. Z. Ent. VII 1902 p. 458. (Gegen Uexküll, auch Insekten erwähnt).
- (3). Referat u. Kritik über Schmeil 1900 (2). *ibid.* p. 155—156.
- (4). Biologie oder Ethologie. *ibid.* p. 391—400.
- (5). Gibt es thatsächlich Arten, die heute noch in der Stammesentwicklung begriffen sind? Zugleich mit allgemeinen Bemerkungen über die Entwicklung der Myrmecophilie und Termitophilie und über das Wesen der Symphilie. (118. Beitrag zur Kenntniss der Myrmecophilen und Termitophilen). *ibid.* p. 689—711, 737—752. — Referat von Escherich 4a. (Hauptsächl. *Col.* u. *Hym.*, auch *Lepid.*, *Rhynch.*, *Orth.* genannt p. 744, siehe Descendenztheorie).
- (6). Zur Kenntniss der myrmecophilen *Antennophorus* und anderer auf Ameisen und Termiten reitender *Acarinen*. Zool. Anz. XXV p. 66—76. (*Hym.*, *Orth.*).
- (7). Zur Lebensweise der Ameisengrillen (*Myrmecophila*). Nat. u. Offenb. 47. 1901 p. 129—152. — Referat von Escherich 3. (*Orth.*, *Hym.*).
- (8). *Termitoxenia*, ein neues flügelloses, physogastres *Dipteren*-Genus aus Termitennestern. II. Nachtrag zum systematischen und biologischen Theil. Zeit. wiss. Zool. 70. 1901 p. 289—298. — Referat von Wandolleck Allg. Z. Ent. VII p. 519 u. von Escherich, Zool. Centr. 1902 p. 86—89. (Forts. von 1900, 5).
- (9). Zur näheren Kenntniss der termitophilen Dipteren-gattung *Termitoxenia* Wasm. Verh. intern. Zool. Congr. Berlin 1901 p. 852—872. — Referat von Escherich, loc. cit. p. 746.
- Webster F. M.** (1). The Trend of Insect Diffusion in North America. Ann. Rep. Ent. Soc. Ontar. 32. 1901 p. 63—67.

- Referat von Speiser, Allg. Z. Ent. VII p. 514. (Geogr. Verbreit. einwandernder Ins.).
- (2). Siehe Webster *Col.* 3. (Auch *Hym.* u. *Dipt.*).
- Weed Cl. M.** (1). Nature Biographies: The lives of some everyday Butterflies, Moths, Grasshoppers and Flies. Neu-York 1901. 164 pp. — Referat von Bethune 4.
- Weehler W. M.** (1). *Microdon* larvae in *Pseudomyrma* nests. Psyche IX p. 222—224, fig. (*Dipt.*, *Hym.*).
- (2). An extraordinary Ant-Guest. Amer. Natural. 35. 1901 p. 1007—1016, fig. — Referat von Escherich, Zool. Centr. 1902 p. 84—86, fig. (*Dipt.*, *Hym.*).
- Weismann A.** (1). Siehe Bachmetjew.
- Weiss** (1). Das Auftreten von Krankheiten und Schädlingen im Frühlinge 1901. Pract. Bl. Pflanzensch. 1901 p. 41—? — Referat von Eckstein 1902 p. 23. (*Dipt.*, *Rhynch.*, *Col.*, *Lep.*, *Hym.*).
- Westerlund A.** (1). („Winterinsekten aus Kuopio“). Medd. Fenn. 23. 1898. p. 80, 189. (*Apt.*, *Rhynch.*)
- Wieren R.** (1). (Zum Andenken A. Becker's). Rev. Russe d'Ent. I p. 130—133. Portr. (Russisch. Necrolog. 27 Schriften aufgezählt. *Lep.*, *Col.*).
- Woodward R. S.** (1). The Progress of Science. Science 14. p. 305—315.
- Xambeu** (1). Moeurs et Metamorphoses des Insectes. Melanges biologiques. Ann. Soc. Linn. Lyon 48. 1901. p. 1—40. (*Hym.*, *Dipt.*)
- Zehnder L.** (1). Die Entstehung des Lebens aus mechanischen Grundlagen entwickelt. II. Leipz. 1900, 340 pp. — Referat von Speiser 1902, Allg. Z. Ent. VII p. 121—122. (Auch Insekten erwähnt).
- Zehntner L.** (1). Over eenige Insectenplagen bij de Cacaocultuur op Java. Samarang 1901, 23 pp.
- (2). De Plantenluizen van het Suikerriet op Java. XIII, XIV, XV. Arch. Java Suikerind. 1901 p. ?, 18 pp. 2 tab. — Referat von Speiser Allg. Z. Ent. VII 1902 p. 436 und von Handlirsch Zool. Centr. 1902 p. 65. (Hauptsächl. *Aphid.*, aber auch *Col.*, *Dipt.*, *Hym.* als Feinde derselben).
- Zichy E. Graf** (1). Dritte asiatische Forschungsreise. II. Bd. Zoologische Ergebnisse. Redig. v. Dr. G. Horváth. Pest u. Leipzig. 1901. 470 pp. 28 tabb. — Referat von Ssemenow 4. (*Col.* von Csiki, *Hym.* von Mocsáry u. Szépliget, *Lep.* von Pavel, *Dipt.* von Kertész, *Orth.* von Bolivar, *Neur.* von Klapálek, *Rhynch.* von Horváth. Im Ganzen 2067 spp. aufgezählt u. zahlreiche nov. spp. beschrieben).
- Zimmermann A.** (1). Ueber einige durch Thiere verursachte Blattflecken. Ann. jardin. de Buitenzorg. 17. p. 102—125. — Referat von Keissler 1. (*Rhynch.* und Milben).

- (2). Sammelreferate über die thierischen und pflanzlichen Parasiten der tropischen Kulturpflanzen. Centr. Bakter. Abth. II, VII p. 914—924.
- (3). Siehe Koningsberger & Zimmermann.
- Zirngiebl** (1). Insektenlarven in Früchten. Prakt. Bl. Pflanzensch. 1901 p. 19—?, 25—? — Referat von Eckstein 1902 p. 24. (*Lep.*, *Hym.*, *Col.*, *Dipt.*).
- Zograff N. J.** (1). (Materialien zur Kenntniss der Genealogie der Arthropoden). Tagebl. zool. Abth. Ges. Fr. d. Naturk. Moskau III p. 1—6. (Russisch).
- Zürn** (1). Kulturpflanzen schützende Pilze und ihre praktische Verwendbarkeit. Prakt. Blätt. Pflanzensch. 1901 p. 28—?, 36—? — Referat von Eckstein 1902 p. 24. (*Dipt.*, *Lep.*, *Orth. Rhynch.*, *Col.*, *Hym.*).

B. Uebersicht nach Zeitschriften.

I. Europa.

a. Deutschland, Oestreich, Balkanländer, Schweiz.

Selbstständig erschienene Werke. Bachmetjew 1., Eimer 1., Emery 1., Forel 1., Friedländer 1., Girod 1., Goethe 1., Hollrung 1., Kolbe 3., Lanquardt 1., Léon 1., Marshall 1., Radl 1., Reuleaux 1., Sernander 1., Simroth 1., 2., Solla 1., Taschenberg 1., Vries 1., Zehnder 1., Zichy 1.

Entomologische Zeitschriften.

- Deutsche entomologische Zeitschrift 1901: Lohde (1), Beil. p. 1—36.
- Stettiner entomologische Zeitung 62. 1901: Krüger (1) p. 214—217.
- Berliner entomologische Zeitschrift 1891: Quedenfeldt (1) Sitzb. p. 29—30. — Rey (1) Sitzb. p. 12, (2) p. 13—14. — Stichel (1) p. 555—556, (2) p. 556—557. — Therese von Bayern (1) p. 235—308, 463—486. — Verhoeff (1) Sitzb. p. 27—28.
- Wiener entomologische Zeitung XX 1901: Brunetti (1) p. 231, Reitter (1) p. 45, (2) p. 88, (3) p. 232. — Wasmann (1) p. 145—147.
- Mittheilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft X 8. 1901: Ris (1) p. 367—369.
- Mittheilungen des Mühlhausner Entomologischen Vereins 17. 1900: Fettig (1) p. 1—5.
- Allgemeine Zeitschrift für Entomologie VI. 1901: Bogdanow (1) p. 35—41, (2) p. 100—102. — Meunier (1) p. 347. —

Prowazek (1) p. 289—291, 352. — Reh (1) p. 191, (2) p. 234, (3) p. 237, (4) p. 383, (5) p. 417—424. — Schlechtendal (1), p. 349—350. — Schmiedeknecht (1) p. 54—57. — Schröder (1) p. 10, (2) p. 12, (3) p. 13, (4) p. 14, (5) p. 15, (6) p. 28, (7) p. 28, (8) p. 29, (9) p. 59, (10) p. 61, (11) p. 76, (11a) p. 79, (12) p. 104—105, (13) p. 108, (14) p. 155, (15) p. 170, (16) p. 202, (17) p. 203, (18) p. 206, (19) p. 207, (20) p. 236, (21) p. 260, (22) p. 264, (13) p. 268, (24) p. 269, (25) p. 284, (26) p. 285—286, (27) p. 300—301, (28) p. 317—318, (29) p. 318, (30) p. 334. — Speiser (1) p. 60, (2) p. 142, (3) p. 169, (4) p. 237, (5) p. 366.

Insektenbörse 18. 1901: Fruhstorfer (1) p. 3, 18, 42, 50, 58, 74, 81, 90, 98, 106, 114, 122, 130, 138, 145, 154, 161, 170, 178, 185, 194, 202, 210, 218, 226, 234, 241, 250, 258, 266, 274, 282, 298, 306, 313, 322. — Gauckler (1) p. 91—93, 98—100. — Rudow (1) p. 157—158, 180—181. — Schenkling (1) p. 83—84, (2) p. 244, (3) p. 380—381, (4) p. 140. — Speiser (1) p. 379.

Entomologisches Jahrbuch 11. 1901: Alté (2) p. 216—223.

Entomologische Litteraturblätter I. 1901: Friedländer (1) p. 1—210, (2) p. 116—117.

Rovartani Lapok VIII: Biro (1) 3. p. 45—47, 4. p. 78—81. — Csiki (1) p. 31—36. — Krécsy (1) 2. p. 26—28.

Zoologische Zeitschriften.

Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie 70. III. 1901: Hesse (2) p. 347—464, 465—473. — Wasmann (8) p. 289—298.

Zoologische Jahrbücher. Abth. f. Anatomie XIV. 1901: Meijere (1) p. 417—469, 470—476.

Zoologica XIII. 33. 1901: Heymons (3) p. ?

Zoologisches Centralblatt VIII. 1901: Adelung (1) p. 58—59, (2) p. 59—61, (3) p. 61—62, (4) p. 70—71, (5) p. 513—514. — Bergh (1) p. 591—604, (2) p. 863—864. — Bütschli (1) p. 489—490. — Escherich (2) p. 64—65, (3) p. 420—422, (4) p. 526—528, (4a) p. 808—812. — Hesse (3) p. 113, (4) p. 113—114. — Heymons (1) p. 241—245, (2) p. 239—240. — Krumbach (1) p. 812—813. — May (1) p. 165, (2) p. 165—166. — Meisenheimer (1) p. 700—702. — Nagel (1) p. 457—458.

Zoologischer Anzeiger 24. 1901: Berlese (2) p. 515—521. — Hesse (1) p. 30—31. — Redikorzew (1) p. 235. — Wasmann (6) p. 66—76.

Idem. Bibliographia Zoologica 1901: Carus (1) p. 57, 140, 265, 379, 486.

Zoologischer Jahresbericht für 1900 an der zoologischen Station in Neapel 1901: Mayer (1) Arthrop. p. 1—19, Hexapoda p. 38—56, Allg. Biol. p. 9—11.

- Sitzungsberichte der Gesellschaft für Morphologie und Physiologie in München XV. 1899 (1900): Hertwig (1) p. 142—153.
- Tageblatt des 5. internationalen Zoologen-Congresses in Berlin 1901: Forel (2) p. 20.
- Verhandlungen des V. internationalen Zoologen-Congresses in Berlin 1901: Wasmann (9) p. 852—872.
- Archiv für die gesammte Physiologie 87. 1901: Radl (1) p. 418—466.

Naturhistorische Zeitschriften.

- Archiv für Naturgeschichte 64. 1898 II. 2. 2: Lucas, Wandolleck & Kuhlitz (1) p. 321—1029. — Lucas (1) 66. 1900, II. 1. p. 1—144.
- Archiv für Entwicklungsmechanik XI. 1900: Dewitz (1) p. 690—699.
- Biologisches Centralblatt 21. 1901: Escherich (1) p. 416—431. — Imhof (1) p. 189—192, 459—463, (2) p. 458. — Moll (1) p. 257—269, 289—305. — Radl (2) p. 75—86. — Thilo (1) p. 513—528. — Wasmann (2) p. 23—31, (3) p. 155—156, (4) p. 391—400, (5) p. 689—711, 737—752.
- Centralblatt für Bakteriologie, Abth. II, VII 1901 (?): Zimmermann (1) p. 914—924.
- Comptes-rendu 83. Session de la Société Helvétique des Sciences naturelles 1900: Thomann (2) p. 58—59.
- Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft Graubündens 44. 1901: Thomann (1) p. 1—40.
- Jahrbuch der Hamburger wissenschaftlichen Anstalten. Beiheft. (Mittheilungen aus dem naturhistorischen Museum in Hamburg) 18. 1901: Kraepelin (1) p. 183—209.
- Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig X. 1901: Rübsaamen (1) p. 79—148.
- Sitzungsberichte der naturforschenden Gesellschaft in Rostock 1900: Escherich (1a) p. ?
- Archiv für naturwissenschaftliche Landesdurchforschung Böhmens XI. 1901: Fric (1) p. 163—180.
- Anzeiger d. K. Akad. der Wissenschaften. Mathematisch-naturwiss. Classe, Wien 1899: Simony (1) p. 82—84.
- Sitzungsberichte der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe der Akademie der Wissenschaften in Wien 108, Abth. I 1901: Brauer (1) p. 464—477.
- Verhandlungen der Zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien 1901: Hormuzaki (1) p. 368. — Keissler (1) p. 542. — Pfurtscheller (1) p. 623. — Steuer (1) p. 616—619. — Geschichte der Botanik und Zoologie in Oestreich, Festschr. 1901.
- Verhandlungen des naturforschenden Vereins zu Brünn 39. 1901: Absolon (2) p. ?

- Naturwissenschaftliche Rundschau 14. 1901: Hanstein (1) p. 188—190, (2) p. 188—190.
Naturwissenschaftliche Wochenschrift 1901: Kolbe (1) p. 145—150.
Prometheus XIII. 1901: Krause (1) p. 603—605, 610—612, (2) p. 750.
Sitzungsberichte der Medicinisch-naturhistorischen Section des Siebenbürgischen Museum-Vereins 24. 1899: Bálint (1) p. 18—19.
Glasnik Naravoslovnog XII 1900: Koca (1) p. ?

Forst- & landwirthschaftliche Zeitschriften.

- Allgemeine Forst- & Jagdzeitung 1901: Eckstein (1) Suppl. p. ?, 26 pp.
Zeitschrift für Forst- & Jagdwesen 1901: Eckstein (2) p. 739.
Hubertus 1901: Thobe (1) p. 615.
Praktische Blätter für Pflanzenschutz 1901: Weiss (1) p. 41. — Zirngibel (1) p. 19, 25. — Zürn (1) p. 28, 36.
Sitzungsberichte des Gartenbau-Vereins in Hamburg-Altona 1900—1901: Reh (6) p. ?

Allgemein-wissenschaftliche Zeitschriften.

- Berichte der Böhmisches Franz-Josef-Akademie X 1901 (?): Absolon (1) p. ?
Allgemeines Litteraturblatt X 1901: Hamann (1) p. 185—186.
Natur und Offenbarung 47. 1901: Wasmann (7) p. 129—152.

b. Norwegen, Schweden, Finnland.

- Entomologisk Tidskrift 22. 1901: Lampa (1) p. 1—56, (2) p. 158—159, (3) p. 183—186.

b. Schweden u. Finnland.

- Bergens Museum Aaarbog 1901: Sparre-Schneider (1) p. 217—223.
Meddelanden of Societas pro Fauna et Flora Fennica 23. —27. 1898—1901: Poppius (2) 24. 1900 p. 29—30, 184, 186, (3) 25. 1900 p. 56, 135, 136, (4) 26. 1900 p. 29, 218, 220, (1) 27. 1901 p. 73—74, 177, 178. — Sahlberg (1) 24. p. 10—11, 184, 186, (2) 23. 1898 p. 46—47, 190, 191. — Westerland (1) 23. 1898 p. 80, 189.
Landbrucks Meddelanden 1900, 1901: Reuter (1) p. ?, (2) p. ?

c. Russland (excl. Finnland).

- Selbstständig erschienene Werke: Lampert 1., Lindemann 1., Mokrshezki 1., Nassonow 1., Velitschkovsky 1.

- Horae Societatis entomologicae Rossicae 35. 1901: M. Jacobson (1) p. V—XIV, G. Jacobson (1) p. XIX—XX, Masaraky (1) p. XL—XLVII, Tarnani (2) p. LXIX—LXX.
- Revue Russe d'Entomologie I. 1901: Ssemenow (1) p. 111—112, (2) p. 112, (3) p. 120, (4) 187—195, (5) p. 262, (6) p. 297—299; Wieren (1) p. 130—133.
- Archives des Sciences biologiques VIII. 1900 (?): Bachmetjew (2) p. ?
- (Schriften der russischen geographischen Gesellschaft) 36. 1901: Sarudnyi (1) p. 1—360.
- (Schriften der Neurussischen Gesellschaft) 23. 2. 1901 (?): Lebedinski (1) p. 47—64.
- (Tageblatt der Zoologischen Abtheilung der Gesellschaft der Freunde der Naturkunde in Moskau) III. 1901: Zograff (1) p. 1—6.
- (Unsere Wirthschaft) no. 33 St. Petersburg. 1900 Myslowsky (1) p. ?, 9 pp.

d. Frankreich.

- Selbstständig erschienene Werke:** Beaugard 1., Champville 1., Daguin 1., Darboux & Houard 1.

Entomologische Zeitschriften.

- Annales de la Société entomologique de France 70. 1901: Kieffer p. 233—384. — Pic (1) p. 157—173. — Seebold (1) p. 6—7.
- Bulletin de la Société entomologique de France 1901: Anglas (1) p. 301—304. — Baer (1) p. 186—188. — Giard (1) p. 214—216. — Marchal (4) 1900 p. 330—332.
- Revue d'Entomologie XX. 1901: Dubourgais (1) p. I—XXXI.
- Miscellanea entomologica VIII. 1901: Kieffer (1) p. 30.

Zoologische Zeitschriften.

- Bulletin de la Société zoologique de France 26. 1901: Dubois (1) p. 24—28. — Guiart (1) p. 129—143.
- Causeries scientifiques de la Société zoologique de France, 1901: Gadeau (3) p. ?
- Archives de Zoologie expérimentale et générale 1901: Vignon (1) p. 371—?

Naturhistorische Zeitschriften.

- Annales de la Société Linnéenne de Lyon 14. 1901: Xambu (1) p. 1—40.
- Comptes-rendus hebdomadaires de l'Académie de Sciences à Paris 132. 1901: Lécaillon (1) p. 586—588.
- Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle 1901: Launoy (1) p. 383—386. — Lesne (1) p. 396—397.

- Nouveau Archiv du Museum d'Histoire naturelle de Paris II.
1901: Bouvier (1) p. III—XXVIII.
- L'Année biologique V 1899 u. 1900 (1901): Claparède (1) p. 550—551. — Cuénot (1) p. 188—189, (2) p. 212—214. — Duboscq (1) p. 129. — Hecht (1) p. 450. — Labbé (1) p. 77, (2) p. 322. — Marchal (1) p. 134, (2) p. 227—230, (3) p. 230—232. — Mendelsohn (1) p. 466—469. — Pruvot (1) p. 437—438. — Saint-Remy (1) p. 297, (2) p. 297—298.
- Bulletin de la Société d'étude des Sciences naturelles de Nimes 28. 1901: Chobaut (1) p. 71—72.
- Bulletin de la Société des amis des Sciences naturelles de Rouen 1900: Gadeau (1) p. 145—224.
- Société d'Histoire naturelle de Toulouse 1901: Salignac (1) p. ?
- Interméd. Biol. I. 1898¹⁾: Ballion (1) p. 106.
- Feuille des jeunes Naturalistes 31. 1901: Buysson (1) p. 251—252, 271—272.
- La Nature 29. 1901: Clément (1) p. 71—74.
- Le Naturaliste 23. 1901: Brogniart (1) V? anno? p. 266—? — Coupin (1) p. 242—244, 276—277. — Fleutiaux (1) p. 115—117. — Gadeau (1) p. 221—222. — Laloy (1) p. 24—26. — Perrier (1) p. 257—260.
- Cosmos 43. 1900: Acloque (1) p. 393—397.

Allgemein-wissenschaftliche Zeitschriften.

- Revue scientifiques (4) 16. 1901: Baer (2) p. 247. — Coupin (1) p. 782—786. — Ewart (2) p. 545—?
- Bulletin scientifique de France et de Belgique 34. ^{bis} 1901: Darboux & Houard (1) p. 1—544.
- Association française pour l'avancement des Sciences. Comptes rendu 28. 1901: Jourdain (1) p. 190—191.

e. Belgien u. Holland.

- Selbstständig erschienene Werke:** Meunier 2.
- Annuaire de l'Académie de Belgique 68. 1901: Plateau (1) p. 45—157.

f. England.

- Selbstständig erschienene Werke:** Connold 1., Dalglish 1., Fabre 1., Headley 1., Ormerod 1., Schmeil 1., Sharp 1.

Entomologische Zeitschriften.

- Transactions of the Entomological Society of London 1901: Fowler (1) p. XXXIII—LIX.

¹⁾ Den vollen Titel dieser Zeitschrift kann ich nirgends finden. Das Citat steht „Année biologique“ V. p. 498. Es ist lebhaft zu bedauern, dass dort jetzt nicht mehr, wie in den ersten Jahrgängen, ein Zeitschriften-Verzeichniss gegeben wird, das sehr nützlich war.

heat or cold. The variety at our command increases every season, and since the Arnold Arboretum was established trees and plants come to us from every country of the temperate zone.

But my farm is only a plain Massachusetts farm, where no attempt is made at the higher order of embellishment, but where more than a hundred different kinds of ornamental trees, and nearly if not quite a thousand individual trees have been planted to test their habits of growth and hardiness and improve the farm landscape. Some of them have already contributed to the construction of farm buildings, while others have been made into household furniture, and a plenty yet remain of ample size and dimensions, suitable for any purpose for which wood or lumber is used. These trees have been planted with my own hands, have been nurtured under my care and supervision, and some of them will outlive generations of men, and remain prominent landmarks as time goes on. The farm is about six hundred feet above tide water.

The better time to plant trees, either spring or autumn, is a question on which there is a wide difference of opinion. Having planted many trees at both seasons with good success, I have come to the conclusion that when climatic and other conditions which should be duly considered by the planter are favorable, the autumn is a propitious season for planting either deciduous or coniferous trees, provided it is accomplished early, when the ground is warm, and root growth is thereby encouraged. For planting deciduous trees, early in October is the better time. The foliage should be removed; the leaves will then cease to draw upon the roots for nourishment, leaving them in condition to make new growth, which they readily do when the ground is warm, and sufficiently moist. Both heat and moisture are essential to promote root growth at any season. In the spring, conditions are changed; the atmosphere is warm and the ground is cold, and while the leaves will start the roots remain dormant, and cannot promptly supply the nourishment required by the top.

Coniferous trees may be planted early in the month of September with advantage, provided the ground is kept moist to insure root growth. When these conditions can be carried out, autumn planting proves of decided advantage. If trees are to be transported long distances spring planting has some advantages. Even spring planting is facilitated by the holes being dug in the autumn; the

action of the frost upon the earth renders it more friable and more easily incorporated among the roots. Thoroughness in filling the spaces among the roots is of essential importance to successful tree planting.

The constantly increasing variety of Ornamental Trees that thrive in the central part of the state is so large that I can but briefly allude to even the most prominent—those that are approved by long experience, and those of newer sorts that promise well. Many trees that were considered but half hardy years ago have seemingly become acclimated, and now withstand our extremes of temperature, adding very much to the landscape in their variety and effect. Of the hardy sorts there are quite enough properly to embellish rural homes with a most agreeable and pleasing variety.

The Maples (*Acer*) have been for a long time and are now prominent in their variety and conspicuous both in landscape and streets—a favorite tree which well repays the attention it receives.

I have growing more than twenty sorts; most prominent are the Sugar, Norway, Schwedleri, Reitenbachi, Geneva, Wier's Cut Leaved, Sycamore, and Purple Leaved, Tataricum, Ginnale, Pennsylvanicum, Negundo, and the Japanese Maples and others which I will omit to mention. In fact the whole family is one of great beauty, and its members are in the front rank of deciduous trees; as ornamental trees some of them will fit any soil or situation. I have many large trees planted near the streets and roads which give abundance of shade and are the glory of the autumn.

The Magnolias are among the most magnificent trees for ornamental planting. Fifty years ago but few were considered hardy. The varied forms of the trees, with the size and verdure of their foliage and the beauty and fragrance of their flowers, place them in the front as ornamental trees where the soil and exposure prove favorable. I have some fifteen varieties, all proving hardy save one. They are *M. acuminata*, *M. glauca*, *M. macrophylla*, *M. tripetala*, *M. Alexandrina*, *M. conspicua*, *M. Kobus*, *M. Lennei*, *M. purpurea*, *M. parviflora*, *M. hypoleuca*, *M. Soulangiana*, *M. speciosa*, *M. stellata*, and *M. Thomsoniana*. Some of these trees are thirty feet high and their season of flowering

- The Canadian Entomologist 33. 1901: Bethune (1) p. 241—242, (2) p. 155—156, (3) p. 238—239, (4) p. 239—240, (5) p. 279—280. — Brunetti (1) p. 207—208. — Smith (1) p. 276—279.
- Entomological News XII. 1901: Calvert (1) p. 33—37. — Cockerell (2) p. 38—43. — Johnson (1) p. 136—138. — Slosson (1) p. 10—12.
- Annual Report of the Entomological Society of Ontario 31., 32. 1900, 1901: Bethune (1) p. 120—125. — Fletscher (1) p. 62—72, (2) — 32. p. 99—108, (3) p. 21. — Fyles (1) p. 13—21. — Gregson (1) p. 106—109, (2) 32. p. 118—120. — Lochhead (1) p. 34—37, (2) p. 72—75, (3) 32. p. 43—50, (4) p. 75—78. — Moffat (1) p. 42—44, (2) 32. p. 50—53. — Stevenson (1) 32. p. 113—115. — Walker (1) 32. p. 85—90. — Webster (3) p. 63—67.
- Psyche IX. no. 297—308 1901: Kellogg (1) p. 173—175. — Weehler (1) p. 222—224.

Naturhistorische Zeitschriften.

- The American Naturalist 35. 1901: Brues (1) p. 337—356. — Walton (1) p. 357—362. — Weehler (2) p. 1007—1016.
- Bulletin of the New York State Museum 36. VII. 1901: Felt (1) 36. VII p. 949—1063, (2) 37. VIII. p. 1—48. — Needham & Betten (1) 47. p. 383—622.
- Bulletin of the United States Geological Survey. 1892. n^o 93: Scudder (1) p. 1—25.
- Proceeding of the Davenport Academy of Natural Sciences VII 1901: Cockerell (1) p. 139—148, 149—156.
- Science Gossip etc. VII. 1901: Buckton (1) p. 257.
- Report Fur . . . seal investigations P. III 1901¹⁾: Schwarz (2) p. 547—552.

Medicinische Zeitschriften.

- Virginia Medical Semi-Monthly VI. 1901: Stiles (1) p. 53—58.

Land- & forstwirtschaftliche Zeitschriften.

- United States Departement of Agricultur, Division of Entomology 1901: Banks (1) p. ? — Chittenden (1) 30. p. 63—74, (2) 27. p. ? — Felt (1) 26. p. 22. — Gillette (1) 26. p. 5, (2) p. 76. — Johnson (1) 26. p. 73. — Marlatt (1) 27. p. ? — Proc. Ass. econ. entom. (1) no. 31.
- Report of the Connecticut experiment Station 1901: Britton (1) p. 277—278.
- Cornell University Agricultural Experiment Station. Bulletin 190. 1901: Slingerland (1) p. 145—164.

¹⁾ Den vollen Titel dieser Zeitschrift kann ich nirgends finden.

- Annual Report of the Delawar College Agricultur Exp. Stat. for 1899—2900, 1901: Sanderson (1) p. 142—238.
 New Jersey agricultural Experiment Station. Bulletin 1901: Smith (3) no. 147, (4) no. 155.
 Kentucky Agricultural Experiment Station 91. 1901: Garman (1) p. 3—56.
 New Mexico College of Agriculture and the mechanic Arts. Agricultural experiment Station. Bulletin 35. 1901: Cockerell (4).

Allgemein-wissenschaftliche Zeitschriften.

- Proceedings of the Washington Academy of Sciences III. 1901: Banks (3) p. 541—546. — Howard (2) 1900: p. 541—604.
 Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences 1899, 1900, 1901, 1902: Thaxter (1) p. ?
 The Transactions of the Academy of Science of St. Louis 11. 1901: Lefevre (1) p. 71—104.
 Transactions of the Royal Society of Canada 1900, Sect. IV: Bethune (1) p. 3—17.
 Science XIV. 1901: Banks (2) p. 976—979. — Davenport (1) p. 315—324. — Jordan (1) p. 498—501. — Kellogg (2) p. 627—628. — Woodward (1) p. 305—315.

Australien, Central-Amerika, Asien.

- Selbstständig erschienene Werke:** French 1., Fuller 1., Lounsbury 1., Koningsberger & Zimmermann 1., Nuove relazioni 1., Silvestri 1., Zehntner 1.
 Proceedings of the Royal Society of Queensland XI. 1901: Lucas (1) p. 66.
 The Agricultural Gazette of New South Wales XII. 1901: Froggatt (1) p. 794—799, (2) p. 1203—1212.
 Transactions and Proceedings of the New Zealand Institute 33. 1900: Hudson (1) p. 383—395. — Quail (1) p. 153—154.
 Boletin del Instituto Fisico-Geografico de Costa Rica I. 1901: Biolley (1) p. 313—318.
 Journal of the Asiatic Society of Bengal II. Nat. Hist. 69. 1901: Nicéville (2) p. 187—278.
 Annales du jardin botanique de Buitenzorg. Batavia, 17. 1901: Zimmermann (1) p. 102—125.
 Archiv voor Java Suikerindustrie 1901: Zehntner (2) p. ?
 Mededeelingen uit 'slands Plantentuin. Batavia. 44. 1901: Koningsberger & Zimmermann (1).

C. Arbeiten nach Inhalt.

I. Literarische und technische Hilfsmittel.

- a) **Hand- & Lehrbücher:** Comstock & Comstock 1, French 1, Howard 1, Marshall 1, Nessonow 1, Schmeil 1, Simroth 1.

Nessonow begann ein Handbuch der Entomologie, in welchem er zunächst das äussere Hautskelet behandelte. — **Howard** und **Simroth** lieferten umfassende Werke über die Biologie der Insekten, **Marshall** und **Schmeil** gaben zoologische Handbücher heraus, in denen die Insekten gebührende Berücksichtigung finden und **French** veröffentlichte ein Handbuch über schädliche Insekten Australiens. — **Comstock & Comstock** gaben die 4. Aufl. ihres Handbuches heraus.

- b) **Bibliographie, Geschichte:** Banks 1, Brauer 2, Brunner 1, Carus 1, Davenport 1, Doria & Gestro 1, Eckstein 1, Friedländer 1, 3, Froggatt 1, Ganglbauer 1, Giard 1, Handlirsch 1, Hubbard 3, Köhl 1, Lefevre 1, Lohde 1, Lucas 1, Lucas & Wandolleck & Kuhlitz 1, Mayer 1, Meunier 2, Plateau 1, Proc. Wash. (2), Rebel 1, Sharp 1, Ssamenow 6, Wieren 1, Woodward 1, Dubourgais 1.

Carus lieferte die vollständigste fortlaufende Bibliographie der gesamten zoologischen Literatur z. Th. von 1900, z. Th. von 1901. Die Insekten kommen mehrere mal an die Reihe.

Die Allg. Zeitschr. f. Entom. (früher „Illustrierte“) bringt 2 mal im Monat ein fortlaufendes Verzeichniss der gesamten entomologischen Literaturerscheinungen.

Mayer bearbeitete die Insekten im Zool. Jahresbericht d. zool. Station in Neapel für 1900 und besprach dabei 11 Arbeiten allgemein entomologischen Inhalts u. mehrere, die in die einzelnen Ordnungen gehören.

Friedländer gab eine neue entomologische Bibliographie heraus, durch die man einen Ueberblick über den entomologischen Inhalt jeder Zeitschriften-Lieferung gewinnt. Leider werden noch nicht alle einschlägigen Zeitschriften auf diese Weise analysirt.

Sharp bearbeitete im Zoological Record pro 1900 die sämtlichen Insekten. Die I. Abth. „Titles“ (p. 5—79), für alle Ordnungen gemeinschaftlich, enthält 1396 Arbeiten, leider aber nicht alle; denn es sind in der II. u. III. Abth. noch zahlreiche Publicationen citirt, deren Titel man nicht erfährt. In der II. Abth. „Biology“ (p. 82—115), auch für alle Ordnungen gemeinsam, sind die Arbeiten nach ihrem Inhalt geordnet. Die III. Abth. „Systematik“ (p. 115—354) behandelt jede Ordnung einzeln.

Lucas lieferte den Allgemeinen Theil des vorliegenden Jahresberichtes pro 1899. Es werden 584 in diesen Theil gehörende Arbeiten aufgeführt, von denen 84 mit entsprechend kurzen Referaten, 65 aber mit unverhältnissmässig (bis zu 5 pp.) langen Excerpten versehen sind. Ausserdem sind noch 179 Arbeiten aufgezählt, welche nur einzelne Ordnungen betreffen, also nicht in diesen Theil gehören, und von denen 22 mit kurzen und 11 mit unverhältnissmässig (bis zu 1 p.) langen Referaten ausgerüstet sind.

Lucas, Wandolleck & Kuhlitz lieferten die übrigen Insekten-Ordnungen (ausser *Coleopt.*) des vorliegenden Berichtes pro 1897.

Banks gab eine Bibliographie der landwirthschaftlichen Entomologie Nord-Amerikas, **Froggatt** eine solche über 1900 in Australien, **Eckstein** einen Bericht über die Forstentomologie von 1900, **Meunier** einen solchen über die land- & forstwirthsch. Entomologie.

Davenport, Lefevre u. Woodward behandelten die Fortschritte der Zoologie im verflossenen Jahrhundert, **Handlirsch, Brunner, Rebel, Brauer, Ganglbauer u. Kohl** die Geschichte der Entomologie in der zweiten Hälfte desselben in Oestreich.

Eine Aufzählung von Hubbard's Schriften brachten die **Proceed. ent. Soc. Wash.** (2), eine solche von Selys-Longchamps Schriften gab **Plateau** (2), eine von Ballion's Schriften **Ssemenow**, eine von Becker's Schriften **Wieren**.

Giard gab ein Literatur-Verzeichniss über Beschädigungen von Büchern durch Insekten.

Doria & Gestro lieferten einen General-Index zu den *Ann. Mus. civ. Gen.* 1870—1901, **Lohde** einen ebensolchen zur *Deut. ent. Zeitschr.* 1893—1899 u. **Dubourgais** einen zur *Revue d'Entomologie* 1892—1901.

c) **Biographien, Necrologe:** Bargagli 1, Bethune 1, Bouvier 1, Calvert 1, Curo 1, Dubois 1, Friedländer 2, Krüger 1, Lampa 1, Mc Lachlan 1, Plateau 1, *Proc. ent. Soc. Wash.* 1, Ris 1, Seebold 1, Ssemenow 6, Tutt 2, Wieren 1.

Ernst Ballion	Ssemenow.
Alexander Becker	Friedländer, Wieren.
Emil Blanchard	Bouvier.
Henry Gernsey Hubbard	<i>Proc. ent. Soc. Wash.</i>
Michel Edmond de Selys-Longchamps	Bargagli, Calvert, Dubois, Krüger, Mc Lachlan, Plateau, Ris, Tutt.
Eleanor Anne Ormerod	Bethune, Lampa.
Dr. Otto Staudinger	Curo, Seebold.

d) **Referate:** Adelung 1—5, Bergh 1, 2, Bethune 2—5, Bütschli 1, Claparède 1, Cuénot 1, 2, Dubosq 1, Eckstein 1, Escherich 2—6, Gadeau 1, Garbowski 1, Guiart 1, Hamann 1, Hanstein 1, 2, Hecht 1, Hesse 3, 4, Heymons 1, 2, Imhof 2, Keissler 1, Krause 2, Labbé 1, 2, Lucas 1, Lucas & Wandolleck & Kuhlitz 1, Marchal 1, 2, 3, May 1, 2, Mayer 1, Meisenheimer 1, Mendelsohn 1, Meunier 1, Moll 1, Pfurtscheller 1, Pruvot 1, 2, Reh 1—4, Reitter 1, 2, 3, Saint Remy 1, Schenkling 1, Schlechtendal 1, Schröder 1—31, Speiser 1—5, Steuer 1, Thilo 1, Wasmann 3, Kirkaldy 1—3, Ssemenow 1—5.

e) **Kritik u. Polemik:** Fletscher 3, Fyles 1, Hormuzaki 1, Krécsy 1, Smith 1, Wasmann 4.

Fletcher, Fyles u. Krécsy gaben kritische Betrachtungen über den Werth naturhistorischen resp. entomologischen Unterrichts resp. Studiums.

Hormuzaki machte kritische Erörterungen über den Werth von Lokalfaunen.

Wasmann trat (sehr mit Recht) für Beibehaltung der in der Entomologie eingebürgerten Bezeichnung „Biologie“ und gegen Einführung des von Dahl, in Nachahmung einiger Franzosen, acceptirten Ausdruckes „Ethologie“ ein.

- f) **Technik:** Alté 1, Bogdanow 2, Brunetti 1—4, Buysson 1, Clément 1, Csiki 1, T. B. Fletscher 1, Johnson 1, Smith 4.
- g) **Sammlungen:** Baer 1, Gauckler 1, Walker 1.

Baer veröffentlichte (nach Stål) eine Notiz über die in Schweden aufbewahrten Sammlungen von Degeer, Paykull, Fallén, Schönherr, Dalman, Fries, Billberg, Sahlberg, Boheman, Stål, Holmgren, Thomson, Wallengren, Linné, Thunberg, Gyllenhal, Zetterstedt, Dahlbom, Ljungh, Westermann (p. 186—188), — **Donkier** (1) über die *Curculioniden* von Chevrolat (p. 188).

Walker gab Auskunft über Curtis' Originalsammlung, die sich jetzt in Melbourne befindet.

II. Systematik.

- a) **Systematische Fragen:** Jordan 1, Verhoeff 1.

Jordan erörterte die Frage nach den „typischen“ Arten bei Zerlegung von Gattungen.

Verhoeff handelte über die Eintheilung der Arthropoden.

- b) **Nomenclatur:** Jordan 1, Prout 1, Verrall 1, 2, 3.

Prout handelte über orthographische und ethymologische Verbesserungen der Namen.

Verrall erörterte die Benennung der vorderen und hinteren Beine der Insekten.

Jordan siehe bei a)

III. Descendenztheorie.

- a) **Allgemeines:** Bacot 1, Eimer 1, Hertwig 1, Poulton 1, Simroth 2, Speiser 6, Vries 1, Wasmann 5, Zehnder 1, Zograff 1, Headley 1.

Bacot erörterte die Stellung der Entomologie zu der von Weismann vertretenen Richtung der Descendenztheorie.

Poulton handelte von Darwin's Einfluss auf die Entomologie.

Headley gab eine umfassende Darlegung der Darwin'schen Selectionstheorie.

Simroth behandelt die Ernährung der Thiere im Sinne der Descendenztheorie.

Zograff erörterte die Genealogie der Arthropoden und **Zehnder** die Entstehung der Lebewesen überhaupt.

Hertwig behandelte die Entstehung der geschlechtlichen Fortpflanzung und der Parthenogenesis. Siehe auch Fortpflanzung pag. 41.

Wasmann zeigte in vorzüglicher Weise, dass es noch heute in der Stammesentwicklung begriffene Arten giebt und erläuterte dieselbe an mehreren myrmecophilen *Coleopteren*.

Vries betonte die Wichtigkeit sprungweiser Variationen (im Gegensatz zur kontinuierlichen Variabilität) für die Neubildung von Arten.

Eimer's Werk gegen die Selectionstheorie wurde durch den 3. Bd. zum Abschluss gebracht.

Speiser betrachtete die Artbildung bei ectoparasitischen Insekten.

b) Schutzfärbung und Mimicry: Fowler 1, Rey 1, 2, Sernander 1, Shelford 1, Townsend 1.

Rey, Sernander, Shelford und **Townsend** brachten neue Belege für echte Mimicry bei.

Fowler sprach über Schutzfärbung und über Mimicry.

c) Färbung und Selectionstheorie: Bohn 1, Eimer 1.

Bohn stellte eine neue Theorie der Farbenanpassung auf. **Eimer** siehe unter a).

d) Vererbung: vacat.

e) Variabilität: Dewitz 1, Ewart 1, 2, 3, Vries 1.

Dewitz und **Ewart** siehe unter f), **Vries** siehe unter a).

f) Missbildungen: Dewitz 1, Ewart 1, 2, 3, Merrifield, Tornier 1.

Dewitz erzeugte durch Verhinderung der Verpuppung bei *Dipteren* und *Hymenopteren* Missbildungen. — **Ewart** u. **Merrifield** handelten über künstlich erzeugte Missbildungen. — **Tornier** siehe Physiologie.

IV. Morphologie (äussere und innere), Histologie, Physiologie, Embryologie.

a) Allgemeines: Bachmetjew 1, 2, Baer 2, Berlese 3, Dewitz 1, Escherich 1, 1a, Ewart 1, Heymons 3, Kellogg 2, Launoy 1, Lécaillon 1, Léon 1, Meijero 1, Merrifield 1, Reuleaux 1, Simroth 1, 2, Tornier 1, Vignon 1, Walton 1, Kaditsch 1.

Bachmetjew veröffentlichte Experimente über die Wirkung von Temperaturveränderungen auf Insekten.

Dewitz, Ewart u. **Merrifield** handelten über experimentelle Entomologie. Siehe auch Missbildungen.

Tornier besprach (im zweiten Theil seiner Arbeit über künstlich herbeigeführte Regeneration von Gliedmassen an *Tenebrio*) übersichtlich die in anderen Insektenordnungen (*Orth.*, *Neur.*, *Lep.*) beobachteten Fälle von Regeneration (p. 649—664).

Kellogg handelte über die Homologie der Mundtheile bei holometabolen Insekten, und **Léon** verglich die Mundtheile der *Rhynchoten* mit denen der Mandibulaten.

Walton handelte über den Metathorax und die Flügel der Insekten.

Meijere untersuchte die Klauenbildung bei allen Ordnungen, hauptsächlich bei vielen *Dipteren*, weniger bei *Coleopteren*, und gab 170 sehr instructive Zeichnungen. Er erklärt das Wurzelgelenkstück der Krallen für ein ursprüngliches sechstes Tarsenglied.

Kaditsch untersuchte die Unterlippe bei *Periplaneta orientalis* (p. 7—10) und wies die homologen Theile derselben auch bei *Coleopteren* (*Necrophorus*, *Carabus*, *Melolontha*, *Agabus*) nach. Diesen verdienstlichen Nachweis schwächt er aber durch eine ganz unzulässige Aenderung der bisherigen Nomenclatur der Theile ab. Die ligula soll jetzt „mentum“ heissen, das mentum soll „Vorderplatte“, das submentum „Submentalplatte“, beide zusammen „submentum“ genannt werden. Wozu? Die Zusammengehörigkeit von mentum und submentum konnte auch bei der alten Nomenclatur genügend betont werden. Die eingeführte Namenverwirrung muss als ganz überflüssig entschieden zurückgewiesen werden. — Siehe auch pag. 116.

Reuleaux (1) behandelt den Mechanismus der Gelenke verschiedener Insekten (*Orth.*, *Col.*) und der Sperrvorrichtungen (*Col.*).

Distant und **Simroth** (1) erörterten die Sinneswahrnehmung der Insekten.

Simroth (2) beleuchtete die Ernährung der Thiere. Siehe auch Descendenzth.

Launoy untersuchte die lähmende Wirkung des Giftes von *Scolia hirta* auf die Larve von *Cetonia aurata*, **Baer** (2) handelte über das von den Arthropoden producirte Gift.

Lécaillon untersuchte die histologischen Vorgänge im Ovarium bei der Eibildung.

Vignon untersuchte die Epithelialbildungen an *Dipt.*, *Lep.* u. *Col.* u. **Berlese** erörterte die Erneuerung des Epithelium des Mesenteriums der Insekten.

Heymons handelte über die Keimblätter bei den Arthropoden.

Escherich (1) brachte eine kritische Abhandlung über das Entoderm der Insekten, wobei er in Bezug auf *Hydrophilus piceus* gegen Degener's (*Col.* 1900, 1.) und für Heyder's Darlegungen eintrat (p. 416—419), dann die *Musciden* behandelte (p. 419—424), die *Hymenopteren* (p. 424—426), die *Orthopteren* (p. 426—427) und schliesslich bei allen pterygoten Insekten die Auffassung Heymon's widerlegte.

b) Pigment: Bohn 1.

Bohn stellte eine neue Theorie der Pigmentbildung (durch direktes Ueberdauern der passendsten Pigmentbildungen) auf.

c) Gesichtssinn, Lichtwirkung: Bálint 1, Davenport & Cannon 1, Distant 1, Duffek 1, Hesse 1, 2, Imhof 1, Redikorzew 1, Radl 1, 2, Simroth 1.

Imhof zählte die Ocellen, die bei *Dipt.* u. *Neuropt.* in den Beschreibungen zu finden sind, **Redikorzew** gab eine berichtigende Notiz, **Radl** (3) behandelte die morphologische Bedeutung der Doppelaugen der Arthropoden und **Bálint** untersuchte die Neurofibrillen im Facettenauge der Insekten.

Hesse (2) schilderte die einfachen Augen aller Ordnungen (p. 394—398), ausgenommen die bei *Colcopt.* vorkommenden, dann die Larvenaugen bei *Dipt.*, *Col.*, *Neur.*, *Lep.*, dann die „Komplexaugen“ (zusammengesetzte Augen) der *Apterygota* u. die der *Lep.*, *Orth.*, *Dipt.* u. *Col.* (p. 418—434), endlich der Arthropoden im Allgemeinen mit Hinzuziehung der Crustaceen etc. (p. 448—464).

Ferner machte er (1) vorläufige Mittheilungen über die einfachen Augen der *Dipt.*, *Hym.*, *Orth.*, *Neur.*, *Rhynch.* u. der Larven von *Col.*

Radl (1, 2) machte Untersuchungen über die Lichtreaction der Arthropoden (*Dipt.*, *Hym.*, *Col.*, *Orth.*, *Phrygan.*, *Crust.*, *Arachn.*), dasselbe thaten **Distant**, **Simroth** und **Davenport & Cannon**.

Duffek erörterte Johannes Müller's Theorie vom musivischen Sehen.

d) **Töne und Gehör:** Coupin 1, Distant 1, Krause 2.

Coupin behandelte die Tonapparate der Insekten, **Krause** dieselben bei Insektenlarven.

Distant erörterte den Gehörssinn bei Arthropoden.

e) **Geruchssinn:** Forel 1, 2.

Forel erörterte den Geruchssinn bei Insekten.

f) **Geschlechtsunterschiede:** vacat.

g) **Histologie der Metamorphose:** Anglas 1, Berlese 1, 2.

Anglas handelte über die Histologie während der Metamorphose bei *Hym.*, *Dipt.* und *Col.*

Berlese berichtete über die Veränderungen des Fettkörpers und Muskelgewebes während der Verpuppung bei *Dipt.*, *Lep.*, *Hym.*, *Neur.* u. *Col.*

V. Biologie.

a) **Allgemeines:** Sopp 1.

Sopp besprach das Studium der Biologie.

b) **Larven, Eier, Puppen:** Lécaillon 1, Hertwig 1, Xambeu 1.

Lécaillon behandelte die histologischen Vorgänge bei der Bildung der Eier im Eierstock. **Hertwig** handelte von befruchteten und unbefruchteten Eiern (siehe c); **Xambeu** beschrieb Larven u. Puppen von *Hym.* u. *Dipt.*

c) **Lebensweise, Fortpflanzung:** Alté 2, Biro 1, Bogdanow 1, Chobaut 1, Cockerell 2, 3, 4, Coupin 2, Cuny 1, Delpino 1, Fabre 1, Fruhstorfer 1, Ghigi 1, Girod 1, Hertwig 1, Jourdain 1, Judd 1, Krause 1, Lampa 1, Lochhead 4, Marchal 4, Needham & Betten 1, Newstead 1, Pergande 1, Rudow 1, Thobe 1.

Hertwig (1) hielt einen lichtvollen Vortrag über geschlechtliche und ungeschlechtliche Fortpflanzung, die bei Protozoen und bei Metazoen beide ganz verschieden aufzufassen sind. Die Parthenogenesis, die „bei allen Arthropoden vorkomme“¹⁾, gehöre nicht zu der ungeschlechtlichen, sondern (bekanntlich²⁾ zu der geschlechtlichen Fortpflanzung (p. 143). Auf pag. 149 muss Zeile 12—14 gestrichen werden.

¹⁾ Dies ist nicht wörtlich zu nehmen; denn aus der grossen Insekten-Ordnung der Coleopteren z. B. ist bisher noch kein Fall von Parthenogenesis festgestellt worden.

²⁾ Vergl. z. B. Seidlitz Die Parthenogenesis und ihr Verhältniss zu den übrigen Fortpflanzungsarten. Leipz. 1872.

Thobe besprach die ungeschlechtliche Fortpflanzung.

Krause berichtete über Lebensfähigkeit bei Insekten.

Jourdain erörterte die Vertheidigungsmittel der Insekten gegen Feinde.

Coupin erörterte die Gewebe und Bauten, welche die Insekten ausführen.

Girod's Werk über Thierstaaten wurde von Marshall ins Deutsche übersetzt.

Bogdanow behandelte die Biologie coprophager *Dipteren* und *Coleopteren*.
Siehe auch Psychologie.

Lampa gab mehrere biologische Details über *Col.*, *Lep.*, *Hym.*, *Dipt.* etc.

Needham & Betten brachten zahlreiche biologische Beobachtungen über *Orth.*, *Neur.*, *Dipt.* u. *Hym.*

Fabre's *Souv. entom.* I wurde ins Englische übersetzt.

Alté, Biro, Cockerell (3, 4), **Fruhstorfer, Ghigi** gaben biologische Notizen.

Cuny behandelte die Beziehungen zwischen Pflanzen und Insekten, **Cockerell** (2) beobachtete den Blumenbesuch durch Insekten an 35 Pflanzenarten, **Delpino** erörterte die biologischen Beziehungen der auf Laub lebenden Arthropoden, **Chobaut** berichtete vom Uebergang einheimischer Insekten auf einen exotischen Baum.

Judd, Newstead und **Rudow** handelten über die Vertilgung von Insekten durch Vögel.

Pergande schilderte den Kampf einer Fliege (*Apocephalus*) gegen Ameisen.

Marchal beobachtete, dass *Nabis lativentris* die Eier von *Pieris Brassicae* u. *Rapae* aussaugte.

d) **Instinct, Psychologie:** Ballion 1, Bogdanow 1, Chapman 1, Forel 1, Laloy 1, Perrier 1, Radl 2, Wasmann 1.

Laloy und **Perrier** handelten kurz und in populärer Weise über Instinkt und Intelligenz bei Insekten.

Ballion erörterte den „Instinkt für Reinlichkeit“ bei Insekten.

Chapman berichtete über Veränderung des Instinktes (bei *Lep.*) nach Angriff durch Parasiten (*Dipt.*).

Radl beobachtete Phototropismus bei Mückenschwärmen.

Bogdanow stellte Experimente über psychologische Fragen an *Dipt.* und *Col.* an.

Forel erörterte eingehend die psychischen Fähigkeiten der Ameisen und einiger anderer Insekten.

Wasmann erwähnte in seiner Abhandlung über Thierpsychologie auch Insekten.

e) **Myrmecophilie, Termitophilie:** Acloque 1, Bethune 5, Brues 1, Buckton 1, Donisthorpe 1, 2, 3, Lanquardt 1, Nicéville 1, Sernander 1, Silvestri 1, Thomann 1, Wasmann 1, 5—9, Weehler 1, 5.

Acloque und **Sernander** gaben allgemeine Betrachtungen über Myrmecophilie, **Donisthorpe** erörterte die Fortschritte in der Kenntniss über Myrmecophilie.

Silvestri beschrieb neue termitophile *Col.*, *Thysan.*, *Dipt.* u. *Rhynch.*

Weehler und **Brues** berichteten über myrmecophile *Dipteren*, **Buckton** über myrmecophile *Aphiden*, **Nicéville** zählte 24 myrmecophile Schmetterlings-

raupen (*Lycaeniden* in Ostindien) auf und **Bethune** referirte über diese u. ähnliche in Nordamerika gemachte Beobachtungen von **Edwards** u. **Scudder**.

Thomann beschrieb genauer die (bekannte) Symbiose der Raupe von *Lycaena Argus* und der Ameise *Formica cinerea*, welche die erstere beleckt und vor dem Angriff durch *Tachinen* u. *Ichneumoniden* beschützt, und **Lanquardt** referirte über **Thomann's** Beobachtung, die aber nicht neu ist. (Vergl. Ins-Börse 18. p. 69).

Wasmann (5) behandelte ausführlich die Arten der myrmecophilen *Coleopteren*-Gattung *Dinarda* u. deren Abstammung sowie deren Wirthe, ausserdem aber noch zahlreiche andere *Coleopteren* und ihre Wirthe und erwähnte (p. 744) auch *Lep.*, *Aphiden*, *Cocciden* etc. in ihrem Verhältnisse zu Ameisen resp. zu Termiten, beschrieb neue Myrmecophilen resp. Termitophilen unter den *Coleopt.* (1), *Acarinen* (6), *Dipt.* (8 u. 9) und behandelte ausführlich die Biologie myrmecophiler resp. termitophiler *Col.* (5), *Orthopt.* (7).

f) **Parasiten, Parasitenwirthe:** **Chapman** 1, **Johnson** 1, **Mysslowsky** 1, **Prowazek** 1, **Quail** 1, **Speiser** 6, **Tarnani** 1, 2, **Thaxter** 1, **Zürn** 1, **G. Jacobson** 1.

Johnson berichtete über einen Parasiten der San-José-Schildlaus, **Chapman** über ein parasitisches *Dipt.* an *Lep.*-Larven, **Mysslowsky** und **Tarnani** über ebensolche an Maikäfer-Larven, **Prowazek** über in Schildläusen u. **Quail** über in *Lep.*-Eiern schmarotzende *Hym.*-Larven.

Speiser handelte über ectoparasitische Insekten.

Thaxter (1) beschrieb 420 Arten der zu den *Laboulbeniaceen* gehörenden Pilze, die auf Insekten leben. Vergl. auch **Thaxter** 1897, *Coleopt.*

Zürn behandelte die den Insekten schädlichen Pilze und ihre praktische Verwendbarkeit. Siehe *Oecon.*

g) **Gallenerzeugung:** **Cecconi** 1, **Connold** 1, **Corti** 1, **Darboux** & **Houard** 1, **Gadeau** 3, **Kieffer** 1, 2, **Stephani** 1, 2.

Connold, **Darboux** & **Houard** und **Kieffer** lieferten umfangreiche Werke, **Cecconi**, **Corti** und **Stephani** kleinere Abhandlungen.

h) **Höhlenbewohner:** **Absolon** 1, 2, **Hubbard** 4, **Lebedinski** 1.

Absolon handelte über böhmische und mährische, **Lebedinski** über krimmische, **Hubbard** über canadische Höhlenbewohner.

i) **Ueberwinterung:** **Lochhead** 4.

VI. Oeconomie.

a) **Schädlinge in Land- & Forstwirtschaft:** **Banks** 1, **Berlese** 4, 5, **Bethune** 6, **Biolley** 1, **Britton** 1, **Carpenter** 2, **Chittenden** 1, 2, **Cockerell** 3, 4, **Éckstein** 1, **Felt** 1, 2, 3, **J. Fletscher** 1, **French** 1, **Fuller** 1, **Garman** 1, **Gibson** 1, **Gillette** 1, 2, **Goethe** 1, **Gregson** 1, 2, **Hollrung** 1, **Kolbe** 1, **Koningsberger** & **Zimmermann** 1, **Lampa** 1, **Lochhead** 1—4, **Lounsbury** 1, **Lunardoni** &

Leonardi 1, Marlatt 1, Meunier 2, Mokrsheski 1, Mysslowsky 1, Newstead 1, Nuove relationi, Ormerod 1, Proceedings, Reh 5, Reuter 1, 2, Ribaga 1, 2, Sanderson 1, Silvestri 2, Slingerland 1, Smith 2, 3, 4, Solla 1, Taschenberg 1, Weiss 1, Zehntner 1, 2, Zimmermann 1, Zirngiebl 1, Zürn 1, Champville 1, Lindemann 1.

- b) **Anderweitige Schädlinge:** Giard 1, Stephenson 1, Stiles 1.
 c) **Nützliche oder verwendete Insekten:** Beaugregard 1, Daguin 1, Stevenson 1, Marchal 4. (Vergl. Biol.).

VII. Geographische Verbreitung.

- a) **Circumpolare Fauna:** vacant.
 b) **Paläarktische Fauna:** Brauer 1, Browne 1, Carpenter 1, 2, Dalglisch 1, Elliott 1, Fettig 1, Fletscher 2, Fleutiaux 1, Gadeau 1, Ghigi 1, Henderson 1, Issel 1, 2, Koca 1, Kraepelin 1, Lampa 2, Lampert 1, Lebedinski 1, Mearns 1, Mocsary 1, Moffat 1, 2, Morton 1, Poppius 1—4, Quedenfeld 1, Reh 6, Rübsaamen 1, Sahlberg 1, 2, Salignac 1, Sarudnyi 1, Schmiedeknecht 1, Sernander 1, Sparre 1, Tutt 1, Turner 1, Velitshkovsky 1, Wainwright 1, Westerlund 1, Zichy 1, Bolivar 1, Csiki 2, Fuente 1, Hovarth 1, A. Jacobson 1, Kertész 1, Klapalek 1, Pavel 1, Szépligeti 1.
 c) **Indo-China:** Hagen 1, Shelford 1, Simony 1.
 d) **Australien und Inseln d. still. Oceans:** Banks 3, Froggatt 1, Hudson 1, Kellog 1.
 e) **Afrika:** Kolbe 1, 2, Sharpe 1.
 f) **Neoarctisch:** Cockerell 1, 2, 3, 3a, 4, Howard 2, Hubbard 1—4, Needham & Betten 1, Schwarz 1, 2, Slosson 1, Walker 2, Webster 1.
 g) **Neotropisch u. Südamerika:** Kirby 1.

VIII. Palaeontologie.

Brogniart 1, Fritsch 1, Scudder 1.

Coleoptera.

Bearbeitet von **Dr. Georg Seidlitz** in Ebenhausen bei München.

Vorbemerkung.

Im Jahre 1901 waren 22 selbstständig erschienene Werke mit ganz oder theilweis coleopterologischem Inhalt zu verzeichnen, also 32 weniger als 1900. In 160 Zeitschriften, von denen nur 39 entomologische waren, wurden 927 Arbeiten publicirt (22 mehr als 1900). Autoren sind 400 zu nennen, von denen 45 zusammen 78 umfassende systematische Arbeiten lieferten, während 20 derselben und 79 andere Autoren zusammen 235 Abhandlungen mit Einzelbeschreibungen brachten (65 weniger als 1900). Im Ganzen beschrieben diese 124 (45+79) Autoren 200 neue Gattungen, 2450 neue Arten und zahlreiche neue Varietäten.

Morphologische und physiologische Verhältnisse wurden von 33 Autoren in 37 Abhandlungen bearbeitet.

Die übrigen 243 Autoren lieferten zusammen 399 Abhandlungen (resp. Notizen) über Litteratur, Descendenztheorie, Biologie, forst- und landwirthschaftliche Schädlinge etc.

Uebersicht.

A. Autoren alphabetisch geordnet	pag. 46
B. Uebersicht nach Zeitschriften	95
C. Arbeiten nach ihrem Inhalt	108
D. Die behandelten <i>Coleopteren</i> nach Familien	122

I. Pentamera.

	pag.		pag.		pag.
Cicindelidae	122	Staphylinidae	147	Erotylidae	161
Carabidae	124	Clavigeridae	155	Endomychidae	162
Dytiscidae	139	Pselaphidae	155	Cryptophagidae	163
Gyrinidae	142	Scydmaenidae	156	Lathriidae	163
Paussidae	142	Silphidae	157	Colydiidae	164
Rhysodidae	143	Anisotomidae	160	Cossyphodidae	164
Cupedidae	144	Corylophidae	160	Cucujidae	165
Hydrophilidae	144	Trichopterygidae	160	Trogositidae	166
Georyssidae	146	Scaphidiidae	vacant	Nitidulidae	166
Heteroceridae	147			Histeridae	166
Parnidae	147	Byturidae	vacant	Mycetophagidae	168
		Phalacridae	161		

	pag.		pag.		pag.
Thorictidae . . .	168	Buprestidae . . .	194	Malacodermata . . .	205
Byrrhidae . . .	169	Eucnemidae . . .	198	Cleridae	210
Dermestidae . . .	169	Elateridae	199	Lymexylonidae . . .	211
Passalidae	170	Cebrionidae	203	Bostrychidae . . .	212
Lucanidae	170			Anobiidae	214
Scarabaeidae . . .	172	Rhipiceridae . . .	204	Cissidae	217
		Dascillidae	204	Sphindidae	vacant

II. Heteromera.

	pag.		pag.		pag.
Tenebrionidae . . .	217	Mycteridae	229	Pyrochroidae . . .	234
Alleculidae	224	Euglenidae	230	Cephaloonidae . .	vacant
Lagriidae	225	Scraptiidae	230	Meloidae	234
Melandryidae . . .	226	Mordellidae	230	Rhipiphoridae . . .	236
Oedemeridae	227	Pedilidae	231	Strepsiptera . . .	236
Pythonidae	228	Anthicidae	232		

III. Tetramera.

	pag.		pag.		pag.
Curculionidae . . .	237	Anthribidae	252	Cerambycidae . . .	254
Scolytidae	251	Bruchidae	253	Chrysomelidae . . .	265
Proterhinidae . . .	252	Brenthidae	254	Coccinellidae . . .	281

A. Autoren in alphabetischer Ordnung.

Abafi siehe Aigner.

Abeille de Perrin E. (1). Rectifications synonymiques. Bull. Soc. ent. Fr. 1901 p. 8. (1 *Chrysobothr.*, 2 *Sphenopt.*, 1 *Anthax.* n. nom.)

— (2). Descriptions de deux *Coléoptères* nouveaux du Nord de l'Afrique. *ibid.* p. 234. (1 *Salpingus*, 1 *Nemonyx* n. spp. Einzelbeschr.)

— (3). Nouvelles espèces de Coléoptères français. *Ech.* 17 p. 59—62, 68—70. (1 *Anacuena*, 1 *Xantholinus*, 1 *Anisotoma*, 1 *Synchita*, 1 *Neuglenes*, 1 *Bathyscia*, 1 *Copris*, 1 *Cryptocephalus* n. spp., Einzelb., auch separat Moulin's 1901, 6 pp., ohne Hinweis auf die Zeitschrift).

Acloque A. (1). Inégalités sociales chez les *Scarabées*. *La Nat.* XXVIII 1900 p. 201—202.

Adelung N. v. (1). Referat über Tschitscherin 1900 (2). *Zool. Centr.* VIII p. 31.

— (2). Referat über Tarnani 1900 (2). *ibid.* p. 69—70.

— (3). Referat über Tarnani 1900 (3). *ibid.* p. 70—71.

— (4). Referat über Mysslowsky 1900 (1). *ibid.* p. 513—514.

— (5). Referat über Sokolow 1900 (1). *ibid.* p. 514—515.

- (6). Referat über Jacobson 1. *ibid.* p. 531—532.
- (7). Referat über Jacobson (Finsk). *ibid.* p. 531—532.
- (8). Referat über Jacobson 1900 (2). *ibid.* p. 532.
- (9). Referat über Ssemenow 1898 (8) u. 1899 (1). *ibid.* p. 534—535.
- Aigner-Abafi L. v.** (1). Referat über Fenyes. 1. Allg. Zeit. Ent. VI p. 188.
- (2). Referat über Fenyes 1900 (1). *ibid.* p. 190.
- Albisson F.** (1). Notes entomologiques: *Hydrocyphon deflexicollis*, *Acmaeodera pilosellae*. Feul. jeun. Nat. XXXI p. 141—142.
- Alisch** (1). Beitrag zur Biologie und Bekämpfung des Apfelblütenstechers (*Anthonomus pomorum*). Ent. Jahrb. XI p. 206—210.
- Allgemeine Zeitschrift für Entomologie** (1): Litteraturbericht: *Coleoptera*. All. Z. Ent. 2× monatlich.
- Alzona C.** (1). Fauna della provincia di Bologna: Coleoptera. Riv. ital. XX 1900 p. 137—140. (Fortsetzung von 1900, 1).
- Anderson L.** (1). Lidl om vore *Crioceris*- og *Cionus*-Arten. Ent. Meddel. (2) I. 1901 p. ?
- Anglas J.** (1). Siehe Allg. Anglas 1. Auch *Col.* erwähnt.
- Apfelbeck V.** (1). Drei neue Höhlenkäfer aus Bosnien. Verh. Zool. bot. Ges. Wien 1901 p. 14—16. (1 *Pholeuonopsis*, 1 *Antroherpon*, 1 *Bathyscia* n. spp., Einzelbeschr.)
- (2). Kritische Abhandlungen über europäische *Otiorrhynchus*-Arten. *ibid.* p. 530—540. (1 n. sp., dich. Tab. über 6 spp.)
- (3). Zwei neue Rassen der Gattung *Carabus* aus Albanien. Soc. ent. XVI p. 121—122 (2 n. varr.).
- (4). Bericht über eine entomologische Forschungsreise nach der Türkei und Griechenland im Jahre 1900. Wiss. Mitth. Bosn. VIII. 1901 p. 447—469. Auch separat Wien 1901. 23 pp. (3 *Pedinus*, 1 *Helops*, 1 *Laena*, 2 *Otiorrh.*, 1 *Ptochus*, 1 *Phyllobius*, 1 *Polydrosus* n. spp. Einzelb.).
- Arrow G. J.** (1). The carabid genus *Pheroporphus*: Notes and descriptions of new species. Tr. Ent. Soc. Lond. 1901 p. 193—209, tab. IX (15 n. sp., Einzelbeschr. u. 1 Tab. über 6 spp.)
- (2). The genus *Hyliota* of the Coleopterous family *Cucujidae*, with descriptions of new forms and a List of the described species. *ibid.* 1901 p. 593—601 (6 n. spp. Einzelbeschr. u. Aufzählung von 32 spp.)
- (3). Remarks upon the Genus *Rhysodes*, with Descriptions of some new Oriental Species. Ann. Mag. Nat. Hist. 1901. 7. p. 83—89. (Umfass. Arbeit.)
- (4). Remarks on secondary sexual Difference in *Rutelid* Coleoptera, with Descriptions of some new Forms. *ibid.* p. 393—401. (1 *Trigonochilus*, 2 *Anoplognathus*, 1 *Mirmadoretus*, 2 *Pseudosinghala* n. spp., Einzelb.)

- (5). The Rutelid genus *Adorodocia* and a new allied Form. *ibid.* VIII p. 35—38. (1 *Pseudadorodocia* n. sp. Einzelb.).
- (6). The Rutelid genus *Adorodocia*. *ibid.* 193—196.
- (7). On a new genus and two new species of African *Cetoniidae*. *ibid.* p. 257—258.
- Babb G. F.** (1). On the Stradulation of *Passalus cornutus* Fbr. *Ent. News* 12 p. 279—281, tab. XII.
- Baer A.** (1). Siehe Allg. Baer 1.
- (2). Sur la distribution géographique des *Cicindèles* au Peron (*Col.*). *Bull. Soc. ent. Fr.* 1901 p. 256.
- Bailey J. H.** (1). *Dryophilus pusillus* Gyll. at Helsby, Cheshire. *Ent. Mont. Mag.* 37 p. 171.
- (2). *Licinus depressus* Payk. in North Staffortshire. *ibid.* p. 171.
- Barbey A.** (1). Les *Scolytides* de l'Europe centrale, étude morphologique et biologique de la famille des *Bostriches* en rapport avec protection des forêts. Genf u. Paris 1901. 121 pp., 15 tab.
- (2). Die Bostrichiden Central-Europas. Eine morphologische und biologische Studie der Familie der Borkenkäfer mit Rücksicht auf den Forstschutz für Forstwirthe, Baumzüchter und Entomologen. Aus dem Französ. übersetzt von Dr. J. Carl. Genf u. Giessen 1901. 119 pp. 15 tabb. — Referat von Escherich 1902 *All. Z. Ent.* VII p. 90—91. (p. 15—28 dichot. Tabellen, p. 29—32 Verzeichniss nach Holzarten, p. 33—114 ausführl. Einzelbeschreib. ganz ohne Citate).
- Barthe E.** (1). *Catalogus Coleopterorum Galliae et Corsicae*. *Miscell. ent.* IX. 1901. p. 13—15, 126—128, 141—143, 190—192.
- Baudisch** (1). Notiz über die Nagekäfer. *Centr. ges. Forstw.* 1901 p. 65—? — Referat von Eckstein 1902 p. 25. (*Anobium* 8 spp. behandelt).
- Beare T. H.** (1). Additions etc. to the List of British *Coleoptera* during 1899 and 1900. *Ent. Mont. Mag.* 37 p. 1—3 (Notizen).
- (2). The late Mr. Lennon's collection of British *Coleoptera*. *ibid.* p. 99.
- (3). Further Notes on *Hydradephaga* and *Hydrophilidae*. *ibid.* p. 279—280. (Sammelbericht).
- (4). *Medon castaneus* Gravh. in Richmond Park. *ibid.* p. 280.
- (5). The Literature of British *Coleoptera* for the past Century. *Ent. Rec.* XIII p. 47—51.
- (6). *Coleopterous Notes* for the Autumn of 1900. *ibid.* p. 328—329.
- (7). *Coleopterous Notes* for April and May. *ibid.* p. 363—364.
- Bedel L.** (1). (Ueber *Mulachius vulneratus* Ab. u. *spinus* Er.) *Bull. Soc. ent. Fr.* 1901 p. 318. (Berichtigung).

- (2). A propos du genre *Pseudomyrmecion* Bed. (Col.) *ibid.* p. 358 (Biol. Notiz.).
- (3). Description et moeurs d'un nouveau genre de *Curculionides* de France (Col.) *ibid.* p. 358—359. (1 *Degorsia* n. gen., n. sp. Einzelb.)
- (4). Faune des Coléoptères du Bassin de la Seine. Phytophaga. V 1889—1901, p. 357—423. Ann. Soc. ent. Fr. 1901 Beilage. (Schluss der *Bruchidae* u. Nachträge zu den *Ceramby.* u. *Chrysom.*)
- (5). Catalogue raisonné des Coléoptères de Tunisie comprenant tous les documents déjà publiés et obligeamment communiqués, et spécialement le resultat des voyages de V. Mayet et M. Sedillot. P. I *Cicindelidae* — *Staphylinidae*. Paris 1900 130 pp.
- (6). Siehe Bedel & Bourgeois 1.
- Bedel L. & Bourgeois J.** (1). *Telephorus geniculatus* Luc. et *Pygidia geniculata* Mars. (Col.) Bull. Soc. ent. Fr. 1901 p. 176—178. (*Spartiolepta* n. subg.)
- Bedwell E. C.** (1). New locality for *Bembidium quadripustulatum* Dej. Ent. Mont. Mag. 37 p. 301.
- Béguin L.** (1). Capture de *Rhipiphorus paradoxus*. Rev. sc. Bourb. XIV p. 46.
- Bellerade** siehe Bial.
- Belon O. P.** (1). Note sur la validité spécifique de *Holoparamecus Truquii* (Col.). Bull. Soc. ent. Fr. 1901 p. 169.
- (2). Revision du genre *Cortilena* Motschulsky de la tribu des Corticariens. Ann. Soc. Linn. Lyon 48. 1901 p. 129—152. — Referat von Ssemenow 4a. (Umfass. Arbeit).
- (3). Remarques sur *Agelandia merkliana* Reitt. L'Ech. XVII p. 35—36. (In Klein-Asien).
- (4). Le genre *Cortilena* Motsch. (*Lathridiidae*) et synopsis de toutes les espèces actuellement connues. Ann. Sc. ent. Belg. 45. 1901 p. 86—89. (Umfass. Revision).
- (5). Petite contribution à la connaissance des *Longicornes* du Congo. *ibid.* p. 246—247. (1 *Gnathoenia* n. sp. Einzelb.)
- (6). Errata du Tome XIX. Rev. Ent. XX p. 256¹).
- Bennett W. H.** (1). Coleoptera in the Nastings District. Ent. Rec. XIII p. 103—104.
- Berg C.** (1). De nonnullis speciebus argentinis cognitiss aut novis generis *Epipedonotae* Sol. Comm. Mus. Buen. Air. I. 8. 1901 p. 267—272 (3 n. spp., Einzelb.).
- (2). *Silfidos* argentinus (*Coleopteros*). Com. Buen. Air. I. 9. 1901 p. 325—330. — Referat von Schröder 1902 Allg. Z. Ent. VII p. 120. (2 *Necrophorus*, 5 *Hyponecrodos* aufgezählt).

¹) Der Autor ist nicht genannt, muss aber Belon sein, und im Titel muss statt „T. XX“, T. XIX stehen.

- Berlese A.** (1). Siehe Allg. Berlese 1. u. 2. (Auch Col. untersucht. Siehe Morphologie.)
- Bernhauer M.** (1). Neue *Staphyliniden* aus Centralasien. Verh. Zool. bot. Ges. Wien 1901 p. 106—115. — Referat von Ssemenow 4a. (1 *Ocalea*, 2 *Ocyusa*, 7 *Atheta*, 1 *Phloeocharis* n. spp., Einzelb.)
- (2). Die *Staphyliniden* der paläarktischen Fauna. I. Tribus: *Aleocharini*. ibid. p. 430—506. — Referat von Ssemenow 8a. (Umfass. Arb., auch separat als Bestimmungs-Tabelle d. europ. Col. Heft 43. Paskau 1901 p. 1—78).
- (3). Zehnte Folge neuer *Staphyliniden* aus Europa. ibid. p. 651—655. (5 n. spp. Einzelb.)
- (4). Neue exotische Arten der Gattung *Aleochara* Gravh. Stett. ent. Zeit. 1901 p. 366—373. (7 n. spp. 1 n. subg. Einzelb.)
- (5). Zur *Staphyliniden*fauna von Madagascar. Deut. ent. Zeit. 1901 p. 161—176. (2 *Atheta*, 1 *Homalota*, 1 *Tomoxelia*, 1 *Philonthus*, 1 *Eulissus*, 1 *Scopaeus*, 1 *Stilicus*, 1 *Bledius*, 5 *Eleusis*, 1 *Lispinus*, 1 *Omalium*, 2 *Oxypodinus* n. spp., Einzelb.)
- (6). Neue *Staphyliniden* der paläarktischen Fauna nebst Bemerkungen. ibid. p. 241—251. (13 n. spp., Einzelb.)
- (7). Ein neuer Termitengast aus Madagascar. ibid. p. 252. (1 *Oxypora* n. sp. Einzelb.)
- Berriat S. Pr.** (1). Énumération de Coléoptères recueillis dans le Pay-de-Dôme. L'Éch. XVIII p. 28—29.
- Bethune C. J. S.** (2). The Colorado Beetle in England. Canad. Ent. 33. 1901 p. 269—270.
- Bial de Bellerade, Blondel de Joigny & Coutures G.** (1). Contribution à la faune des Coléoptères de la Gironde. Act. Soc. Linn. Bord. 55 p. 251—299.
- Bickhardt C. H.** (1). Eine neue deutsche Varietät von *Leptura rubra* L. (*testacea* L., *rubrotestacea* Ill.) Deut. ent. Z. 1901 p. 362.
- Blackburn T.** (1). Revision of the genus *Paropsis*. VI. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 26 p. 159—196. (19 n. spp.)
- (2). Further Notes on Australian Coleoptera. XXVIII. XXIX. Tr. R. Soc. S. Austr. 25. 1901 p. 15—44, 99—131. (1 *Cic.*, 23 *Carab.*, 2 *Gyrin.*, 1 *Hydroph.*, 1 *Hist.*, 4 *Bupr.*, 1 *Cler.*, 1 *Tenebr.*, 1 *Oedem.*, 3 *Curc.*, 12 *Ceram.* n. spp. meist Einzelbeschr. aber auch mehrere kleine dichot. Tab.)
- Blaisdell F. E.** (1). Pupa of *Necrophilus hydrophiloïdes*. Ent. News 12 p. 263—264, tab. XI.
- Blandford W. F. H.** (1). Biologia Centrali-Americana. *Coleoptera* IV 6. tab. VII.
- Blondel de Joigny** siehe Bial & Blondel & Coutures 1.
- Bloomfield E. N.** (1). (Eine von *Attelabus curculionoides* bewohnte Pflanzenvarietät). Ent. mont. Mag. 37 p. 256.

- Bogdanow E. A.** (1). Siehe Allg. Bogdanow 1. (*Geotrupes*, *Aphodius* und *Sphaeridium* zu Experimenten benutzt).
- Boileau H.** (1). Note sur *Cychnus Sikkimensis* Fairm. Bull. Soc. ent. Fr. 1901 p. 350 (1 n. subg.).
- (2). Description sommaire de *Lucanides* nouveaux de l'Annam. Bull. Soc. ent. Fr. 1901 p. 282—285. (5 n. sp.)
- (3). Liste des Coléoptères de la famille des *Lucanides* recueillis dans le Japon central par Mr. le Dr. Harmand. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1901 p. 66.
- (4). Contribution a l'étude de la Faune entomologique de Sumatra. (Chasses de Weyers). Ann. Soc. ent. Belg. 45 p. 4—12. (18 sp. aufgezählt).
- (5). Description de *Lucanides* nouveaux. ibid. p. 12—22 tab. (1 *Cyclommatus*, 1 *Eurytrachelus*, 1 *Ditomoderus*, 1 *Aegus* n. spp. Einzelb.)
- Bordas L.** (1). Morphologie de l'appareil digestif des *Dytiscides*. C. R. Acad. Sc. Paris 132 p. 1580—1582.
- Born P.** (1). Meine Exkursion von 1900. Soc. Ent. XV p. 181—182, 188—190, XVI p. 3—5, 13, 19—21, 28—29.
- (2). Meine Exkursion von 1901. ibid. XVI p. 137—138.
- (3). *Carabus violaceus* nov. var. *Fiorii*. Insektenbörse XVIII p. 91.
- (4). *Orinocarabus Fairmairei* Thoms. nov. var. *omensis*. Verh. Zool. bot. Ges. Wien 1901 p. 522—525.
- Bouchard A.** (1). Notes sur les *Serrimargo* et les *Peripristus* (Col.) de la tribu des *Coptodérides*. Bull. Soc. ent. Fr. 1900 p. 90—91. (1 *Serrimargo* n. sp. Einzelbeschr.)
- (2). Note sur les *Feroniini* (Col.). ibid. p. 170—171. (Nomenclatorische Notiz.)
- (3). Sur quelques *Cicindélètes* de Sumatra. ibid. p. 295—296. (Biol. Notizen.)
- Bourgeois J.** (1). Catalogue des *Coléoptères* de la chaîne de Vosges et des régions limitrophes. Bull. Soc. Hist. nat. Colmar V 1899—1900 p. ? (Fortsetzung von ?)
- (2). Description d'une nouvelle espèce de *Malthodes* d'Algérie (Col.). Bull. Soc. ent. Fr. 1901 p. 143—144 (Einzelbeschr.).
- (3). *Malthodes* et *Podistrina* (Col.). ibid. p. 268—271.
- (4). Les *Lycides* du Museum d'histoire naturelle du Paris. Ann. Soc. ent. Fr. 70. 1901 p. 31—51 (4 n. sp.).
- (5). Siehe Bedel & Bourgeois 1.
- Bouskell F.** (1). The Variation and Distribution of the Genus *Aphodius* Ill. Tr. Leicest. Soc. (5) XI. 35 pp. Referat von Donisthorpe 4.
- Bouvier E. L.** (1). Siehe Allg. 1 (Necrolog Blanchard's).
- Brandes G.** (1). Zur Abwehr. Zool. Anz. XXIV p. 464—471. (Gegen Knoche).
- Brauns H.** (1). *Cossyphodites* Brauns nov. gen. *Cossyphodidarum* Wasm. Mit einer Gattungstabelle der *Cossyphodidae* und

- drei Textfig. von E. Wasmann. Ann. K. K. Nat. Hofmus. Wien. 16 p. 91—96 (Umfass. Arb.)
- Brenske E.** (1). Die *Serica*-Arten der Erde. Berl. ent. Zeit. 1901 p. 187—234, 431—462. — Referat von Ssemenow 8a. (Umfass. Arb., Fortsetz.)
- Brischet** siehe Severin & Brischet 1.
- Brooks W.** (1). *Cerambyx aedilis* in South Yorkshire. The Ent. 34 p. 298.
- Browne J. M.** (1). Entomological Notes from Abbeyleix. The Irish Naturalist X p. 204.
- Brunn M. v.** (1). Entwicklungsstadien einer neuen *Mordella*-Art. Verh. Nat. Ver. Hamb. (3) VIII 1900 p. XIV.
- Buffa P.** (1). Lo Zabro (*Zabrus gibbus*). Boll. Ent. agrar. VIII 1901 p. 281—282.
- Buffet J.** (1). Notice sur l'élevage de la *Criocère* du Magnet. Feuille. jeun. Nat. XXXI p. 120.
- Burckhardt R.** (1). Referat über Bodemeyer 1900 (1). Zool. Centr. VIII p. 386—387.
- Burgess Sopp** siehe Sopp.
- Buysson H. du** (1). Remarques sur quelques *Élatérides* et description de deux espèces nouvelles (*Col.*). Bull. Soc. ent. Fr. 1901 p. 124—126. — Referat von Ssemenow 7a. (2 *Athous* n. spp. Einzelbeschr.)
- (2). Observations sur la ♀ de *Phosphaenus hemipterus* Goeze (*Col.*). *ibid.* p. 220—221. — Referat von Ssemenow 8a. (Biol. Notiz.)
- (3). Souvenirs entomologiques sur Bagnères de Luchon et Bagnères de Bigorre. Frel. X p. 1—28, 33—36. (Sammelbericht u. Reisebeschr.)
- (4). Description de deux variétés nouvelles de Coléoptères. Rev. Ent. XX p. 95. (1 *Demetrias*, 1 *Clerus*).
- (5). (Ueber 1 *Clerus* n. var.). Feuille. jeun. Nat. 1901 p. 226. — Referat von Pic.
- Calvert B.** (1). Siehe Fleutiaux 4.
- Camerano L.** (1). Baudi di Selve Flaminio 1901. Cenni biografici e bibliografici. Boll. Mus. Tor. XVI n° 396, 6 pp.
- Cameron M.** (1). Notes on a few day's collecting (*Coleoptera*) in Madeira. Ent. Mont. Mag. 37 p. 220—222. (Sammelbericht.)
- Carl J.** siehe Barbey 2.
- Carpenter G. H.** (1). Siehe Allg. Carpenter 1.
- Carret A.** (1). M. F. Guillebeau et ses travaux entomologiques. Bull. Soc. Sc. nat. Ain 1901 p. ? sep. 64 pp. Portr.
- (2). Contribution à la faune française. *Necrophorus nigricornis* Fald. dans nos Alpes (*Col.*). Bull. Soc. ent. Fr. 1901 p. 327—331 (dichot. Tab. über 9 sp., 1 n. var.).
- Carus P.** (1). Electricity and Phosphorescence in the animal World. The open Court XV 1901 p. 540—550. — Referat von

Speiser. Allg. Z. Ent. VII p. 456. (Auch *Lampyriden* u. *Pyrophorus* erwähnt u. abgebildet.)

Carus V. (1). Bibliographia Zoologica. Zool. Anz. 1901 p. 66, 150, 276, 386, 499.

Casey Th. L. (1). A reply to Dr. Wasmann. Can. Ent. 33 p. 312—313. (Polemik, *Myrmobiota* nicht = *Homoeusa*).

Champion G. C. (1). (Ueber *Lathridius Bergrothii*). Ent. Month. Mag. 37 p. 18. (Notiz).

— (2). *Larinus Scolymi* at Colchester. ibid. p. 18—19. (Biol. Notiz).

— (3). Some Remarks on the British Species of *Limnius*. ibid. p. 91—92 (Notizen).

— (4). Some critical Remarks on various species of *Bruchus*. ibid. p. 144—155 (Notizen).

— (5). *Odontaeus mobilicornis* Fabr. at Woking. ibid. p. 171.

— (6). *Melandrya barbata* Fabr. in the new Forest. ibid. p. 255—256.

— (7). *Coleoptera* in the South-West of Ireland. ibid. p. 270—272 (Sammelbericht).

— (8). *Coleoptera* at Stornoway, Lewis. ibid. p. 279. (Sammelbericht).

— (9). Sexual dimorphism in *Buprestis sanguinea* Fbr., a species occurring in Spain and new to the European list. Tr. ent. Soc. Lond. 1901 p. 379—384 tab. XIII.

Champion G. Ch. & Chapman Th. A. (1). Observations on some species of *Orina* a genus of viviparous and ovo-viviparous Beetles. Tr. ent. Soc. Lond. 1901 p. 1—18, tab. I u. II. — Referat von Tümpel 1902 Allg. Z. Ent. VII p. 218.

Chapman siehe Champion & Chapman.

Chevalier L. (1). La larve du *Mecaspis alternans* Herbst (*Col.*), nouvel ennemi de la Carotte cultivée. Bull. Soc. ent. Fr. 1901 p. 344—345. (Biolog. Notiz.)

Chittenden F. H. (1). Siehe Allg. Chittenden 2. (p. 88—96 über *Aramigus*).

Chitty A. J. (1). Note on *Cryptocephalus 6-punctatus* L. Ent. Rec. XIII p. 250.

Chobaut A. (1). Description d'un *Mylabris* nouveau du Sahara algérien. Bull. Fr. 1901 p. 280—281. (1 n. sp. Einzelb.)

— (2). Description d'un *Agathidium* nouveau du nord de l'Afrique. ibid. p. 281—282.

— (3). Description d'un *Ptinide* nouveau du midi de la France (*Col.*) ibid. p. 298—299. (1 *Eurostus* n. sp. Einzelb.)

— (4). Insectes des carrières des Angles (Gard). Bull. Soc. S. nat. Nimes. 1900 p. 72—76 (52 spp. aufgezählt).

— (5). Les *Rhyssemus* de France. ibid. p. 77—82. — Kritik von Reitter 4 p. 176. (Umfassende Arbeit).

— (6). Siehe Allg. 1. (10 *Col.* beobachtet).

- (7). Notes entomologiques. 1. fasc. Niemes 1901. 12 pp. (Separatabdruck von no. 4, 5, 6).
- Clouët des Pesruches L.** (1). Essai monographique sur le genre *Rhyssenus*. Mem. Soc. ent. Belg. VIII p. 1—124 tab. I—VI. (Umfass. Arbeit).
- Comstock J. H. & Comstock A. B.** (1). Siehe Allg. Comstock 1.
- Coutures** siehe Bial & Blondel & Coutures.
- Csiki E.** (1). Zichy, Dritte asiatische Forschungsreise. II. Bd. p. 77—120. *Coleopteren*. (832 sp., 39 n. spp., 1 Anatolica n. sp. von Reitter).
- (2). (Ueber den Insectophobus, Zooanaphor, Photolector). Rov. Lap. VIII 2. p. 31—36, fig. (Magyarisch. Auszug deutsch p. 3—4).
- (3). (Die *Alleculiden* Ungarns). *ibid.* 3 p. 53—60, 68. (Magyarisch, Titel u. Inhalt deutsch p. 60, dichot. Tab. über 10 Gatt. u. 32 Arten).
- (4). (Coleopterologische Notizen). Rov. Lap. VIII 5 p. 99—103 (Magyarisch. Deutsch. Ausz. p. 11).
- (5). (Unsere Hirschkäfer). *ibid.* VIII 7 p. 138—141.
- (6). (Neuere Beiträge zur Coleopterenfauna von Ungarn). *ibid.* p. 164—165. (Magyarisch. Deutsch. Ausz. p. 20.)
- (7). Coleoptera nova ex hungaria. Term. Füzet. XXIV 1901 p. 486—490. (1 *Trechus*, 1 *Bathyscia*, 1 *Isomira*, 1 *Otiorrhynchus* n. spp., Einzelb.)
- (8). Catalogus *Endomychidarum*. *ibid.* Beiheft 59 pp. — Referat von Schröder 19 und von Kraatz 1900 p. 38. (585 Arten mit vollständiger Literaturangabe).
- Cuénot L.** (1). Referat über Pompilian 1900 (1). L'Ann. biol. V p. 458—459.
- Curreri G.** (1). Sulla respirazione di alcuni insetti acquaioli. Boll. Soc. zool. ital. X p. 77—86.
- Dagget F. S.** (1). (Ueber die Larve und die Puppe von *Prionus californicus*). Ent. News p. 319.
- Danysz J. & Wize, K.** (1). De l'utilisation des Muscardines dans la lutte avec le *Cleonus punctiventris*. Paris 1901.
- Davis C. A.** (1). Insects of Rhode island. 1901. (Nach Sharp *Coleoptera*.)
- Day, Fr. H.** (1). *Dryophilus pusillus* Gyll. in Cumberland. Ent. Mont. Mag. 37 p. 225.
- (2). *Sphaerites glabratus* F. in Cumberland. Ent. Rec. 13, p. 331.
- Deegener P.** (1). Berichtigung der Angaben Escherichs über meine Arbeit: Entwicklung der Mundwerkzeuge und des Darmkanals an *Hydrophilus*. Biol. Centr. 21, p. 621—624.
- Delval Ch.** (1). (Sammelbericht.) Bull. Soc. ent. Fr. 1901 p. 225—226.
- Desbrochers J.** (1). Deuxième supplément à la Monographie des Apionides. Ab. IX p. 77—83. (6 n. sp. Einzelber.)

- (2). Description d'un *Curculionide* appartenant au Genre *Pachytychius*. *ibid.* p. 84. (1 n. sp.)
- (3). Faunule des Coléoptères de la France et de la Corse. *Cistelidae*. *ibid.* p. 85—135. (Umfass. Arb.)
- (4). Description d'un *Curculionide* nouveau du Portugal, appartenant au genre *Trachyphloeus*. *ibid.* p. 136. (1 n. sp. Einzelb.)
- (5). Faunule etc. *Tenebrionidae*. *ibid.* p. 137—193, X p. 37—104. (Umfass. Arb.)
- (6). Tabula synoptica specierum Generis *Dorytomus* Curculionidum. *ibid.* p. 29—32. (Umfass. Arb.)

Deville siehe Sainte-Claire-Deville.

Dierckx Fr. (1). Les glandes pygidiennes des Coléoptères. 2. Mem. *Carabides* (Bombardiers etc.), *Paussides*, *Cicindélides*, *Staphylinides*. La Cellule XVIII p. 255—297, 299—310, 3 tab. — Referat von Escherich 7.

Donisthorpe H. St. J. K. (1). Evolution of our Knowledge of Myrmecophilous *Coleoptera*. *Ent. Rec.* XIII p. 51—56.

- (1a). Referat u. Kritik über Fowler & Walker 1900 (1). *ibid.* p. 102—103.
 - (2). *Trimum brevicorne* Reichb. from Chiddingfold. *ibid.* p. 182.
 - (3). A succesful Hunt for *Lytta vesicatoria* L. *ibid.* p. 251.
 - (4). The Variation and Distribution of the Genus *Aphodius* Ill., by Frank Bouskell. *ibid.* p. 271—273.
 - (5). New Forest Notes in 1901. *ibid.* p. 329—330.
 - (6). Tracing *Velleius dilatatus* F. to its Haunts. *ibid.* p. 330—331.
 - (7). Some Remarks on the British Species of *Limnius*. *ibid.* p. 337—338, tab. IX (Dich. tab. über 5 sp., v. d. 2 unbenannt).
 - (8). On some Experiments with Myrmecophilous *Coleoptera*, and on Observation Nest of *Formica rufa*. *ibid.* p. 349—353.
 - (9). Cases of protective Resemblance, Mimicry etc. in the British *Coleoptera*. *Trans. Ent. Soc. Lond.* 1901 p. 345—377. (Zahlreiche Arten aller Familien besprochen).
 - (10). On the origin of, and progress in the study of myrmecophilous *Coleoptera*. *Tr. Leic. Soc.* XI (VI?) p. 16—28.
- Donkier** H. (1). (Ueber *Ptycholaemus* sp.). *Bull. Soc. ent. Fr.* 1901 p. 174 (Monstrosität).
- (2). (Ueber die Curculionidensammlung von Chevrolat). *ibid.* p. 188.

Douglas W. D. R. (1). *Cionus blattariae* in the Solway District. *Ann. Scott. Nat. Hist.* 1901 p. 238. (An einer exotischen Pflanze).

Duda L. (1). Unsere Schwimmkäfer. Nebst Anleitung zur Bestimmung der gewöhnlichen einheimischen Arten. *Progr. Obergymn. Pisek.* 1881 (?).

- Dury C.** (1). A new *Culandrid* from Cincinnati, Ohio. Journ. Cincinnati Soc. XIX, p. 243—244.
- Eckstein K.** (1). Vergl. Allg. Eckstein 1. p. 19—22 Referate über Vogel 1900 (1), Tarnani 1900 (3), Dobeneck (1), Bargmann 1900 (2), Knoche 1900 (1), Waldwirtschaft Bulgar. (1), Experiences (1), Grahay (1), Völker 1900 (1), Lehner 1900 (1), Rothe 1900 (1), Lüstner (1), Spies 1900 (1), Märker 1900 (1), Weiss 1900 (1), Boas 1900 (1), Cecconi 1900 (1), Mokrshezki 1900 (1), Torski 1900 (1), C. Schenkling 1900 (2), Borkenkäferschaden 1900 (1, 2).
- Eggers H.** (1). Verzeichniss der in der Umgegend von Eisleben beobachteten Käfer. Ins.-Börse XVIII p. 146—148, 155—156, 163—165, 171—173, 179—180, 195, 203—204, 211—212, 219—220, 227, 235—236, 251—252, 259—260, 267—268, 283—284, 290—291, 299—300, 307—308, 323—324, 331, 339—340, 346—347, 353—354, 387—388, 395—396, 403—404, 411.
- Eichelbaum** (1). Die Larven von *Catops Watsoni* Spence und *C. picipes* (?) Fabr. Berl. Ent. Zeit. 1901 p. 9—14, tab. III. — Referat von Ssemenow 8a.
- (2). Drei noch nicht bekannte Käferlarven der Hamburger Fauna. Zool. Jahrb. Syst. XIV 1901 p. 521—536, fig. (2 *Atheta*, 1 *Cartodere*).
- Elliot A. E.** (1). Variation of some Species of *Aphodius*. Ent. Rec. 13, p. 364.
- Ellis H. W.** (1). *Bagous cylindricus* Payk. in Bedfordshire. Ent. Rec. XIII p. 140.
- (2). *Homalota divisa* var. *Blatchii* n. var. *ibid.* p. 250—251.
- Enderlein G.** (1). *Meropathus Chuni* n. gen. nov. spec. Eine neue *Helephorinen*-Gattung von der Kerguelen-Insel. Zool. Anz. XXIV p. 121—124, fig. 1—6. — Referat von Escherich 3a. (1 n. gen., 1 n. sp.)
- Engelhart, C.** (1). Tillaeg til Fortegnelserne over de i Danmark levende *Coleoptera*. Ent. Meddel. (2) I, 1901 p. ?
- Engmann** (1). Ueber die Nahrung von *Hydrophilus piccus*. Ins. Börse 18, p. 284—285. (Der ausgebild. Käfer frisst auch Fleisch.)
- Escalera** siehe Martinez Escalera.
- Escherich K.** (1). Referat über Bordas 1900 (3). Zool. Centr. VIII p. 66—69.
- (2). Referat über Wasmann 1900 (1) *ibid.* p. 71—72.
- (3). Referat über Brauns 1900 (1). *ibid.* p. 417—418.
- (3a). Referat über Enderlein 1. *ibid.* p. 418.
- (4). Referat über Müller 1. *ibid.* p. 418—419.
- (5). Referat über Rupertsberger 1. *ibid.* p. 419—420.
- (6). Referat über Wasmann 1900 (3). *ibid.* p. 420—422.
- (7). Referat über Dierckx 1. *ibid.* p. 530—531.

- (8). Referat über Rengel 1. *ibid.* p. 533—534.
- (9). Referat über Mallasz 1. *ibid.* p. 232.
- (10). Referat über Kaditsch 10. *ibid.* p. 836—837.
- (11). Referat über Kolbe 1. *ibid.* p. 837—840.
- (12). Siehe Allg. Escherich 1.

Evans Wm. (1). Additions to the List of Scottish *Coleoptera*. *Ann. Scott. Nat. Hist.* 1901 p. 183.

Everts E. J. G. (1). Over het afscheidingsproduct der zoogenaande „Stinkklieren“ bij *Aromia moschata* en bij de larven van vele Chrysomeliden. *Tijd. v. Ent.* 44. Versl. p. 69. (*Melasma collare*).

- (2). *Coleoptera neerlandica*. De schildvleuglige Insecten van Nederland en het aangrenzend gebied. II. 1. 1901. 400 pp., 62 figg. (*Lucanidae* — *Oedemeridae* u. *Cerambycidae*).

Faber (1). Invasion du *Phratora vitellinae* dans une oseraie. *Bull. Soc. forest. Belg.* 1901 p. 430. — Referat von Eckstein p. 26.

Fabre J. H. (1). Les *Geotrupes* et la prevision du temps. *Rev. Sc.* (4) XV p. 762. (Referat über Fabre 1897, 2).

- (2). La Bruche de Pois. *Nouv. Rev.* IX. 1901. p. 421—430.

Fairmaire L. (1). Description de *Coléoptères* nouveaux, de Madagascar. *Bull. Soc. ent. Fr.* 1901 p. 94—97. (1 *Diabena*, 1 *Paussus*, 1 *Liatongus*, 1 *Straliga*, 1 *Chromoptilia*, 2 *Macrotoma*.)

- (2). Description de *Coléoptères* nouveaux, de Madagascar. *ibid.* p. 126—128. (1 *Lingoria*, 1 *Myiodola*, 1 *Donacilla* n. spp. Einzelbeschr.)

- (3). Descriptions de *Coléoptères* des montagnes de Sikkim. *ibid.* p. 265—268. (1 *Cychnus*, 1 *Byrrhocaulus*, 1 *Byrrhus*, 2 *Geotrupes*, 1 *Trigonoides* n. spp. Einzelb.)

- (3a). Description d'un Staphylinide nouveau de l'Afrique australe. *ibid.* p. 279—280. (1 *Hasumius* n. sp. Einzelb.)

- (4). Description de quelques *Coléoptères* recueillis par M. de Dr. Decorse dans le Sud de Madagascar, plateau de l'Androy. *Not. Leyd. Mus.* 23 p. 65—84 (Zahlreiche n. sp. Einzelb.)

- (5). Matériaux pour la Faune coléoptérique de la région malgache. 10. Note. *Curculionidae*. *Ann. Soc. ent. Belg.* 45. 1901 p. 209—244. (68 n. spp., nur Einzelbeschr.)

- (6). Matériaux pour la faune coléoptérique de la région malgache. *Rev. ent. fr.* XX p. 101—248. (*Car.* 52, *Scar.* 45, *Bupr.* 20, *Eucn.* 2, *El.* 8, *Rhip.* 3, *Malac.* 10, *Heterom.* 37, *Anthrib.* 6, *Ceram.* 45, *Chrys.* 19 n. spp., Einzelb.)

Fall H. C. (1). Two new species of *Lucanidae* from California. *Can. Ent.* 33 p. 289—293, fig. (1 *Phyllostoma*, 1 *Platycerus* n. spp.)

- (2). A Change of Name. *ibid.* p. 324. (*Diphyllostoma*, für *Phyllostoma*.)

- (3). A new *Cicindela*, with Notes on allied Species. Ent. News 12 p. 307—320. (1 n. sp. Einzelb.)
- (4). Notes on *Dichelonycha* and *Cantharis* with descriptions of new Species in other genera. Trans. Amer. Ent. Soc. 27 p. 277—310. (28 n. sp.)
- (5). List of the Coleoptera of southern California. Occas. Pap. Cal. Ac. Sc. 1901.
- Fauvel A.** (1). Description d'une nouvelle espèce de *Staphylin* de la Terre de Feu. Com. Mus. Nac. Buen. Aires I. p. 282. (1 *Ilyobates* n. sp.)
- (2). Liste des *Staphylinides* du Japon central recueillis par Mr. le Dr. Harmand. Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1901 p. 62—66. (6 n. sp., dieselben wie in 3.)
- (3). *Staphylinides* nouveaux du Japon. Rev. d'Ent. XX p. 2—5. Referat von Ssemenow 2a. (1 *Anthob.*, 1 *Oxyporus*, 2 *Bolitob.*, 1 *Gyrophæna*, 1 *Oxygota*).
- (4). *Amblyopinus* nouveau. *ibid.* p. 5—6. (Dich. Tab. über 5 spp.)
- (5). Voyage de M. le Dr. Ed. Bugnion au Venezuela, en Colombie et aux antilles. *Staphylinides*, *ibid.* p. 69—91, 256, tab. I, II. (1 *Bled.*, 1 *Osorius*, 1 *Holotrochus*, 2 *Sten.*, 1 *Palam.*, 1 *Med.*, 1 *Ophit.*, 3 *Cryptob.*, 1 *Xantholin.* 1 *Plochionoc.*, 1 *Belon.*, 2 *Erchom.*, 1 *Atheta*, 1 *Din.*, 1 *Fal.*, 1 *Aleoch.*).
- (5a). Anomalie du prothorax chez deux *Staphylinides*. p. 92. (1 *Philonthus*, 1 *Paederus*).
- (6). *Acanthoglossa* n. sp. de Tunisie. *ibid.* p. 250.
- (6a). *Sterculia fulgens* et *ignea*. p. 251—252. (1 n. sp. Einzelb.)
- (7). *Geostiba* nouvelle d'Algérie. *ibid.* 253.
- (8). *Phaleria* nouvelle de France. *ibid.* p. 253—254.
- Felsche C.** (1). Zwei neue *Scarabaeiden*. Ins. Börs. 18 p. 314. (1 *Dicaulocephalus*, 1 *Lepidiota*, Einzelb.)
- (2). Beschreibungen coprophager *Scarabaeiden*. Deut. ent. Z. 1901 p. 135—153, tab. I. (22 *Pinotus*, 2 *Heliocopris*, 1 *Catharsius*, 2 *Copris*, 2 *Phanaeus*.)
- (3). Synonymische Bemerkungen. *ibid.* p. 154—155.
- (4). Zwei neue *Scarabaeiden*. *ibid.* p. 359—361, fig. (1 *Dicaulocephalus*, 1 *Lepidiota* n. sp. = 1.)
- (5). Notiz. *ibid.* p. 361. (Statt „Coxalgrube“ soll es in 2. heißen „Lateralgrube“)
- Felt E. P.** (1). Siehe Allg. Felt 3. (32 *Col.* nebst Metamorph. kurz beschr. u. abgebildet).
- Fényes B.** (1). (Ein Riesen-*Bostrychide* *Dinapate Wrightii* Horn. Rov. Lap. VIII 1 p. 4—7. — Referat von Aigner-Abafi Allg. Zeit. Ent. VI p. 188, wo der Autor nicht Fényes sondern „Bela“ genannt ist.
- Fettig** (1). Siehe Allg. Fettig 1.
- Fischer L.** (1). Käferfauna der Kniebisgegend. Mitth. Bad. Zool. Ver. I 1900 p. 143—154.

- Fleischer** (1). Eine neue Art der *Coleopteren*-Gattung *Bythinus* aus Dalmatien. Wien. ent. Zeit. XX p. 144. (1 n. sp.)
- Fleutiaux E.** (1). Note sur le genre *Pachyderes* Latr. (*Col.*) et description d'une espèce nouvelle. Bull. Soc. ent. Fr. 1901 p. 97—101 (Umfass. Arbeit).
- (2). Note sur une *Bruche* de l'Afrique occidentale (*Col.*) *ibid.* p. 181—182 (Biolog. Notiz).
- (3). Essai d'une Classification des *Melasinæ* (*Eucnemidæ* des Auteurs). Ann. Soc. ent. Fr. 1901 p. 636—664. (Umfass. Arb.)
- (4). *Elateridæ* i *Eucnemidæ* nuevos de Chile. Rev. chil. Hist. nat. V. 1901. p. 117—119. Spanische Uebersetzung von Fleutiaux 1898 (1) u. 1899 (14 u. 8 ex. p.) durch Calvert. (2 *Protelater*, 1 *Idiotarsus*).
- (5). Liste des *Cicindelidæ*, *Elateridæ* et *Eucnemidæ* recueillis dans le Japon central par M. le Dr. J. Harmand de 1894—1897. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris VI 1900 p. 356—361.
- Fliche P.** (1). Sur un insecte fossile trouvé dans le Trias en Lorraine. C. r. Acad. Sc. 132 p. 650—651 (*Buprest.*).
- Förster** (1). Sandkäferfang auf Sumatra. Mitth. Mühlh. Ent. Ver. 17. 1900 p. 8—9.
- Fowler W. W.** (1). *Tarsostenus univittatus* Rossi and *Lyctus canaliculatus* Steph. at Harwich. Ent. Mont. Mag. 37 p. 300—301.
- (2). Siehe Allg. Fowler 1.
- French C.** (1). Siehe Allg. French 1. (Enthält auch *Col.*)
- Friedländer R.** (1). Siehe Allg. Friedländer 1. (*Col.* p. 9—11, 32, 49—50, 65, 80—81, 97—98, 113—114, 134, 144—145, 160—161, 181—182, 203.
- Friedrichs K.** (1). Die Varietäten von *Cryptohypnus pulchellus* und *sabulicola*. Allg. Zeit. Ent. VI p. 81—83 (5 n. var. Einzelbeschr.)
- (2). Zwei wenig bekannte deutsche Carabiden. Ins. Börse 18, 1901 p. 59 (*Notiophilus*, *Bembidium*).
- (3). Neue mecklenburgische Käfer. Arch. Ver. Fr. Nat. Meckl. 55, 1901 p. 169—172.
- Fritsch A.** (1). Siehe Allg. Fritsch 1. (1 *Tenebr.*, 1 *Chrysom.* n. spp.)
- Froggatt W. W.** (1). Cockchafer (*Anoplognathus*) Grubs destroying Strawberry Plants. Agric. Gaz. N. S. Wales 12. p. 473—476, fig. 1—5. — Referat von Reh 1902 All. Z. Ent. VII p. 285.
- (2). Siehe Allg. Froggatt 2. (*Euryscaphus*, *Carab.*)
- Fuente J. M. de la**, (1). Datos para la fauna de la provincia de Ciudad-Real XIV. Especies de Calabrava *Coleopteros*. Boll. Soc. Españ. Hist. Nat. 1901 p. 133—136 (1 *Thylacites*, 1 *Baris* n. sp.)
- Gahan Ch. J.** (1). A Revision of *Asthates* Newm. and allied Genera of Longicorn Coleoptera. Tr. Ent. Soc. Lond. 1901 p. 37—74 tab. IV (Umfass. Arb.)

- Ganglbauer L.** (1). Beiträge zur Kenntniss der palaearktischen *Hydrophiliden*. Verh. Zool. bot. Ges. 1901 p. 312—332. — Referat von Ssemenow 8a. (9 *Helophorus*, 2 *Ochthebius*, 10 *Hydraena*, 1 *Philhydus* n. spp., Einzelb.)
- (2). Ein neues blindes *Lathrobium* aus Südtirol. *ibid.* p. 390—392. (1 n. sp. Einzelb.)
- (3). Der Artenumfang in der *Orinocarabus*-Gruppe und nomenclatorische Vorschläge. *ibid.* p. 791—798 (Umfass. Arb.)
- (4). Siehe Allg. Geschichte der Botanik & Zoologie. (Die Coleopt. p. 349—369).
- Garbowski T.** (1). Referat über Niezabitowski 1900. 1. Zool. Centr. VIII p. 88—89.
- Garman H.** (1). Siehe Allg. Garman I. (p. 3—17 *Diabrotica* u. *Epilachna* als Schädlinge der Gurken.)
- Gavoy L.** (1). Catalogue des Insectes *Coleoptères* trouvés jusqu'à ce jour dans le département de l'Aude. IV. Part. Bull. Soc. Aude XII 1901 p. ? (Fortsetzung von 1900).
- Gerhardt J.** (1). Ueber *Xantholinus linearis* Kr. und *longiventris* Heer. Zeit. Bresl. 26 p. 1—5.
- (2). Neue Fundorte seltener schlesischer Käfer aus dem Jahre 1900 und Bemerkungen. *ibid.* p. 6—14.
- (3). Neuheiten der schlesischen Käferfauna aus dem Jahre 1900. *ibid.* p. 15—17. (17 sp. für Schlesien neu.)
- (4). Eine neue Käferart. *ibid.* p. 18—21. (1 *Salpingus* n. sp.)
- (5). Eine neue Käferart. Deut. ent. Z. 1901 p. 156. (1 *Salpingus* n. sp. = 4.)
- (6). Neuheiten der schlesischen Käferfauna aus dem Jahre 1900. *ibid.* p. 157—158. (1 *Apion*, 1 *Choragus* n. varr. = 3.)
- (7). Ueber *Xantholinus linearis* Kraatz und *longiventris* Heer. *ibid.* p. 205—208.
- Germain P.** (1). Apuntes Entomolojicos. Datos sobre el Jenero *Cnemalobus* (Guérin) i description de las de sus especies halladas en Chile por el autor. Anal. Univers. Chil. CVIII. 1901 p. 175—192. (Umfass. Arb., *Carabid.*)
- (2). Id. El jenero *Phytoloema* (Blanchard). *ibid.* p. ? sep. 21 pp. tab. (Umfass. Arb., *Scarab.*)
- (3). Id. El jenero *Oryctomorphus* (Guérin). *ibid.* p. ? sep. 27 pp. tab. (Umfass. Arb., *Scarab.*)
- Gestro R.** (1). Description d'une espèce nouvelle de *Lebioderus* de Sumatra. Not. Leyd. Mus. 23 p. 15—16.
- (2). Materiali per lo studio delle *Hispidae*. Bull. Soc. Ent. Ital. 33 p. 84—88. (2 *Hispopria* n. sp.)
- Gesztes** (1). Auftreten des *Coraeus bifasciatus*. Magyar. Erdész. I. 9. 1901 p. 166. — Referat von Eckstein 1902 p. 25. (In Eichenbeständen in Ungarn als Schädling.)
- Ghigi A.** (1). Siehe Allg. Ghigi I. (Larve von *Luciola italica*.)
- Giard A.** (1). (Ueber *Prionus*). Bull. Soc. ent. Fr. 1901 p. 199 (Missbildungen).

- (2). Sur un *Coléoptère* nuisible aux carottes porte-graines (*Hypera pustinae* Rossi var. *tigrina* Bohem.). *ibid.* p. 231—232. — Referat von Reh 1902 *All. Z. Ent.* VII p. 155. (Larve u. Puppe).
- Giardina A.** (1). Origine dell' oocite e delle cellule nutrici nel *Dytiscus*. *Internat. Monatsschr. f. Anat. u. Physiol.* XVIII p. 417—477, 478—484, 7 tabb. — Referat von Speiser *Allg. Z. Ent.* VII p. 515 u. von Mayer 1902 p. 56—57.
- Gillanders A. T.** (1). Phytopti, or gall-mites and arboreal beetles *Tr. Manch. micr. Soc.* 1900 p. 67—79. (*Col.* p. 72—79).
- Glasunow D.** (1). (Eine neue Art der Gatt. *Nebria* Latr. vom südlichen Ural. *Rev. Russ. d'Ent.* I p. 20—22, fig. — Referat von Adelung *Zool. Centr.* 1902 p. 205. (Russisch 1 n. sp. Einzelb. lateinisch.)
- (2). Referate über Rupertsberger und über Zang. *ibid.* p. 268, 270 (Russisch).
- (3). Revisio specierum bicolorium generis *Nebriae* Latr. in Asia media habitantium. *Hor. ross.* 35 p. 467—493 tab. II. (Umfass. Arb.).
- Godfrey R.** (1). *Acanthocinus aedilis* L. at Bolness. *Ann. Scott. Nat. Hist.* 1901 p. 238.
- Goethe R.** (1). Siehe *Allg. Goethe* 1. — Referat von Schröder 1902 *All. Z. Ent.* VII p. 347—348. (*Foucartia*, *Phyllobius*, *Eusomus*).
- Gorham H. S.** (1). On a Species of *Stenolophus* apparently new to Britain and to science. *Ann. Scott. Nat. Hist.* 1901 p. 24—25. (1 n. sp.)
- (2). *Erotylidae*, *Endomychidae* and *Coccinellidae* of Sumatra. *Stett. ent. Z.* 62. 1901 p. 169—214. (13 *Erot.*, 8 *Endom.*, 2 *Coccin.* n. spp.)
- (3). Descriptions of Genera and Species of *Coleoptera* from South Africa. *Ann. Mag. Nat. Hist.* 1901 p. 349—365, 401—415. (*Malacod.*, *Clerid.*, *Erotyl.*, *Endom.*, *Cocc.* 27 n. spp., Einzelb.)
- Gorka A.** (1). (Beiträge zur Morphologie und Physiologie der Verdauungsorgane der Coleopteren.) *Pest* 1901. 56 pp., 2 tab. (Magyarisch).
- (2). Beiträge zur Morphologie und Physiologie des Verdauungsapparates der Coleopteren. *Allg. Zeit. Ent.* VI p. 339—341. — Referat von Escherich *Zool. Centr.* 1902 p. 92—93 u. von Mayer 1902 p. 55 (Referat über 1.)
- Gregson P. B.** (1). Habits of the Larvae of *Dermestes talpinus* Mann. 31. *Ann. Rep. Ent. Soc. Ontario.* 1900 p. ?
- (2). Curious habits of the larvae of *Dermestes marmoratus*. *ibid.* p. 84.
- Griffith F. L.** (1). Siehe *Ward* 1.
- Grouvelle A.** (1). Description d'un nouveau genre de *Nitidulide* (*Col.*) du Nord et de l'Est de l'Afrique. *Bull. Soc. ent. Fr.* 1901 p. 102—103. (1 *Anister* n. gen. n. sp. Einzelb.)

- Grunack A.** (1). Seltene Käfer. Ins. Börse 18 p. 260—261. (*Carabus Adonis* var. *Merlinii* u. var. *Krüperi* u. *Omphreus Krüperi* in Griechenland.)
- Günther** (1). (Ueber die Puppe von *Staphylinus nebulosus* F.). Berl. ent. Zeit. 1901 Sitzb. p. 23. (Sie ruht in einer Hülle aus Pflanzenfasern u. Erde.)
- Hagen B.** (1). Siehe Allg. Hagen 1. (*Cic.*, *Melol.* auf Sumatra.)
- Hamann O.** (1). Referat über Seidlitz 1900. 2. u. 3. Allg. Literaturbl. X p. 185—186.
- Handlirsch A.** (1). Referat über Zehntner 1900 (1). Zool. Centr. VIII p. 31—32.
- Hansen H. J.** (1). Emil Adolf Lövendal †. Ent. Tids. 1901 p. 177—183 (Biographie).
- Harris E. D.** (1). *Cicindelidae* of Mt. Desert, Maine. Journ. N. York ent. Soc. IX p. 27—28. (Das Vorkommen von 4 Arten besprochen).
- (2). A new variety of *Cicindela vulgaris*. Canad. Ent. 33. p. 226.
- Harwood B.** (1). Coleoptera at Colchester. Ent. Rec. 13 p. 331.
- Hayward R.** (1). Synonymical Notes on *Bembidium* and Descriptions of New Species. Tr. Amer. Ent. Soc. 27 p. 156. (2 *Bembidium* n. sp.)
- Heine G.** (1). Einiges zur Zucht von Käferlarven. Ent. Jahrb. XI p. 211—213.
- Heller K. M.** (1). Dritter Beitrag zur Papuanischen Käferfauna. Abh. Mus. Dresd. X. 2. 1901. 20 pp.
- (2). Rüsselkäfer aus Ceylon gesammelt von Dr. W. Horn. Deut. ent. Zeit. 1901 p. 337—350, fig. (61 Arten aufgezählt, 12 n. spp. Einzelb.)
- Helm O.** (1). 1897 u. 1898 bei Zoppot gefangene Käfer. Schrift. Natf. Ges. Danz. X. Heft 2 u. 3 p. 14—15.
- (2). Donacien der Provinz Westpreussen. *ibid.* p. 15.
- Hensel R.** (1). Referat über Stierlin 1900 (2). Berl. ent. Zeit. 1901 p. 184.
- Hesse R.** (1). Siehe Allg. Hesse 2. (*Dytisc.*, *Hydroph.*)
- (2). Siehe Allg. Hesse 1.
- Hetschko A.** (1). Referat über Rengel 1. Wien. ent. Zeit. XX. p. 156.
- Heyden L. von** (1). Notiz zu *Platycarabus depressus* Bonelli. Soc. ent. XV p. 191.
- Heyne A.** (1). Die exotischen Käfer in Wort und Bild. X. Lief. p. 67—74. — Referat von Schröder 33.
- Hildt L. F.** (1). (Beitrag zur Käferfauna Podoliens). Pam. Fyzyogr. XII p. 209.
- Hinds W. E.** (1). Strength of *Passalus cornutus* Fbr. Ent. News 12, p. 257—262, tab. X.
- Holland W.** (1). *Harpalus anxius* from the Oxford District. Ent. Mont. Mag. 37. p. 18.

- Holmgren N.** (1). Ueber den Bau der Testes und die Spermatogenese bei *Silpha*. Zool. Anz. 24, p. 254—255.
- (2). Ueber den Bau der Hoden und die Spermatogenese von *Staphylinus*. Anat. Anz. 19, p. 449—461, fig. — Referat von Schröder 1902 All. Z. Ent. VII p. 122, von Mayer 1902 p. 56 und von Escherich Zool. Centr. 1902 p. 377—378. (Jährliche Regeneration der Hodenzellen).
- Hopkins A. D.** (1). Relations between *Scolytids* and their Host Plants. Science 13. p. 628—629.
- (2). On the Development and Evolution of the *Scolytid* Gallery. ibid. 630—631.
- (3). Insect enemies of the Spruce in the Northeast. U. S. Agr. Dep. Div. Ent. Bull. 28., 48 pp.
- (4). Siehe Scudder 2.
- Hormuzaki C. v.** (1). Neue Coleopterenfunde aus der Bukowina. Verh. Zool. bot. Ges. Wien 1901 p. 356—361. (Verz. einiger Arten.)
- (2). (Ueber *Coleopt.* der Bukovina). Bul. Soc. Sc. Bucar. X. p. 77—110 (Rumänisch).
- Horn W.** (1). Contribution à l'étude de la Faune entomologique de Sumatra. (Chasses de Weiers) XIV. *Cicindelides*. Ann. Soc. ent. Belg. 45. 1901. p. 84—85. (18 sp. aufgezählt, 1 n. var.)
- (2). Ueber Hrn. Prof. Kolbe's neues Coleopteren-System. Deut. ent. Z. 1901 p. 13—15, fig. (Kritik).
- (3). Ueber einige Süd-Afrika-Cicindeliden. ibid. p. 123—124. (1 *Myrmecoptera* n. sp. Einzelb.)
- (4). Ueber *Oxygonia floridula* Bat. und *gloriola* Bat. ibid. p. 124.
- (5). *De 7 novis Cicindelidis*. ibid. p. 353—358. (1 *Ctenostoma*, 1 *Langea*, 1 *Cicind.* n. spp. Einzelb.)
- (6). Revision der Cicindeliden etc. p. 33—64. Fortsetz. von 1898 (4). ibid. Beilage Bog. 3 u. 4 (Umfass. Arbeit).
- Houghton** (1). (Ueber *Sphaeridium scarabaeoides*) Ent. News XII p. 209. (In Nord-Amerika).
- Houlbert C.** (1). Genera analytique illustré des *Coléoptères* de France. (Fam. *Dascillides* Guér.) Le Nat. 23. 1901 p. 136, (*Cebrioides*) p. 208, (*Elatériens*) p. 256.
- (2). Siehe Monnot & Houlbert 1.
- Howard L. O.** (1). (Schaarenweise *Coccinelliden*) Pr. ent. Soc. Wash. IV p. 412. (*Hippodamia convergens*.)
- Hubbard H. G.** (1). (Ueber *Mastinocerus opaculus* ♀, Malacod.) Pr. ent. Soc. Wash. IV p. 348.
- (2). Siehe Allg. Hubbard 3. ibid. 381—383. (Zahlreiche *Col.* genannt.)
- Hubenthal W.** (1). Die Käferfauna des Seeberges bei Gotha. Naturwiss. u. Gesch. vom Seeberg Gotha 1901 p. 18—132. — Referat von Schröder 35.

- Issel B.** (1). Siehe Allg. Issel 1 (2).
 — (2). Siehe Allg. Issel 2. (Von *Col.* z. B. *Hydroscapha gyrinoides* u. *Laccobius Sellae* genannt).
- Ivanov N.** (1). (Die Elateriden des Petersburger Gouvernements). Ann. Mus. zool. Acad. Pet. VI. 1901 p. 1—55. (Russisch. 62 Arten aufgezählt mit Literatur u. Fundorten).
- Jacobson A.** (1). Siehe Allg. A. Jacobson 1. (375 spp. *Col.* gesammelt, v. d. mehrere genannt).
- Jacobson G.** (1). Bemerkungen zur „Übersicht der Arten der *Coleopteren*-Gattung *Ischyronota* Weise“ in der Wien. ent. Ztg. 1901. pag. 103. Wien. ent. Zeit. XX p. 125—127. — Referat von Ssemenow 7 a. (Synon. Bemerkungen).
 — (2). Siehe Allg. G. Jacobson 1. (*Trichopt.*, *Scaph.*, *Staphyl.* erwähnt).
 — (3). Johannes Obert 1809—1900. Hor. ross. 35. p. XXXVII—XXXIX. (Necrolog).
 — (4). *Phytophagen* aus West-Sibirien, gesammelt von A. Jacobson 1897 u. 1898. *ibid.* p. LVII. — Referat v. Eckstein 1902 p. 23 (Vorläuf. Mittheil.).
 — (5). *Chrysomelidae* Sibiriae occidentalis I, II. *ibid.* p. 73—102. — Referat von Adelung 6 u. von Ssemenow 2a. (151 spp. aufgezählt, v. d. 6 n. spp. Einzelb., dich. Tab. über 12 Gatt., p. 89—90, u. über 10 *Cryptoceph.*, p. 98—99).
 — (6). *Symbola ad cognitionem Chrysomelidarum Rossiae asiaticae.* Öfv. Finska Förh. 43. p. 99—147. — Referat von Adelung 7. u. von Ssemenow 4a. (12 n. spp., zahlr. n. varr., Einzelbeschr. Umfass. Arbeit).
- Jacoby M.** (1). Eine interessante Käfergruppe, die *Chlamydae*. Ins.-Börse XVIII p. 116.
 — (2). A further contribution to our knowledge of African Phytophagous Coleoptera. Tr. Ent. Soc. Lond. 1901 p. 209—256 tab. X (56 n. spp., Einzelbeschr.)
 — (3). Descriptions of some new Species of Phytophagous *Coleoptera* of the Family *Chlamydae*. Proc. zool. Soc. Lond. 1901 p. 153—164, tab. 14. (13 n. spp., Einzelb.).
 — (4). Descriptions of some new genera and species of phytophagous *Coleoptera* from Madagascar. Ann. Soc. ent. Belg. 45, 1901 p. 287—303 (21 n. sp. Einzelbeschr.)
 — (5). Descriptions of four new species of *Disonycha* (*Coleoptera*, *Halticidae*). The Ent. 34 p. 146—149.
 — (6). Siehe Therese 1.
- Jänner G.** (1). Käfer im Winterschutze des Seebergs. Naturwiss. u. Gesch. von Seeberg. Gotha 1901 p. 133—135. — Referat von Schröder 35.
- Jakowleff W. E.** (1*). Notes coléoptérologiques. I. Rev. Russe

*) Der geehrte Autor heisst „Wassili“ mit Vornamen. (Vergl. Rev. russ. I p. 222).

- d'Ent. I p. 50—54, II. p. 107—110. (5 *Sphenoptera*, 7 *Dorcadion*. synonym. u. geograph. Notizen, 1 *Dorcad.* n. var.)
- (2). Description d'une nouvelle espèce du genre *Sphenognathus* Buqu. (Lucan.) *ibid.* p. 77—79, fig. (1 n. sp. Einzelb.)
- (3). Deux nouvelles espèces de *Dorcadion* Dalm. de l'Asie mineure. *ibid.* p. 83—87. — Referat von Adelung Zool. Centr. 1902 p. 206. (2 n. spp. Einzelb.)
- (4). Étude sur les *Neodorcadion* de l'Asie Russe. *ibid.* p. 146—166. — Referat von Adelung *loc. cit.* p. 206—207. (Umfass. Arb.)
- (5). Description d'un nouveau *Sphenognathus* de Bolivie (*Lucanid.*) *ibid.* p. 176—178, fig. — Referat von Adelung Zool. Centr. 1902 p. 749. (1 n. sp. Einzelb.)
- (6). Description d'un nouveau *Pentodon* Hope de la Faune de Russie. *ibid.* p. 181—182. — Referat von Adelung *loc. cit.* p. 749. (1 n. sp. Einzelb.)
- (7). Études sur les espèces du genre *Sphenoptera* Sol. Hor. ross. 35. p. 168—184. — Referat von Ssemenow 2a. (7 n. spp. Einzelb.)
- (8). Huit nouvelles espèces du genre *Pentodon* Hope. *ibid.* p. 266—278. — Referat von Ssemenow 8a. (8 n. spp., Einzelb.)
- (9). Revision des *Sphenoptera* de la région éthiopienne. *ibid.* p. 279—355. (Umfass. Arbeit.)
- (10). Etude sur les *Sphenoptera* paléarctique du sous-genre *Deudora*. *ibid.* p. 561—583. (Umfass. Arbeit.)
- Jakowlew A.** (1). Enumeratio Coleopterorum a cl. L. Krulikowsky circa urbem Malmysch provinciae Wjatzensis (Rossia media orientalis) annis 1896—1899 et antea collectorum. Hor. ross. 35, p. 103—124. — Referat von Ssemenow 2a. Verzeichniss von 572 Arten v. 1 *Carabus*, 1 *Rhizotrogus* u. 1 *Ctenipinus* für Europa neu.)
- Jander** (1). *Lucanus cervus* L. Zeit. Ent. Bresl. 26. 1901 p. 28. (Larve in wilden Birnbäumen.)
- Janson O. E.** (1). List of the *Cetoniidae* collected by Messrs. H. E. Andrews and J. R. D. Bell in the Bombay Presidency of India, with descriptions of the new species. Tr. Ent. Soc. Lond. 1891 p. 179—186. (27 sp. aufgezählt, 3 n. sp. Einzelb.)
- Jaquet M.** (1). Description de la nouvelle espèce de *Harpalus*, mentionnée plus haut, *Harpalus* (*Erpeinus* Mot.) Stierlini Poncy. Bul. Soc. Sc. Bucar. 10 p. 496—497.
- Jaquet M. & Poncy E.** (1). Coléoptera récoltés en 1899 et déterminés par M. E. Poncy. *ibid.* p. 483—496. (Scheint dasselbe wie Poncy 2.)
- Jennings F. B.** (1). Rhynchophora etc. in 1901. Ent. Rec. 13, p. 364—365.
- Joigny** siehe Blondel.

- Jordan K.** (1). A new species of *Goliathid Coleoptera*. Nov. Zool. VIII p. 408.
 — (2). *Anthrribiden* von Kamerun. Deut. ent. Z. 1901 p. 369—373. (12 n. spp. Einzelb.)
- Kaditsch O.** (1). Studien über das Labium der *Coleopteren*. Jen. Zeit. Nat. 36. p. 207—228, tab. XII. — Referat von Escherich 10 u. von Mayer 1902 p. 55.
- Kemp S. W.** (1). Larvae of *Cassida equestris* feeding on Hemp nettle. The Ent. 34, p. 290.
- Kempers K. J. W.** (1). Het Adersysteem der Kevertvleugels. Subordre VI. *Lamellicornia—Oedemeridae*. Tijds. Ent. 44. p. 13—39, tab. 2—4.
- Kerremans Ch.** (1). Considerations sur les Buprestides. Ann. Soc. ent. Belg. 45. 1901 p. 165—173. (Allg. Betrachtungen.)
- Kew H. W.** (1). Notes on spinning animals. Sc. Gossip. VIII p. 70, 71, 137, 138. (Curculioniden-Larven).
- Kirkaldy G.** — (1). Referat über Scholz III. Zeit. Ent. 1900 p. 298, über Rossi ibid. p. 313 und über Jozsa 1900 (1). The Ent. 34. p. 63—64. (Missbildungen).
- Klages H.** (1). Supplement to Dr. John Hamilton's List of the Coleoptera of Southwestern Pennsylvania. Ann. Carn. Mus. I. 1901 p. 265—294.
- Kletke** (1). Ueber die Athmung der Wasserkäfer. Zeit. Ent. Bresl. 26 p. V—VI. (*Dytisc.*, *Hydrophil.*).
- Knab Fr.** (1). *Asaphes* a Synonym. Ent. News XII p. 91. (*Asaphes* Kirby 1837 (*Elateryd.*) collidirt mit *Asaphes* Walk. 1834 (*Pteromalid.*) vielleicht = *Hemicrepidius* Germ.)
- Knaus W.** (1). Collecting Notes on Kansas. *Coleoptera* II. Can. Ent. 33. p. 110—115.
- Knoche E.** (1). Zur Geschichte zweier Publicationen des Herrn Privatdocenten Dr. phil. Brandes, Halle a. d. S. Zool. Anz. XXIV p. 160—162.
 — (2). Mein Schlusswort zu dem Abwehrartikel des Herrn Dr. Brandes Halle a. d. S. ibid. p. 593—598.
- Koca G.** (1). Siehe Allg. Koca 1. (638 sp. aufgezählt).
- Koebele** (1). (Notizen über *Aramigus*) U. S. Dep. Agr. Ent. Bull. XXX p. 88—90.
- König E.** (1). Erster Beitrag zur *Coleopteren*-Fauna des Kaukasus. Wien. ent. Zeit. XX p. 9—10. — Referat von Ssemenow (2a). (1 *Dorcadion* n. sp.)
- Kolbe H. J.** (1). Vergleichend morphologische Untersuchungen an *Coleopteren*, nebst Grundlagen zu einem System und zur Systematik derselben. Arch. Nat. 1901, Beih. Festr. f. Martens p. 89—150 tab. II, III. — Referat von Escherich 11, von Schauffuss 1 u. von Mayer 1902 p. 55. (Umfass. Arb., siehe Morphol., Biol., Systematik).
 — (2). Ein Schädling des Affenbrodbaumes, *Adansonius fructuum* n. sp., aus der Familie der *Curculioniden*. Allg. Zeit. Ent.

- VI p. 321—323, 341—343. (1 *Adansonius*, 1 *Tenebrionimus* n. spp.)
- (3). Ueber die *Coleopteren*-Fauna der nördlichen Nyassaländer. Sitzber. Nat. Fr. Berlin. 1901. p. 69—84.
- (4). Siehe Allg. Kolbe 1.
- (5). Neue *Lagriiden* aus Afrika. Berl. ent. Z. 1901, p. 539—554. (13 *Lagria*, 3 *Lagriostira*, 2 *Porrolagria* n. spp.) Einzelb.)
- (6). Siehe Therese 1.
- Koltze W.** (1). Verzeichniss der in der Umgegend von Hamburg gefundenen Käfer. Verh. Ver. nat. Unt. Hamb. IX. 1901. 194 pp. — Referat von Weise 16. (Verz. mit genauen Fundortangaben, 2977 sp.).
- Koningsberger J. C.** (1). Siehe Allg. Koningsberger & Zimmermann 1.
- Kraatz G.** (1). *Cetoniden* aus Neu-Guinea gesammelt von Ludw. Biro. Term. Füz. 24, p. 155—156 (1 *Glycyphana* n. sp.)
- (2). Referat über Schilsky 1900 (1). Deut. ent. Zeit. 1901 p. 375.
- Krause E.** (1). Sackkäfer (*Clythra*, *Cryptocephalus* und *Chlamys*). Prometheus 13, 1901, p. 150—154.
- Kubik F.** (1). Eine neue Form von *Carabus auronitens* F. Ins. Börse 18. p. 291. (var. *vindobonensis* n. var.).
- Lambertie M.** (1). *Cerocoma Schaefferi* L. Proc. verb. Soc. Linn. Bord. 56 p. CXIX.
- (2). *Spondylis buprestoides* L. ibid. p. CXXXVII.
- (3). *Ceutorhynchus crucifer* Oliv. ibid. CLIX—CLX.
- (4). *Apionini* (capturés à Citon). ibid. p. CLX—CLXI.
- (5). Habitat de *l'Omophlus lepturoides* F. ibid. p. 84—85.
- Lameere A.** (1). Note sur le genre *Pseudomyrmecion* (Col.). Bull. Soc. ent. Tr. 1901. p. 294—295. (Systemat. Stellung der Gatt.)
- (2). Étude sur la Phylogénie des *Longicornes*. Ann. Soc. ent. Belg. 45. p. 314—323.
- Lampa S.** (1). Siehe Allg. Lampa 1. (Auch Col. genannt.)
- (2). Skeppsvarfflugan (*Lymexylon navale* L.). Ent. Tids. 1901. p. 63.
- (3). Notiser. ibid. p. 142, 160. (Ueber *Bemb. nigricorne*, *Anthax. morio*, *Cler. rufipes*, *Microcara Bohemani*, *Cryptoph. labilis*, *Notorhina muricata* u. *Phaleria cadaverina* Fbr. in Schweden.)
- (4). Siehe Allg. Lampa 2. (1 *Stenus*, 1 *Necrobia.*, 2 *Cryptophag.*, 1 *Ilyobates*, 1 *Otiorh.*, 1 *Hypera*, 1 *Tribolium* für Finnland neu.)
- (5). Koloradobaggen åter i Europa. ibid. p. 170—174.
- Langley S. P. & Very F. W.** (1). On the cheapest form of light. Smiths. Misc. Contr. n° 1258, 20 pp. 1 tab. (Ueber das Licht der *Lampyriden*).

- Lauffer J.** (1). Notos criticas sobre el genero *Dorcadion* Dalm. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. I p. 88—98. (2 n. spp. 7 n. varr. Einzelb.)
- Launoy L.** (1). Siehe Allg. Launoy 1. (Die Wirkung des Giftes von *Scolia hirta* auf die Athmung der Larve von *Cetonia aurata*).
- Lea A. M.** (1). Notes to accompany figures of Boisduvals Types of six Species of Australian *Curculionidae*, based upon observations and sketches by M. P. Lesne. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 25, p. 537—541, tab. 30.
- (2). Descriptions of new species of australian Coleoptera. P. VI. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 26 p. 481—513. (4 *Malacod.*, 1 *Cupes*, 30 *Coccinell.* n. spp. Einzelb.)
- Lécaillon A.** (1). Siehe Allg. Lécaillon. (Auch *Clythra laeviuscula* erwähnt).
- Lederer J.** (1). *Rosalia alpina* in Fürth (Mittelfranken). Ent. Jahrb. 11. p. 214—215.
- Leinberg A.** (1). Einige neue *Staphyliniden*-Varietäten. Medd. Fenn. 26. 1900 p. 79—80. (*Philonthus*, *Quedius*).
- (2). Zwei Varietäten von *Philonthus dimidiatus* Sahlb. ibid. p. 184.
- (3). Ueber die *Cateretes*- (*Cercus*-) Varietäten. ibid. p. 185—187. (5 n. varr. dich. Tab.)
- (4). *Stenus cordaticollis* n. sp. ibid. p. 187—188.
- (5). (*Anisotoma macropus*). ibid. 27. 1901. p. 2, 177 (neu für Finnland).
- Le Sénéchal R.** (1). Catalogue des Coléoptères de la famille des *Carabiques* recueillis dans le département de l'Orne. Bull. Soc. Linn. Normand. (5). III p. 3—43.
- (2). Note sur un habitat particulier de la larve du *Lucanus cervus*. Feul. jeun. Nat. XXXI p. 190.
- Lesne P.** (1). Le régime polyphage du *Lixus algirus* L. (*Col.*). Bull. Soc. ent. Fr. p. 221. (Biol. Notiz).
- (2). Diagnose d'un type générique nouveau de la tribu des *Psoinae* (*Col.*). ibid. p. 348—350. (1 *Coccographis* n. gen., n. sp. Einzelb.)
- (3). Diagnose d'un *Cicindelide* nouveau du genre *Collyris* (*Col.*). ibid. p. 361—362. (1 n. sp. Einzelb.)
- (4). Notice necrologique sur Hyppolite Lucas. Ann. Soc. ent. Fr. 70. p. 1—5.
- (5). Synopsis des *Bostrychides* paléarctiques. Ab. XXX p. 73—104 tab. I, II (Umfass. Arb.).
- (6). La variation sexuelle chez les mâles de certains Coléoptères appartenant à la famille des *Bostrychides*; la poecilandrie periodique. C. R. Acad. Sc. Paris 132. p. 847—850. — Referat Rev. Scient. (4) XV p. 627.
- (7). Coléoptères térédiles recueillis au Japon par Dr. Harmand Bull. Mus. Hist. Nat. Paris VII 1901. p. 335—336.

- (8). Liste des Bostrychides recueillis en Birmanie par feu M. G.-Q. Corbett. Ann. Soc. ent. Belg. 45. 1901 p. 85 (13 sp. aufgezählt).
- (9). Periodic Poecilandy (*Bostrychides*) Journ. R. Micr. Soc. Lond. 1901 p. 412—413. (Referat über 6).
- Léveillé A.** (1). Description de deux *Temnochilides* nouveaux (*Col.*). Bull. Soc. ent. Fr. 1901 p. 318—320. (1 *Nemozomia*, 1 *Alindria* n. spp. Einzelb.)
- Lewis G.** (1). *Odontaeus mobilicornis* F. at Tunbridge Wells. Ent. Mont. Mag. 37. p. 199.
- (2). On new Species of *Histeridae* and Notices of others. Ann. Mag. Nat. Hist. 1901. VII p. 241—245. (7 n. sp. Einzelb.)
- (3). On a new Species of *Histeridae*. *ibid.* VIII p. 366—383. (24 n. sp. nur Einzelb.)
- Linden v.** (1). Referat über Jacobson 1900 (1). Biol. Centralbl. 21 p. 342.
- Lohde R.** (1). Siehe Allg. Lohde 1.
- Lokay E.** (1). *Neuraphes (Scydmorephes) Klapaleki* n. sp. Wien. ent. Zeit. XX p. 131 fig. (1 n. sp.)
- Luze G.** (1). Revision der europäischen und sibirischen Arten der Staphyliniden-Gattungen *Tachyporus* Grav. und *Lamprinus* Heer. Verh. Zool. bot. Ges. Wien 1901 p. 146—185. — Referat von Ssemenow 8a. (Umfass. Arb.)
- (2). Eine neue Art der Staphyliniden-Gattung *Tachinus* Grav. aus dem Altai-Gebirge. *ibid.* p. 389—390. — Referat von Ssemenow 8a. (1 n. sp. Einzelb.)
- (2a). Eine neue Art der *Staphyliniden*-Gattung *Tachinus* Grav. aus Norwegen. *ibid.* p. 614.
- (3). *Bolitobini*. Revision der paläarctischen Arten der Staphyliniden-Gattungen *Bryocharis* Boisd. et Lac., *Bolitobius* Mannh., *Bryoporus* Kraatz und *Mycetoporus* Mannh. *ibid.* p. 662—746. (Umfass. Arb.)
- Mac Dougall R. S.** (1). The biology of the genus *Pissodes*. Pr. R. Soc. Edinb. 23. p. 319—358.
- (2). The biology and forest importance of *Scolytus (Eccoptogaster) multistriatus* (Marsh). *ibid.* p. 359—364.
- Mallasz J.** (1). Studien über ungarische *Caraben*. I. Ueber *Carabus obsoletus* und dessen Verwandte. Pest 1901. 24 pp. 7 fig. — Referat von Escherich 9.
- Mally F. W.** (1). The Mexican Cotton-Boll Weevil (*Anthonomus grandis*). U. S. Dep. Agric. Farm. Bull. 130. 30 pp.
- Manger K.** (1). Einiges über die Entwicklung von *Tenebrio molitor* L. Soc. ent. XVI p. 73—74.
- Marchal C.** (1). Les années à Hannetons. Feuille. j. Nat. 31 p. 119—120.
- Marchal P.** (1). Referat über Marchal 1899 (1) L'Ann. biol. V, p. 179.
- (2). Referat über Arrow 1899 (1 u. 2). *ibid.* p. 221.

- (3). Referat über Wasmann 1899 (10). *ibid.* p. 217.
- (4). Referat über Peyerimhoff 1900 (4). *ibid.* p. 369.
- (5). Referat über Peyerimhoff 1900 (3). *ibid.* p. 403.
- Marmottan H.** (1). (*Malachius spinosus* Er. bei Paris). Bull. Fr. p. 174.
- Marshall W.** (1). Siehe Allg. Marshall 1. (Auch Col.)
- Martinez Escalera M.** (1). *Especies españolas del genero Dorcadion* Dalm. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. I. 1901 p. 77—88. (Umfass. Arbeit.)
- (2). *Notas sinonimicas sobre el genero Dorcadion.* *ibid.* p. 142—144. (Polemik gegen Pic.)
- (3). *Materiales par a una revision del género Asida.* *ibid.* p. 172—175. (Umfass. Arbeit.)
- Marty P.** (1). A propos de la Galeruque de l'Aune (*Agelastica alni*). Feuille. jeun. Nat. XXXI p. 96.
- Masaraky W. W.** (1). (Excursionen in der Umgegend der Station Preobrashenkaja, Kreis Luga, Gouv. St. Petersburg, mit Angabe der interessantesten, in letzter Zeit dort gefundenen Käfer). Hor. ross. 35. p. XXVII—XXXVII. — Referat von Ssemenow 4a. (120 spp. genannt, 19 neu für d. Gouv. Petersb.).
- (2). (Excursionen in der Umgegend von St. Petersburg). *ibid.* p. XL—XLVII. — Referat von Ssemenow 4a. (Mehrere Arten genannt, *Lado Jelskii* bemerkenswerth).
- Mayer P.** (1). Siehe Allg. Mayer (1). *Coleoptera* p. 43—45: Referate über Bordas 1900 (3), Deegener 1900 (1), Dierckx 1900 (1), Escherich 1900 (2), Gahan 1900 (1), Needham 1900 (1), Rabes 1900 (1).
- Mayet V.** (1). Contribution à la faune entomologique (*Col.*) des Cevennes et du Velay. Bull. Soc. ent. Fr. 1901 p. 30—32. (Sammelbericht).
- (2). Sur les métamorphoses de deux *Coléoptères* coprophages. *ibid.* p. 66—71 fig. 1—4 (*Onitis*, *Bubas*).
- (3). Contribution à la faune entomologique des Pyrénées orientales (*Coléoptères*) Suite. Misc. ent. IX p. 1—6, 52—55, 113—117, 185—189.
- Meek E. B.** (1). Some variations in *Lucanus placidus*, statistically examined. Science N. S. XIII p. 375.
- Mégnin P.** (1). Un cas extraordinaire de parasitisme du *Tenebrio molitor*. C. R. Soc. Biol. 53. p. 834.
- Meijere J. C. H. de** (1). Siehe Allg. Meijere 1. (*Col.* p. 431—435 tab. 32 fig. 44—53, *Dyt.*, *Hydroph.*, *Pselaph.*, *Trichopt.*, *Scar.*, *Malac.*, *Meloid.*, *Mord.*, *Curc.*)
- Meinert Fr.** (1). Vandkalvelarverne (*Larvae Dytiscidarum*). Danske Vidensk. Selsk. Skr. (6) Naturv. og Matem. Afd. IX. 8. 1901 p. 341—440, tab. I—VI. (Umfass. Arbeit.)
- Ménégaux A.** (1). Sur la biologie de la Galéruque de l'Orme. C. R. Acad. Sc. 1901 T. 133 p. 459—461.

- (2). Sur la Biologie de la Galéruque de l'Orme (*Galeruca xanthomelaena*) Le Nat. 13. p. 238—241. — Referat von Schenkling 3 u. von Eckstein 1902 p. 26.
- Merkl E.** (1). (Excursionen auf der Szemenik). Rovart. Lap. IX. 1. p. 11—16. (Magyarisch, Deutsch. Ausz. p. 2).
- (2). (Zweckmässige Fangmethode von Buprestiden). Rov. Lap. 9. 1. p. 19—20. (Magyarisch, Deutsch. Ausz. p. 2).
- Meunier F.** (1). Ueber einige *Coleopteren*-Flügeldecken aus der praeglacialen Braunkohle und dem interglacialen Torflager von Lauenburg (Elbe). Jahrb. K. preuss. Land. 1900 p. ? sep. 8 pp. (Wahrscheinlich dasselbe wie 1900, 1.)
- Meyer-Darcis G.** (1). Beschreibung eines neuen Hirschkäfers, *Odontolabis Fruhstorferi* Meyer-Darcis n. sp. Ins. Börs. 18. p. 355.
- Mingaud** (1). (Ueber *Galeruca xanthomelaena* als Schädling). Bull. Soc. Nimes 28 (?) 1901 p. XXVIII.
- (2). Le *Bruchus irresectus* Fahr., insecte coléoptère parasite des haricots cultivés. ibid. 27. 1899. p. 103—107.
- Mjöberg E.** (1). Sällsynta *Coleoptera*. I. Från Stockholmstrakten. Ent. Tids. 1901 p. 191—192. (43 Arten aufgezählt, 1 *Ptilium* neu für Schweden.)
- (2). Ett Utkläckningsförsök. ibid. p. 189—190. (Larve von *Hadrotoma*.)
- Möllenkamp W.** (1). Beitrag zur Kenntniss der Lucaniden-Fauna. Ins. Börs. 18. p. 363—364. (1 *Nigidius*, 1 *Odontolabis* n. spp., Einzelb.)
- (2). Sechs neue *Lucaniden*-Arten und eine neue Varietät. Not. Leyd. Mus. 22. p. 44—48. (6 n. spp. Einzelb.)
- Mokrshezki S. A.** (1). Siehe Allg. Mokrshezki 1. (*Anisoplia*, *Rhynchites*, *Athous*, *Tanymecus* als Schädlinge).
- Monnot E. & Houlbert C.** (1). Faune élémentaire de la France. Tableaux analytiques illustré de la famille des *Longicornes*. Feuille. jeun. Nat. (4) 31. 1901 p. 229—233, 253—258, 285—290, 2 tabb., 32. 1901 p. 19—20, 25—33. (Umfass. Arbeit).
- Morley Cl.** (1). The completed history of *Harpalus Fröhlichii* Sturm as a British Insect. Ent. Mont. Mag. 37 p. 64—66.
- (2). Note on *Encephalus complicans* Westw. ibid. p. 151—152.
- (3). Note on the pairing of *Lampyris notiluca*. ibid. p. 226.
- Moser J.** (1). Einige neue *Cetoniden*-Arten. Berl. ent. Zeit. 1901. p. 379—382. (1 *Theodosia*, 1 *Diceros*, 1 *Clerota*, 1 *Poecilopharis*, 1 *Diplognatha* n. spp., Einzelb.)
- (2). Neue *Cetoniden*-Arten aus Tonkin, gesammelt von Fruhstorfer. ibid. p. 525—538. (1 *Coryphocera*, 1 *Rhomborhina*, 1 *Coelodera*, 2 *Carolina*, 1 *Euselates*, 2 *Callynomes*, 1 *Gnoriemus*, 9 *Trichius* n. spp., Einzelbeschr.)
- Müllenberger H.** (1). Irrfahrten eines Wasserkäfers. Ver. Luxemb. Naturfr. vorm. Fauna XI. 1901. p. 168.

- Müller** (1). Der gefurchte Dickmaulrüssler, *Otiiorhynchus sulcatus*. Prakt. Blätt. Pflanzensch. 1901. p. 52—? — Referat von Eckstein 1902 p. 25.
- Müller A.** (1). Conservirung der Käfer. Ent. Zeit. XV. 1901 p. 33.
- Müller J.** (1). Coleopterologische Notizen. Wien. ent. Zeit. XX p. 137—141. — Referat von Ssemenow 8a. (*Carabid.*, *Coprid.*)
- (2). Beitrag zur Kenntniss der Höhlensilphiden. Verh. zool. bot. Ges. Wien 1901 p. 16—33 tab. I. — Referat von Escherich Zool. Centr. VIII p. 418—419. (Umfass. Arb.)
- (3). *Coccinellidae* Dalmatiae. *ibid.* p. 511—522. (Aufzählung u. 4 n. varr.)
- Münster T.** (1). Index Coleopterorum Norvegiae I: Fortegnelse over de o Norge hidtil jaktagte Arter of Familienne *Clambidae*, *Corylophidae*, *Trichopterygidae*, *Erotylidae*, *Phalacridae* og *Lathridiidae*. Forh. Selsk. Christian. 1901 p. ? 43 pp.
- Mysslowky M. N.** (1). Siehe Allg. Mysslowky 1. — Referat von Adelung. Zool. Centr. VIII p. 513—514 (*Melolontha*).
- Nägele F.** (1). Einiges über den *Platypus cylindrus* Fbr. Mitth. Bad. Zool. Ver. I. 1900 p. 43—44.
- Nassonow N.** (1). Siehe Allg. Nassonow 1. (Auch für *Col.* wichtiges Handbuch).
- Newbery E. A.** (1). Cosmopolitan Beetles in a London Warehouse. Ent. Rec. XIII p. 219—220.
- Newstead R.** (1). Siehe Allg. Newstead 1. (*Otiiorhynchus*, *Sitones* aus dem Magen der Singdrossel, *Necrophorus* aus dem des Würgers, *Geotrupes stercorarius* und *spiniger* aus dem der Ohreule).
- Nicolas A.** (1). *Clytus Rhamni* Germ. *bifasciatus* var. n. L'Éch. 17. p. 29. (Einzelb.)
- Noël** (1). (Ueber *Goliathus giganteus*). Le Natural. 1901 p. 10.
- (2). (Ueber *Galeruca xanthomelaena*). *ibid.* p. 238.
- Normand H.** (1). Description d'un *Pselaphus* nouveau, de Tunesie (*Col.*). Bull. Soc. ent. Fr. 1901 p. 147—148. (Einzelbeschr.)
- Oberthür R.** (1). Sur la coloration des taches de certains *Batocera* (*Col.*). Bull. Soc. ent. Fr. 1901 p. 351.
- Obst P.** (1). Synopsis der Coleopteren-Gattung *Anthia* Weber. Arch. Nat. Festschr. f. Martens 1901. p. 265—298. — Referat von Ssemenow 7a. (Umfass. Arb.)
- (2). Berichtigung zur Synopsis der Coleopteren-Gattung *Anthia* (Weber). *ibid.* 67. I. p. 279.
- Ohaus F.** (1). Biologische Beobachtungen aus Brasilien. Verh. Nat. Ver. Hamb. (3) VIII 1900 p. XXXIII—XXXIV.
- (2). Revision der *Heterosterniden*. Stett. ent. Zeit. 62, 1901 p. 349—366 tab. II. (Umfass. Arbeit).
- (3). Ruteliden der alten Welt. Deut. ent. Z. 1901. p. 125—134, figg. (6 n. sp. Einzelb.)

- (4). Bemerkungen zu einigen Parastasen. *ibid.* p. 251. (Biol. Notiz).
- (5). Beitrag zur Kenntniss der afrikanischen Popillien. *ibid.* p. 257—271. (11 n. sp., Einzelb. u. 1 dichot. Gattungstabelle).
- (6). *Mimela Grubaueri* n. sp. *ibid.* p. 272. (1 n. sp. Einzelb.)
- Olivier E.** (1). Variétés nouvelles de *Lampyris noctiluca*. *Misc. Ent.* 9, p. 129. (2 n. varr.)
- Olsuflew G. de** (1). Nouvelles espèces du genre *Comytocephalus* White d'Afrique orientale. *Hor. ross.* 35, p. 603—610. (2 n. spp., dich. Tab.)
- Paganetti-Hummler G.** (1). Ueber das Vorkommen einiger interessanter Coleopteren. *Verh. Zool. bot. Ges. Wien* 51. p. 404 405. (Sammelnotizen).
- (2). Beitrag zur Fauna von Süd-Dalmatien V. *Allg. Zeit. Ent.* VI. p. 147—151. (Fortsetz. *Curc.* u. *Ceramb.*)
- Pasztor** (1). (I. Ueber *Anthonomus pomorum* L. II. Ueber *Anthonomus cinctus* Redt. *Kis Közlemenyck.* IV. 3. p. 244—273, fig. — Referat von Eckstein 1902 p. 26.
- Pearsall** (1). (Ueber *Sphaeridium scarabaeoides*). *Ent. News* XII p. 158. (In Nord-Amerika).
- Penecke K. A.** (1). *Coleopterologische* Miscellen. *Wien. ent. Zeit.* XX p. 11—21. (3 *Staph.*, 1 *Hist.*, 2 *Curc.* n. sp.)
- Perez J.** (1). (Quelques Coléoptères intéressants). *Proc. verb. Soc. Linn. Bord.* 56 p. CXXXIII.
- Peringuey L.** (1). Descriptive Catalogue of the *Coleoptera* of South Africa. V. *Lucanidae* and *Scarabaeidae*. *Tr. S. Afr. Phil. Soc.* XII. 1901 p. 1—563 tab. I—IX. (Umfass. Arb.)
- (2). Note sur le genre *Monoplius* Mars. avec descriptions d'espèces nouvelles. *Ann. Soc. ent. Fr.* 70 p. 178—187. (Umfass. Arbeit).
- Pesruches** siehe Clouët.
- Petri K.** (1). Monographie der *Curculioniden*-Tribus der *Hyperini*. *Verh. Sieb. Ver. Nat.* 1901. II. Separatb. — Referat von Schröder, *Allg. Z. Ent.* 8. p. 53. (Umfass. Arb. 210 pp.)
- (2). Bestimmungstabelle der europäischen Coleopteren. 44. *Curculionidae. Hyperini.* Paskau. 1901. (Auszug aus 1).
- Peyerimhoff P. de** (1). Description d'un nouveau *Pselaphide* cavernicole des Alpes françaises (*Col.*). *Bull. Soc. ent. Fr.* 1901. p. 203—205. (1 n. sp. Einzelbeschr., dichot. Tab. über 4 Untergatt.)
- (2). Notes sur les groupes *Tychobythinus*, *Bythoxenus* et *Xenobythus*. *ibid.* p. 297—298.
- (3). Description d'un nouveau *Staphylinide* de la Haute-Provence, *Aleochara (Ceranota) penicillata* n. sp. (*Col.*) *ibid.* p. 347—348. (1 n. sp. Einzelbeschr.)
- (4). A propos de la larve de *Hydrocyphon deflexicollis*. *Feul. jaun. Nat.* XXXI p. 166—167.

— (5). Siehe Peyerimhoff & Deville 1.

Peyerimhoff & Saint-Claire-Deville (1). Coléoptères nouveaux ou peu connus trouvés dans les Alpes-maritimes et les Basses-Alpes. Ab. XXX p. 53—72. (42 sp. neu für Frankreich, 1 *Trechus*, 2 *Atheta*, 1 *Bythinus*, 1 *Eutheia*, 1 *Stenichnus*, 2 *Troglodromus*, 1 *Otiorynchus* n. spp.)

Pic M. nach Zeitschriften.

Bull. Soc. ent. France 1901.

- (1). Sur quelques variétés de *Zonabris*, du Turkestan (*Col.*). loc. cit. p. 110—111. — Referat von Ssemenow 4a. (2) *Mylabris* n. var. Einzelbeschr.)
- (2). Diagnoses préliminaires de deux *Malthinus*, de nord de l'Afrique (*Col.*). ibid. p. 111—112. (2 n. sp. Einzelbeschr.)
- (3). Synonymie probable de *Malthinus tuniseus* Fairm. (*Col.*). ibid. p. 112—113.
- (4). Quelques mots sur l'accouplement des Coléoptères. ibid. p. 113.
- (5). Description de *Ptinus* nouveaux, de l'île Maurice (*Col.*). ibid. p. 155—156. (2 *Ptinus* n. spp. Einzelb.)
- (6). Note sur *Strangalia emmipoda* Muls. espèces voisines (*Col.*). ibid. p. 235. (2 *Strangal.* n. varr. dichot. Tab. u. Einzelbeschr.)
- (7). Liste de quelques Coléoptères recueillis en Grèce en 1901. ibid. p. 253—255. (1 *Hymenorus* n. sp. Einzelbeschr.)
- (8). Un nouveau *Ptinus* du Mexique (*Col.*). ibid. p. 299—300. (1 n. sp. Einzelb.)
- (9). Un genre nouveau de Coléoptère de l'île Maurice. ibid. p. 332—333. (1 n. gen. *Anobiid.* Einzelb.)
- (10). Notes correctives et synonymiques. ibid. p. 363—365. (*Mastigus*, *Pristocyphus*, *Pachybrachys*).

Annales de la Soc. ent. Fr. 70. 1901.

- (11). Répertoire des publications zoologiques 1898—1899. loc. cit. p. 157—173.

Revue d'Entomologie. XX. 1901.

- (11a). *Hylophilidae* et *Anthicidae* de la Rhodesia. loc. cit. p. 96—100. (1 *Euglen.*, 2 *Formicom.*, 1 *Tomod.*, 3 *Anthic.* n. spp., Einzelbeschr.)
- (11b). Les *Thanasimus* gollo-rhenans. ibid. p. 248—250. (Umfass. Arbeit).

Ann. Soc. ent. Belg. 45. 1901.

- (12). Diagnoses d'*Anthicidae* exotiques. loc. cit. p. 89—91. (1 *Notow.*, 1 *Form.*, 2 *Anth.* n. spp., Einzelb.)
- (13). Deuxième supplément à ma liste des Anthicides (1897—1900). ibid. p. 248—257. — Referat von Ssemenow 8a. (Catalog mit Citaten u. Fundorten).

— (13a). Siehe Pic 1899 (20).

Bull. Soc. Zool. Fr. XXV. 1900, XXVI. 1901.

- (14). Quelques mots au sujet des ouvrages écrits en collaboration. loc. cit. 25. p. 65—67.
 — (15). Quelques mots au sujet des publications délaissées. *ibid.* p. 172—173. (Gegen Reitter).
 — (16). *Coléoptères* nouveaux de la faune paléarctique. *ibid.* p. 182—185. (1 *Bythinus*, 1 *Cantharis*, 4 *Rhagonycha*, 1 *Malchinus* n. spp., Einzelb.)
 — (17). Notes diverses sur le genre *Zonabris* Harold. *ibid.* 26. p. 77—78. (2 *Mylabris* n. spp., Einzelb.)

Bull. Mus. Hist. nat. Par. 1901.

- (18). *Coléoptères Cerambycides* recueillis au Japon par Dr. Harmand, Ministre plenipotentiaire de France à Tokio. loc. cit. p. 337—343. (8 n. spp.)
 — (19). Liste des *Ptinidae*, *Hedobiini* et *Anthicidae* recueillis au Japon central pr. Dr. Harmand, Ministre etc. *ibid.* p. 343.

Miscell. entomol. IX. 1901.

- (20). Sur le genre *Polyarthron* Serv. loc. cit. p. 2—3.
 — (21). Addenda sur le genre *Polyarthron* Serr. *ibid.* p. 25—26.
 — (22). Note sur les *Anthicus terminatus* Schmt. et *terminatus* Laf. *ibid.* p. 129—131.
 — (23). Sur quelques questions de priorité inspirées par le *Nemoxys*? var. *semirufus* Pic. *ibid.* VII. 1898. p. 113—114.
 — (24). Sur quelques Coléoptères Phytophages d'Akbès. *ibid.* VII. 1898. p. 155—156.
 — (24a). Siehe Pic 1898 (23).
 — (24b). Siehe Pic 1898 (22a).
 — (24c). Siehe Pic 1898 (22c).

Le Naturaliste. 23. 1901.

- (25). Description de *Coléoptères* nouveaux. loc. cit. p. 37, 44, 227.
 — (26). Description de *Coléoptères* nouveaux de l'Amérique méridionale. loc. cit. p. 277—?

Feuill. jeun. Natural. (4) 31. 1901.

- (26a). Sur le groupe *Podistrina*. loc. cit. p. 104—106.
 — (27). Note complémentaire sur *Podistrina*. *ibid.* p. 144.
 — (28). Notes de chasse et d'élevage. *ibid.* p. 272.
 — (29). De la diversité de classification chez les *Longicornes*. *ibid.* p. 291—292.
 — (29a). Siehe Pic 1898 (27).
 — (29b). Siehe Pic 1899 (38).

L'Echange. XVII, XVI, XIV.

- (30). Notes diverses et diagnoses de Coléoptères I—V. loc. cit. 17. p. 2—4, 9—12, 17—20, 25—27, 33—35. (35 n. spp.) VI. p. 57—59, VII. p. 65—68, VIII. p. 81—83 (25 n. spp.) (1 *Cephen.*, 2 *Colon*, 1 *Nemosoma*, 1 *Cozelus*, 1 *Litargus*, 1 *Trogoderma*, 1 *Elmis* etc. etc.)
- (31). *Cryptocephalus crassus* Ol. et ses variétés. *ibid.* p. 37—39. (1 n. var., dich. Tab.)
- (32). *Anthicids* américains nouveaux. *ibid.* p. 41. (3 *Tomoderus*, 2 *Anthicus* n. spp.)
- (33). Renseignements sur l'augmentation de la Faune française. *ibid.* p. 47—48, 55—56. (87 sp. aufgezählt.)
- (34). Descriptions abrégées de Coléoptères provenant de Grèce. *ibid.* p. 49—52. (21 n. spp.)
- (35). Synopsis des *Euanoma* Reitt. et *Pseudeuanoma* Pic. *ibid.* p. 74—75. (Umfass. Arbeit.)
- (36). Communications diverses. *ibid.* p. 79—80. (2 *Ptinus*, 1 *Apalus* n. spp. u. mehrere n. varr., Einzelb.)
- (37). *Curculionides* d'Arabie. *ibid.* p. 87—88. (Umfass. Arbeit.)
- (37a). Coléoptères nouveaux d'Orient, Arménie et Tunisie. *ibid.* p. 89—91. (1 *Singilis*, 1 *Danacaea*, 1 *Anthicus*, 1 *Nanophyes*, 1 *Cartodera*, 1 *Dorcadion* n. spp., Einzelb.)
- (38). Diagnoses ou descriptions abrégées du divers Coléoptères exotiques. *ibid.* p. 93—96. (1 *Astylus*, 1 *Ptinus*, 2 *Trichodesma*, 1 *Hadrobregmus*, 1 *Gibboxyletinus*, 1 *Ptilinus*, 4 *Anthicus*, 3 *Euglenes*, 1 *Caryopemon*, 1 *Malegia* n. spp.)
- (39). Sur le *Dorcadion* Dalm. *ibid.* 16. 1900. p. 29—?
- (40). Sur *Zonabris* (*Mylabris*) 20-*punctata* Ol. et formes voisines. *ibid.* p. 46—?
- (41). Rectifications et Synopsis sur le genre *Rosalia* L. *ibid.* p. 58—?
- (42). Sur divers *Cryptocephalus* du nord de l'Afrique. *ibid.* p. 95—?
- (43). Liste de Longicornes provenant de France ou des Alpes *ibid.* 14. 1898. p. 86—88.
- (44). Bibliographie entomologique. *ibid.* p. 93.

Bull. Soc. Hist. nat. Autun. 1898—1901.

- (45). A propos de la synonymie. loc. cit. 1898. p. 17—21.
- (45a). Siehe Pic 1899 (40).
- (46). Ou sont les types? Par assez ou trop de priorité absolue? *ibid.* p. 179—181.
- (47). Court recit d'un voyage en Orient. *ibid.* 1899. p. 201—204.
- (48). Diagnoses de Coléoptères d'Orient. *ibid.* p. 204—210, 252—261. (1 *Cholera*, 1 *Hadrotoma*, 1 *Telopes*, 1 *Acmaeodera*, 1 *Drilus*, 2 *Haplocnemus*, 1 *Hypebaeus*, 1 *Malthinus*, 1 *Meso-*

dasytes, 1 *Theca*, 1 *Xyletinus*, 1 *Mylabris*, 1 *Rhinoncus*, 2 *Stylosomus*, 1 *Luperus*).

- (48a). Diagnoses de Coléoptères d'Orient récoltés en 1899. *ibid.* XIII. 1900 p. 25—32. (1 *Amaur.*, 1 *Leptomast.*, 1 *Eucomm.*, 1 *Danacaea*, 1 *Helops*, 1 *Mordellist.*, 1 *Anasp.*, 1 *Barris*, 1 *Assuanensius*, 2 *Bagous*, 1 *Bruchus* n. spp.).
- (48b). Coléoptères d'Orient. *ibid.* XIV. 1901 p. 33—39. (1 *Pseudeuanomu*, 1 *Malchinus*, 1 *Malthinus*, 5 *Malthodes*, 1 *Anthic.*, 2 *Procas*, 1 *Cryptoceph.*, 1 *Pachybrach.*).

Bulletin de la Société d'Hist. nat. de Mâcon. 1899.

- (49). Les Coléoptères *Anthicides* du centre de la France. *loc. cit.* p. 189—196 tab. (Umfass. Arb.).

Rev. Scient. Bourbon. 14.

- (50). *Xylophilides* et *Anthicides* capturés en Italie et Grèce, du 17 Avril au 14 Juin 1901. *loc. cit.* p. 173—182. (1 *Anthicus* n. sp.).

Deutsche entomologische Zeitschrift.

- (51). Ein neuer *Mecynotarsus* aus Ceylon. *loc. cit.* p. 363.

Selbstständig erschienene Schriften.

- (52). *Materiaux pour servir à l'étude des Longicornes* III. 3. Lyon 1901. (Fortsetzung.)

- (53). Siehe Pic & Pic.

Pic M. & Pic Th. (1). Uebersicht der Arten der *Coleopteren*-Gattung *Hedobia* Latr. aus der palaearktischen Fauna. *Wien. ent. Zeit.* XX. p. 169—174. (Umfass. Arbeit).

Pic Th. (1) siehe Pic & Pic.

Pierre A. (1). Coléopterocécidies de *Linaria vulgaris* Moench. *Rev. Sc. Bourb.* XIV p. 48. (*Gymnetron netum*).

- (2). Coléopterocécidies d'*Arabis thaliana* L. *ibid.* p. 77—78. (*Ceutorhynch. griseus* und *atomus*).

- (3). Nouvelles cécidologiques. *ibid.* p. 204—212, 241—246. (*Col.*)

Piffard A. (1). *Steni* gliding on the surface of water. *Ent. Mont. Mag.* 37. p. 99.

Planet L. (1). Essai monographique sur les Coléoptères des genres *Pseudolucane* et *Lucane*. *Le Natur.* 23. 1901. p. 133—134, p. 157—158, 179—181, 193—195, 250—253.

Poncy É. (1). Coléoptères récoltés en 1899 par M. Jaquet déterminés par P. . . . *Bul. Soc. Sc. Bucar.* IX, p. 754—758.

- (2). Faune de la Roumanie. Coléoptères récoltés en 1899 par M. le doct. Jaquet et déterminés par P. . . . *ibid.* X p. 483—496.

- (3). Siehe Jaquet & Poncy. (Scheint dasselbe wie 2).

- Ponselle A.** (1). Observations sur l'*Atemeles paradoxus* (Col.). Bull. Soc. ent. Fr. 1901. p. 360—361. (Biolog. Notiz).
 — (2). Contributions à l'étude des moeurs des *Cicindèles*. Feuille. jeun. Nat. XXXI p. 67—68.
- Poppius B. R.** (1). (*Aphodius Scrophia* in Finnland). Medd. Fenn. 23. 1898 p. 33—34, 190.
- (2). (*Negastrius quadripustulatus* Fbr. in Finnland). *ibid.* p. 5, 190.
- (3). Tyra för finska faunan nya Coleoptera. *ibid.* 24, 1900. p. 13—14, 184. (*Polystoma*, *Omalium*, *Melandrya*, *Araeocerus*).
- (4). Siehe Allg. Poppius 2. (*Thinobius*).
- (5). (För Finlands fauna nya coleoptera). *ibid.* 25, 1900 p. 43, 135. (*Nebria*, *Cartodere*).
- (6). Siehe Allg. Poppius 3. (*Bythinus*).
- (7). Siehe Allg. Poppius 4. (*Tribolium*).
- (8). (Tvenne för faunan nya skalbaggar. *ibid.* 26. 1900. p. 78, 218. (*Ilyobates*, *Otiorrhynch*).
- (9). Siehe Allg. Poppius 1. (1 *Bembid.*, 1 *Philonth.*).
- (10). Eine neue Art der Gattung *Cryptophagus* Herbst. *ibid.* p. 189—190. (1 n. sp. Einzelb.)
- (11). Ueber die Entwicklung von *Phyllotreta armoraciae* Ksch. *ibid.* p. 27, 1901. p. 106—111.
- (12). Förteckning öfver Ryska Karelens Coleoptera. Acta Fenn. 18. 1899. n° I. p. 1—125. (1791 Arten aufgezählt).
- Porta A.** (1). Studio critico e classificazione delle specie appartenenti al Sottog. *Abacopercus* Gangl. e al Sottog. *Percus*, Bon. colla descrizione di una nuova specie. Bull. Soc. Ent. ital. 33. p. 105—132. Referat von Speiser 1902 All. Z. Ent. VII p. 89. (Dichot. Tab. über 33 sp., 1 n. sp. 1 n. var.)
- (2). La metamorfosi dello *Zabrus tenebrioides* Goeze (*gibbus* F.) *ibid.* p. 177—182.
- (3). Sulla Filogenia degli *Scarabaeidi* e dei *Curculionidi*. Atti Soc. Nat. Mod. IV 1901. p. ? 6 pp., 1 tab. — Referat von Speiser 1902. All. Z. Ent. VII p. 94.
- Porter C. E.** (1). Revista bibliogr.: Nuevas especies de Coleopteros. Rev. Chil. V. 1901. p. 156—157.
- Poujade G. A.** (1). Sur l'*Hydrophilus piceus*. Bull. Soc. ent. Fr. 1901 p. 229. (Biol. Notiz).
- Prowazek S.** (1). Spermatologische Studien. Arb. Inst. Wien XIII. p. 197—236, 2 tabb. II. — Referat von Speiser Allg. Z. Ent. VII. p. 515—516, von Mayer 1902 p. 56 u. von Goldschmidt Zool. Centr. 1902 p. 331. (Spermatogenese der Weinbergsschnecke u. des Nashornkäfers *Oryctes nasicornis* L.)
- Quittard J.** (1). Contribution à la faune des Coléoptères du département du Pay-de-Dôme, principalement des environs de

Riom. L'Ech. XVII p. 36—37, 42—44, 53—54, 63—64, 72, 77—78, 88.

Raffray A. (1). Description d'un *Thorictide* nouveau, de l'Afrique australe (Col.). Bull. Soc. ent. Fr. 1901. p. 123. (Einzelbeschr.)

— (2). *Braunsiella*, nouveau genre de *Clavigerides* (Col.). *ibid.* p. 201. (1 n. gen. 1 n. sp. Einzelbeschr.)

— (3). Description of New Species of South African *Pselaphidae*. Ann. S. Afr. Mus. 1901 p. 117—126 (11 n. spp.)

— (4). *Pselaphides* nouveaux de Ceylon. Ann. Soc. ent. Fr. 70. 1901. p. 27—30. (2 *Batrisodes*, 1 *Hornia* n. spp.)

Raspail X. (1). Le Hanneton (*Melolontha vulgaris*) au point de vue de sa progression dans les années intermédiaires de ses cycles. Bull. Soc. Accl. Fr. 1900 p. ? sep. 10 pp.

— (2). (Ueber die Eierzahl bei *Melolontha*). Feuille. jeun. Nat. 31 p. 143.

Régimbart M. (1). Description d'un *Hydroporus* du Liban (Col.). Bull. Soc. ent. Fr. p. 101—102. (Einzelbeschr.)

— (2). Notes sur quelques *Dytiscides* d'Europe (Col.). *ibid.* p. 323—327. (1 *Haliphus*, 4 *Hydroporus* n. varr. Einzelbeschr.)

— (3). Revision des grands *Hydrophiles*. Ann. Soc. ent. Fr. 70. p. 188—232, 665—666, tab. VII, VIII. (Umfass. Arb.)

— (4). Dytiscidae, Gyrinidae et Hydrophilidae recueillis par Dr. Harmand, au Japon central, en 1900. Bull. Mus. Hist. nat. Paris VII. 1901. p. 336—337.

Reh L. (1). Der Himbeerkäfer. Pomolog. Monatshefte. 1901. Heft 3—4, 3 pp. — Referat von Schröder Allg. Zeit. Ent. VI. p. 156. (*Byturus*-Imago als Schädling).

Reitter E. Nach Zeitschriften geordnet:

Wiener entomol. Zeitung XX. 1901.

— (1). Zwölfter Beitrag zur *Coleopteren*-Fauna von Europa und den angrenzenden Ländern. loc. cit. p. 22—24. (1 *Amaurops*, 1 *Triplax*, 1 *Anommatus*, 1 *Otiorh.* n spp.)

— (2). Referat über Matthews 1900. *ibid.* p. 48.

— (3). Uebersicht der Arten der *Coleopteren*-Gattung *Pachnophorus* Reit. aus der palaearktischen Fauna. *ibid.* p. 53—54. — Referat von Ssemenow 4a. (Umfass. Arbeit).

— (4). Coleopterologische Notizen. *ibid.* p. 57—59, 98, 175—176. — Referat von Ssemenow 4a, 7a.

— (5). Ueber *Throscus*-Arten mit ganz ungetheilten Augen, aus der Gruppe des *brevicollis* Bonv. *ibid.* p. 60. — Referat von Ssemenow 4a. (1 n. sp., dich Tab. über 3 Arten).

— (6). Ueber die turkestanischen Arten der *Coleopteren*-Gattung *Laena* Latr. *ibid.* p. 61—63. — Referat von Ssemenow 4a. (Umfass. Arbeit, 2 n. spp.)

— (7). Uebersicht der Arten der *Coleopteren*-Gattung *Triplax* Payk. aus Europa und den angrenzenden Ländern. *ibid.*

- p. 73—76. — Referat von Ssemenow 4a. (Umfassende Arbeit, 2 n. spp.)
- (8). Uebersicht der Arten der *Coleopteren*-Gattung *Strangalia* Serv. aus der Verwandtschaft der *St. melanura* L. und *bi-fasciata* Müll. *ibid.* p. 77—80. — Referat von Ssemenow 4a. (Umfass. Arbeit, 1 n. sp.)
 - (9). Uebersicht der *Coeliodes*-Arten aus dem *Coleopteren*-Subgenus *Cydnorrhinus* Thoms. *ibid.* p. 86—88. — Referat von Ssemenow 4a. (dichot. Tab., 2 n. spp.)
 - (10). Referat über Schilsky 1901 (1). *ibid.* p. 88.
 - (11). Dreizehnter Beitrag zur *Coleopteren*-Fauna von Europa und den angrenzenden Ländern. *ibid.* p. 99—101. (1 *Alexia*, 1 *Pentodon*, 1 *Ludius*, 1 *Danacaea*, 1 *Pityophthorus* n. spp.)
 - (12). Uebersicht der bekannten *Agyrtes*-Arten. *ibid.* p. 102. — Referat von Ssemenow 7a. (1 n. subg., 1 n. sp.)
 - (13). Neue Uebersicht der Arten der *Coleopteren*-Gattung *Ischyronota* Weise. *ibid.* p. 103—108. — Referat von Ssemenow 7a. (Umfass. Arbeit, 1 n. sp.)
 - (14). Notizen zu den Bemerkungen des Herrn Tschitscherin zu Reiters Bestimmungs-Tabelle der *Harpalini*. *ibid.* p. 109—113. — Referat von Ssemenow 7a. (Umfass. Arb. über *Odontocarus*).
 - (15). Uebersicht der *Coleopteren*-Gattung *Pedilus* Fisch. der palaearktischen Fauna. *ibid.* p. 114—116. — Referat von Ssemenow 7a. (Umfass. Arb., 3 n. sp.)
 - (16). Ueber *Silpha carinata* Hrbst. und nächste Verwandte. *ibid.* p. 121—123. — Referat von Ssemenow 7a. (Umfass. Arb., 1 n. sp.)
 - (17). Ueber die Arten der *Coleopteren*-Gattung *Pselaphoptrus* Reitt. *ibid.* p. 123—124. — Referat von Ssemenow 7a. (Umfass. Arb., 1 n. sp.)
 - (18). Ein neuer blinder Grotten-Silphide aus der Herzegowina. *ibid.* p. 128. (1 n. gen. 1 n. sp.)
 - (19). Uebersicht der *Coeliodes*-Arten der *Coleopteren*-Gattung *Allodactylus* Wse. aus der palaearktischen Fauna. *ibid.* p. 129—130. — Referat von Ssemenow 7a. (Dichot. Tab. 2 n. spp.)
 - (20). Eine neue Art der *Coleopteren*-Gattung *Cychnus* aus der Herzegowina. *ibid.* p. 141—142. (1 n. sp.)
 - (21). Eine neue Art der *Coleopteren*-Gattung *Trechus* aus der Herzegowina. *ibid.* p. 143. (1 n. sp.)
 - (22). Referat über Tschitscherin 15. *ibid.* p. 156.
 - (23.) Abbildungen und Beschreibung neuer *Coleopteren* aus der paläarktischen Fauna. *ibid.* p. 157—164. (1 *Carabid.*, 1 *Staph.*, 1 *Lathrid.*, 3 *Tenebr.*, 1 *Curc.*, 2 *Chrys.*)
 - (24). Ein neuer Borkenkäfer aus Oberösterreich. *ibid.* p. 182. (1 *Thamnurgus* n. sp.)

- (25). Die europäischen Arten der *Coleopteren*-Gattung *Monotoma* Hrbst. *ibid.* p. 193—197.
- (26). Vierzehnter Beitrag zur *Coleopteren*-Fauna von Europa und den angrenzenden Ländern. *ibid.* p. 200—202. (2 *Curc.*, 1 *Scol.*, 1 *Chrys.*)
- (27). Bestimmungs-Tabelle der europäischen *Tropiphorini* und *Alophini*. (*Coleoptera*, *Curculionidae*.) *ibid.* p. 203—214. (Ufass. Arbeit).
- (28.) Fünf neue Arten der *Coleopteren*-Gattung *Apion* Herbst, aus der paläarktischen Fauna. *ibid.* p. 226—229. (5 spp.)
- (29.) Ein neues *Coleopteren*-Genus aus Mittel-Europa. *ibid.* p. 229—230. (*Saulcyella* Einzelb.)

Deutsche ent. Zeitschrift.

- (30.) Uebersicht der *Coleopteren*-Gattung *Catops* Payk. aus der paläarktischen Fauna. *loc. cit.* p. 39—48. — Referat von Ssemenow 7 a. (Ufass. Arbeit).
- (31.) *Lesteva binotata* n. sp. p. 48. — Referat von Ssemenow 7 a. (1 n. sp. Einzelb.)
- (32.) Weitere Beiträge zur *Coleopteren*-Fauna des russischen Reiches. *ibid.* p. 65—84. — Referat von Ssemenow 7 a. (31 n. spp., meist Einzelb., 1 dich. Tab.)
- (33.) Eine Serie neuer *Coleopteren* aus dem russischen Reiche. *ibid.* p. 177—186. (18 n. sp., Einzelb.)
- (34.) Neue *Coleopteren* aus Europa und den angrenzenden Ländern. *ibid.* p. 187—188. (4 n. sp., Einzelb.)
- (35.) Dichotomische *Coleopteren*-Gattung *Pterocomma* Sol. *ibid.* p. 189—192. (Ufass. Arb.)
- (36.) *Baris perlucida* n. sp. *ibid.* p. 192. (1 n. nom.)
- (37.) Verschiedenes über die *Tenebrioniden*-Abtheilung *Helopina*. *ibid.* p. 209—224. (Ufass. Arb.)

Verh. naturf. Ver. Brünn.

- (38.) Bestimmungstabelle der europäischen *Coleopteren*. 47. *Byrrhidae* (*Anobiidae*) und *Cioidae*. *loc. cit.* p. 1—64. (Ufass. Arbeit.)

Selbstständig erschienene Schriften.

- (39.) Siehe Csiki 1. (1 *Anatolica* n. sp.)
- Rengel C.** (1). Zur Biologie des *Hydrophilus piceus*. *Biol. Centr.* XXXI 1901 p. 173—182, 209—220. — Referat von Escherich 8, von Hetschko 1, von Krauss *Allg. Z. Ent.* VII. 1902. p. 517—518 u. von Mayer 1902 p. 57, Kritik von Eckstein 1902 p. 24.
- Reuleaux F.** (1). Siehe *Allg. Reuleaux* 1. (Mechanismen des Hautskelettes, besonders Springmechanismus der Elateriden).
- Reuter E.** (1). (Larven-Regen). *Medd. Fenn.* 25. 1900. p. 69, 135. (*Car.*- oder *Canthariden*-Larven).

- Reuter O. M.** (1). On the *Coleoptera* of the Faroë Islands. Ent. Mont. Mag. 37. p. 3—4. (Nachtrag zu Hansen 1881 u. Sharp 1900, 4).
- Ribaga C.** (1). Sul *Gymnetron tetrum* Fbr. del Verbasco e sul *Rhynchites cribripennis* Desbr. dell' Olivo. Boll. Ent. agrar. et Pat. veg. VIII p. 6.
- (2). Attivita nocive del *Tychius quinquepunctatus* L. ibid. p. 132—135.
- Ribaut** (1). Remarques sur les *Geotrupes stercorarius* L. et *spiniger* Marsh. Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse XXXII 1899 p. ?
- Ritsema C. Cz.** (1). Two new species of the genus *Helota* from British Bhotan. Not. Leyd. Mus. 22. p. 27—32. (2 *Erotylid.* n. sp. u. dich. Tab. über 4 spp.)
- (2). Two new Malayan *Lucanidae*. ibid. p. 189—192. (1 *Aegus*, 1 *Cardanus* n. spp., Einzelb.)
- (3). *Pelargoderus Sjthoffi* n. sp. ibid. 23. p. 94.
- Ritzema-Bos J.** (1). *Rhynchites minutus* Herbst (*germanicus* aut.) chadelijk aan aardbeiplanten. Tijds. Plantenziek VI. 1900 p. 39.
- (2). De eikenaarvloo (*Haltica Erucae* Oliv. = *quercetorum* Foudr.). ibid. VII. 1901. p. 129—141.
- Röben** (1). Vierter Nachtrag zu dem Systematischen Verzeichniss der bis jetzt im Herzogthum Oldenburg gefundenen Käferarten. Abh. Nat. Ver. Bremen 17. p. 203—215.
- Roman A.** (1). *Hapalus binuculatus*. Ent. Tids. 1901 p. 166. (In Schweden als Parasit bei *Colletes cunicularia*).
- Rothenburg v.** (1). Ueber einige bemerkenswerthe Monstrositäten an *Lucaniden*. Ent. Zeit. XV. 1901. p. 30—32.
- (2). Ueber die Verbreitung einiger *Lucaniden*-Arten. ibid. p. 75.
- Rottenbach P.** (1*). Mittheilungen über das Vorkommen von *Cantharis fusca*. Ins. Börs. XVIII. p. 212—213. (Fehlt stellweis).
- Rupertsberger M.** (1). *Sisyphus Schaefferi* L., der Pillendreher. Allg. Zeitschr. Ent. VI. p. 69—70. — Referat von Eschereich Zool. Centr. VIII. p. 419—420 u. von Glasunow 1.
- Rybinski M.** (1). *Trechus fontinalis* n. sp. Spraw. Kom. Fizyogr. Krakau 35. p. 66.
- Sahlberg J.** (1). *Aleocharider* insamlade i Polarregionerna af Svenska Expeditionerna 1883 och 1899. Ent. Tids. 1901 p. 167—169. (3 *Atheta*, 1 *Gnypeta* aufgezählt).
- (2). *Anisotomider* och *Colonider* på tenhösten. Medd. Faun. Fl. fenn. 23. 1898. p. 28—33. (2 *Anisotoma* n. spp. Einzelb.; 1898 nur der Titel genannt).

*) Der Name heisst vielleicht ganz anders. Die Ins. Börs. scheint dem Prinzip zu huldigen, die Namen ihrer Mitarbeiter möglichst zu verheimlichen. Warum ist nicht jeder Artikel mit dem vollen Namen seines Autors gezeichnet?

- (3). Siehe Allg. Sahlberg 2. (*Attagenus pantherinus*).
 - (4). Siehe Allg. Sahlberg 1. (9 *Col.* genannt).
 - (5). (*Agabus maculatus* aberr. *aterrima*). *ibid.* 26. 1900. p. 71—72, 218.
 - (6). (*Hypera punctata*). *ibid.* p. 72, 218 (neu für Finnland).
 - (7). (Tvenne för vår fauna nya Coleoptera). *ibid.* p. 190—191, 219. (*Necrobia*, *Cryptophagus*).
 - (8). (Tre anmärkningsvärda Coleoptera). *ibid.* 27. 1901 p. 85, 177. (*Orchestes*, *Mordellistena*, *Phloeotrya*).
 - (9). (*Clytra affinis* statt *aurita* in Finnland). *ibid.* p. 86, 176—177.
 - (10). Coleoptera i Polartrakterna. *ibid.* p. 96—98, 177.
- Sainte-Claire-Deville J.** (1). Description d'un *Pselaphide* nouveau de France (*Col.*). Bull. Soc. ent. Fr. 1901 p. 271—272. (1 *Bythinus* n. sp. Einzelb.)
- (2). *Anthobium* nouveau de France. Rev. ent. XX p. 1.
 - (3). Siehe Peyerimhoff & Deville 1.
- Sajó K.** (1). Der Spargelkäfer. Prometh. XIII. p. 166—171, figg.
- Schaeffer Ch.** (1). Synopsis of the Species of *Trechus*, with the Description of a new Species. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 14. p. 209—212, tab. 28. — Referat von Tümpel 1. (Umfass. Arb. 1 n. sp., dich. Tab. über 6 sp.)
- (2). Note on a species of *Psilopyga*. Journ. N. York Entom. Soc. IX p. 86.
- Schaufuss C.** (1). Referat über Kolbe 1. Ins. Börse 18. p. 315—316.
- Schenkling S.** (1). Neue *Cleriden* des Königl. Museums zu Brüssel. Ann. Soc. ent. Belg. 45. p. 104—108. (2 *Callimerus*, 1 *Orthrius*, 1 *Thaneroclerus*, 1 *Phlogistus*).
- (2). Referat über Ménégaux 1, 2. Ins. Börse 18. p. 405.
 - (3). Referat über Giard 1900 (2). *ibid.* p. 140.
 - (4). Referat über Schloemp 1. *ibid.* p. 140.
 - (5). Neue *Cleriden* des Museums zu Leyden. Not. Leyd. Mus. 23. 1901 p. 123—130. (1 *Strotocera*, 1 *Callimerus*, 1 *Orthrius*, 1 *Tillicera*, 1 *Phaeocyclotomus*, 1 *Pelonium* n. spp., Einzelb.).
- Schilsky J.** (1). *Apion Horvathi* n. sp. aus russisch Armenien. Term. Füz. 24. p. 153—154. — Referat von Ssemenow 8a.
- (2). Küster. Die Käfer Europas, 38. 1901. — Referat von Ssemenow 7a u. von Schröder 1902 All. Z. Ent. VII. p. 156. (Umfass. Arb. über *Apion*).
 - (3). Synonymische und andere Bemerkungen zur Gattung *Apion*. Deut. ent. Z. 1901 p. 365—368.
 - (4). Referat über Entom. Jahrb. XI. *ibid.* p. 375—376.
- Schloemp V.** (1). (Ueber die Nahrung von *Hydrophilus piceus*). Nerthus 1901 n^o 2, p. ? — Referat von Schenkling 4.
- Schmiedeknecht O.** (1). Siehe Allg. Schmiedeknecht 1. (Zahlreiche *Coleopt.* aufgeführt).

Schneider siehe Sparre.

Schmitt (1). (Ueber *Upoluna*.) Ann. Carab. Mus. I. p. 284.

Schreiner J. Th. (1). (Beobachtungen an *Epicometis hirta*). Hor. ross. 35. p. XXIV—XXVI. (Russisch. Biologische Notizen).
 — (2). (Ueber die den Obstgärten schädlichen Rüsselkäfer). (Obstzucht) 1900 p. ? und Sep. 1901. 27 pp., 8 fig. — Referat von Adelung Zool. Centr. IX 1902. p. 570—572. (7 spp. *Rhynchites*, 1 *Anthonomus* behandelt).

Schröder Chr. (1). Referat über Meunier 1900 (1). Allg. Zeit. Ent. VI p. 9.

- (2). Referat über Needham 1900 (1). *ibid.* p. 11.
- (3). Referat über Berlese 1900 (2). *ibid.* p. 12.
- (4). Referat über W. Kolbe 1899 (2). *ibid.* p. 27.
- (5). Referat über Prowazek 1900 (1). *ibid.* p. 28.
- (6). Referat über Alisch 1900 (1). *ibid.* p. 28.
- (7). Referat über Ritzema-Bos 1900 (1). *ibid.* p. 29.
- (8). Referat über Knoche 1900 (1). *ibid.* p. 31.
- (9). Referat über Bordas 1899 (4). *ibid.* p. 45.
- (10). Referat über Fiori 1899 (6). *ibid.* p. 58.
- (11). Referat über Kleffner 1900 (1). *ibid.* p. 58.
- (12). Referat über Knotek 1900 (1). *ibid.* p. 59.
- (13). Referat über Fall 1900 (1). *ibid.* p. 59.
- (14). Referat über Oberbeck 1900 (1). *ibid.* p. 63.
- (15). Referat über Jacobson 1899 (2). *ibid.* p. 75.
- (16). Referat über Boas 1900 (1). *ibid.* p. 76.
- (17). Referat über Regimbart 1899 (1). *ibid.* p. 77.
- (18). Referat über Zehntner 1900 (1). *ibid.* p. 91.
- (19). Referat über Csiki 8. *ibid.* p. 95.
- (20). Referat über Seurat 1900 (1). *ibid.* p. 105.
- (21). Referat über Fiori 1899 (1). *ibid.* p. 107.
- (22). Referat über Planet 1899 (5) u. 1900 (1). *ibid.* p. 107.
- (23). Referat über Wickham 1899 (1). *ibid.* p. 108.
- (24). Referat über Heyne 1900 (1). *ibid.* p. 109.
- (25). Referat über W. E. Sharp 1899 (1). *ibid.* p. 111.
- (26). Referat über Webster 1900 (1). *ibid.* p. 124.
- (27). Referat über Röttgen 1899 (1). *ibid.* p. 127.
- (28). Referat über Nüsslin 1898 (10). *ibid.* p. 138.
- (29). Referat über Vogler 1. *ibid.* p. 156.
- (30). Referat über Reh 1. *ibid.* p. 156.
- (31). Referat über Carpentier 1899 (2). *ibid.* p. 157.
- (32). Referat über Buddeberg 1900 (1). *ibid.* p. 204.
- (33). Referat über Heyne 1. *ibid.* p. 230.
- (34). Referat über W. Kolbe 1900 (1). *ibid.* p. 262.
- (35). Referat über Hubenthal und Jänner 1900 (1). *ibid.* p. 265.
- (36). Referat über Ritzema-Bos 1900 (2). *ibid.* p. 269.
- (37). Referat über Schilsky 1900 (1). *ibid.* p. 303.
- (38). Referat über Seidlitz 1. *ibid.* p. 318.

- (39). Die Variabilität der *Adalia bipunctatata* L., gleichzeitig ein Beitrag zur Descendenz-Theorie. *ibid.* p. 355—360, 371—377, tab. 5. (Anfang der Arbeit, deren Haupttheil 1902 folgte).
- (40). Referat über Kolbe 1. *ibid.* p. 381.
- Schröder L.** (1). Entwicklungsgeschichtliche und anatomische Studien über das männliche Genitalorgan einiger *Scolytiden*. *Zool. Anz.* 24, p. 460—461. (Vorl. Mittheil.)
- Schütte H.** (1). *Phaedon cochleariae* F., der Meerrettig-Blattkäfer. Aus d. Heimath. 1900. p. 53—55.
- Schultze A.** (1). *Baris Gudemusi* nov. spec. *Verh. Zool. bot. Ges. Wien* p. 212—215. (1 n. sp. Einzelb.)
- (2). Berichtigungen, Ergänzungen und sonstige Bemerkungen zur Nomenclatur der paläarktischen *Ceuthorrhynchinen*. *Deut. ent. Z.* 1901 p. 57—60. — Referat von Ssemenow 7a. (*Coeliodes* u. *Ceutorrhynchus*).
- (3). Beitrag zur Kenntniss der paläarktischen *Mononychus*-Arten und ihrer Varietäten. *ibid.* p. 61—64 — Referat von Ssemenow 7a.
- (4). *Coeliodes proximus* Schze. u. *simulans* Faust. *ibid.* p. 64. (Unterscheidung).
- (5). Varietäten-Reihe paläarktischer *Ceuthorrhynchinen*. *ibid.* p. 93—96. — Referat von Ssemenow 7a. (12 n. varr., Einzelb.)
- (6). Neue paläarktische *Ceuthorrhynchinen*. *ibid.* p. 97—112. — Referat von Ssemenow 7a. (15 n. spp., Einzelbeschr.)
- (7). Ueber *Rhinoncus bosnicus* Schultze. *ibid.* p. 208 (bei Wien).
- Schulz H.** (1). *Carabus cancellatus* nov. var. *sudeticus*. *Soc. Ent.* 16, p. 122—123.
- Schulz W. A.** (1). Biologische, zoogeographische und synonymische Notizen aus der Käferfauna des unteren Amazonenstroms. *Berl. ent. Zeit.* 1901 p. 321—338. (123 Arten verschiedener Fam. aufgeführt mit geograph. u. biol. Notizen).
- Schwarz E. A.** (1). (Ueber Langlebigkeit eines Scolytiden. *Pr. ent. Soc. Wash.* IV p. 431. (*Cactopinus Hubbardii* 4 Jahre lebend erhalten.)
- (2). (Ueber *Carpophilus Yuccae* u. *C. lacertosus*). *Pr. ent. Soc. Wash.* IV p. 431—432. (Biol. Notizen).
- (3). (Ueber *Dinoderus substriatus* u. *Cryphalus Jalapae*). *ibid.* p. 432. (Biol. Notizen).
- Schwarz O.** (1). Ein neuer deutscher *Cardiophorus*. *Deut. ent. Z.* 1901 p. 16. (1 n. sp. Einzelb.)
- (2). Verzeichniss der von Hrn. Dr. Horn auf Ceylon gesammelten *Elateriden* nebst Beschreibung der neuen Arten. *ibid.* p. 17—38. (23 n. sp., Einzelb.)
- (3). Aenderung des Gattungsnamens *Pomachilioides* m. in *Paracosmesus* m. *ibid.* p. 38.

- (4). *Elateriden* von den Stephens-Inseln und den Chatuca-Inseln gesammelt von Hrn. Director Schauinsland. *ibid.* p. 193—196. (3 *Amychus* n. spp., Einzelb.)
 - (5). *Cremnostethus* und *Metriaulacus* nov. gen. *Elateridarum*. Ein Beitrag zur Kenntniss der *Elateriden*-Gattung *Melanotus* Eschs. *ibid.* p. 197—199.
 - (6). Ueber die *Elateriden*-Gattungen *Plastocerus* Le Conte und *Octinodes* Cand. *ibid.* p. 199—201. (1 *Plastocerus* n. sp., Einzelb.)
 - (7). Vier neue *Elateriden* aus Madagaskar. *ibid.* p. 253—256. (1 *Hypnoidus*, 3 *Cardiophorus* n. spp., Einzelb.)
 - (8). Neue *Elateriden*. *ibid.* p. 311—336. (38 n. spp., Einzelb.)
 - (9). Ueber *Anchastus tongaënsis* und *major* Cand. und Beschreibung zweier neuer *Psephus*-Arten von den Fidschi-Inseln. *ibid.* p. 351—352. (2 *Psephus* n. spp., Einzelb.)
- Scudder S. H.** (1). Contributions to Canadian Palaeontology. Vol. II, p. I. Canadian fossil Insects. 2. The Coleoptera hitherto found in Canada. Geol. Surv. Canad. 1895 p. 27—56. (1895 genannt, aber nicht im Speziellen referirt. 1 *Hylobiites*, 1 *Tenebrio*, 1 *Cryptocephalites*, 1 *Limonius*, 1 *Fornax*, 1 *Byrrhus*, 1 *Arpedium*, 1 *Geodromicus*, 1 *Platynus* n. spp. Einzelb. u. 2 dich. Tab.)
- (2). Canadian fossil Insects. 4. Additions to the Coleopterous fauna of the interglacial clays of the Toronto district. With an Appendix by A. D. Hopkins on the Solytid borings from the same deposits. *ibid.* II. 2. 1900 p. 67—92. tab. VI—XV (17 *Carab.*, 9 *Dytisc.*, 1 *Hydroph.*, 13 *Staph.*, 6 *Curc.* n. spp. Einzelb.)
 - (3). Siehe Allg. Scudder 2. (Col. p. 16—17, 1 *Byrrhid.*, 1 *Carabid.* n. spp.)
- Seidlitz G.** (1). *Dytiscidae* et *Gyrinidae* d'Europe. Misc. ent. 1901 p. 6—12, 161—179. (Uebersetzung der Bestimmungstab. ins Französische, Fortsetz. von 1900, 5.)
- (2). Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der Entomologie während des Jahres 1899. *Coleoptera*. Arch. Nat. 66. 1900. II. 1. p. 145—366.
- Severin** (1). Le genre *Myelophilus*. Bull. Soc. forest. Belg. 1901, p. 754—? — Referat von Eckstein 1902 p. 25. (*M. pini-perda* u. *minor*).
- (2). Siehe Severin & Brichet 1.
- Severin & Brichet** (1). Le *Dendroctonus micans* en Belgique. Brüssel 1901. — Referat von Eckstein 1902 p. 25.
- Sharp D.** (1). Siehe Allg. Sharp 1. (Col. p. 115—187 u. z. Th. auch p. 1—115.)
- (2). On a spanish *Bembidium* (Subg. *Testediolum*). Ent. Mont. Mag. 37. p. 37—39.
 - (3). The types of Heer's Fauna Coleopterorum Helvetica. *ibid.*

- p. 143—144. (Wichtige Aufschlüsse über den Verbleib der Typen).
- (4). *Attelabus curculionoides* L. attacking chestnut. *ibid.* p. 280—281..
- (5). Siehe Therese 1.
- Sharp W. E.** (1). Notes on some *Coleoptera* of the London District. *Ent. Rec.* XIII 1901 p. 104—106.
- (2). Notes on the Distribution of the British *Coleoptera*. *ibid.* p. 147—149, 175—178, 201—205, 270—271, 293—296.
- Shelford R.** (1). Siehe Allg. Shelford 1. (*Biol. v. Mormolyce, Lyciden-Larven*).
- Silvestri F.** (1). Siehe Allg. Silvestri (1). (5 n. gen., 6 n. spp. *Staphylinid.*)
- Slingerland M. V.** (1). Siehe Allg. Slingerland 1. — Referat von Reh 1902 Allg. Z. Ent. VII p. 58—59. (*Harpalus caliginosus* Fbr. u. *pennsylvanicus* Deg. als Schädlinge der Erdbeeren).
- Sloane Th. G.** (1). Studies in Australian Entomology. XI. Description on a new Ground-Beetle from Victoria. *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales* 26 p. 672—673. (1 *Morphnos* n. sp. Einzelb.)
- Sopp E. J. B.** (1). Some British diving beetles. *Sc. Goss.* VII p. 289—293, 321—325.
- (2). Siehe Allg. Sopp 1. (Ueber die Stridulationsorgane der *Dytisciden* und den Dimorphismus der *Dytiscus* ♀♀).
- (3). Siehe Tomlin & Sopp.
- Spaeth F.** (1). Neue Cassiden aus Sumatra. *Stett. ent. Zeit.* 62. 1901 p. 3—13. (1 *Prioptera*, 2 *Thlaspidosoma*, 1 *Thlaspidula*, 1 *Cassida*, 1 *Cassidula* n. sp. Einzelb.)
- (2). Beschreibung neuer *Cassididen* nebst synonymischen Bemerkungen. IV. *Verh. Zool. bot. Ges. Wien* 1901 p. 333—350. (15 n. sp. Einzelbeschr.)
- (3). Ueber *Chelysida* und *Oxylepus* als zwei verschiedene *Cassiden*-Gattungen. *ibid.* p. 750—756.
- Sparre-Schneider J.** (1). Siehe Allg. Sparre 1.
- Speiser P.** (1). Referat über Tower 1900 (3). *Allg. Zeit. Ent.* VI p. 172.
- (2). Referat über Bordas 1899 (5). *ibid.* p. 191.
- Sprenger C.** (1). *Anomala vitis*, ein schädlicher Käfer am Weinstock. *Ins. Börse* 18 p. 300, u. *Gartenflora* 50 p. ?
- Ssemenow A.** (1*). *Diagnoses praecursoriae specierum novarum*

*) Da der Name des geehrten russischen Entomologen in Deutschland meist falsch ausgesprochen wird, weil das Hochdeutsch das harte „S“ am Anfang eines Wortes nicht kennt (die holsteinisch-hannoveranische Aussprache von Stock u. Stein ist skandinavischen Ursprungs), so soll derselbe durch obige Schreibart richtig verdeutscht werden. Französisch u. lateinisch dagegen kann er auch „Semenow“ geschrieben werden, denn dort giebt es ein hartes S am Anfang der Worte.

- generis *Apatophysis* Chevr. (*Cerambyc.*) Rev. Russ. I p. 28—32. — Referat von Adelung Zool. Centr. 1902 p. 749.
- (2). (Ueber einige, für die russische Fauna neue Coleopteren). *ibid.* p. 36—38. — Referat von Adelung Zool. Centr. 1902 p. 206. (1 *Calosoma*, 1 *Dicranoncus*, 1 *Peronomerus*, 1 *Bolbocearas*, 1 *Apalimna*, 1 *Lamiomimus*).
- (2a). Referate in Bezug auf die Fauna Russlands aus: Champenois 1900 (2), Fauvel 3, Jacobson 2, Jakowlew 1, Jakowleff 7, Koenig 1, Reitter 1900 (2), Tschitscherin 8, 13, Weise 1900 (10), Xambeu 1. *ibid.* p. 59—64.
- (3). (Zur Küstenfauna der Krimm). I. *Phaleria pontica* n. sp. *ibid.* p. 90—97. — Referat von Adelung Zool. Centr. 1902 p. 206. (Umfass. Arbeit).
- (4). (Notiz über die Auffindung von *Lucanus ibericus* Mot. in Transcaspien). *ibid.* p. 105—106. (Russisch. 3 spp. u. ihre Synonymie).
- (4a). Referate in Bezug auf die Fauna Russlands aus folgenden Werken: Belon 2, Bernhauer 1, G. Jacobson 3, Masaraky 1, Pic 1, Reitter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ssumakow 1, 2, Tschitscherin 15, Xambeu 1. *ibid.* p. 112—121.
- (5). (Notizen über *Coleopteren* des europäischen Russlands und des Caucasus. Neue Serie I—X.) *ibid.* p. 137—145. — Referat von Adelung Zool. Centr. 1902 p. 206. (Russisch. Fortsetz. von 1899 (1). *Carabus*, *Acinopus*, *Ditomus*, *Zuphium*, *Brychius*, *Haliphus*).
- (6). (Der erste Vertreter der Gatt. *Hymenorus* Muls. in Russland und die zoogeographische Bedeutung dieses Zuwachses der russischen Fauna). *ibid.* p. 167—172. — Referat von Adelung Zool. Centr. 1902 p. 205. (Russisch. 1 n. sp. Einzelbeschr. lateinisch).
- (7). (Notiz über *Moechotypa fuliginosa* Kolbe = *Tylophorus Wulfiusi* Bless. *Cerambyc.*) Russisch. *ibid.* p. 183—184.
- (7a). Referate in Bezug auf die Fauna Russlands über: Csiki 1, 8, Buysson 1, Gestro 1900 (6), Ivanov 1, Jacobson 1, Obst 1, Reitter 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 30, 31, 32, Schilsky 2, Schultze 2, 3, 5, 6, Weise 6, Xambeu 1. *ibid.* p. 188—190, 195—210.
- (8). (Ueber die geographische Verbreitung der Vertreter der Gattung *Lethrus* im europäischen Russland.) *ibid.* p. 251—255. (Russisch).
- (8a). Referate in Bezug auf die Fauna Russlands über: Bernhauer 2, Brenskel, Buysson 2, Eichelbaum 1, Ganglbauer 1, Jakowleff 8, Lesne 1900 (3), Luze 1, 2, J. Müller 1, Pic 13, Planet 1, Reitter 1900 (22), Schilsky 1, Xambeu 3. *ibid.* p. 262—270.
- (9). (Zum Andenken E. Ballions). *ibid.* p. 297—299. (Russisch. 11 *coleopterol.* Schriften aufgeführt).

- (10). Coleoptera nova Rossiae europaeae Caucasicque. VIII. Hor. ross. 35. p. 253—265. — Referat von Tschitscherin 7a. — (1 *Dromius*, 1 *Lithophilus*, 1 *Leucohimatium* mit dichot. Tab., 2 *Pedilus* mit dichot. Tab. n. spp.)
- Ssumakow G. G.** (1). Species nova generis *Donacia* Fbr. Sitzbr. Naturf. Ges. Dorpat. XII p. 454—459. — Referat u. Kritik von Ssemenow 4a.
- (2). (Eine neue Art der Gattung *Malegia* Lef.). Rev. Russ. d'Ent. I p. 179—180. — Referat von Adelung Zool. Centr. 1902 p. 207. (Russisch, 1 n. sp. Beschr. u. tab. über 3 sp. lateinisch).
- Stange G.** (1). Verzeichniss der Coleopteren des Stadtmuseums in Kasan). Protok. Naturf. Ges. Univ. Kasan. 33. Beil. n^o 193, 15 pp.
- Stierlin G.** (1). *Curculionides* récoltés en 1899 par M. Jaquet et déterminés par St. . . Bulet. Soc. Sc. Bucarest. IX p. 758—762. (2 n. sp.)
- (2). Beschreibung einiger neuer Rüsselkäfer. Mitth. Schw. ent. Ges. X. 8. 1901. p. 364—366. (4 *Otiorrh.*, 1 *Pachytychius* n. spp.)
- Strand E.** (1). For Norges Fauna nye *Staphylinider* og *Apioner*. Ent. Tids. 1901 p. 143. (9 *Staphylinid.*, 3 *Apion* neu für Norwegen).
- (2). Norske findesteder for Coleoptera. Nyt Mag. Nat. 39. 4. p. 327—336. (153 *Staphylinid.*, 23 *Apionen* aufgezählt).
- Swinton A. H.** (1). Coleoptera found around Jerusalem. Ent. Mont. Mag. 37. p. 156—160. (Zahlreiche Arten aller Familien aufgezählt).
- Tarnani J. K.** (1). Die Larve des Maikäfers und einige ihrer Parasiten. St. Petersburg. 1901. 32 pp., figg. (Russisch).
- (2). Siehe Allg. Tarnani 2.
- Terre L.** (1). Referat über Karavaiev 1899 (1). L'Ann. biol. V p. 159.
- Thaxter R.** (1). Siehe Allg. Thaxter 1. (Auch über Pilze auf *Coleopt.*)
- Theobald F. V.** (1). The Colorado Beetle. Journ. Board. Agric. VIII p. 147—154, tab.
- Therese Prinzessin von Bayern** (1). Auf einer Reise in Südamerika gesammelte Insekten. IV. *Coleopteren*. Berl. ent. Zeit. 1901 p. 463—486, tab. VII. (1 *Cic.*, 2 *Carab.*, 2 *Dytisc.*, 1 *Hydrophil.*, 1 *Staph.*, 10 *Scarab.*, 1 *Bupr.*, 4 *Elat.*, 9 *Malac.*, 3 *Tenebr.*, 1 *Cistel.*, 1 *Meloid.*, 1 *Curcul.*, 3 *Brenth.*, 5 *Ceram.*, 17 *Chrys.*, 2 *Erot.*, 4 *Cocc.* aufgezählt, — 1 *Dyt.*, 1 *Mal.*, 1 *Ten.*, 1 *Ceram.*, 4 *Chrys.* n. spp., Einzelb. von Sharp, Kolbe, Jacoby).
- Théry A.** (1). Description d'un genre nouveau de *Buprestides*

- (*Col.*) du Congo français. Bull. Soc. ent. Fr. 1901 p. 107—108. (1 *Rethia* n. sp. Einzelb.)
- (2). Description de deux *Buprestides* exotiques (*Col.*). *ibid.* p. 108—110. (1 *Psiloptera*, 1 *Steraspis* n. spp. Einzelbeschr.)
- (3). Description d'un *Carcinops* nouveau (*Col.*). *ibid.* p. 237—238. (1 n. sp. Einzelbeschr.)
- Thornley A.** (1). *Lathridius Bergrothii* Reitt. and other beetles in a herbarium. Ent. Mont. Mag. 37. p. 18.
- Timm R.** (1). Lebensgeschichte der *Lomechusa*, eines Ameisenkäfers. Verh. naturw. Ver. Hamb. N. F. VIII 1900 p. XXXVIII—XXXIX.
- Tomlin B.** (1). The complet Account of the *Coleoptera* from Glover's History of Derbyshire 1829. Ent. Rec. XIII p. 104. (Referat).
- (2) siehe Tomlin & Sopp 1.
- Tomlin B. & Sopp E. J. B.** (1). *Coleoptera* on Snowdon. Ent. Rec. 13 p. 342—345.
- Tornier G.** (1). Neues über das natürliche Entstehen und experimentelle Erzeugen überzähliger und Zwillingsbildungen. Cap. 4. Herstellung von gegabelten, ringförmigen, verschmälernten und Zwergflügeldecken beim Mehlkäfer (*Tenebrio molitor*). Zool. Anz. 24, p. 490—491.
- (2). Bein- und Fühlerregeneration bei Käfern und ihre Begleiterscheinungen. *ibid.* p. 634—638, 649—664.
- Traquair R. H.** (1). The Lennon Collection of British *Coleoptera*. Ann. Scott. Nat. Hist. 1901 p. 52.
- Treichel A.** (1). Beobachtungen aus der Ordnung der *Coleopteren*. Schrift. Nat. Ges. Danz. X Heft 2 u. 3 p. 158—162. — Referat von Speiser 1902 Allg. Z. Ent. VII p. 29—30.
- Tryon H.** (1). The sweet potato weevil. Queensl. Agr. J. 1900. p. 176—189 tab. XV, XVI.
- Tschitscherin T.** (1). Description d'un nouveau sous-genre et d'une nouvelle espèce du genre *Platysma* Bon. Tsch. Rev. russe I p. 10—12. (1 n. sp. Einzelb.)
- (2). *Platysmatini* nouveaux ou peu connus. — Referat von Adelung Zool. Centr. 1902 p. 749. *ibid.* p. 39—47. (5 *Abacetus*, 1 *Haplobothynus*, 2 *Feronia* n. sp. Einzelb.)
- (3). Note supplémentaire sur le genre *Tropidocerus* Chaud. *ibid.* p. 57. (1 n. sp. Einzelb.)
- (4). Note sur deux espèces du genre *Abacetus* Dej. découvertes en Perse par M. N. Zarudny. — Referat von Adelung loc. cit. p. 749. *ibid.* p. 88—89. (1 n. sp. Einzelb.)
- (5). *Platysmatini* nouveaux ou peu connus de l'Asie orientale. — Referat von Adelung loc. cit. p. 749. *ibid.* p. 239—250. (6 n. spp. Einzelb.)
- (6). Ueber *Pterostichus lombardus* (Dan.). *ibid.* p. 256—258. (Kritik u. Einzelb.)

- (7). Referat über Ssemenow 10. *ibid.* p. 270.
 - (8). Neue *Platysmatini* aus Central-Asien. *Wien. ent. Zeit.* XX p. 25—27. — Referat von Ssemenow 2a. (1 *Argutor*, 1 *Pseudoderus* n. spp.)
 - (9). *Cerrigendum.* *ibid.* p. 136.
 - (10). Description de quelques nouvelles espèces de la tribu des *Platysmatini*. *Hor. ross.* 35. p. 1—15. (1 *Drimost.*, 1 *Lobobr.*, 1 *Marsyas*, 1 *Apsaust.*, 1 *Liopasa*, 1 *Paranurus*, 1 *Homalos.*, 1 *Feron.* n. spp., Einzelb.)
 - (11). Quelques observations sur les *Eudromus* de Madagascar et sur les *Homalosoma* d'Australie. *ibid.* p. 38—44.
 - (12). Note sur quelques *Platysmatini* nouveaux ou peu connus. *ibid.* p. 49—72. (1 *Drimost.*, 1 *Stomonax*, 2 *Abacetus*, 1 *Adrimus*, 4 *Loxandr.*, 1 *Haploboth.*, 1 *Eumara* n. sp.)
 - (13). Einige Bemerkungen zu Reitter's Bestimmungstabelle der *Harpalini*. *ibid.* p. 125—155. — Referat von Ssemenow 2a. (Dich. Tab. über die (5) Subtribus u. über einige *Ophonus*, 1 *Ophon.* n. sp., zahlreiche Synonyme).
 - (14). Observations sur quelques types de C. H. Boheman, conservés au Musée de Stockholm. *ibid.* p. 160—167. (1 *Abacetus* n. sp.)
 - (15). Genera des *Harpalini* des régions paléarctique et paléantarctique. *ibid.* p. 217—251. — Referat von Reitter 22 und von Ssemenow 4a. (Umfass. Arbeit).
 - (16). *Platysmatini* nouveaux ou peu connus de l'Asie orientale. *ibid.* p. 494—501. (4 *Feronia* n. spp. Einzelb.)
 - (17). Notes sur les *Platysmatini* de l'Australie. I. p. 502—534. (Umfass. Arbeit).
 - (18). Bemerkungen über *Harpalini*. *ibid.* p. 584—597. (3 *Harpalus* n. spp. Einzelb.)
- Tümpel R.** (1). Referat über Schäffer 1. *Allg. Zeit. Ent.* VI. p. 349.
- Tutt J. W.** (1). Abundance of *Hydrophilus piceus* at electric light. *Ent. Rec.* XIII p. 273.
- (2). *Lina populii* in the Pellice Valley. *ibid.* p. 273.
 - (3). Migration and Dispersal of Insects. Coleoptera. *ibid.* p. 281—284, 317—320, 453—358.
 - (4). Note on the Habits of *Luciola lusitanica* Charp. *ibid.* p. 363.
- Uhagon S. de** (1). Nota sobre *Malaquidos* de España. *Bol. Soc. esp.* I p. 359—360. (1 *Attalus* n. nom.)
- (2). Siehe Uhagon 1900 (1). (Umf. Arb., der Schluss erschien erst 1901, wurde aber schon 1900 referirt).
- Van Dyke E. J.** (1). Observations upon the Faunal Region of California from the standpoint of a Coleopterist. *Journ. N. York ent. Soc.* IX p. 197—199.
- Vaney C.** (1). Referat über Tornier 1900, 1. *L'Ann. biol.* V. p. 171.

- Vauloger M. de** (1). Description d'un *Phaenotherion* nouveau du Nord de l'Afrique. Bull. Soc. ent. Fr. 1901 p. 233. (1 n. sp. Einzelbeschr.)
- Vayssière A.** (1). Étude sur les Insectes qui s'attaquent aux bâtons de suc de réglisse. Ann. Fac. Mars. XI p. 77—92 tab. I. (*Anobium* als Schädling des Zuckers).
- Vignon P.** (1). Siehe Allg. Vignon 1. (Von *Col.* die Larve von *Tenebrio* auf Epithelium untersucht. Sharp p. 82).
- Villard L.** (1). Description d'un *Cerambycide* nouveau, d'Afrique (*Col.*). Bull. Soc. ent. Fr. 1901 p. 144—146, 263. (1 *Olenecamptus* n. sp. Einzelb.)
- Viré A. & Alzona C.** (1). Note sur l'*Anophthalmus Fabiani* Gestro. Bull. Mus. Hist. Nat. Par. VII 1901. p. 344—346.
- Viturat** (1). Chasse au *Vesperus strepens* F. L'Echang. 17. p. 6.
 — (2). Allevard et l'entomologie. *ibid.* p. 84. (Sammelbericht).
 — (3). Nouvelles variétés de Coléoptères français. *ibid.* p. 75. (*Pterostichus* 2 n. varr. Einzelb.)
- Vodoz P.** (1). Excursions entomologiques en Corse. Misc. ent. IX 1901 p. 49—52. (Forts. von Vodoz 1900 ob vielleicht Allg.?)
 — (2). Observations sur la faune des Coléoptères de la Corse. Cmt. rend. Assoc. franç. Av. Sc. Congr. Ajaccio. 1901 p. 626—643. — Referat von Speiser A. Z. Ent. VII p. 437—438.
- Vogler C. H.** (1). Entwicklung von *Rhopalodontus glabratus* Bris. aus *Polyporus*. Schaffhaus. 1901 ? pp. — Referat von Schröder 29.
- Voigts H.** (1). Zur Kenntniss der exotischen Arten der *Meloiden*-Gattung *Zonabris* Har. Wien. ent. Zeit. XX p. 215—218.
- Waldwirthschaft** (Ueber den Zustand der . . . in Bulgarien). Bericht des Ministers etc. Sofia 1901. 121 pp. 25 tab. — Referat von Eckstein (1) p. 20. (Schaden durch *Tomicus*).
- Walker J. J.** (1). Siehe Allg. Walker 1.
- Ward J.** (1). The Sacred Beetle. Popular treatise on Egyptian Scarabs in Art and History. Translated by F. L. Griffith. Lond. 1901.
- Warnier A.** (1). Catalogue des Coléoptères de la Faune gallo-rhénane. Reims 1901. 191 pp.
- Wasmann E.** (1). On some Genera of *Staphylinidae*, described by Thos. L. Casey. Canad. Entom. 33. p. 249—252. (Synonymische Bemerkungen).
 — (2). Zwei neue *Liometopum*-Gäste aus Colorado. 116. Beitrag zur Kenntniss der Myrmecophilen und Termitophilen. Wien. ent. Zeit. XX p. 145—147. (2 *Staphyl.* n. spp.)
 — (3). Siehe Allg. Wasmann 5. — Referat von Mayer 1902 p. 67. (Hauptsächl. Abstammung der *Dinarda*-Arten, auch andere *Col.*)
 — (4). Siehe Brauns 1.

- Waterhouse Ch. O.** (1). Two new Genera of Coleoptera belonging to the *Cupesidae* and *Prionidae*. Ann. Mag. Nat. Hist. 1901 VIII. p. 520—523. (2 n. sp. Einzelb.)
- (2). Report on a collection made by Messrs F. V. Mc Connel and J. J. Quelch at Mount Roraima in British Guiana. Tr. Linn. Soc. Lond. VIII. 1900 p. 74—76.
- Webb J. L.** (1). Notes on *Cychrus*, with the Description of a new Species. Ent. News XII. p. 133—136. (1 n. sp. Einzelbeschr.).
- Webster F. M.** (1). Notes on two Longicorn Beetles affecting Growing Nursery Stock. Ann. Rep. Ent. Soc. Ontar. 1900. p. 81—84. (*Saperda vestita*, *Oberca bimaculata*).
- (2). Observations on several Species of *Dermestidae*. *ibid.* p. 85—86.
- (3). Some experiments in the Exportation of beneficial Insects. Canad. Ent. 33. 1901 p. 58—60. (*Coccinellid.* nach Afrika versandt).
- (3a). Insectary Rearings of two Species of *Mordellistena*. *ibid.* p. 176. (Biol. Notiz. über die Larven).
- (4). An experiment in the Importation of beneficial Insects. *ibid.* p. 183—184.
- (5). The Southern Corn-Leaf Beetle a new Insect Pest of growing Corn. Journ. N. York Ent. Soc. IX p. 127—132, tab. VII—IX. (*Myochrous denticollis*).
- (6). The Clover-root borer (*Hylastes obscurus*). Ohio Agric. Exper. Stat. 1900 Bull. 119. p. 143—149. — Referat Exper. Stat. Rec. XII p. 576, und von Reh 1902 All. Z. Ent. VII p. 312.
- (7). The grape-cane gallmaker and its enemis. (*Ampelogypter sesorostris*). *ibid.* Bull. 116. p. 195—198. — Referat von Reh 1900 Allg. Z. Ent. VII p. 285. (Curculionide als Schädlinge der Rüben u. seine Parasiten).
- Weise J.** (1). Ostafrikanische *Crioceriden*. Arch. f. Nat. 67. 1901. I p. 145—163. (16 n. sp.)
- (2). Ein Beitrag zur Kenntniss von *Paropsis* Oliv. *ibid.* p. 164—174.
- (3). Contribution à l'étude de la Faune entomologique de Sumatra. (chasses de Weiers). XV. *Coccinellides*. Ann. Soc. ent. Belg. 45. 1901 p. 91—96. (7 n. sp. Einzelb.)
- (4). Neue Coccinelliden. *ibid.* p. 273—286. (18 n. sp. Einzelb.)
- (5). Cassididen aus Ceylon, gesammelt von Dr. Horn, Deut. ent. Zeit. 1901 p. 49—56. (1 *Oocassida*, 3 *Cassida* n. spp., Einzelb.)
- (6). Biologische und Sammel-Notizen aus dem Jahre 1900. *ibid.* p. 85—92.
- (7). *Sagra rugulipennis* n. sp. *ibid.* p. 202.
- (8). Nachtrag zum Verzeichnisse kleinasiatischer Coleopteren

- von Hrn. E. v. Bodemeyer Freiburg i. Br. 1900 *ibid.* p. 203—204. (1 *Labidostomis*, 1 *Pseudocolaspis* n. sp. Einzelb.)
- (9). Afrikanische Hispinen. p. 225—240. (16 n. spp., Einzelb.)
- (10). *Chrysochloa alpestris* var. *vinariensis*. *ibid.* p. 240. (1 *Oreina* n. var.)
- (11). Synonymische Bemerkung. *ibid.* p. 256. (*Chrysomela*).
- (12). Beitrag zur Kenntniss der afrikanischen *Galerucinen*. *ibid.* p. 273—300. (Umfass. Arbeit).
- (13). Einige neue afrikanische *Chrysomeliden*. *ibid.* p. 301—310. (13 n. spp., Einzelb.)
- (14). Synonymische Bemerkungen. *ibid.* p. 350. (*Timarcha*).
- (15). *Coptocyclus aruensis* n. sp. *ibid.* p. 364. (1 n. sp. Einzelb.)
- (16). Referat u. günstige Kritik über Koltze 1. *ibid.* p. 373.
- Wenzel H. W.** (1). The *Coleoptera* found in a barn. *Ent. News* XII p. 75—76. (30 spp., in 1 alten Scheune gesammelt).
- Wickham A. F.** (1). Two new blind Beetles of the genus *Adranes* from the Pacific Coast. *Can. Ent.* 33. p. 25—28, fig. (Dich. Tab. über 4 spp., 2 n. spp.)
- (2). Some Insects of the Hudsonian zone in New Mexico. II. *Coleoptera*. *Psyche* IX p. 150—151. (19 sp. aufgezählt).
- Wieren R.** (1). Siehe Allg. Wieren 1. (Necrolog A. Becker's).
- Wize** siehe Danysz & Wize.
- Wood Th.** (1). *Coleoptera* in North Wales. *Ent. Mont. Mag.* 37. p. 225.
- Xambeu V.** (1). Moeurs et Métamorphoses des Insectes. 9. *Mém. Rev. d'Ent.* XX p. 7—68. — Referat von Ssemenow 2a, 4a, 7a. (Eier, Larven und Puppen von zahlreichen, wild durcheinander gemengten Arten).
- (2). Moeurs et Métamorphoses des Insectes. Longicornes. *L'Ech.* 17, p. 157—204. (Fortsetzung).
- (3). Moeurs et Métamorphoses de l'*Anobium paniceum* L. *Le Nat.* 23. 1901 p. 127—128. — Referat von Ssemenow 8.
- (3a). (Ueber *Nanophyes*-Larven). *ibid.* p. 224.
- (4). Moeurs et Métamorphoses de l'*Onthophagus Amyntas* Olivier. *ibid.* p. 276.
- Zang R.** (1). Beiträge zur Biologie von *Carabus nemoralis* Müll. *Allg. Zeit. Ent.* VI p. 273—276, Fig. 1—5. — Referat von Glasunow 2. (Die Larve, Einzelbeschr.).
- Zehntner L.** (1). Proefstation voor Cacao te Salatiga. *Bull.* 1., 10 pp. (Larve von *Cutoxantha*, Bupr.)
- Zirngiebl** (1). Die Borkenkäfer unserer Obstbäume. *Prakt. Blätt. Pflanzensch.* 1901 p. 57—? — Referat von Eckstein 1902 p. 25. (*Scolytus Pruni*, *Sc. rugulosus*, *Tomicus dispar*).
- Zürn E. S.** (1). Maikäfer und Engerlinge. Ihre Lebens- u. Schädigungsweise, sowie ihre erfolgreiche Vertilgung. *Leipzig.* 1901. — Referat von Eckstein 1902 p. 25.

B. Uebersicht nach Zeitschriften.**I. Europa.**

a. Deutschland, Oestreich, Balkanländer, Schweiz.

Selbstständig erschienene Werke: Barbey 1., 2., Duda 1., Heyne 1., Hubenthal 1., Jänner 1., Kolbe 4., Koltze 1., Mallasz 1., Vogler 1., Waldwirthschaft, Zürn 1.

Entomologische Zeitschriften.

Zeitschrift für Entomologie. Herausg. v. Verein für schlesische Insektenkunde zu Breslau (II) 26. 1901: Gerhardt (1) p. 1—5, (2) p. 6—14, (3) p. 15—17, (4) p. 18—21. — Jander (1) p. 28. — Kletke (1) p. V—VI.

Entomologische Zeitung herausg. v. entom. Verein in Stettin. 62. 1901: Bernhauer (4) p. 366—373. — Gorham (2) p. 169—214. — Ohaus (2) p. 349—366. — Spaeth (1) p. 3—13.

Deutsche entomologische Zeitschrift 1901: Bernhauer (5) p. 161—176, (6) p. 241—251, (7) p. 252. — Bickhardt (1) p. 362. — Felsche (2) p. 135—153, (3) p. 154—155, (4) p. 359—361, (5) p. 361. — Gerhardt (5) p. 156, (6) p. 157—158, (7) p. 205—208. — Heller (2) p. 337—350. — Horn (2) p. 13—15, (3) p. 123—124, (4) p. 124, (5) p. 353—358, (6) Beil. p. 33—64. — Jordan (2) p. 369—373. — Kraatz (2) p. 375. — Lohde Beil. p. 1—36. — Ohaus (3) p. 125—134, (4) p. 251, (5) p. 257—271, (6) p. 272. — Pic (50) p. 363. — Reitter (30) p. 39—48, (31) p. 48, (32) p. 65—84, (33) p. 177—186, (34) p. 187—188, (35) p. 189—192, (36) p. 192, (37) p. 209—224. — Schilsky (3) p. 365—368, (4) p. 375—376. — Schultze (2) p. 57—60, (3) p. 61—64, (4) p. 64, (5) p. 93—96, (6) p. 97—112, (7) p. 208. — Schwarz (1) p. 16, (2) p. 17—38, (3) p. 38, (4) p. 193—196, (5) p. 197—199, (6) p. 199—201, (7) p. 253—256, (8) p. 311—336. — Weise (5) p. 49—56, (6) p. 85—92, (7) p. 202, (8) p. 203—204, (9) p. 225—240, (10) p. 240, (11) p. 256, (12) p. 273—300, (13) p. 301—310, (14) p. 350, (15) p. 364, (16) p. 374.

Berliner entomologische Zeitschrift 1891: Brenske (1) p. 187—234, 431—462. — Eichelbaum (1) p. 9—14. — Günther (1) Sitzb. 23. — Hensel (1) p. 184. — Kolbe (5) p. 539—554. — Moser (1) p. 379—382, (2) p. 525—538. — Schulz (1) p. 321—338. — Therese von Bayern (1) p. 463—485.

Wiener entomologische Zeitung XX 1901: Fleischer (1) p. 144, Hetschko (1) p. 156, Jacobson (1) p. 125—127, König (1) p. 9—10, Lokay (1) p. 31, Müller (1) p. 137—141, Penecke (1) p. 11—21, M. & Th. Pic (1) p. 169—174, Reitter (1) p. 22—24, (2) p. 48, (3) p. 53—54, (4) p. 57—59, (5) p. 60,

(6) p. 61—63, (7) p. 73—76, (8) p. 77—80, (9) p. 86—88, (10) p. 88, (11) p. 99—101, (12) p. 102, (13) p. 103—108, (14) p. 109—113, (15) p. 114—116, (16) p. 121—123, (17) p. 123—124, (18) p. 128, (19) p. 129—130, (20) p. 141—142, (21) p. 143, (22) p. 156, (23) p. 157—164, (24) p. 182, (25) p. 193—197, (26) p. 200—202, (27) p. 203—214, (28) p. 226—229, (29) p. 229—230. — Tschitscherin (8) p. 25—27, (9) p. 136, Voigts (1) p. 215—218, Wasmann (2) p. 145—147.

Mittheilungen des Mühlhausener Entomologischen Vereins. 17, 1901: Förster (1) p. 8—9.

Mittheilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft. X, 8. 1901: Stierlin (2) p. 364—366.

Allgemeine Zeitschrift für Entomologie VI. 1901: Aigner-Abafi (1) p. 188, (2) p. 190. — Bogdanow (1) p. 35—41. — Friedrichs (1) p. 81—83. — Goethe (1) p. 347—348. — Gorka (2) p. 339—341. — Kolbe (2) p. 321—323, 341—343. — Paganetti-Hummeler (2) p. 147—151. — Reh (1) p. 156. — Rupertsberger (1) p. 69—70. — Schröder (1) p. 9, (2) p. 11, (3) p. 12, (4) p. 27, (5) p. 28, (6) p. 28, (7) p. 29, (8) p. 31, (9) p. 45, (10) p. 58, (12) p. 59, (13) p. 59, (14) p. 63, (15) p. 75, (16) p. 76, (17) p. 77, (18) p. 91, (19) p. 95, (20) p. 105, (21) p. 107, (22) p. 107, (23) p. 108, (24) p. 109, (25) p. 111, (26) p. 124, (27) p. 127, (28) p. 138, (29) p. 156, (30) p. 156, (31) p. 157, (32) p. 204, (33) p. 230, (34) p. 262, (35) p. 268, (36) p. 269, (37) p. 303, (38) p. 318, (39) p. 355—360, 371—377, (40) 381. — Speiser (1) p. 172, (2) p. 191. — Tümpel (1) p. 349. — Zang (1) p. 273—276.

Societas entomologica 15. 16. 1901: Apfelbeck (3) 16. p. 121—122. — Born (1) 15. p. 181—182, 188—190, 16. p. 3—5, 13, 19—21, 28—29, (2) 16. p. 137—138. — Heyden (1) p. 191. — Manger (1) p. 73—74. — Schultz (1) p. 122—123.

Entomologische Zeitschrift (Guben) XV 1901: Müller (2) p. 33. — Rothenburg (1) p. 30—32, (2) p. 75.

Entomologische Litteraturblätter. Repertorium der neuesten Arbeiten auf dem Gesamtgebiet der Entomologie. Berlin. I 1901: Friedländer (1) p. 9, 32, 49, 65, 80, 97, 113, 134, 144, 160, 181, 203, (2) p. 116—117.

Die Insektenbörse 18. 1901: Born (3) p. 91. — Eggert (1) p. 146, 155, 163, 171, 179, 195, 203, 211, 219, 227, 235, 251, 255, 275, 283, 299, 307, 323, 331, 339, 346, 353, 387, 395, 403, 411. — Engmann (1) p. 284—285. — Felsche (1) p. 314. — Friedrichs (2) p. 59. — Grunack (1) p. 260—261. — Jacoby (1) p. 116. — Kubik (1) p. 291. — Meyer-Darcis (1) p. 355. — Möllenkamp (1) p. 363—364. — Rottenbach (1) p. 212—213. — Schenkling (2) p. 405, (3) p. 140, (4) p. 140. — Schaufuss (1) p. 315—316. — Sprenger (1) p. 300.

Entomologisches Jahrbuch XI 1901: Alisch (1) p. 206—210. — Heine (1) p. 211—213. — Lederer (1) p. 214—215.

Rovartani Lapok VIII 1901: Csiki (2) 2. p. 31—36, (3) 3. p. 53—60, 68, (4) p. 99—103, (5) p. 138—141, (6) p. 160—165. — Fényes (1) 1. p. 4—7. — Merkl (1) p. 11—16, (2) p. 19—20.

Zoologische Zeitschriften.

Zoologischer Anzeiger 24. 1901: Brandes (1) p. 464—471. — Enderlein (1) p. 121—124. — Holmgren (1) p. 254—255. — Knoche (1) p. 160—162. — (2) p. 593—598. — L. Schröder (1) p. 460—461. — Tornier (1) p. 490—491, (2) p. 634—638, 649—664.

Id. Bibliographia zoologica: Carus 1 p. 66, 150, 276, 386, 499.

Zoologisches Centralblatt VIII 1901: Adelong (1) p. 31, (2) p. 69—70, (3) p. 70—71, (4) p. 513—514, (5) p. 514—515, (6) p. 531—532, (7) p. 531—532, (8) p. 532, (9) p. 534—535. — Burckhardt (1) p. 386—387. — Escherich (1) p. 66—69, (2) p. 71—72, (3) p. 417—418, (3a) p. 418, (4) p. 418—419, (5) p. 419—420, (6) p. 420—422, (7) p. 530—531, (8) p. 533—534, (9) p. 232, (10) p. 836—837, (11) p. 836—840. — Garbowski (1) p. 88—89. — Handlirsch (1) p. 31—32.

Zoologische Jahrbücher, Abth. für Systematik XIV, 1901: Eichelbaum (1) p. 521—536.

Zoologischer Jahresbericht für 1900. Neapel 1901: Mayer (1) p. 43—45.

Arbeiten aus dem zoologischen Institute der Universität Wien und der zoologischen Station in Triest. XIII. 1901: Prowazek (1) p. 197—236.

Anatomischer Anzeiger 19. 1901: Holmgren (2) p. 449—461.

Internationale Monatsschrift für Anatomie und Physiologie XVIII. 1901: Giardina (1) p. 417—477, 478—484.

Abhandlungen u. Berichte des K. Zoologischen etc. Museums zu Dresden. X 1901: Heller (1) n^o 2.

Mittheilungen des Badischen Zoologischen Vereins I. 1900: Fischer (1) p. 143—154. — Nägele (1) p. 43—44.

Naturhistorische Zeitschriften.

Archiv für Naturgeschichte 67. 1901: Kolbe (1) Beiheft, Festschrift p. 89—150. — Obst (1) *ibid.* p. 265—298, (2) I 3. p. 279. — Seidlitz (2) 66. 1900. II 1. p. 145—366. — Weise (1) p. 145—163, (2) p. 164—174.

Biologisches Centralblatt 21. 1901: Deegener (1) p. 621—624. — Rengel (1) p. 173—182, 209—220. — Linden (1) p. 342.

Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft. 36. 1901: Kadié (1) p. 207—228.

Sitzungsberichte der Gesellschaft Naturforschender Freunde in Berlin. 1901: Kolbe (3) p. 39—84.

Annalen des K. K. Naturhistorischen Hofmuseums in Wien. 16. 1901: Brauns (1) p. 91—96.

- Archiv für naturwissenschaftliche Landesdurchforschung Böhmens. XI. 1901: Fritsch (1) p. 163—180.
- Abhandlungen herausgeg. vom naturwissenschaftlichen Verein zu Bremen. 17. 1901: Röben (1) p. 203—215.
- Schriften der naturforschenden Gesellschaft zu Danzig. X. Heft 2—3 1901: Helm (1) p. 14—15, (2) p. 15. — Treichel (1) p. 158—162.
- Verhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg (3) VIII. 1900: Brunn (1) p. XIV. — Ohaus (1) p. XXXIII—XXXIV. — Timm (1) p. XXXVIII—XXXIX.
- Verein Luxemburger Naturfreunde vorm. Fauna. XI. 1901: Müllenberger (1) p. 168.
- Archiv des Vereins der Freunde der Naturwissenschaften in Mecklenburg. 55. 1901: Friedrichs (1) p. 169—172.
- Verhandlungen der Zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien. 51. 1901: Apfelbeck (1) p. 14—16, (2) p. 530—540. — Bernhauer (1) p. 106—115, (2) p. 430—506, (3) p. 651—655. — Born (4) p. 522—525. — Ganglbauer (1) p. 312—332, (2) 390—392, (3) p. 791—798, (4) Festschrift p. ? — Hormuzaki (1) p. 356—361. — Luze (1) p. 146—185, (2) p. 389—390, (2a) p. 614, (3) p. 662—746. — Müller (2) p. 1633, (3) p. 511—522. — Paganetti-Hummler (1) p. 404—405. — Schultze (1) p. 212—215. — Spaeth (1) p. 333—350, (2) p. 750—756.
- Verhandlungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften. 1901: Petri (1) Separatband p. ?
- Verhandlungen des naturforschenden Vereins in Brünn. XL. 1901: Reitter 38.
- Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und der Herzegovina. VIII. 1901: Apfelbeck (4) p. 447—469.
- Globus. 1901 no. 16, 17: Hagen (1) p. ?
- Prometheus 13. 1901: Krause (1) p. 150—154. — Sajo (1) p. 166—171.
- Sprawozdanie Komisyi fizyjograficznej etc. Krawaz. 35. 1901: Rybinski (1) p. 66.
- Termesztetrajzi Füzetek. XXIV. 1901. Csiki (7) p. 486—490, (8) Beiheft. — Kraatz (1) p. 155—156. — Schilsky (1) p. 153—154.

Forst- & landwirthschaftliche Zeitschriften.

- Allgemeine Forst- & Jagdzeitung. 1901: Eckstein (1) Suppl. p. 19—22.
- Centralblatt für das gesammte Forstwesen. 1901: Baudisch (1) p. 65.
- Jahrbücher der K. preussischen Staats- und Landwirthschaftlichen Academie. Eldena. 1900: Meunier (1) p. ?
- Praktische Blätter für Pflanzenschutz. 1901: Müller (1) p. 52. — Zirngiebl (1) p. 57.

- Gartenflora, Zeitschrift für Garten- u. Blumenkunde. 50. 1901:
Sprenger (1) p. ?
Nerthus 1901 no. 2: Schloemp (1) p. ?

Allgemein wissenschaftliche Zeitschriften.

- Aus der Heimath für die Heimath. 1900. Schütte (1) p. 53—55.
Allgemeines Litteraturblatt. Red. Schnürer. X. 1901:
Hamann (1) p. 186.
Kis erletüzi Közlemenyek. IV. 3: Pasztor (1) p. 244—273.
Magyar Erdész. I. 9: Gesztes (1) p. 166.
Buletinul Societatii di Sciinte diu Bucaresci-Romania. X.
1901; Hormuzaki (2) p. 77—110. — Jaquet (1) p. 496—497.
— Poncy (1) IX. p. 754—758, (2) X. p. 483—493. —
Stierlin (1) p. 758—762.

b. Dänemark, Schweden, Finnland.

Entomologische Zeitschriften.

- Entomologisk Tidskrift utgifven af Entomologiska Föreningen i
Stockholm. 22. 1901: Hansen (1) p. 177—183, Lampa (2)
p. 63, (3) p. 142, 160, (5) p. 170—174, Mjöberg (1) p. 191
—192, (2) p. 189—190, Roman (1) p. 166, Sahlberg (1) p. 167
—169, Strand (1) p. 143.
Entomologiske Meddelelser (2) I. 1901: Andersen (1) p. ?,
Engelhardt (1) p. ?

Naturwissenschaftliche Zeitschriften.

- Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter. (6) Nat.
Afd. IX. 8. 1901: Meinert (1) p. 341—440.
Forhandlingar: Videnskabs Selskabet i Christiania. 1901:
Münster (1) p. ?.
Nyt Magazin for Naturvidenskaberne. 39. 1901: Strand (1)
p. 327—336.
Öfversigt af Finska Vetenskaps Societatens Förhandlingar.
43. 1901: Jacobson (3) p. 99—147.
Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica. 18. 1899:
Poppius (6) p. ?.
Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica. 23—27.
1898—1901: Leinberg (1) 26. p. 79—80, (2) p. 184, (3) p. 185
—187, (4) p. 187—188, (5) 27. p. 2, 177. — Poppius (1) 23
p. 33—34, 190, (2) p. 5, 190, (3) 24. p. 13—14, 184, (4)
p. 29—30, 184, (5) p. 43, 135, (6) p. 56, 135, (7) 26. p. 29,
218, (8) p. 78, 218, (9) 27. p. 73—74, 177, (10) p. 189—190,
(11) p. 106—111. — Reuter (1) 25. p. 69, 135. — Sahlberg
(2) 23. p. 28—33, (3) p. 46—47, 190, (4) 24. p. 10—11, 184,
(5) 26. p. 71—72, 218, (6) 72, 218, (7) 190—191, 219, (8) 27.
p. 85, 177, (9) p. 86, 176—177, (10) p. 96—98, 177.

c. Russland (excl. Finnland).

Selbstständig erschienene Werke: Mysslowsky 1., Nassonow 1., Tarnani 1.

Entomologische Zeitschriften.

Horae Societatis entomologicae rossicae. 35. 1901*): Glasunow (1) p. 467—493. — A. Jacobson (1) p. V—XIV. — G. Jacobson (2) p. XIX—XX, (3) p. XXXVII—XXXIX, (4) p. LVII, (5) p. 73—102. — Jakowlew (1) p. 103—124. — Jakowleff (7) p. 168—184, (8) p. 266—278, (9) p. 279—355, (10) p. 561—583. — Masaraky (1) p. XXVII—XXXVII, (2) p. XL—XLVII. — Olsufiew (1) p. 603—610. — Schreiner (1) p. XXIV—XXVI. — Ssemenow (10) p. 253—265. — Tarnani (2) p. LXIX—LXX. — Tschitscherin (10) p. 1—16, (11) p. 38—44, (12) p. 49—72, (13) p. 128—129, (14) p. 160—167, (15) p. 217—251, (16) p. 494—501, (17) p. 502—534, (18) p. 584—597.

Revue Russe d'Entomologie I. 1901: Glasunow (1) p. 20—22, (2) p. 269, 270, Jakowleff (1) p. 50—54, 107—110, (2) p. 77—79, (3) p. 83—87, (4) p. 146—166, (5) p. 176—178, (6) p. 181—182. — Ssemenow (1) p. 28—32, (2) p. 36—38, (2a) p. 59—64, (3) p. 90—97, (4) p. 105—106, (4a) p. 112—121, (5) p. 137—145, (6) p. 167—172, (7) p. 183—184, (7a) p. 188—190, 195—210, (8) p. 251—255, (8a) p. 262—270, (9) p. 297—299. — Ssumakow (1) p. 179—180. — Tschitscherin (1) p. 10—12, (2) p. 39—47, (3) p. 57, (4) p. 88—89, (5) p. 239—250, (6) p. 256—258, (7) p. 270. — Wieren (1) p. 130—133.

Zoologische Zeitschriften.

Annuaire du Musée zoologique de l'Academie des Sciences de St. Petersburg. VI. 1901: Ivanov (1) p. 1—55.

Naturwissenschaftliche Zeitschriften.

Sitzungsberichte der Naturforscher-Gesellschaft in Dorpat. XII. 1901: Ssumakow (1) p. 454—459.

Pamiętnik Fizyograficzny. Warschau. XII. 1901: Hildt (1) p. 209—?. (Protokolle der Naturforscher-Gesellschaft der Universität Kasan). 33. Beil. n. 19: Stange (1) p. ?.

(Die Obstzucht). 1900: Schreiner (1) p. ?.

d. Frankreich.

Selbstständig erschienene Werke: Danysz 1., Davis 1., Pic 51., Warnier 1.

*) p. 253—611 erschien erst im Juli 1902.

Entomologische Zeitschriften.

- Annales de la Société entomologique de France.* 70. 1901: Bourgeois (4) p. 31—51, Fleutiaux (4) p. 636—664, Lesne (4) p. 1—5, Péringuey (2) p. 178—187, Pic (11) p. 157—173, Raffray (4) p. 27—30, Régimbart (3) p. 188—232, 665—666.
- Bulletin de la Société entomologique de France.* 1901: Abeille (1) p. 8, (2) p. 234, Augles (1) p. 301—304, Baer (1) p. 186—188, (2) p. 256, Bedel (1) p. 318, (2) p. 358, (3) p. 358—359, Bedel & Bourgeois (1) p. 176—178, Belon (1) p. 169, Boileau (1) p. 350, (2) p. 282—285, Bouchard (1) p. 90—91, (2) p. 170—171, (3) p. 295—296, Bourgeois (2) p. 143—144, (3) p. 268—271, Buysson (1) p. 124—126, (2) p. 220—221, Carret (2) p. 327—331, Chevalier (1) p. 344—345, Chobaut (1) p. 280—281, (2) p. 281—282, (3) p. 298—299, Deville (1) p. 271—272, Delval (1) p. 225—226, Donkier (1) p. 174, (2) p. 188, Fairmaire (1) p. 94—97, (2) p. 126—128, (3) p. 265—268, (3a) p. 279—280, Fleutiaux (1) p. 97—101, (2) p. 181—182, Giard (1) p. 199, (2) p. 231—232, Grouvelle (1) p. 102—103, Lameere (1) p. 294—295, Lesne (1) p. 221, (2) p. 348—350, (3) p. 351—362, Léveillé (1) p. 318—320, Marmottan (1) p. 174, Mayet (1) p. 30—32, (2) p. 66—71, Normand (1) p. 147—148, Oberthür (1) p. 351, Peyerimhoff (1) p. 203—205, (2) p. 297—298, (3) p. 347—348, Pic (1) p. 110—111, (2) p. 111—112, (3) p. 112—113, (4) p. 113, (5) p. 155, (6) p. 235, (7) p. 253—255, (8) p. 299—300, (9) p. 332—333, (10) p. 363—365, Ponselle (1) p. 360—361, Poujade (1) p. 229, Raffray (1) p. 123, (2) p. 201, Régimbart (1) p. 101—102, (2) p. 323—327, Théry (1) p. 107—108, (2) p. 108—110, (3) p. 237—238, Vauloger (1) p. 233, Villard (1) p. 144—146.
- L'Abeille Journal d'Entomologie* XXX. 1901: Lesne (5) p. 73—104. — Peyerimhoff & Deville (1) p. 53—72.
- Revue d'Entomologie* 20. 1901: Belon (6) p. 256. — Buysson (4) p. 95. — Deville (2) p. 1. — Fairmaire (6) p. 101—248. — Fauvel (3) p. 2—5, (4) p. 5—6, (5) p. 69—91, (5a) p. 92, (6) p. 250, (6a) p. 251—252, (7) p. 253, (8) p. 253—254. — Pic (11a) p. 96—100, (11b) p. 248—250. — Xambeu (1) p. 7—68.
- Le Frelon Journal d'Entomologie descriptive* IX no. 5 p. 77—196, X no. 1—104: Buysson (3) X p. 1—28, 33—36. — Desbrochers (1) IX p. 77—83, (2) p. 84, (3) p. 85—135, (4) p. 136, (5) p. 137—193, X p. 37—104, (6) p. 28—32.
- Miscellanea entomologica* IX. 1901: Barthe (1) p. 13—15, 126—128, 141—143, 190—192. — Mayet (3) p. 1—6, 52—55, 113—117, 185—189. — Olivier (1) p. 129. — Pic (20) p. 2—3, (21) p. 25—26, (22) p. 129—131, (23) VII. 1898 p. 113—114, (24) *ibid.* p. 155—156. — Seidlitz (1) p. 6—12, 161—179. — Vodoz (1) p. 49—51.

Zoologische Zeitschriften.

- Bulletin de la Société Zoologique de France. 25. 1900, 26. 1901: **Pic** (14) 25. p. 65—67, (15) p. 172—173, (16) p. 182—185, (17) 26. p. 77—78.
- Bulletin du Museum d'Histoire naturelle de Paris VII. 1901: **Boileau** (3) p. 46. — **Fauvel** (2) 62—66. — **Lesne** (7) p. 335—336. — **Pic** (18) p. 337—343, (19) p. 343. — **Régimbar** (4) p. 336—337. — **Viré** (1) p. 344—346.
- Bulletin de la Société d'Acclimation de France 1900: **Raspail** (1) p. ?.

Naturwissenschaftliche Zeitschriften.

- L'Année biologique V. 1899 u. 1900 (1901): **Acloque** (1) p. 201—202. — **Cuénot** (1) p. 458—459. — **Marchal** (1) p. 179, (2) p. 221, (3) 217, (4) 369, (5) p. 403. — **Ferre** (1) p. 759. — **Vaney** (1) p. 171.
- La Cellule. XVIII. 1901: **Dierckx** (1) p. 255—297, 299—310.
- Comptes rendus de l'Académie des Sciences. Paris. 132. 1901: **Bordas** (1) p. 1580—1582. — **Fliche** (1) p. 650. — **Lesne** (6) p. 847—850. — **Ménégaux** (1) 133. 1901. p. 459—461.
- Comptes rendus de la Société de Biologie. 53. 1901. **Mégnin** (1) p. 834.
- L'Echange. 17. 1901: **Abeille** (3) p. 59—62, 68—70. — **Belon** (3) p. 35—36. — **Berriat** (1) p. 28—29. — **Nicolas** (1) p. 29. — **Pic** (30) p. 2—4, 9—12, 17—20, 25—27, 33—35, 57—59, 65—68, 81—83, (31) p. 37—39, (32) p. 41, (33) p. 47—48, 55—56, (34) p. 49—52, (35) p. 74—75, (36) p. 79—80, (37) p. 87—88, (37a) p. 89—91, (38) p. 93—96, (39) 16. 1900. p. 29, (40) p. 46, (41) p. 58, (42) p. 95, (43) 14. 1898. p. 86—88, (44) 14. 1898. p. 93. — **Quittard** (1) p. 36—37, 42—44, 53—54, 63—64, 72, 77—78, 88. — **Viturat** (1) p. 6, (2) p. 84, (3) p. 75. — **Xambeu** (2) **Beilage** p. 157—204.
- Feuilles des jeunes Naturalistes. 31 u. 32. 1901: **Albisson** (1) p. 141—142. — **Buffet** (1) p. 120. — **Le Sénéchal** (1) p. 190. — **Marchal** (1) p. 119—120. — **Marty** (1) p. 96. — **Monnot & Houlbert** (1) p. 229—233, 253—258, 285—290, 32. p. 19—20, 25—33. — **Peyerimhoff** (4) p. 166—167. — **Pic** (26a) p. 104—106, (27) p. 144, (28) p. 272, (29) p. 291—292. — **Ponselle** (2) p. 67—68. — **Raspail** (1) p. 143.
- Le Naturaliste. 23. 1901: **Houlbert** (1) p. 136, 208, 256. — **Ménégaux** (2) p. 238—241. — **Noël** (1) p. 10, (2) p. 238. — **Pic** (25) p. 37, 44, 227, (26) p. 277. — **Planet** (1) p. 133—134, 157—158, 179—181, 193—195, 250—253. — **Xambeu** (3) p. 227—228, (4) p. 276.
- La Nature 28. 1900: **Acloque** (1) p. 201—202.
- Bulletin de la Société des Sciences naturelles d'Ain. 1901: **Carret** (1) p. ?

- Bulletin de la Société d'Études scientifiques de l'Aude. XII. 1901: Gavoy (1) p. ?
- Bulletin de Société d'histoire naturelle d'Autun. 1898—1901: Pic (45) 1898 p. 17—21, (46) p. 179—181, (47) 1899 p. 201—204, (48) p. 204—210, 352—261, (48a) XIII. 1900. p. 25—32, (48 b) XIV. 1901 p. 33—39.
- Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux. 55. 1901: Bial & Blondel & Contures (1) p. 251—299.
- Procès verbeaux de la Société Linnéenne de Bordeaux. 56. 1901: Lambertie (1) p. CXIX, (2) p. CXXXVII, (3) p. CLIX—CLX, (4) CLX—CLXI, (5) p. 84—85. — Perez (1) p. CXXXIII.
- Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Colmar. V. 1899—1900: Bourgeois (1) p.
- Annales de la Société Linnéenne de Lyon. 48. 1901: Belon (1) p. 129—152. — Xambeu (5) p. 1—40.
- Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Mâcon. 1899: Pic (49) p. 189—196.
- Annales de la Faculté des Sciences de Marseille etc. XI. 1901: Vayssière (1) p. 77—92.
- Bulletin de la Société d'étude des Sciences naturelles de Nimes. 28. 1900: Chobaut (2) p. ?, (3) p. 77—82. — Mingaud (1) 28. (?) 1901. (?) p. XXVIII (2) 27. p. 103—107.
- Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie. (5) III. 1901: Le Sénéchal (1) p. 3—43.
- Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse. 32. 1899: Ribaut (1) p. ?

Allgemein-wissenschaftliche Zeitschriften.

- Association française pour l'avancement des Sciences. Compte rendu. Congr. à Ajaccio 1901: Vodoz (2) p. 626—643.
- Revue scientifique (4) XV. 1901: Fabre (1) p. 762—?
- Revue scientifique de Bourbonnais XIV. 1901: Béguin (1) p. 46. — Pic (50) p. 173—182. — Pierre (1) p. 48, (2) p. 77—78, (3) p. 204—212, 241—246.

e. Holland und Belgien.

Selbstständig erschienene Werke: Everts 2, Severin & Brichet.

Entomologische Zeitschriften.

- Annales de la Société entomologique de Belgique. 45. 1901: Belon (4) p. 86—89, (5) p. 246—247. — Boileau (4) p. 7—12, (5) p. 12—22. — Fairmaire (5) p. 209—244. — Horn (1) p. 84—85. — Jacoby (4) p. 287—303. — Kerremans (1) p. 165—173. — Lameere (2) p. 314—323. — Lesne (8) p. 85. — Pic (12) p. 89—91, (13) p. 248—257. — Schenkling (1) p. 104—108. — Weise (3) p. 91—96, (4) p. 273—286.

- Memoires de la Société entomologique de Belgique. VIII. 1901:
 Clouët (1) p. 1—124.
 Tijdschrift voor Entomologie. 44. 1901: Everts (1) p. 69. —
 Kempers (1) p. 13—39.
 Notes of the Leyden Museum 22, 23. 1900—1901: Fairmaire
 (4) 23. p. 65—84. — Gestro (1) 23. p. 15—16. — Möllen-
 kamp (2) 22. 1900. p. 44—48. — Ritsema (1) 22. 1900.
 p. 27—32, (2) p. 189—192, (3) 23. 1901. p. 94. — Schenkling
 (5) p. 123—130.
 Bulletin de la Société centrale forestière de Belgique 1901:
 Faber (1), Severin (1).
 Tijdschrift voor Plantenziekten. VI. 1900. Ritzema-Bos (1)
 p. 39, (2) p. 129—141.

f. England.

Selbstständig erschienene Werke: Ward 1.

Entomologische Zeitschriften.

- Transactions of the Entomological Society of London 1901.
 Arrow (1) p. 193—209, (2) p. 593—601. — Champion (9)
 p. 379—384. — Champion & Chapman (1) p. 1—18. —
 Donisthorpe (9) p. 345—377. — Gohan (1) p. 37—74. —
 Jacoby (2) p. 209—256. — Janson (1) p. 179—186.
 The Entomologist's Monthly Magazine. 37. 1901: Baily (1)
 p. 171, (2) p. 171. — Beare (1) p. 1—3, (2) p. 99, (3) p. 279
 —280, (4) p. 280. — Bedwell (1) p. 301. — Bloomfield (1)
 p. 256. — Cameron (1) p. 220—222. — Champion (1) p. 18,
 (2) p. 18—19, (3) p. 91—92, (4) p. 144—145, (5) p. 171, (6)
 p. 255—256, (7) p. 270—272, (8) p. 279. — Day p. 225. —
 Fowler (1) p. 300—301. — Holland (1) p. 18. — Lewis (1)
 p. 199. — Morley (1) p. 64—66, (2) p. 151—152, (3) p. 226.
 — Piffard (1) p. 99. — Reutter (1) p. 3—4. — Sharp (2)
 p. 37—39, (3) p. 143—144, (4) p. 280—281. — Swinton (1)
 p. 156—160. — Thornley (1) p. 18. — Walker (1) p. 76.
 — Wood (1) p. 225.
 The Entomologist's Record and Journal of Variation XIII.
 1901: Beare (6) p. 47—51, (7) p. 328—329, (8) p. 363—364.
 — Bennett (1) p. 103—104. — Chitty (1) p. 250. — Day (2)
 p. 331. — Donisthorpe (1) p. 51—56, (1a) p. 102—103, (2)
 p. 182, (3) p. 251, (4) p. 271—273, (5) p. 329—330, (6) p. 330
 —331, (7) p. 337—338, (8) p. 349—353. — Elliot (1) p. 364.
 — Ellis (1) p. 140, (2) p. 250—251. — Harwood (1) p. 331.
 Jennings (1) p. 364—365. — Newbery (1) p. 219—220. —
 Sharp (1) p. 104—106, (2) p. 147—149, 175—178, 201—205,
 270—271, 293—296. — Tomlin (1) p. 104. — Tomlin & Sopp
 (1) p. 342—345. — Tutt (1) p. 273, (2) p. 273, (3) 281—284,
 317—320, 353—358, (4) p. 363.

The Entomologist 34. 1901: Broocks (1) p. 298. — Jacoby (5) p. 146—149. — Kamp (1) p. 290. — Kirkaldy (1) p. 63—64. — Sopp (2) p. 118—122.

Zoologische Zeitschriften.

Proceedings of the Zoological Society of London 1901: Jacoby (3) p. 153—164.

Zoological Record for 1901: Sharp (1) p. 115—187.

Novitates Zoologicae VIII. 1901: Jordan (1) p. 408.

Naturwissenschaftliche Zeitschriften.

Annals and Magazin of Natural History 1901, VII u. VIII: Arrow (3) VII p. 83—89, (4) p. 393—401, (5) VIII p. 35—38, (6) p. 193—196, (7) p. 257—258. — Gorham (3) p. 349—365, 401—415. — Lewis (2) p. 241—245, (3) p. 366—383. — Waterhouse (1) p. 520—523.

Transaction of the Linnean Society of London. VIII. 1900: Waterhouse (2) p. 74—76.

Transactions of the Manchester microscopical Society. 1900: Gillanders (1) p. 67—79.

Journal of the Royal Microscopical Society of London. 1901: Lesne (9) p. 412—413.

The Irish Naturalist X. 1901: Browne (1) p. 204.

Annals of the Scottish Natural History 1901: Douglas p. 238. — Evans (1) p. 283. — Godfrey (1) p. 238. — Gorham (1) 24—25. — Traquair (1) p. 52.

Gardener's Chronicle 1901: Newstead (1) p. 197, 217.

The Journal of the Board of Agriculture. VIII. 1901: Theobald (1) p. 147—154.

Allgemeinwissenschaftliche Zeitschriften.

Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. 23. 1901: Mac Dougall (1) p. 319—358, (2) p. 359—364.

Transactions of the Leicester Literary and Philosophical Society (5) XI. 1901: Bouskell (1) p. ?, Donisthorpe (10) VI (?) p. 16—28.

Science-Gossip 7. 8. 1900. 1901: Kew (1) 8. p. 70, 71, 137, 138. — Sopp (1) 7. p. 289—293, 321—325.

g. Italien.

Entomologische Zeitschriften.

Bulletino della Societa entomologica italiana. 33. 1901: Gestro (2) p. 84—88. — Porta (1) p. 105—132, (2) p. 177—182.

Zoologische Zeitschriften.

- Bolletino dei Musei di Zoologia e Anatomia comparata della
Universita di Torino. XVI 1901: Camerano (1) n^o 396. —
Silvestri (1) n^o 398.
- Bolletino della Societa zoologica italiana X. 1901: Curreri
(1) p. 77—86.

Naturwissenschaftliche Zeitschriften.

- Rivista italiana di Scienze naturali e Bolletino de Naturaliste
etc. XX. 1900, XXI. 1901: Alzona (1) p. 137—140.
- Atti della Societa dei Naturalisti e Matematici di Modena IV.
1901: Porta (3) p. ?

Landwirthschaftliche Zeitschriften.

- Bolletino di Entomologia agraria, Patologia vegetale etc. VIII.
1901; Buffa (1) p. 181—182. — Ribaga (1) p. 6, (2) p. 132.

h. Spanien.

- Boletin de la Sociedad española de Historia natural.¹⁾ T. I.
1901: Fuente (1) p. 133—134. — Lauffer (1) p. 88—98. —
Martinez Escalera (1) p. 77—88, (2) p. 142—144, (3) p. 172
—175. — Uhagon (1) p. 360.

II. Nord-Amerika.**Entomologische Zeitschriften.**

- Transactions of the American Entomological Society. 27.
1901: Fall (4) p. 277—310. — Hayward (1) p. 156.
- The Canadian Entomologist 33. 1901: Bethune (2) p. 268—270.
— Casey (1) p. 312—313. — Fall (1) p. 289—293, (2) p. 324.
— Harris (2) p. 226. — Knaus (1) p. 110—115. — Wasmann
(1) p. 249—252. — Webster (3) p. 58—60, (3a) p. 176, (4)
p. 183—184. — Wickham (1) p. 25—28.
- Journal of the New York Entomological Society IX 1901:
Harris (1) p. 27—28. — Van Dyke (1) p. 197—199. — Schaeffer
(2) p. 86. — Webster (5) p. 127—132.
- Annual Report of the Entomological Society of Ontario. 31.
1900: Gregson (1) p. ?, (2) p. 84. — Webster (1) p. 81—84,
(2) p. 85—86, (3) 32. 1901 p. 67—?
- Proceedings of the entomological Society of Washington.
IV. 1901: Howard (1) p. 412. — Hubbard (1) p. 348, (3) p. 381
—383. — Schwarz (1) p. 431, (2) p. 431—432, (3) p. 432.

¹⁾ Bis 1901 incl. gab dieselbe Gesellschaft ihre „Anales“ incl. „Actas“
jährlich heraus. Jetzt erscheinen statt dessen 1. das „Boletin“ jährlich und 2.
die „Memorias“ bandweis.

Entomological News XII. 1901: Babb (1) p. 279—281. — Blaisdell (1) p. 263—264. — Doggett (1) p. 319. — Fall (3) p. 307—320. — Hinds (1) p. 257—262. — Houghton (1) p. 209. — Knab (1) p. 91. — Pearsall (1) p. 158. — Webb (1) p. 133—136. — Wenzel (1) p. 75—76.
Psyche IX n° 297—308. 1901: Wickham (2) p. 150—151.

Naturwissenschaftliche Zeitschriften.

Bulletin of the American Museum of Natural History 14. 1901: Schaeffer (1) p. 209—212.
Smithsonian Miscellaneous (oder Contributions?) n° 1258: Langley & Very (1) p. ?
Journal of the Cincinnati Society of Natural History. XIX. 1901 (?): Dury (1) p. 243—244.
Annals of the Carnegie Museum. Pillsburg Pensylv. I. 1901: Klages (1) p. 265—294. — Schmitt (1) p. 284.
Geological Survey of Canada 1895: Scudder (1) p. 27—56, (2) 1900 p. 67—92.

Landwirthschaftliche Zeitschriften.

United States Departement of Agricultur. Division of Entomology. 1901. Bull. XXX: Koebele (1) p. 88 - 90.
United States Departement of Agricultur, Farmer Bulletin 130. 1901: Hopkins (3) p. ?, Mally (1) p. ?
Kentucky Agricultural Experiment Station. 91. 1901: Garman (1) p. 3—16.
Ohio Agricultur Experiment Station 1900: Webster (6) Bull. 119 p. 143—149, (7) Bull. 116 p. 195—198.

Allgemeinwissenschaftliche Zeitschriften.

Occasional Papers of the California Academia of Sciences. 1901: Fall 5.
Science, a weekly Journal. N. S. XIII. 1901: Hopkins (1) p. 628—629, (2) p. 630—631. — Meek (1) p. 375.
The open Court. Chicago XV. 1901: Carus (1) p. 540—550.

III. Australien, Südamerika, Afrika, Asien.

Proceedings of the Linnean Society of New South Wales 25. 1900, 26. 1901: Blackburn (1) 26. p. 159—196. — Lea (1) 25. p. 537—541, (2) 26. p. 481—513. — Sloane (1) p. 672—673.
Transactions of the Royal Society of South Australia. 25. 1901: Blackburn (2) p. 15—44, 99—131.
Queensland Agricultural Journal. 1900: Tryon (1) p. 176—189.
The Agricultural Gazette of New South Wales 1901: Froggatt (1) p. 473—476.

- Anales de la Universidad Santiago de Chile 108. 1901: Germain (1) p. 175—192, (2) p. ?, (3) p. ?
- Revista Chilena de Historia Natural. V. 1901: Fleutiaux (4) p. 117—119. — Porter (1) p. 156—157.
- Comunicaciones del Museo nacional de Buenos Aires I, 8. 9. 1901: Berg (1) p. 267—272, (2) p. 325—330. — Fauvel (1) p. 282.
- Transactions of the S. African Philosophical Society. XII. 1901: Peringuey (1) p. 1—563.
- Annals of the South African Museum 1901: Raffray (3) p. 117—126.
- Proefstation voor Cacao te Salatiga. Bull. 1. 1901: Zehntner (1) p. ?

C. Die Arbeiten nach ihrem Inhalt.

I. Litterarische u. technische Hilfsmittel.

- a) **Hand- u. Lehrbücher:** Comstock 1, French 1, Everts 2, Marshall 1, Nassonow 1.

Everts gab die Fortsetzung seiner Coleopteren der Niederlande, in welcher die Familien von den *Lucaniden* bis zum Schluss der Heteromeren, dann die *Cerambyciden* behandelt und die *Chrysomeliden* begonnen werden.

Comstock, French, Marshall und **Nassonow** siehe Allg. Handbücher.

- b) **Bibliographie:** Beare 6, Camerano 1, Carret 1, V. Carus 1, Eckstein 1, Ganglbauer 4, Mayer 1, Pic 10, 11, 44, Porter 1, Seidlitz 2, Ssemenow 9, D. Sharp 1, Wieren 1.

Carus gab eine Aufzählung sämtlicher Publicationen im Gebiete der Coleopterologie im Jahre 1900 u. 1901 ohne näheres Eingehen auf ihren Inhalt, und die **Allgemeine** Zeitschr. f. Ent. brachte dasselbe in halbmonatlicher Folge.

Sharp giebt (zusammen mit den übrigen Ordnungen) die genauen Titel von 425 wichtigeren coleopterologischen Arbeiten von 1900 (25 derselben gehören eigentlich in die Jahrgänge 1898 u. 99), während die übrigen kleinen nur gelegentlich citirt sind, eine Analyse des Inhalt (zusammen mit den übrigen Ordn.) u. eine Aufzählung von 3100 neuen Arten (p. 115—187).

Seidlitz giebt (p. 48—100) die genauen Titel von 955 Publicationen über Coleopterologie von 1900 (wenige stammen aus früheren Jahren, einige sind factisch erst 1901 erschienen, aber sollten nach dem Jahrgang der Zeitschrift schon 1900 erscheinen), dann (p. 100—112) eine Uebersicht derselben nach den 162 Zeitschriften, in denen sie zerstreut, geordnet, dann (p. 113—123) eine Uebersicht derselben nach ihrem Inhalt geordnet, nebst kurzen Referaten, u. endlich (p. 124—288) eine Aufzählung der behandelten *Coleopteren*, unter denen 3400 n. spp. Die (69) umfassenden Arbeiten sind hierbei vor den Einzelbeschreibungen bevorzugt, indem ihr Inhalt im Zusammenhang wiedergegeben ist, während die Einzelbeschreibungen in alphabetischer Reihenfolge angeordnet sind.

Mayer zählte mehrere Titel coleopterologischer Arbeiten von 1901 auf u. gab über 9 derselben kurze Referate.

Ganglbauer gab eine Geschichte der Coleopterologie Oesterreichs seit 1850.

Eckstein führte in seinem Jahresbericht über Forstzoologie (p. 19—22) mehrere coleopterologische Schriften auf u. gab über 21 derselben kurze Referate.

Beare behandelte in allgemeinen Zügen die Literatur über *Coleopt.* Englands im verflossenen Jahrhundert, **Porter** zählte die in letzter Zeit neu beschriebenen Coleopt. Chilis auf, **Camerano** gab das Verzeichniss von Baudi's, **Carret** das von Guillebeau's, **Ssamenow** das von Ballion's u. **Wieren** das von Becker's Schriften. Siehe Necrologe.

Pic M. (11) gab eine Fortsetzung der früher begonnenen, sehr dankenswerthen Uebersicht über seine Publicationen von 1898 u. 1899 (p. 157—166), die kein Anderer vollständig auffinden kann u. von denen 9 in den Berichten übersehen wurden; denn sie sind wie die Sandkörner am Meere: an Zahl sowohl (106 in 2 Jahren als auch an Grösse (meist 1—2 pag.). Dieser Uebersicht folgt eine zweite (noch nöthigere) über die als „neue“ beschriebenen Arten und Varietäten, die bei der bekannten Gepflogenheit des Autors, Novitäten bei der Beschreibung oft nicht als solche zu bezeichnen, oder sonst sehr geschickt zu verstecken, dem suchenden Auge leicht entgehen.¹⁾

Pic (10) betont, dass seine „Materiaux p. Longicornes“ wohl im Buchhandel erschienen sind, gegen Reitter (p. 364) u. hat (44) im Jahre 1898 eine „Bibliographie entomologique“ gegeben, die dem Ref. nicht zugänglich ist.

c) **Biographien, Necrologe:** Bouvier 1, Camerano 1, Carret 1, Hansen 1, Lesne 4, Ssamenow 9, Wieren 1.

Ernst Ballion	Ssamenow.
Flaminio Baudi di Selve	Camerano.
Alexander Becker	Wieren.
Emil Blanchard	Bouvier.
M. F. Guillebeaux	Carret.
Emil Adolf Lövendal	Hansen.
Hypolyte Lucas	Lesne.

d) **Referate:** Adelung 1—9, Aigner 1, 2, Burckhardt 1, Cuénot 1, Donisthorpe 1a, 4, Eckstein 1, Escherich 1—12, Garbowski 1, Glasunow 2, Hamann 1, Handlirsch 1, Hensel 1, Hetschko 1, Kraatz 2, Linden 1, P. Marchal 1—5, Mayer 1, Reitter 2, 10,

¹⁾ So ist es z. B. dem geehrten Autor, wie sich jetzt zeigt, glücklich gelungen, von seinen Novitäten der 2 Jahre der mühevollen Berichterstattung einen ganz beträchtlichen Theil (128!) zu entziehen. Dass nicht Böswilligkeit der Referenten (Sharp und Seidlitz) vorliegt, geht daraus hervor, dass der Autor auch sich selbst nicht ganz hat zurecht finden können; denn er führt jetzt z. B. *Anemia Reitteri* als „nov. sp.“ auf, während sie nur nov. nom. ist. Diesen Fehler finde ich bei einer Stichprobe, alle übrigen 127 Namen trage ich ohne Gewähr für ihre Richtigkeit u. ohne Fundorte (die durchweg fehlen) nach. In Zukunft dürfte es sich vielleicht empfehlen, mit der Berichterstattung über die Publicationen des fruchtbaren Herrn Autors immer so lange zu warten, bis eine Uebersicht von ihm selbst vorliegt. Zum Versteckspiel ist die Zeit der Referenten wirklich zu kostbar. (Vergl. *Aomus, Curcul.*)

22, Schaufuss 1, Schenkling 2, 3, 4, Schilsky 4, Schröder 1—38, Seidlitz 2, Speiser 1, 2, Ssemenow 2a, 4a, 7a, 8a, Terre 1, Tomlin 1, Tschitscherin 7a, Tümpel 1, Vaney 1, Weise 16.

Die meisten Referate wurden von **Schröder, Mayer, Escherich, Adelung, Marchal** u. **Seidlitz** geliefert und **Ssemenow** gab zahlreiche Auszüge in Bezug auf die Fauna Russlands in russischer Sprache; die übrigen Autoren gaben nur gelegentlich einige Referate.

e) **Kritik, Polemik:** Brandes 1, Casey 1, Deegener 1, Donisthorpe 1a, Escherich 12, Horn 2, Knoche 1, 2, Martinez 2, Pic 14, 15, 23, 29, 45, 46, Reitter 4, 14, Tschitscherin 7, 13, Wasmann 1, Weise 16.

Brandes und **Knoche** ergingen sich in persönlicher Polemik, die hier nur daher Erwähnung findet, dass sie wegen Publicationen über die Fortpflanzung einiger *Scolytiden* entbrannte.

Donisthorpe kritisierte die Arbeit von Fowler & Walker.

Horn kritisierte Kolbe 1. Siehe *Cicindeliden*.

Escherich kritisierte Deegener 1900 (1), wogegen **Deegener** sich verteidigte.

Martinez wendete sich (mit Unrecht) gegen Pic 1900 (18), der einige vergebene Namen (mit Recht) geändert hatte; denn ob es sich um Namen von Arten oder von Varietäten in derselben Gattung handelt, ist einerlei. In beiden Fällen ist doppelte Verwendung desselben Namens nach den alten Regeln der Nomenclatur u. nach den Regeln der Logik unzulässig.

Pic (14) kritisierte das Citiren von Arbeiten, die mehr als einen Autor haben, wies (15) Reitter lückenhafte Citate nach, besprach (23) einige Prioritätsfragen, kritisierte (29) einige Systeme der Cerambyciden, (45) einige synonymische „Berichtigungen“ u. (46) das Schwören auf „typische“ Exemplare.

Reitter (4) wendet sich gegen Pic 1900 (10) in Bezug aus *Rosalia alpina*, gegen Jacobson wegen *Cassida salsolae*, gegen Pic 30 (p. 59) wegen *Strangalia*, und gegen Chobaut 5, dem die Wiedergabe nachgewiesener synonymischer Unrichtigkeiten vorgeworfen wird.

Tschitscherin (7) kritisierte Daniel's Diagnose von *Pterostichus lombardus* sehr abfällig und (13) eingehender Reitter 1900 (21), wogegen **Reitter** (14) sich verteidigte.

Wasmann (1) kritisierte mehrere von Casey sehr reichlich aufgestellte Gattungen, theils günstig, theils ungünstig, wogegen **Casey** protestirte.

f) **Technik:** Csiki 2, Heine 1, A. Müller 1, Pic 28.

g) **Sammlungen:** Baer 1, Beare 2, Donkier 2, D. Sharp 3, Traquair 1, Tschitscherin 14.

Baer gab Auskunft über die Sammlungen von Paykull, Schönherr, Billberg, Boheman, Linné, Thunberg, Zetterstedt, Ljungh, Westermann, **Donkier** über die *Curculioniden* von Chevrolat, **Sharp** über den Verbleib der Typen zu Heer's Ins. Helvet., **Traquair** und **Beare** berichteten über Lennon's Sammlung britischer Käfer und Tschitscherin über einige Typen Boheman's in der Stockholmer Sammlung.

II. Systematik.

a) **Nomenclatur:** Bouchard 2, Ganglbauer 1, Knab 1.

Bouchard betonte (mit Recht) gegenüber Tschitscherin die Unzulässigkeit des Gebrauches des Gattungsnamens *Platysma* Bon. in dem erweiterten Sinne statt *Feronia* oder *Pterostichus*.

Knab constatirte, dass der Name *Asaphes* Kirby 1837 mit *Asaphes* Walk. 1834 collidire. (Vergl. *Elateridae*).

Ganglbauer (3) schlägt eine neue Art der Bezeichnung von Varietäten u. Subvarietäten vor. Erstens sollen die Varietäten jetzt „Rassen“ oder „Subspecies“ genannt werden, und die alteingebürgerte Bezeichnung „varietas“ soll für die bisherige Bezeichnung „aberratio“ gebraucht werden. Welchen lateinischen Namen die bisherige Bezeichnung Subvarietas bei dieser modernen Massen-Umtaufung erhalten soll, verschweigt der Autor. Auf deutsch darf man sie „Unterrasse“ nennen. Zweitens soll statt der veralteten Linné'schen binären Nomenclatur eine ternäre für die „Subspecies“ u. eine quaternäre für die Unterrasse eingeführt werden und drittens soll, da dieser moderne Sport sich bei artreichen Gattungen besonders für Catalogszwecke natürlich als durchaus unpraktisch erweist, eine neue Art der Bezeichnung vorgenommen werden, die einfach darin besteht, dass an Stelle des bisherigen Zeichens „var.“ das erste mal A, das zweite mal B, das dritte mal C u. s. w. gesetzt wird, während an Stelle des alten Zeichens „subvar.“ unter A das erste mal „a 1“, das zweite mal „a 2“ u. s. w., unter B dann „b 1“, „b 2“ u. s. w. in Gebrauch tritt. Der Vortheil dieser neuen Bezeichnungsart wird nur der sein, dass man sie ohne vorherige Einweihung nicht verstehen wird, während man die alten Bezeichnungen „var.“ u. „subvar.“ ohne Weiteres versteht. Ein Vergleich des vom Autor nach neuem Muster (p. 796—797) dargestellten *Carabus concolor* und seiner 8 „Subspecies“ (A—H) und 13 Unterrassen (a 1, a 2, e 1—e 4, f 1—f 4, h 1—h 3) mit unserem, nach altem Muster gegebenen Referat (pag. 126) dürfte in Bezug auf Klarheit zu Gunsten des letzteren ausfallen, obgleich das letztere nicht einmal in übersichtlicher Catalogs-Ordnung gedruckt ist.

b) **Systematische Fragen:** Dierckx 1, Gorka 1, Horn 2, Kolbe 1, Lameere 1, 2.

Dierckx erörterte die systematische Stellung mehrerer *Carabiden*-Gattungen von dem (sehr einseitigen) Gesichtspunkte der Pygidialdrüsenbildung aus.

Gorka charakterisirte von dem (sehr einseitigen) Gesichtspunkte der Darmbildung aus 6 Haupttypen der Käfer: *Coprophaga*, *Phytophaga*, *Succiphaga*, *Saprophaga*, *Sarcophaga*, *Necrophaga*. (Siehe Morphologie pag. 116.

Horn kritisirte Kolbe 1 in Betreff der *Cicindeliden*. Siehe *Cicindeliden*.

Kolbe (1) theilte die Coleopteren in drei Unterordnungen: *Adephaga*, *Heterophaga* u. *Rhynchophora*. Die erste und die dritte Unterordnung entsprechen den gleichnamigen (2. u. 6.) „Reihen“ von Sharp (1899, 5) und sind, wie diese, durch positive morphologische Merkmale gekennzeichnet, während die zweite (grösste) Unterordnung nur durch Ausscheidung der 1. u. 3. negativ charakterisirt ist, während die morphologische Unterscheidung der 3 Unterordnungen somit keine Schwierigkeiten bietet, machen sich solche bei der weiteren Zerlegung der zweiten Unterordnung in 4 Abtheilungen (*Staphylinoideen*, *Actinorrhadden*, *Heterorrhadden*, *Anchistopoden*) sehr störend bemerkbar. Die

angegebenen Merkmale lassen sich, wie es scheint, absolut nicht durch scharfe Gegensätze dichotomisch ausdrücken, wenigstens hat der Autor es zu thun unterlassen. Inhaltlich entspricht die 1. Abth. der gleichnamigen „Reihe“ Ganglbauer's, die 2. Abth. der 1. „Reihe“ Sharp's (*Lamellicornia*), die 3. Abth. fasst die 3. u. 4. „Reihe“ Sharp's (*Polymorpha* u. *Heteromera*) zusammen und die 4. Abth. entspricht ziemlich der 6. „Reihe“ Sharp's (*Phytophaga*).¹⁾ Bei der Vertheilung der Familien in die neuen Abtheilungen sind viele Neuerungen zu verzeichnen:

- 1) Die *Cupesiden* kommen zu den *Adephagen*.
 - 2) Die *Hypocephaliden* (*Hypocephalus* u. *Dietta*) kommen zu den *Staphylinoiden*.
 - 3) Die *Synteliiden* kommen zu den *Actinorrhaden*.
 - 4) Die *Passaliden* kommen zu den *Clavicorniern*.
 - 5) Die *Malacodermata* sind in 5, die *Dascylliden* in 3, die Cleriden in 2 Familien zerlegt, die z. Th. weit von einander getrennt werden. Die *Anobiiden* und *Ptiniden* sind getrennt.
 - 6) Die *Tentyriiden* sind von den *Tenebrioniden* getrennt.
 - 7) Die *Languriiden*, *Erotyliiden* u. *Phalacriden* kommen zu den *Anchistopoden*, ebenso die *Endomychiden* u. *Coccinelliden*.
 - 8) Die *Prioniden* werden von den *Cerambyciden* getrennt.
 - 9) Die *Rhynchitiden* u. die *Apioniden* werden von den *Curculioniden* getrennt. In Bezug auf die *Cicindeliden* vergl. Horn. — Siehe auch Ganglbauer 1903.
- Lameere** (1) behandelte die systematische Stellung der Gattung *Pseudomyrmecion* und (2) die natürliche Systematik der *Cerambyciden*. Siehe *Cerambycidae*.

c) Umfassende Arbeiten: Arrow 2, 3, Barbey 1, 2, Bedel 4, Belon 2, 4, Berg 2, Bernhauer 2, Blackburn 1, Brauns 1, Brenske 1, Carret 2, Chobaut 5, Clouët 1, Csiki 3, 5, 8, Desbrochers 1, 3, 5, 6, Duda 1, Everts 2, Fleutiaux 1, 3, Gahan 1, Ganglbauer 3, Germain 1, 2, 3, Horn 6, Houlbert 1, Lesne 5, Luze 1, 3, Monnot & Houlbert 1, J. Müller 2, Obst 1, 2, Ohaus 2, Péringuey 1, 2, Petri 1, 2, Pic 13, 35, 37, Pic & Pic 1, Planet 1, Porta 1, Régimbart 3, Reitter 3, 6, 7, 8, 9, 12—17, 19, 25, 27, 30, 35, 37, 38, Schaeffer 1, Schilsky 2, Seidlitz 1, Ssamenow 3, Tschitscherin 15, Uhagon 2, Weise 12., Fall 4, Jacobson 6.

Arrow (2) siehe *Cucujidae*, (3) siehe *Rhysodidae*. — **Barbey** (1, 2) siehe *Scolytidae*. — **Bedel** (4) siehe *Bruchidae*. — **Belon** (2, 4) siehe *Lathridiidae*. — **Berg** (2) siehe *Silphidae*. — **Bernhauer** (2) siehe *Staphylinidae*. — **Blackburn** (1) siehe *Chrysomelidae*. — **Brauns** (1) siehe *Cossyphodidae*. — **Brenske** (1) siehe *Scarabaeidae*. — **Carret** (2) siehe *Silphidae*. — **Chobaut** (1) siehe *Scarabaeidae*. — **Clouët** (1) siehe *Scarabaeidae*. — **Csiki** (3) siehe *Alleculidae*, (5) siehe *Lucanidae*, (8) siehe *Endomychidae*. — **Desbrochers** (1 u. 6) siehe *Curculionidae*, (3) siehe *Alleculidae*, (5) siehe *Tenebrionidae*. — **Duda** (1) siehe *Dytiscidae*. — **Everts** (2) siehe *Lucanidae* — *Cerambycidae*. — **Fleutiaux** (1) siehe *Elatерidae*, (3) siehe *Eucnemidae*. — **Gahan** (1) siehe *Cerambycidae*. — **Ganglbauer**

¹⁾ Uebrigens wird Sharp's neues System vom Autor gar nicht erwähnt! Sollte es ihm unbekannt geblieben sein?

bauer (3) siehe *Carabidae*. — **Germain** (1) siehe *Carabidae*, (2 u. 3) siehe *Scarabaeidae*. — **Horn** (6) siehe *Cicindelidae*. — **Houlbert** (1) siehe *Dascillidae*, *Cebriionidae*, *Elateridae*. — **Lesne** (5) siehe *Bostrychidae*. — **Luze** (1 u. 3) siehe *Staphylinidae*. — **Mounot & Houlbert** (1) siehe *Cerambycidae*. — **J. Müller** (2) siehe *Silphidae*. — **Obst** (1) siehe *Carabidae*. — **Ohaus** (2) siehe *Scarabaeidae*. — **Péringuey** (1) siehe *Lucanidae* u. *Scarabaeidae*, (2) siehe *Histeridae*. — **Petri** (1 u. 2) siehe *Curculionidae*. — **Pic** (13) siehe *Anthicidae*, (35) siehe *Malacodermata*, (37) siehe *Curculionidae*. — **Pic & Pic** siehe *Anobiidae*. — **Planet** (1) siehe *Lucanidae*. — **Porta** (1) siehe *Carabidae*. — **Régimbart** (3) siehe *Hydrophilidae*. — **Reitter** (3) siehe *Chrysomelidae*, (6) siehe *Tenebrionidae*, (7) siehe *Erotylidae*, (8) siehe *Cerambycidae*, (9) siehe *Curculionidae*, (12) siehe *Silphidae*, (13) siehe *Chrysomelidae*, (14) siehe *Carabidae*, (15) siehe *Pedilidae*, (16) siehe *Silphidae*, (17) siehe *Pselaphidae*, (19) siehe *Curculionidae*, (25) siehe *Cucujidae*, (27) siehe *Curculionidae*, (30 u. 35) siehe *Silphidae*, (37) siehe *Tenebrionidae*, (38) *Anobiidae* u. *Cissidae*. — **Schaeffer** (1) siehe *Carabidae*. — **Schilsky** (2) siehe *Curculionidae*. — **Seidlitz** (1) siehe *Dytiscidae*. — **Ssomenow** (3) siehe *Tenebrionidae*. — **Tschitscherin** (15) siehe *Carabidae*. — **Uhagon** (2) siehe *Malacodermata*. — **Weise** (12) siehe *Chrysomelidae*. — **Fall** (4) siehe *Scarabaeidae* u. *Meloidae*. — **Jacobson** (6) siehe *Chrysomelidae*.

Nach Familien geordnet.

Cicindelidae: Horn 6.

Carabidae: Ganglbauer 3, Germain 1, Obst 1, Porta 1, Reitter 14, Schäffer 1, Tschitscherin 15.

Dytiscidae: Duda 1, Seidlitz 1.

Rhysodidae: Arrow 2.

Hydrophilidae: Régimbart 3.

Staphylinidae: Bernhauer 2, Luze 1, 3.

Pselaphidae: Reitter 17.

Silphidae: Berg 2, Carret 2, Müller 2, Reitter 12, 16, 30, 35.

Erotylidae: Reitter 7.

Endomychidae: Csiki 8.

Lathridiidae: Belon 2, 4.

Cossyphodidae: Brauns 1.

Cucujidae: Arrow 1, Reitter 25.

Histeridae: Péringuey 2.

Lucanidae: Csiki 5, Everts 2, Péringuey 1, Planet 1.

Scarabaeidae: Brenske 1, Clouët 1, Everts 2, Germain 2, 3, Ohaus 2, Péringuey 1, Fall 4.

Buprestidae: Everts 2.

Eucnemidae: Everts 2, Fleutiaux 3.

Elateridae: Everts 2, Fleutiaux 1, Houlbert 1.

Cebriionidae: Houlbert 1.

Dascyllidae: Everts 2, Houlbert 1.

Malacodermata: Everts 2, Pic 35, Uhagon 2.

Cleridae: Everts 2.

Lymexylonidae: Everts 2.

Bostrychidae: Everts 2, Lesne 5.

Anobiidae: Everts 2, Pic & Pic 1, Reitter 38.

Cissidae: Reitter 38.

Tenebrionidae: Desbrochers 5, Everts 2, Reitter 6, 37, Ssamenow 3.

Alleculidae: Csiki 3, Desbrochers 3, Everts 2.

Lagriidae: Everts 2.

Melandryidae: Everts 2.

Oedemeridae: Everts 2.

Pythonidae: Everts 2.

Mycteridae: Everts 2.

Euglenidae: Everts 2.

Mordellidae: Everts 2.

Scraptiidae: Everts 2.

Pedilidae: Reitter 15.

Anthicidae: Everts 2, Pic 13.

Pyrochroidae: Everts 2.

Meloidae: Everts 2, Fall 4.

Rhipiphoridae: Everts 2.

Curculionidae: Desbrochers 1, Petri 1, 2, Pic 37, Reitter 9, 19, 27, Schilsky 2.

Scolytidae: Barbey 1, 2.

Bruchidae: Bedel 4.

Cerambycidae: Everts 2, Gahan 1, Monnot & Houlbert 1, Reitter 8.

Chrysomelidae: Blackburn 1, Everts 2, Jacobson 6, Reitter 3, 13, Weise 12.

d) Einzelbeschreibungen: Abeille 2, 3, Apfelbeck 1, 2, 3, Arrow 1, 4—7, Bedel 3, Bedel & Bourgeois 1, Belon 1, 3, 5, Berg 1, Bernhauer 1, 3—7, Bickhardt 1, Blackburn 2, Boileau 1—5, Born 3, 4, Bouchard 1, Bourgeois 2, 4, Buysson 1, Champion 3, 4, 9, Chobaut 1, 2, 3, Csiki 1, 7, Desbrochers 2, 4, Deville 1, 2, Donisthorpe 7, Dury 1, Elliott 1, Ellis 2, Enderlein 1, Fairmaire 1—6, Fall 1, 3, 4, Fauvel 1, 2, Felsche 1, 2, 4, Fleischer 1, Fleutiaux 4, Friedrichs 1, 2, Fuente 1, Ganglbauer 1, 2, Gerhardt 1, 4, 5, 6, 7, Glasunow 1, Gorham 2, 3, Grouvelle 1, Harris 2, Hayward 1, Heller 1, 2, Heyne 1, Horn 1, 3, 5, Jacobson 1 a, 2, 3, Jacoby 2—5, Jakowleff 2—7, Janson 1, Jordan 1, 2, König 1, Kolbe 2, 3, 5, Kubik 1, Lauffer 1, Lea 2, Leinberg 1—4, Lesne 2, 3, Lèveillé 1, Lewis 2, 3, Lokay 1, Luze 2, 2a, Martinez Esalera 1, 2, 3, Meyer-Darcis 1, Möllenkamp 1, 2, Moser 1, 2, J. Müller 3, Nicolas 1, Normand 1, Ohaus 3, 5, 6, Oberthür 1, Olivier 1, Penecke 1, Peyerimhoff 1, 3, Peyerimhoff & Deville 1, Pic 1, 2, 5—9, 12, 16, 17, 18, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 36, 37a, 38, 48—52, Raffray 1—4, Régimbart 1, 2, Reitter 1, 5, 11, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 39, Ritsema 1, 2, 3, Rybinski 1, Schenkling 1, Schilsky 1, 3, Schultze 1—7, H. Schulz 1, O. Schwarz 1, 2, 4—9, D. Sharp 2, Sloane 1, Spaeth 1, 2, 3, Ssamenow 1, 6, 10, Stierlin 1, 2, Sumanow 1, 2, Therese 1, Thery 1, 2, 3, Tschitscherin 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, Vauloger 1, Villard 1, Viturat 3, Voigts 1, Wasmann 2, Waterhouse 1, Webb 1, Weise 1—5, 7—10, 13, 15, Wickham 1.

III. Descendenztheorie.

a) Phylogenie: Lameere 2, Porta 3, Schröder 39, Wasmann 3.

Lameere behandelt die „Phylogenie“ der *Cerambyciden* oder richtiger gesagt das natürliche System der *Cerambyciden* nach phylogenetischen Grundlagen. Siehe Systematik pag. 112.

Porta will die *Curculioniden* von den *Pythoniden* (*Mycterus*) und *Oedermeriden*, die *Scarabaeiden* aber von den *Meloiden* und diese von den *Strepsipteren* ableiten.

Schröder (31) untersuchte durch Experimente die Ontogenie der Ausfärbung bei *Coccinella bipunctata* u. bei 11 ihrer Varietäten u. zog hieraus Schlüsse auf die Phylogenie derselben. Der Haupttheil der Arbeit gehört in das folgende Jahr.

Wasmann (3) entwarf den Stammbaum der *Dinarda*-Arten (p. 707) u. behandelte ausführlich die Art ihrer Entstehung (p. 691—711), auch die anderer *Aleocharinen* (p. 737—742).

b) Schutzfärbung u. Mimicry: Donisthorpe 9, Fowler 2.

Donisthorpe besprach zahlreiche britische Arten verschiedener Familien in Bezug auf Schutzfärbung, spezielle Anpassung und Mimicry.

Fowler berücksichtigte in seiner Rede über Schutzfärbung und Mimikry auch zahlreiche *Coleopteren*. Siehe Allg p. 39.

c) Variabilität: Meek 1, Schröder 39.

Meek machte statistische Untersuchungen über Varietäten des *Lucanus placidus* und **Schröder** über die der *Adalia bipunctata*.

d) Missbildungen: Donkier 1, Giard 1, Rothenburg 1, Tornier 1, 2.

Donkier berichtete über einen Fall von Doppelbildungen an Beinen bei einem *Ptycholaemus* (*Ceram.*), **Giard** erinnerte an ähnliche Funde Bateson's (1894) bei *Prionus*, und **Rothenburg** berichtete über einige Monstrositäten an *Lucaniden*.

Tornier stellte Versuche über künstliche Erzeugung von Missbildungen an *Tenebrio molitor* an.

e) Erbllichkeit: Schröder 39.

Schröder machte (z. Th. statistische) Untersuchungen über die Konstanz der Vererbung bei Varietäten von *Adalia bipunctata*.

IV. Morphologie (äussere u. innere), Histologie, Physiologie, Embryologie.

a) Allgemeines: Berlese 1, Bordas 1, Curreri 1, Deegener 1, Dierckx 1, Escherich 12, Everts 1, Giardina 1, Gorka 1, 2, Hesse 1, 2, Hinds 1, Holmgren 1, 2, Kaditsch 1, Kempers 1, Kletke 1, Kolbe 1, Launoy 1, Meijere 1, Prowazek 1, Régimbart 3, Reuleaux 1, Tornier 1, 2, Vignon 1.

Berlese untersuchte *Ocypus*, *Aphodius terrestris*, *Dermestes vulpinus*, *Hesperophanes cinereus*, *Sitodrepa panicea*, *Lampyris noctiluca*, *Coccinella septempunctata* auf die Veränderungen des Fettkörpers und des Muskelgewebes während des Puppenzustandes.

Bordas untersuchte den Verdauungsapparat der *Dytisciden*. Siehe *Dytiscidae*.

Curreri behandelte die Athmung einiger Wasser-Insekten, unter denen nach Sharp auch *Coleopteren*.

Deegener brachte bei Gelegenheit einer Berichtigung noch einige Angaben über die Entwicklung der Mundwerkzeuge und des Darmkanals von *Hydrophilus piceus*.

Dierekx untersuchte die Pygidialdrüsen bei *Carabiden*, *Paussiden*, *Cicindeliden* und *Staphyliniden*. Siehe auch Systematik pag. 111.

Escherich (12) behandelte die Entwicklung des Darmkanals von *Hydrophilus piceus* im Gegensatz zu Degener's Darlegung (1900, 1) u. im Einklang mit Heider 1898.

Everts untersuchte die Duftabsonderungen bei *Aromia moschata* und bei *Chrysomeliden*-Larven.

Giardina gab eine eingehende histologische Schilderung der Eibildung bei *Dytiscus*.

Hesse (1) schilderte die Larvenaugen von *Dytiscus* (p. 400—401, tab. XVIII fig. 48—52), die Komplexaugen von *Dytiscus* u. *Hydrophilus* (p. 418—434, 448—464 gelegentlich erwähnt) und erwähnte (2) auch die einfachen Augen der *Coleopteren*-Larven.

Gorka (1, 2) untersuchte an 110 Arten verschiedener Familien die Bildung des Darmkanals u. charakterisirte hiernach 6 Haupttypen. Vergl. Systematische Fragen p. 111.

Hinds untersuchte experimentell die Kräfte von *Passalus cornutus*.

Holmgren (1) untersuchte die Hoden und die Spermabildung bei *Silpha* u. (2) bei *Staphylinus*, und **Prowazek** die bei *Oryctes*.

Kaditsch untersuchte die Unterlippe bei *Necrophorus vespillo* (p. 10—14), *Carabus cancellatus* (p. 15—17, fig. 1 u. 2), *Melolontha vulgaris* (p. 17—19, fig. 3 u. 4), *Agabus guttatus* (p. 19—20, fig. 5 u. 6) und wies die Homologie der einzelnen Theile mit denen der Unterlippe von *Periplaneta orientalis* sehr gut nach. Wenn (nach Newport's Vorgang bei *Hydrophilus piceus*, was der Autor nicht erwähnt) ein Theil der Gula als „submentum“ mit zum labium gezogen wird, so mag das sammt der Benennung zulässig sein. Wenn jedoch weiterhin die alten Benennungen für mentum und ligula durch neue ersetzt werden sollen und zwar nur, weil bei *Periplaneta* diese Umbenennung (auch ganz ohne Grund) beliebt wurde, so muss dagegen energisch protestirt werden. Siehe Allgem. pag. 40.

Kempers schilderte die Flügel in den Familien der *Scarabaeiden*—*Oedermeriden*.

Kletke handelte über die Athmung von *Hydrophilus piceus*.

Kolbe (1) stellte eingehende vergleichend morphologische Forschungen an *Coleopteren* aller Familien an u. zwar besonders in Bezug auf die Fühler (p. 91—93), die Maxillen (p. 93—94), die Kehle (p. 94—95), die Thoracalsegmente (p. 95—96), die Coxalgruben (p. 96—98), das Flügelgeäder (p. 98—112), die Coxen (p. 113—114), die Trochanteren (p. 114), die Tarsen (p. 114—115), das Abdomen (p. 116—119), die ventrale Ganglienketten (p. 122—123), die Ovarien (p. 124—125), die Malpighischen Gefäße (p. 125—126), und gründete hierauf ein neues System der *Coleopteren* (p. 127—145). Vergl. Systematik pag. 111.

Launoy (1) untersuchte die lähmende Wirkung des Giftes von *Scolia hirta* auf die Muskulatur der Larve von *Cetonia aurata*.

Meijere (1) schilderte die Klauenbildung der Imagines an einigen Beispielen aus 8 Fam., und die der Larven an Beispielen aus 2 Fam. (*Dyt.*, *Meloid.*). Er erklärt das Wurzelstück der Klauen für ein sechstes Tarsenglied.

Régimbart (3) schilderte ein räthselhaftes Organ. (Siehe *Hydrophilus*).

Reuleaux (1) beschrieb die Sperrvorrichtungen an den Flügeldecken der Coleopteren u. besonders das „Spannwerk“ der Elateriden.

Tornier (1) machte Experimente über künstliche Erzeugung (1) von missgebildeten Flügeldecken an *Tenebrio molitor* und (2) von Bein- und Fühlerregeneration bei Käfern.

Vignon untersuchte histologisch die Epithelien der Larve von *Tenebrio molitor*.

b) **Pigment:** vacat.

c) **Leuchten und Gesichtssinn:** Bogdanow 1, P. Carus 1, Langley & Very 1.

Bogdanow siehe „Instinct“ pag. 119.

Carus und **Langley & Very** besprachen das Leuchten verschiedener Coleopteren.

d) **Töne und Gehör:** Babb 1.

Babb besprach die Stridulationsapparate von *Passalus cornutus*.

e) **Düfte und Geruchssinn:** Everts 1.

Everts siehe Allgemeine Morph. pag. 116.

f) **Geschlechtsunterschiede:** Arrow 4, Champion 9, Lesne 6, 9.

g) **Histologie der Metamorphose:** Anglas 1.

V. Biologie.

a) **Metamorphose:** Manger 1, Mayet 2, Poppius 1, Porta 2.

Manger besprach Einiges aus der Metamorphose von *Tenebrio molitor*.

Mayet schilderte die Metamorphose von *Onitis* und *Bubas*, **Poppius** die von *Phyllotreta armoraciae*, **Porta** die von *Zabrus tenebrioides*. Vergl. auch b) Larven etc.

b) **Larven, Eier, Puppen:** Barbey 1, 2, Blaisdell 1, Buffet 1, Chevalier 1, Dagget 1, Eichelbaum 1, 2, Ghigi 1, Giard 2, Gregson 1, 2, Günther 1, Jander 1, Kemp 1, Kew 1, Le Sénéchal 1, Meinert 1, Mjöberg 2, Peyerimhoff 4, Raspail 2, Rengel 1, Shelford 1, Tarnani 1, Weise 3, Xambeu 1—5, Zang 1, Brunn 1, Kolbe 2.

Barbey behandelte die Biologie der *Scolytiden* in umfassender Weise.

Brunn besprach die Larve einer *Mordella*

Kolbe (1) gab eine Uebersicht über die Larven aller Familien im Allgemeinen (p. 120—122) und Auskunft über die von Erichson beschriebene *Paussus*-Larve im Speciellen (p. 132).

Meinert gab eine vorzügliche Darstellung der Larven von 48 *Dytisciden*-Arten.

Xambeu (2) setzte seine Arbeit über die *Longicornia* fort.

Einzelbeschreibungen von Larven lieferten: **Chevalier** (*Mecaspis alternans*), **Eichelbaum** (*Catops Watsonis* u. *picipes*, *Atheta divisa* u. *amica*, *Cartodera filum*), **Ghigi** (*Luciola italica*), **Giard** (*Hypera Postinacae*), **Weise** (*Melasoma saliceti*), **Xambeu** (*Anobium paniceum* 3., *Nanophyes* 3a, *Onthophagus Amyntas* 4. u. zahlreiche andere (in 1. u. in 5.) wild durcheinander, die bei den einzelnen Familien aufgeführt sind.

Einzelbeschreibungen von Puppen oder Notizen über solche lieferten: **Blaisdell** (*Necrophilus hydrophiloides*), **Günther** (*Staphylinus nebulosus*), **Xambeu** in 1. u. 5.

Einzelbeschreibungen von Larven und Puppen lieferten: **Dagget** (*Prionus californicus*), **Weise** (*Haltica saliceti*, *Scymnus ater*) und **Xambeu** in 1. u. 5.

Notizen über Biologie von Larven geben: **Buffet** (*Crioceris*), **Gregson** (*Dermestes talpinus* u. *marmoratus*), **Jander** und **Le Sénéchal** (*Lucanus cervus*), **Kemp** (*Cassida equestris*), **Kew** (mehrere *Col.*), **Mjöberg** (*Hadrotoma*), **Peyerimhoff** (*Hydrocyphon deflexicollis*), **Rengel** (*Hydrophilus piceus*), **Shelford** (*Lyciden*), **Tarnani** (*Melolontha*), **Weise** (*Phytonomus*).

Ueber die Eierzahl von *Melolontha* berichtete **Raspail**, **Xambeu** (1, u. 5) beschrieb die Eier zahlreicher Arten.

Siehe auch a) „Metamorphose“ pag. 117 u. „Oeconomie“ pag. 119.

c) **Lebensweise, Nahrung, Vertilgung, Fortpflanzung:** Acloque 1, Albison 1, Alisch 1, Andersen 1, Barbey 1, 2, Baudisch 1, Bedel 2, Beguin 1, Bloomfield 1, Bogdanow 1, Bouchard 3, Buysson 2, Carpenter 1, Champion 2, Champion & Chapman 1, Douglas 1, Engmann 1, Fabre 1, Fleutiaux 2, Förster 1, Hagen 1, Hopkins 1, 2, Howard 1, Issel 1, 2, Krause 1, Lambertie 1—5, Lesne 1, Mac Dougall 1, 2, C. Marchal 1, Megnin 1, Ménégau 1, 2, Merkl 2, Müllenberger 1, Newstead 1, Ohaus 1, 4, Pic 4, Piffard 1, Ponselle 1, 2, Poujade 1, Rengel 1, Rupertsberger 1, Schloemp 1, W. Schulz, E. Schwarz 1, 2, 3, Shelford 1, Therese 1, Thornley 1, Timm 1, Treichel 1, Tutt 1, 3, 4, Viturat 1, Vogler 1, Ward 1, Wasmann 3, Webster 2, 3a, Weise 6, Wenzel 1.

Umfangreichere Darstellungen resp. Untersuchungen lieferten **Barbey** (*Scolytidae*), **Baudisch** (*Anobiini*), **Bogdanow** (Experimente an *Geotrupes*, *Aphodius* und *Sphaeridium*), **Champion & Chapman** (*Oreina*), **Engmann** und **Rengel** (*Hydrophilus piceus*), **Fabre** (*Geotrupes*), **Krause**, **Mc Dougall** 1 (*Pissodes*), 2. (*Scolytus multistriatus*), **Ménégau** (*Galeruca xanthomelaena*), **Newstead** (*Otiorynchus*, *Sitones*, *Necrophorus*, *Geotrupes* von Vögeln gefressen), **Schulz** (Mehrere *Col. Amazoniens*), **Therese** (Mehrere *Col. Südamerikas*), **Tutt** (Mehrere *Col.*), **Ward** (*Scarabaeus* bei den Egyptern, geschichtl.), **Wasmann** (Mehrere *Col.*, besonders *Dinarda*).

Die übrigen Autoren lieferten kürzere biologische Notizen. Vergl. auch „Oeconomie“ pag. 119.

Pic (4) machte eine Bemerkung über die Stellung von ♂ u. ♀ in der copula bei *Mylabris* u. *Malthinus*, gegen Gadeau 1900, 2. (p. 113).

d) **Instinct, Psychologie:** Bogdanow 1, Wasmann 3.

Bogdanow stellte Experimente über die Reaction auf Lichteindrücke an *Geotrupes*, *Aphodius* und *Sphaeridium* an

Wasman behandelte ausführlich die Entstehung der Instinkte der myrmecophilen Coleopteren.

e) **Myrmecophilie, Termitophilie:** Bernhauer 7, Donisthorpe 1, 8, Ponselle 1, Silvestri 1, Timm 1, Wasmann 2, 3.

Bernhauer beschrieb eine neue termitophile *Oxyroda* aus Madagascar, **Ponselle** gab eine Notiz über *Atemeles paradoxus*, **Silvestri** beschrieb 6 neue termitophile *Staphyliniden*, **Timm** berichtete über *Lomechusa*.

Donisthorpe berichtete (1) über die Fortschritte in der Kenntniss myrmecophiler Coleopteren, u. stellte (8) Experimente mit myrmecophilen Coleopteren an.

Wasmann (3) behandelt sehr ausführlich die *Dinarda*-Arten u. ihre Wirthe (p. 691—711) u. auch mehrere andere myrmecophile *Aleocharinen* (p. 737—742), *Claviger*, *Paussus* etc.

f) **Parasiten u. Parasitenwirthe:** Donisthorpe 3, Mégnin 1, Roman 1, Tarnani 1, Thaxter 1, Webster 7.

Donisthorpe berichtete über einen Parasiten von *Lytta vesicatoria*. — **Mégnin** berichtete über *Tenebrio molitor* als (wirklichen?) Parasiten. — **Roman** berichtete über *Apalus bimaculatus* als Parasiten von *Colletes cunicularia*. — **Tarnani** berichtete über die Parasiten der Larve von *Melolontha*. — **Webster** berichtete über den Curculioniden *Ampelogypter sesorostris*.

Thaxter's Untersuchungen über auf Insekten schmarotzende Pilze betreffen auch *Coleopteren* u. sind eine Fortsetzung seiner früheren Arbeit (1897, 1).

g) **Gallenerzeugung:** Gillanders 1, Pierre 1, 2, 3.

Gillanders besprach unter anderen Gallenerzeugern auch mehrere Coleopteren.

Pierre schilderte (1) die durch *Gymnetron netum*, (2) die durch *Ceutorhynchus griseus* und *atomus* und (3) andere Coleopteren erzeugten Gallen.

h) **Höhlenfauna:** Apfelbeck 1, J. Müller 2, Reitter 18, Viré 1.

Apfelbeck beschrieb 3 und **Reitter** einen neuen Höhlen-Silphiden und **Müller** gab eine umfassende Arbeit über Höhlen-Silphiden.

Viré gab eine Notiz über *Anophthalmus Fabianii*.

VI. Oeconomie.

a) **Schädlinge in Land- u. Forstwirtschaft:** Alisch 1, Barbey 1, 2, Baudisch 1, Buffa 1, Chevalier 1, Chittenden 1, Danysz & Wize 1, Donisthorpe 3, Eckstein 1, Faber 1, Froggatt 1, 2, Garman 1, Gesztes 1, Giard 2, Goethe 1, Hopkins 1, 2, 3, Koebele 1, Kolbe 2, Lampa 1, 5, Mally 1, Marty 1, Ménégauz 1, 2, 3, Mingaud 1, Mokrshezki 1, Müller 1, Mysslovsky 1, Nägele 1, Noël 2, Pasztor 1, Raspail 1, 2, Reh 1, Ribaga 1, 2, Ritzema-Bos 1, 2, Sajó 1, Schreiner 1, Schütte 1, Severin

1, Severin & Brichet 1, D. Sharp 4, Slingerland 1, Sprenger 1, Tarnani 1, 2, Theobald 1, Tryon 1, Vayssière 1, Waldwirthschaft Bulgarien, Webster 1, 3—7, Zehntner 1, Zirngiebl 1, Zürn 1.

Umfangreichere Arbeiten sind: **Barbey** (*Scolytiden*), **Baudisch** (*Anobiidae*), **Eckstein** (Literatur-Bericht), **Kolbe** 2. (Schädlinge des Affenbrodbaumes) (Gartenfeinde), **Lampa** 1. (mehrere Coleoptera), **Ménégaux** (*Galeruca xanthomelaena*), **Ribaga** (*Gymnetron tetrum*, *Rhynchites cribripennis*, *Tychius quinquepunctatus*), **Schreiner** (Obstschädlinge), **Waldwirthschaft** (Schaden durch *Tomicus*).

Die übrigen Autoren geben einzelne kürzere Notizen über schädliche Coleopteren.

b) **Anderweitige Schädlinge**: Gregson 1, 2, Lampa 2, Webster 2.

Lampa berichtet über *Lymexylon navale* in Schweden, **Webster** und **Gregson** über Dermestiden.

c) **Nützliche u. verwendete Coleopteren**: Ward 1, Webster 3, 4.

Ward gab historische Untersuchungen über die von den Egyptern verehrten *Scarabaeus*.

Webster stellte Versuche an nützliche *Coccinellen* aus Amerika nach Süd-Afrika und umgekehrt zu verpflanzen.

VII. Geographische Verbreitung.

a) **Circumpolare Fauna**: Sahlberg 1, 3.

b) **Paläarktische Fauna**.

1. Im Allgemeinen: Bernhauer 2, 6, Clouët 1, Desbrochers 1, Ganglbauer 1, Jakowleff 7, Pic 16, 17, 20, 21, 52, Pic & Pic 1, Régimbart 3, Reitter 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 23, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, Schilsky 2, 3, Schultze 2—6, Seidlitz 1, Ssamenow 2, 5, 8, Tschitscherin 15.
2. Europa: Abeille 3, 4, Alzona 1, Andersen 1, Apfelbeck 1—4, Bailey 1, 2, Barby 1, 2, Barthe, Beare 1, 3, 4, 7, 8, Bedel 1, 4, Bedwell 1, Béguin 1, Bennett 1, Bernhauer 3, Berriat 1, Bethune 2, Bial & Blondel & Coutures 1, Bickhardt 1, Born 1—4, Bourgeois 1, 3, Bouskell 1, Brooks 1, Browne 1, Brunn 1, Bysson 2, 3, Carret 2, Champion 1, 2, 3, 5—9, Chitty 1, Chobaut 3, 4, 5, Csiki 3—6, Davis 1, Day 1, 2, Delval 1, Desbrochers 3—6, Deville 1, 2, 3, Donisthorpe 2, 5, 6, 7, 8, Douglas 1, Eggers 1, Ellis 1, 2, Engelhardt 1, Escalera 1, 2, 3, Evans 1, Everts 2, Fauvel 8, Fischer 1, Fleischer 1, Fowler 1, Friedrichs 1, 2, 3, Fuente 1, Ganglbauer 2, 3, Gavoy 1, Gerhardt 1—7, Gesztes 1, Glasunow 1, Godfrey 1, Gorham 1, Grunack 1, Harwood 1, Helm 1, 2, Heyden 1, Hildt 1, Holland 1, Hormuzaki 1, 2, Houlbert 1, Hubenthal 1, Issel 1, 2, Ivanov 1, Jänner 1, Jaquet 1, Jaquet & Poncy,

- Jennings 1, Koca 1, Koltze 1, Kubik 1, Lambertie 1—5, Lampa 5, Lea 1, 2, Lederer 1, Leinberg 1—4, Le Sénéchal 1, Morley 1, 2, 3, J. Müller 1, 2, 3, Münster 1, Newbery 1, Nicolas 1, Olivier 1, Paganetti 1, 2, Penecke, Pérez 1, Peyerimhoff 1, 3, Peyerimhoff & Deville 1, Pic 6, 7, 33, 37b, 41, 43, 49, 50, Poncy 1, 2, Poppius 1—6, Quittard 1, Régimbart 2, Reitter 18, 20, 21, 24, 25, 27, 29, Reuter 1, Röben 1, Roman 1, Rottenbach 1, Rybinsky 1, Sahlberg 2, 4, 5, Schultze 1, 7, Schulz 1, O. Schwarz 1, Ssemenow 3, 6, D. Sharp 2, 3, 4, W. Sharp 1, 2, Sopp 1, Sparre 1, Stange 1, Stierlin 1, 2, Strand 1, 2, Thornley 1, Tomlin & Sopp 1, Treichel 1, Tschitscherin 7, Tutt 2, 3, 4, Uhagon 1, Viturat 2, Vodoz 1, 2, Warmier 1, Weise 6, 10, Wenzel 1, Wood 1.
3. Nordafrika: Abeille 2, Bedel 5, Bourgeois 2, Cameron 1, Chobaut 1, 2, Fauvel 6, 7, Grouvelle 1, Norman 1, Pic 2, 37a, 42, Thery 3, Vauloger 1.
4. Asien: Arrow 1, Belon 3, Bernhauer 1, Boileau 3, Buysson 1, Csiki 1, Desbrochers 2, Fauvel 2, 3, Fleutiaux 5, Jacobson 1a, 2, 3, Jakowleff 3, 4, 6, König 1, Lesne 7, Lokay 1, Mallasz 1, Marmottan 1, Mayet 1, 3, Merkl 1, Mjöberg 1, Pic 1, 18, 19, 24, 37, 37a, 47, 48, Régimbart 1, 4, Reitter 6, 14, 31, 36, 39, Schilsky 1, Ssemenow 1, 4, 7, Ssumakow 1, 2, Swinton 1, Tschitscherin 1, 5, 8, Weise 8.
- c) Indo-China: Arrow 1, 3, 4, Boileau 1, 2, 4, 5, Bouchard 3, Bourgeois 4, Clouët 1, Fairmaire 3, Felsche 1, 4, Förster 1, Gahan 1, Gestro 1, 2, Gorham 2, Hagen 1, Heller 2, Horn 1, Janson 1, Koningsberger & Zimmermann 1, Lesne 8, Meyer-Darcis 1, Möllenkamp 1, 2, Moser 1, 2, Ohaus 3, 6, Pic 51, Raffray 4, Ribaut 1, Ritsema 1, 2, 3, Schenkling 1, O. Schwarz 2, 5, 8, Spaeth 1, Tschitscherin 6, Weise 3, 5.
- d) Australien und stiller Ocean: Arrow 4, Blackburn 1, 2, Enderlein 1, Froggatt 1, 2, Heller 1, Horn 5, Jacoby 3, Kraatz 1, Möllenkamp 2, Ohaus 3, Régimbart 3, Schenkling 1, O. Schwarz 8, 9, Sloane 1, Tryon 1, Tschitscherin 10, 11, Weise 7.
- e) Afrika: Arrow 1, 4, 7, Bernhauer 4, Brenske 1, Clouët 1, Fairmaire 3a, Felsche 2, Gorham 3, Horn 5, Jacoby 2, 3, Jordan 1, 2, Kolbe 2—5, Moser 2, Obst 1, Ohaus 5, Raffray 1, 2, 3, O. Schwarz 8, Thery 1, 2, Tschitscherin 3, 10, 12, Villard 1, Weise 1, 9, 12, 13, 15.
- f) Madagascar: Arrow 1, 5, 6, Bernhauer 5, 7, Clouët 1, Fairmaire 1, 2, 4, 5, 6, Jacoby 4, Lèveillé 1, Pic 5, 9, O. Schwarz 7, Tschitscherin 11.
- g) Neoarctisch: Bernhauer 4, Dury 1, Fall 1, 3, 4, 5, Harris 1, 2, Hayward 1, Houghton 1, Howard 1, Hubbard 1, 2, Jacoby 5, Klages 1, Knaus 1, Pearsall 1, Schaeffer 1, 2, Schmitt 1, E. Schwarz 2, 3, Van Dyke 1, Webb 1, Webster 2, Wickham 1, 2.

- h) **Neotropisch u. Südamerika:** Berg 1, 2, Bernhauer 4, Blandford 1, Fauvel 1, 4, 5, Felsche 2, Fleutiaux 4, Germain 1, 2, 3, Horn 5, Jacoby 3, 5, Möllenkamp 2, Ohaus 1, 2, Pic 8, 26, 32, Porter 1, Régimbart 3, W. Schulz 1, O. Schwarz 6, 8, Therese 1, Tschitscherin 10, 11, 12, Waterhouse 2.

VIII. Palaeontologie.

Fliche 1, Fritsch 1, Meunier 1, Scudder 1, 2, 3.

D. Die behandelten Coleopteren nach Familien.

Fam. Cicindelidae.

Baer 2, Bedel 5, Blackburn 1, Bouchard 3, Dierckx 1, Fall 3, Fleutiaux 5, Hagen 1, Harris 1, Horn 1—6, Kolbe 1, Lesne 3, Schulz 1.

Morphologie.

Dierckx (1) untersuchte die Pygidialdrüsen an *Cicindela hybrida*, *C. campestris* u. *Derocrania Honorii* (p. 288—289, 296).

Kolbe (1) erörterte das Flügelgeäder der *Cicindeliden* (p. 104, 133). Die Form der Trochanteren nennt er primär (p. 114), während sie, wenigstens an den Hinterbeinen, stets ausgesprochen derivat ist.

Horn (2) besprach einige Punkte des Flügelgeäders der *Cicindeliden*, bildete den Flügel von *Pogonostomu pubescens* Lap. ab (p. 15 Fig.) und berichtete, dass die Flügel von *Ctenostoma Jekeli* u. *rugosum* stark verkürzt, die von *Ct. ichneumoneum* u. *unifasciatum* ganz rudimentär sind. Auch wies er Kolbe's Deutung des Flügelgeäders zurück. Vergl. Systematik p. 123.

Biologie.

Ueber mehrere Arten am unteren Amazonenstrom berichtete **Schulz** Berl. ent. Z. p. 322—324.

Ueber *Cic. longilabris*, *pupurea*, *repanda* u. *vulgaris* von Mt. Desert berichtete **Harris** (1).

Bouchard (3) gab biologische Notizen über *Cicindelen* auf Sumatra (p. 295—296).

Hagen (1) beobachtete, dass *Heptodonta Beckarii* (Sumatra) nur zu Fuss jagt und niemals fliegt.

Geographisches.

Baer (2) berichtete über die Verbreitung verschiedener *Cicindeliden* in Peru (p. 256—257).

Bedel (5) zählte 13 Arten aus Tunis auf (p. 1—4).

Fleutiaux (5) gab ein Verzeichniss der von Dr. Harmand in Japan gesammelten *Cicindeliden*.

Systematik.

Horn (2) prüfte Kolbe's neues System der Coleopteren in Bezug auf die Adephegen und wies u. A. Kolbe's Versuch, auf Grund des Flügelgeäder die Cicindeliden den Rhysodiden besonders zu nähern und von den übrigen Adephegen zu entfernen, als unhaltbar nach. Siehe auch Morphologie p. 122.

a) Umfassende Arbeiten.

Horn.

Revision der Cicindeliden.

(Deut. ent. Zeitschr. Beilage p. 33—64).

Fortsetzung von Horn 1898 (4), die 1. Gatt. der 2. Tribus *Collyridae*, welche *Collyris* u. *Tricondyla* umfasst, behandelnd. Die Gatt. wird in 2 Untergattungen, die aber nicht als solche bezeichnet werden¹⁾ getheilt, die beide neue Namen erhalten, während es sonst üblich ist, für eine der Untergattungen den alten Namen „i. sp.“ zu verwenden²⁾. Die beiden Gattungen der Tribus sind p. 35—36 unterschieden. Beschrieben werden nur die neuen Arten.

Die behandelten Arten.

Collyris (*Archicollyris* n. subg. p. 43) mit 6 Arten: *C. Dormeri* H., *C. Muiszechii* Chd., *C. longicollis* Fbr., *C. brevipennis* n. sp. (p. 44) Bombay, *C. Dohrnii* Chd., *C. subtilesulpta* n. sp. (p. 44) Ostindien.
C. (Neocollyris n. subg. p. 45) mit 90 Arten, v. d. 8 neu: *C. linearis* Sch. Goeb. var. *pronotalis* n. var. (p. 46) Birma, *C. Kollarii* n. sp. (p. 47) Ostindien, *C. carinifrons* n. sp. (p. 47), China, *C. clavipalpis* n. sp. (p. 50) Borneo, *C. apteroides* n. sp. (p. 59) Manipur, *C. foveifrons* n. sp. (p. 60) Assam, *C. ampullacea* n. sp. (p. 60) Basilan, *C. Richteri* n. sp. (p. 62) Borneo, *C. plicicollis* n. sp. (p. 63) Ost-Indien.

Einzelbeschreibungen.

Cicindela Juno n. sp. **Horn** (D. ent. Z. p. 355) Central-Afrika, *C. catopriola* n. sp. (p. 355) Australien, *C. Moseri* n. sp. (p. 356) Timor, *C. Bennignsenia* n. sp. (p. 357) Neu-Guinea, *C. virginialis* n. sp. (p. 358) Luzon. — *C. Jungii* n. sp. **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. 25. p. 15) Australien. — *C. heureka* n. sp. **Fall** (Ent. News XII p. 307) Californien. — *C. vulgaris* Say var. *roguënsis* n. var. **Harris** (Can. Ent. 33 p. 226) Oregon.
Collyris gigas n. sp. **Lesne** (Bull. Fr. p. 361) Süd-Amerika. — *C. brevilabris* Ar. var. *Weiersii* n. var. **Horn** (Ann. Belg. 45. p. 84) Sumatra — Siehe auch Horn oben.

¹⁾ In Folge dessen hat Sharp (Rec.) die eine derselben für eine Gattung gehalten.

²⁾ Die Wahl bleibt einem künftigen Monographen vorbehalten; denn dass Sharp (Rec. p. 114) die erste derselben auch dem Namen nach unterdrückt u. die 2. dafür als Gattung behandelt (ohne sie als nov. gen. zu bezeichnen), ist nicht maassgebend.

Otenostoma dentifrons n. sp. **Horn** (D. ent. Z. p. 353) Brasilien.

Langea n. gen. *Euryodini* **Horn** (D. ent. Z. p. 353) *euprosopides* n. sp. (p. 354) Peru.

Myrmecoptera Marshallana n. sp. **Horn** (D. ent. Z. p. 123) u. *M. polyhirmoides* var. *completa* n. var. (p. 123) Süd-Afrika.

Neocollyris siehe **Horn** p. 123.

Oxygonia uncifera n. nom. **Horn** (D. ent. Z. p. 124) für *O. floridula* Bat. ♂ u. *gloriola* Bat. ♀, *O. simplipennis* n. nom. (p. 124) für *O. gloriola* Bat. ♂ u. ? *floridula* Bat. ♀¹⁾.

Fam. Carabidae.

Arrow 1, Bedel 5, Blackburn 2, Boileau 1, Born 3, 4, Bouchard 1, 2, Buysson 2, Csiki 1, Deville 3, Dierckx 1, Fairmaire 1, 3, 4, 6, Friedrichs 2, Froggatt 2, Ganglbauer 3, Germain 1, Gestro 1, Glasunow 1, 3, Gorham 1, Hayward 1, Horn 2, Jakowlew 1, Kaditsch 1, Kubik 1, Kolbe 1, Mallasz 1, Morly 1, J. Müller 1, Obst 1, 2, Pic 30, Poppius 9, Porta 1, 2, Reitter 4, 14, 20, 21, 23, 32, 33, Reuter 1, Rybinski 1, Schaeffer 1, H. Schulz 1, W. Schulz 1, Scudder 1, 2, D. Sharp 2, Shelford 1, Sloane 1, Ssamenow 2, 5, 10, Tschitscherin 1—18, Viturat 3, Webb 1, Xambeu 1, Zang 1.

Morphologie.

Kolbe (1) erörterte das Flügelgeäder der *Carabiden* (p. 105—106) u. bildete den Flügel von *Calosoma sycophanta* ab (tab. II Fig. 16). Die Trochanterenform nannte Kolbe (p. 114) primär. Die *Carabiden* zeigen aber im Gegentheil eine ausgesprochen derivate Trochanterenform, wenigstens an den Hinterbeinen.

Dierckx (1) untersuchte die Pygidialdrüsen an *Pheropsophus Bohemani*, *Ph. bimaculatus*, *Argutor confinis*, *Brachynus crepitans*, *Br. sclopeta*, *Br. promontorii*, *Br. pygmaeus*, *Anchomenus* spp., die nicht bombardiren (gegen Perty), *Calosoma sycophanta*, *Elaphrus cupreus*, *Notiophilus*, *Loricera*, *Nebria picicornis*, *Carenum* spp., *Clivina* (von *Scaritini* sehr verschieden! p. 269) *Steropus madidus*, *Stomis pumicatus*, *Pristonychus terricola*, *Broscus cephalotes*, *Orthogenius Schaumii*, *Chlaenius* spp. (p. 271) u. erörterte die Classification der *Carabidae* nach den Pygidial-Drüsen (p. 271—282, 293—295).

Kaditsch schilderte die Unterlippe von *Carabus cancellatus* (p. 15—17 Fig. 1 u. 2). Siehe Morphologie p. 116.

Biologie.

Ueber mehrere Arten am unteren Amazonenstrom berichtete **W. Schulz** (Berl. ent. Z. p. 324—326).

¹⁾ Die Einführung neuer Namen ist hier nicht durchaus nothwendig, da man in solchen Fällen die Namen der ♂♂ beizubehalten pflegt.

Zang (1) beschrieb die Eier und die Larve von *Carabus nemoralis*.

Porta (2) beschrieb die Entwicklung von *Zabrus tenebrioides*.

Morly (1) gab biologische Notizen über *Harpalus Fröhlichii* in England.

Froggatt (2) (Agr. Gaz. XII p. 1203) berichtete über *Eury-scaphus lobicollis*.

Shelford (1) schilderte die Lebensgewohnheiten von *Mormolyce phyllodes*.

Reuter (1) berichtete über einen „Larvenregen“ in Finnland auf eine schneebedeckte Wiese, wobei es sich vielleicht um Carabidenlarven handelte.

Xamheu (1) beschrieb das Ei von *Chlaenius fulgidicollis* (p. 13) u. von *Calathus punctipennis* (p. 50), die Larve von *Elaphrus uliginosus* var. *pyrenaeus* (p. 45), *Pterost. Xatartii* (p. 51) u. *Trechus obtusus* (p. 58), das Ei und die Larve von *Procrustes coriaceus* (p. 53).

Geographische Verbreitung.

Poppius (9) fand *Bembidium lapponicum* und *Nebria Gyllen-hali* var. *Balbi* in Finnland.

Jakowlew (1) führte *Carabus Loschnikowii* Fisch. aus dem Gouvernement Wjätka auf.

Bedel (5) zählte 273 Arten aus Tunis auf (p. 4—55) u. beschrieb 1 *Bembidium* u. 1 *Dromius* n. varr. (Vergl. Einzelbeschr.).

Palaeontologie.

Scudder (1) beschrieb 20 Arten, von denen 1 *Platynus* neu, u. (2) 1 *Loricera*, 1 *Nebria*, 6 *Bembidium*, 2 *Patrobus*, 1 *Pterostichus*, 1 *Badister*, 4 *Platynus*, 1 *Harpalus* n. spp. Siehe Einzelbeschr.

Systematik.

Horn (2) wies nach, dass die *Carabiden* von den *Cicindeliden* nicht auf Grund des Flügelgeäders getrennt werden können, wie Kolbe es versucht hat (p. 15).

Bouchard (2) trat (mit Recht) für den Gattungsnamen *Feronia* Latr. ein gegen *Tschitscherin* (p. 170—171).

Umfassende Arbeiten.

Ganglbauer.

Der Artenumfang in der *Orinocarabus*-Gruppe und nomenklatorische Vorschläge.

(Mitth. Zool. bot. Ges. 1901, p. 791—798).

Eine umfassende Besprechung der Arten der Untergatt. *Orinocarabus*, welche der Autor auf 4 (*concolor* Fbr., *alpestris* St., *carinthiacus* St., *Latreillei* Dej.) reducirt wissen will. Zugleich schlägt

er eine neue Art der Bezeichnung von Varietäten u. Subvarietäten vor. (Vergl. Nomenclatur pag. 111).

Die 4 behandelten Arten u. ihre Varietäten.

Carabus (Orinocarabus) Latreillei Dej.

Carabus (Orinoc.) carinthiacus St.

Carabus (Orinoc.) alpestris St. mit ab. *illyricus* Kr., mit var. *Hoppei* Germ. (= *brevicornis* Kr.) nebst ab. *puncticollis* Kr. u. nebst subvar. *tyrolensis* Kr. und var. *Bertolinii* Kr.

Carabus (Orinoc.) concolor Fbr. mit var. *silvestris* Pz. nebst subvar. *Haberfelneri* Gyll. u. subvar. *nivosus* Heer (= *nivalis* Heer), var. *transsylvanicus* Dej., var. *Redtenbacheri* Géh. (= *angustatus* Redt.), var. *castanopterus* Vill. (= *lombardus* Kr.), var. *alpinus* Dej. (= *concolor* Kr.) nebst subvar. *bernhardinus* Kr., subvar. *bornensis* Born, subvar. *mimetes* Kr. u. subvar. *amplicollis* Kr. (= *mimethes* Born), var. *cenisius* Kr. (= *Sellae* Kr.) nebst subvar. *heteromorphus* Dan. (= *Putzeysianus* Born), subvar. *sturensis* Born, subvar. *ceresianus* Born u. *fenestrellianus* Beut., var. *Fairmairei* Thms. (= *Baudii* Kr.), var. *Putzeysianus* Géh. (= *maritimus* Sch. = *Putzeysi* Thms.) nebst subvar. *omensis* Born, subvar. *tendanus* Born u. subvar. *pedemontanus* Gglb. (= *Putzeysianus* Kr.).

Germain.

Apuntes Entomologicos. Datos sobre el Género *Cnemalobus* (Guérin). I descripción de las de sus especies halladas en Chile por el autor.

(Anal. Univ. Chil. CVIII. 1901. p. 175—192).

Eine umfassende Revision der chilenischen Arten der Gattung *Cnemalobus*. Es werden 6 Arten dichotomisch aus einander gesetzt (p. 182) und dann einzeln ausführlich beschrieben. Als Einleitung werden die verwandten Gattungen *Cnemacanthus*, *Scelodontis* (= *Odonotoscelis*) und *Scaritidea* besprochen (p. 175—181).

Die behandelten Arten.

Cnemalobus striatus Guér. (p. 183), *Cn. obscurus* Br. (= *cyaneus* Br. = *tentyrioides* Curt.) (p. 184), *Cn. Germainii* Putz. (p. 185), *Cn. cyaneus* Putz. (p. 186), *Cn. convexus* n. sp. (p. 182, 190) Coquimbo, *Cn. araucanus* n. sp. (p. 182, 191) Bio-Bio.

Glasunow.

(Uebersicht der zweifarbigen mittelasiatischen Arten der Gatt. *Nebria*) Revisio specierum bicolorium generis *Nebria* in Asia media habitantium.

(Hor. ross. 35. p. 467—493. tab. II).

Eine sorgfältige Auseinandersetzung von 8 Arten mit zahlreichen Varietäten. Nur die Einleitung ist russisch (p. 467—473), die dichotomische Tabelle (p. 473—477) sowie die ausführlichen Beschreibungen sind lateinisch.

Die behandelten Arten.

Nebria psammophila Slsk. (p. 478 tab. II fig. 1) mit var. *subalpina* n. var. (p. 474, 479 fig. 2), var. *oreophila* n. var. (p. 474, 480 fig. 3), var. *humerosa* n. var. (p. 474, 480 fig. 4), var. *transcaspica* n. var. (p. 474, 481 fig. 5), *N. psammodes* Ross. (p. 478 nota), *N. limbiger* Slsk. (p. 481 fig. 6) mit var. *alei*ensis n. var. (p. 475, 482), var. *picta* Sem., var. *kandshutica* n. var. (p. 475, 483 fig. 7), *N. Koslowii* n. sp. (p. 475, 484 fig. 8), *N. sublivida* Sem. (fig. 9), *N. Grombcezewskyi* Sem. (fig. 10), *N. ambigua* n. sp. (p. 476, 487 fig. 11), *N. Grumii* n. sp. (p. 477, 488 fig. 12), *N. Haberhaueri* Heyd. fig. 13 (= *N. Glasunowii* Tschit.), *N. perlonga* Heyd. (fig. 14).

Mallász.

Studien über ungarische Caraben. I. Ueber *Carabus obsoletus* und dessen Verwandte. Pest 1901. 24 pp.

Eine dichotomische Auseinandersetzung von 2 Arten, die eine mit 3, die andere mit 2 Varietäten, von denen die neuen erst hier als n. var. zu bezeichnen sind, da sie bisher nur nom. i. lit. hatten.¹⁾

Die behandelten Arten.

Carabus (Loxocarabus) obsoletus St. mit var. *Csikii* n. var. (p. 13, 17), var. *Sacheri* Thms. u. var. *euchromus* Pall., *C. procerus* Bielz (= *nagyagensis* BIRTH.) und var. *fossulifer* Fleisch. u. var. *Pruneri* n. var. (p. 14, 23).

Obst.

Synopsis der Coleopteren-Gattung *Anthia* Weber.

(Arch. Nat. 1901 Festschr. f. Martens p. ? Sep. 34 pp.)

Eine Revision der Gattung, in welcher 64 Arten in 6 Untergattungen vertheilt und dichotomisch aus einander gesetzt werden. Verunstaltet ist die Arbeit durch die den Amerikanern und Engländern nachgeahmte Manier, alle Artnamen klein zu schreiben, auch wo es orthographisch unzulässig ist. Die neue Mode, die Varietäten Subspecies zu nennen, kann eher als harmloseres Vergnügen bezeichnet werden, obgleich gerade hierbei das Unpraktische dieser Neuerung sehr schön zu Tage tritt, indem der Autor (oder der Setzer?) die Bezeichnung „spec.“ u. „subspec.“ einmal wechselt, was bei der alten Bezeichnung nicht hätte geschehen können (Vergl. *affinis*). Die Seitenzahlen des Originalen sind aus den Separaten nicht zu ersehen.

Die behandelten Arten.

Anthia (Termophila) Hopei Luc., *A. hexasticta* Gerst., *A. Hedenborgii* Boh., *A. Nimrod* Fbr., *A. galla* Thoms., *A. bella* n. sp. (p. 4, 13) Togo, *A. alternata* Bat., *A. massilicata* Guér. mit var. *Fornasinii* Bert., var. *Hildebrandtii* Har., var. *Stygne* Klb. u. var. *Gorge* Klb., *A. Burchellii* Hop. mit var. *Petersii* Klg. u. var. *brevivittata* n. var. (p. 10, 14), *A. praesignis* Bat.,

¹⁾ Vergl. Bericht pro 1900 p. 137.

A. homoplata Lequ. mit var. *parva* n. var. (p. 2, 14) u. var. *modesta* n. var. (p. 3), *A. crudelis* Har., *A. Westermanni* Dohrn, *A. Andersonis* Chaud., *A. venator* Fbr., *A. decemguttata* L., *A. duodecimguttata* Bon., *A. sexmaculata*, Fbr., *A. marginata* Dej., *A. adelpha* Thms., *A. sulcata* Fbr., *A. variabilis* n. sp. (p. 3, 16) mit var. *simplex* n. var. (p. 4), *A. biguttata* Bon. mit var. *affinis* n. var. (p. 2, 16¹), *A. limbata* Dej., *A. mima* Pér., *A. aequilatera* Kl. mit var. *capillata* n. var. (p. 6, 17), *A. cephalotes* Guér., *A. bimaculata* Perr., *A. Kolbei* n. sp. (p. 5, 17) Südafrika, *A. binotata* Perr., *A. parallela* n. sp. (p. 4, 17) Capland, *A. desertorum* Thms.

A. (Chilanthia n. subg. p. 10) *cavernosa* Gerst.

A. (Anthia i. sp.) *Lunae* Thms., *A. tomentosa* Chaud., *A. Martensii* n. sp. (p. 8, 18) Deutsch-Ostafrika mit var. *fallax* n. var. (p. 9), *A. artemis* Gerst., *A. Bordasii* Rog., *A. adulatrix* Klb., *A. bucolica* Klb. (fig. 2) mit var. *angulata* n. var. (p. 9, 20 fig. 3), *A. maxillosa* Fbr., *A. algoa* Pér., *A. pachyoma* Chaud., *A. Georgeri* Anc., *A. cinctipennis* Lequ., *A. Actaeon* Er., *A. ooptera* Bat., *A. dissimilis* n. sp. (p. 6, 20) Deutsch-Ostafrika, *A. thoracica* Fbr. mit var. *portentosa* Dohrn, *A. circumscripta* Kl., *A. omostigma* Chaud., *A. niveicincta* Bat., *A. ferox* Thms.

A. (Pachymorpha Hop.) *sexguttata* Hop., *A. Mannerheimii* Chaud.

A. (Odonthantia n. subg. p. 11) *calida* Har.

A. (Calanthia n. subg. p. 11) *pulcherrima* Bat., *A. Ida* Kolbe.

Porta.

Studio critico e classificazione delle specie appartenente al Sottog. *Abacopercus* Gangl. e al Sottog. *Percus* Bon.

(Bull. Soc. ent. Ital. 38. p. 104—132.)

Es wird die ganze Gattung *Abax* incl. *Percus* einer dichotomischen Auseinandersetzung von 4 Untergattungen und 33 Arten unterworfen (p. 109—116), u. der Bestand der genannten 2 Untergatt. näher erörtert (p. 117—130), wobei 1 Art u. 1 Varität neu beschrieben sind.

Die behandelten Arten.

Abax (i. sp.) mit 13 Arten (p. 110—111), *A. (Apacopercus)* mit 3 Arten (p. 112—113), *A. (Percus)* mit 11 sp. (p. 113—115), v. d. 1 neu: *A. siculus* Dej. var. *elongatus* n. var. (p. 115, 129) Sardinien, *A. ellipticus* n. sp. (p. 115, 129) Sardinien, *A. (Pseudopercus)* mit 5 Arten (p. 116).

Reitter.

Uebersicht der *Odontocarus*-Arten aus der Verwandtschaft des *chodshenticus* Ball. aus Central-Asien.

(Wien. ent. Zeit. XX p. 112—113.)

Eine dichotomische Auseinandersetzung von 5 palaeartischen Arten, von denen 1 neu ist.

¹) pag. 2 ist *A. affinis* als subsp., pag. 16 dagegen als spec. bezeichnet.

Die behandelten Arten.

Odontocarus chodshenticus Ball. mit var. *usgentensis* Heyd., *O. propagator* n. sp. (p. 113) Bucharei, *O. Esau* Heyd., *O. Semenovii* Reitt.

Schaeffer.

Synopsis of the species of *Trechus*, with the description of a new species.

(Bull. Am. Mus. XIV p. 209—212 tab. 28.)

Eine Revision der Gattung, die in Nord-Amerika die überraschend geringe Zahl von 6 Arten aufweist, die dichotomisch aus einander gesetzt, beschrieben und abgebildet wurden.

Die behandelten Arten.

Trechus Barbarae Horn (tab. 28 fig. 6), *Tr. rubus* Fbr. (fig. 1), *Tr. chalybaeus* Dej. (fig. 2), *Tr. ovipennis* Mot. (fig. 3), *Tr. hydropiceus* Horn (fig. 4), *Tr. Carolinae* n. sp. (p. 210, 212, fig. 5).

Tschitscherin.

Genera des *Harpalini* des régions paléarctique et paléantarctique.

(Hor. ross. 35. p. 216—251.)

Eine umfassende dichotomische Darstellung der 49 Gattungen der *Ditomina* u. *Harpalina*, die zusammen gefasst und in 5 Subtribus vertheilt sind. Gegenüber der früheren, ähnlichen Arbeit des Autors (1900, 3) wird die jetzt „auf Bedel's Autorität hin berichtigte Stellung“ der Gattung *Dichivotrichus* besonders betont, dabei jedoch nicht gesagt, dass diese allein richtige Stellung der Gattung schon lange vor Bedel durch morphologische Begründung nachgewiesen worden ist. (Vergl. Fauna baltica 1875, Ganglbauer 1892, Reitter 1900).

Die behandelten Gattungen.

1. *Ditomini*. p. 220—228.

Dioces Men., *Carenochyrus* Solsk., *Bronislavia* Sem.

Carterocarus n. gen. (p. 222) für *Pachycarus Latreillei* Sol.

Chilotomus Chaud., *Ditomus* Bon. (= *Aristus* Latr.), *Pseudaristus* Reitt., *Carterus* Dej., *Eriotomus* Pioch.

Eriocypas n. gen. (p. 225) für *Ditomus caucasicus* Dej. u. *villosulus* Reiche.

Eucarterus Reitt., *Carterophonus* Ganglb.

Penthophonus Reitt. *Antonovii* n. sp. (p. 227) Transcapien, hierher auch *Ophonus*

Glasunowii Tsch. (p. 227).

Penthus Chaud., *Liochirus* Tsch.

2. *Daptini*.

Daptus Fisch.

3. *Harpalini* s. str.

Blusea Bed., *Heteracantha* Br.

Acinopus Dej. (subgg. *Acamastus* Sch., *Osimus* Mot., *Hoplacinopus* Sem., *Acinopus* i. sp., *Oedematicus* Bed.)

Nesacinopus Tsch., *Dregus* Mot., *Platymetopus* Dej.

Harpalus Latr. (subgg. *Macrophonus* n. subg. p. 233 für *H. oblongus* Sch., *Cephalophonus* Ganglb., *Ophonus* Steph., *Metophonus* Bed., *Eriophonus* n. subg. p. 235 für *H. grandiceps* Reitt., *Tachyophonus* n. subg. p. 235 für *Parophon. vigil* Tsch., *H. planicollis* Dej., *H. laeviceps* Men., *H. suturifer* Reitt., *H. mendax* Ross. u. (?) *H. zigzag* Costa, *Parophonus* Ganglb. mit *H. maculicornis* Dej., *H. hirsutulus* Dej. u. *H. interstitialis* Reitt., *Pseudophonus* Mot. mit *H. griseus* Pz., *H. pubescens* Müll., *H. ussuriensis* Chaud., *H. roninus* Bat. u. *H. Eous* n. sp. p. 236 Mandchurei u. Japan, *Cephalomorphus* Tsch., *Megalophonus* Tsch., *Pardileus* Goz., *Harpalophonus* Ganglb., *Cephalotyphis* n. subg. p. 238 für *H. Semenowii* n. sp. p. 238 Thibet, *Artabas* Goz., *Typsi-harpalus* n. subg. p. 240 für *H. punctatipennis* Ramb. u. *H. Bonvouloirii* Vuillfr., *Harpalus* i. sp. = *Epilharpalus* Reitt. = *Lasioharpalus* Reitt. = *Harpaloxys* Reitt. = *Asmerinx* Reitt. nec Tsch., *Amblystus* Reitt. = *Harpaloderus* Reitt. = *Harpalobius* Reitt. = *Pheuginus* Reitt., *Actephilus* Steph., *Phygas* Mot., *Microharpalus* n. subg. p. 241 für *H. nanalus* Tsch., *Microdes* Fald., *Lozophonus* Reitt., *Neopangus* Tsch., *Brachypangus* Tsch.).

Nesarpalus Bed., *Harpalobrachys* Tsch.

4. *Acupalpini*.

Amaroschesis Tsch., *Trichotichnus* Mor. (mit Subg. *Asmerinx* Tsch.), *Iridessus* Bat., *Lioloholus* Tsch., *Oxycentrus* Chaud., *Idiomelas* Tsch., *Anoplogenus* Chaud., *Stenolophus* Dej., *Egadroma* Mot., *Acupalpus* Latr., *Anthracus* Mot.

Liocellus n. gen. (p. 247) für *Harp. nigrinus* Dej. u. a. aus Nord-Amerika.

Tachycellus Mor. (mit subg. *Pselaphoxys* Tsch.), *Tetraplatypus* Tsch., *Bradycellus* Er.

Pelagophilus n. gen. (p. 249) für *Dichirotrichus punicus* Bed.

Trichocellus Ganglb. (mit subg. *Oreoxenus* Tsch. u. subg. *Cardiostenus* Tsch.), *Dichirotrichus* Duv.

5. *Anisodactylini*.

Diachromus Er., *Gynandromorphus* Dej., *Scybalicus* Sd., *Crasodactylus* Guér., *Anisodactylus* Dej. (mit subg. *Hexatrachus* Tsch.), *Acrogeniodon* Tsch.

Tschitscherin.

Notes sur les Platysmatini d'Australie.

(Hor. ross. 35 p. 502—534).

Die australischen *Feroniini**) werden einer eingehenden

*) Der Autor behauptet wiederholt, *Platysma* Bon. habe vor *Pterostichus* Bon. die Priorität. Dieses ist aber ein Irrthum; denn beide Namen sind durchaus gleichzeitig publicirt worden. Vergl. „Gesetze der entomologischen Nomenclatur“ § 15. Berl. ent. Zeit. 1858. Fauna balt. II u. transsylyv. 1891 p. XXIV.

Revision unterworfen (wobei einige allerdings nur sehr lückenhaft bekannt sind) und hierbei 11 Subtribus kurz, aber leider nicht dichotomisch, charakterisiert (p. 506—507), von denen die 1., 2., 3., 7., 8. u. 11. in Australien vertreten sind, und 3 (*Darodiliini*, *Cyphosomatini*, *Platysmatini*) eingehender behandelt werden.

Die behandelten Subtribus, Gattungen u. Arten.

1. *Drimostomini*. (p. 506).

Stomonaxus Mot., *Eurystomis* Chaud. u. noch unbeschriebene Gattungen. (p. 508).

2. *Darodiliini*. (p. 506).

Darodilia Cast. (= *Aulacocoelius* Chaud.): *D. longula* n. sp. (p. 509).

3. *Deliniini*. (p. 506).

Leiradira Cast., *Delinius* Westw. u. ? *Cyrtoderus* Hopa.

4. *Trigonostomini*. (p. 506).

Lesticus Dej.

5. *Abacetini*. (p. 506).

Abacetus Dej. u. ? *Pedimorphus* Chaud.

6. *Euchroini*. (p. 507).

Setalis Cast.

7. *Cyphosomatini*. (p. 506).

Cyphosoma Hop. (= *Cratogaster* Bl., *Pachidius* Ch., *Tibarisus* Cast.) mit 6 Arten.
p. 511—512.)

Liopasa Tsch. 1901 mit 1 Art.

8. *Platysmatini*. (p. 507).

Morphnos Schauf., *Prionophorus* Chaud., *Mecynognathus* Macl., *Paranurus* Tsch.
mit 2 spp.: *P. Macleayi* Sl. = *dilaticeps* Chd. (p. 515).

Nuridius Sl. mit 1 Art.

Nurus Mot. (*Pachymelas* n. subg. p. 517) *niger* Chd., *N. curtus* Ch., *N. (Nurus*
i. sp.) *imperialis* Sl., *N. brevis* Mot., *N. Atlas* Cast., dich. Tab. p. 517—519.

Trichosternus Chaud. (= *Homalosoma* Chd.) mit 3 subgg.: 1. subg. *Trichosternus*
i. sp.: *Tr. Renardii* Chd. (= *Hercules* Chd.), *Tr. Vigorsii* Gor. (= ? *alternans*
Sl.), *Tr. angulosus* Chd., *Tr. subvirens* Chd., 2. subg. *Omocycla* n. subg.
(p. 524): *Tr. obscuripennis* Macl., 3. subg. *Castelneaudia* Tsch.: *Tr. superbus*
Cast., *Tr. cyaneotinctus* Boisd., *Tr. porphyricus* Sl., *Tr. Hecate* Tsch. 1901,
Tr. cordatus Chd., *Tr. Wilsonis* Cast., *Tr. opacipennis* Macl., *Tr. nitidicollis*
Cast., *Tr. marginifer* Chd., *Tr. cyaneus* Cast. (= *episcopalis* Cast.).

9. *Abacomorphini*. (p. 507).

Abacomorphus Chd., *Setalidius* Chd., *Selenochilus* Chd.

10. *Sphodrosomini*. (p. 507).

Sphodrosomus Perr.

11. *Catadromini*. (p. 507).

Catadromus Macl.

Einzelbeschreibungen.

- Abacetus Voltae* n. sp. **Tschitscherin** (Rev. russ. I p. 40) Sudan, *A. Decorsei* n. sp. (p. 41) Madagascar, *A. mirulus* n. sp. (p. 42) Sudan, *A. Sarudnyi* n. sp. (p. 88 *Zarudnyi**) Persien. — *A. tenuimanus* n. sp. **Tschitscherin** Hor. ross. 35 p. 54) Sudan, *A. impictus* n. sp. (p. 57) Indien.
- Abacetini*, *Abacomorphus* siehe **Tschitscherin** pag. 131.
- Abacopercus*, *Abax* siehe **Porta** pag. 128.
- Acinopus*. Die Synonymie von 5 Arten erörterte **Ssemenow** (Rev. russ. I p. 137—142). — Siehe auch **Tschitscherin** pag. 130.
- Acmastes*, *Acrogeniodon*, *Actephilus*, *Acupalpus* siehe **Tschitscherin** pag. 130.
- Adelotopus micans* n. sp. **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. 25. p. 18) Australien. *A. Tasmaniae* n. sp. (p. 18**) Tasmanien, *A. criberimus* n. sp. (p. 19) Australien. Siehe auch *Silphomorpha*.
- Adrimus virens* n. sp. **Tschitscherin** (Hor. ross. 35 p. 58) Venezuela.
- Amaroschesis*, *Amblystus*, *Anaplogenus*, *Anisodactylus* siehe **Tschitscherin** pag. 130.
- Anophthalmus* siehe **Trechus**.
- Anthia* siehe **Obst** pag. 127. — *Anthracus* siehe **Tschitscherin** pag. 130.
- Apsaustodon* n. gen. **Tschitscherin** (Hor. ross. 35 p. 4), *A. segregatus* n. sp. (p. 5) Venezuela.
- Aptinus madecassus* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. 20 p. 132) Madagascar.
- Argutor velox* n. sp. **Tschitscherin** (Wien. ent. Zeit. XX p. 25) Turkestan.
- Aristus tenuesculptus* Solsk. = *lucidus* Reitt. = *Ditomus semicylindricus* Pioch. nach **Tschitscherin** (Rev. russ. I p. 142).
- Artabas*, *Asmerinx*, *Aulacocoelius* siehe **Tschitscherin** pag. 130, 131.
- Badister antecursor* n. sp. **Scudder** (Geol. Surv. Canad. II. 2. p. 75 tab. VII fig. 2) fossil in Canada.
- Bembidium (Testediolum) pyrenaicum* var. *carpetanum* n. var. **Sharp** (Ent. Mont. Mag. 37. p. 39) Sierra Guadarrama, u. var. *montanum* Ramb. (p. 38) Sierra Nevada. — *B. lunulatum* Fourcr. unterschied von *B. biguttatum* Fbr. **Friedrichs** (Ins. Börse 18. p. 59). — *B. (Principidium) Marthae* n. sp. **Reitter** (D. ent. Z. p. 177) Turkestan. — *B. Hobartii* n. sp. **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. 25 p. 123) Tasmanien, *B. wattense* n. sp. (p. 123) Victoria, dich. Tab. über 7 Arten (p. 122—123), *B. Mastersii* Slo. gehört zu *Cillemum* (p. 122). — *B. (Peryphus) Postae* n. sp. **Csiki** (Zichy II p. 101) Sibirien, *B. (Pekinium* n. subg.) *chinense* (p. 102) Peking. — *B. normannum* var. *Lais* n. var. **Bedel** (Cat. Tunis. p. 14) Tunis. — *B. aemulum* n. sp. **Hayward** (Tr. Am. ent. Soc. 27. p. 156), *B. Oberthürri* n. sp. (p. 158) Nord-Amerika. — *B. Haywardii* n. sp. **Scudder** (Geol. Surv. Canad. II. 2 p. 70 tab. VI fig. 3), *B. vestigium* n. sp. (p. 71 tab. VI fig. 4), *B. vanum* n. sp. (p. 71 tab. VI fig. 5), *B. praeteritum* n. sp. (p. 72 tab. VI fig. 6), *B. expletum* n. sp. (p. 72 tab. VII fig. 1), *B. damnosum* n. sp. (p. 73 tab. VII fig. 5) fossil in Canada.

*) Der Russe, dem die Art gewidmet sein soll, heisst nicht Царуднiй sondern Заруднiй, ist also deutsch u. lateinisch *Sarudnyi* zu schreiben.

**) Der Autor nennt die Art „*Tasmani*“, da er aber keinen Herrn *Tasman* nennt, dem die Art gewidmet sein könnte, wohl aber den Fundort *Tasmania*, so scheint obige Schreibart die einzig zulässige.

- Blechrus corticalis* ♂ beschrieb genauer **Reitter** (Wien. ent. Zeit. XX. p. 176).
— *Bl. vittatus* var. *pallidior* n. var. **Pic** (Ech. 17. p. 2) Jericho.
- Blennidus* siehe *Feronia*.
- Bleusea* siehe Tschitscherin pag. 130.
- Brachinus truncatulus* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 130), *Br. tenuicollis* n. sp. u. *Br. Perrieri* n. sp. (p. 13) Madagaskar. — *Br. ornatus* n. sp. **Fairmaire** (Not. Leyd. Mus. 23. p. 66) Madagaskar.
- Brachypangus* siehe Tschitscherin pag. 130.
- Bradycellus harpalinus* Dej. = *collaris* Payk. var. nach **Müller** (Wien. ent. Zeit. XX p. 139). — *Br. Koltzei* Reitt. = *Tetraplatypus (Pselaphoxyx) grandiceps* Bat. (*Tachycell.*) nach **Tschitscherin** (Hor. ross. 35 p. 149). — Siehe auch Tschitscherin p. 130.
- Bronislavia* siehe Tschitscherin pag. 129.
- Calanthia* siehe Obst p. 128.
- Callistominus hovanus* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 116) Madagaskar.
- Carabus (Orinocarabus) Fairmairei* Thoms. var. *onensis* n. var. **Born** (Verh. Zool. bot. Ges. Wien 1901 p. 522) Cottische Alpen. — *C. violaceus* var. *Fiorii* n. var. **Born** (Ins.-Börse 18. p. 91) Italien. — *C. cancellatus* var. *alessiensis* n. var. **Apfelbeck** (Soc. ent. XVI p. 121), *granulatus* var. *miridita* n. var. (p. 121). — *P. cancellatus* var. *sudeticus* n. var. **Schulz** (Soc. ent. XVI p. 122.) — *C. Henningii* var. *Roeschkei* n. var. u. *sajanicus* n. var. **Csiki** (Zich. II p. 101). — *C. versicolor* Triv. besprach **Müller** (Wien. ent. Zeit. p. 137). — *C. auronitens* var. *vindobonensis* n. var. **Kubik** (Ins. Börse 18. p. 291). — Siehe auch Ganglbauer pag. 125 u. Mallasz pag. 127.
- Cardiostenus cymindiformis* n. sp. **Reitter** (Wien. ent. Zeit. XX p. 157 tab. III fig. 1) Turkestan. — Siehe auch Tschitscherin pag. 130.
- Carenochypus, Carterocarus, Carterophonus, Carterus, Catadromus, Cephalomorphus, Cephalophonus, Cephalotypsis* siehe Tschitscherin pag. 129, 130, 131.
- Chalcochrous* siehe *Feronia*.
- Chilanthia* siehe Obst pag. 128.
- Chilotomus* siehe Tschitscherin pag. 129.
- Chlaenioidius* siehe *Feronia*
- Chlaenites spoliatus* var. *subpurpureus* n. var. **Reitter** (D. ent. Z. p. 65) Turkestan.
- Chlaenius tetrastigma* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 107), *Chl. Perrieri* n. sp. (p. 108), *Chl. Alluaudii* n. sp. (p. 109), *Chl. epipleuralis* n. sp., *Chl. inaequalis* n. sp. (p. 110), *Chl. lineicinctus* n. sp., *Chl. cupreolus* n. sp. (p. 111), *Chl. densaticollis* n. sp., *Chl. demissus* n. sp. (p. 112), *Chl. rysonotus* n. sp., *Chl. nitidifrons* n. sp. (p. 113), *Chl. strigipennis* n. sp., *Chl. pulchriceps* n. sp. (p. 114), *Chl. retropectus* n. sp., *Chl. tenuis* n. sp. (p. 115), *Chl. opaculus* n. sp. (p. 116) Madagaskar.
- Clivina eurenensis* Bl. = *denticollis* Sl. nach **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. p. 113). — *Cl. simplicifrons* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 105), *Cl. globithorax* n. sp. (p. 105), *Cl. pallitibia* n. sp. (p. 106) Madagaskar.
- Cnemalobus* siehe Germain pag. 126.
- Colpodes cupreatinctus* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 119), *C. callizonatus* n. sp. u. *C. cribrosus* n. sp. (p. 120) Madagaskar.
- Cophosomorpha* siehe *Feronia*.
- Crasodactylus, Cratogaster* siehe Tschitscherin pag. 130, 131.

- Cratognathus luridus* n. sp. **Fairmaire** (ibid. p. 118) Madagascar.
- Crepidopterus Vickii* n. sp. **Fairmaire** (ibid. p. 101) Madagascar. — *Cr. cordipennis* n. sp. **Fairmaire** (Not. Leyd. Mus. 23. p. 65) Madagascar.
- Cychropsis* siehe *Cychnus*.
- Cychnus punctipennis* n. sp. **Reitter** (Wien. ent. Zeit. 1901, p. 141) Herzegovina. — *C. sikkimensis* n. sp. **Fairmaire** (Bull. Fr. p. 265) Sikkim. — *C. (Cychropsis* n. subg.) **Boileau** (ibid. p. 350) für *C. sikkimensis* Frm. — *C. idahoensis* n. sp. **Webb** (Ent. News XII p. 133) Idaho, *C. relictus* Horn u. *C. regularis* Lec. besprochen (p. 134).
- Cyphosoma latum* Chaud. = *sulcatum* Blanch. nach **Tschitscherin** (Rev. russ. I p. 44). — Siehe auch **Tschitscherin** pag. 131.
- Cyrtoderus* siehe **Tschitscherin** pag. 131.
- Daptus*, *Darodilia*, *Delinius* siehe **Tschitscherin** pag. 129, 131.
- Demetrius atricapillus* var. *erythrocephalus* **Buysson** (Rev. Ent. XX p. 95) Frankreich.
- Diabaticus collaris* n. sp. **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. p. 25, p. 111) u. *D. pauper* n. sp. (p. 111) Tasmanien.
- Diabena* n. gen. (bei *Galerita*) **Fairmaire** (Bull. Fr. p. 94), *D. Perrieri* n. sp. (p. 94) Madagascar.
- Diachromus*, *Dichirotrichus*, *Diocetes* siehe **Tschitscherin** pag. 129, 130.
- Ditonus* siehe *Aristus* u. **Tschitscherin** pag. 129.
- Dregus* siehe **Tschitscherin** pag. 130.
- Drimostoma planipenne* n. sp. **Tschitscherin** (Hor. ross. 35. p. 1) Kamerun, *Dr. sculptile* n. sp. (p. 49) Congo.
- Drimostomini* siehe **Tschitscherin** pag. 131.
- Dromius uralensis* n. sp. **Semenow** (Hor. ross. 35. p. 253) Ural. — *Dr. sellatus* Mot. var. *lebioides* n. var. **Bedel** (Cat. Tunis p. 50) Tunis.
- Drypta curtipennis* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX, p. 127) Madagascar.
- Dyscherus ovulipennis* n. sp. **Fairmaire** (Not. Leyd. Mus. 23. p. 66) Madagascar.
- Ectrona elegans* n. sp. **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. 25 p. 107), *E. grave* n. sp., *E. fasciatum* Macl. (p. 108), *E. fragile* n. sp. (p. 110) Australien, dich. Tab. über 9 Arten (ibid. p. 110).
- Egadroma*, *Epiharpatus*, *Eriocypus*, *Eriophonus*, *Eriotomus*, *Eucarterus* siehe **Tschitscherin** pag. 129, 130.
- Eosteropus* siehe *Feronia*.
- Euchroini* siehe **Tschitscherin** pag. 131.
- Eudromus* unterschied von *Homalosoma* **Tschitscherin** (Hor. ross. 35, p. 38—41).
- Euleptus gracilis* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 119) Madagascar.
- Euprymira* n. nom. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 122) für *Prymira* Fairm.
- Eurystomis* siehe **Tschitscherin** pag. 131.
- Feronia* (*Oreolyperus* n. subg.) *Korolkowii* n. sp. **Tschitscherin** (Rev. russ. I p. 10) Caucasus, *F. (Cophosomorpha) sinuatangula* n. sp. (p. 45) Afrika, *F. (Chlaenioidius) caledonica* n. sp. (p. 46) Neu-Caledonien, *F. (Pterostichus) raptor* (p. 239), *F. (Pt.) compar* n. sp. (p. 242), *F. (Pt.) scurra* n. sp. (p. 242), u. *F. (Pt.) praedo* n. sp. (p. 244) Korea, *F. (Pt.) Orion* n. sp. (p. 246) Ost-Sibirien, *F. (Phaenoraphis* n. subg. p. 250) *acuspina* n. sp. (p. 248) Korea,

F. (Pt.) lombarda Dan. (= *Panzeri* var.?) (p. 257*), *F. (Chalcochrous) hera*** n. sp. **Tschitscherin** (Hor. ross. 35. p. 15) Kap. *F. (Blennidus) vancouveriensis* Chaud. nicht in Nord-Amerika, sondern in Peru (p. 72), *F. amoenula* Boh. gehört zu *Metacys* (p. 160), *F. trivialis* Boh. bildet eine neue Gattung (p. 161), *F. nigrina* gehört zu *Abacetus* (p. 164), *F. trivialis* Boh. zu *Argutoridius*, *F. insularis* Boh. zu *Blennidus* (p. 165), *F. (Pterost.) Ixion* n. sp. (p. 494), *F. (Pt.) rhanis* n. sp. (p. 497) u. *F. (Eosteropus) n. subg.* (p. 500) *crepera* n. sp. (p. 499 *Platysma*) Japan.

Gigadema rugaticolle n. sp. **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. 25. p. 16), *G. dux* n. sp. (p. 100), *G. longius* n. sp. u. *G. longicolle* n. sp. (p. 101) Australien, dichot. Tab. über 10 sp. (ibid. p. 102).

Gnathophanus. Die Synonymie erörterte **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. XXV p. 20).

Gynandromorphus siehe **Tschitscherin** pag. 130.

Haplamer insulicola n. sp. **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. 25, p. 114) Australien.

Haplobathymus n. gen. **Tschitscherin** (Hor. ross. 35 p. 66), *H. Gounellei* n. sp. p. 68). — *H. Paranae* n. sp. (Rev. russ. I p. 43) Süd-America.

Harpalini. Eintheilung in 5 Subtribus **Tschitscherin** Hor. ross. 35 p. 128—129. Siehe auch **Tschitscherin** pag. 130.

Harpalobius, *Harpalobrachus*, *Harpaloderus*, *Harpalophonus*, *Harpaloxys* siehe **Tschitscherin** pag. 130.

Harpalus ellipticus Ball. von *acuminatus* Motsch. verschieden nach **Tschitscherin** (Hor. ross. 35. p. 144) u. kommt in Europa vor, *H. acuminatus* Mot. = *optabilis* Dej. (p. 144), *H. pastus* Mén. = *reflexus* Putz., *H. pastus* Reitt. = *brevis* Mot. (p. 146), *H. skutiariensis* Reitt. = *tristis* Tsch. (p. 146), *H. bradycelloides* Reitt. = *pusillus* Mot., *H. pusillus* Reitt. = *mazareoides* Bat. (p. 147), *H. angulatus* Reitt. nec Putz. = *fugax* Fald. (p. 153), *H. decoloratus* Reitt. = *oblitus* Dej. var. *tingitanus* Fairm. (p. 153), *H. Satanus* Reitt. = *fuscipalpis*, *H. tingens* Reitt. = *flavicornis* var. *Scipio* Reitt., *H. Strasseri* Reitt. = *calathoides* Mot., *H. relator* Reitt. = *optabilis* Dej. (p. 154), *H. (Megalophonus) Phoenix* n. sp. (p. 584) Syrien?, *H. (Artabas) Petri* n. sp. (p. 596) Süd-Russland. — *H. (Erpeinus) Stierlinii* n. sp. **Poncey** (Bull. Soc. Buc. X p. 496) Rumänien. — *H. conditus* n. sp. **Scudder** (Geol. Surv. Canad. II. 2. p. 77 tab. VIII fig. 5) fossil in Canada. Siehe auch **Tschitscherin** pag. 130.

Heteracantha, *Hexatrichus* siehe **Tschitscherin** pag. 130.

Homalosoma Hecate n. sp. **Tschitscherin** (Hor. ross. 35, p. 13) Australien. — Siehe auch *Eudromus* u. **Tschitscherin** pag. 131.

Hoplacinopus siehe **Tschitscherin** pag. 130.

Hormacrus siehe *Lestignathus*.

*) Die Art wird fälschlich als „nov. sp.“ beschrieben, obgleich **Daniel's**, wenn auch fehlerhafte Beschreibung citirt u. kritisirt wird.

**) Ob der geehrte Autor die Art als „Herrin“ (*hera*) oder als „Juno“ (*Hera*) hat bezeichnen wollen, ist bei der unglücklichen Manier, alle Species-Namen klein zu schreiben, nicht zu erkennen. Ein ausgezeichneter Beweis für die Verwerflichkeit dieser neuen ganz unpraktischen Mode.

- Iridessus*, *Idiomelas* siehe Tschitscherin pag. 130.
- Lacardairia*. Mehrere Arten besprach **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. 25 p. 115).
- Lasioharpalus* siehe Tschitscherin pag. 130.
- Lebia syriaca* n. sp. **Pic** (Ech. 17 p. 57) Syrien. — *L. semicyanea* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 126), *L. stigmula* n. sp. (p. 126) Madagascar.
- Lebioderus Ritsemae* n. sp. **Gestro** (Not. Leyd. Mus. 23. p. 15) Sumatra.
- Lecanomerus obscurus* Bl. = *Stenolophus dingo* Cast. nach **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. 25 p. 115).
- Leiradira* siehe Tschitscherin pag. 131.
- Leistus punctatus* Reitt. = *spinibarbis* nach **Müller** (Wien. ent. Zeit. p. 138).
- Lesticus* siehe Tschitscherin pag. 131.
- Lestignathus minor* Bl. gehört zu *Hormacrus* nach **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. 25 p. 115).
- Liocellus*, *Liochirus*, *Liöholus* siehe Tschitscherin pag. 129, 130.
- Liopasa* n. gen. **Tschitscherin** (Hor. ross. 35 p. 6), *L. crepera* n. sp. (p. 8) Australien. — Siehe auch Tschitscherin p. 131.
- Lobobrachus alternans* n. sp. **Tschitscherin** (ibid. p. 2, 69) Brasilien.
- Loricera evita* n. sp. **Scudder** (Geol. Surv. Canad. II. 2. p. 70 tab. VI fig. 1.) fossil in Canada.
- Loxandrus ater* Tsch. ♂ beschreibt **Tschitscherin** (ibid. (p. 60), *L. Maindronis* n. sp. mit var. *terminatus* n. var. (p. 60), *L. guttula* n. sp. (p. 62), *L. notula* n. sp. u. *L. modicus* n. sp. (p. 64) Venezuela.
- Loxocarabus* siehe **Mallasz** pag. 127.
- Loxophonus* siehe Tschitscherin pag. 130.
- Macrochilus cribrarius* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 121) Madagascar.
- Macrophonus* siehe Tschitscherin pag. 130.
- Marsyas lampronotus* n. sp. **Tschitscherin** (Hor. ross. 35 p. 3) Brasilien.
- Masoreus quadricollis* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 121) Madagascar.
- Mecynognathus* siehe Tschitscherin pag. 131.
- Megalophonus* siehe *Harpalus* u. Tschitscherin p. 130.
- Metophonus*, *Microdes*, *Microharpalus* siehe Tschitscherin pag. 130.
- Microzaena* n. gen. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 106) *madecassa* n. sp. (p. 107) Madagascar.
- Morphnos Bestii* n. sp. **Sloane** (Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 26 p. 692) Australien. — Siehe auch Tschitscherin pag. 131.
- Nebria livida* var. *sibirica* n. var. **Csiki** (Zichy II p. 101) Sibirien. — *N. abstracta* n. sp. **Scudder** Geol. Surv. Canad. II. 2. p. 70 tab. VI fig. 2. Siehe auch **Glasunow** pag. 126.
- Neopangus*, *Nesacinopus*, *Nesarpalus* siehe Tschitscherin p. 130.
- Notiophilus bigeminus* Thms. unterschied von *N. aquaticus* L. **Friedrichs** (Ins. Börse 18. p. 59).
- Nuridius*, *Nurus* siehe Tschitscherin pag. 131.
- Nycteis tetrastigma* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 122), *N. latiuscula* n. sp. (p. 122), *N. postalalis* n. sp., *N. unicolor* n. sp., *N. scapulata* n. sp. (p. 123) Madagascar.
- Nyctecomorpha* n. gen. *mitomera* n. sp. **Fairmaire** (ibid. p. 124) Madagascar.
- Odontanthia* siehe **Obst** pag. 128.

Odontocarus siehe Reitter pag. 129.

Oedematicus siehe Tschitscherin pag. 130.

Omasus sylvaticus Blanch. = *Feronia (Holcaspis) pantomelas* Bl. (*Argutor*) nach Tschitscherin (Rev. russ. I p. 47).

Omphron limbatum var. *maculatipennis* n. var. **Pic** (Ech. 17 p. 9 *Epactius*) Loire.

Ophonus (Parophonus) vigil n. sp. **Tschitscherin** (Hor. ross. 35 p. 140) Syrien, dich. Tab. über 5 Arten (p. 139—140), *O. clypealis* Reitt. = *judaeus* Pioch. (p. 151), *O. pseudazureus* Reitt. = *azureus* (p. 152), *O. sulcifer* n. sp. (p. 586) Syrien, *O. brevicollis* Serv. var. *orienticola* n. var. (p. 591) Syrien u. *O. crebrior* n. var. (p. 592) Krimm, *O. amoenus* Reitt. = *minimus* Mot. (ibid. p. 595). — Siehe Tschitscherin pag. 130.

Orcolyperus siehe *Feronia*. — *Oreoxenus* siehe Tschitscherin pag. 130.

Orinocarabus siehe *Carabus* u. Ganglbauer pag. 125.

Osimus, Oxycentrus siehe Tschitscherin pag. 130.

Pachidius, Pachycarus, Pachymelas siehe Tschitscherin pag. 129, 131.

Pachymorpha siehe Obst pag. 128.

Paranurus n. gen. **Tschitscherin** (Hor. ross. 35 p. 9) *Petri* n. sp. (p. 12) Torres-Strasse, sicher auch *Trichosternus dilaticeps* Chaud. — Siehe auch Tschitscherin pag. 131.

Paridileus, Parophonus siehe *Ophonus* u. Tschitscherin pag. 130.

Patrobus decessus n. sp. **Scudder** (Geol. Surv. Canad. II. 2. p. 73 tab. VII fig. 4), *P. frigidus* n. sp. (p. 74 Tab. VII fig. 6) fossil in Canada.

Pedimorphus siehe Tschitscherin pag. 131.

Pekinium siehe *Bembidium*.

Pelagophilus, Penthophonus, Penthus siehe Tschitscherin pag. 129, 130.

Percus siehe Porta pag. 128.

Phaenoraphis siehe *Feronia*.

Pheropsophus dimidiatus n. sp. **Arrow** (Tr. ent. Soc. Lond. 1901 p. 194 tab. IX fig. 8) u. *Ph. abbreviatus* n. sp. (p. 195 fig. 5) Angola, *Ph. exiguus* n. sp. (p. 196) Congo, *Ph. pallidopunctatus* n. sp. (p. 196) u. *Ph. gracilis* n. sp. (p. 197 fig. 6) Ost-Afrika, *Ph. Livingstonis* n. sp. (p. 197 fig. 9) Ngami-See, *Ph. Nyasae* n. sp. (p. 198) Nyasaland, dich. Tab. über 6 Arten (p. 199), *Ph. congoënsis* n. sp. (p. 199, 200 fig. 7), *Ph. relicticollis* n. sp. (p. 199, 200) u. *Ph. tristis* n. sp. (p. 201) Congo, *Ph. arabicus* n. sp. (p. 201) Arabien, *Ph. nigricollis* n. sp. (p. 203 fig. 2) u. *Ph. curtus* n. sp. (p. 204 fig. 3) Indien, *Ph. Heathii* n. sp. (p. 205 fig. 1) Burma, *Ph. Perrotii* n. sp. (p. 206) Madagascar. — *Ph. fasciatocollis* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 129), *Ph. rufimembris* n. sp. (p. 130) Madagascar.

Pheuginus siehe Tschitscherin pag. 130.

Phloeocarabus Farinae n. sp. **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. 25 p. 112) Australien.

Phygas, Platymetopus siehe Tschitscherin pag. 130.

Platynus dilapidatus n. sp. **Scudder** (Geol. Surv. Canad. II. 1. 1895 p. 46, 49 tab. III Fig. 2) fossil in Canada, dich. Tab. über 6 Arten (p. 46) wobei *Pl. Hartii* fehlt — *Pl. exterminatus* n. sp. **Scudder** (ibid. II. 2. 1900 p. 75 tab. VIII fig. 3), *Pl. interglacialis* n. sp. (p. 76 tab. VIII fig. 2), *Pl. interitus* n. sp. (p. 76 tab. VIII fig. 4), *Pl. longaeus* n. sp. (p. 77 tab. VIII fig. 1) fossil in Canada.

- Platysma* siehe *Feronia*.
- Prionophorus* siehe Tschitscherin pag. 131.
- Promecoderus Sloanei* n. sp. **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. 25 p. 19) Australien.
- Pselophoxys* siehe Tschitscherin pag. 130.
- Pseudaristus* siehe Tschitscherin pag. 129.
- Pseudoderus melanochrus* n. sp. **Tschitscherin** (Wien. ent. Zeit. XX p. 26) u. *Ps. gonioderus* n. sp. (p. 27) Turkestan.
- Pseudopercus* siehe Porta pag. 128.
- Pseudophonus* siehe Tschitscherin pag. 130.
- Pterostichus biimpressus* Klüst. u. *anthracinus* Illg. unterschied **Müller** (Wien. ent. Zeit. XX p. 138 Fig. 1, 2). — Ueber die Verbreitung derselben 2 Arten berichtete **Reitter** (ibid. p. 176). — *Pt. externepunctatus* var. *glesicinus* n. var. u. *Prevostii* var. *cupreonitens* n. var. **Viturat** (Ech. XVII p. 75). — *Pterostichus depletus* n. sp. **Scudder** (Geol. Surv. Canad. II. 2. p. 75 tab. VII Fig. 3., Siehe auch *Feronia*).
- Scarites striolifrons* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 102), *Sc. anguliceps* n. sp. (p. 102), *Sc. externus* n. sp., *Sc. curtippennis* n. sp. (p. 103), *Sc. Perrieri* (p. 104), *mediocris* n. sp. (p. 105) Madagascar.
- Scybalicus* siehe Tschitscherin pag. 130.
- Selenochilus* siehe Tschitscherin pag. 131.
- Serrimargo Gounellei* n. sp. **Bouchard** (Bull. Fr. p. 90) Sumatra, auch Beziehungen zu *Peripristus*, *Thyreopterus* u. *Mormolyce* besprochen (p. 90).
- Setalidius*, *Setalis* siehe Tschitscherin pag. 131.
- Silphomorpha difficilis* n. sp. **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. 25 p. 17) Australien, *S. rufoguttata* Bl. gehört zu *Adelotopus* u. scheint *A. bimaculatus* Macl. zu sein (ibid. p. 113).
- Singilis (Phloeozeteus) hirtipennis* n. sp. **Pic** (Ent. XVII p. 89) Syrien, S. (*Phl.*) *plagiata* R. S. var. *mesopotamica* n. var. (p. 89) Bagdad.
- Sphinctodera* n. gen. **Perrieri** n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 128) Madagascar.
- Sphodrosomus* siehe Tschitscherin pag. 131.
- Stenolophus plagiatus* n. sp. **Gorham** (Ann. Scott. p. 25) Schottland. — *St. biplagiatus* Boh. gehört zu *Acupalpus* nach **Tschitscherin** (Hor. ross. 35 p. 167). — Siehe auch *Lecanomerus* u. Tschitscherin pag. 130.
- Stomonaxellus* n. gen. **Tschitscherin** (Hor. ross. 35 p. 51), *St. filicornis* n. sp. (p. 52) Indien.
- Stomonaxus* siehe Tschitscherin pag. 131.
- Storthodontus tenuipunctatus* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 101) Madagascar. — *St. Decorsii* n. sp. **Fairmaire** (Not. Leyd. Mus. 23. p. 65) Madagascar.
- Tachycellus* siehe *Bradycellus* u. Tschitscherin pag. 130.
- Tachyphonus* siehe Tschitscherin pag. 130.
- Tachys*. Mehrere Arten besprach **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. 25 p. 120 —122), *Tr. Adelaidae* Bl. = *transversicollis* Macl. (p. 122).
- Termophila* siehe Obst pag. 127.
- Terraleus brevior* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 117) Madagascar.
- Tetraplatypus* siehe *Bradycellus* u. Tschitscherin pag. 130.

- Thenarotes metallicus, minor* u. *discoidalis* Bl. besprochen von **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austral. 25 p. 115).
- Tibarismus* siehe Tschitscherin pag. 131.
- Trechodes* n. gen. (*Trechinini*) **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. 25 p. 119) für *Bembidium secalioides* Bl. u. *Tr. gibbipennis* n. sp. (p. 119) Tasmanien.
- Trechus Leonhardii* n. sp. **Reitter** (Wien. ent. Zeit. 1901. p. 143) Herzegowina.
 — *Tr. (Anophthalmus) Brujasii* n. sp. **Deville** (Ab. XXX p. 53) See-Alpen.
 — *Tr. (Anophth.) Mallaszi* n. sp. **Csiki** (Term. Füset. XXIV p. 486) Siebenbürgen. — *Tr. fontinalis* n. sp. **Rybinski** (Spr. Kom. Krak. 35 p. 66) Karpathen. — *Tr. subornatellus* n. sp. **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. 25 p. 117) u. *Tr. solidior* n. sp. (p. 118) Victoria, *Tr. Tasmaniae* n. sp. (p. 118) Tasmanien. — Siehe auch Schaeffer pag. 129.
- Trichocellus discicollis* Reitt. nec Dej. = *discolor* Fald. (*Stenol.*) nach **Tschitscherin** (Hor. ross. p. 149), *Tschitscherinii* Reitt. = *desertus* Mot. = *discicollis* Dej. (p. 148). — Siehe auch Tschitscherin pag. 130.
- Trichosternus, Trichotichnus, Trigonostomini* siehe Tschitscherin pag. 130. 131.
- Trigonothops longiplaga* Chaud., *pacifica* Er. u. *flavofasciata* Chaud. besprach **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. 25. p. 104).
- Tropidocerus affinis* n. sp. **Tschitscherin** (Rev. russ. I p. 57) Sudan.
- Typsiharpalus* siehe Tschitscherin pag. 130.
- Xantophoea concinna* n. sp. **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. 25 p. 102) u. *X. cylindricollis* n. sp. (p. 103) Australien.
- Xatis* n. gen. *nigripes* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 125) Madagascar.
- Zuphium impressicolle* n. sp. **Fairmaire** (ibid. p. 128) Madagascar.

Fam. *Dytiscidae*.

Bedel 5, Blackburn 2, Bordas 1, Csiki 1, Duda 1, Kaditsch 1, Kletke 1, Kolbe 1, Meijere 1, Meinert 1, Penecke 1, Regimbart 1, 2, 4, Sahlberg 5, Scudder 2, Seidlitz 1, Sharp 5, Sopp 2, Ssemenow 5.

Morphologie und Physiologie.

Kolbe (1) erörterte das Flügelgeäder der *Dytisciden* zusammen mit dem der übrigen Adepagen (p. 104—105).

Bordas (1) untersuchte den Verdauungsapparat von *Dytiscus marginalis*, *Cybister Roeseii*, *Agabus chalconotus*, *Acilius sulcatus* „etc.“ (NB. die etc. sind leider nicht genannt).

Meijere (1) schilderte die Klauen der *Dytisciden*-Larven (p. 432 tab. 32 fig. 52).

Kaditsch schilderte die Unterlippe von *Agabus guttatus* (p. 19—20 fig. 5 u. 6). Siehe Morphologie pag. 116.

Kletke (1) erörterte die Art der Athmung der *Dytisciden* (p. V—VI).

Sopp (2) besprach die Stridulationsorgane der *Dytisciden* und den Dimorphismus der *Dytiscus*-Weibchen.

Biologie.

Umfassende Arbeiten.

Meinert.

Vandkalvelarverne (*Larvae Dytiscidarum*).

(Vergl. Dansk. Vid. Selsk. Skr. (6) Nat. IX. 8. p. 341—440
tab. I—VI).

Eine umfassende Darstellung der Larven von 48 Arten (von denen nur 22 früher bekannt gewesen sind) der *Dytiscidae*, (die der Autor mit Ausschluss der *Halipilidae* aber mit Einschluss der *Pelobiinae* und *Amphizoinae* nach den Larven neu definiert) in muster-gültiger, durch ausgezeichnete Abbildungen erläuteter Weise, wie sie bisher bloss von Schiödte durchgeführt worden war. Genaue Citate der Vorgänger bilden sogar einen Vorzug vor Schiödte's Arbeiten. Die Beschreibungen und die dichotomischen Auseinander-setzungen der Familien u. Unterfamilien (p. 420—426) sind durchweg lateinisch, ein Résumé (p. 430—434) ist französisch gegeben.

Die behandelten Gattungen und Arten.

Subfam. *Dytiscinae*.

- Hyphydrus ovatus* L. (p. 356, tab. I fig. 1—9).
Hydroporus lineatus Fbr. (p. 360 tab. I fig. 10—15), *H. inaequalis* Fbr., *H. parallelo-*
grammus Ahr. (p. 361 fig. 16—18), *H. impressopunctatus* Schall. (p. 363), *H.*
versicolor Schall. (p. 363 tab. I fig. 19), *H. atriceps* Crot. (p. 364), *H. palustris*
 L. (p. 365 tab. I fig. 20—24), *H. dorsalis* Fbr. (p. 366 tab. I fig. 25—26), *H.*
erythrocephalus L. (p. 366 tab. II fig. 27—28), *H. confluens* Fbr. (p. 367 tab.
 II fig. 29—33), *H. depressus* Fbr. (p. 368 tab. II fig. 34—36), *H. halensis* Fbr.
 (p. 369 tab. II fig. 37—42).
Agabus bipustulatus L. (p. 372 tab. II fig. 43—50), *A. Solieri* Aub. (p. 372 tab. II
 fig. 51—53), *A. nebulosus* Forst. (p. 373 tab. II fig. 54), *A. Sturmii* Gyll.
 (p. 374), *A. undulatus* Schrk. (p. 374 tab. III fig. 55—57).
Platambus maculatus L. (p. 376 tab. III fig. 58—59).
Ilybius fenestratus Fbr. (p. 378 tab. III fig. 60—64), *I. subaeneus* Er. (p. 378), *I.*
fuliginosus Fbr. (p. 379 tab. III fig. 65—67), *I. ater* Deg. (p. 379), *I. obscurus*
 Marsh. (p. 380).
Cymatopterus fuscus L. (p. 381 tab. III fig. 68—72), *C. groenlandicus* Aub. (p. 382
 tab. III fig. 73).
Colymbetes Grapei Gyll. (p. 383 tab. III fig. 74—75).
Rhantus exoletus Forst. (p. 385 tab. III fig. 76—80), *Rh. suturalis* Lac (p. 385
 tab. III fig. 81), *Rh. calidus* Fbr. (p. 386 tab. III fig. 82—83).
Laccophilus hyalinus Deg. (p. 387 tab. IV fig. 84—88), *L. obscurus* Pz. (p. 388
 tab. IV fig. 89—93).
Dytiscus latissimus L. (p. 390 tab. IV fig. 94).
Macrodytes marginalis L. (p. 392 tab. IV fig. 95—97), *M. circumflexus* Fbr. (p. 392
 tab. IV fig. 98—99), *M. circumcinctus* Ahr. (p. 393), *M. dimidiatus* Bergstr.
 (p. 393).
Hydaticus transversalis Brünn. (p. 395 tab. IV fig. 100—108, tab. V fig. 109—111).

Acilius sulcatus L. (p. 397 tab. V fig. 112—117), *A. fasciatus* Deg. (p. 398).

Thermonectes circumscriptus Latr. (p. 399 tab. V fig. 118—122).

Eretes sticticus L. (p. 401 tab. V fig. 123—130).

Cybister laterimarginalis Deg. (p. 405), C. sp. aus Süd-Amerika p. 404, 405 tab. V fig. 131—133.

Subfam. *Pelobiinae*.

Pelobius tardus Hrbst. (p. 410 tab. VI fig. 134—138).

Subfam. *Noterinae*.

Hydrocanthus debilis Sh. (p. 413 tab. VI fig. 139—146).

Canthydrus Haagii Wnck. (p. 414 tab. VI fig. 147—149).

Noterus clavicornis Deg. (p. 415 tab. VI fig. 150—157).

Subfam. *Amphizoinae*.

Amphizoa Lecontei Matth. (p. 418 tab. VI fig. 158—163).

Geographische Verbreitung.

Bedel (5) zählte 63 Arten aus Tunis auf. (p. 56—66).

Palaeontologie.

Scudder (2) beschrieb 4 *Coelambus*, 3 *Hydroporus*, 1 *Agabu* n. spp. Siehe Einzelbeschr.

Systematik.

Kolbe (1) schloss (wie Ganglbauer) die *Pelobiidae* (*Hygrobiidae*) und *Haliplidae* als besondere Familien aus, stellte aber die ersteren in eine Gruppe mit den *Carabiden* und *Amphizoiden*.

Umfassende Arbeiten.

Duda behandelte die *Dytisciden* in einem Programm (1881?).

Seidlitz's „Bestimmungstabelle“ von 1886 wurde ohne vorherige Anfrage durch einen ungenannten Autor weiter ins Französische übersetzt. Dass die damals neuen Arten auch jetzt noch, nach 16 Jahren (!) als nov. sp. bezeichnet werden, ist eine Lizenz des wortgetreuen Uebersetzers, die man in einem Jahresbericht nicht wörtlich nehmen sollte (Vergl. Sharp Record pro 1901 p. 120).

Einzelbeschreibungen.

Agabus maculatus aberr. *aterrima* nov. ab. **Sahlberg** (Medd. Fenn. 26, p. 71) Finnland.

Antiporus collaris Hop. besprach **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. 25 p. 124).

Coelambus derelictus n. sp. **Scudder** (Geol. Surv. Canad. II. 2. p. 78 tab. IX fig. 4), *C. cribrarius* n. sp. (p. 78 tab. IX fig. 3), *C. infernalis* n. sp. (p. 78 tab. IX fig. 2), *C. disjunctus* n. sp. (p. 79 tab. IX fig. 1).

Haliplus laminatus ♀ var. *punctulatus* n. var. **Penecke** (Wien. ent. Zeit. XX p. 11) Kärnten. — *H. Jakowlewii* Ssem. = *fulvicollis* Er. nach **Ssemenow** (Rev. russ. I p. 144), *H. Schaumii* Solsk. = *fluviatilis* Anb. (p. 145). — *H. fulvus* Payk. var. *carlittensis* n. var. **Régimbart** (Bull. Fr. p. 323) Pyrenäen.

Hydroporus libanus n. sp. **Régimbart** (Bull. Fr. p. 101) Libanon, *H. (Deronectes) carinatus* var. *Fabressei* n. var. (p. 324) Pyrenäen, *H. halensis* Fbr. var. *ibericus* n. var. (p. 326) Spanien, *H. septentrionalis* var. *Helveticus* n. var. (p. 326) Schweiz u. var. *Devillei* n. var. (p. 326) Seealpen. — *H. inanimatus* n. sp. **Scudder** (Geol. Surv. Canad. II 2. p. 79 tab. X Fig. 3), *H. inundatus* n. sp. (p. 79 tab. X Fig. 2), *H. sectus* n. sp. (p. 80 tab. X Fig. 1) fossil in Canada.

Ilybius chinensis n. sp. **Csiki** (Zichy II p. ?) Peking.

Lancetes Theresae n. sp. **Sharp** (Berl. ent. Z. 1901 p. 478 tab VII Fig. 1) Bolivien.

Necterosoma costipenne Lea = *penicillatum* Clk. (*Hydropor.*) nach **Blackburn** (Tr. R. Soc. Austr. 25 p. 125).

Platynectes subaenescens Lea besprach **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austral. 25 p. 125).

Fam. Gyrinidae.

Bedel 5, Blackburn 2, Scudder 2.

Geographische Verbreitung.

Bedel (5) zählte 4 Arten aus Tunis auf. (p. 66—67).

Palaeontologie.

Scudder (2) beschrieb 1 *Gyrinus* u. bildete ihn ab. Siehe Einzelbeschr.

Systematik.

Einzelbeschreibungen.

Dineutes. Einige Arten besprach **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. 25 p. 127).

Gyrinus confinis Lec. abgebildet von **Scudder** (Geol. Surv. Canad. II. 2. tab. X fig. 5).

Macrogyrus fortissimus n. sp. **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. 25 p. 126) N. S. Wales, *M. opacior* n. sp. (p. 127) Victoria.

Fam. Paussidae.

Bedel 5, Dierckx 1, Fairmaire 1, Kolbe 1.

Morphologie.

Dierckx (1) besprach die Pygidialdrüsen mehrerer Arten (p. 282—287, 295—299).

Biologie.

Kolbe (1) gab nähere Auskunft über die von Erichson beschriebene *Paussiden*-Larve (von *Paussus Humboldtii*), wonach dieselbe in der That eine Adephegen-Larve ist, mit Tarsus und einer Klaue (p. 132).

Geographische Verbreitung.

Bedel (5) zählte 2 Arten aus Tunis auf (p. 56).

Systematik.

Kolbe (1) verband die *Paussiden* mit den *Pelobiiden* (*Hygrobiiden*) zu einer Gruppe (p. 133), während Ganglbauer sie mehr den *Halipliden* genähert hatte.

Einzelbeschreibungen.

Paussus elegantulus n. sp. **Fairmaire** (Bull. Tr. p. 94) Madagascar.

Fam. *Rhysodidae*.

Arrow 3, Horn 2, Kolbe 1.

Morphologie.

Kolbe (1) erörterte das Flügelgeäder der *Rhysodiden* im Vergleich mit dem der übrigen Aephagen (p. 104—105). Die Trochantären der *Rhysodiden* nennt er nach dem „primären“ Typus geformt (p. 114), während sie thatsächlich, wenigstens an den Hinterbeinen, ausgesprochen die „derivate“ Form zeigen. Vergl. auch *Cicindeliden* u. *Carabiden*.

Systematik.

Kolbe (1) machte den Versuch, auf Grund des Flügelgeäders die *Rhysodiden* den *Cicindeliden* mehr zu nähern als den übrigen Aephagen (p. 133), was **Horn** (2) als unhaltbar nachwies (p. 15).

Umfassende Arbeiten.

Arrow.

Remarks upon the genus *Rhysodes*, with Descriptions of some new Oriental Species.

(Ann. Mag. Nat. Hist. 1901. VII p. 83—89).

Eine Zusammenstellung der 20 bekannten Arten, die in 6 Gruppen getheilt werden, wobei leider eine dichotomische Auseinandersetzung der Arten vermisst wird. Die 8 neuen Arten sind nur durch Einzelbeschreibungen gekennzeichnet.

Die neuen Arten.

Rhysodes armatus n. sp. (p. 85) Nikobaren, *Rh. malaicus* n. sp. (p. 85) Penang, *Rh. batschianus* n. sp. (p. 86) Batschian, *Rh. malabaricus* n. sp. (p. 86) Malabar, *Rh. quadraticollis* n. sp. (p. 87) Malaischer Archipel, *Rh. Boysii* n. sp. (p. 87) Indien, *Rh. bucculatus* n. sp. (p. 88) Malai. Arch., *Rh. anguliceps* n. sp. (p. 89) Malabar.

Fam. Cupedidae.

Horn 2, Kolbe 1, Lea 2, Waterhouse 1.

Systematik.

Kolbe (1) brachte die Familie auf Grund des Flügelgeäders zu den Adephagen, welche Zugehörigkeit **Horn** (2) nicht für zweifellos erwiesen hält, während Peyerimhoff (1902) und Ganglbauer (1903) sie für unzweifelhaft richtig erklären.

Einzelbeschreibungen.

Cupes varians n. sp. **Lea** (Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 26. p. 485, 513). Australien.

Tetraphalerus n. gen. **Waterhouse** (Ann. Mag. Nat. Hist. 1901. VII p. 520), *T. Wagneri* n. sp. (p. 521) Rio Janeiro.

Fam. Hydrophilidae.

Abeille 3, **Blackburn** 2, **Enderlein** 1, **Escherich** 12, **Ganglbauer** 1, **Gerhardt** 2, 3, 6, **Kletke** 1, **Kolbe** 1, **Meijere** 1, **Poujade** 1, **Régimbart** 3, **Reitter** 32, **Rengel** 1, **Scudder** 1, 2, **Schloemp** 1, **Xambeu** 1, **Engmann** 1.

Morphologie und Physiologie.

Kletke (1) erörterte die Art der Athmung bei *Hydrophilus piceus* (p. VI).

Escherich (12) vertheidigte Heider's (1889) Darstellung der Entwickelung des Darmes von *Hydrophilus piceus* u. bekämpfte die von Degeneer (1900, 1).

Meijere (1) schilderte die Klauen von *Hydrophilus piceus* (p. 431).

Biologie.

Rengel (1) wies von *Hydrophilus piceus* nach, dass die Imagines herbivor (p. 173—182), die Larven aber carnivor sind, u. beschrieb die Lebensweise und Verpuppung der Larven (p. 215—219).

Engmann und **Schloemp** berichteten, dass die Imagines von *Hydrophilus piceus* gelegentlich auch Fleisch fressen.

Poujade (1) gab eine biologische Notiz über *Hydrophilus piceus* (p. 229—230).

Xambeu (1) beschrieb die Larve von *Ochthebius quadricollis* (p. 21).

Palaeontologie.

Scudder (1) beschrieb 3 Arten aus Canada, u. (2) eine neue *Cymbiodyta*. Siehe Einzelbeschr.

Systematik.

Kolbe (1) stellt die Familie zusammen mit den *Georyssiden* und *Elmiden* in eine Abtheilung der *Clavicornia* (p. 139).

Umfassende Arbeiten.

Régimbart.

Revision des grands *Hydrophiles*.

(Ann. Soc. ent. Fr. 70. p. 188—232, tab. VII, VIII).

Eine umfassende Revision der Gattung *Hydrophilus* im gewöhnlichen Sinne, die hier ohne nähere Begründung (nach Bedel's Vorgang) *Stethoxus* Sol. genannt wird. Die von Bedel aufgestellte Untergatt. *Dibolocelus* wird zur Gattung erhoben und aus diesem Grunde mit dem Autornamen Régimbart (statt Bedel) ausgerüstet, ein Verfahren, das ebenso neu als unzulässig ist. Ein räthselhaftes Organ an der Innenseite der Basis der Flügeldecken wird (p. 189) geschildert. Die Arten sind dichotomisch auseinandergesetzt und ausserdem alle ausführlich beschrieben.

Die behandelten Gattungen und Arten.

Stethoxus (*Temnopterus* Sol.) *marginatus* Cast. (tab. 7 fig. 7), *St. aculeatus* Sol. (tab. 7 fig. 1, 8), *St.* (i. sp.) *senegalensis* Perch. (tab. 7 fig. 9), *St. olivaceus* Fbr. (tab. 7 fig. 2, 10), *St. hastatus* Hrbst. (tab. 7 fig. 11), *St. cashmirensis* Redt. (tab. 7 fig. 13) var. *birmanicus* n. var. (p. 202 fig. 13 a) Birma, *St. cavisternum* Bed. (tab. 7 fig. 12), *St. Loriae* n. sp. (p. 202 tab. 7 fig. 14) Neuguinea, *St. picicornis* Chvr. (= *brunnipalpis* Kuw. = *colombinus* Kuw.), *St. sabellifer* Frm. (tab. 7 fig. 15), *St. rufocinctus* Bed., *St. indicus* Bed., *St. flavicornis* Cast. (= *cavicus* Kuw.), *St. ruficornis* Klg. (tab. 7 fig. 3), *St. australis* Montr., *St. albipes* Cast. (tab. 7 fig. 20), *St. brevispina* Frm. (= *brevissimus* Kuw.) (tab. 7 fig. 16), *St. macronyx* n. sp. (p. 208 tab. 7 fig. 4, 17) Australien, *St. latipalpus* Cast. (tab. 7 fig. 18, 18 a), *St. pedipalpus* Bed. (tab. 7 fig. 19), *St. acuminatus* Mot. (= *Sumatrae* Kuw.) (tab. 7 fig. 21), *St. piceus* L. (= *turkestanus* Kuw.) (tab. 7 fig. 22), *St. unguicularis* n. sp. (p. 213 tab. 7 fig. 23) patria?, *St. pistaceus* Cast. (tab. 7 fig. 5, tab. 8 fig. 24), *St. aterrimus* Esch. (= *africanus* Kuw.) (tab. 8 fig. 25), *St. gansuensis* Sem. (tab. 8 fig. 26), *St. insularis* Cast. (= *Behrensii* Knw.) (tab. 8 fig. 27), *St. foveolatus* n. sp. (p. 217 tab. 8 fig. 28) Süd-Amerika, *St. triangularis* Say (fig. 29), *St. ovalis* Cast. (fig. 30), *St. Beedlii* n. sp. (p. 219 fig. 31) Brasilien, *St. simulator* Bed. (fig. 32), *St. ater* Ol. (= *ensifer* Brull. = *ovalis* Brull. = *brasiliensis* Cast. = *intermedius* Duv.) (tab. 8 fig. 33).

Dibolocelus Bed. *palpalis* Brull. (tab. 7 fig. 6, tab. 8 fig. 34) var. *viridis* n. var. (fig. 35), var. *purpurascens* n. var. u. var. *iricolor* n. var. (p. 223), *D. masculinus* n. sp. (p. 223 fig. 36) Argentinien, *D. ovalis* Ziegl. (fig. 37), *D. Oberthürri* n. sp. (p. 226) Ecuador, *D. gibbosus* n. sp. (p. 226) Brasilien, *D. smaragdinus* Brull.

Einzelbeschreibungen.

Anacaena immatura n. sp. *Abeille* (Nouv. esp. Col. p. 2 u. Ech. XVII p. 59) Basses-Alpes.

Atractohelophorus siehe *Helophorus*.

Cymbiodyta exstincta n. sp. *Scudder* (Geol. Surv. Canad. II. 2. p. 81 tab. X fig. 4) fossil in Canada.

Dibolocelus siehe Régimbart pag. 145.

Empleurus, *Haenydra* siehe *Helophorus*.

Helophorus crenatus Rey in Schlesien nach **Gerhardt** (Zeit. ent. Bresl. 26. p. 17, D. ent. Z. p. 157). — *H. (Empleurus) crinitus* n. sp. **Ganglbauer** (Zool. bot. 1901 p. 312) Central-Asien, *H. (Atractohelophorus) dalmatinus* n. sp. (p. 312), Dalmatien, *H. (Atract.) glacialis* var. *Deubelii* Kr. = *brevitarsis* Kuw., *H. (Atract.) Fauvelii* n. sp. (p. 314) Simplon, *H. (Atract.) armeniacus* n. sp. (p. 315) Armenien, *H. (Atract.) longipennis* n. sp. (p. 315) Turkestan, *H. (Atract.) altaicus* n. sp. Altai, *H. (Atract.) pictus* n. sp. (p. 317) Bucharei, *H. Kerimii* n. sp. (p. 318) Transkaukasien, *H. aeneipennis* = *viridicollis* Steph., *H. confrater* Kuw. var. *Knothyi* n. var. (p. 319) Rhilo-Dagh, *H. Joppae* n. sp. (p. 319) Siebenbürgen.

Henicocerus siehe *Ochthebius*.

Hydraena (Phothydraena) Paganettii n. sp. **Ganglbauer** (Zool. bot. 1901 p. 322) Mähren, Herzegowina, Caucasus, *H. spinipes* Baudi u. *Fiorii* Port. besprochen (p. 322), *H. Kaufmannii* n. sp. (p. 323) Dalmatien, *H. ambigua* n. sp. (p. 324) Herzegowina, *H. (Haenydra) Devillei* n. sp. (p. 324) See-Alpen, *H. (Haen.) truncata* Rey besprochen (p. 325), *H. (Haen.) gracilis* Germ. var. *emarginata* Rey u. var. ♀ *subintegra* n. var. (p. 326), *H. (Haen.) producta* Muls. (p. 326), *H. (Haen.) bicuspidata* n. sp. (p. 327) Süd-Frankreich, *H. (Haen.) dalmatina* n. sp. (p. 327) Dalmatien, *H. (Haen.) hispanica* n. sp. (p. 328), *H. (Haen.) monticola* Rey (p. 328), *H. (Haen.) italica* n. sp. (p. 328) mit var. *bidentata* n. var., var. *Doderonis* n. var. (p. 329) u. *procera* n. var. (p. 330), *H. (Haen.) heterogyna* Bed. (p. 330), *H. (Haen.) Bensae* n. sp. (p. 330) See-Alpen, *H. (Haen.) Schuleri* n. sp. (p. 331) Mähren.

Hydrophilus scissipalpis n. sp. **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. 25 p. 128) Australien. — Siehe auch Régimbart pag. 145.

Meropathus n. gen. (bei *Helophorus*) **Enderlein** (Zool. Anz. 24. p. 121) *Chunii* n. sp. (p. 122) Kerguelen-Insel.

Ochthebius (Henicocerus) montenegrinus n. sp. **Ganglbauer** (Zool. bot. 1901 p. 320) Montenegro, *O. Peisonis* n. sp. (p. 320) Neusiedler See, *O. viridis* Peyr. var. *fallaciosus* n. var. u. var. *Mülleri* n. var. (p. 321) Dalmatien. — *O. (Trymochthebius) laevisculptus* n. sp. **Reitter** (Deut. ent. Z. 1901 p. 65) und *O. (Trym.) atricapillus* n. sp. (p. 66) Bucharei. — *O. narentinus* Reitt. in Schlesien nach **Gerhardt** (Zeit. Ent. Bresl. 26. p. 6) statt *O. Czwalinae*.

Philhydrus hamifer n. sp. **Ganglbauer** (Zool. bot. 1901 p. 332) Neusiedler See. *Phothydraena* siehe *Hydraena*.

Stethoxus, *Temnopterus* siehe Régimbart pag. 145.

Trymochthebius siehe *Ochthebius*.

Fam. *Georyssidae*.

Reitter 32.

Systematik.

Georyssus trifossulatus Mot. beschrieb ausführlicher **Reitter** (D. ent. Z. p. 66).

Fam. *Heteroceridae*.

Kolbe 1, Reitter 32.

Systematik.

Kolbe (1) fasste die *Heteroceriden* mit den *Psepheniden*, *Dermestiden*, *Dascylliden* s. str. und *Rhipiceriden* zu einer Gruppe *Dascylloidea* zusammen (p. 137).

Einzelbeschreibungen.

Heterocerus albineus n. sp. **Reitter** (D. ent. Z. p. 66) Bucharei.

Fam. *Parnidae*.

Champion 3, Donisthorpe 7, Kolbe 1, Pic 30.

Systematik.

Kolbe (1) theilte die Familie in *Parniden* und *Elmiden*, fasste die ersteren mit den *Byrrhiden*, *Chelonariiden*, *Lichadiden* und *Artematopiden* in eine Abtheilung „*Amphibola*“ zusammen (p. 138), welche der Abtheilung „*Helodoidea*“ mit den Familien (*Eubriiden*, *Helodiden*, *Eucinetiden*, *Ptilodactyliden*) genähert und von den *Clavicornia* incl. *Elmiden* weit entfernt ist.

Einzelbeschreibungen.

Elmis palaestinus n. sp. **Pic** (Ech. XVII p. 3) Jericho.

Limnius Dargelasii, *troglydytes* u. *rivularis* besprach **Champion** (Ent. Mont. Mag. 37. p. 91), *L. rugosus* Bab. ist zu streichen (p. 92). — Die in England vorkommenden Arten behandelte **Donisthorpe** (Ent. Rec. XIII p. 337 tab. IX), dich. Tab. über 5 Arten (*L. Darg.*, *trogl.*, *rivul.* u. 2 unbenannte), die alle photograph. abgebildet.

Fam. *Staphylinidae*.

Bedel 5, Bernhauer 1—7, Casey 1, Csiki 1, Dierckx 1, Deville 2, Eichelbaum 2, Ellis 2, Fauvel 1—7, Fairmaire 3a, Ganglbauer 2, Gerhardt 1, 3, 6, Günther 1, Luze 1—3, Leinberg 1, 2, 4, Penecke 1, Peyerimhoff 3, 5, Pic 32, Piffard 1, Poppius 3, 4, 8, 9, Ponselle 1, Reitter 31, 32, Sahlberg 1, Scudder 1, 2, Silvestri 1, Strand 1, Wasmann 1—3, Xambeu 1.

Morphologie.

Dierckx (1) untersuchte die Pygidialdrüsen von *Ocypus olens*, *Staphylinus caesareus* u. *St. nebulosus* (p. 289—292, 296—297).

Fauvel (5a) besprach Missbildungen des Halsschildes bei *Staphylinus quisquiliarius* u. *Paederus sanguinicollis*.

Descendenztheorie.

Wasmann (3) entwarf den Stammbaum von *Myrmigaster singularis*, *Fauvelia permira* u. *Wasmannii*, *Dinarda clavigera*, *nigrita*, *Märkelii*, *Hugensii*, *dentata* u. *pygmaea* (p. 707), behandelte die Art

und Ursache ihrer Abstammung u. Umbildung ausführlich u. musterhaft (p. 691—711) u. gab auch phylogenetische Notizen über andere *Aleocharinen* (p. 737—742).

Biologie.

Ueber die Puppe von *Staphylinus nebulosus* berichtete **Günther** (Berl. ent. Z. Sitzb. p. 23), dass sie in einer Hülle aus Pflanzenfasern u. Erde ruht.

Eichelbaum (2) beschrieb die Larven von *Atheta divisa* u. *amicula* (521—531 fig. A—N).

Piffard (1) schilderte die Gewohnheiten einiger *Stenus*-Arten.

Ponselle (1) gab eine biologische Notiz über *Atemeles paradoxus* (p. 360).

Fauvel (5) berichtete über die Lebensweise von *Paederus brasiliensis* (p. 77).

Xambeu (1) beschrieb die Larve von *Quedius laevigatus* (p. 44) u. die Puppe von *Philonthus laminatus* (p. 49).

Geographisches.

Sahlberg (1) zählte *Atheta (Megista) graminicola*, *A. (Metaxyia) subplana*, *A. (Met.) islandica*, *Gnypeta cavicollis* von Grönland, Island und Spitzbergen auf.

Strand (1) zählte 2 *Philonthus*, 1 *Sunius*, 1 *Oxyypoda*, 5 *Atheta* aus Norwegen auf, und **Poppius** (9) fand *Philonthus subvircescens* Th., (3) *Polystoma grisea* Kr. u. *Omalium riparium* Th., (4) *Thinobius brevipennis* Knw. u. (8) *Ilyobates nigricollis* in Finnland.

Bedel (5) zählte 417 Arten aus Tunis auf (p. 67—126).

Palaeontologie.

Scudder (1) beschrieb 5 Arten aus Canada, von denen 1 *Arpedium* u. 1 *Gcodromicus* neu, und (2) 1 *Gymnusa*, 1 *Quedius*, 1 *Philonthus*, 2 *Cryptobium*, 5 *Lathrobium*, 3 *Olophrum* n. spp. Siehe Einzelbeschr.

Systematik.

Umfassende Arbeiten.

Bernhauer.

Die Staphyliniden der paläarktischen Fauna. I. *Aleocharini*. (Verh. Zool. bot. Ges. Wien 1901 p. 431—506. Auch separat als Bestimmungstabelle d. europ. Col. 43. Heft. 78 pp.).

Eine gründliche umfassende Bearbeitung der paläarktischen *Staphyliniden* wird hier begonnen, die dadurch, dass der dichotomischen Auseinandersetzung auch ausführliche Beschreibungen der Gattungen u. Arten folgen, zwar weit über den Rahmen der Reitter'schen „Bestimmungstabellen“ hinausgeht, aber trotzdem auch als solche erschienen ist, so dass sie nicht in den dickleibigen Gesellschaftschriften vergraben bleibt. Das Heft enthält die Auseinandersetzung

der 31 *Aleocharinen*-Gattungen, (p. 4—7), von denen 2 als neu bezeichnet, u. die 79 Arten der ersten Gattung (*Aleochara*). Von den Untergattungen ist keine als neu bezeichnet, 3 können aber neu sein.

Die behandelten Gattungen u. neuen Arten.

Aleochara (*Al. i.* sp.) mit 5 Arten: *brevipennis* Grav. var. *nigrovillosa* n. var. (p. 23), *A. (Heterochara Mls.)* mit 9 sp.: *A. spissicornis* Er. var. *cephalotes* n. var. (p. 26), *A. (Xenochara Mls.)* mit 2 sp., *A. (Baryodma Mls.)* mit 4 sp., (*Isochara* Brh.) mit 2 sp.: *A. moesta* Grv. var. *lepidoptera* n. var. (p. 35), *A. (Homoeochara Mls.)* mit 1 sp., *A. (Dyschara Mls.)* mit 1 sp. *A. (Polychara Mls.)* mit 23 sp.: *A. diversa* Sahl. (= *moesta* Er. nec Grav.) var. *albovillosa* n. var. (p. 43), *A. pulchra* n. sp. (p. 444, 479) Turkestan, *A. (Ophiochara* Brh.) mit 2 sp., *A. (Rheochara Mls.)* mit 5 sp.: *A. cuniculorum* Kr. var. *longitarsis* n. var. (p. 59), *A. (Megalogastris* Brh.) mit 1 sp., *A. (Ceranota* Steph.) mit 15 sp.: *A. Strasseri* n. sp. (p. 446, 492) Bosnien, *A. Ganglbaueri* n. sp. (p. 446, 493) Tyrol, *A. consors* Epp. = *adusta* Epp. (p. 71), *A. (Coprochara Mls.)* mit 5 sp., *A. (Polystoma* Steph.) mit 4 sp.

Pyroglossa n. gen. (p. 431, 435) für *Ocyusa* grossa Brnh. u. *mirabilis* Brnh.

Parocalea n. gen. (p. 431, 435) für *Calodera baicalica* Epp.

1. Luze.

Revision der europäischen und sibirischen Arten der *Staphyliniden*-Gattungen *Tachyporus* Grav. und *Lamprinus* Heer. (Verh. Zool. bot. Ges. Wien 1901 p. 146—185).

Eine monographische Revision, die eine ausführliche Beschreibung und eine, leider nicht ganz consequent durchgeführte dichotomische Auseinandersetzung der Arten der Gattungen *Tachyporus*, *Lamprinus* u. *Lamprinodes* bringt, auch die dichotomische Unterscheidung der beiden letztgenannten Gattungen (p. 180), während man eine solche von der erstgenannten Gattung vermisst.

Die behandelten Gattungen und Arten.

Tachyporus dich. Tab. über 37 sp. (p. 149—152), v. d. 19 neu: *T. compressicornis* n. sp. (p. 152, 153) Caucasus, *T. nigrinus* n. sp. (p. 152, 154) Centralasien, *T. imitator* n. sp. (p. 152, 155) Sibirien, *T. austriacus* n. sp. (p. 152, 156) Wien, *T. Bernhaueri* n. sp. (p. 152, 158) Nördl. Mongolei, *T. Ganglbaueri* n. sp. (p. 152, 158) Ost-Sibirien. *T. Sahlbergii* n. sp. (p. 152, 160) Turkestan, *T. italicus* n. sp. (p. 152, 160) Italien, *T. Skalitzkyi* n. sp. (p. 151, 162) Sibirien, *T. duplex* n. sp. (p. 151, 163), *T. microcephalus* n. sp. (p. 152, 163) Sibirien, *T. mysticus* n. sp. (p. 151, 164) Sibirien, *T. Reitteri* n. sp. (p. 151, 170) Central-Asien, *T. flavifrons* n. sp. (p. 150, 172) Baikalseegebiet, *T. formosus* Matt. var. *decoratus* n. var. (p. 150, 174) Ungarn, *T. laticollis* n. sp. (p. 150, 175) Caucasus, *T. cuneus* n. sp. (p. 150, 175) Central-Asien, *T. Matthewsii* n. sp. (p. 150, 178) Taschkent, *T. Lederi* nov. sp. (p. 150, 178) Caucasus, *T. convexus* n. sp. (p. 150, 179) Caucasus.

Lamprinodes n. gen. (p. 180), dich. Tab. über 5 Arten (p. 181), v. d. 1 neu:

L. Hammarstroemii n. sp. (p. 181, 182) Finnland.

Lamprinus nur 1 Art: *L. erythropterus* Pz.

2. Luze.

Bolitobiini. Revision der paläarktischen Arten der Staphyliniden-Gattungen *Bryocharis* Boisd. et Lac., *Bolitobius* Mannh., *Bryoporus* Kraatz und *Mycetoporus* Mannh.
(Verh. Zool. bot. Ges. Wien 1901 p. 662—746).

Eine umfassende Monographie der genannten 4 Gattungen: zuerst eine dichotomische Begründung derselben, dann eine, leider nicht consequent durchgeführte dichot. Auseinandersetzung der Arten und dann ausführliche Einzelbeschreibungen derselben.

Die behandelten Gattungen u. Arten.

- Mycetoporus* dich. Tab. über 58 sp. (p. 656—670), v. d. 20 neu: *M. major* nov. sp. (p. 666, 673) Caucasus, *M. altaicus* n. sp. (p. 670, 676) Altai, *M. gracilis* n. sp. (p. 669, 678) Ungarn, *M. flavicornis* n. sp. (p. 669, 681) Lappland, *M. bosnicus* n. sp. (p. 669, 683) Bosnien, *M. dalmatinus* n. sp. (p. 666, 685) Dalmatien, *M. completus* n. sp. (p. 666, 687) Caucasus, *M. Ganglbaueri* n. sp. (p. 666, 692) Südtirol, *M. swaneticus* n. sp. (p. 666, 692) Caucasus, *M. insulanus* n. sp. (p. 666, 693) Korfu, *M. Inaris* n. sp. (p. 667, 695) Lappland, *M. blandus* n. sp. (p. 667, 697) Lenkoran, *M. ambiguus* n. sp. (p. 669, 699) Croatien, Hercegowina, *M. nobilis* n. sp. (p. 668, 703) Dalmatien mit var. *graecus* n. var. (p. 703) Griechenland, *M. liliputanus* n. sp. (p. 668, 705) Russisches Central-Asien, *M. corpulentus* n. sp. (p. 667, 707) Riesengebirge mit var. *Halbherrii* n. var. (p. 707) Südtirol, *M. Wingelmuelleri* n. sp. (p. 668, 708) Steiermark, *M. montanus* n. sp. (p. 669, 711) Steiermark, *M. Heerii*, n. sp. (p. 668, 712) Ostsibirien, *M. pluripunctus* n. sp. (p. 668, 717) Ostsibirien.
- Bryoporus* dich. Tab. über 9 Arten (p. 718—719), v. d. 2 neu: *B. caucasicus* n. sp. (p. 719, 723) u. *B. abdominalis* n. sp. (p. 719, 724) Caucasus.
- Bolitobius* dich. Tab. über 17 Arten (p. 726—727), v. d. 3 neu: *B. puncticeps* n. sp. (p. 726, 733), *B. indubius* n. sp. (p. 726, 736), *B. imitator* n. sp. (p. 727, 737) Ostsibirien.
- Bryocharis* dich. Tab. über 7 Arten (p. 739—740).

Einzelbeschreibungen.

- Acanthoglossa* (*Cephisus*) *punica* n. sp. **Fauvel** (Rev. Ent. XX p. 250) Tunis.
- Acidota crenata* Fbr. var. *nigra* n. var. **Scudder** (Geol. Surv. Canad. II. 2. p. 85 tab. XII fig. 4) fossil in Canada.
- Aleochara* (*Baryodma*) *bipunctata* var. *croatica* n. var. **Penecke** (Wien. ent. Zeit. XX p. 12) Croatien. — *A. capitata* Fauv. besprach **Reitter** (D. ent. Z. p. 67). — *A. curtula* var. *Bugnionis* n. var. **Fauvel** (Rev. ent. p. 90). — *A. Cera-nota* *penicillata* n. sp. **Peyerimhoff** (Bull. Fr. p. 347) Frankreich. — *A. colorata* n. sp. **Bernhauer** (Stett. ent. Zeit. 1901 p. 366), *A. fortepunctata* n. sp. (p. 367) u. *A. funesta* n. sp. (p. 368) Gaboon, *A. opacula* n. sp. (p. 369) Amazonien, *A. angusticollis* n. sp. (p. 370) Gaboon, *A. speculicollis* n. sp. (p. 371) u. *A. gracilicornis* n. sp. (p. 372) Nord-Amerika, *A. (Triochara)* n. subg. p. 373) für *A. trisulcata* Weise. — Siehe auch Bernhauer pag. 149.

- Amblyopinus Gahani* n. sp. **Fauvel** (Rev. Ent. XX p. 6) La Plata, dich. Tab. über 5 spp. (p. 6).
- Anthobium miricolle* n. sp. **Deville** (Rev. Ent. XX p. 1) See-Alpen. — *A. hirtellum* n. sp. **Fauvel** (Rev. Ent. XX p. 2 u. Bull. Mus. Par. 1901 p. 63) Japan.
- Apteronina* n. gen. (*Aleocharini*) **Wasmann** (Wien. ent. Zeit. 1901. p. 146)
A. Schmittii n. sp. (p. 147) Colorado.
- Arpedium stillicidii* n. sp. **Scudder** (Geol. Surv. Canad. II. 1. 1895 p. 42 tab. II. fig. 2) fossil in Canada
- Astenus bucharensis* n. sp. **Bernhauer** (D. ent. V. p. 246) Bucharei.
- Atheta (Dimetrota) comitissa* n. sp. **Peyerimhoff** (Ab. XXX p. 54) See-Alpen.
A. (Hydrosmectina) Bernhaueri n. sp. (p. 54) Basses-Alpes. — *A. (Oreostiba) oreophila* n. sp. **Bernhaner** (Zool. bot. 1901 p. 108), *A. (Dimetrota) altaica* n. sp. (p. 109), *A. (Homalota) pachycera* Epp. besprochen (p. 110), *A. (Xenota) Lederi* n. sp. (p. 110), *A. (Metaxyia) Bang-Haasii* n. sp. (p. 111), *A. difficulta* n. sp. (p. 112), *A. (Phillygra) lioglutooides* n. sp. (p. 113) und *A. (Tachynota) n. subg. p. 113) thiodromoides* n. sp. (p. 113) Altai, *A. (Thinobaena) cephalotes* n. sp. (ibid. p. 651) Genua. — *A. (Homalota) madagascariensis* n. sp. **Bernhauer** (Deut. ent. Zeit. 1901 p. 161), *A. (Homal.) insularis* n. sp. (p. 162) u. *A. (Epipeda) Brodschildii* n. sp. (p. 163) Madagascar. — *A. colombica* n. sp. **Fauvel** (Rev. Ent. XX p. 88) Columbien.
- Baryodma* siehe *Aleochara* und **Bernhauer** pag. 149.
- Belonuchus Bugnionis* n. sp. **Fauvel** (Rev. Ent. XX p. 86) Martinique.
- Bledius madagascariensis* n. sp. **Bernhauer** (Zool. bot. 1901 p. 169) Madagascar.
 — *Bl. Poppii* n. sp. **Bernhauer** (D. ent. Z. p. 249) arctisches Russland. —
Bl. microcephalus n. sp. **Fauvel** (Rev. Ent. XX p. 72 tab. I fig. 1).
- Bolitobius limbifer* n. sp. **Fauvel** (Rev. Ent. XX p. 3 u. Bull. Mus. Par. 1901 p. 64) u. *B. melanurus* n. sp. (p. 4 u. p. 65) Japan. — Siehe auch **Luze** pag. 150.
- Bryocharis, Bryoporus* siehe **Luze** pag. 150.
- Cephisus Abeillei* n. sp. **Bernhauer** (D. ent. Z. p. 245) Syrien. Siehe auch *Acanthoglossa*.
- Ceranota* siehe *Aleochara* u. **Bernhauer** pg. 149.
- Chitosa* Cas. 1900 gute Gattung nach **Wasmann** (Can. Ent. 33 p. 249).
- Coprochara* siehe **Bernhauer** pag. 149.
- Cryptobium Munetii* n. sp. **Fauvel** (Rev. Ent. XX p. 80 tab. II fig. 8), *Cr. Steinhelii* n. sp. (p. 81 fig. 9), *Cr. Bugnionis* n. sp. (p. 81 fig. 10) Columbien. —
Cr. detectum n. sp. **Scudder** (Geol. Surv. Canad. II. 2. p. 83 tab. XII fig. 2)
Cr. cinctum n. sp. (p. 83 tab. XII fig. 3) fossil in Canada.
- Decusa* Cas. gute Gatt. nach **Wasmann** (Can. Ent. 33 p. 249).
- Dimetrata* siehe *Atheta*.
- Dinaraea diffusa* n. sp. **Fauvel** (Rev. Ent. XX p. 89 tab. II fig. 16).
- Dinardilla* n. gen. *Liometopi* n. sp. **Wasmann** (Wien. ent. Zeit. 1901. p. 145) Colorado.
- Drusilla (Astilbus) alutacea* n. sp. **Reitter** (D. ent. Z. p. 67) Bucharei.
- Dyschara* siehe **Bernhauer** pag. 149.
- Eleusis howa* n. sp. **Bernhauer** (Deut. ent. Z. 1901 p. 170), *E. scapularis* n. sp.,
E. acuticollis n. sp., *E. inermis* n. sp. (p. 171) u. *E. obscura* n. sp. (p. 172) Madagascar.

Epipeda siehe *Atheta*.

Erchomus tereticornis n. sp. **Fauvel** (Rev. Ent. XX p. 87 tab. II fig. 14), *E. tenui punctatus* n. sp. (p. 88 fig. 15) Columbien.

Eulissus diabolicus n. sp. **Bernhauer** (Deut. Ent. Z. 1901 p. 167) Madagascar.

Falagria scutellaris n. sp. **Fauvel** (Rev. Ent. XX p. 89) Columbien.

Geodromicus asiaticus n. sp. **Bernhauer** (D. ent. Z. p. 249) u. *G. Bodemeyeri* n. sp. (p. 250) Klein-Asien. — *G. stiricidii* n. sp. **Suedder** (Geol. Surv. Canad. II. 1. 1895 p. 43 tab. II fig. 1) fossil in Canada.

Geostiba bisulcata n. sp. **Fauvel** (Rev. Ent. XX p. 253) Algier.

Gymnusa absens n. sp. **Suedder** (Geol. Surv. Canad. II. 2. p. 81 tab. XI fig. 1).

Gyrophana Harmandii n. sp. **Fauvel** (Rev. Ent. XX p. 5 u. Bull. Mus. Par. 1901 p. 279) Japan.

Hasumius suturalis n. sp. **Fairmaire** (Bull. Fr. p. 279) Central-Afrika.

Heterochara siehe **Bernhauer** pag. 149.

Holotrochus pubiventris n. sp. **Fauvel** (Rev. Ent. XX p. 73) Venezuela.

Homalota divisa var. *Blatchii* n. var. **Ellis** (Ent. Rec. XIII p. 250). — Siehe auch *Atheta*.

Homoeochara siehe **Bernhauer** pag. 149.

Homoeusa besprach **Wasmann** (Can. Ent. 33 p. 250), *Solinsa* Cas. u. *Myrmobiota* Cas. = *Homoeusa* (p. 250).

Hydrosmectina siehe *Atheta*.

Ilyobates Bergii n. sp. **Fauvel** (Com. Mus. Buen. Air. I p. 282) Patagonien.

Isochara siehe **Bernhauer** pag. 149.

Lamprinodes, *Lamprinus* siehe **Luze** pag. 149.

Lathrobium (Glyptomerus) Pinkeri n. sp. **Ganglbauer** (Zool. bot. 1901 p. 390) Tyrol. — *S. semirufulum* n. sp. **Bernhauer** (D. ent. Z. p. 242) u. *L. Bang-Haasii* n. sp. (p. 243) Turkestan. — *L. antiquatum* n. sp. **Suedder** (Geol. Surv. Canad. II. 2. p. 83 tab. XI fig. 5), *L. debilitatum* n. sp. (p. 84 tab. XI fig. 6), *L. exesum* n. sp. (p. 84 tab. XI fig. 7), *L. inhibitum* n. sp. (p. 84 tab. XI fig. 4), *L. frustum* n. sp. (p. 85 tab. XI fig. 3) fossil in Canada.

Leptogenius virginicus n. sp. **Fall** (Tr. Am. ent. Soc. 27 p. 304).

Leptusa (Pisalia) oreophila n. sp. **Penecke** (Wien. ent. Zeit. XX p. 12) Koralpe. — *L. sudetica* Lok. = *puellaris* **Hampe** nach **Gerhardt** (Zeit. Ent. Bresl. 26 p. 15, D. ent. Z. p. 157), das ♂ genauer beschrieben (ibid. p. 15, 157). — *L. Sharpii* n. nom. **Fauvel** (Rev. ent. p. 5 u. Bull. Mus. Par. 1901 p. 66.)

Lesteva binotata n. sp. **Reitter** (D. ent. Z. p. 48) Turkestan.

Lispinus colossus n. sp. **Bernhauer** (Deut. Ent. Z. 1901 p. 172) Madagascar.

Medon bucharicus n. sp. **Bernhauer** (D. ent. Z. p. 244) Bucharei, *M. picinus* n. sp. (p. 245) Turkestan. — *M. (Scioporus) intellus* n. sp. **Fauvel** (Rev. Ent. XX p. 79 tab. I fig. 6) Columbien.

Megalogastrina siehe **Bernhauer** pag. 149.

Metaxya siehe *Atheta*.

Mycetoporus siehe **Luze** pag. 150.

Myrmedonia (? *Myrmoecia*) *libanensis* n. sp. **Pic** (Ech. XVII p. 81) Libanon.

Myrmobiota von *Homoeusa* verschieden nach **Casey** (Can. Ent. 33 p. 312). — Siehe *Homoeusa*.

Myrmoecia picta **Wasm.** = *lauta* **Cas.** nach **Wasmann** (Can. Ent. 33 p. 252), *Nototaphra* **Cas.** = *Myrmoecia* (p. 252).

- Nestus* siehe *Stenus*.
Nototaphra siehe *Myrmoecia*.
Ocalea pulcherrima n. sp. **Bernhauer** (Zool. bot. 1901 p. 107) Central-Asien.
Ocyusa mirabilis n. sp. **Bernhauer** (Zool. bot. 1901 p. 107) Central-Asien, *O. grossa* n. sp. (p. 108) Centralasien.
Olophrum celatum n. sp. **Scudder** (Geol. Surv. Canad. II. 2. p. 86 tab. XII fig. 5), *O. arcanum* n. sp. (p. 86 tab. XII fig. 6), *O. dejectum* n. sp. (p. 86 tab. XII fig. 7) fossil in Canada.
Omalius madagassa n. sp. **Bernhauer** (Deut. ent. Z. 1901 p. 173) Madagascar.
Ophiochara siehe Bernhauer pag. 149.
Ophites Bugnienis n. sp. **Fauvel** (Rev. Ent. XX p. 80 tab. I fig. 7) Columbien.
Oreostiba siehe *Atheta*.
Orosius asymmetricus n. sp. **Fauvel** ibid. (p. 72, 256 tab. I fig. 1a).
Oxyopoda termitophila n. sp. **Bernhauer** (D. ent. Z. p. 252) Madagascar bei einer unbekanntenen Termitenart. — *O. japonica* n. sp. **Fauvel** (Rev. Ent. XX p. 5 u. Bull. Mus. Par. 1901 p. 66) Japan.
Oxyopodinus n. gen. **Bernhauer** (Deut. Ent. Z. 1901 p. 174), *O. anxius* n. sp. (p. 175) und *O. lucidus* n. sp. (p. 176) Madagascar.
Oxyporus crocatus n. sp. **Fauvel** (Rev. Ent. XX p. 2 u. Bull. Mus. Par. 1901 p. 64) Japan.
Paederus longiceps n. sp. **Bernhauer** (D. ent. Z. p. 247) Margelan.
Palaminus trapezicollis n. sp. **Fauvel** (Rev. Ent. XX p. 76 tab. I fig. 5) Columbien.
Paraleptusa n. gen. (*Bolitocharini*) **Peyerimhoff** (Ab. XXX p. 55) für *Leptusa* (*Sipalia*) *Helitasii* Peyerimh.
Parocalea siehe Bernhauer pag. 149.
Philhygra siehe *Atheta*.
Philonthus undae n. sp. **Penecke** (Wien. ent. Zeit. XX p. 13) bei Graz. — *Ph. ornatipennis* n. sp. **Reitter** (ibid. p. 158 tab. III fig. 2) Sibirien. — *Ph. Plasonis* n. sp. **Bernhauer** (Deut. ent. Z. 1901 p. 166), *Ph. quisquiliarius* Goh. var. *rubrosuturatus* n. var. (p. 166) Madagascar. — *Ph. Bernhaueri* n. sp. **Csiki** (Zichy II p. 104) Pecking, *Ph. lepidus* var. *mongolicus* n. var. (p. 104). — *Ph. varius* Gyll. var. *oligostigma* n. var. **Leinberg** (Medd. Fenn. 26. 1900 p. 79), *Ph. dimidiatus* Sahlb. var. *apicalis* n. var. u. var. *unicolor* n. var. (p. 184) Finnland. — *Ph. claudus* n. sp. **Scudder** (Geol. Surv. Canad. II. 2. p. 82 tab. XII fig. 1) fossil in Canada.
Phloeocharis gigantea n. sp. **Bernhauer** (Zool. bot. 1901 p. 114) Altai.
Platysthetus volgensis n. sp. **Csiki** (Zichy II p. 105) Russland.
Plochionocerus Dalmasii n. sp. **Fauvel** (Rev. Ent. XX p. 84 tab. II fig. 12) Columbien.
Polychara, Polystoma siehe Bernhauer pag. 149.
Pyroglossa opaca n. sp. **Bernhauer** (D. ent. Z. p. 241) Altai. Siehe auch Bernhauer pag. 149.
Quedius rubripennis n. sp. **Bernhauer** (Verh. Zool. bot. Ges. Wien 1901 p. 652) Caucasus. — *Qu. umbrinus* Grav. var. *tetrastigma* n. var. **Leinberg** (Medd. Fenn. 26. 1900 p. 79) Finnland. — *Qu. deperditus* n. sp. **Scudder** (Geol. Surv. Canad. II. 2. p. 82 tab. XI fig. 2) fossil in Canada.
Rheochara siehe Bernhauer pag. 149.

- Sciocharis Sharpii* n. nom. **Fauvel** (Rev. Ent. XX p. 78) für *Sc. humilis* Sh. nec Er.
- Scopaeus Kraatzii* n. sp. **Bernhauer** (Deut. ent. Zeit. 1901 p. 168) Madagascar.
- Soliusa* siehe *Homoeusa*.
- Staphylinus Sharpii* n. nom. **Fauvel** (Rev. Ent. XX p. 5) für *St. subaeneus* Sh. nec Roth.
- Stenus (Nestus) phyllobates* n. sp. **Penecke** (Wien. ent. Zeit. XX p. 14) Steiermark. — *St. auliensis* n. sp. **Bernhauer** (D. ent. Z. p. 247) Turkestan. — *St. pekinensis* **Csiki** (Zichy II p. 104) China. — *St. cordicollis* n. sp. **Leinberg** (Medd. Fenn. 26. 1900 p. 187) Finnland. — *St. decoloripes* **Fauvel** (Rev. Ent. XX p. 75 tab. I fig. 3) u. *St. denticollis* n. sp. (p. 75 fig. 4) Süd-Amerika.
- Sterculia Nordmannii* n. nom. **Fauvel** (Rev. Ent. XX p. 251) für *St. fulgens* Nordm. nec Fbr., *St. ignea* n. sp. (p. 252) Amazonien.
- Stilicus opacicollis* n. sp. **Bernhauer** (Deut. Ent. 1901 p. 168) Madagascar.
- Tachinus Bernhaueri* n. sp. **Luze** (Verh. Zool. bot. Ges. Wien 1901 p. 389) Altai, *T. Münsteri* n. sp. (p. 614) Norwegen. — *T. Luzei* n. sp. **Bernhauer** (D. ent. Z. p. 242) Turkestan. — *T. mongolicus* n. sp. **Csiki** (Zichy II p. 103) Chara-gol.
- Tachynota* siehe *Atheta*.
- Tachyporus hypnorum* var. *atratus* n. var. **Csiki** (Zichy II p. 103). — Siehe auch **Luze** pag. 149.
- Termitius* n. gen. **Silvestri** (Boll. Tor. p. 8) *pauciseta* n. sp. (p. 9) Paraguay bei *Eutermes*.
- Termitoiceus* n. gen. (bei *Xenogaster*) **Silvestri** (Boll. Tor. p. 5) *anastrephoproctus* n. sp. (p. 6) Süd-Amerika bei *Eutermes*.
- Termitothymus* n. gen. (bei *Abroteles*) **Silvestri** (ibid. p. 1) *philaeterus* n. sp. (p. 2) bei *Eutermes*.
- Termitozophilus* n. gen. **Silvestri** (ibid. p. 7) *laetus* n. sp. (p. 8) Paraguay bei *Cornitermes*.
- Timeparthenus* n. gen. **Silvestri** (ibid. p. 10) *regius* n. sp. (p. 11) Süd-Amerika bei *Eutermes*.
- Tomoxelia* n. gen. **Bernhauer** (Deut. Ent. Z. 1901 p. 164), *T. tropica* n. sp. (p. 165) Madagascar.
- Triochara* siehe *Aleochara*.
- Trogophloeus Ganglbaueri* n. sp. **Bernhauer** (Verh. Zool. bot. Ges. Wien. 1901 p. 653) Neusiedler-See, *Tr. Augustae* n. sp. (p. 654) Pola. — *Tr. tener* n. sp. **Bernhauer** (D. ent. Z. p. 249) Turkestan.
- Xantholinus linearis* Kr. u. *longiventris* Heer unterschied **Gerhardt** (Zeit. Ent. Bresl. 26. 1901 p. 1—5, D. ent. Z. p. 205—208). — *X. Belisarius* n. sp. **Abeille** (Nouv. esp. Col. p. 2, Ech. 17. p. 60) See-Alpen. — *X. corallinus* n. sp. **Reitter** (D. ent. Z. p. 68) Bucharei, *X. semirufus* n. sp. (p. 68) Samarkand, *X. Fuenteanus* n. sp. (p. 68) Spanien. — *X. hydrocephalus* n. sp. **Fauvel** (Rev. Ent. XX p. 83 tab. II fig. 11) Columbien.
- Xenochara* siehe *Bernhauer* pag. 149.
- Xenogaster nigricollis* n. sp. **Silvestri** (Boll. Mus. Tor. XVI 398 p. 3) Süd-Amerika.
- Xenota* siehe *Atheta*.

Raffray 2.

Fam. *Clavigeridae*.

Systematik.

Braunsiella n. gen. **Raffray** (Bull. Fr. p. 201), *Br. pubiventris* n. sp. (p. 202) Kap.Fam. *Pselaphidae*.

Fleischer 1, Meijere 1, Normand 1, Peyerimhoff 1, 2, Pic 32, 48a, Poppius 6, Raffray 3, 4, Reitter 1, 4, 17, 29, 34, Schmitt 1, Wickham 1.

Morphologie.

Meijere (1) erwähnte die Klauenbildung der *Pselaphiden* (p. 431).

Geographische Verbreitung.

Poppius (6) berichtete über *Bythinus nodicornis* in Finnland.

Systematik.

Umfassende Arbeiten.

Reitter.

Ueber die Arten der Coleopteren-Gattung
Pselaphoptrus Reitt.

(Wien. ent. Zeit. XX p. 123—124).

Eine dichotomische Auseinandersetzung von 3 palaearktischen Arten von denen 1 neu ist.

Die behandelten Arten.

Pselaphoptrus Kubischtekie Reitt.*), *Ps. Banghaasi* Reitt., *Ps. Lomnickii* n. sp. (p. 124) Ostgalizien.

Einzelbeschreibungen.

Adranes pacificus n. sp. **Wickham** (Can. Ent. 33 p. 25, 26) Californien, *A. Tayloris* n. sp. (p. 26, 27) Oregon, dich. Tab. über 4 sp. (p. 25—26).*Amavrops leptoderina* n. sp. **Reitter** (Wien. ent. Zeit. XX p. 22) Dalmatien. — *A. dentatithorax* n. sp. **Pic** (Bull. Autun XIII p. 25) mit var. *rufipennis* n. var. (p. 25) Brussa.*Asymoplectus senipunctatus* n. sp. **Raffray** (Ann. S. Afr. Mus. II p. 120), *A. fissus* n. sp. (p. 121).*Batrisodes singalensis* n. sp. **Raffray** (Ann. Fr. p. 27) und *B. saucius* n. sp. (p. 27) Ceylon.*Biblioplectus angustulus* n. sp. **Raffray** (Ann. Afr. Mus. II (p. 120) Süd-Afrika.*Bythinus Formanekii* n. sp. **Fleischer** (Wien. ent. Zeit. 1901. p. 144) Dalmatien.— *B. Koramanii* Reitt. = *Hoffgartenii* Reitt. nach **Reitter** (ibid. p. 59),*B. Brenskei* Reitt. = *convexus* Kiesw. (p. 175). — *B. (Xenobythus* n. subg.)*) Da Reitter die Art der Frau Kubischtek gewidmet hat, ist der Name nicht *Kubischtekii* sondern wie oben zu schreiben.

Serullazii n. sp. **Peyerimhoff** (Bull. Fr. p. 203 fig. 1, 2), dichot. Tab. über die 4 Untergatt.: *Machaerites* Mill., *Trichobythus* Dod., *Xenobythus* n. subg. u. *Bythoxenus* Mot. (p. 204—205), alle Arten mit augenlosen ♀♀ sind vielleicht natürlicher nicht in besondere subgg. zu stellen (ibid. p. 297—298). — *B. pastoralis* n. sp. **Peyerimhoff** (Ab. XXX p. 56) See-Alpen. — *B. (Eccoptybythus* n. subg.) *paradoxus* n. sp. **Deville** (Bull. Fr. p. 271, fig.) Nizza. — *B. judaeus* n. sp. **Pic** (Bull. Mus. 25 p. 182) Jericho.

Bythoxenus siehe *Bythinus*.

Centrophthalmus grandicornis n. sp. **Raffray** (Ann. Afr. Mus. II p. 125), *C. gracilis* n. sp. (p. 126) Süd-Afrika.

Cercocerus siehe *Upoluna*.

Chaetorhopalus minutus n. sp. **Raffray** (Ann. Afr. Mus. II p. 117) Süd-Afrika.

Eccoptybythus siehe *Bythinus*.

Enoptostomus alternans n. sp. **Raffray** (Ann. Afr. Mus. II p. 125) Süd-Afrika.

Hornia n. gen. (*Tyrini*) **Raffray** (Ann. Fr. p. 29), *H. Hirtella* n. sp. (p. 30) Ceylon.

Machaerites siehe *Bythinus*.

Periplectus bicolor n. sp. **Raffray** (Ann. Afr. Mus. II p. 118) Süd-Afrika.

Pselaphoptrus siehe Reitter p. 155.

Pselaphus tunisicus n. sp. **Normand** (Bull. Fr. p. 147) Tunis. — *P. Banghaasii* siehe Reitter pag. 155.

Reichenbachia dimidiata n. sp. **Raffray** (Ann. Afr. Mus. II 123), *R. Marshallii* n. sp. (p. 124) Süd-Afrika.

Rybaxis africana n. sp. **Raffray** (ibid. p. 122) Rhodesia.

Saulcyella n. gen. (bei *Aphiliops*) **Reitter** (Wien. ent. Zeit. XX p. 229) für *Trimium Schmidtii* Maerk. A. (= *lativentris* Chaud.)

Syntectodes tortipalpus n. sp. **Raffray** (Ann. Fr. p. 28) Ceylon.

Trimiodytes sulcifrons n. sp. **Raffray** (Ann. Afr. Mus. II p. 119) Süd-Afrika.

Tychus bescidicus n. sp. **Reitter** (D. ent. Z. p. 187) Beskiden, *T. balcanicus* n. sp. (p. 187) Türkei. — *T. tunisicus* n. sp. **Pic** (Ech. 17 p. 2) Tunis.

Upoluna Scharf = *Cercocerus* Lec. nach **Schmitt** (Ann. Carn. Mus. p. 284).

Xenobythus siehe *Bythinus*.

Fam. *Scydmaenidae*.

Deville 3, Lokay 1, Paganetti-Hummler 1, Peyerimhoff 5, Pic 10, 32, 34, 48a, Reitter 4.

Biologie.

Paganetti-Hummler (1) berichtete über *Leptomastax hypogaeus*.

Systematik.

Einzelbeschreibungen.

Cephennium (Megaloderus) tunisicum n. sp. **Pic** (Ech. XVII p. 2) Tunis.

Euconnus aegyptiacus n. sp. **Pic** (Bull. Ant. XIII p. 26) *Egypten*, *Eu.* (*Napochus*) *jordanensis* n. sp. (p. 26) Jericho.

Euthia minutissima n. sp. **Deville** (Ab. XXX p. 57) See-Alpen.

Leptomastax latipennis n. sp. **Pic** (Bull. Autun XIII p. 32) Syrien.

Mastigus graecus n. sp. **Pic** (Ech. XVII p. 49) Olympia von *dalmatinus* Heyd. wohl verschieden nach **Pic** (Bull. Fr. p. 363), — von *dalmatinus* nicht verschieden nach **Reitter** (Wien. ent. Zeit. XX p. 176).

Megaloderus siehe *Cephennium*.

Napochus siehe *Euconnus*.

Neuraphes (*Scydmoraphes*) *Klapalekii* n. sp. **Lokay** (Wien. ent. Zeit. 1901. p. 131, fig.) Unterkrain.

Stenichnus angustissimus n. sp. **Peyerimhoff** (Ab. XXX p. 58) Basses-Alpes.

Fam. *Silphidae*.

Abeille 3, Apfelbeck 1, Blaisdell 1, Carret 2, Csiki 7, Deville 3, Kolbe 1, J. Müller 2, Pic 32, 47, Reitter 4, 12, 16, 18, 30, 33.

Biologie.

Eichelbaum (1) beschrieb die Larven von *Catops Watsonis* Sp. u. (?) *picipes* Fbr. ausführlich mit einer Tafel Abbildungen.

Blaisdell (1) beschrieb die Puppe von *Necrophilus hydrophiloides*.

Systematik.

Kolbe (1) theilte die Familie (jedoch ohne Begründung) in *Silphiden* und *Catopiden* (p. 134).

Umfassende Arbeiten.

Carret.

Contribution à la faune française. *Necrophorus nigricornis* Fald. dans nos Alpes. (*Col.*)

(Bull. Soc. ent. Fr. 1901 p. 327—331).

Eine dichotomische Auseinandersetzung der 9 in Frankreich gefundenen Arten, nebst einer neuen Varietät.

Die behandelten Arten.

Necrophorus germanicus L., *N. humator* Goez., *N. vestigator* Hersch. mit var. *interruptus* Brull. u. var. *degener* n. var. (p. 330) Frankreich, *N. vespillo* L., *N. nigricornis* Fld. (= *sepulchralis* Heer), *N. investigator* Zett., *N. fossor* Er., *N. sepultor* Charp., *N. mortuorum* Fbr.

Müller.

Beitrag zur Kenntniss der Höhlensilphiden.

(Verh. Zool. bot. Ges. Wien 1901 p. 16—33 tab. I).

Die alte Gattung *Leptoderus* wird hier einer (für die Untergattungen u. die 11 Arten) dichotomischen Revision unterworfen und in 4 Gatt. getheilt, von denen eine neu ist. Bei den Gattungen und Untergattungen vermisst man die Autoren-Angabe.

Die behandelten Gattungen und Arten.

Antroherpon (*Eumecosoma* n. subg. p. 29) *stenocephalum* Apf., *A. i. sp. pygmaeum* Apf., *A. Hoermannii* Apf., *A. Ganglbaueri* Apf., *A. cylindricolle* Apf.
Leptoderus i. sp. *Hohenwartii* Schm., *L. (Astagobius) angustatus* Schm.
Spelaeobates n. gen. (p. 16, 18) *Novakii* n. sp. (p. 19 tab. I fig. 1—7) u. *Sp. pharensis* n. sp. (p. 20 fig. 9) Dalmatien.
Propus (i. sp.) *Ganglbaueri* Apf., *Pr. sericeus* Schm. (fig. 8) *Pr. (Protobracharhron) Reitteri* Apf.

1. Reitter.

Uebersicht der bekannten *Agyrtes*-Arten.

(Wien. ent. Zeit. XX p. 102).

Eine dichotom. Auseinandersetzung von 4 Arten und 2 Untergatt., von denen die eine offenbar neu zu sein scheint, obgleich sie ausdrücklich so bezeichnet wird, als habe sie bloss einen neuen Namen erhalten. („nom. nov.“)

Die behandelten Arten.

Agyrtes (Agyrtecanus n. subg.? p. 102) *bicolor* Cast., *A. (i. sp.) castaneus* Fröhl., *A. ferrugineus* Solsk. (= *rufus* Reitt.), *A. alutaceus* n. sp. (p. 102) Anatolien.

2. Reitter.

Ueber die *Silpha carinata* Hrbst. und nächste Verwandte.
(Wien. ent. Zeit. XX p. 121—123).

Eine dichotomische Auseinandersetzung von 12 paläarktischen Arten, von denen 1 neu.

Die behandelten Arten.

Silpha bilineata n. sp. (p. 121 u. 122) Rumänien, *S. carinata* Hrbst. mit var. *atropurpurea* Küst., var. *blattiformis* n. var., var. *rufocincta* n. var. (p. 121) Central-Asien, var. *italica* Küst., var. *carpathica* n. var. (p. 122) Karpathen, var. *austriaca* Otto, var. *armeniaca* Kolen., *S. perforata* Gebl. mit var. *mongolica* Fld. u. var. *venatoria* Harold.

3. Reitter.

Uebersicht der Coleopteren-Gattung *Catops* Payk. aus der paläarktischen Fauna.

(Deut. ent. Zeitschr. 1901 p. 39—48.)

Eine neue dichotomische Tabelle der paläarktischen Arten der Gattung *Catops* Payk., die hiermit auf 41 anwachsen. Dabei ist *Sciodrepa* Thms. eingeschlossen, aber *Ptomaphagus* Hellw., *Nemadus* Thms., *Anemadus* Reitt., *Attumbra* Goz., *Nargus* Thoms. u. *Choleva* Latr. sind ausgeschlossen. Die Gattung ist in 5 Untergattungen zerlegt, von denen 2 neu zu sein scheinen, was aber nicht gesagt wird.

Die behandelten Untergatt. u. Arten.

- Catops* (*Cholevinus* n. subg.? p. 39¹) *fuscipes* Mén., *conicicollis* n. sp. (p. 39) Orenburg, *Sahlbergii* Reitt., *rufus* Kr. (= *cuneiformis* Fairm.), *cholevoidea* Reitt., *pallidus* Mén. (= *Menetriesii* Fald.)
- C.* (*Sciodrepa* Thms.) *umbrinus* Er., *depressus* Marr., *fumatus* Spenc., *Watsonis* Sp.
- C.* (i. sp.) *brevipalpis* n. sp. (p. 41) Irkutsk, *brunneipennis* Sahlb., *laticollis* Sahlb., *grusinus* Reitt., *picipes* Fbr. (= *grandis* Reitt.), *marginicollis* Luc., *fuscus* Pz., *nigricantoides* n. sp. (p. 42) Araxesthal, *nigricans* Sp., *flavicornis* Thms., *fuliginosus* Er., *grandicollis* Er., *substriatus* Reitt., *nigrita* Er. (= *affinis* Reitt.), *coracinus* Kelln., *morio* Fbr., *quadraticollis* Aub., *speluncarum* Reitt., *subfasciatus* Reitt., *neglectus* Kr., *Kirbyi* Sp., *chrysomeloides* Pz., *longulus* Kelln., *tristis* Pz. (= *ventricola* Weise), *dichrous* Reitt., *nitidicollis* Kr., *angustitarsis* Reitt., *tortiscelis* n. sp. (p. 46) Ostsibirien.
- C.* (*Lasiocatops* n. subg.? p. 46, 47¹) *hybridus* Reitt., *Oertzenii* Reitt., *alpinus* Gyll., *alpinoides* n. sp. (p. 48) Ostsibirien.
- C.* (*Chionocatops* Ganglb.) *Bugnionis* Tourn.

Einzelbeschreibungen.

- Agyrtecanus*, *Agyrtes* siehe Reitter pag. 158.
- Antroherpon stenocephalum* n. sp. **Apfelbeck** (Zool. bot. 1901 p. 15) Bosnien. — Siehe auch Müller pag. 158.
- Bathyscia Horvathii* n. sp. **Csiki** (Term. Füset. XXIV p. 487) in einer Höhle bei Fiume. — *B. Neumannii* n. sp. **Apfelbeck** (Zool. bot. 1901 p. 15) in einer Höhle in Bosnien. — *B. minuscula* n. sp. **Abeille** (Nouv. esp. Col. p. 4, Ech. 17 p. 68) Frankreich.
- Catopomorphus funebris* Reitt. besprach **Reitter** (Wien. ent. Zeit. XX p. 59).
- Catops* siehe Reitter oben.
- Chionocatops* siehe Reitter oben.
- Choleva palaestina* n. sp. **Pic** (Bull. Soc. Aut. 1899 p. 204) Palaestina. — *Ch. Lederiana* n. sp. **Reitter** (D. ent. Z. p. 177) Altai.
- Cholevinus* siehe Reitter oben.
- Colon distinctipes* n. sp. **Pic** (Ech. XVII p. 65) Corfu, *C. alpestre* n. sp. (p. 65) Alpen.
- Eumecosoma* siehe Müller pag. 158.
- Lasiocatops* siehe Reitter oben.
- Leonhardia* nov. gen. *Hilfi* n. sp. **Reitter** (Wien. ent. Zeit. 1901, p. 128) Herzegovina.
- Leptoderus* siehe Müller pag. 158.
- Necrophorus* siehe Carret pag. 157.
- Pholeuonopsis* n. gen. **Apfelbeck** (Zool. bot. 1901 p. 14), *Ph. Ganglbaueri* n. sp. (p. 14) Süd-Bosnien.
- Propus*, *Protobracharthron* siehe Müller pag. 158.
- Sciodrepa*, *Silpha* siehe Reitter pag. 158 u. oben.
- Spelaeobates* siehe Müller pag. 158.

1) Ob diese Untergattung neu ist, wird verschwiegen.

Trogloedromus n. gen. (*Leptoderini*) **Deville** (Ab. XXX p. 59), dichot. Tab. über 3 Gatt. (p. 59), *Tr. Gavetii* n. sp. (p. 59) See-Alpen, *Tr. Bonafontis* n. sp. (p. 72) Nizza, hierher auch *Cytodromus Buchatii* Dev., dichot. Tab. über 2 sp. (p. 60).

Fam. Anisotomidae.

Abeille 3, Chobaut 2, Kolbe 1, Leinberg 5, Reitter 32, Sahlberg 2.

Geographische Verbreitung.

Sahlberg berichtete über *Anisotoma silesiaca* Kr., *Colon armipes* Th., *Hydnobius spinipes* Gyll. und *H. spinula* Zett. aus Finnland, **Leinberg** (5) über *Anisotoma macropus* aus Finnland.

Systematik.

Kolbe (1) rückte die Familie von den *Silphiden* weiter ab, indem er die *Hypocephaliden* zwischen sie und die *Catopiden* einschob (p. 134), was sich wohl kaum rechtfertigen lässt, trotz der vom Autor herangezogenen Aehnlichkeiten des *Hypocephalus* mit *Catops* und mit *Anisotoma*.

Einzelbeschreibungen.

Agathidium Puelii n. sp. **Chobaut** (Bull. Fr. p. 281) Algier.

Anisotoma hiemalis n. sp. **Abeille** (Nouv. esp. Col. p. 3, Ech. 17. p. 61 *Liodes*) See-Alpen u. Montpellier. — *A. baicalica* n. sp. **Reitter** (D. ent. Z. p. 69 *Liodes*) Baikal-See. — *A. ruficollis* n. sp. **Sahlberg** (Medd. Faun. Fl. fenn. 23. 1898 p. 29, 31) Helsingfors, *A. punctulata* Gyll. vera (p. 28, 31), *A. punctulata* Reitt. Seidl. nec Gyll. = *A. liturata* Steph. (p. 29), *A. inordinata* n. sp. (p. 32) Kuopio.

Triarthron punctipennis n. sp. **Reitter** (D. ent. Z. p. 69) Turkestan.

Fam. Corylophidae.

Reitter 32.

Systematik.

Einzelbeschreibungen.

Orthoperus acariformis n. sp. **Reitter** (D. ent. Z. p. 70) Turkestan.

Fam. Trichopterygiden.

Meijere 1, Mjöberg 1.

Morphologie.

Meijere (1) schilderte die Klauenbildung nebst Onychium bei *Trichopteryx* u. bei *Ptenidium evanescens* (p. 431 tab. 32 fig. 45).

Geographisches.

Mjöberg (1) führte *Ptilium* (*Trichoptilium*) *Sahlbergii* aus Schweden an.

Systematik.

Neuglenes rotundicollis n. sp. **Abeille** (Nouv. esp. Col. p. 4 Ech. 17. p. 62) Basses-Alpes.

Fam. Phalacridae.

Kolbe 1.

Systematik.

Kolbe (1) entfernte die Familie aus den *Clavicorniern* und brachte sie, zusammen mit den *Erotyliden* und *Languriiden*, in die Abtheilung A. seiner „*Anchistopoden*“, die ausserdem die *Cerambyciden*, *Bruchiden* und *Chrysomeliden* enthält, während die Abth. B. aus den *Endomychiden* und *Coccinelliden* besteht.

Fam. Erotylidae.

Gorham 2, 3, Kolbe 1, Reitter 1, 4, 7, Ritsema 1.

Systematik.

Kolbe (1) stellte die *Erotyliden* zusammen mit den *Languriiden* und *Phalacriden* in die Abtheilung A. seiner „*Anchistopoden*“ in welcher ausserdem die *Cerambyciden*, *Bruchiden* und *Chrysomeliden* stehen, während die *Endomychiden* und *Coccinelliden* zusammen die Abth. B. bilden.

Umfassende Arbeiten.

Reitter.

Uebersicht der Arten der Coleopteren-Gattung *Triplax* *Payk.* aus Europa und den angrenzenden Ländern.

(Wien. ent. Zeit. XX p. 73—76).

Eine dichotomische Auseinandersetzung über 23 palaearktische Arten, von den 2 neu sind.

Die behandelten Arten.

Triplax aenea Schall., *Tr. elongata* Lacord., *Tr. russica* L., *Tr. Lacordairei* Crotch., *Tr. pygmaea* Kr., *Tr. melanocephala* Latr. *Tr. apicipennis* n. sp. (p. 74) Kaukasus, *Tr. rubrica* Reitt., *Tr. nigratarsis* Reitt., *Tr. Bedelii* Reitt., *Tr. Marseulii* Bedel., *Tr. rudis* Reitt., *Tr. cyanescens* Bed., *Tr. subtilissima* n. sp. (p. 75) Altaigebirge, *Tr. subcylindrica* Reitt., *Tr. caucasica* Reitt., *Tr. Emgei* Reitt., *Tr. bicolor* Gyll., *Tr. carpathica* Reitt., *Tr. lepida* Fald., *Tr. tergestana* Reitt., *Tr. analis* Reitt., *Tr. rufipes* F., *Tr. swanetica* Reitt., *Tr. collaris* Schall.

Einzelbeschreibungen.

- Anadastus distinguendus* n. sp. **Gorham** (Stett. ent. Z. 62 p. 175) Sumatra.
Amblyscelis siehe *Triplax*.
Aulacochilus Moensicus n. sp. **Gorham** (Stett. ent. Z. 62. p. 184) u. *Au. Dohrnii* n. sp. (p. 186) Sumatra.
Callilanguria Dohrnii n. sp. **Gorham** (Stett. ent. Z. 62 p. 171) Sumatra.
Cyrtomorplus histerooides n. sp. **Gorham** (Stett. ent. Z. 62 p. 187) Sumatra.
Cyrtotriplax siehe *Tritoma*.
Episcaphula Dohrnii n. sp. **Gorham** (Stett. ent. Zeit. 62 p. 181) u. *E. Dwivieri* n. sp. (p. 182) Sumatra. — *E. picturata* n. sp. **Gorham** (Ann. Mus. Nat. Hist. 1901. VII p. 362) Mashonaland.
Helota Margarethae n. sp. **Ritsema** (Not. Leyd. Mus. 22 p. 27, 31) u. *H. Krügeri* n. sp. (p. 29, 32) Britisch Bhotan, dich. Tab. über 4 Arten (p. 31—32).
Micrencaustes sexpustulata n. sp. **Gorham** (Stett. ent. Z. 62. p. 178) Sumatra.
Pachylanguria mestasternalis Crot. und *P. Speyeri* Kr. = *potatoria* Wied. nach **Gorham** (Stett. ent. Z. 62. p. 170).
Paracladoxena sanguinalis n. sp. **Gorham** n. sp. (Stett. ent. Z. 62. p. 177) Sumatra.
Promecolanguaria natalensis n. sp. **Gorham** (Ann. Mag. Hist. 1901. VII. p. 362) Natal.
Tetralanguria elongata Fbr. besprach **Gorham** (Stett. ent. Z. 62 p. 170).
Triplacidea n. gen. **Gorham** (Stett. ent. Z. 62. p. 191) *cingalensis* n. sp. (p. 192) Ceylon, *Tr. sumatrensis* n. sp. (p. 193) Sumatra, *Tr. haemorrhoea* n. sp. (p. 193) Borneo, hierher auch *Triplax Motschoulskyi* Bedel.
Triplax fusciventris n. sp. **Reitter** (Wien. ent. Zeit. XX p. 23) Slavonien. — *Tr. vittipennis* gehört zu *Amblyscelis* nach **Gorham** (Ann. Mag. nat. Hist. VII p. 364). — Siehe auch Reitter pag. 161.
Tritoma subbasalis Rtt. var. *subtransversa* n. var. **Reitter** (Wien. ent. Zeit. XX p. 58) Galizien, *Tr. Jakowlewii* Sem. = *subbasalis* Reitt., *Tr. sibirica* Sem. = *subbasalis* var. (p. 58, *Cyrtotriplax*). — *Tr. arridens* n. sp. **Gorham** (Stett. ent. Z. 82 p. 189 *Cyrtotriplax*) Sumatra.

Fam. *Endomychidae*.

Csiki 1, 5, Fall 4, Gorham 2, 3, Kolbe 1, Reitter 11.

Systematik.

Kolbe (1) bildete aus den *Endomychiden* und *Coccinelliden* die Abtheilung B. seiner „*Anchistopoden*“. Vergl. *Erotyliden*.

Csiki (5) lieferte einen Catalog der ganzen Familie mit genauen Literatur- u. Fundortangaben. Die Artenzahl ist seit 1858 (224 sp.), 1873 (302 sp.) u. 1876 (366 sp.) jetzt auf 585 sp. gestiegen.

Einzelbeschreibungen.

- Alexia compressa* n. sp. **Reitter** (Wien. ent. Zeit. XX p. 99) Constantinopel,
A. pubescens Friv. u. *pilosissima* Friv. bei Adrianopel (p. 59).

- Amphistermus papulatus* n. sp. **Gorham** (Stett. ent. Z. 62. p. 195), *A. eruptus* n. sp. (p. 196) u. *A. vomeratus* n. sp. (p. 197) Sumatra, *A. cultratus* n. sp. (p. 197) Borneo, *A. spinosus* n. sp. (p. 199) Sumatra.
- Dapsa (Phylira) Horvathii* n. sp. **Csiki** (Zichy Reise II p. 106) Sibirien.
- Eumorphus insignis* n. sp. **Gorham** (Stett. ent. Z. 62. p. 200) u. *Eu. opatinus* n. sp. (p. 201) Sumatra.
- Mycetina erubescens* n. sp. **Gorham** (Stett. ent. Z. p. 204) Borneo, Sumatra, *M. brevicollis* n. sp. (p. 205) Borneo. — *M. endomychoides* n. sp. **Fall** (Tr. Am. ent. Soc. 27 p. 304).
- Oediarthrus natalensis* Gerst. ♀ beschrieb **Gorham** (Ann. Mag. nat. Hist. VII p. 401).

Fam. *Cryptophagidae*.

Poppius 10, **Sahlberg** 7, **Ssemenow** 10.

Geographische Verbreitung.

Sahlberg (7) führte *Cryptophagus cylindrus* Kiesw. aus Finnland auf.

Systematik.

- Cryptophagus plagiatus* n. sp. **Poppius** (Medd. Fenn. 26. 1900 p. 189) Finnland.
Leucohimatium Jakowleffii n. sp. **Ssemenow** (Hor. ross. 35 p. 255) Krimm, dich. Tab. über 4 Arten (p. 256—258).

Fam. *Lathridiidae*.

Belon 1, 2, 4, **Eichelbaum** 2, **Poppius** 5, **Reitter** 1, 23, 33.

Biologie.

Eichelbaum (2) beschrieb die Larve u. die Puppe von *Cartodere filum* (p. 531—536 fig. O—T).

Geographische Verbreitung.

Poppius (5) führte *Cartodere filum* aus Finnland auf.

Systematik.

Umfassende Arbeiten.

1. **Belon**.

Le genre *Cortilena* Motsch. (*Lathridiidae*) et synopse de toutes les espèces actuellement connues.

(Ann. Soc. ent. Belg. 45. 1901 p. 86—89).

Dichotomische Revision von 8 Arten, die zu *Cortilena* vereinigt werden, wobei indess nicht gesagt wird, ob nach der gegebenen Charakteristik (p. 86—87) *Cortilena* eine selbstständige Gattung oder eine Untergattung von *Melanophthalma* sein soll.

Die behandelten Arten.

Cortilena Chamaeropsis Fall., *birmana* Bel., *casta* Fall., *picta* Lec., *signata* Bel.,
fuscipennis Mannh., *simplex* Lec., *capicola* Bel.

2. Belon.

Revision du genre *Cortilena* Motschulsky de la
 tribu des *Corticariens*.

(Ann. Soc. Linn. Lyon 48. p. 129—151).

Die Gattung *Melanopthalma* wird in 4 Untergattungen geteilt,
 von denen eine *Cortilena* Mot. ist. Von dieser werden dieselben
 8 Arten beschrieben, die bei der vorhergehenden Arbeit genannt
 sind.

Einzelbeschreibungen.

Anommatus Titanus n. sp. **Reitter** (Wien. ent. Zeit. XX p. 23) Dalmatien.

Coninomus Apfelbeckii n. sp. **Reiter** (Wien. ent. Zeit. XX p. 159 tab. III fig. 3)
 Constantinopel, Adampol.

Cortilena siehe Belon oben.

Holoparamesus Truquii Baud. unterschied von *Kunzei* Aub. **Belon** (Bull. Fr.
 p. 169).

Lathridius altaicus n. sp. **Reitter** (D. ent. Z. p. 177) Altai.

Merophysiosops n. gen. **Semenow** (Mem. Ac. Pet. (8) VIII. 1899. p. 15 nota
 2¹) für *Merophysia bicarinata* Reitt.

Fam. *Colydiidae*.

Abeille 3, Belon 3, Pic 30, Reitter 26.

Systematik.

Cerylon histeroides var. *nigripes* n. var. **Reitter** (Wien. ent. Zeit. XX p. 200)
 Mähren.

Coxelus luteopilosus n. sp. **Pic** (Ech. XVII p. 3) Brussa.

Agelandia Merkliana Reitt. besprach **Belon** (Ech. 17. p. 35).

Synchita angularis n. sp. **Abeille** (Nouv. esp. Col. p. 3, Ech. XVII p. 61) See-
 Alpen u. Moldau.

Fam. *Cossyphodidae*.

Brauns 1, Wasmann 4.

Systematik.

Umfassende Arbeit.

Wasmann gab eine Gattungstabelle der Familie mit Figuren.

¹) Die Gatt. ist nur benannt, aber nicht charakterisirt u. somit bisher noch
 nicht prioritätsberechtigt, worauf der geehrte Autor hiermit aufmerksam ge-
 macht sei denn die Bezugnahme auf **Reitter's** und **Belon's** Art-Beschreibungen
 kann unmöglich als Gattungs-Beschreibung gelten.

Einzelbeschreibung.

Cossyphodites n. gen. Brauns (Ann. Hofmus. Wien XVI 91) für *Cossyphodes Woodrooffei* Pér.

Fam. Cucujidae.

Arrow 2, Felt 1, Reitter 25, 32.

Biologie.

Felt (1) gab eine kurze Beschreibung und Abbildung der Larve u. der Puppe von *Silvanus surinamensis* (p. 39 fig. 71).

Systematik.

Umfassende Arbeit.

Reitter.

Die europäischen Arten der Coleopteren-Gattung

Monotoma.

(Wien. ent. Zeit. XX p. 193—197).

Eine dichotomische Auseinandersetzung der 16 europäischen Arten, von denen 2 neu sind.

Die behandelten Arten.

Monotoma (*Gyrocecis* Th.) *quadrioveolata* Aub. (= *quadriimpressa* Reitt. nec Mot. = *subquadrioveolata* Fowl. nec Wat.), *conicicollis* Aub. (= *angusticollis* Thms. nec Aub.), *angusticollis* Gyll. (= *formicetorum* Thms.), *M.* (i. sp.) *spinicollis* Aub. (= *spinigera* Chaud. = *spinifera* Woll.), *M. picipes* Hrbst. (= *scabra* Kunz. = *robustula* Mot.) mit var. *cavicula* n. nom. (p. 194) für *M. subquadrioveolata* Reitt. nec Wat., *M. brevipennis* Kunz., *M. quadridentata* Thms., *M. brevicollis* Aub., *M. punctaticollis* Aub. (= *brevicornis* Mot.), *M. Dieckii* Reitt., *M. conicithorax* Reitt., *M. quadricollis* Aub. (= *bicolor* Villa, *obtusicollis* Mot., *quisquiliarum* Redt.), *parallela* Thms., *Thomsonis* Reitt.), *M. testacea* Mot. (= *rufa* Redt., *subquadrioveolata* Wat., *quadrioveolata* Fowl. nec Aub., *ferru gineu* Bris.), *M. seriata* n. sp. (p. 196) Caucasus, *M. inseriata* n. sp. (p. 197) Ordubad, *M. longicollis* Gyll. (= *flavipes* Kunz.).

Einzelbeschreibungen.

Airaphilus Semenowii n. sp. Reitter (D. ent. Z. p. 71) Bucharei, *A. ruthenus* Solsk. u. *seminiger* Group. = *geminus* Kr. var. (p. 71).

Gyrocecis siehe Reitter oben.

Hyliota bicolor n. sp. Arrow (Tr. ent. Soc. Lond. 1901 p. 597) Australien, *H. gracilicornis* n. sp. (p. 598) Sumatra, *H. siamensis* n. sp. (p. 599) Siam, *H. indica* n. sp. (p. 599) Indien, *H. pallida* n. sp. (p. 600) u. *H. brevicollis* n. sp. (p. 601) Madagascar, Aufzählung aller 32 Arten (p. 594—595).

Monotoma siehe Reitter oben.

Silvanus surinamensis abgebildet von Felt (Bull. N. York. St. Mus. 37. VIII (p. 39 fig. 71).

Fam. Trogositidae.

Léveillé 1, Pic 30.

Systematik.*Alindria Decorsei* n. sp. Léveillé (Bull. Fr. p. 318).*Nemosoma syriacum* n. sp. Pic (Ech. XVII p. 33) Libanon.*Nemozomia Landesii* n. sp. Léveillé (Bull. Fr. p. 318) Martinique.*Fam. Nitidulidae.*

Csiki 1, Grouvelle 1, Kolbe 1, Leinberg 3, Reitter 32, 34, Schaeffer 2, Schwarz 2, Xambeu 1.

Biologie.**Xambeu** (1) beschrieb die Larve von *Carpophilus hemipterus* (p. 39) u. *Pocadius ferrugineus* (p. 56), die Larve u. die Puppe von *Cryptophagus subdepressus* (p. 16) u. *Cr. scanicus* (p. 27).**Schwarz** (2) gab biologische Aufschlüsse über *Carpophilus Yuccae* u. *lacertosus*.**Palaeontologie.****Scudder** (1) beschrieb eine *Prometopia* aus Canada.**Systematik.****Kolbe** (1) zerlegte die Familie (ohne morphologische Begründung) in 3: *Nitiduliden*, *Ipiden* und *Rhizophagiden*.**Einzelbeschreibungen.***Anister* nov. gen. (bei *Nosodendron*) **Grouvelle** (Bull. Fr. p. 102), *A. Raffrayi* n. sp. (p. 102) Tunis u. Abyssinien.*Brachyleptus notativentris* n. sp. **Reitter** (D. ent. Z. p. 188) Palästina.*Brachypterus sibiricus* n. sp. **Csiki** (Zichy II p. 106) Omsk.*Cercus (Cateretes) pedicularius* L. var. *scutellaris* n. var. **Leinberg** (Medd. Fenn. 26. 1900 p. 186), var. *nigriventris* n. var. u. var. *alandicus* n. var. (p. 186), *C. bipustulatus* Payk. var. *nigricollis* n. var. u. var. *lapponicus* n. var. (p. 187) Finnland u. Lappland, dich. Tab. über beide Arten u. 8 varr. (ibid. p. 186—187).*Micrurula auripubens* n. sp. **Reitter** (D. ent. Z. p. 70) Mongolei.*Psilopyga fasciata* Sh. besprach **Schaeffer** (Y. N. York. ent. Soc. p. 86).*Fam. Histeridae.*

Blackburn 2, Csiki 1, Kolbe 1, Lewis 2, 3, Penecke 1, Peringuey 2, Thery 3.

Biologie.**Peringuey** (2) beschrieb die Larve von *Monoplius gravis* u. das Leben der *Monoplius*-Arten in den Nestern von *Holsermes viator*.

Systematik.

Kolbe (1) stellt die Familie (wie Ganglbauer) zu den *Staphylinoiden*.

Umfassende Arbeiten.

Péringuey.

Note sur le genre *Monoplius* Mars.

(Ann. Soc. ent. Fr. 70. 1901 p. 178—187).

Nach eingehender Schilderung des in den Nestern von *Holotermes viator* Latr. verlaufenden Lebens der Arten (p. 178—180) und nach Beschreibung der Larve von *M. gravis* (p. 180—181) wird zuerst die Gattung in zwei Untergatt. geteilt (p. 182), dann werden die 8 Arten durch Einzelbeschreibungen in einer Weise geschildert, welche äusserlich einer dichotomischen Tabelle ähnlich sieht, und zuletzt sind die 5 neuen Arten nochmals durch Einzeldiagnosen kenntlich gemacht. Bei den alten Arten fehlt die Autorangabe, die man nur mit Zeitaufwand aus dem vorausgehenden Text ermitteln kann.

Die behandelten Arten.

Monoplius (i. sp.) *inflatus* Mars., *M. aemulator* n. sp. (p. 183, 185) u. *M. gravis* n. sp. (p. 184, 186) Kapkolonie, *M. dissidens* n. sp. (p. 184, 186) Natal, *M. pinguis* Lew., *M. singularis* Per., *M. mimus* n. sp. (p. 185, 186) u. *M. sigillatus* n. sp. (p. 185, 187) Kapkolonie.

Einzelbeschreibungen.

Abraeodes Raddei Reitt. kommt in Siebenbürgen vor nach **Penecke** (Wien. ent. Zeit. XX p. 16).

Abraeus Zoppae n. sp. **Penecke** (Wien. ent. Zeit. XX⁷ p. 16) Siebenbürgen.

Baconia jubaris n. sp. **Lewis** (Ann. Mag. Nat. Hist. 1901. VIII p. 371) Bahia, *B. chaspites* n. sp. (p. 372) Fernambuck, hierher auch *Phelister Gounellei* Mars.

Carcinops Vaulogeri n. sp. **Théry** (Bull. Fr. p. 237) Tunis.

Chlamydopsis comata n. sp. **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. 25 p. 129) Australien.

Cypturus bengalensis n. sp. **Lewis** (Ann. Mag. Nat. Hist. 1901. VII. p. 242) Bengalen.

Hister Lameerei n. sp. **Lewis** (Ann. Mag. nat. Hist. 1901. VII. p. 243) Sahara,

H. Mairdronis n. sp. (p. 243) Ost-Indien, *H. apicalis* Fairm. = *Notolister sulcicollis* Lew. (p. 243), *H. Filipae* n. sp. (p. 233) Jowa, *H. hamatilis* n. sp.

(p. 374) u. *H. sectator* n. sp. (p. 375) Borneo, *H. Baberi* n. sp. (p. 375) Ost-

Indien, *H. silvicola* n. sp. (p. 376) Khasia Hills. — *H. Czikanii* n. sp. **Csiki**

(Zichy II p. 106) China.

Hololepta caudicalis n. sp. **Lewis** (Ann. Mag. Nat. Hist. 1901. VIII. p. 368) u.

H. canaliculata n. sp. (p. 369) Brasilien.

Homalopygus geminatus n. sp. **Lewis** (Ann. Mag. Nat. Hist. 1901. VIII p. 379)

Bahia.

Hypocaccus asper n. sp. **Lewis** (Ann. Mag. Nat. Hist. 1901. VIII p. 383) Matabeleland.

- Niponius canalicollis* n. sp. **Lewis** (Ann. Mag. Nat. Hist. 1901. VIII. p. 370) Himalaja.
- Omatodes oblongus* n. sp. **Lewis** (Ann. Mag. Nat. Hist. 1901. VIII. p. 373) Brasilien.
- Pachyeraerus praeliarius* n. sp. **Lewis** (Ann. Mag. Nat. Hist. 1901. VIII. p. 370) Mashonaland.
- Paratropus altilis* n. sp. **Lewis** (Ann. Mag. Nat. Hist. 1901. VIII. p. 377) Ost-Afrika, *P. boleti* n. sp. (p. 377) Congo.
- Pelorusus Cregoei* n. sp. **Lewis** (Ann. Mag. Nat. Hist. 1901. VII. p. 244) Matabeleland.
- Phylloma labrosum* n. sp. **Lewis** (Ann. Mag. Nat. Hist. 1901. VIII. p. 367) u. *Ph. tuberculatum* n. sp. (p. 368) Brasilien.
- Plaesius cossyphus* M. von *puadicus* M. verschieden nach **Lewis** (Ann. Mag. N. Hist. VII p. 241).
- Platysoma pictipenne* n. sp. **Lewis** (Ann. Mag. Nat. Hist. 1901. VII p. 241) Sumatra.
- Saprinus viridipennis* n. sp. **Lewis** (Ann. Mag. Nat. Hist. 1901. VII p. 245) Australien.
- Teretriosoma unicolorne* n. sp. **Lewis** (Ann. Mag. Nat. Hist. 1901. VIII p. 379) Bahia, *T. Stebbingii* n. sp. (p. 380) u. *T. cristatum* n. sp. (p. 381) Ost-Indien.
- Teretrius latebricola* n. sp. **Lewis** (Ann. Mag. Nat. Hist. 1901. VIII. p. 382) Nord-Amerika.
- Tribalus Hornii* n. sp. **Lewis** (Ann. Mag. Nat. Hist. 1901. VIII p. 244) Ceylon.
- Tylois mirificus* n. sp. **Lewis** (ibid. VIII p. 378) Fernambuck.

Fam. *Mycetophagidae*.

Pic 30, Reitter 4, 32.

Systematik.

- Atritonus* Reitt. braucht nicht (in *Parabaptistes* Ganglb.) umgetauft zu werden nach **Reitter** (Wien. ent. Zeit. p. 98).
- Esarcus Leprieurii* var. *parallelus* n. var. **Pic** (Ech. 17 p. 3) Tunis.
- Litargus Leprieurii* n. sp. **Pic** (Ech. 17 p. 65) Algier, *L. coloratus* var. *obscuripennis* n. var. (p. 66) Algier.
- Mycetophagus quadriornatus* n. sp. **Reitter** (D. ent. Z. p. 71 *Tritoma*) Talysch, *M. quadripustulatus* var. *connexus* n. var. (p. 71) Caucasus.
- Parabaptistes* siehe *Atritonus*.

Fam. *Thorictidae*.

Raffray 1.

Systematik.

- Thorictus hottentotus* n. sp. **Raffray** (Bull. Fr. p. 123) Kap.

Fam. *Byrrhidae*.

Fairmaire 3, Kolbe 1, Reitter 32, Scudder 1, 3.

Systematik.

Kolbe (1) stellte die *Byrrhiden* unter die *Amphilola*. Vergl. *Parnidae*.

Palaeontologie.

Scudder (1) beschrieb 1 neuen *Byrrhus* aus Canada u. (3) 1 neuen *Nosotelocus* aus Florissant. (Siehe Einzelb.)

Systematik.

Einzelbeschreibungen.

Byrrhocaulus n. gen. (bei *Byrrhus*) **Fairmaire** (Bull. Fr. p. 266) *inaequalis* n. sp. (p. 266) Sikkim.

Byrrhus indicus n. sp. **Fairmaire** (Bull. Fr. p. 266) Sikkim. — *B. Ottawaensis* n. sp. **Scudder** (Geol. Surv. Canad. II. 1. 1895 p. 40 tab. II fig. 6--8) fossil in Canada.

Limnichus latiusculus n. sp. **Reitter** (D. ent. Z. p. 72) Turkestan.

Nosotelocus n. gen. **Scudder** (Bull. U. S. geol. Surv. 93. 1892 p. 16), *N. Marconi* n. sp. (p. 17) fossil in Florissant.

Fam. *Dermestidae*.

Felt 1, Gregson 1, 2, Kolbe 1, Mjöberg 2, Pic 24b, 30, 48a, Sahlberg 3, Xambeu 1.

Biologie.

Mjöberg (2) beschrieb die Larve von *Hadrotoma marginata*.

Felt (1) gab kurze Beschreibungen und Abbildungen der Larve u. Puppe von *Anthrenus scrophulariae* (p. 35 fig. 63) u. *Attagenus piceus* (p. 36 fig. 64), und der Larve von *Dermestes lardarius* (p. 37 fig. 67).

Gregson berichtete über die Lebensweise der Larven von (1) *Dermestes talpinus* u. (2) *D. marmoratus*.

Xambeu (1) beschrieb das Ei von *Dermestes undulatus* (p. 13) u. die Larve von *Trogoderma megalomoides* (p. 61).

Geographische Verbreitung.

Sahlberg führte *Attagenus pantherinus* als in Finnland eingeschleppt auf.

Systematik.

Kolbe (1) stellte die *Dermestiden* zwischen die *Heteroceriden* und *Dascylliden* s. str. in seine *Dascylloidea*, zu denen noch die *Psepheniden* und *Rhipiceriden* kommen.

Einzelbeschreibungen.

Anthrenus scrophulariae abgebildet von **Felt** (Bull. N. York St. Mus. 37. VIII. p. 35 fig. 63).

Attagenus piceus abgebildet von **Felt** (ibid. p. 36 fig. 64).

Dermestes impressus n. sp. **Pic** (Misc. Ent. 1898 p. 2). — *D. lardarius* abgebildet von **Felt** (Bull. N. York St. Mus. 37. VIII. p. 37 fig. 67).

Hadrotoma rufoguttata n. sp. **Pic** (Bull. Soc. Ant. 1899 p. 254 *Globicornis*) mit var. *signatipennis* (p. 255).

Mariouta Pic ist im Bericht pro 1899 p. 281 irrtümlich als *Marionta* aufgeführt (Vergl. Ann. Fr. 1901 p. 166, 170).

Telopes assuanensis n. sp. **Pic** (Bull. Soc. Ant. 1899 p. 254).

Trogoderma aegyptiaca n. sp. **Pic** (Ech. XVII p. 33) Assuan.

Fam. Passalidae.

Babb 1, Hinds 1, Kolbe 1.

Morphologie u. Physiologie.

Babb (1) beschrieb die Stridulationsorgane von *Passalus cornutus* (p. 279—281 tab. XII).

Hinds (1) untersuchte die Körperkraft von *Passalus cornutus* (p. 257—262 tab. X).

Systematik.

Kolbe (1) entfernt die Familie auf Grund des Flügelgeäders von den *Pectinicorniern* und stellt sie zu den *Clavicornia* neben die *Trogositiden*, was Ganglbauer (1903) scharf kritisiert.

Fam. Lucanidae.

Boileau 2—5, Everts 2, Fall 1, Jakowleff 2, 5, Jander 1, Kempers 1, Kolbe 1, 3, Le Sénéchal 1, Meek 1, Meyer-Darcis 1, Möllenkamp 1, 2, Peringuey 1, Planet 1, Ritsema 2, Rothenburg 1, Ssemenow 4, Waterhouse 1, Xambeu 1.

Morphologie.

Everts (Col. Neerl. II. 1. p. 2 fig. 64) gab eine Beschreibung u. Abbildung der Flügel von *Lucanus cervus*.

Kempers beschrieb die Flügel von *Lucanus cervus* (p. 14), *Platycerus caraboides* (p. 15 tab. II fig. 2), *Passalus interruptus* (p. 15).

Biologie.

Everts gab (loc. cit.) die Beschreibungen der Larven der Lucaniden (p. 2) von *Lucanus cervus* (p. 4).

Xambeu (1) beschrieb das Ei von *Dorcus parallelopedus* (p. 29) u. die Puppe von *Lucanus cervus* (p. 47).

Jander (1) berichtete über die Larve von *Lucanus cervus* in wilden Birnbäumen (p. 28).

Le Sénéchal (1) berichtete über das Vorkommen derselben Larve.

Missbildungen.

Rothenburg (1) berichtete über Missbildungen an *Lucanus cervus* und *Westermanni*, *Cladognathus gyraffa* u. *Confucius*, *Psalidoremus inclinatus* u. *dissimilis*, *Macrodorcus rectus*, *Odontolabis cuvera*.

Systematik.**Umfassende Arbeiten.****Everts.**

Coleoptera neerlandica II. 1. p. 1—7. *Lucanidae*.

In der umfassenden faunistischen Arbeit wurden die 4 Gattungen *Lucanus*, *Dorcus*, *Platycerus* und *Sinodendron* dichotomisch begründet (p. 3) u. richtig benannt.

Die behandelten Gattungen u. Arten.

Lucanus cervus (pag. 5 fig. 63). — *Dorcus parallelopipedus*. — *Platycerus caraboides*. — *Sinodendron cylindricum*.

Peringuey.

Descriptive Catalogue of the *Coleoptera* of South Africa.

Lucanidae.

(Tr. S. Afr. Philos. XII p. 1—12 tab. XXXI fig. 1—4).

Eine umfassende Bearbeitung der südafrikanischen Arten, wobei 5 Gattungen diagnostisch (nur scheinbar dichotomisch!) unterschieden und in 2 (nicht charakterisierte!) Unterfamilien vertheilt sind (p. 2).

Die behandelten Gattungen u. Arten.

Colophon Westwoodii Gr. (p. 3 tab. XXXI fig. 1).

Cladognathus (Prosopocoelus) natalensis Parr.

Oonotus adpersus Boh.

Xiphodontus antilope West. (p. 8 tab. XXXI fig. 4).

Nigidius Delegorguei Th. (p. 10 fig. 2), *N. validus* n. sp. (p. 11 fig. 3) Mozambique.

Einzelbeschreibungen.

Aegus Hopei n. sp. **Boileau** (Ann. Belg. 45 p. 19 tab. fig. 6. 7) Sumatra. — *Ae. dilaticollis* n. sp. **Ritsema** (Not. Leyd. Mus. 22 p. 189) Mentawey-Inseln.

Cardanus Boileaui n. sp. **Ritsema** (Not. Leyd. Mus. 22. p. 190) Mentawey-Inseln.

Charagmophorus lineatus ♀ beschrieb **Waterhouse** (Tr. Linn. Soc. Lond. VIII. p. 74).

Cladognathus, *Colophon* siehe **Peringuey** oben.

Cyclommatus cupreonitens n. sp. **Boileau** (Ann. Belg. 45 p. 12 tab. fig. 3) Java (?). — *C. pulchellus* n. sp. **Möllenkamp** (Not. Leyd. Mus. 22. p. 44) Neu-Guinea.

Diphylostoma n. nom. **Fall** (Can. Ent. 33 p. 324) für *Phyllostoma*.

Ditomoderus mirabilis Parry ♀ beschrieb **Boileau** (Ann. Belg. 45 p. 17 tab. fig. 5).

Dorcus siehe Everts pag. 172.

Eurytrachelus Prostii n. sp. **Boileau** (Ann. Belg. 45 p. 15 tab. fig. 4) Borneo. —

Eu. cervulus n. sp. (Bull. Fr. p. 284) Tonking. — *Eu. egregius* M. var.

honestus n. var. **Möllenkamp** (Not. Leyd. Mus. 22. p. 47) Astrolabe-Bai.

Leptinopterus consimilis n. sp. **Möllenkamp** (Not. Leyd. Mus. 22. p. 47) Brasilien.

Lucanus ibericus var. *caspicus* n. var. **Semenow** (Rev. russ. Ent. I p. 105). —

L. placidus u. Varietäten behandelte **Meek** Sc. XIII p. 375. — Siehe auch Everts pag. 172.

Metopodontus (Hoplitocranum) Jakowleffi n. sp. **Boileau** (Bull. Soc. ent. Fr.

1901 p. 282) Annam. — *M. Wentzel-Heckmannae* n. sp. **Kolbe** (Sitzb. Fr.

Berl. 1901 p. 71) Nyassaland.

Neolucanus birmaënsis n. sp. **Möllenkamp** (Not. Leyd. Mus. 22. p. 47) Birma,

N. celebensis n. sp. (p. 47) Celebes.

Nigidius gigas n. sp. **Möllenkamp** (Ins. Börse 18. p. 363) Tonkin. — Siehe auch

Peringuey pag. 172.

Odontolabis fallaciosus n. sp. **Boileau** (Bull. Fr. p. 284) Tonkin. — *O. relucens*

n. sp. **Möllenkamp** (Not. Leyd. Mus. 22. p. 45) Sumatra, *O. cupreiventris* n. sp.

(p. 45) Borneo. — *O. elegans* n. sp. **Möllenkamp** (Ins. Börse 18. p. 363)

Birma. — *O. Fruhstorferi* n. sp. **Meyer-Darcis** (Ins. Börse 18 p. 355) Tonkin.

Oonotus siehe **Peringuey** pag. 172.

Phyllostoma n. gen. *fimbriata* n. sp. **Fall** (Can. Ent. 33 p. 290 fig. 10, 11)

Californien. Siehe *Diphyllostoma*.

Platycerus latus n. sp. **Fall** (ibid. p. 291) Californien. — Siehe auch Everts

pag. 172.

Prosopocoelus ovatus n. sp. **Boileau** (Bull. Soc. ent. Fr. 1901 p. 283) u. *Pr. denticulatus*

n. sp. (p. 284) Tonkin. — *Pr. forceps* Voll. ♂♀ besprach **Boileau**

(Ann. Belg. p. 8 tab. I fig. 1, 2).

Pseudolucanus Oberthürri berichtigte **Planet** (Le Natur. 1901 p. 250).

Sinodendron siehe Everts pag. 172.

Sphenognathus praestans n. sp. **Jakowleff** (Rev. russ. Ent. I p. 77, fig.) Vene-

zuela, *Sph. manifestus* n. sp. fig. (p. 176) Bolivien.

Xiphodontus siehe **Peringuey** pag. 172.

Fam. Scarabaeidae.

Abeille 3, Arrow 4—7, Blackburn 2, Bouskell 1, Brenske 1, Champion 5, Chobaut 5, Clouët 1, Csiki 1, Everts 2, Fabre 1, Fairmaire 1, 3, 4, 6, Fall 4, Felsche 1—5, Felt 1, Froggatt 1, Germain 2, 3, Janson 1, Jakowleff 6, 8, Jakowlew 1, Jordan 1, Höller 1, Kaditsch 1, Kempers 1, König 1, Kolbe 3, Kraatz 1, Launoy 1, Lewis 1, C. Marchal 1, Mayet 2, Meijere 1, Moser 1, 2, J. Müller 1, Noël 1, Ohaus 1—6, Olsufiew 1, Péringuey 1, Pic 24a, 30, Poppius 1, Raspail 1, 2, Reitter 4, 11, 32, 33, Ribaut 1, Rupertsberger 1, Scudder 1, Ssamenow 8, Xambeu 1.

Morphologie u. Physiologie.

Launoy (1) untersuchte die lähmende Wirkung des Giftes von *Scolia hirta* auf die Muskulatur der Larve von *Cetonia aurata*.

Everts (2) schilderte die Flügel der *Melolonthidae* im Allgemeinen (p. 9).

Meijere (1) schilderte die Klauenbildung bei den *Scarabaeiden* (p. 431 tab. 32 fig. 46).

Kaditsch schilderte die Unterlippe von *Melolontha vulgaris* (p. 17—19 fig. 3 u. 4). Siehe Morphologie p. 116.

Kempers (1) schilderte die Flügel von *Trox sabulosus* (p. 15), *Aphodius fimetarius* (p. 15), *Oxyomus silvestris* (p. 16), *Geotrupes spiniger* (p. 16), *Sisyphus Schaefferi* (p. 16), *Copris lunaris* (p. 17), *Onthophagus nuchicornis* u. *ovatus* (p. 17), *Oryctes nasicornis* (p. 17), *Melolontha Hippocastani* (p. 17 tab. II fig. 1), *Phyllopertha horticola* (p. 18), *Hoplia philanthus* (p. 18), *Cetonia aurata*, *Valgus hemipterus*, *Trichius rosaceus*.

Biologie.

Ueber mehrere Arten am unteren Amazonenstrom berichtete **Schulz** (Berl. ent. Z. p. 326—330).

C. Marchal (1) u. **Raspail** (1 u. 2) behandelten die Fortpflanzung von *Melolontha*.

Froggatt (1) behandelte die Larve von *Anoplognathus*.

Ewerts (2) schilderte die Larven der *Melolonthiden* im Allgemeinen (p. 10—11).

Ribaut (1) gab Bemerkungen über *Geotrupes stercorarius* L. u. *spiniger* Marsh.

Rupertsberger (1) behandelte die Fortpflanzung von *Sisyphus Schaefferi*.

Felt (1) gab eine kurze Beschreibung u. Abbildung der Larve von *Macroductylus subspinosus* (p. 9 fig. 7), der Larve u. der Puppe von *Pelidnota punctata* (p. 15 fig. 17), *Lachnosterna fusca* (p. 32 fig. 56), *Allorhina nitida* (p. 32 fig. 57).

Fabre's Beobachtungen (Souv. ent. V p. 178—181), dass der Abend-Ausflug der *Geotrupes*-Arten sich nach dem in der Nacht zu erwartenden Wetter richtet, wurde kurz wiedergegeben.

Mayet (2) schilderte die Metamorphose von *Onitis Belial* (p. 66—68 fig. 1, 2) und von *Bubas Bison* (p. 68—71 fig. 3, 4).

Nach **Ohaus** (4) leben die *Parastasia*-Arten in morschem Holz.

Xamheu (4) beschrieb die Larve von *Onthophagus Amyntas*, ferner (1) das Ei von *Aphodius vernus* (p. 27) u. *A. scrutator* (p. 56) u. von *Amphimallus rufus* (p. 30), das Ei u. die Puppe von *Aphod. fimetarius* (p. 9), das Ei, die Larve u. die Puppe von *Sisyphus Schaefferi* (p. 17), u. *Aphodius merdarius* (p. 23), die Larve u. die Puppe von *Bolboceras gallicus* (p. 33), die Puppe von *Osmoderma eremita* (p. 43).

Geographisches.

Ueber *Odontaeus mobilicornis* in England berichteten **Champion** (5) u. **Lewis** (1).

Ssemenow (8) behandelte die Verbreitung der 3 *Lethrus*-Arten des europäischen Russlands, u. gab ihre Synonymie.

Poppius (1) fand *Aphodius Scropha* in Finnland.

Jakowlew (1) führte *Rhizotrogus altaicus* aus dem Gouvernement Wjätka auf.

Bouskell (1) gab eine Uebersicht über die Verbreitung der *Aphodius*-Arten in England.

Palaeontologie.

Scudder (1) beschrieb 1 *Trox*-Art aus Canada, die nicht neu.

Systematik.

Umfassende Arbeiten.

Brenske.

Die *Serica*-Arten der Erde. (Forts.)

(Berl. ent. Zeit. 1901 p. 187—234, 431—432).

Die Fortsetzung der Artbeschreibungen der aethiopischen Region bringt zahlreiche neue Arten, aber leider nur in Einzelbeschreibungen. Die Monographie ist im Jahrgang 1902 beendigt.

Die neuen Arten.

- Euphoresia warriensis* n. sp. (p. 187) Warri, *Eu. ogoweana* n. sp. (p. 187) Ogowé,
Eu. loangoana n. sp. (p. 188) Loangó, *Eu. bruta* n. sp. (p. 189), *Eu. ludificans*
 n. sp. (p. 190) u. *Eu. viridicans* n. sp. (p. 190) Congo, *Eu. gabonensis* n. sp.
 (p. 191) Gabun, *Eu. albofasciata* n. sp. (p. 191) Benito, *Eu. gibbosa* n. sp.
 (p. 193) Gabun, *Eu. versicolor* n. sp. (p. 194) Congo, *Eu. samliana* n. sp.
 (p. 195) Samla, *Eu. Kivuana* n. sp. (p. 195) Kivu-See, *Eu. chiloanga* n. sp.
 (p. 196) Chiloanga, *Eu. maculifera* n. sp. (p. 197) Gabun, *Eu. labiata* n. sp.
 (p. 198) u. *Eu. bisquamulata* n. sp. (p. 199) Kamerun, *Eu. Conradtii* n. sp.
 (p. 199) Togo, *Eu. sequens* n. sp. (p. 200) Congo, *Eu. aschantica* n. sp.
 Aschanti, *Eu. baliola* n. sp. (p. 202) Congo.
- Aphenoserica* (p. 203) *fallax* n. sp. mit var. *loloana* n. var. (p. 204) u. *samliana*
 n. var. (p. 205) Benito.
- Homaloserica fessa* n. sp. (p. 205) Victoria-Nyansa-See.
- Bilga Conradtii* n. sp. (p. 208) u. *kameruna* n. sp. (p. 209) Kamerun, *B. rufoma-*
maculata n. sp. (p. 209) Gabun, *B. togoana* n. sp. (p. 209) Togo, *B. ficsa*
 n. sp. (p. 210) Congo.
- Doxocalia superba* n. sp. (p. 210) Gabun.
- Thrymoserica fabulosa* n. sp. (p. 212) Usambara.
- Triodontia ikuthana* n. sp. (p. 214) Ost-Afrika, *Tr. nyssana* n. sp. (p. 215) Nyssa-
 land (?), *Tr. abyssinica* n. sp. (p. 216) Abyssinien.
- Tephraoserica Hauseri* n. sp. (p. 217) Ost-Afrika.
- Stenoserica Kolbei* n. sp. u. *St. falsa* (p. 218) Nyassa-See.
- Camentoserica* (p. 221) *livida* Boh.
- Lepiserica* (p. 222) *ukamina* n. sp. (p. 222) Deutsch-Südost-Afrika, *L. farsilis* n.
 sp. (p. 224) Usambara, *L. zoutpaniana* n. sp. (p. 225) Transvaal, *L. fullonica*
 n. sp. (p. 226) Albert-Nyansa, *L. fucata* n. sp. u. *L. fucatella* n. sp. (p. 227)
 Deutsch-Ost-Afrika, *L. guinensis* n. sp. (p. 228) Aschanti, *L. delagoana* n.

sp. (p. 228) Delagoa-Bay, *L. budjanguana* n. sp. (p. 229) Albert-Nyansa, *L. fasta* n. sp. (p. 230) Delagoa-Bay, *L. barbata* n. sp. (p. 232) Port Natal, *L. benigna* n. sp. (p. 233) Port Natal, *L. desquamata* n. sp. (p. 234) Togo, *L. desquamifera* n. sp. (p. 234) Kamerun, *L. Lydenburgiana* n. sp. (p. 432) Transvaal, *L. Zenkeri* n. sp. (p. 434) Süd-Kamerun, *L. ibemboana* n. sp. (p. 435) Ibembo.

Conioserica mit 1 Art: *Eisermannii* n. sp. (p. 436) Sierra Leone.

Neoserica mit 20 Arten v. d. 16 neu: *N. fecunda* n. sp. (p. 438) Nyassa-See, *N. fraterna* n. sp. (p. 438) Nyassa-See, *N. sandeana* n. sp. (p. 439) Njam-Njam, *N. bibosa* n. sp. (p. 439) Congo, *N. baryca* n. sp. (p. 441) Sierra Leone, *N. senegalensis* n. sp. (p. 441) Senegal, *N. basilica* n. sp. (p. 441) Deutsch Süd-Afrika, *N. natalensis* n. sp. (p. 444) Natal, *N. barbara* n. sp. (p. 444) Transvaal, *N. kilimandscharoana* n. sp. (p. 445) Ost-Africa, *N. zanzibarica* n. sp. (p. 446) Zanzibar, *N. panganiensis* n. sp. (p. 447) Ost-Africa, *N. lamuensis* n. sp. (p. 447) Witu, *N. ikuthana* n. sp. (p. 449) Africa, *N. nyassica* n. sp. (p. 449) Nyassa-See, *N. finitima* n. sp. (p. 450) Dar-es-Salaam.

Serica mit 2 Arten, davon 1 neu: *S. globuliformis* n. sp. (p. 451) Capland.

Mesoserica mit 1 Art: *M. transvaalensis* n. sp. (p. 453) Transvaal.

Archoserica mit 1 Art: *A. bogosana* n. sp. (p. 454) Bogos.

Neuroserica mit 1 Art: *N. fulvescens* Blanch.

Lamproserica mit 4 Arten: *L. mombasana* n. sp. (p. 457) Britisch Ost-Africa, *L. Salaama* n. sp. (p. 457) Dar es Salaam, *L. Kakomae* n. sp. (p. 458) Ost-Africa Kakoma, *L. Beccarii* n. sp. (p. 458) Bogos.

Philoserica mit 2 Arten: *Ph. vittata* Bl., *Ph. pauper* Spång.

Nedymoserica mit 1 Art: *N. flavida* n. sp. (p. 462) Delagoabai.

Orthoserica. Die Arten folgen 1902.

Chobaut.

Les *Rhyssemus* de France.

(Bull. Soc. Sc. nat. Nimes 1900 p. 77—82).

Eine dichotomische Auseinandersetzung der 5 französischen *Rhyssemus*-Arten. Ein Auszug aus Orbigny 1896, ohne Berücksichtigung der von Reitter 1897 an letzterem geübten Kritik (nach Reitter 4. p. 176).

Die behandelten Arten.

Rhyssemus Godartii Muls., *Rh. arenarius* Cost., *Rh. algiricus* Luc., *Rh. germanus* L., *Rh. verrucosus* Muls.

Clouët.

Essai monographique sur le genre *Rhyssemus*.

(Mém. Soc. ent. Belg. VIII p. 1—124 tab. I—VI).

Monographie der Gattung, die in 4 Untergattungen getheilt wird (p. 14—15), welche aber weiterhin ganz wie Gattungen behandelt werden. Alle Arten sind dichotomisch aus einander gesetzt u. ausserdem ausführlich beschrieben. Die erste Tafel enthält instructive Details, die übrigen enthalten nur Umriss.

Die behandelten Untergattungen und Arten.

- Rhyssemus* (*Rhyssemodes*) mit 5 spp., v. d. 1 neu: *Rh. opacus* Reitt. (tab. I fig. 7, II fig. 2), *Rh. alutaceus* Reitt. (tab. I fig. 8, II fig. 1), *Rh. tenuisculptus* Reitt. (tab. I fig. 9, II fig. 3), *Rh. Bouvieri* n. sp. (p. 17, 22, tab. II fig. 4) China
Rh. orientalis Muls. (fig. 5, 6, 7).
- Rh.* (*Trichorhyssemus* n. subg. p. 15) mit 5 spp. (p. 27—28), v. d. 2 neu: *Rh. cristatellus* Bat. (fig. 8), *Rh. riparius* Horn, *Rh. setulosus* Reitt. (fig. 9), *Rh. lasionotus* n. sp. (p. 28, 32 fig. 10) China, *Rh. asperulus* Wat. (fig. 11), *Rh. hirsutus* n. sp. (p. 28, 35 fig. 12) Sumatra, Java, Borneo.
- Rh.* (*Rhyssemus* i. sp.) mit 43 sp. (p. 36—39, 59—66), v. d. 24 neu: *Rh. Severinii* n. sp. (p. 37, 40 tab. III fig. 13) Congo, *Rh. Godartii* Muls. (fig. 14), *Rh. plicatus* Germ. (tab. I fig. 1—6, III fig. 15), *Rh. berytensis* Mars. (fig. 16), *Rh. biovatus* n. sp. (p. 39, 48 fig. 17) Madagascar, *Rh. granulatus* Ball., *Rh. Blackburnei* n. sp. (p. 39, 50 fig. 18) Australien, *Rh. pectoralis* n. sp. (p. 39, 52 fig. 19) Congo, *Rh. Alluaudii* n. sp. (p. 39, 53 fig. 20) Madagascar, *Rh. Aurivillii* n. sp. (p. 39, 55 fig. 21) Congo, *Rh. madagassus* Ker., *Rh. polycolpus* Fairm. (fig. 22), *Rh. Goudotii* Har. (fig. 23), *Rh. Haroldii* n. sp. (p. 59, 68 fig. 24) Diego-Suarez, *Rh. Coluber* Mayet (tab. IV fig. 25), *Rh. californicus* Horn (fig. 26), *Rh. maximus* n. sp. (p. 60, 74 fig. 27), *Rh. capensis* n. sp. (p. 61, 75 fig. 28) Cap, *Rh. bicolor* n. sp. (p. 61, 76 fig. 29) Congo, *Rh. Hornii* n. sp. (p. 61, 78 fig. 30) patria?, *Rh. birmensis* n. sp. (p. 61, 79 fig. 31) Birma, *Rh. Ritsemae* n. sp. (p. 61, 81 fig. 32) Sierra Leone und var. *indica* nov. var. (p. 82) Ost-Indien, *Rh. interruptus* Reitt. (fig. 33), *Rh. vaulogeri* n. sp. (p. 62 84 fig. 34) Tunis, *Rh. congolanus* n. sp. (p. 63, 86 fig. 35) Congo, *Rh. malasiacus* Lansb. (fig. 36), *Rh. algericus* Luc (tab. V fig. 37, 38), und var. *caucasicus* n. var. (p. 91) Kaukasus, *Rh. Fæe* n. sp. (p. 63, 91 fig. 39) Birma, *Rh. rubeolus* Har. (fig. 40), *Rh. Bedelii* n. sp. (p. 64, 94 fig. 41) Algier, *Rh. Reitteri* n. sp. (p. 64, 96 fig. 42) West-Africa, *Rh. inermis* n. sp. (p. 64, 98 fig. 43) Madagaskar, *Rh. exaratus* Mars. (fig. 44), *Rh. parallelcollis* n. sp. (p. 65, 101 fig. 45) Natal, *Rh. granosus* Klug (fig. 46), *Rh. Gestronis* n. sp. (p. 65, 105 tab. VI fig. 47) Nubien, *Rh. verrucosus* Muls. (fig. 48), *Rh. granulocostatus* n. sp. (p. 66, 103 fig. 49) Madagascar, *Rh. Mayetii* n. sp. (p. 66, 110 fig. 50) Egypten, *Rh. Fairmairei* n. sp. (p. 66, 111 fig. 51) Diégo-Suarez, *Rh. tarsalis* Wat. (fig. 52), *Rh. germanus* L. (fig. 53—56).
- Rh.* (*Rhyssemorpha* n. subg. p. 15, 117) mit 1 sp.: *Rh. Mocquerysii* n. sp. (p. 117, fig. 57) Madagascar.

Everts.

Coleoptera neerlandica. II. 1. p. 7—70. *Scarabaeidae*.

Die Familie wird dichotomisch in 2 Unterfamilien u. 12 Tribus getheilt (p. 11—13), deren 30 Gattungen ebenso begründet werden (p. 13—16). Die Arten sind ebenfalls dichotomisch aus einander gesetzt. Ausser den holländischen Arten sind die belgischen und die der benachbarten Theile Deutschlands u. Frankreichs berücksichtigt. Als neu unterschiedene Art kann *Trichius rosaceus* Voet betrachtet werden.

Die behandelten Gattungen u. Arten.

I. Sub.-Fam. Coprophaginae. p. 16—48.

Trox mit 7 Arten. p. 16—18.

Psammodyus mit 3 Arten p. 18—19. — *Rhyssenus* mit 1 Art. — *Diastictus* mit 1 Art. — *Pleurophorus* mit 1 Art. — *Oxyomus* mit 1 Art: *sylvestris* Scop. (= *porcatus* Fbr.). — *Aphodius* mit 52 Arten (p. 21—36). — *Heptaulacus* mit 3 Arten (p. 36—37). — *Aegialia* mit 3 Arten (p. 37—38). — *Odontaeus* mit 1 Art. — *Ceratophyes* mit 1 Art (p. 38—39). — *Geotrupes* mit 7 Arten (p. 39—42). — *Sisyphus* mit 1 Art: *S. Schaefferi* (p. 42 fig. 65 II p. 12). — *Oniticellus* mit 1 Art. — *Onthophagus* mit 9 Arten (p. 43—47). — *Caccobius* mit 1 Art. — *Copris* mit 1 Art: *lunaris* (p. 48 fig. 65 I p. 12).

II. Subfam. Melolonthinae. p. 48—70.

Oryctes 1 Art. — *Melolontha* mit 2 Arten: *M. vulgaris* (p. 52 fig. 68 I u. II p. 49), *M. Hippocastani* (p. 53 fig. III p. 49). — *Polyphylla* mit 1 Art: *fullo* (p. 53 fig. 67 p. 15). — *Anoxia* mit 1 Art. — *Rhizotrogus* mit 5 Arten (p. 54—56). — *Serica* mit 2 Arten. — *Homalopia* mit 1 Art. — *Anisoplia* mit 2 Arten. — *Phyllopertha* mit 1 Art. — *Anomala* mit 1 Art. — *Hoplia* mit 3 Arten (p. 61—62). — *Ozythyrea* mit 1 Art. — *Epicometis* mit 1 Art. — *Cetonia* mit 4 Arten p. 63—66. — *Valgus* mit 1 Art. — *Osmoderma* mit 1 Art: *eremita* (p. 67 fig. 70). — *Gnorimus* mit 2 Arten. — *Trichius* mit 3 Arten: *Tr. fasciatus* L. in Holland selten, *Tr. rosaceus* Voet mit var. *nudiventris* Kr. u. var. *suturalis* Kr. (p. 70) in ganz Holland gemein, *Tr. gallicus* in der Rheinprovinz.

Fall.

Notes on *Dichelonycha* etc.

(Tr. Amer. ent. Soc. XXVII p. 277—292).

Die Arbeit enthält unter Anderem auch eine dichotomische Revision der nordamerikanischen Arten der Gattung *Dichelonycha*, aus welcher nur die 9 neuen Arten aufgeführt werden können, da die Arbeit dem Ref. leider nicht zugänglich war.

Die neuen Arten nach Sharp.

Dichelonycha diluta n. sp. (p. 283), *D. vaga* n. sp. (p. 285), *D. nana* n. sp., *D. muscula* n. sp. (p. 286), *D. longiclava* n. sp. (p. 287), *D. robusta* n. sp. (p. 288), *D. decolorata* n. sp. (p. 290), *D. vicina* n. sp. (p. 291), *D. lateralis* n. sp. (p. 293).

1. Germain.

Apunt. Entom. Jenero *Phytolaema*.

(An. Univ. Chil. 1901 p. ? sep. 21 pp. tab.).

Eine eingehende Behandlung der Gattung mit dichotomischer Auseinandersetzung und ausführlicher Beschreibung ihrer 3 Arten.

Die behandelten Arten.

Phytolaema Blanch. *Herrmannii* n. sp. (p. ? sep. p. 9, 10) Araucanien, *Ph. flavipes* Phil., *Ph. mutabilis* Sol. (fig. a—g).

2. Germain.

Ap. Entom. Jenero *Oryctomorphus* Guérin.

(An. Univ. Chil. 1901 p. ? sep. 27 pp. tab.).

Eine eingehende Behandlung der Gattung und ihrer 3 Arten, aber ohne dichotomische Auseinandersetzung.

Die behandelten Arten.

Oryctomorphus bimaculatus Guér. (= *variegatus* Guér. = *pictus* Wat.) (fig. a—m),
O. maculicollis Guér. (♀ = *morio* Burm.) (fig. n, o), *O. laevipennis* Germ. (= *parumstriatus* Fairm. = *Fairmairei* Redt.).

Ohaus.

Revision der *Heterosterniden*.

(Stett. ent. Zeit. 62. 1901 p. 349—366, tab. II).

Eine umfassende Revision der 4 Gattungen *Parisolea* Bat., *Macropoides* Guér., *Homoio sternus* n. gen. u. *Heterosternus* Dup., die hier zu einer Gruppe *Heterosternidae* vereinigt sind, die leider gar nicht morphologisch begründet und umgrenzt wird, so dass es nicht klar wird, warum z. B. die Gattungen *Pelydnota* und *Chrysina*, von denen p. 349 u. 350 die Rede ist, nicht in die Gruppe gehören. Eine dichotomische Tabelle (p. 364—365) giebt die Auseinandersetzung der 4 Gattungen mit ihren 8 Arten, von denen die der beiden letztgenannten Gattungen ausserdem ausführlich einzeln behandelt u. auf Tafel II abgebildet sind. Diese Tafel entdeckt man nur zufällig; denn weder im Text noch im Inhaltsverzeichniss ist sie erwähnt.

Die behandelten Gattungen und Arten.

Homoio sternus n. gen. (p. 352, 365) mit 1 Art: *Beckeri* n. sp. (p. 353, tab. II fig. 10, 11) Mexico.

Heterosternus Dup. (p. 355, 365) mit 3 Arten (p. 365): *H. buprestoides* Dup. (p. 358, 365, tab. II fig. 1—3), *H. Rodriguesii* Cand. (p. 359, 365, fig. 4—7), *H. Oberthürrii* n. sp. (p. 361, 365, fig. 8, 9) Mexico.

Parisolea Bat. (p. 364) mit 1 Art: *P. pallida* Cand.

Macropodius Guér. (p. 364) mit 3 Arten (p. 364—365): *M. Nietonis* Guér., *M. crassipes* Horn, *M. Mnisechii* Sall.

Peringuey.

Descriptive Catalogue of the *Coleoptera* of South Africa.

Scarabaeidae.

(Tr. S. Afr. Phil. Soc. XII p. 13—563 tab. XXXI—XXXIX).

Eine umfassende Bearbeitung der südafrikanischen Arten, wobei die 11 Unterfamilien in einer wirklichen dichotomischen Tabelle auseinander gesetzt werden (p. 19), was auch bei der Unterscheidung der Gattungen, nicht aber bei den Arten durchgeführt ist; diese

müssen meist mit nur scheinbar (!) dichotomischen Tabellen vorlieb nehmen. Es sind in dem vorliegenden Bande zunächst 8 Unterfamilien *Coprinae*—*Dynastinae* behandelt, so dass die *Melolonthinae*, *Rutelinae* u. *Cetoniinae* noch ausstehen. Die 9 Tafeln enthalten zahlreiche sehr instructive Zeichnungen (kein Bilderbuch!). Tab. XL ist in diesem Bande noch nicht enthalten, wird aber von p 515 an schon citirt. Die Citate der Zeichnungen im Text sind leider vielfach fehlerhaft u. müssen nach der beigegebenen „Explication of Plates“ corrigirt werden, die aber auch nicht fehlerfrei ist¹⁾. Vergl. *Anachalcos* u. *Catharsius*.

Die behandelten Gattungen und Arten.

1. Subfam. *Coprinae*.

1. Trib. *Scarabaeini*.

Scarabaeus (Pachylomera) femoralis Kirb. (p. 26 tab. XXXI fig. 5, XXXVII fig. 1), *Sc. opacus* Lansb. (p. 27).

Sc. (Scarabaeus i. sp.) mit 35 spp. (p. 28—31): *Sc. cupreus* Cast. (p. 31 tab. XXXI fig. 6 u. tab. XXXVII fig. 2), *Sc. metallicus* (p. 31 tab. XXXVII fig. 3), *Sc. mashunus* n. sp. (p. 32 fig. 5) Rhodesia, *Sc. usurpator* n. sp. (p. 33 fig. 4) Rhodesia, *Sc. intricatus* Fbr. (p. 33 fig. 6), *Sc. parvulus* Boh., *Sc. lucidulus* Boh., *Sc. Andersenii* Wat., *Sc. rubripennis* Boh. (p. 36 fig. 7), *Sc. flavicornis* Boh. (p. 37 fig. 8), *Sc. proximus* n. sp. (p. 37 fig. 9) Kap, *Sc. cognathus* n. sp. (p. 38) Damaraland, *Sc. Fritschii* Har. (p. 38 tab. XXXI fig. 7²⁾, *Sc. alienus* n. sp. (p. 39) Süd-Afrika, *Sc. suri* Hausm. (p. 40 tab. XXXVII fig. 10), *Sc. viator* n. sp. (p. 41 fig. 11) Kay mit var. *deceptor* n. var. (p. 41) Transvaal, *Sc. rugosus* Hausm. (p. 42 fig. 12), *Sc. funebris* Boh. (p. 42 fig. 14), *Sc. interstitialis* Boh., *Sc. ambiguus* Boh. (p. 43 fig. 13), *Sc. Hottentottorum* n. sp. (p. 44 fig. 15), *Sc. Savignyi* Macl. (p. 45 fig. 16), *Sc. convexus* Hausm. (p. 45 fig. 17), *Sc. rusticus* Boh. (p. 46 fig. 18), *Sc. ebenus* Kl. (p. 47 fig. 19), *Sc. satyrus* Boh. (p. 47 fig. 20), *Sc. profanus* Boh. (p. 48 fig. 21), *Sc. pacatus* n. sp. (p. 49), *Sc. zambesianus* n. sp. (p. 49 fig. 22) u. *Sc. rixosus* n. sp. (p. 50) Rhodesia, *Sc. modestus* Boh. (p. 51 fig. 23), *Sc. infernalis* Kl. (p. 51 fig. 24), *Sc. prodigiosus* Er. (p. 52 fig. 25), *Sc. Bonellii* Macl. (p. 53 fig. 26), *Sc. clericus* Boh., *Sc. nigro-aeneus* Boh. (p. 54 fig. 27), *Sc. pubiventris* Lansb., *Sc. canaliculatus* Fairm., *Sc. Reichei* Wat.

Sc. (Sebasteos) mit 4 Arten (p. 57): *Sc. galenus* West. (p. 58 tab. XXXI fig. 8, XXXVII fig. 28), *Sc. laticeps* n. sp. (p. 59 tab. XXXVII fig. 30) Natal, *Sc. plausibilis* Per., *Sc. Caffer* Boh. (p. 60 fig. 29).

Circellium Bacchus Fbr. (p. 62 tab. XXXVIII fig. 1).

Sceliages adamastor Serv. (p. 63 tab. XXXI fig. 9, XXXVII fig. 35), *Sc. Hippias* West.

Gymnopleurus mit 17 Arten (p. 66—67): *G. splendens* Cast., *G. Wahlbergii* Fähr., *G. consocius* n. sp. (p. 68) Transvaal, *G. insidiosus* n. sp. (p. 69) Rhodesia

¹⁾ Ein neuer Beweis, dass Abbildungen ohne übereinstimmende Beschreibung keine Prioritätsberechtigung haben können.

²⁾ Auf der Tafel selbst ist die Figur als „*Sc. flavicornis*“ bezeichnet.

- G. Caffer* Fähr., *G. fastiditus* Har., *G. unicolor* Fähr., *G. thalassinus* Kl., *G. chloris* Kl., *G. caelatus* Wied. (p. 72 tab. XXXI fig. 11), *G. humeralis* Kl., *G. cupreus* Fähr., *G. sericatus* Er., *G. modestus* Per. 1888, *G. ignitus* Kl. (p. 75 tab. XXXVIII fig. 2), *G. virens* Er.
- Pachysoma* mit 5 spp. (p. 77): *P. Aesculapius* Ol. (p. 78 tab. XXXI fig. 10, XXXVII fig. 32), *P. Hippocrates* Macl. (p. 78 tab. XXXVII fig. 31), *P. marginatum* Per. 1888 (p. 79 fig. 33), *P. denticolle* Per. 1888 (p. 80 fig. 34), *P. Schinzii* Fairm., *P. striatum* Cast.
- Anachalcos convexus* Boh. (p. 82 tab. XXXVIII fig. 3), *A. spectabilis* n. sp. (p. 83¹) Rhodesia.
- Byrrhidium ovale* Har.
- Gyronotus pumilus* Boh. (p. 85 fig. 5), *G. marginatus* Per. (p. 86 fig. 4) Kap.
- Odontoloma* (p. 86 tab. XXXIX fig. 27) mit 3 Arten (p. 87): *O. pauxillum* Boh., *O. pygidiale* n. sp. (p. 88) Kap, *O. dentinum* Har.
- Epirinus* mit 9 Arten (p. 90): *E. sulcipennis* Boh. (p. 90 tab. XXXVIII fig. 12), *E. validus* n. sp. (p. 91) Transvaal, *E. scabratus* Fbr., *E. asper* n. sp. (p. 92), Natal, *E. obtusus* Boh., *E. aeneus* Wied., *E. gratus* n. sp. (p. 93), *E. hilaris* n. sp. u. *E. comosus* n. sp. (p. 94) Kap.
- Epilissus subtilis* Boh.
- Aphengoecus* n. gen. (p. 22, 97) *clypeatus* n. sp. (p. 98 tab. XXXVIII fig. 33, XXXIX fig. 22) Kap.
- Sisyphus* mit 9 Arten (p. 100—101): *S. rubripes* Boh. (p. 101 tab. XXXIV fig. 20, XXXVIII fig. 14), *S. fortuitus* n. sp. (p. 103 tab. XXXVIII fig. 13) Natal, *S. quadricollis* Gor. (p. 103 fig. 15), *S. atratus* Kl. (p. 104 fig. 16), *S. spinipes* Thunb. (p. 104 tab. XXXIV fig. 19, XXXVIII fig. 17), *S. muricatus* Ol. (p. 105 tab. XXXIV fig. 18, XXXVIII fig. 19), *S. fasciculatus* Boh. (p. 106 fig. 18), *S. Goryi* Har., *S. nanniscus* n. sp. (p. 107) Natal.

2. Trib. *Coprini*. (p. 108—110).

- Drepanocerus* mit 5 Arten (p. 111): *Dr. Kirbyi* Kirb. (p. 112 tab. XXXIV fig. 23), *Dr. sulcicollis* Cast. (p. 113 fig. 22), *Dr. fastiditus* n. sp. (p. 113) Natal, *Dr. laticollis* Fähr. (p. 114 fig. 24), *Dr. impressicollis* Boh. (p. 115 tab. XXXVIII fig. 9).
- Tiniocellus* n. gen. (p. 116²) *spinipes* Roth.
- Drepanochirus* n. gen. (p. 108, 117) *ambiguus* Kirby.
- Onitis* (p. 118 tab. XXXIX fig. 30) mit 31 Arten (p. 119—122): *O. Castelnaui* Har. (p. 122 tab. XXXIV fig. 3, 3a, XXXVIII fig. 6), *O. audens* n. sp. (p. 123) Kap, *O. Bohemani* Lansb. (p. 124 tab. XXXIV fig. 1, 1a), *O. gigas* Bertol., *O. paradoxus* Boh. (p. 126 fig. 2), *O. aerarius* Har. (p. 127, fig. 15, 15a), *O. fulgidus* Kl. (p. 128), *O. Westermanni* Lansb., *O. Agyulus* Fbr. (p. 130 tab. XXXIV fig. 11, 11a, XXXVIII fig. 7), *O. Sphinx* Fbr. (p. 131 tab. XXXIV fig. 12, 12a), *O. picticollis* Boh., *O. crenatus* Reich. (p. 132 fig. 13³), *O. viridulus* Boh. (p. 133 fig. 14), *O. perturbator* n. sp. (p. 134) Rho-

¹) In der Explic. plat. ist zu tab. I fig. 12 *Anachalcos pumilus* genannt, ob *Gyronotus* gemeint?

²) In der Tabelle (p. 108) nicht unterschieden.

³) Ist, wahrscheinlich irrtümlich, in der „Explic.“ als „*viridulus*“ bezeichnet.

desia, *O. cribratus* Lansb., *O. minutus* Lansb., *O. aeruginosus* Kl., *O. licitus* n. sp. (p. 137) Kap., *O. confusus* Boh. (p. 138 fig. 5, 5a), *O. Caffer* Boh. (p. 139 fig. 6), *O. Fabricii* Roth (p. 140 fig. 8), *O. dispar* Per. 1895 (p. 141 tab. XXXVI fig. 31), *O. Mniszechii* Lansb., *O. nubiensis* Lansb., *O. curvipes* Lansb. (p. 143 tab. XXXIV fig. 4, 4a), *O. uncinatus* Kl., *O. deceptor* n. sp. (p. 145) Rhodesia, *O. robustus* Boh. (p. 146 fig. 7), *O. inversidens* Lansb. (p. 147 fig. 10, 10a—d), *O. abyssinicus* Reich., *O. orthopus* Lansb. (p. 149 fig. 9), *O. vicinus* Lansb., *O. Rothii* Lansb.

Tapinopterus ateuchoides Lansb.

Neonitidius n. gen. (p. 152¹) *porculus* Boh. (p. 153 tab. XXXIX fig. 20, 28).

Cheironitidius (p. 154 tab. XXXIX fig. 29) mit 2 Arten: *Ch. hoplosternus* Har. (p. 155 tab. XXXIV fig. 17, 17a), *Ch. scabrosus* Fbr. (p. 156 tab. XXXIV, fig. 16, XXXVIII fig. 8).

Scaptocnemis n. gen. (p. 108, 158) *segrex* n. sp. (p. 158 tab. XXXVIII fig. 10²).

Tragiscus dimidiatus Kl. (p. 160 tab. XXXIV fig. 21, 21a, 21b).

Oniticellus mit 7 Arten (p. 161—162): *O. egregius* Kl., *O. planatus* Cast. (p. 163 tab. XXXVIII fig. 11), *O. pictus* Hausm., *O. africanus* Har., *O. triangulatus* Har., *O. nasicornis* Reich., *O. militaris* Cast.

Onthophagus mit 105 Arten (p. 172—180): *O. heros* n. sp. (p. 181³) Rhodesia, *O. Gazella* Fbr. (p. 181 tab. XXXV fig. 32), *O. subextensus* Klb. (p. 182 tab. XXXV fig. 15, XXXVIII fig. 26), *O. lanista* Cast. (p. 184 tab. XXXV fig. 16, XXXVIII fig. 25), *O. tricorniger* Boh., *O. insignis* Per. 1896 (p. 185 tab. XXXV fig. 17), *O. loricatedus* Kl. (p. 186 fig. 18), *O. leucopygus* Har. (p. 187 fig. 19, 19a), *O. stenocerus* Har., *O. impressicollis* Boh. (p. 188 fig. 24), *O. epimus* n. sp. (p. 189 fig. 20) Kap., *O. Monodon* Fähr., *O. mastrucatus* n. sp. (p. 191) Kap., *O. pugionatus* Fähr. (p. 192 fig. 21), *O. brevicornis* Fähr., *O. alcyon* Kl. (p. 193 fig. 27), *O. Giraffa* Hausm. (p. 194 fig. 26), *O. lutulentus* Har., *O. vigenis* n. sp. (p. 195) Transvaal, *O. pilosus* Fähr. (p. 196 fig. 28), *O. obtusicornis* Fähr. (p. 197 fig. 25), *O. axillaris* Boh., *O. perniciosus* n. sp. (p. 197) Rhodesia, *O. lugens* Fähr., *O. cretus* n. sp. (p. 199 fig. 22) Natal, *O. scabrosus* Fähr., *O. parvumnotatus* Fähr. (p. 200 fig. 30), *O. trinodosus* Fähr., *O. quadrinodosus* Fähr. (p. 201 fig. 29), *O. opacus* Fähr., *O. impictus* Fähr., *O. pusio* Fähr., *O. naso* Fähr. (p. 204 fig. 13, 13a), *O. ebenus* Per. (p. 205 fig. 14, 14a), *O. aequatus* n. sp. (p. 205) u. ♂ *praestans* n. sp. (p. 206) Rhodesia, *O. deterrens* n. sp. (p. 206 fig. 23) Kap., *O. ditus* n. sp. (p. 207) Rhodesia, *O. pyramidalis* Kl. (p. 208, fig. 12, 12a), *O. panoplus* Bat. (p. 209 fig. 11, 11a), *O. merus* n. sp. (p. 210 fig. 38) Kap., *O. flavolimbatu*s Kl., *O. bovinus* Per. (p. 211 fig. 35), *O. auriculatus* Kl., *O. vemistulus* Er. (p. 213 fig. 41), *O. sugillatus* Kl. (p. 214 fig. 40, 40a), *O. versutus* n. sp. (p. 214) Rhodesia, *O. exiguus* Per. (p. 215 tab. XXXVI fig. 4), *O. emeritus* n. sp. (p. 216 tab. XXXV fig. 31), *O. crucifer* Kl., *O. interstitialis* Fähr. (p. 217

¹) In der Tabelle p. 108 nicht unterschieden.

²) Der Autor schreibt „*segregis*“, was auf einem lapsus beruht. Allenfalls könnte es *segregus* heißen, aber *segrex* ist besser.

³) Der Autor schreibt „*herus*“. Es kann aber nur „*heros*“ oder „*herous*“ heißen.

fig. 36), *O. bubulus* Har. (p. 218 fig. 33), *O. urus* Har. (p. 219 fig. 34), *O. vitulus* Fähr. (p. 220 fig. 37), *O. tenuicornis* Kl. (p. 221 fig. 39), *O. obtusus* Fähr., *O. corniculatus* Reich. (p. 222 tab. XXXVI fig. 1, 1a), *O. vinctus* Er., *O. insulsus* n. sp. (p. 224) Natal, *O. fugitivus* n. sp. (p. 225) Transvaal, *O. decipiens* n. sp. (p. 225) Natal, *O. talpa* Fähr., *O. ambiguus* n. sp. (p. 227 tab. XXXVI fig. 2), *O. patricius* n. sp. (p. 228) u. *O. dispar* n. sp. (p. 229) Natal, *O. incertus* n. sp. (p. 130) Ovampoland, *O. obtutus* n. sp. (p. 230 fig. 5) Kap, *O. biplagiatus* Per. 1888 (p. 231 fig. 3), *O. pallidipennis* Fähr., *O. semiflavus* Boh., *O. signatus* Fähr., *O. inconspicuus* Fähr., *O. indigus* n. sp. (p. 235) Rhodesia, *O. laceratus* Gerst., *O. asimilis* n. sp. (p. 236) Bechuanaland, *O. coptorhinoides* n. sp. (p. 237) Natal, *O. vicarius* n. sp. (p. 238) Kap, *O. glaber* Fähr., *O. discretus* n. sp. (p. 239) Transvaal, *O. illotus* n. sp. (p. 240) u. *O. inops* n. sp. (p. 240) Rhodesia, *O. probus* n. sp. (p. 241) Kap, *O. titigiosus* n. sp. (p. 242) Mozambique, *O. discrepans* n. sp. (p. 242) Natal, *O. pudens* n. sp. (p. 243) Rhodesia, *O. columella* Fähr. (p. 243 fig. 10), *O. carbonarius* Kl., *O. croesus* Bat. (p. 245 fig. 8, 9), *O. cupricollis* Per. 1888, *O. plebejus* Kl. (p. 247 fig. 6), *O. ferrugineus* Fähr., *O. rangifer* Kl. (p. 248 tab. XXXV fig. 8, 8a), *O. rarus* Guer. (p. 250 tab. XXXV fig. 10, 10a, XXXVIII fig. 22), *O. furcifer* Boh. (p. 251 tab. XXXV fig. 9, 9a, XXXVIII fig. 24), *O. bicallosus* Kl. (p. 252 tab. XXXVI fig. 7, XXXVIII fig. 21), *O. saphyrinus* Fähr. (p. 253 tab. XXXVI fig. 12), *O. suspectus* Per. 1892 (p. 254 fig. 13), *O. aciculatus* Fähr. (p. 254 fig. 15), *O. optivus* n. sp. (p. 255) Rhodesia, *O. Brucei* Reich. (p. 255 tab. XXXVI fig. 11, XXXVIII fig. 23), *O. gemmatus* n. sp. (p. 256 tab. XXXVI fig. 14) Rhodesia, *O. seniculus* n. sp. (p. 257) u. *O. importunus* n. sp. (p. 258) Ovampoland, *O. imitativus* n. sp. (p. 258) u. *O. pellax* n. sp. (p. 259) Transvaal, *O. consobrinus* n. sp. (p. 259) Rhodesia.

Diastellopalpus quinquedens Bat. (p. 265 tab. XXXV fig. 7, XXXVIII fig. 20).

Phalops mit 6 Arten (p. 267): *Ph. ardea* Kl. (p. 267 tab. XXXV fig. 1), *Ph. adspersipennis* Boh. (p. 268 fig. 5, 5a, 6), *Ph. congenitus* n. sp. (p. 270) Transvaal, *Ph. tarsatus* Per. 1888, *Ph. flavocinctus* Kl. (p. 271 fig. 2), *Ph. boschas* Kl. (p. 272 fig. 4, 4a), *Ph. rufosignatus* Lansb.

Milichus n. gen. (p. 274¹) *apicalis* Fähr.

Caccobius Thoms. *histerinus* Fähr., *C. anomalus* Kl.

Pedaria mit 10 Arten (p. 278—279): *P. tuberculata* Cast. (p. 279 tab. XXXI fig. 13), *P. costata* Fähr. (p. 280 tab. XXXVIII fig. 30), *P. cicatricosa* n. sp. (p. 280) Rhodesia, *P. cylindrica* Boh., *P. aspera* n. sp. (p. 282) Kap, *P. picea* Boh. (p. 282 fig. 29), *P. segrex* n. sp. (p. 283 „segregis“²) Mozambique, *P. conformis* n. sp. (p. 283) Transvaal, *P. alternans* Wat., *P. sobrina* n. sp. (p. 284) Kap.

Aulonocnemis torquata n. sp. (p. 285) Natal.

Coptorhina mit 10 Arten (p. 287—288): *C. Klugii* Hop. (p. 288 tab. XXXVIII p. 31), *C. vicina* n. sp. (p. 289) Mozambique, *C. auspicata* n. sp. (p. 289) Transvaal, *C. optata* n. sp. (p. 290) Rhodesia, *C. nitidipennis* Boh., *C. obtusi-*

¹) In der Tabelle p. 108 ist die Gatt. nicht unterschieden.

²) Vergl. pag. 181 Anm.

cornis Boh., *C. Barrattii* Wat. (p. 293 tab. XXXI fig. 14¹), *C. nana* Per. 1888 (p. 293 tab. XXXVIII fig. 32), *C. armata* Boh., *C. imitativa* n. sp. (p. 295) Transvaal.

Delopleurus pallus Boh.

Xinidium dentilabris Har.

Macroderes mit 5 Arten (p. 298–299): *M. Grenii* Kirb. (p. 299 tab. XXXVIII fig. 28²), *M. Bias* Ol., *M. spectabilis* n. sp. (p. 300) Kap, *M. politulus* Borr., *M. dubius* n. sp. (p. 301) Kap.

Heteroclitopus n. gen. (p. 110, 305) *remipes* n. sp. (p. 305 tab. XXXIX fig. 31) Natal.

Saproecius n. gen. (p. 110, 306) *singularis* n. sp. (p. 307) u. *S. optatus* n. sp. (p. 308) Rhodesia.

Parapinotus Dewitzi Har. (p. 309 tab. XXXIII fig. 3, 3a, tab. XXXVIII fig. 27, XXXIX fig. 26).

Heliocopris (p. 310 tab. XXXIX fig. 24) mit 11 Arten (p. 312–313): *H. gigas* L. (p. 113 tab. XXXII fig. 7, 7a), *H. Dillonis* Guer., *H. Pirmal* Fbr. (p. 315 tab. XXXII fig. 2³), *H. Antenor* Ol. (p. 316 fig. 6, 6a), *H. japeus* Kl. (p. 317 fig. 8), *H. Marshallii* n. sp. (p. 318) Rhodesia, *H. Hamadryas* Fbr. (p. 318 tab. XXXII fig. 1, 1a, XXXIX fig. 32), *H. Faunus* Boh. (p. 319 tab. XXXIX fig. 33), *H. Atropos* Boh. (p. 321 tab. XXXII fig. 3), *H. Eryx* Fbr. (p. 322 tab. XXXII fig. 5), *H. hamifer* Har. (= *Selousii* Per. 1896) (p. 322 fig. 4).

Catharsius mit 18 Arten (p. 325–326): *C. platycerus* Kl., *C. Bradshawii* Lansb. (= *C. insignis* Per. 1892) (p. 327 tab. XXXII fig. 10, 10a⁵), *C. rhinoceros* Kl., *C. heros* Boh. (p. 329 tab. XXXII fig. 9, 9a, XXXIX fig. 34), *C. disseptus* n. sp. (p. 330) Transvaal, *C. Ulysses* Boh. (p. 331 tab. XXXIII fig. 11, 11a, XXXIX fig. 37), *C. Pylades* n. sp. (p. 332 tab. XXXIII fig. 25, 25a, XXXIX fig. 38), *C. tricornutus* Deg. (p. 333 tab. XXXIII fig. 13, 13a), *C. dubius* n. sp. (p. 334) Transvaal, *C. vitulus* Boh. (p. 334 fig. 20, 20a), *C. laticeps* Boh. (p. 335 fig. 23, 23a, 24, 24a), *C. melancholicus* Boh. (p. 336 fig. 21, 21a, 22, 22a), *C. marcellus* Klb., *C. opaeus* Wat. (p. 337 fig. 6, 6a), *C. Anderseni* Wat., *C. laticornis* Har., *C. troglodytes* Boh., *C. exiguus* Boh.

Copris (p. 342 tab. XXXIX fig. 25) mit 28 Arten (p. 343–346): *C. macer* n. sp. (p. 346) Rhodesia, *C. laticornis* Boh. (p. 347 tab. XXXIII fig. 18⁶), *C. integer* Reich., *C. Orion* Kl., *C. misellus* n. sp. (p. 349) Natal, *C. orphanus* Guer. (p. 350 fig. 9, 9a), *C. Cassius* n. sp. (p. 351 tab. XXXIX fig. 36) Betschuana-land, *C. contractus* (p. 352 tab. XXXIII fig. 4, 4a), *C. perturbator* n. sp. (p. 352) Rhodesia, *C. Amyntor* Kl., *C. Victorinii* Boh. (p. 354 tab. XXXIII fig. 8), *C. subsidens* n. sp. (p. 355) Damaraland, *C. anceus* Ol. (p. 356 tab. XXXIII fig. 14, 14a, 18⁷), *C. capensis* Wat., *C. Elpenor* Kl. (p. 357 fig. 15,

1) Auf der Tafel selbst ist diese Figur als *C. forcipata* Per. bezeichnet, die im Text gar nicht vorkommt.

2) Im Text dagegen ist diese Figur bei *M. Bias* citirt.

3) Im Text ist fig. 3 citirt.

4) Auf der Tafel selbst ist diese Figur als *H. Faunus* bezeichnet.

5) Fig. 9 u. 10 fehlen in der „Expl.“ ganz.

6) Dieselbe fig. wird im Text (p. 356) zugleich als *C. anceus* ♀ citirt.

7) Im Text ist diese Figur zugleich bei *C. laticornis* citirt, wohin sie nach der „Explication“ ausschliesslich gehört.

15a, 19, 19a), *C. Jacchus* Fbr. (p. 358 fig. 12, 12a, 16, 16a, 17, 17a), *C. globulipennis* Wat. (p. 359 tab. XXXIII fig. 1, 1a, XXXIX fig. 35), *C. cornifrons* Boh. (p. 360 tab. XXXIII 2, 2a), *C. Plutus* Fbr., *C. mesacanthus* Har., (p. 362 fig. 7, 7a), *C. Bootes* Kl. (p. 363 fig. 5, 5a), *C. excavatus* Kl., *C. Achates* n. sp. (p. 365) Süd-Afrika, *C. urus* Boh. (p. 365, fig. 10, 10a, 10b), *C. insidiosus* n. sp. (p. 366) Rhodesia, *C. muticus* Boh.

2. Subfam. *Aphodiinae*. (p. 369—370).

Harmodactylus n. gen. (p. 369, 370) *oscitans* n. sp. (p. 371) Kap.

Aphodius mit 57 Arten (p. 374—380): *A. marginicollis* Har., *A. Wahlbergii* Boh., *A. Holubii* Dohrn, *A. emeritus* (p. 382) Rhodesia, *A. valens* n. sp. (p. 382) Süd-Afrika, *A. iridescens* n. sp. (p. 383) Natal, *A. connexus* Kl., *A. amoenus* Boh., *A. lanuginosus* n. sp. (p. 385) Natal, *A. cinerascens* Kl., *A. gracilis* Boh., *A. lucidulus* Boh., *A. (? Ammoeicus) brevitarsis* n. sp. (p. 388) Kap, *A. ditus* n. sp. (p. 388) Natal, *A. haematiticus* Boh., *A. genialis* n. sp. (p. 390) Kap, *A. decipiens* n. sp. (p. 390) Transvaal, *A. granulatus* Boh., *A. consimilis* Boh., *A. intercalaris* n. sp. (p. 392), *A. anomalipus* n. sp. (p. 393) u. *A. serenus* n. sp. (p. 393) Kap, *A. russatus* Er., *A. moestus* Fbr., *A. Bohemianii* Har., *A. rubricosus* Boh., *A. impurus* Boh., *A. dubiosus* n. sp. (p. 398) Kap, *A. lividus* Ol., *A. calcaratus* Boh., *A. dolosus* Har., *A. timidus* Boh., *A. discoidalis* Boh., *A. probus* n. sp. (p. 401 „probes“) Natal, *A. peregrinus* n. sp. *A. rhinoceros* Reich., *A. procerus* Har. (p. 403 tab. XXXVIII fig. 34), *A. productus* Boh., *A. amabilis* Boh., *A. fugitivus* n. sp. (p. 405) Natal, *A. dorsalis* Boh., *A. mashunensis* n. sp. (p. 406) Rhodesia, *A. adustus* Kl., *A. hirticeps* n. sp. (p. 408) u. *A. (Ammoeicus) mimus* n. sp. (p. 409) Kap, *A. (Amm.) lugubris* Boh., *A. (Amm.) dentinus* n. sp. (p. 410) Transvaal, *A. (Amm.) armaticeps* n. sp. u. *A. (Amm.) spectabilis* n. sp. (p. 410) Kap, *A. (Amm.) carinulatus* n. sp. (p. 411) Transvaal, *A. (Oxyomus) badius* Boh., *A. (Oxyom.) jucundulus* n. sp. (p. 412) Natal, *A. (Ox.) pygmaeus* Boh., *A. sulcipennis* Boh., *A. (Ox.) jugalis* n. sp. (p. 413) Natal, *A. (Ox.) puberulus* Boh., *A. (Ox.) medioximus* n. sp. (p. 414) Kap, *A. (Ox.) costipennis* Boh.

Aphodobius n. gen. (p. 369, 420) *misellus* Boh., *A. villosulus* n. sp. (p. 421) Rhodesia.

Harmogaster exarata Har., *H. transitoria* n. sp. (p. 423) Kap.

Teuchestes sorex Fbr.

Coptochirus mit 7 Arten (p. 426—427): *C. pteropus* Har., *C. cognatus* n. sp. (p. 428) Kap, *C. emarginatus* Germ., *C. pallidipennis* Har., *C. vulgatus* Har., *C. brachypterus* Har., *C. excisus* Har.

Drepanocanthus n. gen. (p. 370, 431) mit 5 Arten (p. 431—432): *Dr. acanthotarsis* n. sp. (p. 432) u. *Dr. eximius* n. sp. (p. 433) Kap, *Dr. spinitarsis* n. sp. (p. 433) Natal, *Dr. connexus* n. sp. (p. 434) u. *Dr. intrusus* n. sp. (p. 434) Kap.

Liparoichirus n. gen. (p. 370, 435), *L. simplex* n. sp. (p. 435) Rhodesia.

Lorditomaeus n. gen. (p. 370, 436) *deplanatus* Roth.

Sybx sulcicollis Boh., *S. impressicollis* Boh.

Notocaulus auriculatus Qued.

Rhyssemus mit 5 Arten (p. 442—443): *Rh. carinatipennis* n. sp. (p. 443) Rho-

desia, *Rh. atramentarius* n. sp. (p. 443) Kap, *Rh. germanus* L., *Rh. promontorii* n. sp. (p. 444) Kap, *Rh. caelatus* n. sp. (p. 445) Süd-Afrika.

Psammobius mit 3 Arten (p. 445—446): *Ps. modestus* n. sp. u. *Ps. evanidus* n. sp. (p. 446) Natal, *Ps. subciliatus* Har.

Pleurophorus capicola n. sp. (p. 448) u. *Pl. natalensis* n. sp. (p. 449) Natal.

Corythoderus Marshallii Brauns.

3. Subfam. *Troginae*. (p. 452).

Trox mit 20 Arten (p. 454—456): *Tr. (Phoberus) rhyparoides* Har. (p. 456 tab. XXXIX 14, 14a), *Tr. (Phob.) talpa* Fähr., *Tr. (Phob.) fascicularis* Wied. (p. 457 fig. 13), *Tr. (Phob.) nanniscus* n. sp. (p. 458) Kap, *Tr. (Phob.) nasutus* Har., *Tr. (Phob.) horridus* Fbr. (p. 460 fig. 15), *Tr. (Phob.) aculeatus* Har., *Tr. penicillatus* Fähr. (p. 461 fig. 12), *Tr. luridus* Fbr. (p. 462 fig. 10), *Tr. sulcatus* Thunb. (= *angulatus* Fähr.) (p. 463 fig. 11), *Tr. (Omorgus) incultus* Fähr. (p. 464 fig. 16), *Tr. (Om.) melancholicus* Fähr., *Tr. consanguineus* n. sp. (p. 466) Rhodesia, *Tr. (Om.) tuberosus* Kl. (p. 466 fig. 19), *Tr. (Om.) ponderosus* n. sp. (p. 467 tab. XXXIX fig. 18) Mozambique, *Tr. (Om.) denticulatus* Ol., *Tr. (Om.) radula* Er., *Tr. (Om.) damarinus* n. sp. (p. 469) u. *Tr. (Om.) gravidus* n. sp. (p. 470 fig. 17) Damaraland, *Tr. (Om.) foveolatus* Boh.

Acanthoceroles n. gen. (p. 452, 471) *singularis* n. sp. (p. 472 tab. XXXIX fig. 23) Kap.

4. Subfam. *Chironinae*. (p. 472).

Chiron puncticollis Har. (p. 474 tab. XXXVIII fig. 35), *Ch. gravis* n. sp. (p. 475) Basutoland, *Chr. volvulus* Kl.

5. Subfam. *Geotrupinae*. (p. 477).

Bolboceras mit 18 Arten (p. 479—480) *panza* Per. 1896 (p. 480 tab. XXXVI fig. 27, XXXIX fig. 2), *B. damarinum* n. sp. (p. 481 tab. XXXVI fig. 19) Damaraland, *B. fortuitum* n. sp. (p. 482 tab. XXXVI fig. 23, XXXIX fig. 7) Transvaal, *B. spurium* n. sp. (p. 482 tab. XXXVI fig. 18, XXXIX fig. 5) Kap, *B. indubium* n. sp. (p. 483 tab. XXXVI fig. 20) Rhodesia, *B. capense* Kl. (p. 484 tab. XXXVI fig. 16, 17, XXXIX fig. 4), *B. caffrum* Boh. (p. 484 tab. XXXVI fig. 24), *B. vacivum* n. sp. (p. 485 tab. XXXVI fig. 25, XXXIX fig. 6, 6a) Rhodesia, *B. inchoatum* n. sp. (p. 485) Mozambique, *B. plausibile* n. sp. (p. 486 tab. XXXVI fig. 22, XXXIX fig. 8) u. *B. auspiciatum* n. sp. (p. 487 tab. XXXVI fig. 21, XXXIX fig. 3) Natal, *B. stercorosum* n. sp. (p. 488) Kap, *B. consocium* Boh. (p. 488 tab. XXXVI fig. 26), *B. posticatum* Boh., *B. pannosum* n. sp. (p. 489) Natal, *B. maculicolle* Boh. (p. 490 tab. XXXVI fig. 28, tab. XXXIX fig. 9), *B. ornatellum* n. sp. (p. 490) Rhodesia, *B. rufotestaceum* Boh.

6. Subfam. *Hybosorinae*. (p. 492).

Hybosorus mit 3 Arten (p. 493): *H. Illigeri* Reich., (p. 493 tab. XXXVIII fig. 39) *H. ruficornis* Boh. (p. 494 fig. p. 38), *H. crassus* Kl.

Chaetocanthus n. gen. (p. 492, 495) *insuetus* n. sp. (p. 496 tab. XXXIX fig. 21) Kap.

Phaeocrous madagascariensis West. (p. 497 fig. 1, 1a, 1b).

7. Subfam. *Orphninae*. (p. 498).

Orphnus mit 7 Arten (p. 499–500): *O. pugnax* Per. 1896 (p. 500 tab. XXXVI fig. 29), *O. plebejus* n. sp. (p. 501) Rhodesia, *O. bilobus* Kl., *O. ovampoanus* Per. 1896, *O. zambesianus* Per. 1896 (p. 502 tab. XXXVI fig. 30, XXXVIII fig. 36, 37), *O. rufulus* Boh., *O. incultus* Per. 1892.

Ochodaenus capicola n. sp. (p. 505) Kap.

Drepanognathus mandibularis Lansb.

8. Subfam. *Dynastinae*. (p. 509–511).

Heteronychus mit 14 Arten (p. 513–515): *H. claudius* Kl. (p. 515 tab. XL fig. 1¹⁾), *H. Wilmsii* Klb., *H. niger* Kl., *H. infrictus* n. sp. (p. 517 tab. XL fig. 2) Rhodesia, *H. Lichas* Kl. (p. 518 fig. 3), *H. indigus* n. sp. (p. 519) Natal, *H. mashunus* n. sp. (p. 519 fig. 4) Rhodesia, *H. transvaalensis* n. sp. (p. 520 fig. 5) u. *H. indotatus* n. sp. (p. 520) Transvaal, *H. tristis* Boh. (p. 521 fig. 6), *H. arator* Fbr. (p. 521 fig. 7), *H. viator* n. sp. (p. 522 fig. 8) Transvaal, *H. pauperatus* n. sp. (p. 523 fig. 9) u. *H. dissidens* n. sp. (p. 523 fig. 10) Rhodesia.

Pentodontoschema n. gen. (p. 510, 525) mit 5 Arten (p. 526–527): *P. Aries* Fbr. (p. 527 tab. XL fig. 12), *P. capicola* n. sp. (p. 528 fig. 13), *P. diversa* n. sp. (p. 529 fig. 14) u. *P. fraudulenta* n. sp. (p. 529) Kap, *P. Nireus* Burm. (p. 530 fig. 15²⁾), *P. deceptor* n. sp. (p. 530 fig. 16) Natal.

Hyboschema n. gen. (p. 510, 531) mit 2 Arten (p. 531): *H. contrata* Boh. (p. 532 fig. 17), *H. sobrina* n. sp. (p. 532 fig. 18) Transvaal.

Orsilochus cornutus Thunb.

Temnorhynchus mit 4 Arten (p. 535): *T. retusus* Fbr. (p. 535 fig. 19), *T. clypeatus* Kl., *T. bubalus* n. sp. (p. 537 fig. 20) Damaraland, *T. Faunus* n. sp. (p. 538 fig. 21) Kap.

Pycnoschema (p. 539 fig. 22) mit 4 Arten (p. 540): *P. corpulenta* n. sp. (p. 540 fig. 23), *P. Corydon* Ol. (p. 541 fig. 24), *P. diversa* n. sp. (p. 542 fig. 25) Kap, *P. mashuna* n. sp. (p. 543) Rhodesia.

Callistemonus n. gen. (p. 510, 543) *intrusus* n. sp. (p. 544) Kap.

Homocormorphus rufipes Burm.

Cyphonistes vallatus Wied.

Oryctes Boas Fbr., *O. monoceros* n. sp. (p. 549 tab. XL fig. 27) Kap.

Archon Centaurus Fbr.

Syrichthus verus Burm. (p. 553 fig. 28).

Syrichthodontus n. gen. (p. 511, 553) *spurius* Burm. (p. 554 fig. 29).

Syrichthomorphus n. gen. (p. 511, 554) *termitophilus* n. sp. (p. 555 fig. 30) Transvaal.

Pseudosyrichthys n. gen. (p. 511, 555) *clathratus* Gerst. (p. 556 fig. 31).

Venedus n. gen. (p. 511, 556) *paradoxus* Boh.

Pseudocyphonistes n. gen. (p. 511, 557) *corniculatus* Burm.

¹⁾ Tab. XL ist im 12. Bande noch nicht enthalten.

²⁾ Den schönen von Burmeister erteilten Namen verballhornt der Autor in die absolut unverständliche Bezeichnung „*nirea*“, ein böser lapsus, der gewiss vermieden worden wäre, wenn der Autor nicht fälschlich „*nireus*“ statt richtig „*Nireus*“ zu schreiben gewohnt wäre. Vergl. p. 135 Anm.

Rhizoplatys trituberculatus Burm. (p. 560 fig. 32), *Rh. bituberculatus* Kl. (p. 561 tab. ? fig. ?¹).

Rhizoplatodes n. gen. (p. 511, 561) *castaneipennis* Boh. (p. 562 tab. ? fig. ?).

Einzelbeschreibungen.

Coprini.

Aegialia siehe Everts pag. 177.

Acanthocerodes, *Anachalcos*, *Ammoeciis*, *Aphengoeus* siehe Peringuey pag. 179, 180, 185.

Aphodius (*Mendidaphodius* n. subg.) *spinifrons* n. sp. Reitter (D. ent. Z. p. 73 „*spinifrontis*“) Indersk, *A. (Volinus) Graffi* n. sp. (p. 74) Sibirien, *A. flavomargo* n. sp. (p. 75) Turkestan (= *pustulifer* Reitt. ex. p.) — *A. (Mendidius) burgaltaicus* n. sp. Csiki (Zichy II p. 107), *A. (Phaeaphodius) Zichyi* n. sp. (p. 107), *A. (Melinopterus) Mehelyi* n. sp., *A. Roschlapilii* n. sp. (p. 108) Mongolei. — Siehe Everts pag. 177, Peringuey pag. 184.

Aphodobius, *Aulonocnemis* siehe Peringuey pag. 182, 184.

Bolboceras panza Per. = *atavus* Kolbe nach Felsche (D. ent. Z. p. 154). -- Siehe auch Peringuey pag. 185.

Byrrhydium siehe Peringuey pag. 180.

Caccobius siehe Everts pag. 177, Peringuey pag. 182.

Catharsius mirabilis n. sp. Felsche (D. ent. Z. p. 147 tab. I) Afrika, *C. insignis* Per. = *Bradshawii* Lansb. (p. 154), *C. Australiae* Shipp = *tricornutus* ♀ (p. 155). — Siehe auch Peringuey pag. 183.

Ceratophyes siehe Everts pag. 177.

Chaetocanthus, *Cheironitis* siehe Peringuey pag. 181, 185.

Chiron hovanus n. sp. Fairmaire (Rev. Ent. XX p. 135) Madagascar. Siehe Peringuey pag. 185.

Circellium siehe Peringuey pag. 179.

Copris umbilicatus n. sp. Abeille (Nouv. esp. Col. p. 4, Ech. 17 p. 68) Südfrankreich. — *C. truncatus* n. sp. Felsche (D. ent. Z. p. 150) Goldküste, *C. tridens* n. sp. (p. 150) Kamerun, *C. globulipennis* Wat. = *sexdentatus* Thunb. (p. 154). — Siehe auch Everts pag. 177, Peringuey pag. 183.

Coptochirus, *Coptorhina*, *Corythoderus* siehe Peringuey pag. 182, 184, 186.

Diastellopalpus Füllebornii n. sp. Kolbe (Sitzb. Fr. Berl. p. 73) u. *D. nyassicus* n. sp. (p. 73) Nyassaland. — Siehe auch *Onthophagus* u. Peringuey pag. 182.

Diastictus siehe Everts pag. 177.

Delopleurus, *Drepanocanthus*, *Drepanocerus*, *Drepanochirus*, *Drepanognathus* siehe Peringuey pag. 180, 182, 184, 186.

Epilissus refulgens n. sp. Fairmaire (Rev. Ent. XX p. 132) Madagascar. — Siehe auch Peringuey pag. 180.

Epirinus siehe Peringuey pag. 180.

Geotrupes tenebrosus n. sp. Fairmaire (Bull. Fr. p. 267), *G. infraopacus* n. sp. (p. 267) Sikkim. — Siehe auch Everts pag. 177.

Gymnopleurus, *Gyronotus*, *Harmodactylus*, *Harmogaster* siehe Peringuey pag. 179, 184.

¹) Wird wahrscheinlich auf tab. XLI erscheinen.

Helicopriss Kolbei n. sp. **Felsche** (D. ent. Z. p. 146) Westafrika, *H. coronatus* n. sp. (p. 146) Gabun, *H. Selousii* Per. = *hamifer* Har. (p. 154), *H. operosus* Wat. = *Satyrus* Boh. (p. 154), *H. coriaceus* Shipp. = *gigas* ♀, *H. Donaldsonis* Shipp. = *Dillonis* Guér. (= *protentosus* Gerst. = *Menelikii* Gestr. (p. 154), *H. Coryndonis* Shipp. = *Samson* Har. (p. 155). — Siehe auch Peringuey pag. 183.

Heptaulacus siehe Everts pag. 177.

Heteroclitopus, *Hybosorus* siehe Peringuey pag. 183, 185.

Lethrus. **Ssemenow** stellte die Synonymie der 3 Arten *L. apterus* Laxm., *L. (Ceratodirus) longimanus* Fisch. u. *L. (Cerot.) cephalotes* Pall. fest (Rev. russ. I p. 254—255).

Liatongus unifasciatus n. sp. **Fairmaire** (Bull. Fr. p. 95) Madagascar. — *L. giganteus* var. *corinthius* n. var. **Fairmaire** (Rev. Ent. p. 133), *L. aurocupreus* n. sp. (p. 133), *L. viridans* n. sp., *L. infimus* n. sp. (p. 134) Madagascar.

Liparocheirus, *Lorditomaeus*, *Macroderes* siehe Peringuey pag. 183, 184.

Mendidaphodius siehe *Aphodius*.

Milichus, *Neonitis*, *Notocaulus*, *Ochodaenus*, *Odontoloma* siehe Peringuey pag. 180, 181, 182, 184, 186.

Odontaeus siehe Everts pag. 177.

Oniticellus siehe Everts pag. 177, Peringuey pag. 181.

Onitis siehe Peringuey pag. 180.

Onthophagus Felschei Reitt. kann nicht = *O. orcas* Mén. sein nach **Reitter** (Wien. ent. Zeit. XX p. 57), *O. orientalis* Reitt. nec Har. = *fissinatus* Fairm. — *O. mashunus* Per. = *panoplus* Bat. nach **Felsche** (D. ent. Z. p. 154), *O. ponderosus* Per. = *Diastellopalpus quinquedens* Bat. (p. 154), *O. Smithii* Shipp. = *Bottegonis* Gestr. (p. 155). — *O. transbaicalicus* n. sp. **Csiki** (Zich. II p. 109) Sibirien. — Siehe auch Everts pag. 177, Peringuey pag. 181.

Orphnus siehe Peringuey pag. 186.

Oxyomus siehe Everts pag. 177, Peringuey pag. 184.

Pachylomera, *Pachysoma*, *Parapinotus*, *Pedaria*, *Phaeocrous*, *Phalops* siehe Peringuey pag. 179, 182, 183, 185.

Phanaeus thalassinus Pert. beschrieb genauer **Felsche** (D. ent. Z. p. 151), *Ph. sericeus* n. sp. (p. 152) Rio grande do Sul, *Ph. Jason* n. sp. (p. 153) Cayenne, *Ph. furiosus* Bat. ist Druckfehler u. muss *furcosus* heissen (p. 154).

Pinotus reclinatus n. sp. **Felsche** (D. ent. Z. p. 135) Columbien, *P. verticalis* n. sp. (p. 136) Argentinien, *P. imitator* n. sp. (p. 136) Para, *P. Podalirius* n. sp. (p. 137) u. *P. quinquelobatus* n. sp. (p. 138) Ecuador, *P. anthrax* n. sp. (p. 138) Brasilien, *P. texanus* n. sp. (p. 139) Texas, *P. alutaceus* n. sp. (p. 139) Uruguay, *P. punctatostriatus* n. sp. (p. 139) Uruguay, *P. laevicollis* n. sp. (p. 140) Brasilien, *P. parcepunctatus* n. sp. (p. 140) Amazonas, *P. ocellatopunctatus* n. sp. (p. 141) Venezuela, *P. globulus* n. sp. (p. 141) Amazonas, *P. cuprinus* n. sp. (p. 141) u. *P. fissiceps* n. sp. (p. 142) Bolivien, *P. quadraticeps* n. sp. (p. 142) Brasilien, *P. rotundigena* n. sp. (p. 142) Miranda, *P. mamillatus* n. sp. (p. 143) Ecuador, *P. quadrinodosus* n. sp. (p. 143) Honduras, *P. inachoides* n. sp. (p. 144) Venezuela, *P. Lycas* n. sp. (p. 144) Brasilien, *P. superbus* n. sp. (p. 145) patria?

- Pleurophorus*, *Psammobius* siehe Everts pag. 177, Peringuey pag. 185, 186.
Rhyssmodes, *Rhyssmorphus* siehe Clouët pag. 176.
Rhyssemus siehe Chobaut pag. 175, Clouët pag. 176, Everts pag. 177, Peringuey pag. 184.
Saproecius, *Scaptocnemis* siehe Peringuey pag. 181, 183.
Scarabaeus Grandidieri Shipp. = *Radoma* Fairm. nach Felsche (D. ent. Z. p. 155).
 — Siehe auch Peringuey pag. 179.
Sceliages, *Sebasteos*, *Sybox* siehe Peringuey pag. 179, 184.
Sisyphus Schaefferi u. *Boschniakii* sind nicht zu trennen nach Müller (Wien. ent. Zeit. XX p. 140). — Siehe Everts pag. 177, Peringuey pag. 180.
Tapeinopterus, *Teuchestes*, *Tiniocellus*, *Tragiscus* siehe Peringuey pag. 180, 181, 184.
Trichorhyssenus siehe Clouët pag. 176.
Trox patagonicus Blanch. = *bullatus* Curt. nach Felsche (D. ent. Z. p. 154). —
Tr. gonoderus n. sp. Fairmaire (Rev. Ent. XX p. 135) Madagascar. — Siehe auch Everts pag. 177, Peringuey pag. 185.
Xinidium siehe Peringuey pag. 183.

Melolonthini.

- Anodontonyx (Scitala) longuuda* Er. = *nigrolineata* Boisd. nach Blackburn (Tr. R. Soc. S. Austr. 25 p. 21).
Anomalyna picticollis Frm. beschrieb genauer Fairmaire (Rev. Ent. p. 151).
Anozia siehe Everts pag. 177.
Aphenoserica, *Archoserica*, *Bilga*, *Camentoserica* siehe Brenske pag. 174, 175.
Coenonycha parvula n. sp. Fall (Tr. Am. ent. Soc. 27 p. 293) Californien.
Comioserica siehe Brenske pag. 175.
Dichelonycha siehe Fall pag. 177.
Dissotoxus costipennis n. sp. Fairmaire (Rev. Ent. XX p. 144) Madagascar.
Doxocalia siehe Brenske pag. 174.
Empecta deusesquamosa n. sp. Fairmaire (Rev. Ent. XX p. 149), *E. densaticollis* n. sp. (p. 149), *E. cariosicollis* n. sp., *E. vagecostata* n. sp., *E. scutata* n. sp. (p. 150) Madagascar.
Enaria lividula n. sp. Fairmaire (ibid. p. 148) Madagascar. — *E. biapicata* n. sp. Fairmaire (Not. Leyd. Mus. 23. p. 69) Madagascar.
Encya plagulata n. sp. Fairmaire (ibid. p. 69) Madagascar.
Enthora rubiginosa n. sp. Fairmaire (Rev. Ent. XX p. 147) Madagascar.
Euphoresia siehe Brenske pag. 174.
Heteronyx rapax Black. = *hepaticus* Er. = *fumatus* Er. nach Blackburn (Tr. R. Soc. S. Austr. 25. p. 22).
Homalopia siehe Everts pag. 177, *Homaloserica* siehe Everts pag. 174.
Hoplia Karamanii Reitt. = *farinosa* nach Müller (Wien. ent. Zeit. XX p. 141).
 — *H. Asteria* n. sp. Reitter (D. ent. Z. p. 178) Turkestan. — *H. atronitens* n. sp. Fairmaire (Rev. Ent. XX p. 137), *H. rugicollis* n. sp. (p. 137), *H. rudesquasoma* n. sp., *H. squameovaria* n. sp. (p. 138), *H. vittula* n. sp. (p. 139), *H. bidentula* n. sp., *H. anticipes* n. sp. (p. 140), *H. stigmatopyga* n. sp., *H. latecostata* n. sp. (p. 141), *H. terminalis* n. sp., *H. cervinotincta* n. sp. (p. 142), *H. rufolutosa* n. sp. (p. 143) Madagascar.
Lachnosterna fusca abgebildet. Felt (Bull. N. York Mus. 37. VIII p. 32 fig. 56).
Lamproserica siehe Brenske pag. 175.

- Lepidiota amoena* n. sp. **Felsche** (Ins. Börs. 18. p. 314, D. ent. Z. p. 360) Tonkin.
- Lepiserica*, *Mesoserica*, *Nedymoserica*, *Neoserica*, *Neuroserica*, *Orthoserica* siehe Brenske pag. 174, 175.
- Macrodactylus subspinosus* abgebildet von **Felt** (Bull. N. York. Mus. 37. VIII. p. 9 fig. 7).
- Melolontha* siehe Everts pag. 177.
- Pachyolus Dohrnii* Frm. ♀ beschrieb **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 151).
- Philoserica* siehe Brenske pag. 175.
- Phytolaema* siehe Germain pag. 177.
- Polyphylla adspersa* Mot. var. *Arazidis* n. var. **Koenig** (Wien. ent. Zeit. XX p. 9) Borshom. — *P. alba* var. *permagna* n. var. **Reitter** (D. ent. Z. p. 76) Turkestan. — Siehe auch Everts pag. 177.
- Pseudenaria* n. gen. *hexaphylla* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 146) Madagascar.
- Rhizotrogus* siehe Everts pag. 177.
- Scitala* siehe *Anodontonyx*.
- Serica rufoguttata* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 144), *S. nigroguttata* n. sp. (p. 145), *S. curtipennis* n. sp. (p. 145) Madagascar. — Siehe auch Brenske pag. 175 u. Everts pag. 177.
- Stenoserica* siehe Brenske pag. 174.
- Straliga* n. gen. **Fairmaire** (Bull. Fr. p. 95), *Str. croceicollis* n. sp. (p. 95) Madagascar.
- Tephraoserica*, *Thrymoserica* siehe Brenske pag. 174.
- Toxophyllus Ganglbaueri* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 147) Madagascar.
- Triodonta difformipes* Frm. var. *Delagranei* **Pic** (Misc. Ent. 1898 p. 97). — *Tr. costipennis* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 143) Madagascar. — Siehe auch Brenske pag. 174.

Rutelini.

- Adorodocia* ♂ beschrieb **Arrow** (Ann. Mag. nat. hist. 8. p. 194) u. besprach die Arten (p. 35, 194).
- Adoretus*. Ueber die Geschlechtsunterschiede mehrerer Arten berichtete **Arrow** (Ann. Mag. nat. Hist. VII p. 393—394).
- Amblyterus cicatricosus* Gyll. ♂ beschrieb **Ohaus** (D. ent. Z. p. 133).
- Anisoplia* siehe Everts pag. 177.
- Anodontopopillia* n. gen. **Ohaus** (D. ent. Z. p. 269, 271) für *Popillia subvittata* Burm.
- Anomala mutata* n. nom. **Arrow** (Ann. Mag. VII p. 401) für *A. solida* Arr. nec Er. — *A. lucicola* abgebildet von **Felt**, Bull. N. York St. Mus. 37. VIII. p. 15 fig. 16). — Siehe auch Everts pag. 177.
- Anoplognathus luridus* n. sp. **Arrow** (Ann. Mag. nat. hist. 7. p. 396) u. *A. explanatus* n. sp. (p. 397) N. S. Wales. — *A. griseopilosus* n. sp. **Ohaus** (D. ent. Z. p. 130) Neu-Süd-Wales.
- Calloodes* beschränkte **Arrow** (Ann. Mag. nat. hist. 7. p. 396) auf *C. Grayanus* Wh., *C. Rayneri* M. L. u. *C. Atkinsonis* Wat.
- Calopopillia Felschei* n. sp. **Ohaus** (D. ent. Z. p. 260) Congo. — Siehe auch *Popillini*.

- Dicaulocephalus Fruhstorferi* n. sp. **Felsche** (Ins. Börse 18. p. 314 u. D. ent. Z. p. 359 fig.) Tonkin.
- Eupopillia viridiaenea* n. sp. **Ohaus** (D. ent. Z. p. 260) Kamerun. — Siehe auch *Popilliini*.
- Fruhstorferia sexmaculata* Kr. die Mundtheile beschrieb **Ohaus** (D. ent. Z. p. 129, 134 fig. 7), *Fr. javana* Kolb. (p. 134 fig. 8).
- Gnatholabis hirsuta* n. sp. **Ohaus** (D. ent. Z. p. 258) Afrika. — Siehe auch *Popilliini*.
- Heterosternidae*, *Heterosternus*, *Homoisternus* siehe **Ohaus** pag. 178.
- Homotropus testaceipennis* n. sp. **Ohaus** (D. ent. Z. p. 133 fig. 11) Australien.
- Hoplia* siehe **Everts** pag. 177.
- Hylamorpha rufimana* Arr. = *elegans* Burm. ♀ nach **Arrow** (Ann. Mag. VII p. 400).
- Macropodius* siehe **Ohaus** pag. 178.
- Metapopillia intermedia* n. sp. **Ohaus** (D. ent. Z. p. 266) Congo. — Siehe auch *Popilliini*.
- Mimadoretus* n. gen. **Arrow** (Ann. Mag. nat. hist. 7. p. 398) für *Popillia flavomaculata* Mc L.
- Mimelia Grubaueri* n. sp. **Ohaus** (D. ent. Z. p. 272) Sumatra.
- Nannopopillia Damarae* n. sp. **Ohaus** (D. ent. Z. p. 257) Afrika. — Siehe auch *Popilliini*.
- Parastasia nigroscutellata* n. sp. **Ohaus** (D. ent. Z. p. 125, 134 fig. 4) Cap Engano, *P. assimilis* n. sp. (p. 126, 134 fig. 5) Shortlands-Inseln, *P. Montroussieri* Fairm. var. *australis* n. var. (p. 128) Trinity-Bai, *P. Kinibalensis* n. sp. (p. 128) Borneo, *P. nigriceps* Westw. (p. 134 fig. 3), *P. novoguineensis* Oh. (p. 134 fig. 5).
- Parisolea* siehe **Ohaus** pag. 178.
- Pelidnota punctata* abgebildet von **Felt** (Bull. N. York Mus. 37. VIII. p. 15 fig. 17).
- Phaenomeris splendida* n. sp. **Ohaus** (D. ent. Z. p. 125, 134 fig. 2) Ost-Afrika, *Ph. Beskei* Mannh. (p. 134 fig. 1).
- Pharaonus* siehe *Popilliini*.
- Phyllopertha* siehe **Everts** pag. 177.
- Popillia hexaspila* Anc. u. *P. atra* Qued. ♂♂ beschrieb **Ohaus** (D. ent. Z. p. 261), *P. cuprascens* n. sp. (p. 262) Congo, *P. luteipennis* Hope von *P. interpunctata* Er. unterschieden (p. 263), *P. marginata* n. sp. (p. 263) West-Afrika, *P. Donckieri* n. sp. (p. 264) Congo, *P. viridicyanea* n. sp. (p. 265) Congo. — Siehe auch *Popilliini*.
- Popilliini*. Dichot. Tabelle über 6 Gattungen gab **Ohaus** (D. ent. Z. p. 270—271), wobei aber *Calopopillia*, *Eupopillia*, *Metapopillia* u. *Pseudopopillia* als Untergattungen zu *Popillia* gezogen u. nicht charakterisirt werden, während sie in derselben Arbeit (p. 260, 266, 267) als selbstständige Gattungen behandelt sind.
- Pseudodorodocia* n. gen. *aenigma* n. sp. **Arrow** (Ann. Mag. Nat. Hist. 1901. VIII p. 37) Madagascar.
- Pseudopopillia Mossartsi* n. sp. **Ohaus** (D. ent. Z. p. 267) Guinea, *Ps. Colmantii* n. sp. p. 268) Congo. — Siehe auch *Popilliini*.

- Pseudosinghala regalis* n. sp. **Arrow** (Ann. Mag. nat. hist. Z. p. 399) Penang,
Ps. conjuga n. sp. (p. 400) Indien.
Repsinus purpureipes Mac Leay von *R. aeneus* unterschieden **Ohaus** (D. ent. Z. p. 131, 134 fig. 10, 10a), *R. aeneus* Fbr. (p. 134 fig. 9, 9a, 9b).
Trichopopillia dorsalis Kr. var. *picipennis* n. var. **Ohaus** (D. ent. Z. p. 257) Afrika. — Siehe auch *Popilliini*.
Trigonochilus politus n. sp. **Arrow** (Ann. Mag. N. Hist. Z. p. 394 fig. b) Angola,
Tr. coriaceus Br. (fig. a).

Dynastini.

- Archon*, *Callistemonus*, *Cyphonistes*, *Heteronychus* siehe Peringuey pag. 186.
Hexodon griseosericans n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 136) Madagascar.
Homoemorphus, *Hyboschema*, *Orsilochus* siehe Peringuey pag. 186.
Oryctes anguliceps n. sp. **Fairmaire** (Not. Leyd. Mus. 23. p. 70), *O. politus* n. sp. (p. 70) Madagascar, *O. Vinsonis* Deyr. = *Chevolatii* (p. 71). — *O. Crampelii* Frm. (*Dimyxus*) = *ingens* Klb. = *cristatus* Voll. = *gigas* Cast. nach **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 136), das ♀ beschrieben (p. 137). — Siehe auch Everts pag. 177, Peringuey pag. 186.
Oryctomorphus siehe Germain pag. 178.
Pentodon mandibularis n. sp. **Reitter** (Wien. ent. Zeit. XX p. 99) Anatolien. — *P. Nikolskii* n. sp. **Jakowleff** (Rev. ross. Ent. I p. 181) Balkasch - See. — *P. devius* n. sp. **Jakowleff** (Hor. ross. 35 p. 266) Samarkand, *P. Semenowii* n. sp. (p. 268) Persien, *P. conjunctus* n. sp. (p. 269) Turkestan, *P. Memnon* n. sp. (p. 271) Algier, *P. pachypus* n. sp. (p. 272) Klein-Asien, *P. persicus* n. sp. (p. 274) Persien, *P. tardus* n. sp. (p. 275) Turkestan, *P. tumidus* n. sp. (p. 276) Transcaspien.
Pentodontoschema siehe Peringuey pag. 186.
Phileurus convexus n. sp. **Arrow** (Andrews 1900 p. 320) Christmas Insel (Nachtrag zu 1900, 1.).
Pseudocyphonistes, *Pseudosyrichthius*, *Pycnoschema*, *Rhizoplatodes*, *Rhizoplatys*, *Syrichthodontus*, *Syrichthomorphus*, *Syrichthius*, *Temnorhynchus*, *Venedus* siehe Peringuey pag. 186, 187.

Cetoniini.

- Allorhina nitida* abgebildet durch **Felt** (Bull. N. York Mus. 37. VIII. p. 32 fig. 57).
Anacamptorhina concolor n. sp. **Heller** (Abh. Mus. Dresd. X. 2. p. 3) Neu-Guinea.
Anisoptia gossypiata var. *ferruginipes* n. var. **Pic** (Ech. 17 p. 9) Jaffa.
Bricoptis marginicollis n. sp. **Fairmaire** (Not. Leyd. Mus. 23 p. 68).
Callynomes Davidis Fairm. var. *humeralis* n. var. **Moser** (Berl. ent. Z. 1901 p. 529), *C. rufithorax* n. sp. u. *C. cruciatus* n. sp. (p. 530) Tonkin.
Carolina flavofasciata n. sp. **Moser** (ibid. p. 527) und *C. lurida* n. sp. (p. 527) Tonkin.
Celidota subfasciata n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. 20 p. 157) Madagascar. — *C. Decorsii* n. sp. **Fairmaire** (Not. Leyd. Mus. 23 p. 68) Madagascar.
Chalcopharis n. gen. *nigroaenea* n. sp. **Heller** (Abh. Mus. Dresd. X. 2. p. 4) Neu-Guinea.
Chromoptilia Perrieri n. sp. **Fairmaire** (Bull. Fr. p. 96) Madagascar.

- Clerota castaneipennis* n. sp. Moser (Berl. Zeit. 1901 p. 381) Sumatra.
- Clinteria Bellii* n. sp. Janson (Tr. ent. Soc. Lond. 1901 p. 180) Ost-Indien.
- Coelodera nigroscutellaris* n. sp. Moser (Berl. ent. Z. 1901 p. 527) Tonkin.
- Coelochilus pygidialis* n. sp. Janson (Tr. ent. Soc. Lond. 1901 p. 185) Ost-Indien.
- Compscephalus Dmitriewii* n. sp. Olsuflew (Hor. ross. 35 p. 603, 609 tab III fig. 3—5) und *C. Kachowskii* n. sp. (p. 606, 610 fig. 1, 2) Ost-Afrika, *C. Horsfieldianus* Wh. (p. 610 fig. 6, 7).
- Coryphocera tonkinensis* n. sp. Moser (Berl. ent. Z. 1901 p. 525) Tonkin.
- Diaphonia seminigra* Kr. = *Parryi* Jans. nach Blackburn (Tr. R. Soc. S. Austr. 25. p. 22).
- Dicerus biplagiatus* n. sp. Moser (Berl. Zeit. 1901 p. 379) Insel Wetter.
- Dicranorhina derbyana* var. *divortialis* n. var. Kolbe (Sitzb. Fr. Berl. 1901 p. 75).
- Dilochrosis*. Verzeichniss der Arten und Synonymie. Heller (Abh. Mus. Dresd. X. 2. p. 5—6).
- Diplognatha mhondana* Moser (Berl. Zeit. 1901 p. 381) Mhonda.
- Epicometis* siehe Everts pag. 9♂.
- Epixanthis Perrieri* n. sp. Fairmaire (Rev. Ent. XX p. 152), *E. rostrifera* n. sp. (p. 152) Madagascar. — *E. fasciolata* n. sp. Fairmaire (Not. Leyd. Mus. 23. p. 68) Madagascar.
- Eudicella nyassica* n. sp. Kolbe (Sitzb. Fr. Berl. p. 74) Afrika.
- Eumimimetica* siehe *Pseudanthracophora*.
- Euphoria inda* abgebildet von Felt (Bull. N. York Mus. 37. VIII. p. 28 fig. 47).
- Euselates tonkinensis* n. sp. Moser (Berl. ent. Z. 1901 p. 529) Tonkin.
- Glycyphana Andrewesii* n. sp. Janson (Tr. ent. Soc. Lond. 1901 p. 182) Ost-Indien. — *G. laterimaculata* n. sp. Kraatz (Term. Füz. 24. p. 155), *G. incerta* u. Varietäten besprochen (ibid. p. 155).
- Gnathocera uheha* n. sp. Kolbe (Sitzb. Fr. Berl. p. 75), *Gn. usafuana* n. sp. (p. 76), *Gn. vestita* n. sp., *Gn. pilicollis* n. sp. (p. 77), *Gn. sulcata* n. sp. (p. 78) Nyassaland.
- Gnorimus pictus* n. sp. Moser (Berl. ent. Z. 1901 p. 531) Tonkin. — Siehe auch Everts pag. 177.
- Goliathus giganteus* var. besprach Noël (Le Natural. 1901 p. 10).
- Hemiaspis* n. gen. *sanguinosa* n. sp. Fairmaire (Rev. Ent. XX. p. 156) Madagascar.
- Heterophana dorsopunctata* n. sp. Fairmaire (ibid. p. 151) Madagascar.
- Heterosoma exasperatum* n. sp. Fairmaire (Not. Leyd. Mus. 23 p. 66), *H. breve* n. sp. (p. 67) Madagascar.
- Hiberasta* n. gen. *longipilis* n. sp. Fairmaire (Rev. Ent. XX. p. 155), Madagascar.
- Ligyromorphus* n. gen. *rufiventris* n. sp. Arrow (Ann. Mag. nat. hist. 8 p. 257) Mashonaland.
- Lomaptera Satanas* n. sp. Heller (Abh. Mus. Dresd. X. 2. p. 7) Neu-Guinea.
- Myoderma nigra* n. sp. Arrow (Ann. Mag. nat. hist. 8. p. 258) Kamerun.
- Osmoderma*, *Oxythyrea* siehe Everts pag. 177.
- Poecilopharis minuta* n. sp. Moser (Berl. Zeit. 1901 p. 381) Insel Larat.
- Potosia floricola* Herbst var. *azurea* n. var. Koenig (Wien. ent. Zeit. XX. p. 10) Eriwan. — *P. hungarica* var. *auliensis* n. var. Reitter (D. ent. Z. p. 76) Turkestan.

- Pseudanthracophora striatipennis* Kr. = *Eumimimetica irrorata* Wall. nach **Janson** (Tr. ent. Soc. Land. p. 183).
- Pseudinca Wentzel-Heckmannae* n. sp. **Kolbe** (Sitzb. Fr. Berl. p. 79), *Ps. infelix* n. sp. (p. 80) Nyassaland.
- Pygora viridicincta* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX. p. 153), *P. cribricollis* n. sp. (p. 153), *P. elegantula* n. sp., *P. ruficollis* n. sp. (p. 154) Madagascar.
- Rhomborhina Thiemei* n. sp. **Moser** (Berl. ent. Z. 1901 p. 526) Tonkin.
- Stephanocrates Dohertyi* n. sp. **Jordan** (Nor. Zool. VIII. p. 408) Ost-Afrika.
- Theodosia perakensis* n. sp. **Moser** (Berl. Zeit. 1901 p. 379) Perak.
- Trichius bifasciatus* n. sp. **Moser** (Berl. ent. Z. 1901 p. 532), *Tr. fraterculus* n. sp. (p. 533), *Tr. cruentus* n. sp. (p. 534), *Tr. elegantulus* n. sp. (p. 535), *Tr. flavipes* n. sp. (p. 535), *Tr. saucius* n. sp. (p. 536), *Tr. marmoreus* n. sp. (p. 537), *Tr. versicolor* (p. 537) u. *Tr. bicolor* n. sp. (p. 538) Tonkin. —
Siehe auch **Everts** pag. 177.
- Valgus* siehe **Everts** p. 177.

Fam. *Buprestidae*.

Abeille 1, Albisson 1, Blackburn 2, Champion 9, Csiki 1, Everts 2, Fairmaire 6, Fall 4, Felt 1, Fliche 1, Jakowleff 1, 7, 9, 10, Kempers 1, Kerremans 1, Kolbe 1, 3, Pic 48a, Scudder 1, Théry 1, 2, Xambeu 1, Zehntner 2.

Morphologie.

Kempers (1) schilderte die Flügel von *Chalcophora mariana* (p. 19), *Capnodis tenebrionis* (p. 20), *Dicercia aenea* (p. 20), *Agrilus coeruleus* (p. 20 tab. II fig. 3), *Trachys minuta* (p. 20).

Biologie.

Albisson (1) berichtete über die Biologie von *Acmaeodera Pilosellae*.

Zehntner (2) behandelte die Larve von *Catoxantha gigantea*.

Xambeu (1) beschrieb die Larve u. die Puppe von *Agrilus Solieri* (p. 26).

Felt (1) gab eine kurze Beschreibung und Abbildung der Larve von *Agrilus anxius* (p. 24 fig. 37) u. der durch die Larven von *Agrilus ruficollis* erzeugten Gallen (p. 14 fig. 15).

Descendenztheorie.

Kerremans (1) stellte eine phylogenetische Untersuchung an, in welcher er die 12 Unterfamilien von den *Julodini* abzuleiten versuchte (p. 165—171). Es folgen Angaben über *Mimicry* und Schutzfärbung p. 171—173.

Palaeontologie.

Fliche (1) nannte eine neue Art *Glaphyroptera* aus dem Trias von Lothringen (*lotharingiaca*), ohne sie zu beschreiben.

Scudder (1) beschrieb 3 *Buprestis* aus Canada, die nicht neu sind.

Systematik.

Umfassende Arbeiten.

Everts.

Coleoptera neerlandica. II. 1. 1901 p. 70—89.

Die Familie wird dichotomisch in 4 Tribus und 12 Gattungen getheilt.

Die behandelten Gattungen u. Arten.

Ptosima mit 1 Art, *Dicerca* mit 1 Art, *Chalcophora* mit 1 Art, *Buprestis* mit 3 Arten: *B. haemorrhoidalis* (p. 77 fig. 71 II p. 70), *Phaenops* mit 1 Art, *Poecilonota* mit 2 Arten, *Chrysobothris* mit 2 Arten: *Chr. affinis* (p. 80 fig. 71 I p. 70), *Anthaxia* mit 8 Arten (p. 80—81), *Coraeus* mit 1 Art, *Agrilus* mit 15 Arten (p. 82—86), *Trachys* mit 5 Arten (p. 86—88), *Aphanisticus* mit 3 Arten (p. 88—89), *Cylindromorphus* mit 1 Art.

1. Jakowleff.

Revision des *Sphenoptera* de la region éthiopienne.
(Hor. ross. 35. p. 279—355).

Eine umfassende Revision, in welcher 92 Arten der Untergattungen *Hoplistura*, *Hoplandrocneme* und *Chrysoblemma* dichotomisch auseinander gesetzt werden (p. 293—317), wobei die Unterscheidung der Untergattung leider fehlt. Es folgten dann ausführliche Beschreibungen der neuen und wenig bekannten Arten, auch aus 2 weiteren Untergattungen *Sphenoptera* i. sp. u. *Tropeopeltis*, die leider auch nicht charakterisirt werden. Eine ganz wesentliche (und ganz überflüssige) Erschwerung des Gebrauches der sonst vorzüglichen Arbeit liegt in der, von der Reihenfolge der Arten in der Tabelle ganz abweichenden Reihenfolge der ausführlichen Beschreibungen.

Die behandelten Arten.

Sphenoptera (i. sp.) *maura* n. sp. (p. 317) Senegal, *variolosa* Kerr. = *antiqua* var. *Sph. (Tropeopeltis) divergens* Kerr.
Sph. (Hoplistura) aemula n. sp. (p. 300, 321) Senegal, *Sph. annexa* n. sp. (p. 300, 322) Senegal, *Sph. attenuata* n. sp. (p. 303, 323) Senegal, *Sph. blanda* n. sp. (p. 309, 325) Kap, *Sph. dispar* Kerr., *Sph. formosa* n. sp. (p. 306, 327) Sierra Leone, *Sph. gravida* n. sp. (p. 303, 329) Kamerun, *Sph. illucens* n. sp. (p. 303, 330) Senegal, *Sph. integrata* n. sp. (p. 305, 332) Kamerun, *Sph. nigripennis* Kerr., *Sph. Orion* n. sp. (p. 308) Dar-es-Salaam, *Sph. ornatifrons* n. sp. (p. 294, 335) Delagoa-Bai, *Sph. remota* n. sp. (p. 304, 336) Sierra Leone, *Sph. scaura* n. sp. (p. 301, 338) Benuë, *Sph. latona* n. sp.

(p. 299, 339) Cabambare, *Sph. solida* n. sp. (p. 298, 340) Süd-Afrika, *Sph. spicula* n. sp. (p. 296, 342) Senegal, *Sph. tumida* n. sp. (p. 306, 343) Sierra Leone, *Sph. valida* n. sp. (p. 310, 344) Kamerun.
Sph. (Hoplandrocneme) adumbrata n. sp. (p. 313, 346) Transvaal, *Sph. denticauda* n. sp. (p. 313, 347) Congo, *Sph. perstriata* Kerr., *Sph. sublaevis* Kerr.
Sph. (Chrysoblemma) rugicollis Kerr., *Sph. smaragdina* n. sp. (p. 316, 352) Sierra Leone, *Sph. aureola* n. sp. (p. 316, 354) Kap.

2. Jakowleff.

Etude sur les *Stenophera* paléarctiques de sous-genre
Deudora B. Jak.

(Hor. ross. 35. p. 561—583).

Eine erneute dichotomische Auseinandersetzung der jetzt 42 Arten, welche die Untergattung *Deudora* bilden. In der Revision des vorhergehenden Jahres waren es erst 30 Arten (Jakowleff 1900, 6). Von den hinzugekommenen 12 Arten sind 7 neu.

Die hinzugekommenen Arten.

Sphenoptera (Deudora) simplex Jak. 1893, *Sph. tenax* n. sp. (p. 563, 577) Transcaucasien, *Sph. Danieli* Jak. 1900, *Sph. manifesta* Jak. 1900, *Sph. improvisa* n. sp. (p. 566, 575) Klein-Asien, *Sph. ambigua* Kl. 1829, *Sph. dives* n. sp. (p. 567, 573) Klein-Asien, *Sph. detrita* n. sp. (p. 568, 572) Transcaucasien, *Sph. captiosa* n. sp. (p. 568, 571) Transcaucasien, *Sph. segregata* Jak. 1900, *Sph. bactriana* n. sp. (p. 569, 576) Bucharei, *Sph. aucta* n. sp. (p. 569) Turkestan.

Einzelbeschreibungen.

Acmaeodera Abeillei n. sp. Pic (Bull. Soc. Ant. 1899 p. 256) Orient. — *A. postfasciata* n. sp. Fairmaire (Rev. Ent. XX. p. 160) Madagascar. — *A. Bowditchii* n. sp. Fall (Tr. Am. Ent. Soc. 27. p. ?), *A. lucis* n. sp. (p. ?¹) Nord-Amerika.

Agrilus siehe Everts pag. 195.

Anthaxia tractata n. nom. Abeille (Bull. Fr. p. 8) für *uniformis* Ab. 1900 nec Macl. — *A. nitidiventris* n. sp. Fairmaire (Rev. Ent. XX p. 160) Madagascar. — Siehe auch Everts pag. 195.

Aphanisticus simplex n. sp. Fairmaire (ibid. 163), *A. impressipennis* n. sp. (p. 164) Madagascar. — Siehe auch Everts pag. 195.

Buprestis margaripicta Mars. = *sanguinea* Fbr. ♂ nach Champion (Tr. ent. Soc. Lond. 1901 p. 379) u. *A. Levillantii* Luc. = *sanguinea* ♀ (p. 379—384 tab. XIII). — Siehe auch Everts pag. 195.

Chalcophora siehe Everts pag. 195.

Chrysoblemma siehe *Sphenoptera* u. Jakowleff oben.

Chrysobothris adusta n. nom. Abeille (Bull. Fr. p. 8) für *Chr. tristis* Ab. 1900 nec Deyr. — Siehe auch Everts pag. 195.

¹) Die Arbeit war dem Ref. leider nicht zugänglich u. bei Sharp sind die pagg. der beiden neuen Arten nicht angegeben.

- Coraeus*, *Cylindromorphus*, *Dicerca* siehe Everts pag. 195. — *Deudora* siehe Jakowleff pag. 196.
- Discoderes corinthius* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 162), *D. simplicifrons* n. sp., *D. deformis* n. sp. (p. 163) Madagascar.
- Entomogaster Neocaris* n. sp. **Fairmaire** (ibid. p. 161), *E. bipustulatus* n. sp. (p. 161), *E. cupriventris* n. sp. (p. 162) Madagascar.
- Hoplandrocneme* siehe Jakowleff pag. 196.
- Hoplistura* siehe *Sphenoptera* u. Jakowleff pag. 195.
- Melobasis interstitialis* n. sp. **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. 25 p. 130) Australien.
- Phaenops*, *Poecilonota* siehe Everts pag. 195.
- Polybothris tetraleuca* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 157), *P. hypocyanea* n. sp., *P. Perrieri* n. sp. (p. 158) Madagascar.
- Pseudianthe* n. gen. *tenebrosa* n. sp. **Fairmaire** (ibid. p. 167) Madagascar.
- Psiloptera alorensis* n. sp. **Théry** (Bull. Fr. p. 108) Insel Alor.
- Ptosima* siehe Everts pag. 195.
- Rethia* n. gen. (bei *Sphenoptera*) **Théry** (Bull. Fr. p. 107), *R. clateroides* n. sp. (p. 107) Congo.
- Sphenoptera glyphoderes* n. nom. **Abeille** (Bull. Fr. p. 8) für *sculpticollis* Ab. 1900 nec Heyd. — *Sph. Zichyi* n. sp. **Csiki** (Zichy II p. 109) Mongolei. — *Sph. cylindracea* Reitt. = *viridiaurea* Kr. nach **Jakowleff** (Rev. ross. I p. 50), *Sph. spectabilis* Kr. 1883 = *Dejeanii* Zoubk. 1829 (p. 52), *Sph. Pelletii* Muls. = *Fairmairei* Mars. = *mesopotamica* Mars. (p. 53), *Sph. adelphina* Th. Afrika u. nicht Caracas (p. 54), *Sph. chrysostoma* Gor. = Pharao C. G. (ibid. p. 108). — *Sph. lia* n. sp. **Jakowleff** (Hor. ross. 35. p. 168) Bucharei, *Sph. egregia* n. sp. (p. 170) Transcaspien, *Sph. Roborowskyi* n. sp. (p. 171) Thibet, *Sph. inermis* Kerr., *Sph. chinensis* Kerr., *Sph. (Hoplistura) Dione* n. sp. (p. 176) Algier, *Sph. (Hoplist.) Kerremansii* n. sp. (p. 178) Madras, *Sph. (Hopl.) Isis* n. sp. (p. 179) Egypten, *Sph. (Chrysoblemma) bifulgida* Reitt., *Sph. amoena* n. sp. (p. 183) Persien. Siehe auch Jakowleff pag. 195 u. pag. 196.
- Stenianthe crassula* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 166) Madagascar.
- Steraspis Argodii* n. sp. **Théry** (Bull. Fr. p. 109) Berberah.
- Sternocera variabilis* Kerr. var. *cyaneicollis* n. var. **Kolbe** (Sitzb. Fr. Berl. p. 81), *St. pulchra* Wat. var. *Goetzeana* n. var. (p. 81), *St. discedens* n. sp. (p. 81) mit var. *nigrescens* n. var., var. *pupurascens* n. var., var. *viridipennis* n. var., var. *fastuosa* n. var. (p. 82), *St. Füllebornii* n. sp. (p. 83) u. *St. frutetorum* n. sp. (p. 84) Nyassaland.
- Stigmodera Pallas* n. sp. **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. 25 p. 22), *St. erubescens* n. sp. (p. 23) u. *St. guttigera* n. sp. (p. 24) Australien.
- Trachys Perrieri* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 164), *Tr. sellata* n. sp., *Tr. brevior* n. sp. (p. 165), *Tr. cribrosa* n. sp., *Tr. micros* n. sp. (p. 166) Madagascar. — Siehe auch Everts pag. 195.
- Tropeopeltis* siehe Jakowleff pag. 195.

Fam. *Eucnemidae*.

Everts 2, Fairmaire 6, Fleutiaux 3, 4, 5, Kempers 1, Kolbe 1, Reitter 5, Scudder 1.

Morphologie.

Kempers schilderte die Flügel von *Throscus dermestoides* (p. 21 tab. II fig. 4) u. *Melasis buprestoides* (p. 21 tab. II fig. 5).

Geographische Verbreitung.

Fleutiaux (5) zählte die von Dr. Harmand in Japan gefundenen Eucnemiden auf.

Palaeontologie.

Scudder (1) beschrieb 1 neuen *Fornax* aus Canada. (Siehe Einzelb.).

Systematik.

Kolbe (1) theilte die Familie (ohne Begründung) in 2 Familien: *Eucnemiden* und *Throsciden*.

Umfassende Arbeiten.

Everts.

Coleoptera neerlandica. II. 1. 1901 p. 90—97. *Throscidae* u. *Eucnemidae*.

Die Familie wird in Fam. *Throscidae* und Fam. *Eucnemidae* getheilt, die erstere mit 2 Gattungen, die letztere mit 3 Tribus und 7 Gattungen.

Die behandelten Gattungen u. Arten.

Throscus mit 6 Arten p. 90—92. — *Drapetes* mit 1 Art.

Cerophytum mit 1 Art. — *C. elateroides* (p. 94 fig. 72 I p. 92). — *Melasis* mit 1 Art. — *Tharops* mit 1 Art. — *Eucnemis* mit 1 Art: *Eu. capucina* (p. 96 fig. 72 II p. 92). — *Dromaeolus* mit 1 Art. — *Dirhagus* mit 1 Art. — *Hypocoelus* mit 1 Art.

Fleutiaux.

Essai d'une Classification des Melasinae.

(Ann. Soc. ent. Tr. 1901 p. 637—664, erschien im Mai 1902).

Nach einer historischen Uebersicht der Literatur (p. 637—644) werden die 5 Unterfamilien dichotomisch charakterisirt, die der Autor als Familie der *Elateridae* zusammengefasst wissen will (p. 644): *Cebrioninae*, *Throscinae*, *Cerophytinae*, *Elaterinae*, *Melasinae*. Sodann werden die Gattungen der letzten Unterfamilie einer dichotomischen Auseinandersetzung unterworfen, wobei die neuen Gattungen ausführlich beschrieben sind. 20 Gattungen sind dem Autor unbekannt geblieben u. nur in Anmerkungen behandelt.

Die neuen Gattungen.

- Pseudodiaeretus* n. nom. (p. 650) für *Diaeretus* Bonv. nec Först.
Chropoecilus n. gen. (p. 652) für *Poecilochrus grossicollis* Bonv.
Pseudoscython n. gen. (p. 656) für *Scython parvulus* Fleut.
Pachyformax n. gen. (p. 657) für *Proformax crassus* Fleut.
Macroscython n. gen. (p. 657) für *Scython gabonensis* Fleut.
Rhagomicrus n. gen. (p. 658) für *Microrhagus meticulosus* Bonv. u. a.
Aruanus n. gen. (p. 662) für *Eumenes chloropterus* Fleut.
Pseudomenes n. nom. (p. 663) für *Eumenes* Bonv. nec Latr.
Fryanus n. gen. (p. 663) für *Compsoenemis Dohertyi* Fleut.

Einzelbeschreibungen.

- Aruanus*, *Chropoecilus* siehe Fleutiaux oben.
Cerophytum, *Dirhagus*, *Dromacolus*, *Eucnemis* siehe Everts pag. 198.
Fornax rufopubens n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 167) u. *F. patruelis* n. sp. (p. 466) Madagascar. — *F. ledensis* n. sp. **Scudder** (Geol. Surv. Canad. II. 1. 1895 p. 39 tab. III fig. 3, 4) fossil in Canada.
Fryanus siehe Fleutiaux oben.
Hylochares Harmandii n. sp. **Fleutiaux** (Bull. Mus. Par. VI p. 360) Japan.
Hypocoelus siehe Everts pag. 198.
Macroscython siehe Fleutiaux oben. — *Melasis* siehe Everts pag. 198.
Microrhagus Lewisii n. sp. **Fleutiaux** (ibid. p. 358) Japan.
Pachyformax siehe Fleutiaux oben.
Proxylopius n. gen. **Fleutiaux** (ibid. p. 360) *Helleri* n. sp. (p. 361) Japan.
Pseudodiaeretus, *Pseudomenes*, *Pseudoscython*, *Rhagomicrus* siehe Fleutiaux oben. — *Tharops* siehe Everts pag. 198.
Throscus dilatatus n. sp. **Reitter** (Wien. ent. Zeit. XX p. 60) Araxestahl, dich. Tab. über 3 Arten.
Xylobius japonensis n. sp. **Fleutiaux** (Bull. Mus. Par. VI p. 359) Japan.

Fam. *Elateridae*.

Buysson 1, Everts 2, Fairmaire 6, Fall 4, Fleutiaux 1, 3, 4, 5, Friedrichs 1, Houlbert 1, Ivanov 1, Kempers 1, Knab 1, Poppius 2, Reitter 4, 11, 32, 33, Reuleaux 1, Schwarz 1—9, Scudder 1, Xambeu 1.

Morphologie und Physiologie.

Everts (2) besprach die Flügelbildung der *Elateriden* im Allgemeinen und bildete die von *Campylus* nach Redtenbacher ab (fig. 75).

Kempers (1) schilderte die Flügel von *Lacon marinus* (p. 22), *Cardiophorus asellus* (p. 22), *Athous haemorrhoidalis* (p. 22), *Agriotes lineatus* (p. 22).

Reuleaux (1) beschrieb eingehend das „Spannwerk“ der *Elateriden*.

Biologie.

Ueber mehrere Arten am unteren Amazonasstrom berichtete **W. Schulz** (Berl. ent. Z. p. 330—331).

Everts (2) besprach die Larven der *Elateriden* im Allgemeinen p. 99—100.

Xambeu (1) beschrieb die Larve von *Limonius minutus* (p. 31).

Geographische Verbreitung.

Fleutiaux (5) zählte die von Dr. Harmand in Japan gesammelten *Elateriden* auf.

Ivanov (1) gab ein Verzeichniss der im Petersburger Gouvernement gefundenen 62 Arten, mit Litteratur- und Fundortangaben.

Poppus (2) führte *Negastrius quadripustulatus* aus Finnland auf.

Palaeontologie.

Scudder (1) beschrieb 2 Arten aus Canada, von denen 1 *Limonius* neu. (Siehe Einzelb.).

Systematik.**Umfassende Arbeiten.****Everts.**

Coleoptera neerlandica. II. 1. p. 97—134. *Elateridae*.

Die Familie wird dichotomisch in 3 Tribus und 20 Gattungen getheilt (p. 100—102).

Die behandelten Gattungen und Arten.

Lacon mit 1 Art. — *Elater* mit 15 Arten (p. 103—107): *E. sanguineus* (p. 104 fig. 73 p. 97). — *Ischnodes* mit 1 Art. — *Megapenthes* mit 1 Art. — *Porthmidius* mit 1 Art. — *Cryptohypnius* mit 1 Art. — *Hypnoidus* mit 6 Arten (p. 109—110). — *Cardiophorus* mit 10 Arten (p. 110—112). — *Paracardiophorus* mit 1 Art. — *Melanotus* mit 4 Arten (p. 112—114). — *Limonius* mit 4 Arten (p. 114—115). — *Pheletes* mit 2 Arten. — *Idolus* mit 1 Art. — *Athous* mit 13 Arten (p. 116—120). — *Ludius* mit 1 Art. — *Corymbites* mit 19 Arten (p. 120—126). — *Sericus* mit 2 Arten. — *Dolopius* mit 1 Art. — *Agriotes* mit 9 Arten (p. 128—131). — *Synaptus* mit 1 Art. — *Adrastus* mit 5 Arten (p. 132—133). — *Campylus* mit 2 Arten.

Fleutiaux.

Note sur le genre *Pachyderes* Latr. et description d'une espèce nouvelle.

(Bull. Soc. ent. Fr. 1901 p. 97).

Eine dichotom. Auseinandersetzung der 8 bekannten Arten, von denen eine neu.

Die behandelten Arten.

Pachyderes minor Cand., *P. ruficollis* Guér., *P. apicalis* Cand., *P. coccineus* Cand.,
P. macrothorax Wied., *P. niger* Cand., *P. bengalensis* Cand., *P. africanus*
 n. sp. (p. 100) Sierra Leone.

Houlbert.

Genera analytiques illustrés de Coléoptères de France.

Elateriens.

(Le Nat. 23. p. 256—?).

Einzelbeschreibungen.

Dichotomische Auseinandersetzung der Gattungen. Dem Ref. nicht zugänglich.

Adlocera Fleutiauxii n. sp. Schwarz (D. ent. Z. p. 311) Congo.

Adiaphorus parallelus n. sp. Schwarz (D. ent. Z. p. 22), *A. gracilis* n. sp. (p. 22)
 Ceylon.

Adrastus siehe Everts pag. 200.

Aeolus trivittatus n. sp. Schwarz (D. ent. Z. p. 323) Madagascar.

Agonischius laterovittatus n. sp. Schwarz (D. ent. Z. p. 37) Ceylon, *A. aequalis*
 (p. 332) u. *A. bifasciatus* n. sp. (p. 332) Sumatra, *A. dispar* n. sp. (p. 333)
 Banguey.

Agriotus siehe Everts p. 200.

Alaus Hornii n. sp. Schwarz (D. ent. Z. p. 19) Ceylon, *A. angusticollis* n. sp.
 (p. 315) Sumatra.

Amychus Stephensiensis n. sp. Schwarz (D. ent. Z. p. 193) Neu-Seeland, *A.*
Schauinslandii n. sp. (p. 194) u. *A. rotundicollis* n. sp. (p. 196) Chatam-Inseln.
Anchastus tongaënsis Cand. u. *A. major* Cand. gehören zu *Psephus* nach Schwarz
 (D. ent. Z. p. 335).

Aphanobius unicolor n. sp. Fleutiaux (Bull. Mus. Par. VI p. 357) Japan.

Asaphes Kirby 1837 collidirt nach Knab (Ent. News XII p. 91) mit *Asaphes*
 Walk. 1834 (*Pteromalidae*), fällt aber vielleicht mit *Hemicrepidius* Germ.
 zusammen.

Athous Martini n. sp. Buysson (Bull. Fr. p. 125) Leukoran, *A. probosus* n. sp.
 (p. 126) Caucasus. — *A. villosus* var. *caucasicus* Buyss. = *A. Rostii* Schw.
 nach Reitter (Wien. ent. Zeit. XX p. 57). — *A. Championis* n. sp. Schwarz
 (D. ent. Z. p. 328) Mexico. — Siehe auch Everts pag. 200.

Campylus, *Corymbitus*, *Cryptohypnus* siehe Everts pag. 200.

Cardiophorus Demaisonis Buyss = *thebaicus* Cand. nach Buysson (Bull. Fr.
 p. 124), *C. nigrotissimus* Buyss. von *megathorax* Fald. verschieden (p. 124),
C. Erichsonis n. nom. (p. 124) für *C. rufipes* Er. nec Goeze (= *vestigialis*
 Er.). — *C. Gaertneri* n. sp. Schwarz (D. ent. Z. p. 16) Thüringen. — *C.*
anulatus n. sp. Schwarz (D. ent. Z. p. 32), *C. subhumeralis* n. sp. (p. 38) u.
C. taprobanensis, *C. differens* n. sp. (p. 254), *C. discolor* n. sp. (p. 254) u. *C.*
interruptus n. sp. (p. 255) Madagascar. — Siehe auch Everts pag. 200.

- Cladocerus* n. nom. **Schwarz** (D. ent. Z. p. 200¹⁾ für *Plastocerus* Cand. nec Lec.
- Corymbites mirabilis* n. sp. **Fall** (Tr. Am. ent. Soc. 27 p. 306), *C. tigrinus* n. sp. (p. 307) Nord-Amerika. — Siehe auch Everts pag. 200.
- Cremnostethus* n. gen. (bei *Melanotus*) *nigricollis* n. sp. **Schwarz** (D. ent. Z. p. 197) Assam, siehe auch *Melanotus telum* Cand.
- Crepidomenus vitticollis* n. sp. **Schwarz** (D. ent. Z. p. 329) Australien.
- Cryptohypnus pulchellus* var. *ripicola* n. var. **Friedrichs** (Allg. Zeit. Ent. VI p. 82), *Cr. sabulicola* Boh. var. *laetus* n. var., var. *contentus* n. var., var. *modestus* n. var., var. *moestus* n. var. (ibid. p. 82). — *Cr. Perrieri* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 169), *Cr. signatipennis* n. sp. (p. 169), *Cr. inconstans* n. sp., *Cr. griseopictus* n. sp. (p. 170) Madagascar. — *Cr. aeneus* n. sp. **Schwarz** (Deut. ent. Z. 1901 p. 30) und *Cr. paucivillus* n. sp. (p. 31) Ceylon, *Cr. variegatus* n. sp. (p. 253 *Hypnoides*) Madagascar. — Everts p. 200.
- Cylindroderus brunneus* n. sp. **Schwarz** (D. ent. Z. p. 334), *C. femoratus* Grm. var. *picipes* n. var. u. *C. inconditus* n. sp. (p. 335) Brasilien.
- Dilobitarsus Perrieri* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 168) Madagascar.
- Diploconus depressus* n. sp. **Schwarz** (D. ent. Z. p. 326) und *D. apicalis* n. sp. (p. 327) Sumatra.
- Dolopius Lewisii* n. sp. **Fleutiaux** (Bull. Mus. Par. VI p. 358) Japan. — Siehe auch Everts pag. 200.
- Elater Koltzei* n. sp. **Reitter** (D. ent. Z. p. 179) Turkestan. — Siehe auch Everts pag. 200.
- Eschatroxus longicollis* n. sp. **Schwarz** (D. ent. Z. p. 325) patria?
- Glyphochilus venustus* n. sp. **Schwarz** (D. ent. Z. p. 319), *Gl. laticollis* n. sp. (p. 320), *Gl. brunnipis* n. sp., *Gl. opaculus* n. sp. (p. 321) und *Gl. ustulatus* n. sp. (p. 322) Australien.
- Glyphonyx gregarius* n. sp. **Schwarz** (D. ent. Z. p. 334) Sumatra.
- Hemiolimerus inconditus* n. sp. **Schwarz** (D. ent. Z. p. 330) Sumatra.
- Heteroderes ancoralis* n. sp. **Schwarz** (D. ent. Z. p. 24) u. *H. spinosulus* n. sp. (p. 25) Ceylon.
- Hypnoidus* siehe *Cryptohypnus* u. Everts pag. 200.
- Idolus*, *Ischnodes* siehe Everts pag. 200.
- Ischiodontus* von *Psephus* nur geographisch zu trennen nach **Schwarz** (D. ent. Z. p. 335).
- Lacon lineatus* n. sp. **Schwarz** (D. ent. Z. p. 18) Ceylon, *L. alternatus* n. sp. (p. 311) Neu-Guinea. — Siehe auch Everts pag. 200.
- Limonium impunctus* n. sp. **Scudder** (Geol. Surv. Canad. II. 1. 1895 p. 37 tab. II fig. 3) fossil in Canada. — Siehe auch Everts pag. 200.
- Lobotarsus depressus* n. sp. **Schwarz** (D. ent. Z. p. 312) Congo, *L. crenatus* n. sp. (p. 313) Kamerun.
- Ludius (Prosternon) anatolicus* n. sp. **Reitter** (Wien. ent. Z. XX p. 100) Anatolien. — *L. (Selatosomus) impressoides* n. sp. **Reitter** (D. ent. Z. p. 76) Bucharei.

¹⁾ Der neue Name ist überflüssig, da die Candèze'sche Gattung schon seit mehr als 10 Jahren ganz legitim in *Ceroplastus* ungetauft ist. Vergl. Fauna balt. ed. II u. transsylv. Gatt. p. 42.

- L. tumidicollis* n. sp. **Schwarz** (D. ent. Z. p. 330) Madras, *L. nigritarsis* n. sp. (p. 331) Java. — Siehe auch **Everts** pag. 200.
- Lycoreus orbiculatus* n. sp. **Schwarz** (D. ent. Z. p. 314) Madagascar. — *L. corpulentus* Cand. ♂ beschrieb **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 171).
- Megapenthes* siehe **Everts** pag. 200.
- Melanotus Candezei* n. sp. **Schwarz** (D. ent. Z. p. 327) Java. Siehe auch *Cremnostethus* u. **Everts** pag. 200.
- Melanoxanthus Hornii* n. sp. **Schwarz** (D. ent. Z. p. 26), *M. trivittatus* n. sp. (p. 27), *M. monticola* n. sp., *M. tenellus* n. sp. (p. 28) u. *M. tenuiculus* n. sp. (p. 29) Ceylon, *M. vitticollis* n. sp. (p. 323) u. *M. niger* n. sp. (p. 324) Sumatra. — *M. Fleutiauxii* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 172) Madagascar.
- Metriaulacus* n. gen. (bei *Melanotus*) *nigrolaterus* n. sp. **Schwarz** (D. ent. Z. p. 198) Borneo.
- Monocrepidius arenicola* n. sp. **Schwarz** (D. ent. Z. p. 23) Ceylon.
- Morostoma Cottae* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 172) Madagascar.
- Octinodes* Cand. = *Plastocerus* Lec. nach **Schwarz** (D. ent. Z. p. 200).
- Olophoeus cinnamomeus* n. sp. **Schwarz** (D. ent. Z. p. 315) Transvaal.
- Pachyderes* siehe **Fleutiaux** pag. 201.
- Paracardiophorus arenosus* n. sp. **Schwarz** (D. ent. Z. p. 35), *P. arenicola* n. sp. (p. 36) u. *P. arenarius* n. sp. (p. 37) Ceylon. — Siehe auch **Everts** pag. 200.
- Paracosmesus* n. nom. **Schwarz** (D. ent. Z. p. 38) für *Pomachilioides* Schw. 1900 nec Cand.
- Pheletes* siehe **Everts** pag. 200.
- Plastocerus ruficollis* n. sp. **Schwarz** (D. ent. Z. p. 200) mit var. *rufipennis* n. var. (p. 200, 201) Ecuador, vergl. auch *Cladocerus*.
- Pomachilioides dimidiatus* n. sp. **Schwarz** (D. ent. Z. p. 326) Sumatra, siehe auch *Paracosmesus*. — *Porthmidius* siehe **Everts** pag. 200.
- Psephus semipunctatus* n. sp. **Schwarz** (D. ent. Z. p. 316), *Ps. fusiformis* n. sp. (p. 317) u. *Ps. puerilis* n. sp. (p. 318) Kamerun, *Ps. rufipes* n. sp. (p. 351) u. *Ps. (Campylocephus) euainis* n. sp. (p. 352) Tonga-tabu. Vergl. auch *Anchastus* u. *Ischiodontus*
- Sephilus minor* n. sp. **Schwarz** (D. ent. Z. p. 319) Sumatra.
- Silesis Harmandii* n. sp. **Fleutiaux** (Bull. Mus. Par. VI p. 358) Japan.
- Sericus* siehe **Everts** pag. 200.
- Sphenomerus rufescens* n. sp. **Schwarz** (D. ent. Z. p. 20), *Sph. angustus* n. sp. (p. 21) Ceylon.
- Stichotomus testaceus* n. sp. **Schwarz** (D. ent. Z. p. 336) u. *St. fusiformis* n. sp. (p. 336) Australien.
- Synaptus* siehe **Everts** pag. 200.
- Tetralobus parallelus* n. sp. **Schwarz** (D. ent. Z. p. 315) Nossi-Bé.

Fam. Cebriionidae.

Fleutiaux 3, Houlbert 1, Kolbe 1.

Fleutiaux (3) charakterisierte die Familie als Unterfamilie der *Eläteriden* (Ann. Fr. p. 644).

Houlbert (1) behandelte die Familie kurz. Dem Ref. nicht zugänglich.

Kolbe (1) stellte die Familie zu den *Sternoxia*.

Fam. *Rhipiceridae*.

Fairmaire 6, Kolbe 1.

Systematik.

Kolbe (1) stellte die Familie neben die *Dascylliden* in die Abth. *Dascylloidea*. Vergl. *Dascillidae*.

Einzelbeschreibungen.

Callirhipis hovana n. sp. Fairmaire (Rev. Ent. p. 173) Madagascar.

Hovactyla n. gen. Fairmaire (ibid. p. 174) *dermestoides* n. sp. (p. 175) Madagascar.

Stenactyla basicornis n. sp. Fairmaire (ibid. p. 174) Madagascar.

Fam. *Dascillidae*.

Albisson 1, Everts 2, Houlbert 1, Kempers 1, Kolbe, Peyerimhoff 4, Pic 29 a, Waterhouse 1.

Morphologie.

Everts (2) besprach die Flügel von *Dascillus* (p. 134—135) und der *Cyphoniden* (p. 136—137) und bildete die von *Prionocyphon serricornis* ab (fig. 77 III).

Kempers (1) schilderte die Flügel von *Dascillus cervinus* (p. 23 tab. II fig. 7), *Helodes pallida* (p. 24), *Scirtes hemisphaericus* (p. 24 fig. 8), *Microcara testacea* (p. 24), *Cyphon variabilis* u. *contractus* (p. 24).

Biologie.

Albisson (1) u. **Peyerimhoff** (4) behandelten das Larvenleben von *Hydrocyphon deflexicollis*.

Everts besprach die Larven von *Dascillus* (p. 136) und die der *Cyphoniden* (p. 137).

Systematik.

Kolbe (1) vereinigte die Familie mit den *Psepheniden*, *Heteroceriden*, *Dermestiden* und *Rhipiceriden* zu seiner Abtheilung *Dascylloidea*.

Umfassende Arbeiten.

Everts.

Coleoptera neerlandica.

Die Familie wird in 2 Familien getheilt, *Dascillidae* u. *Cyphonidae*, und die letztere in 2 Tribus und 7 Gattungen.

Die behandelten Gattungen u. Arten.

Dascillus mit 1 Art: *D. cervinus* (p. 136 fig. 76).

Helodes mit 2 Arten: *H. minuta* (p. 139 fig. 77 I, II). — *Microcara* mit 1 Art.
— *Cyphon* mit 5 Arten (p. 140–141). — *Hydrocyphon* mit 1 Art. — *Prionocyphon* mit 1 Art: *Pr. serricornis* (p. 142 fig. 77 I p. 136). — *Scirtes* mit 2 Arten.

Houlbert.

Genera analytiques illustrés des Coléoptères de France.

Dascillides.

(Le Nat. 23. p. 136—?)

Dichotomische Tabelle der Gattungen. Dem Ref. nicht zugänglich.

Einzelbeschreibungen.

Cyphon, *Dascillus* siehe Everts oben.

Exagontus n. gen. **Waterhouse** (Tr. Linn. Soc. Lond. Zool. (2) VIII p. 74 2891 p. 74), *E. denticollis* n. sp. (p. 75) Guiana.

Helodes marginatus Fbr. var. *Delagrangi* n. var. u. var. *pyrenaicus* n. var. **Pic** Feuille. Nat. 1898 p. 26), *H. peninsularis* n. sp. (p. 27). *H. Chobautii* Ab. var. *algerinus* n. var. p. 27). — Siehe auch Everts oben.

Hydrocyphon, *Microcara*, *Prionocyphon*, *Scirtes* siehe Everts oben.

Fam. *Malacodermata*.

Bedel 1, Bedel u. Bourgeois 1, Bourgeois 2, 3, 4, Buysson 2, Everts 2, Fairmaire 6, Ghigi 1, Gorham 3, Hubbard 1, Kempers 1, Kolbe 1, 6, Lea 2, Marmottan 1, Meijere 1, Morley 3, Olivier 1, Pic 2, 13a, 16, 24a, 29a, 29b, 30, 34, 35, 38, 45a, 48, 48a, 48b, Reitter 11, Reuter 1, Shelford 1, Uhagon 1, Xamheu 1.

Morphologie u. Physiologie.

Meijere schilderte die Klauen nebst ihren Anhängen bei *Dasytes plumbeus* (p. 431 tab. 32 fig. 47) u. *Psilothrix nobilis* (fig. 48).

Everts behandelte die Flügel der *Lampyriden* (p. 144), *Lyciden* (p. 148), *Telephoriden* (p. 153) und der *Melyriden* (p. 178).

Kempers (1) schilderte die Flügel von *Lamprorhiza splendidula* (p. 25 tab. II fig. 9), *Lygistopterus sanguineus* L. (p. 25 fig. 10), *Drilus flavescens* (p. 26 tab. III fig. 11), *Cantharis livida* (p. 26), *Rhagonycha atru* (p. 26 fig. 12), *Malthinus fasciatus* (p. 26), *Malachius bipustulatus* (p. 27 fig. 13), *Dasytes coeruleus* (p. 27), *Danaecaea pallipes* (p. 28 fig. 14).

Langley u. Very (1) handelten über das Licht der *Lampyriden*.

Biologie.

Everts (2) behandelte die Larven der *Lampyriden* (p. 145), der *Lyciden* (p. 149), der *Telephoriden* (p. 154) und der *Melyriden*

(p. 179) im Allgemeinen und die von *Lampyris noctiluca* (p. 144 fig. 78), *Drilus* (p. 156—157 fig. 82) im Speciellen.

Reuter (1) berichtete über einen Larven-Regen auf eine schneebedeckte Wiese, wobei es sich vielleicht um *Cantharis*-Larven handelte.

Xamheu (1) beschrieb das Ei, die Larve u. die Puppe von *Danacaea Reyi* (p. 7) u. die Larve von *Malacogaster Passerinii*.

Morley (3) schilderte die Copula von *Lampyris noctiluca* (p. 226).

Shelford (1) berichtete über *Lyciden*-Larven in Borneo.

Ghigi (1) behandelte die Larve von *Luciola italica*.

Buysson (2) berichtete über die copula von *Phosphaenus hemipterus*.

Systematik.

Kolbe (1) zerlegte die Familie in 5 Familien: *Driliden*, *Lampyriden*, *Lyciden*, *Telephoriden* u. *Melyriden*, von denen die 4 ersten als Abth. *Malacodermata* vereinigt bleiben, während die letzte mit den *Cleriden* die Abth. *Trichodermata* bildet.

Umfassende Arbeiten.

Everts.

Coleoptera Neerlandica.

Die Fam. wird hier in 4 gesonderten Familien abgehandelt: *Lampyridae*, *Lycidae*, *Telephoridae* u. *Melyridae*, wobei nur die letztgenannte in 4 Unterfamilien geteilt ist. Im Ganzen sind 33 Gattungen unterschieden.

Die behandelten Gattungen u. Arten.

Lampyris mit 1 Art, *Lampyrhiza* mit 1 Art, *Phosphaenus* Lap. mit 1 Art.

Homalidus mit 1 Art, *Lygistoris* mit 1 Art: *L. sanguineus* (fig. 79 II), *Dictyopterus* mit 5 Arten: *D. Aurora* (fig. 79 I).

Drilus mit 2 Arten, *Podabrus* mit 1 Art, *Telephorus* mit 24 Arten: *T. rusticus* (fig. 81 I u. II), *Absidia* mit 1 Art, *Rhagonycha* mit 10 Arten: *Rh. fulva* (fig. 81 III), *Pygidia* mit 1 Art, *Silis* mit 2 Arten, *Malthinus* mit 7 Arten: *M. flaveolus* (fig. 83 I), *Malthodes* mit 14 Arten: *M. mysticus* (fig. 83 II), *Maltharchus* mit 3 Arten.

Hapalochrus mit 1 Art, *Malachius* mit 7 Arten: *M. aeneus* (fig. 84 I), *Axinotarsus* mit 3 Arten, *Ebaeus* mit 3 Arten, *Sphinginus* mit 1 Art, *Anthocomus* mit 3 Arten, *Ceraphelus* mit 1 Art, *Hypebaeus* mit 1 Art, *Charopus* mit 2 Arten, *Troglops* mit 2 Arten, *Haplocnemus* mit 4 Arten, *Trichocele* mit 1 Art, *Dasytes* mit 8 Arten, *Psilothrix* mit 1 Art, *Dolichosoma* mit 1 Art, *Danacaea* mit 2 Arten, *Phloeophilus* mit 1 Art.

Pic.

Synopsis des *Euanoma* Reitt. et *Pseudeuanoma* Pic.
(Ech. 17. p. 74—75).

Eine dichotomische Auseinandersetzung von 6 Arten, von denen die Angehörigen der Gattung *Pseudeuanoma* alle erst in diesem

Jahre beschrieben wurden. Nur über *Pseudeuanoma obscura* Pic bleibt man im Dunkeln wann und wo sie beschrieben worden ist; denn neu soll in diesem Artikel nur die *Ps. subimpressa* sein.

Die behandelten Arten.

Euanoma Starkii Reitt. Caucasus.

Pseudeuanoma Reitteri Pic 1901 Griechenland, *Ps. obscura* Pic Smyrna, *Ps. subimpressa* n. sp. (p. 74) Olympia, *Ps. jonica* Pic 1901 Zante, *Ps. semiobscura* Pic (n. sp.?) Cephalonien.

Einzelbeschreibungen.

Absidia siehe Everts pag. 206.

Anthocomus felix n. sp. **Gorham** (Ann. Mus. Nat. Hist. 1901. VII. p. 357) Mashonaland. — *A. mesopotamicus* n. sp. (?) **Pic** (Ech. 17 p. 10) Bagdad, *infasciatus* n. sp. (p. 18) Anatlien. — Siehe auch Everts pag. 206.

Apalochrus micans n. sp. **Fairmaire** (Rev. ent. XX p. 177), *A. Perrieri* n. sp. (p. 178) Madagascar. — *A. mashunus* n. sp. **Gorham** (Ann. Mag. Nat. Hist. 1901. VII. p. 359) u. *A. aerosus* n. sp. (p. 359 *Hapalochrus*) Mashonaland. — Siehe auch Everts pag. 206.

Astylus rubrithorax n. sp. **Pic** (Ech. 17. p. 93) Brasilien.

Attalus ridens n. sp. **Gorham** (Ann. Mag. Nat. Hist. 1901. VII p. 356) und *A. albofasciatus* n. sp. (p. 356) Natal, *A. lugens* n. sp. (p. 357) Mashonaland. — *A. Elzeari* n. nom. **Uhagon** (Bol. Soc. esp. I p. 360) für *A. Abeillei* Uh. 1901 nec **Pic** 1900.

Axinotarsus siehe Everts pag. 206.

Balanophorus megalops n. sp. **Lea** (Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 26. p. 483) Australien.

Cantharis talyschensis n. sp. **Pic** (Bull. Soc. zool. 1900 p. 182) Talysch. — *C. Morfinii* n. sp. **Pic** (Ech. 17. p. 25) Libanon. — Siehe auch *Telephorus*.

Cantires Bourgeoisii n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. p. 175) Madagascar.

Carphurus rhytideres n. sp. **Lea** (Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 26. p. 481) und *C. invenustus* n. sp. (p. 482) Australien. — *Cerapheles* siehe Everts pag. 206.

Chalicornus formicarius n. sp. **Gorham** (Ann. Mag. Nat. Hist. 1901. VII. p. 358) Natal.

Charopus siehe Everts pag. 206.

Cyrtosus romaniensis n. sp. **Pic** (Ech. 17. p. 18) Rumänien.

Danaecaea Sequentis n. sp. **Reitter** (Wien. ent. Zeit. XX p. 100) Anatolien. — *D. subelongata* n. sp. **Pic** (Ech. 17. p. 10) Tunis, *D. tokatensis* n. sp. (p. 89) Tokat, *D. tibialis* Schl. var. *cephalonica* n. var. (p. 89) Cephalonien. — *D. mecheriensis* var. *nigrofemorata* n. var. **Pic** (Bull. Soc. Aut. 1898 p. 118), *D. marginata* Küst. var. *maculipennis* (ibid. 1899 p. 207). — *D. Lysholmii* n. sp. (ibid. XIII. 1900 p. 27) Jericho. — Siehe auch Everts pag. 206.

Dasytes siehe Everts pag. 206.

Dictyopterus, *Dolichosoma* siehe Everts pag. 206.

Drilus obscuricornis n. sp. **Pic** (Bull. Soc. Aut. 1899 p. 205). — Siehe auch Everts pag. 206.

- Ebaeus hovanus* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. p. 177) Madagascar. — Siehe auch Everts pag. 206.
- Euanoma* siehe Pic pag. 207.
- Haplocnemus (Ischnopalpus) griseopubescens* n. sp. **Pic** (Bull. Soc. Ant. p. 259), *H. (Diplambe) Peyronis* n. sp. (p. 259). — *H. libanicus* n. sp. **Pic** (Ech. 17. p. 9) Libanon, *H. smyrnensis* n. sp. (p. 18) Smyrna. — Siehe auch Everts pag. 206.
- Hedybius albipennis* n. sp. **Gorham** (Ann. Mag. Nat. Hist. 1901 p. 360).
- Homalisus* siehe Everts pag. 206.
- Hypebaeus inapicalis* n. sp. **Pic** (Bull. Soc. Ant. 1899 p. 205), *H. (Allogynes) obscuripes* n. sp. (p. 257). — Siehe auch Everts pag. 206.
- Laius politus* berichtigte **Fairmaire** (Rev. Ent. p. 176).
- Lampyrus noctiluca* var. *minor* n. var. **Olivier** (Misc. ent. IX. p. 129) Frankreich u. var. *parvicollis* n. var. (p. 129) Italien. — Siehe auch Everts pag. 206.
- Lampyrorhiza, Lygistopterus* siehe Everts pag. 206.
- Lycus (Acantholycus) elegans* Murr. var. *posticalis* n. var. **Bourgeois** (Ann. Fr. p. 35) Congo, *L. Prometheus* n. sp. (p. 35) Kap, *L. (Lopholycus Lesnei* n. sp. p. 37) Angola, *L. (i. sp.) inornatus* n. sp. (p. 41) Kap, *L. (Merolycus) Bouvieri* n. sp. (p. 44) Congo, *L. Gestronis* ♂ (p. 48).
- Malachius spinosus* Er. bei Paris gef. v. **Marmottan** (Bull. Fr. p. 174), ist nach **Bedel** (ibid. p. 318) nicht diese Art, sondern *M. vulneratus* Ab. 1900. — *M. immaculithorax* n. sp. **Pic** (Feuill. Nat. 1898 p. 27¹), *M. ensiculus* Ab. var. *Delagrangi* n. var. (p. 28). — *M. abdominalis* Fbr. var. *mozabitus* n. var. **Pic** (Misc. ent. 1898 p. 97). — *M. flammeus* Ab. var. *flammeithorax* n. var. u. var. *Theresae* n. var. **Pic** (Bull. Soc. Aut. 1899 p. 257), *M. gethsemanensis* Ab. var. *rubidiformis* n. var. (p. 258). — Siehe auch Everts pag. 206.
- Malchinus Rostii* n. sp. **Pic** (Bull. Soc. Zool. p. 184) Caucasus. — *M. subelongatus* n. sp. **Pic** (Ech. 17 p. 50) Samos. — *M. carinatus* n. sp. **Pic** (Bull. Autun XIV p. 34) Smyrna.
- Maltharchus* siehe Everts pag. 206.
- Malthinus Vaucheri* n. sp. **Pic** (Bull. Fr. p. 111) Marocco, *M. grandiceps* n. sp. (p. 112) Algier, *M. tunisens* Fairm. scheint mit *M. nigribuccis* Mars. nahe verwandt (p. 112). — *M. gratiosus* n. sp. **Pic** (Ech. 17 p. 51), *M. diversithorax* n. sp. u. *M. jonicus* n. sp. (p. 51) Griechenland, *M. seriepunctatus* var. *distinctipes* n. var. (p. 25) Frankreich, *M. maculithorax* Pic var. *lineatus* n. var. (p. 25) Tanger, *M. glabricollis* Ksw. var. *corcyrcus* n. var. (p. 51) Corfu u. var. *rufescens* n. var. (p. 51) Cephalonien, *M. balteatus* var. *Krüperi* n. var. (p. 51) Athen, *M. fasciatus* var. *sabaudus* n. var. (p. 80) Savoiën. — *M. maculithorax* n. sp. **Pic** (Feuill. Nat. 1898 p. 28). — *M. ruficeps* n. sp. **Pic** (Ann. Belg. 1899 p. 373). — *M. turcicus* n. sp. **Pic** (Bull. Soc. Aut. 1899 p. 206), *M. seriepunctatus* Ksw. var. *pallidithorax* n. var. (p. 207). — *M. persicus* n. sp. **Pic** (Bull. Autun XIV p. 34) Persien. — *M. hovanus* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. p. 176) Madagascar. — Siehe auch Everts pag. 206.

¹) Der im Bericht pro 1898 p. 266 aufgeführte *M. maculithorax* ist zu streichen.

- Malthodes batillifer* n. sp. **Bourgeois** (Bull. Fr. p. 143) Alger. Siehe auch *Podistrina*. — *M. latirufus* n. sp. **Pic** (Ech. 17 p. 17) Tunis, *M. distinctus* n. sp. (p. 17) Alger, *M. Henrici* n. sp. (p. 17) Tunis, *M. oranensis* n. sp. (p. 18) Oran. — *M. mersinensis* n. sp. **Pic** (Bull. Autun XIV p. 34) Messina, *M. Delagrangi* n. sp., *M. palaestinus* n. sp. (p. 36), *M. akbesianus* n. sp. *M. distinctithorax* n. sp. (p. 36) Syrien. — Siehe auch Everts pag. 206.
- Mastilius* n. gen. (bei *Pelecophorus*) **Fairmaire** (Rev. Ent. p. 179) *croceipennis* n. sp. (p. 180) Madagascar.
- Mastinocerus opacus* ♂ besprach **Hubbard** (Pr. ent. Soc. Wash. IV p. 348).
- Mesodasytes pallidohirtus* n. sp. **Pic** (Bull. Soc. Aut. 1899 p. 258).
- Microjulistus Lysholmii* var. *abdominalis* u. *nigripennis* n. var. **Pic** (Feuill. Nat. 1899 p. 171), *A. Wegeneri* var. *obscurus* n. var. (p. 170).
- Neocarphurus basizonis* n. sp. **Lea** (Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 26 p. 483) Australien.
- Phaeopterus graecus* n. sp. **Pic** (Ech. 17 p. 49) Griechenland.
- Phloeophilus*, *Podabrus* siehe Everts pag. 206.
- Podistrina Villardii* Bourg., *Chobautii* Bourg. u. *Peyerinhoffii* Bourg. sind ungeflügelte Varietäten des ♂ von *Malthodes trifurcatus* Kiesw. nach **Bourgeois** (Bull. Fr. p. 268), dichot. Tab. der var. (p. 270—271). — *P. impennis* n. sp. **Pic** (Ech. 17 p. 35) Tunis, *P. opaciceps* n. sp. u. *P. Ludwigii* n. sp. (p. 50) Griechenland. — *P. Normandii* besprach **Pic** (Feuill. j. Nat. 31. p. 144) Liste der Arten (p. 104—106).
- Pseudeuanoma* n. gen. *obscura* n. sp. **Pic** (Bull. Autun XIV 1901 p. 33) Smyrna. — *Ps. Reiteri* n. sp. u. *jonica* n. sp. **Pic** (Ech. 17 p. 49) Griechenland. — Siehe auch **Pic** pag. 207.
- Pseudozygia Argodii* n. sp. **Pic** (Ech. 17 p. 26) Somaliland.
- Psilothrix nitidifrons* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. p. 179) Madagascar. — Siehe auch Everts pag. 206.
- Pygidia Theresae* n. sp. **Pic** (Ech. 17 p. 50) Corfu, *P. graeca* n. sp. (p. 66) Olympia, *P. laeta* var. *semiobscura* (p. 66) Genua. — Siehe auch Everts pag. 206.
- Rhagonycha* (*Spartiolepta* n. subg.) **Bedel** u. **Bourgeois** (Bull. Fr. p. 177) für *Telephorus geniculatus* Luc. u. *Rh. Marseullii* n. nom. für *Pygidia geniculata* Mars. nec Luc. (p. 177). — *Rh. Rostii* n. sp. **Pic** (Bull. Soc. Zool. p. 183), *Rh. abchastica* n. sp. (p. 183), *Rh. kubanensis* n. sp. (p. 184) u. *Rh. obscurior* n. sp. (p. 184) Caucasus. — *Rh. (Armidia) jonica* n. sp. **Pic** (Ech. 17 p. 50), *Rh. corcyrea* n. sp. u. *Rh. Mauricei* n. sp. (p. 50) Griechenland, *Rh. libanicola* n. sp. (p. 17) Libanon, *Rh. limbipennis* var. *Fedjensis* n. var. (p. 25), Tunis, *Rh. cruentata* Reiche var. *brumanensis* n. var. (p. 57) Libanon, *Rh. balcanica* n. sp. (p. 57) Balkan. — Siehe auch Everts pag. 206.
- Silis incisicollis* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. p. 176) Madagascar. — Siehe auch Everts pag. 206.
- Spartiolepta* siehe *Rhagonycha*.
- Sphinginus corcyreus* n. sp. **Pic** (Ech. 17 p. 66) Corfu. — Siehe auch Everts pag. 206.
- Telephorus teter* n. sp. **Gorham** (Ann. Mag. Nat. Hist. 1901. VII. p. 351) Natal. — *T. Johannis* n. sp. **Kolbe** (Berl. ent. Z. 1901 p. 478 tab. VII fig. 2) Columbien. — Siehe auch Everts pag. 206.

Thonalmus Chevrolatii n. nom. **Bourgeois** (Ann. Fr. p. 50) für *Th. bicolor* Chev.
nec L.

Trichoceble, *Troglops* siehe Everts pag. 206.

Xamerpus Perrieri n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 180), *X. distinctus* n. sp.
(p. 180) Madagascar.

Zygia discoidalis Frm. var. *bimaculata* n. var. **Pic** (Ech. 17 p. 93) Obock.

Fam. Cleridae.

Blackburn 2, Everts 1, Gorham 3, Kempers 1, Kolbe 1, Lea 2,
Pic 24a, 30, Sahlburg 7, Schenkling 1, 5.

Morphologie.

Kempers (1) schilderte die Flügel von *Tillus elongatus* (p. 29),
Opilo domesticus (p. 29), *Clerus formicarius* (p. 29), *Trichodes apiarius*
(p. 29), *Corynetes coeruleus* (p. 29 tab. III fig. 16).

Geographisches.

Sahlburg führte *Necrobia rufipes* aus Finnland auf.

Systematik.

Kolbe (1) theilte die Familie in 2 Familien: *Corynetiden* und
Cleriden, die er zusammen mit den *Melyriden* zur Abth. *Tricho-*
dermata vereinigte.

Umfassende Arbeiten.

Everts.

Coleoptera Nerlandica. 56. Fam. Cleridae.
(p. 199—208).

Die Familie wird eingehend behandelt und dichotomisch in
2 Unterfamilien, mit je 2 Tribus, getheilt p. 200.

Die behandelten Gattungen.

Tillus mit 2 Arten: *T. elongatus* (fig. 81 II), *Opilo* mit 4 Arten: *O. mollis* (fig. 86 I),
Clerus mit 1 Art, *Thanasimus* mit 2 Arten, *Allonyx* mit 1 Art, *Trichodes*
mit 2 Arten, *Orthopleura* mit 1 Art, *Corynetes* mit 1 Art, *Necrobia* mit
4 Arten, *Opetiopalpus* mit 1 Art, *Laricobius* mit 1 Art.

Pic.

Les *Thanasimus* gallo-rhenans.
(Rev. Ent. XX p. 248—250).

Eine dichotomische Auseinandersetzung des *Clerus rufipes* u.
Cl. formicarius mit je 3 Varietäten.

Die behandelten Arten u. Varietäten.

Clerus rufipes Brahm mit var. *austriacus* Reitt., var. *femoralis* Zett. (= pectoralis Fm. = *substriatus* Heyd.) u. var. *nigricollis* Seidl., *Cl. formicarius* L. mit var. *semifasciatus* Fleisch., var. *brevicollis* Spin. u. var. *laetipes* Reitt. (= *hilaris* Buys.).

Einzelbeschreibungen.

Allonyx, Corynetes, Clerus siehe Everts pag. 210.

Callimerus Grandjeanii n. sp. **Schenkling** (Ann. Belg. 45 p. 104) u. *C. scutellaris* n. sp. (p. 105) Himalaja. — *C. macer* n. sp. **Schenkling** (Not. Leyd. Mus. 23. p. 125) Java.

Elasmocerus picticollis n. sp. **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. 25. p. 25) Victoria.

Graptoclerus n. gen. **Gorham** (Ann. Mag. Nat. Hist. VII p. 352) *signatus* n. sp. (p. 353) Mashonaland, *Gr. quadripunctatus* n. sp. (p. 353) Natal, hierher auch *Clerus equestris* Boh. (p. 353).

Laricobius, Necrobia siehe Everts pag. 210.

Lemidia obliquefasciata Gorh. nebst 8 Farbenvariationen behandelte **Lea** (Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 26. p. 484).

Ommadius caledonicus Montr. beschrieb **Schenkling** (Ann. Belg. 45 p. 107).

Opetiopalpus defunctorum Walt. var. *obscuripes* n. var. **Pic** (Misc. ent. 1898 p. 98).

— *O. caffrarius* n. sp. **Gorham** (Ann. Mag. Nat. Hist. 1901. VII p. 355) Mashonaland. — Siehe auch Everts p. 210.

Opilo congruus Newm. var. *abdominalis* n. var. **Schenkling** (Ann. Belg. 45. p. 106). — *O. albonotatus* **Pic** (Ech. 17 p. 10) Bagdad. — Siehe Everts p. 210.

Orthopleura siehe Everts pag. 210.

Orthrius striatopunctatus n. sp. mit var. *bimaculatus* n. var. **Schenkling** (Ann. Belg. 45 p. 106) Bengalen. — *O. angusticollis* **Schenkling** (Not. Leyd. Mus. 23. p. 126) Java.

Pelonium defletum n. sp. **Schenkling** (Not. Leyd. Mus. 23. p. 129) Sumatra.

Phaeocyclotomus scaber n. sp. **Schenkling** (Not. Leyd. Mus. 23. p. 128) Java.

Phlogistus funestus n. sp. **Schenkling** (Ann. Belg. 45 p. 107) Australien.

Prosymnus villosus n. sp. **Gorham** (Ann. Mag. Nat. Hist. 1901. VII. p. 354) Mashonaland.

Strotocera n. gen. **Schenkling** (Not. Leyd. Mus. 23. p. 123), *Str. grandis* n. sp. (p. 124) Java.

Thanasimus siehe **Pic** oben u. Everts pag. 210.

Thaneroclerus nanus n. sp. **Schenkling** Ann. Belg. 44. p. 106) Sumatra.

Tillicera soror n. sp. **Schenkling** (Not. Leyd. Mus. 23. p. 127) Brit. Bhutan.

Tillus siehe Everts pag. 210.

Fam. *Lymexyloidea*.

Everts 2, Fairmaire 6, Kempers 1, Kolbe 1.

Hylecoetus Perrieri n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. p. 181) Madagascar, *H. benitonus* n. sp. (p. 181) Congo.

Morphologie.

Kempers (1) schilderte die Flügel von *Hylecoetus dermestoides* (p. 28 tab. III fig. 15).

Systematik.

Kolbe (1) stellte die Familie zwischen seine neuen Abth. *Amphibola* (siehe *Parnidae*) und *Bostrychoidea*.

Umfassende Arbeiten.

Everts.

Coleoptera Neerlandica, 55. Fam. *Lymexylonidae*.

(p. 196—199).

Die Familie ist zwischen die *Melyriden* und *Cleriden* gestellt.

Die behandelten Arten.

Hylecoetus mit 2 Arten: *H. dermestoides* (fig. 85 I, II), *Lymexylon* mit 1 Art.

Fam. Bostrychidae.

Beare 1, Everts 1, Kempers 1, Kolbe 1, Lesne 2, 5—9.

Morphologie.

Lesne (6, 9) berichtete über periodische Pöcilandrie bei Bostrychiden.

Kempers (1) schilderte die Flügel von *Apate capucina* (p. 29 tab. III fig. 17).

Geographische Verbreitung.

Lesne (7) berichtete über Sammelresultate in Japan u. (8) in Burma.

Systematik.

Kolbe (1) theilte (ohne Begründung) die Familie in 2 Familien: *Psoiden* und *Bostrychiden*.

Umfassende Arbeiten.

Everts.

Coleoptera Neerlandica, 57. Fam. *Apatidae*.

(p. 209—213).

Die Familie, die hier ohne Motivirung „*Apatidae*“ genannt wird, ist dichotomisch in 2 Tribus und 7 Gattungen getheilt (p. 209—210).

Die behandelten Gattungen.

Dinoderus mit 1 Art, *Rhizopertha* mit 1 Art, *Stephanopachys* mit 2 Arten, *Apate* mit 1 Art: *A. capucina* (fig. 87), *Lichenophanes* mit 1 Art, *Bostrychulus* mit 1 Art, *Xylopertha* mit 1 Art.

Lesne.

Synopsis des *Bostrychides* paléarctiques.

(Ab. XXX p. 73—104, tab. I u. II).

Ein sehr dankenswerther Auszug der paläarktischen Arten aus den dichotomischen Tabellen der grossen Monographie des Autors, der so weit geht, als diese gefördert ist, so dass nur die *Apatini* noch fehlen. Zwei ausgezeichnete Tafeln erläutern die Beschreibungen aufs Beste.

Die behandelten Gattungen u. Arten.

- Psoa dubia* Ross., *Ps. viennensis* Hrbst (p. 75).
Stenomera Blanchardii Luc., *St. assyria* Lesn. (p. 76).
Dinoderus japonicus Lesn., *D. speculifer* Lesn., *H. D. minutus* Fbr., *D. bifoveolatus* Woll. (p. 79).
Rhizopertha dominica Fbr. (p. 80).
Stephanopachys elongatus Payk. (p. 82), *St. substriatus* Payk., *St. quadricollis* Mars., *St. brunneus* Woll.
Bostrychus capucinus L. (p. 88).
Lichenophanes varius Ill., *L. numida* Lesn., *A. cariuipennis* Lew. (p. 90—91).
Schistoceros bimaculatus Ol. (p. 93).
Heterobostrychus hamatipennis Lesn. (p. 94).
Bostrychopsis Reichei Mars. (p. 94).
Micrapate Cas. (= *Bostrychulus* Lesn.) *xyloperthoides* Duv. (p. 95).
Bostrychoplites Normandii Lesn., *B. Zickelii* Mars. (p. 96—97).
Xylopertha picea Ol. (= *Heydenii* Schilsk.) (p. 98).
Xylonites retusus Ol. (= *sinuatus* Fbr.), *X. praeustus* Germ. (= *appendiculatus* Luc.) (p. 99—100).
Scobicia pustulata Fbr. (= *humeralis* Luc.), *Sc. barbata* Woll., *Sc. barbifrons* Woll., *Sc. Chevrieri* Villa (p. 162—163).

Einzelbeschreibungen.

- Apaté*, *Bostrychulus* siehe Everts pag. 212. — *Bostrychoplites*, *Bostrychopsis*, *Bostrychus* siehe Lesne oben.
Coccographis n. gen. Lesne (Bull. Fr. p. 349), *C. nigrorubra* n. sp. (p. 349) Tonkin.
Dinoderus minutus F., *D. pilifrons* Lesn. u. *Stephanopachys substriatus* Pk. sind nach Donisthorpe (1900, 1) alle 3 in England gesammelt worden und als *Dinoderus substriatus* in den Sammlungen vermischt, worauf Beare wiederholt aufmerksam macht (Ent. Month. Mag. 37 p. 2). — Siehe auch Lesne oben u. Everts pag. 212.
Heterobostrychus siehe Lesne oben.
Lichenophanes siehe Lesne oben u. Everts pag. 212.
Micrapate, *Psoa* siehe Lesne oben.
Rhizopertha siehe Lesne oben u. Everts pag. 212.
Stenomera, *Schistoceros*, *Scobicia* siehe Lesne oben.
Stephanopachys siehe Lesne oben u. Everts pag. 212.
Xylonites siehe Lesne oben.
Xylopertha siehe Lesne oben u. Everts pag. 212.

Fam. *Anobiidae*.

Chobaut 3, Everts 1, Kempers 1, Kolbe 1, Pic 5, 8, 9, 24c, 26, 30, 34, 38, 48, Pic & Pic 1, Reitter 38, Xamheu 1, 3.

Morphologie.

Kempers (1) schilderte die Flügel von *Helobia imperialis* (p. 30 tab. III fig. 19), *Priolium castaneum* (p. 31), *Ochina Hederæ* (p. 31), *Coenocara Bovistæ*.

Biologie.

Xamheu (3) beschrieb die Larve von *Anobium pacineum* u. (1) die Larve u. Puppe von *Coenocara Bovistæ* (p. 10).

Systematik.

Kolbe (1) theilt die Familie in 2 Familien: *Anobiiden* und *Ptiniden*, wobei die erstere (zusammen mit den *Lycyten*) durch die zwischen geschobenen *Psoiden* und *Bostrychiden* von der letzteren getrennt ist.

Umfassende Arbeiten.

Everts.

Coleoptera Neerlandica. 58. u. 59. Fam. *Ptiniden* u. *Anobiiden*. (p. 213—244).

Die Familie ist hier in 2 Familien getheilt, von denen die erste dichotomisch in 2 Tribus und 5 Gattungen (p. 214), die zweite in 5 Tribus und 19 Gattungen (p. 221—223).

Die behandelten Gattungen.

1. *Ptinini*.

Gibbium mit 1 Art: *G. psylloides* (fig. 88 II), *Mezium* mit 1 Art, *Sphaericus* mit 1 Art, *Niptus* mit 3 Arten: *N. hololeucus* (fig. 88 I), *Ptinus* mit 17 Arten.

2. *Anobiini*.

Hedobia mit 3 Arten, *Dryophilus* mit 3 Arten, *Priobium* mit 4 Arten, *Gastrallus* mit 2 Arten, *Episernus* mit 1 Art, *Oligomerus* mit 1 Art, *Anobium* mit 9 Arten: *A. striatum* (fig. 89 I), *Xestobium* mit 2 Arten, *Ernobius* mit 9 Arten, *Trypopytus* mit 1 Art, *Ptilinus* mit 2 Arten: *Pt. pectinicornis* (fig. 89 II, III), *Ochina* mit 2 Arten, *Xyletinus* mit 4 Arten, *Lasioderma* mit 2 Arten, *Meso-coelopus* mit 1 Art, *Dorcatoma* mit 5 Arten: *D. chrysomelina* (fig. 89 IV), *Xylothea* mit 1 Art, *Anitys* mit 1 Art, *Coenocara* mit 3 Arten.

M. u. Th. Pic.

Uebersicht der Arten der Coleopteren-Gattung
Hedobia Latr. aus der palæarctischen Fauna.

(Wien. ent. Zeit. XX p. 169—174).

Eine dichotomische Auseinandersetzung von 8 palæarctischen Arten und 3 Untergattungen, von denen 1 neu.

Die behandelten Arten.

Hedobia (i. sp.) mit 1 sp.: *pubescens* Fbr. mit var. *unicolor* Pic u. *nigrina* Reitt. *H.* (*Pseudoclava* n. subg. p. 170) mit 1 sp.: *H. quinquecostata* Schls. (? = *tricolorata* Baudi), *H.* (*Ptinomorphus* Mls.) mit 5 sp.: *H. angustata* Bris., *H. regalis* Duft. mit var. *aureopilosa* Pic u. var. *circassia* Pic, *H. angustior* Pic, *H. magnifica* Reitt., *H. imperialis* L. mit var. *interrupta* Pic, var. *alpina* Pic u. var. *senex* Kr., *H. Rostii* Pic, *H. succincta* Chev. = *Dryophilus paradoxus* Rosh. (p. 172).

Reitter.

Bestimmungstabelle der europäischen Coleopteren.

47. *Byrrhidae* (*Anobiidae*) und *Cioidae*. *Anobiidae* p. 1—46.
(Verh. naturf. Ver. Brünn XL p. 1—64).

Die Familie der *Anobiidae* im engeren Sinne (mit Ausschluss der *Ptinini*), für die der Autor den irreführenden Namen *Byrrhidae* „mit consequenter Bosheit“ festhält, obgleich er selbst den richtigen Namen in Klammern beizufügen als nothwendig einsieht.

Die behandelten Gattungen und Arten.

Hedobia (i. sp.) mit 3 Arten, *H.* (*Ptinomorpha*) mit 5 Arten: *H. regalis* Duft. var. *satanula* n. var. (p. 8) Südrussland.
Dryophilus (*Pseudodryophilus*) mit 1 Art, *Dr.* (*Homophthalmus*) mit 1 Art, *Dr.* (i. sp.) mit 5 Arten, *Priobium* mit 4 Arten, *Gastrallus* mit 4 Arten.
Episernus mit 8 Arten: *E. Henschii* n. sp. (p. 12) Bosnien.
Xestobium (*Hyperiscus*) mit 3 Arten: *X. ernobiformis* n. sp. (p. 13), *X.* (i. sp.) mit 5 Arten.
Ernobius mit 23 Arten, v. d. 1 neu: *E. Schilskyi* n. sp. (p. 15) Taygetos.
Rhadine Baud. (= *Synanobium* Schlsk.) mit 1 Art: *Rh. parmata* Baud. = *Ganglbaueri* Schilsk.
Anobium (*Dendrobium*) mit 3 Arten, *A.* (i. sp.) mit 6 Arten, *A.* (*Oligomerus*) mit 3 Arten. — *Nicobium* mit 2 Arten. — *Sitodrepa* mit 1 Art.
Priartobium n. gen. (p. 5¹) mit 1 Art: *Pr. serriformis* n. sp. (p. 24).
Tripopithys mit 2 Arten, v. d. 1 neu: *Tr. dendrobiformis* n. sp. (p. 25) Galizien, Caucasus etc.
Ptilinus mit 4 Arten. — *Plumaria* mit 1 Art, *Metholcus* mit 2 Arten. — *Trachelobrachys* mit 1 Art.
Xyletinus (*Xeronthobius*) mit 3 Arten, v. d. 2 neu: *X. ocularis* n. sp. (p. 28) Mongolei, *X. bucephaloides* n. sp. (p. 28) Egypten, *X.* (*Xyletomimus* n. subg.) mit 1 Art: *sanguineocinctus* Fairm., *X.* (*Calypterus*) mit 4 Arten, v. d. 1 neu: *X. Theanus* n. sp. (p. 29) Sporaden, *X.* (i. sp.) mit 15 Arten, v. d. 1 neu: *X. asiaticus* n. sp. (p. 33).
Lasioderma mit 20 Arten, v. d. 1 neu: *L. Mulsantii* var. *Chobautii* n. var. (p. 35) Algier, *L. turkestanicum* n. sp. (p. 36).
Ochina (i. sp.) mit 1 Art, *O.* (*Cittobium*) mit 4 Arten.

¹) Die Gattung scheint neu zu sein, obgleich sie weder p. 5 noch p. 23 mit „nov. gen.“ bezeichnet ist.

Mesothus mit 2 Arten. — *Mesocoelopus* mit 4 Arten. — *Theca* (*Anomotheca*) mit 7 Arten, *Th.* (i. sp.) mit 9 Arten. — *Eutheca* 1 Art. — *Xylotheca* 1 Art. *Dorcatoma* mit 10 Arten, v. d. 1 neu: *D. pilosella* n. sp. (p. 44) Amur. *Anitys* mit 2 Arten. — *Coenocara* mit 4 Arten.

Einzelbeschreibungen.

- Anakania* n. gen. (bei *Theca*) **Pic** (Bull. Fr. p. 332), *A. subvelutina* n. sp. (p. 332) Mauritius.
- Anitys*, *Anobium*, *Coenocara*, *Dorcatoma*, *Dryophilus*, *Episernus*, *Ernobius* siehe Everts pag. 214 u. Reitter pag. 215.
- Eurostus anemophilus* n. sp. **Chobaut** (Bull. Fr. p. 298) Frankreich.
- Gastrallus*, *Gibbium* siehe Everts pag. 214.
- Gibboxyletinus* n. gen. **Pic** (Ech. 17 p. 94), *G. Gounellei* n. sp., *G. intermedius* n. sp., *G. nitidipennis* n. sp., *G. subpubescens* n. sp., *G. fuscipennis* n. sp. mit var. *laticornis* n. var. (p. 94) Brasilien.
- Hadrobregmus aureosignatus* n. sp. **Pic** (Ech. p. 94) Brasilien, *H. australiensis* n. sp. (p. 94) Australien.
- Hedobia* (*Ptinomorphus*) *regalis* var. *aureopilosa* n. var. **Pic** (Ech. 17 p. 58) Frankreich, *H. (Pt.) magnifica* var. *caucasica* n. var. (p. 58) Caucasus. — Siehe auch **Pic & Pic** u. Reitter pag. 215.
- Lasioderma*, *Mezium*, *Mesocoelopus*, *Niptus*, *Ochina*, *Oligomerus*, *Priobium* siehe Everts pag. 214.
- Priartobium* siehe Reitter pag. 215.
- Ptilinus mexicanus* **Pic** (Ech. 17. p. 95) Mexico. — *Pt. brasiliensis* n. sp. (Le Natural. 1901 p. 278) und *Pt. Grouvellei* n. sp. (p. 278) Brasilien. — Siehe auch Everts pag. 214 u. Reitter pag. 215.
- Ptinus Cariei* n. sp. **Pic** (Bull. Fr. p. 155), *Pt. atricornis* n. sp. (p. 156), *Pt. vestitus* **Pic** var. *Autelmei* n. var. (p. 156) Mauritius, *Pt. mexicanus* n. sp. (p. 299) Mexico. — *Pt. nigricolor* n. sp. **Pic** (Ech. 17 p. 26) Tucuman, *Pt. (Pseudoptinus) Pistaciae* n. sp. (p. 51), *Pt. Salvatoris* n. sp. (p. 52) Griechenland, *Pt. subelongatus* n. sp. (p. 57) Caucasus, *Pt. tokatensis* n. sp. (p. 58) Tokat, *Pt. (Bruchoptinus) femoralis* var. *Ravelii* n. var. (p. 79) Neapel, *Pt. fulvocapillus* n. sp. (p. 79) Tunis, *Pt. (Eutaphrus) major* n. sp. (p. 79) Tunis, *Pt. (Eutaphrus) Dollei* n. sp. (p. 93) Abyssinien. — *Pt. cupreus* n. sp. **Pic** (Misc. ent. 1898 p. 54), *Pt. (Eutaphrimorphus* n. subg.) *Raffrayi* n. sp. (p. 54). — Siehe auch Everts pag. 214.
- Rhadine* siehe Reitter pag. 215.
- Sphaericus* siehe Everts pag. 214.
- Theca latior* n. sp. **Pic** (Bull. Aut. 1899 p. 207).
- Trichodesma semialbida* n. sp. **Pic** (Ech. 17 p. 26) und *Tr. dentatithorax* n. sp. (p. 27) Brasilien, *Tr. mexicana* n. sp. (p. 93) Mexico, *Tr. Gounellei* n. sp. (p. 94) Brasilien, *Tr. Gorhami* n. nom. (p. 94) für *Tr. imperator* Gorh. nec Cast.
- Trigonogenius nigronotatus* n. sp. **Pic** (Le Natural. 1901 p. 278) Bolivien.
- Trypopytus luteopilosus* n. sp. **Pic** (Ech. 17 p. 94) Himalaia, *Tr. brevipennis* n. sp. (p. 94) Ceylon. — Siehe auch Everts pag. 214 u. Reitter pag. 215.
- Xestobium* siehe Everts pag. 214 u. Reitter pag. 215.
- Xyletinus semilimbatus* n. sp. **Pic** (Bull. Soc. Aut. 1899 p. 208). Reitter p. 215.
- Xylotheca* siehe Everts pag. 214.

Fam. Cissidae.

Kolbe 1, Reitter 38.

Systematik.

Kolbe (1) stellte die Familie zu den *Clavicornia* neben die *Colydiiden*.

Umfassende Arbeiten.

Reitter.

Bestimmungstabelle der europäischen Coleopteren.

47. *Byrrhidae* (*Anobiidae*) und *Cioidae*. *Cioidae* p. 46 — 61.
(Ver. naturf. Ver. Brünn XL p. 1—61).

Eine umfassende dichotomische Auseinandersetzung der palae-
artischen Arten, von denen mehrere neu sind.

Die behandelten Gattungen und Arten.

Xylographus mit 2 Arten, v. d. 1 neu: *X. tomicoides* n. sp. (p. 47) Amur.

Cis (*Hadraule*) mit 7 Arten, *C. (Eridaulus)* mit 3 Arten, *C. (i. sp.)* mit 38 Arten,
v. d. 2 neu: *C. hispidus* Payk. var. *albohispidulus* n. var. (p. 50), *C. lineatulus* n. sp. (p. 51), *C. judaeus* n. sp. (p. 55) Beirut, *C. tomentosus* Mell.
var. *tomentoides* n. var. (p. 56) Caucasus.

Rhopalodontus mit 7 Arten, v. d. 1 neu: *Rh. novorossicus* n. sp. (p. 58) Novorossisk.
Cisdygma mit 1 Art. — *Diphyllocis* mit 1 Art. — *Cisarthron* mit 1 Art. —
Ennearthron mit 9 Arten. — *Octotemnus* (i. sp.) mit 1 Art, *O. (Orophius)*
mit 2 Arten.

Fam. Tenebrionidae.

Berg 1, Blackburn 2, Csiki 1, Desbrochers 5, Everts 2,
Fairmaire 3, 4, 6, Fauvel 8, Felt 1, Fritsche 1, Kempers 1, Kolbe
1, 2, 6, Manger 1, Mégnin 1, Martinez 3, Pic 48b, Poppius 7,
Reitter 6, 23, 32, 33, 35, 37, W. Schulz 1, Scudder 1, Ssamenow 3,
Tornier 1, Waterhouse 2, Xamheu 1.

Tornier (1) erzeugte auf künstlichem Wege bei *Tenebrio*
molitor Missbildungen an den Beinen, Fühlern und Flügeldecken
(p. 634—638).

Morphologie.

Kempers (1) schilderte die Flügel von *Opatrum sabulosum*
(p. 32 tab. III fig. 20), *Microzoum tibiale* (p. 32), *Tribolium ferru-*
gineum (p. 32), *Alphitobius diaperinus* (p. 32), *Nalassus striatus*
(p. 33).

Biologie.

Ueber mehrere Arten am Amazonenstrom berichtete **Schulz**
(Berl. ent. Z. p. 331—332), ebenso über die Larven von *Nilio*
villosus (ibid. p. 332).

Manger (1) behandelte die Metamorphose von *Tenebrio molitor*.

Mégnin (1) berichtete über *Tenebrio molitor*, der Geflügel angriff.

Xambeu (1) beschrieb die Larve u. die Puppe von *Tribolium confusum* (p. 63) u. die Larve von *Heliopates abbreviatus* (p. 21).

Felt (1) gab eine kurze Beschreibung und Abbildung der Larve u. der Puppe von *Tribolium confusum* (p. 40 fig. 72).

Kolbe (2) berichtete über die Larve von *Tenebrioninus Adamsoniarum* aus den Früchten des Affenbrodbaumes.

Geographische Verbreitung.

Poppius (7) führte *Tribolium madens* aus Finnland auf.

Palaeontologie.

Scudder (1) beschrieb 2 Arten *Tenebrio* aus Canada, von denen 1 neu (Siehe Einzelb.).

Fritsch (1) beschrieb 1 *Blaptoides*, der neu zu sein scheint, obgleich er nicht als n. sp. bezeichnet ist (Siehe Einzelb.).

Systematik.

Kolbe (1) trennte die *Tentyriiden* u. *Aegialitiden* als besondere Familien ab, die er in stärkerem Gegensatz zu den *Tenebrioniden* setzte als die *Alleculiden* (*Cisteliden*) und *Lagriiden*.

Umfassende Arbeiten.

Desbrochers.

Faunule des *Coléoptères* de la France et de la Corse.

Tenebrionidae.

(Frelon IX p. 137—193, X p. 37—104).

Eine Revision der Familie nach bekanntem Muster¹⁾. Andere Arbeiten als die von Lacordaire (1859) und von Mulsant (1852—1859) hat der glückliche Autor kaum berücksichtigt. Als Curiosum findet sich die Angabe, dass *Blaps mortisaga* L. nur in Armenien und im Caucasus vorzukommen scheine, und dass die Gattung *Phylax* von Megerle beschrieben sei. Die Fortsetzung der Arbeit folgt im nächsten Jahr.

Die behandelten Gattungen und Arten.

Tentyria 5 sp., *Pachychile* 1 sp., *Stenosis* 2 sp., *Dichillus* 3 sp., *Scaurus* 4 sp., *Elenophorus* 1 sp., *Akis* 1 sp., *Blaps* 5 sp. (IX p. 137—193).

Pimelia 4 sp., *Asida* 11 sp., *Crypticus* 2 sp., *Oochrotus* 1 sp., *Pedinus* 3 sp., *Colpotus* 1 sp., *Phylax* 1 sp., *Dendarus* 3 sp., *Heliopathes* 4 sp., *Pachypterus* 1 sp., *Opatrum* 7 sp., *Sinorus* 1 sp., *Microzoum* 1 sp., *Lichenium* 1 sp., *Bolitophagus* 3 sp. (X p. 37—104).

¹⁾ Vergl. Bericht pro 1899 p. 323.

Everts.

Coleoptera Neerlandica. 60. Fam. Tenebrionidae.

(p. 244—266).

Die Familie wird dichotomisch in 11 Tribus und 25 Gattungen getheilt (p. 246—249).

Die behandelten Gattungen und Arten.

Blaps mit 2 Arten: *Bl. lethifera* (fig. 90), *Asidia* mit 1 Art, *Pedinus* mit 1 Art, *Opatrum* mit 1 Art, *Microzoum* mit 1 Art, *Crypticus* mit 1 Art, *Phaleria* mit 1 Art, *Bolitophagus* mit 2 Arten, *Eledona* mit 1 Art, *Scaphidema* mit 1 Art, *Diaperis* mit 1 Art, *Platydema* mit 2 Arten, *Hoplocephala* mit 1 Art, *Alphitophagus* mit 1 Art, *Pentaphyllus* mit 1 Art, *Hypophloeus* mit 6 Arten, *Latheticus* mit 1 Art, *Palorus* mit 3 Arten. *Tribolium* mit 3 Arten, *Echocercus* mit 3 Arten, *Uloma* mit 1 Art, *Alphitobius* mit 2 Arten, *Tenebrio* mit 4 Arten, *Nalassus* mit 3 Arten.

Martinez Escalera.

Materiales para una revision del género *Asida*.

(Bol. Soc. esp. I p. 172—175).

Zunächst sind nur die 9 Arten der 1. Gruppe (mit Sammtflecken) der Gattung dichotomisch auseinandergesetzt, doch scheint es, als ob die übrigen Gruppen folgen sollen, wobei hoffentlich eine dichotomische Begründung der Gruppen nicht fehlen wird. Drei Arten sind neu, 2 weitere zwar als n. sp. bezeichnet, aber nicht neu, sondern n. nom. oder schon früher als var. beschrieben.

Die behandelten Arten.

I. Gruppe.

Asida luctuosa Boisd. nec Ramb. (= var. minor Rosh.), *A. argenteolimbata* n. nom. (= *luctuosa* Ramb. nec Boisd.) (p. 172), *A. holosericea* Germ. (= *Ramburii* Sol.), *A. Sanchez-Gomezi* i. n. sp. (p. 173) Mazarón mit var. *almeriensis* n. var. (p. 174) Almeria, *A. Clementei* P. Arc. (= *Solieri* Ramb.), *A. Martinezii* n. sp. (p. 175) Osuna, *A. lorcani* P. Arc., *A. Oberthürri* n. sp., (p. 175) Galera.

1. Reitter.

Ueber die turkestanischen Arten der Coleopteren-Gattung
Laena Latr.

(Wien. ent. Zeit. XX p. 61—63).

Eine dichotomische Auseinandersetzung über 7 turkestanische Arten, von denen 2 neu sind.

Die behandelten Arten.

Laena dilutella Ersch., *A. hirtella* Ersch., *L. bifoveolata* Reitt., *L. dentitibia* n. sp. (p. 62) Buchara, *L. turkestanica* Reitt., *A. brevipennis* n. sp. (p. 63) Alatau, *L. robusta* Reitt.

2. Reitter.

Dichotomische Uebersicht der Coleopteren-Gattung
Pterocoma Sol.

(Deut. ent. Zeit. 1901 p. 189—192).

Es werden 15 Arten auseinandergesetzt, von denen eine neu, während 2 andere zwar als neu bezeichnet, aber nur mit neuen Namen ausgestattet sind.

Die behandelten Arten.

Pterocoma costata Pall. (= *Sarpae* Sol.) mit var. *gracilicornis* Sol., *Pt. subarmata* Mot. (= *subrugosa* Mot.), *Pt. Ganglbaueri* Reitt., *Pt. variolaris* Gebl. (= *tuberculata* Mot. = *subnuda* Reitt.), *Pt. piligera* Gebl., *Pt. vittata* Friv., *Pt. Chan* Reitt., *Pt. denticulata* Gebl., *Pt. alutacea* n. nom. (= *tuberculata* Reitt. ol.), *Pt. fuscopilosa* n. nom. (= *denticulata* Reitt. ol.), *Pt. plicicollis* n. sp. (p. 191) Turkestan, *Pt. Reitteri* Friv. (= *obesa* Friv.), *Pt. parvula* Friv., *Pt. Amandona* Reitt., *Pt. Loczyi* Friv.

3. Reitter.

Verschiedenes über die Coleopteren der *Tenebrioniden*-
Abtheilung *Helopina*.

(Deut. ent. Zeit. 1901 p. 209—224.)

Die Arbeit ist ausschliesslich den *Helopinen* gewidmet und bringt so viel neues Material, dass sie vortheilhaft als umfassende behandelt wird. Namentlich sind die Bemerkungen über die *Hedyphanes* und bisher unbekanntem ♂♂ von *Entomogonus* wichtig.

Die behandelten Gattungen und Arten.

- Euryhelops* n. gen. (p. 209) für *H. Championis* Reitt.
Entomogonus als getrennte Gattung aufzufassen (p. 211, 212), *E. Amandanus* n. sp. (p. 211) Orudbad, hierher auch *saphyrinus* All. (p. 210).
Hedyphanes als selbstständige Gattung (p. 211, 212), aus der *Stenomacidius* und *Catomidius* entfernt werden müssen (p. 224).
Helops (*Raiboscelis*) *angustitarsis* n. sp. (p. 210) Armenien.
Helops i. sp. *immarginatus* n. sp. (p. 212) Kurdistan, *H. Theanus* n. sp. (p. 213) Amasia, *H. Prometheus* n. sp. (p. 213) Talysch, *H. peropacus* n. sp. (p. 214) Armenien.
Helops (*Euryhelops* n. subg. p. 214¹) *tiro* n. sp. (p. 215) Turkestan, *H. Nadari* n. sp. (p. 215) Alai, *H. cylindrinotoides* n. sp. (p. 216) Turkestan.
H. (Cylindronotus) dich. Tab. über 4 Gruppen und 6 Arten, v. denen 2 neu: *H. bellator* n. sp. (p. 218) Caucasus, *H. funestus* Fald. var. *corallipes* n. var. (p. 219) u. mit var. *umbrinus* Fald., var. *gibbicollis* Fald. u. var. *flavipes* All., *H. erivanus* n. sp. (p. 219) Erivan.
H. (Odocnemis) Korbii n. sp. (p. 219) Konia.

¹ Der Name ist bereits vergeben (ibid. p. 209) u. wurde daher von Reitter durch *Zophohelops* ersetzt (Wien. ent. Zeit. 1902 p. 221).

- H. (Stenomax) kurdistanus* n. sp. (p. 221) Armenien, *H. scutellatus* n. sp. (p. 221) Kleinasien, *H. planivittis* ist nicht = *H. (Odocnemis) nigroaeneus*, sondern gehört zu *Nalassus*.
*H. (Xanthomus*¹⁾ *semiopacus* n. sp. (p. 222) Transcaspien, *H. humerideus* n. sp. (p. 223) Araxesthal.
H. (Catomus) dichrous (p. 224) Angora.

Ssemenow.

(Zur Küstenfauna der Krimm: I. *Phaleria pontica* n. sp.)
 (Rev. russ. I. p. 90).

Eine dichotomische Tabelle über 5 europäische Arten der Gattung *Phaleria* in lateinischer Sprache (nur Titel, Vorwort u. Nachwort russisch). Ausgeschlossen wird aus der Gattung die *Phal. pellucida* Hrbst. und zu einer neuen Gattung erhoben.

Die behandelten Arten.

- Phaleria atlantica* Fauv. (= *bimaculata* Woll. nec L.), *Ph. pontica* n. sp. (p. 93) Krimm, *Ph. cadaverina* Fbr. (= *cava* Hrbst.), *Ph. bimaculata* L. (= *dorsigera* Fbr. = *cadaverina* Sol.), *Ph. acuminata* Kst.
Halammobia n. gen. (p. 92) für *Phal. pellucida* Hrbst.

Einzelbeschreibungen.

- Akis* siehe Desbroches pag. 218.
Alphitobius limbalis n. sp., Fairmaire (Rev. Ent. XX. pag. 185), *A. distinguendus* gehört zu *Eutochia*, *A. striatulus* Frm. = *piceus* Ol. (p. 185). — Siehe auch Everts pag. 216.
Alphitophagus siehe Everts pag. 216.
Amarsenes nepos n. sp. Fairmaire (Rev. Ent. XX p. 188) Madagascar.
Anatolica sulcipennis n. sp. Reitter (Zichy Reise II p. 110) Mongolei.
Anemia Reitteri n. nom. Pic (Bull. Fr. 1899 p. 278²) für *A. rotundicollis* Reitt. nec Desbr.
Asida siehe Martinez pag. 219, Everts pag. 219, Desbrochers pag. 218.
Blaps siehe Everts pag. 219, Desbrochers pag. 218.
Blaptoides dubius n. sp. (?) Fritsch (Arch. naturw. Land. Böhm. XI 1901 p. 172 fig. 16) fossil in Böhmen.
Bolitophagus siehe Everts pag. 219 u. Desbrochers pag. 218.
Camaria Billecoqii n. sp. Fairmaire (Rev. Ent. XX p. 189), *C. obscurina* Frm. var. *coeruleascens* n. var. (p. 189) Madagascar.
Catomus siehe Reitter oben.

¹) *Odocnemis*, *Stenomax* u. *Xanthomus* werden vom Autor zwar „Gattungen“ genannt u. als solche behandelt (ohne dass diese Ansicht begründet wird), trotzdem aber mitten zwischen die Untergattungen von *Helops* gestellt.

²) Ist nicht „n. sp.“, wie es nach Pic den Anschein hat, sondern nur n. nom.

- Chalcopterus cribratus* n. sp. **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. 25. p. 25). Australien.
- Chemolamus Vickii* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 186), *Ch. infimus* n. sp., *Ch. Perrieri* n. sp. (p. 187) Madagascar.
- Colpotus* siehe Desbrochers pag. 218.
- Crypticus* siehe Everts pag. 219 u. Desbrochers pag. 218.
- Cylindronotus* siehe Reitter pag. 220.
- Cyphelops* n. gen. **Fairemaire** (Rev. Ent. XX p. 73), *C. inflatus* n. sp. (p. 74) Madagascar.
- Cyrtosoma montanum* n. sp. **Waterhouse** (Tr. Linn. Soc. Lond. VIII p. 76) Guinea.
- Damatris zonulata* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 186) Madagascar.
- Dendarus (Pandarinus) vagans* n. sp. **Reitter** (D. ent. Z. p. 180) Transcaspien. — Siehe auch Desbrochers pag. 218.
- Diaperis* siehe Everts pag. 219. — *Dichillus* siehe Desbrochers pag. 218.
- Echocerus, Eledona* siehe Everts pag. 219.
- Etenophorus* siehe Desbrochers pag. 218.
- Entomogonus* siehe Reitter pag. 220.
- Epipedonota intercostata* n. sp. **Berg** (Com. Buen. Air. I p. 269) und *E. sublineata* n. sp. (p. 270) Salta, *E. viramosa* n. sp. (p. 271) Patagonien.
- Euryhelops* siehe Reitter pag. 220.
- Gonocephalum Reitteri* n. sp. **Csiki** (Zichy II p. 111) Mongolei.
- Halammobia* siehe Ssemenow pag. 221.
- Hedyphanes (Catomidius) subniger* n. sp. **Reitter** (D. ent. Z. p. 181) Transcaspien. — Siehe auch Reitter pag. 220.
- Heliopathes* siehe Desbrochers pag. 218.
- Helops (Raiboscelis) iconiensis* n. sp. **Pic** (Bull. Autun XVI p. 31) Klein-Asien. — *H. (Stenomax) pindicus* n. sp. **Apfelbeck** (Mitth. Bosn. VIII. p. 465) Aetolien. — Siehe auch Reitter pag. 220.
- Hipalmus aequatorius* n. sp. **Kolbe** (Berl. ent. Zeit. 1901 p. 479 tab. VII fig. 3).
- Hoplocephala* siehe Everts pag. 219.
- Hypophloeus* siehe Everts pag. 219.
- Laena yzantina* n. sp. **Apfelbeck** (Mitth. Bosn. VIII p. 466) Constantinopel. — Siehe auch Reitter pag. 219.
- Lasiostola (Centrocnemis) interrupta* n. sp. **Reitter** (Wien. ent. Zeit. XX p. 161 tab. III fig. 5) Turkestan.
- Latheticus* siehe Everts pag. 219.
- Lichenium* siehe Desbrochers pag. 218.
- Madobalus* n. gen. *rotundicollis* n. sp. **Fairmaire** (Not. Leyd. Mus. 23. p. 73) Madagascar.
- Melanesthes mongolica* n. sp. **Csiki** (Zichy Reise II p. 112) u. *M. Heydenii* n. sp. (p. 112) Mongolei.
- Microzoum* siehe Everts pag. 219, Desbrochers pag. 218.
- Miotodera* n. gen. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 190), *M. funeraria* n. sp. (p. 191) Madagascar.
- Nalassus* siehe Reitter pag. 221, Everts pag. 219.

- Odocnemis* siehe Reitter pag. 220, 221.
Oochrotus siehe Desbrochers pag. 218.
Opatrum siehe Everts pag. 219, Desbrochers pag. 218.
Pachychila, *Pachypterus* siehe Desbrochers pag. 218.
Palorus siehe Everts pag. 219.
Parecatus inciscollis n. sp. Fairmaire (Rev. Ent. XX p. 182), *P. interruptus* n. sp. (p. 182), *P. machloides* n. sp. (p. 183) Madagascar.
Pedinus aetolicus n. sp. Apfelbeck (Mitth. Bosn. VIII p. 464) Aetolien, *P. peristericus* n. sp. (p. 464) Epirus, *P. balcanicus* n. sp. (p. 465) Bosnien. — Siehe auch Everts pag. 219, Desbrochers pag. 218.
Pentaphyllus siehe Everts pag. 219.
Penthicus Sequentis n. sp. Reitter (D. ent. Z. p. 79) Mongolei.
Phaleria provincialis n. sp. Fauvel (Rev. Ent. XX p. 253) Süd-Frankreich. —
Ph. ellipsodes n. sp. Fairmaire (Rev. Ent. XX p. 184) Madagascar. —
 Siehe auch Ssemenow pag. 221 u. Everts pag. 219.
Phrynocolus madecassus n. sp. Fairmaire (Rev. Ent. XX p. 183) Madagascar.
Phylax, *Pimelia* siehe Desbrochers pag. 218.
Platydemia siehe Everts pag. 219.
Platyscelis (Platynoscelis) sinuato-collis n. sp. Reitter (D. ent. Z. p. 180) Bucharei.
Porphyrhya camaena n. sp. Fairmaire (Rev. Ent. p. 188) Madagascar.
Proscorus n. gen. Fairmaire (ibid. p. 188) *Pr. cyaneostriatus* n. sp. (p. 189) Madagascar.
Prosodes bactrianiformis n. sp. Reitter (D. ent. Z. p. 77) Bucharei, *Pr. transfuga sulcatissima* n. var. (p. 78) Bucharei.
Pseudogena laevistriata n. sp. Fairmaire (Rev. Ent. XX p. 191) Madagascar.
Psilachnopus n. gen. (bei *Lachnodactylus*¹⁾ Reitter (Wien. ent. Zeit. XX p. 161),
Ps. cribratellus n. sp. (p. 162 tab. III fig. 6) Orudubad.
Pterocomma siehe Reiter pag. 220.
Pterocomodes n. gen. Reitter (Wien. ent. Zeit. p. 259), *Pt. acutus* n. sp. (p. 160 tab. III fig. 4) Turkestan.
Raiboscelis siehe Helops u. Reitter p. 220.
Scaphidema siehe Everts pag. 219.
Scaurus, *Sinorus* siehe Desbrochers pag. 218.
Stenogena substriata n. sp. Fairmaire ((Rev. Ent. XX p. 191), *St. crenulata* n. sp. (p. 192) Madagascar.
Stenomax siehe Reitter pag. 221.
Stenosis siehe Desbrochers pag. 218.
Sternoplax siehe *Trigonoscelis*.
Styphacus n. gen. *Decorsii* Fairmaire (Not. Leyd. Mus. X 23. p. 71), *St. humerosus* n. sp. (72) Madagascar.
Suarezius cupreolus n. sp. Fairmaire (Rev. Ent. XX p. 185) Madagascar.
Tagona rugipleura n. sp. Reitter (D. ent. Z. p. 76 „*rugipleuris*“) Turkestan.
Tagonoides costulatus n. sp. Fairmaire (Bull. Fr. p. 267 *Trigonoides*) Sikkim.
Tenebrio calculensis n. sp. Scudder (Geol. Surv. Canad. II. 1. 1895 p. 31 tab. III pag. 1, 6) fossil in Canada. — Siehe auch Everts pag. 219.

¹⁾ *Lachnopus* Seidl. wurde in *Lachnodactylus* geändert (Ins. Deut. V. 1. p. 837).

- Tenebriomimus* n. gen. (*Diaperini*) **Kolbe** (Allg. Zeit. Ent. VI p. 342), *T. Adansoniarum* n. sp. (p. 342) Deutsch-Ostafrika.
Tentyria siehe Desbrochers pag. 218.
Tribolium confusum abgebildet von **Felt** (Bull. N. York Mus. 37. VIII. p. 40 fig. 72. — Siehe auch Everts pag. 219.
Trigonoscelis auliensis n. sp. **Reitter** (D. ent. Z. p. 78) u. *Tr. (Sternoplax) Iduna* n. sp. (p. 179) Turkestan. — *Tr. Zichyi* n. sp. **Csiki** (Zichy Reise II p. 110) u. *Tr. Reitteri* n. sp. (p. 111) Mongolei.
Xanthomus siehe Reitter p. 221.

Fam. *Alleculidae*.

Csiki 3, 7, Desbrochers 3, Everts 2, Fairmaire 6, Jakowlew 1, Kempers 1, Lambertie 5, Pic 7, Ssemenow 6.

Morphologie.

Kempers (1) schilderte die Flügel von *Mycetochara linearis* (p. 33 tab. IV fig. 21), *Cteniopus sulphureus*.

Biologie.

Lambertie (5) berichtete über zahlreiches Auftreten von *Omophlus lepturoides*.

Geographisches.

Jakowlew (1) führte *Cheniopinus altaicus* aus dem Gouvernement Wjädka auf.

Systematik.

Umfassende Arbeiten.

Csiki.

(Die *Alleculiden* Ungarns).
 (Rov. Lap. VIII. 3. p. 53—60).

Dichotomische Auseinandersetzung von 10 Gattungen und 32 Arten. Magyarisch.

Desbrochers.

Faunule des Coléoptères de la France et de la Corse.

Cistelidae.

(Frel. IX p. 85—135).

Eine Revision nach bekanntem Muster¹⁾. Dass die Fam. in 2 sehr natürliche Unterfam. zerfällt, ist dem Autor ganz unbekannt geblieben. Als Curiosum der Nomenclatur kann *Omophlus Amerinae*

¹⁾ Vergl. Bericht pro 1899 p. 323.

Curt. genannt werden, ein Name, der einem Druckfehler in Mulsant's *Pectinipèdes* (1856) seine Entstehung verdankt (statt *Armeriae* Curt.¹⁾). Die Art muss *O. rufitarsis* Leske heissen.

Die behandelten Gattungen.

Cistela 1 sp., *Hymenalia* 1 sp., *Gonodera* 2 sp., *Isomira* 4 sp., *Eryx* 4 sp.,
Allecula 2 sp.: *A. morio* u. *A. semilivida* Pic, *Hymenorus* 1 sp., *Mycetochares*
 6 sp., *Omophilus* 5 sp., *Heliotaurus* 4 sp., *Podonta* 1 sp., *Cteniopus* 1 sp.

Everts.

Coleoptera Neerlandica. 61. Fam. *Cistelidae*.
 (p. 267—275).

Die Familie wird in 3 Unterfamilien und 4 Tribus getheilt (p. 268) und enthält 9 Gattungen.

Die behandelten Gattungen und Arten.

Allecula mit 2 Arten: *morio* (fig. 92 I), *Eryx* Steph. mit 2 Arten, *Hymenalia* mit 1 Art, *Cistela* mit 1 Art, *Gonodera* mit 1 Art, *Isomira* mit 1 Art, *Mycetochara* mit 4 Arten, *Cteniopus* mit 1 Art, *Ct. flavus* (fig. 92 II), *Omophilus* mit 1 Art.

Einzelbeschreibungen.

Allecula discipennis n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. 20 p. 193) Madagascar. — Siehe auch Everts u. Desbrochers oben.

Cistela, *Cteniopus*, *Eryx*, *Gonodera*, *Hymenalia* siehe Everts und Desbrochers oben.

Cteniopus, *Heliotaurus* siehe Desbrochers oben.

Hymenorus scutellatus n. sp. **Pic** (Bull. Fr. p. 254) Griechenland. — *H Avajewii* n. sp. **Ssamenow** (Rev. russ. I p. 168) Russland, Kostroma. — Siehe auch Desbrochers oben.

Isomira hungarica n. sp. **Csiki** (Term. Füzet. XXIV 1901 p. 486) Süd-Ungarn. — auch Everts und Desbrochers oben.

Nesotaurus dermestoides n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. 20 p. 193) Madagascar.

Mycetochara siehe Everts und Desbrochers oben.

Omophilus siehe Everts und Desbrochers oben.

Podonta siehe Desbrochers oben.

Stenerula suturella n. sp., **Fairmaire** (Rev. Ent. 20. p. 192) Madagascar.

Fam. *Lagriidae*.

Everts 2, Fairmaire 6, Kempers 1, Kolbe 1, 5.

Morphologie.

Kempers (1) schilderte die Flügel von *Lagria hirta* (p. 34 tab. IV fig. 22).

¹⁾ Vergl. Ins. Deutschl. V. 2. I. Lief. 1896 p. 237.

Geographische Verbreitung.

Kolbe (5) machte Angaben über die geographische Verbreitung der *Lagria*-Arten u. verwandten Gattungen (p. 539¹).

Systematik.

Kolbe (1) schied die *Petriiden* als selbstständige Familie aus und stellte sie neben die *Salpingiden*, indem er übersah, dass sie geschlossene vordere Coxalgruben haben²).

Umfassende Arbeiten.

Everts.

Coleoptera Neerlandica. 62. Fam. *Lagriidae*.

(p. 275—277).

Die kleine Familie enthält nur eine Gattung, *Lagria*, mit 2 Arten.

Einzelbeschreibungen.

Lagria laticollis n. sp. **Kolbe** (Berl. ent. Z. 1901 p. 540), *L. usambica* n. sp. (p. 541), *L. ruficeps* n. sp. (p. 542), *L. hirsuta* n. sp. (p. 543), *L. picea* n. sp. (p. 543), *L. convexa* n. sp. (p. 544), *L. minuta* n. sp. (p. 545), *L. undussumana* n. sp. (p. 545), *L. opaca* n. sp. (p. 546), *L. collina* n. sp. (p. 547), *L. lanuginosa* n. sp. (p. 547), *L. pilosivestis* n. sp. (p. 548), *L. gibbosa* n. sp. (p. 549) Afrika. Vertheilung der 13 neuen Arten in 4 Abth. (p. 540). — *L. asperipes* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 196), *L. maculiventris* n. sp. (p. 197) Madagascar. — Siehe auch Everts oben.

Lagriostira n. gen. *infernalis* n. sp. **Kolbe** (Berl. ent. Z. 1901 p. 550), *L. parcepilosa* n. sp. (p. 551) u. *L. hispida* n. sp. (p. 552) Afrika, *L. subseriata* Reitt. (p. 552).

Porrolagria derosa n. sp. **Kolbe** (Berl. ent. Z. 1901 p. 553) und *P. alternata* n. sp. (p. 554) Afrika.

Staius globulicollis n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. 20 p. 196) Madagascar.

Fam. *Melandryidae*.

Champion 6, Everts 2, Fairmaire 6, Kempers 1, Pic 24a, 30, Poppius 3, Sahlberg 8.

¹) Diese Angaben enthalten leider unheimlich viele Fehler: 1. In Europa giebt es nicht 10, sondern nur 6 Arten der Gatt. *Lagria*. 2) In Nordafrika giebt es keine *Eutrapela*. 3) Die *Eutrapela suturalis* Lucas bildet 1 Gatt. der *Helopini* (*Adelphinus*). 4) *Arthromacra* ist nicht nur aus Nord-Amerika und Japan bekannt, sondern auch im Caucasus mit 1 Art (*pretiosa* Rch.) vertreten. (Vergl. Erichson Ins. Deutschl. V. 2 p. 336—339, p. 320 Anm., p. 322).

²) Vergl. Erichson Ins. Deutschl. V. 2. pag. 308.

Morphologie.

Kempers (1) schilderte die Flügel von *Tetratoma fungorum* (p. 34), *Orchesia picea* (p. 34 tab. IV fig. 23), *Melandrya caraboides* (p. 35).

Geographische Verbreitung.

Poppius (3) führte *Melandrya rufibarbis* Schall. und **Sahlberg** (8) *Phloeotrya rufipes* Gyll. aus Finnland auf.

Systematik.

Umfassende Arbeiten.

Everts.

Coleoptera Neerlandica. 63. Fam. *Melandryidae*.
(p. 277—292).

Die Familie wird in 3 Unterfamilien, 8 Tribus (p. 279) und 15 Gattungen getheilt (p. 279—281).

Die behandelten Gattungen u. Arten.

Tetratoma mit 3 Arten: *T. fungorum* (fig. 93 I), *Eustrophus* mit 1 Art, *Hallomenus* mit 2 Arten, *Orchesia* mit 5 Arten: *O. micans* (fig. 93 II), *Anisoxya* mit 1 Art, *Abdera* mit 4 Arten, *Dircaea* mit 1 Art, *Phloeotrya* mit 2 Arten, *Xylita* mit 1 Art, *Serropalpus* mit 1 Art, *Hypulus* mit 2 Arten, *Zilora* mit 1 Art, *Melandrya* mit 3 Arten, *Conopalpus* mit 1 Art: *C. testaceus* (fig. 93 III), *Osphya* mit 1 Art.

Einzelbeschreibungen.

Abdera, *Anisoxya* siehe Everts oben.

Caspyria n. gen. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 194) *Perrieri* n. sp. (p. 195) Madagascar = *Pelecotoiles simplicifrons* Fairm. (p. 248). Vergl. *Rhipiphoridae*.

Conopalpus, *Dircaea*, *Eustrophus*, *Hallomenus*, *Hypulus* siehe Everts oben.

Melandrya barbata und *dubia* besprach **Champion** (Ent. Mont. Mag. 37. p. 255—256). — Siehe auch Everts oben.

Orchesia siehe Everts oben.

Osphya bipunctata Fbr. var. *innotata* n. var. **Pic** (Misc. ent. 1898 p. 98). — Siehe auch Everts oben.

Phloeotrya siehe Everts oben.

Serropalpus madecassus n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 194) Madagascar. — Siehe auch Everts oben.

Tetratoma ancora var. *conjuncta* n. var. **Pic** (Ech. 17. p. 58) Pyreneen u. var. *obscurior* n. var. (p. 58) Steyermark. — Siehe Everts oben.

Xylita, *Zilora* siehe Everts oben.

Fam. Oedemeridae.

Blackburn 2, Everts 2, Fairmaire 6, Paganetti - Hummler 1, Pic 24c, 29b, 30.

Morphologie.

Everts (2) bildete die Flügel von *Oedemera Podagrariae* nach Redtenbacher ab. — **Kempers** schilderte die Flügel von *Oedemera nobilis* (p. 37 tab. IV fig. 28), *Oe. Podagrariae* (p. 37) und *Asclera coerulea*.

Biologie.

Everts besprach die Larven der Familie im Allgemeinen (p. 324).

Paganetti-Hummler (1) fand *Sparedrus Orsinii* auf Ilex.

Systematik.

Umfassende Arbeiten.

Everts.

Coleoptera Neerlandica. 59. Fam. *Oedemeridae*.

(p. 323—331).

Die Familie wird dichotomisch in 3 Tribus mit 5 Gattungen getheilt (p. 324—325).

Die behandelten Gattungen und Arten.

Nacerda mit 4 Arten: *N. melanura* (fig. 99 I), *Asclera* mit 2 Arten, *Chrysanthia* mit 2 Arten, *Oedemera* mit 9 Arten: *Oe. nobilis* (fig. 99 II), *Oe. Podagrariae* (fig. 100).

Einzelbeschreibungen.

Ananca heluanensis n. sp. **Pic** (Ech. 17. p. 34) Egypten.

Asclera cavicollis n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. 20. p. 199) Madagascar. — Siehe auch Everts oben.

Chrysanthia oralis Frm. var. *differens* n. var. **Pic** (Feull. Nat. 1899 p. 14), *Chr. turcica* n. sp. (p. 14, 15). — Siehe auch Everts oben.

Nacerda (*Lethonymus*) *diformis* var. *differens* n. var. **Pic** (Misc. ent. 1899 p. 115). — Siehe auch Everts oben.

Oedemera barbara var. *dalmatina* n. var. **Pic** (Misc. ent. 1898 p. 73, 1899 p. 116) u. var. *algerica* n. var. (p. 116). — *Oe. Sebastiani* n. sp. **Pic** (Ech. XVII p. 10) Caucasus, *Oe. brevipennis* var. *akbesiana* n. var. (p. 11) Akbes, *Oe. nobilis* var. *subviolacea* n. var. (p. 11) Kabylien. — Siehe auch Everts oben.

Pseudotylus torridus n. sp. **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. 25. p. 26) Australien.

Zabriola n. gen. (bei *Xanthochroa*) *obscurifrons* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. 20 p. 198) Madagascar.

Fam. Pythonidae.

Abeille 2, Everts 2, Fairmaire 6, Gerhardt 4, 5, Kempers 1, Kolbe 1.

Morphologie.

Kempers (1) schilderte die Flügel von *Rhinosimus planirostris* (p. 38 tab. IV fig. 29).

Systematik.

Kolbe (1) trennte, nach den Epimeren des Mesothorax, die *Salpingiden* als besondere Familie ab, und stellte sie neben die *Petriiden*. Vergl. *Lagriidae*.

Umfassende Arbeiten.

Everts.

Coleoptera Neerlandica. 70. Fam. *Pythidae*.I. u. II. Subfam. *Pythinae* u. *Salpinginae*.

(p. 332—336).

Die Familie ist hier in 2 Unterfamilien geteilt und mit den *Mycteriden* als einer dritten Unterfamilie verbunden.

Die behandelten Gattungen u. Arten.

Pytho mit 1 Art: *P. depressus* (fig. 101 I), *Lissodema* mit 2 Arten, *Salpingus* mit 5 Arten, *Rhinosimus* mit 4 Arten: *Rh. ruficollis* (fig. 101 II).

Einzelbeschreibungen.

Lissodema, *Pytho*, *Rhinosimus* siehe Everts oben.

Salpingus Gabrielii n. sp. **Gerhardt** (Zeit. Ent. Bresl. 26. p. 18, D. ent. Z. p. 156) Schlesien. — *S. Vaulogeri* n. sp. **Abeille** (Bull. Fr. p. 234) Algier. — *S. basalis* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. 20. p. 195) Madagascar. — Siehe auch Everts oben.

Fam. *Mycteridae*.

Everts 2.

Systematik.

Umfassende Arbeit.

Everts.

Coleoptera Neerlandica. 70. Fam. *Pythidae*. III. Subf. *Mycterinae*.
(p. 332, 336).

Die Familie ist hier als Unterfamilie der *Pythoniden* behandelt und enthält nur die eine Gattung *Mycterus* mit 1 Art.

Fam. *Euglenidae*.

Everts 2, Pic 11a, 30, 38.

Systematik.

Umfassende Arbeit.

Everts.

Coleoptera Neerlandica. 68. Fam. *Anthicidae*.

1. Subf. *Hylophilinae*.

(p. 318—319).

Die Familie wird hier als Unterfamilie der *Anthicidae* behandelt. Sie enthält nur die eine Gattung *Eugenes* (die hier *Hylophilus* genannt ist) mit 3 Arten.

Einzelbeschreibungen.

Eugenes notatipennis n. sp. **Pic** (Ann. Belg. 1898 p. 262, 265), *Eu. suturifer* n. sp. (p. 262, 266), *Eu. gracilis* var. *pallidus* n. var. (p. 263, 268 *Xylophilus*). — *Eu. Donckieri* var. *differens* n. var. **Pic** (Ann. Fr. 1899 p. 757 *Xylophilus*). — *Eu. Marshallii* n. sp. **Pic** (Rev. Ent. 20 p. 96 *Hylophilus*) Süd-Afrika. — *Eu. (Pseudototelus* n. subg.) **Pic** (Ech. XVII p. 67) für *Eu. punctatissimus* Reitt. u. *Eu. curtipennis* **Pic**. *Eu. Brounii* n. nom. (p. 67) für *obscurus* Broun nec **Pic**, *Eu. (Emelinus) ramicornis* n. sp. (p. 67), *Eu. (Elonus) subcurvipes* n. sp., *Eu. (Pseudariotus) Gounellei* n. sp. u. *Eu. (Ariotus) triangularis* n. sp. (p. 68) Brasilien, *Eu. bipartitus* n. sp., *Eu. rufotestaceus* n. sp. u. *Eu. capitalis* n. sp. (p. 96 *Hylophilus*) Malabar. — Siehe auch Everts oben.

Ariotus, *Elonus*, *Emelinus*, *Hylophilus* siehe *Eugenes*.
Pseudariotus, *Pseudototelus*, *Xylophilus* siehe *Eugenes*.

Fam. Scaptiidae.

Everts 2, Pic 34.

Systematik.

Umfassende Arbeit.

Everts.

Coleoptera Neerlandica. 64. Fam. *Mordellidae*. *Scaptiinae*.
(p. 292—295).

Die *Scaptiinae* sind als Unterfamilie der *Mordelliden* behandelt und enthalten nur 1 Gattung, *Scaptia*, mit einer Art.

Einzelbeschreibungen.

Scaptia siehe Everts oben.

Trotommidea coreyrica n. sp. **Pic** (Ech. XVII p. 52) Corfu, *Tr. Baudii* n. sp. (p. 67) Sardinien.

Fam. Mordellidae.

Brunn 1, Everts 1, Kempers 1, Kolbe 1, Meijere 1, Sahlberg 8, Webster 3a.

Morphologie.

Meijere schilderte die Klauenbildung (p. 431).

Kempers (1) schilderte die Flügel von *Anaspis frontalis* (p. 35 tab. IV fig. 24) u. von *Mordella fasciata* (p. 35).

Biologie.

Webster (3a) gab eine biologische Notiz über die Larven der *Mordellistena pustulata* Melsh. in den Stengeln von *Ambrosia trifida* und der *M. limbalis* Melsh.

Brunn (1) schilderte die Larve einer exotischen *Mordella*-Art, die mittelst ihrer „beweglichen“ Dorsalpapillen auf dem Rücken kriechen kann.

Geographische Verbreitung.

Sahlberg (8) führte *Mordellistena Tournieri* Em. aus Finnland auf.

Systematik.

Kolbe (1) stellte die Familie neben die *Melandryiden*.

Umfassende Arbeit.

Everts.

Coleoptera Neerlandica. 64. Fam. *Mordellidae*. *Mordellinae*. (p. 292—305).

Pentaria mit 1 Art, *Cyrtanaspis* mit 1 Art, *Anaspis* mit 16 Arten, *Tomoxia* mit 1 Art, *Mordella* mit 4 Arten: *M. aculeata* (fig. 94 II), *Mordellistena* mit 8 Arten: *M. pumila* (fig. 94 I).

Einzelbeschreibungen.

Anaspis brumanensis n. sp. Pic (Bull. Autun XIII p. 28) Libanon. — Siehe auch Everts oben.

Cyrtanaspis, *Mordella* siehe Everts oben.

Mordellistena palaestina n. sp. Pic (Bull. Autun XIII p. 27) Jericho. — Siehe auch Everts oben.

Pentaria, *Tomoxia* siehe Everts oben.

Fam. Pedilidae.

Reitter 15, Ssemenow 10.

Systematik.

Umfassende Arbeiten.

Reitter.

Uebersicht der Coleopteren-Gattung *Pedilus* Fisch. der palaeartischen Fauna.

(Wien. ent. Zeit. XX p. 114—116).

Eine dichotomische Auseinandersetzung von 14 palaeartischen Arten, von denen 3 neu sind.

Die behandelten Arten.

Pedilus lividipennis Sem., *P. polycanthus* Sem., *P. Willbergii* Sem., *P. Zubovskii* Sem., *P. Weberi* n. sp. (p. 114) Krim, *P. rufipes* Motsch., *P. xanthopus* Sem., *P. laevicollis* n. sp. (p. 115) Ural, *P. tibialis* Sem., *P. constricticollis* Sem., *P. fuscus* Fisch., *P. tristis* Sem., *P. errans* Faust, *P. mongolicus* n. sp. (p. 116) Shangaigeb.

Ssemenow.

Synopsis praecursoria specierum hucusque cognitarum generis *Pedilus* Fisch. W.

(Hor. ross. 35 p. 261—265.)

Eine erneute dichotomische Tabelle, in welcher zu den 14 von Reitter auseinandergesetzten Arten, 2 neue hinzukommen.

Die hinzukommenden neuen Arten.

Pedilus canescens n. sp. (p. 258, 263) und *P. serricornis* n. sp. (p. 260, 263) Caucasus.

Fam. Anthicidae.

Csiki 1, Everts 2, Fairmaire 6, Kempers 1, Pic 10, 11a, 12, 13, 24a, 25, 29b, 30, 32, 37a, 38, 48b, 49, 50, 51, Reitter 32.

Morphologie.

Kempers (1) schilderte die Flügel von *Notoxus monoceros* (p. 36 tab. IV fig. 27).

Systematik.

Pic (13) gab als Fortsetzung seines 1894 publicirten Nachtrages zu Harold u. Gemminger, der 414 Arten enthielt, und seines Supplements hierzu von 1897 (mit 319 Arten) ein zweites Supplement mit den Publikationen von 1897—1900 (162 spp.), so dass im Ganzen 895 Arten seit 1870 publicirt worden sind.

Umfassende Arbeiten.

Everts.

Coleoptera Neerlandica. 68. *Anthicidae* II. Subf. *Anthicinae*. (p. 319—323).

Die Familie wird hier als Unterfamilie behandelt, indem die *Euglenidae* als andere Unterfamilie auftreten.

Die behandelten Gattungen und Arten.

Notoxus mit 3 Arten, *Anthicus* mit 13 Arten.

Pic.

Les Coléoptères *Anthicides* du centre de la France.

(Bull. Soc. Hist. nat. Mâcon 1899 p. 189—196, tab.).

Eine dichotomische Auseinandersetzung der in Central-Frankreich vorkommenden Arten, wo die bisher „fehlende“ Gattung *Formicomus* gewiss bald aufgefunden werden dürfte.

Die behandelten Gattungen und Arten.

Notoxus Geoffr. mit 3 Arten: *N. trifasciatus* Ross. var. *armatus* Schm. (tab. fig. 3),

N. brachycerus Fld. (fig. 1), *N. monoceros* L. var. *immaculatus* Pic (fig. 2).

Mecynotarsus Laf. mit 1 Art: *M. Rhinoceros* Fbr. (fig. 4).

Anthicus Payk. mit 16 Arten: *A. flavipes* Pz. var. *flavescens* n. var. (p. 193¹),

A. instabilis Sch. (fig. 8), *A. quadrioculatus* Laf. (fig. 9).

Ochthenomus Schm. mit 2 Arten.

Einzelbeschreibungen.

Anthicus Dugesii n. sp. **Pic** (Ann. Belg. 45 p. 90) Mexico, *A. postsignatus* n. sp. (p. 90) Uruguay. — *A. ustulatus* var. *lacustris* **Pic** (Ech. XVII p. 11) am toden Meer, *A. ataënsis* n. sp. (p. 34) Turkestan, *A. (Acanthinus) tucumanensis* n. sp. u. *A. Gounellei* n. sp. Südamerika, *A. jonicus* n. sp. (p. 52) Griechenland, *A. lacunosus* n. sp. u. *A. austriacus* n. sp. (p. 66) Europa, *A. quadrioculatus* Laf. var. *pedemontanus* n. var. (p. 66), *A. Joannis* n. sp. (p. 90) Bagdad, *A. nitidior* P. var. *bagdadensis* n. var. (p. 90) Bagdad, *A. crinitulus* Reitt. (p. 90), *A. Peringueyi* n. sp. u. *instygius* n. sp. (p. 95) Kap, *A. malabarensis* n. sp. u. *A. robustipes* n. sp. (p. 95) Malabar. — *A. rhodesianus* n. sp. **Pic** (Rev. Ent. 20. 1901 p. 99), *A. (Aulacoderus) Marshallii* n. sp. (p. 99) u. *A. tumefactus* n. sp. (p. 100) Süd-Afrika. — *A. viridipennis* var. *metallescens* n. var. (ibid. 18. 1899 p. 75). *A. subobscurus* n. sp. u. *A. Groultii* n. sp., **Pic** (Le Natural 1901 p. 37) Brasilien, *A. Busignyi* n. sp. u. *A. externemaculatus* n. sp. (p. 37) Sumatra. — *A. flavipes* Pz. var. *flavescens* **Pic** (Bull. Soc. Mâc. 1899 p. 193) Frankreich. — *A. fenestratus* Schm. var. *nigricans* n. var. u. var. *submaculatus* n. var. **Pic** (Misc. ent. 1898 p. 98) *A. cyanipennis* Gril. var. *Grilatii* n. var. (p. 99), *A. Henonis* **Pic** var. *quinquenotatus* (ibid.) 1899 p. 20²), *A. terminatus* Laf. nec Schm. = *notatus* **Pic** (*mutatus* **Pic** err. typ.) (ibid. 1901 p. 131). — *A. vittatus* Luc. var. *Hartliebii* n. var. **Pic** (Rev. Bourb. 1899 p. 174), *A. erro* Truq. var. *Lysholmii* n. var. (p. 174), *A. debilis* Laf. var. *Wegeneri* n. var. (p. 174). *A. armatus* Truq. var. *heluanensis* n. var. (p. 175), *A. gratiosus* n. sp. (p. 176) Orient, *A. Oertzenii* n. sp. (ibid. 14. 1901 p. 181) Samos. — *A. Drurei* n. sp. **Pic** (Bull. Autun XIV p. 37) Bagdad. — *A. subarmatus* n. sp. **Pic** (Bull. Mus. Par. 1899 p. 30). — *A. astrachanicus* n. sp. **Csiki** (Zichy Reise II p. 113), *A. Kuthyi* n. sp. (p. 113), *A. dauricus* n. sp. u. *A. Shishmareffii* n. sp. (p. 114) Mongolei.

¹) Ihren regelrechten Namen hat diese Varietät erst 1902 (Ann. Fr. 70 p. 167) bekommen; denn bei der Beschreibung von 1899 war sie bloss mit einer französischen Bezeichnung versehen.

²) Im Bericht pro 1899 p. 321 als var. *notatus* aufgeführt.

- Euproctus cinerarius* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 197) Madagascar.
Formicomus b'spiliifasciatus Pic var. *obscuripennis* n. var. **Pic** (Bull. Mus. Par. 1898 p. 67). — *F. mutillarius* Saund. var. *inapicalis* n. var. **Pic** (Rev. d'Ent. 1899 p. 106), *F. subinflatus* n. sp. (ibid. 1901 p. 97) u. *F. Marshallii* n. sp. (p. 97) Süd-Afrika. — *F. Thomsoni* n. sp. **Pic** (Ann. Belg. 45 p. 90) Ost-Indien.
Mecynotarsus Truquii Mars. var. *Lysholmii* n. var. **Pic** (Rev. Bourb. 1899 p. 172). — *M. Hornii* n. sp. **Pic** (D. ent. Z. p. 363) Ceylon.
Notoxus Dugesii n. sp. **Pic** (Ann. Belg. 45 p. 89) Central-Amerika. — *N. Gounellei* n. sp. **Pic** (Le Natural. 1901 p. 227) u. *N. venustus* n. sp. (p. 227) Süd-Amerika, *N. nigronotatus* n. sp., *N. Pentheri* n. sp. (p. 227), *N. pulcher* n. sp., *N. Simonis* n. sp., *N. nigricolor* n. sp. u. *N. Antinorii* n. sp. (p. 228) Süd-Afrika. — Siehe auch Everts pag. 232.
Ochthenomus coniceps n. sp. **Reitter** (D. ent. Z. p. 79) Bucharei.
Pristocyphus Fairm. scheint = *Hypaspistes* Wot. nach **Pic** (Bull. Fr. p. 364).
Pseudonotoxus n. gen. *brevis* n. sp. **Pic** (Feuill. Nat. 1899 p. 189).
Tomoderus Marshallii n. sp. **Pic** (Rev. Ent. 20 p. 98) Süd-Afrika. — *T. punctatus* n. sp. **Pic** (Ech. XVII p. 41), *T. impressipennis* n. sp. u. *T. obscuriceps* n. sp. (p. 41) Süd-Amerika. — *T. Perrieri* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 197) Madagascar.

Fam. *Pyrochroidae*.

Everts 1, Kempers 1, Kolbe 1.

Morphologie.

Kempers (1) schilderte die Flügel von *Pyrochroa coccinea* (p. 36 tab. IV fig. 26).

Everts.

Coleoptera Neerlandica. 67. Fam. *Pyrochroidae*.

Die kleine Familie, die nur aus einer Gattung, *Pyrochroa*, besteht, ist mit den 3 europäischen Arten behandelt.

Pyrochroa mit 3 Arten: *P. coccinea* fig. 97.

Fam. *Meloidae*.

Chobaut 1, Everts 2, Fall 4, Felt 1, Kempers 1, Meijere 1, Pic 1, 17, Roman 1, 24b, 24c, 30, 36, 48, Voigts 1.

Morphologie.

Meijere (1) schilderte die Klauenbildung der ausgebildeten Käfer (p. 432 tab. 32 fig. 49, 50) und die der Triungulinen (p. 433).

Kempers (1) schilderte die Flügel von *Lytta vesicatoria* (p. 36), *Cerocoma Schaefferi* (p. 36 tab. IV fig. 25).

Biologie.

Roman (1) berichtete, dass *Apalus bimaculatus* (als Larve) parasitisch bei *Colletes cunicularia* lebt.

Systematik.

Umfassende Arbeit.

Everts.

Coleoptera Neerlandica. 66. Fam. *Meloidae*.
(p. 307—315).

Die Familie wird in 2 Unterfamilien und in 3 Tribus mit 4 Gattungen dichotomisch zerlegt (p. 308—309).

Die behandelten Gattungen und Arten.

Meloë mit 8 Arten: *M. proscarabaeus* (fig. 96 I), *Lytta* mit 1 Art, *Cerocoma Schaefferi* (fig. 96 II), *Sitaris* mit 1 Art.

Fall.

Notes on *Dichelonycha* and *Cantharis* etc.

(Tr. Ann. ent. Soc. 27 p. 293—304).

Eine dichotomische Auseinandersetzung der nordamerikanischen Arten der Gattung *Lytta* (die hier *Cantharis* genannt ist), liegt in der genannten Arbeit vor, die dem Ref. leider nicht zugänglich war, so dass nur die neuen Arten aufgezählt werden können.

Die neuen Arten nach Sharp.

Lytta peninsularis n. sp., *L. margarita* n. sp. (p. 300), *L. morora* n. sp., *L. funerea* n. sp. (p. 301), *L. agrestis* n. sp., *L. stolidia* n. sp., *L. purpureascens* n. sp. (p. 302), *L. chloris* n. sp., *L. nigripilis* n. sp., *L. difficilis* n. sp., *L. infidelis* n. sp. (p. 303).

Einzelbeschreibungen.

Alosimus collaris Fbr. var. *semiobscurus* n. var. **Pic** (Misc. ent. 1898 p. 73).

Apalus sulcithorax n. sp. **Pic** (Ech. 17 p. 79) Syrien.

Cerocoma siehe Everts oben.

Epicauta cinerea abgebildet von **Felt** (Bull. N. York Mus. 37. VIII. p. 28 fig. 45),
E. vittata (fig. 46).

Lydus sulcicollis Ab. var. *luteipennis* n. var. **Pic** (Misc. ent. 1899 p. 115). -- *L. bitlisiensis* n. sp. **Pic** (Esch. 17. p. 34) Armenien.

Lytta siehe Everts u. Fall oben.

Meloë siehe Everts oben.

Mylabris Thomae n. nom. **Voigts** (Wien. ent. Zeit. XX p. 215 *Thomae*) für *M. distincta* Thom. 1898, nec Chevr. 1837, *M. Peringueyi* n. nom. (p. 215), für *M. distincta* Pering. 1888 nec Chevr. 1837, *M. egregia* n. nom. (p. 215) für *M. (Actenodia) villosa* Mars. 1872 nec Fähr. 1870, *M. Fahraei* n. nom. (p. 215) für *M. Wahlbergii* Mars. nec Fähr., *M. fulvicornis* n. nom. (p. 215) für *M.*

flavicornis Fähr. nec Fbr., *M. Deckenii* Gerst. = *Kerstenii* Gerst. var. (p. 215), *M. Fiesii* n. sp. (p. 215) Togo., *M. kilwana* n. sp. (p. 216) Ost-Afrika, *M. Escherichii* n. sp. (p. 216) Kamerun, *M. seminigra* n. sp. (p. 217) Sierra-Leone, *M. bifasciata* Ol. var. *conjuncta* n. var. (p. 217), *M. amplectens* Gerst. *sallaamina* n. var. (p. 218) Dar-es-salam, *M. (Decatoma) benuënsis* n. sp. (p. 218) Niger, *M. (Decat.) dolabrififormis* n. sp. (ibid. p. 218 *Zonabris*) Nyassa. — *M. suturalis* n. sp. **Pic** (Misc. ent. 1898 p. 2), *M. syriaca* Klg. var. *Leseleucii* n. sp. (p. 2), *M. algerica* n. sp. (p. 3), *M. circumflexa* Chvr. var. *Comtei* n. sp. (p. 3), *M. tenuipicta* Frm. var. *marsabensis* n. sp. (p. 3), *M. oraniensis* n. sp. (p. 3). — *M. Delagrangi* n. sp. **Pic** (Bull. Soc. Aut. 1899 p. 208), *M. elegans* Ol. var. *trijuncta* n. var. (208), *M. Caroli* n. sp. (p. 209). — *M. insignipennis* n. sp. **Pic** (Bull. Zool. 26. p. 77) Algier. — *M. scabiosae* Ol. var. *auliensis* n. var. **Pic** (Bull. Fr. 1901 p. 111 *Zonabris*), *M. khodjentic* Ball. var. *ataënsis* n. var. (p. 111) Turkestan. — *M. saharica* n. sp. **Chobaut** (Bull. Fr. p. 280) Sahara.

Sitaris siehe Everts pag. 235.

Zonabris siehe *Mylabris*.

Zonitis (Euzonitis) sexmaculata Ol. var. *subconjuncta* n. var. **Pic** (Ech. p. 79) Klein-Asien u. var. *pedemontana* n. var. (p. 79) Piemont, *Z. auricoma* Esch. var. *armeniaca* n. var. (p. 79), *Z. bifasciata* Sch. var. *iconiensis* n. var. (p. 79) Konia.

Fam. *Rhipiphoridae*.

Everts 1, Kempers 1.

Morphologie.

Kempers (1) schilderte die Flügel von *Emenadia flabellata* (p. 35).

Systematik.

Umfassende Arbeit.

Everts.

Coleoptera Neerlandica. 65. Fam. *Rhipiphoridae*.
(p. 305—307).

Die kleine Familie enthält nur eine Gattung (*Rhipiphorus*) mit 1 Art.

Einzelbeschreibungen.

Pelecotomoides siehe *Caspyria (Melandryidae)*.

Rhipiphorus siehe Everts oben.

Fam. *Strepsiptera*.

Vacat.

Fam. Curculionidae.

Abeille 2, Apfelbeck 2, Bedel 3, Blackburn 2, Chevalier 1, Chittenden 2, Csiki 1, 7, Desbrochers 1, 2, 4, 6, Dury 1, Fairmaire 4, 5, Fall 4, Felt 1, Fuente 1, Giard 2, Goethe 1, Heller 1, 2, Kew 1, Koebele 1, Kolbe 1, 2, Koningsberger 1, Lea 1, Lesne 1, Mac Dougall 1, Meijere 1, Paganetti-Hummeler 1, 2, Penecke 1, Petri 1, 2, Peyerimhoff & Deville 1, Pic 24b, 30, 37, 48, 48a, 48b, Pierre 1, Poppius 8, Reitter 1, 9, 19, 23, 26, 27, 28, 32, 33, 36, Sahlberg 8, Schilsky 1, 2, Schultze 1—7, W. Schulz 1, Scudder 1, Stierlin 1, 2, Strand 1, Tryon 1, Weise 6, Xamheu 1.

Morphologie.

Meijere schilderte die Klauenbildung von *Protocerus colossus* (p. 431 tab. 32 fig. 44), *Sitona lineata* (p. 432 fig. 51) und *Anoplus plantaris* (fig. 53).

Biologie.

Weise (6) schilderte die Cocons von *Phytonomus Arundinis* u. *Ph. Rumicis* (p. 85) u. **Kew** (1) besprach die Cocons verschiedener Curculioniden.

Mac Dougall (1) behandelte die Biology von *Pissodes*.

Xamheu (1) beschrieb die Eier von *Trachyphloeus scaber* (p. 9), *Brachyderes lusitanicus* (p. 32), die Larve von *Smicronyx cyaneus* var. *Lallemantii* (p. 19), die Larve u. die Puppe von *Magdalinus Cerosi* (p. 14) u. von *Nanophyes Telephii* (p. 64), ferner (3a) die Metamorphose von *Nanophyes*.

Felt (1) gab eine kurze Schilderung u. Abbildung der Larve u. Puppe von *Lixus concavus* (p. 30 fig. 52).

Kew (1) schilderte die von Curculioniden-Larven gefertigten Cocons.

Kolbe (2) beschrieb die Lebensweise von *Adamsonius fructuum* n. sp. (p. 321) aus den Früchten des Affenbrodbaumes.

Koningsberger (1) behandelte die Lebensweise von *Arachnopus* sp. (p. 99).

Chittenden (1) behandelte die Lebensweise u. Metamorphose von *Aramigus Fulleri* (p. 88—96) u. **Koebele** (1) gab Notizen über dieselbe Art.

Goethe (1) berichtete über *Foucartia squamulata*, *Phyllobius pomonae* u. *Eusomus ovulum* als Schädlinge der Reben.

Pierre (1) berichtete über Gallen, die durch *Gymnetron netum* u. (2) durch *Ceutorhynchus griseus* und *C. atomus* hervorgebracht werden.

Peyerimhoff & Deville (1) berichteten, dass die Larve von *Trachelomorphus Baudii* von den Wurzeln der *Saxifraga opposifolia* lebt.

Lesne (1) berichtete über die zahlreichen Pflanzen, in denen *Lixus algirus* lebt.

Giard (2) berichtete über die Larve von *Hypera pastinacae* var. *tigrina* u. den Schaden, den sie an *Daucus carota* verursacht, — und **Chevalier** (1) ebenso über die Larve von *Cleonus alternans* Herbst.

Ueber mehrere Arten am unteren Amazonenstrom berichtete **Schulz** (Berl. ent. Z. p. 332—333). — **Paganetti - Hummler** (1) gab eine Notiz über das Leben des *Trogloorhynchus Hummleri* (p. 405).

Geographisches.

Peyerimhoff & Deville berichteten über *Trachelomorphus Baudii* aus den Französischen Alpen.

Strand (1) zählte 3 *Apion*-Arten aus Norwegen auf, **Sahlberg** (8) nannte *Orchestes rufitarsis* und *Hypera punctata*, **Poppius** (8) *Otiiorhynchus raucus* aus Finnland.

Palaeontologie.

Scudder (1) beschrieb 1 neuen *Hyllobiites* aus Canada u. ferner (2) 1 *Erycus*, 3 *Anthonomus*, 1 *Orchestes*, 1 *Centrinus* n. spp. (Siehe Einzelb.).

Systematik.

Kolbe (1) sonderte die *Rhinomaceriden*, *Rhynchitiden*, *Apioniden* und *Brachyceriden* als selbstständige Familien ab und vereinigte die erstgenannten mit den *Anthribiden* zur Abth. A der *Rhynchophoren*, denen alle übrigen *Rhynchophoren* (excl. *Bruchiden*) als Abth. B gegenüber stehen.

Umfassende Arbeiten.

Desbrochers.

Tabula synoptica specierum Generis *Dorytomus*
Curculionidum.

(Frelon X p. 29—32).

Dichotom. Tabelle über 22 Arten.

1. Petri.

Monographie des *Coleopteren*-Tribus *Hyperini*. 1901
210 pp. 3 tabb.

(Herausgegeben vom Siebenb. Ver. Nat. Hermannstadt, aber nicht in den „Verhandlungen“ erschienen).

Eine Auseinandersetzung der Arten — der Gattungen *Bubalcephalus*, *Macrotarsus*, *Hypera*, *Phytonomus*, *Limobius* u. *Coniatus*

durch dichotomische Tabellen und ausführliche Beschreibungen. Die 6 Gattungen und *Lepidophorus* Krb. sind nur in der dichotomischen Tabelle (p. 4—6) charakterisirt, nachdem der systematische Werth der Merkmale (p. 2—4) besprochen worden; dazu auch die 8 Gattungen der *Cepurini* (*Cepurus*, *Cephalalges*, *Isorhinus*, *Tylopterus*, *Eurychirus*, *Chloropholus*, *Larinosomus*, *Phelypera*) nach Capimont, denen eine neue (*Fronto*) hinzugefügt ist, die aber fremdartig scheint.

Bei der Gatt. *Phytonomus* ist zuerst als „Uebersicht der Gruppen“ eine Eintheilung der 85 Arten in 3 Untergattungen mit zusammen 12 Gruppen gegeben (p. 108—111): subg. *Spongifer* n. subg. umfasst Gruppe I—IV mit 32 Arten, subg. *Heteromorphus* n. subg. umfasst Gruppe V mit nur 3 Arten und subg. *Phytonomus* i. sp. umfasst Gruppe VI—XII (irrthümlich V—XI) mit 50 Arten. Im weiteren Verlauf der Arbeit sind aber diese 3 Untergattungen, wie es scheint, wieder ganz aufgegeben, wenigstens werden sie nicht mehr als Untergattungen behandelt. Nur *Heteromorphus* wird in der Arten-Tabelle noch einmal, aber nicht nachdrücklicher als die vom Autor verworfene Untergattung *Donus* Cap., erwähnt (p. 114). Leider steht die Arten-Tabelle in wesentlichen Angaben mit der erwähnten „Uebersicht der Gruppen“ in direktem Widerspruch. *Phyt. Pastinacae* und *Poupillieri* zeigen am letztgenannten Ort (p. 109) das Merkmal „Schuppen tief ausgerandet“, in der Art-tabelle aber (p. 113) schwach ausgerandete Schuppen. Was ist nun die eigentliche Meinung des Autors?

Zwei allgemeine Vorwürfe können der fleissigen Monographie nicht erspart werden, da sie leicht zu vermeiden gewesen wären. Erstens die neue Manier, die mit dem wohlbegründeten Brauche der gesammten bisherigen deutschen entomologischen Litteratur bricht und in gehorsamer Nachahmung englischer Mode, unbekümmert um orthographische Regeln, und unbekümmert um sinnwidrige Störungen, alle Species-Namen klein schreibt. Unbekannt ist dem Autor die richtige Schreibweise keineswegs; denn in seiner fast gleichzeitig erschienenen „Bestimmungstabelle“ hat er sie angewandt. Warum nicht auch in der Monographie?

Zweitens sind die zahlreichen neuen Arten nur zum geringsten Theil als solche richtig mit „nov. sp.“ bezeichnet. Weit häufiger tragen sie den Autornamen „Petri“, was die Annahme erwecken muss, Petri habe sie schon früher beschrieben, während es sich in der That um neue, d. h. unbeschriebene Arten handelt. Folgerichtig hat denn auch Sharp in seinem Record nur 3 *Macrotarsus*, 17 *Hypera* u. 15 *Phytonomus* als neue Arten genannt, während es in Wirklichkeit 8 *Macrotarsus*, 23 *Hypera* u. 17 *Phytonomus* sind, die ich durch freundliche Mittheilung des Autors als Neuheiten (ohne Gewähr meinerseits) aufzuführen in der Lage bin. Möglicher Weise sind noch mehr neue Arten unter den mit „Reitter“ oder „Faust“ bezeichneten Namen verborgen, die der Autor verschiedenen Sammlungen entnahm, ohne ihre Beschreibungen zu kennen. Die zahlreichen, im Text zertretenen, leider vielfach sehr misslungenen Fi-

guren sind zum Schluss auf 3 Tafeln nochmals übersichtlich zusammengestellt, was ein lobenswerthes Verfahren ist.

Die behandelten Gattungen u. Arten.

Fronto nov. gen. (p. 4, 7) *bimaculatus* n. sp. (p. 8) Sibirien.

Bubalocephalus mit 2 Arten.

Macrotarsus mit 19 Arten (p. 10—11), v. d. 8 neu: *M. setosus* n. sp. (p. 10, 12) Bucharei, *M. hirtus* n. sp. (p. 10, 13) Mongolei, *M. gracilis* n. sp. (p. 10, 14) Tian-Schan, *M. elongatus* n. sp. (p. 11, 16) Altai, *M. altaicus* n. sp. (p. 11, 18) Altai, *M. Kolbei* n. sp. (p. 11, 19) Sibirien, *M. cuprifer* n. sp. (p. 10, 21) Altai, *M. inflatus* n. sp. (p. 11, 23) Mongolei¹⁾.

Hypera mit 93 Arten (p. 25—35), v. d. 23 neu: *H. Gordyaea* n. sp. (p. 29, 39) Kurdistan, *H. latifrons* n. sp. (p. 29, 42), Caucasus, *H. callosa* n. sp. (p. 29, 47) Jerusalem, *H. bosnica* n. sp. (p. 29, 49) Bosnien, *H. Lydia* n. sp. (p. 29, 50) Kleinasien, *H. Capiomontis* n. sp. (p. 29, 51) Parnass, *H. rugulosa* n. sp. (p. 30, 35) Amur, *H. nivosa* n. sp. (p. 30, 56) Bosnien, *H. Ganglbaueri* n. sp. (p. 30, 59), Cserna prst, *H. minuta* n. sp. (p. 31, 66) Siebenbürgen, *H. virescens* n. sp. (p. 31, 68) Bosnien, *H. solida* n. sp. (p. 32, 70) Bucharei, *H. duplopunctata* n. sp. (p. 31, 72) Herzegowina, *H. maculosa* n. sp. (p. 32, 74) Kleinasien, *H. cordicollis* n. sp. (p. 32, 75) Kleinasien, *H. Korbii* n. sp. (p. 32, 82) Sierra Newada, *H. quadratocollis* n. sp. (p. 33, 85) Sierra Newada, *H. longicollis* n. sp. (p. 32, 86) Lusitanien, *H. fumana* n. sp. (p. 33, 90) Fiume, *H. judaica* n. sp. (p. 34, 98) Jerusalem, *H. Faustii* n. sp. (p. 34, 104) Syrien, *H. Amalek* n. sp. (p. 34, 105) Syrien, *H. Reitteri* n. sp. (p. 34, 106) Syrien.

Phytonomus mit 85 Arten (p. 108—119), v. d. 17 neu: *Ph. (Spongifer)* n. subg. p. 108 mit 32 sp.) *Apfelbeckii* n. sp. (p. 112, 123) Bosnien, *Ph. Rogenhoferi* Ferr. var. *cretaceus* n. var. u. var. *caesius* n. var. (p. 132) Banat u. Türkei, *Ph. tenuicornis* n. sp. (p. 122, 137) Kaukasus, *Ph. carinaerostris* n. sp. (p. 114, 138) Caspi-Meer-Gebiet, *Ph. validus* n. sp. (p. 114, 139) Caucasus, *Ph. turcomanus* n. sp. (p. 115, 143) Turkestan, *Ph. (Heteromorphus)* n. subg. p. 109 mit 3 sp.) *campestris* n. sp. (p. 114, 148), Transcaspien, *Ph. tripolitanus* n. sp. (p. 114, 149) Tripolis, *Ph. (Phytonomus)* i. sp. p. 109 mit 50 Arten) *tenuirostris* n. sp. (p. 115, 157) Obersyrien, *Ph. triangularis* n. sp. (p. 116, 159) Sicilien, *Ph. Schusteri* n. sp. (p. 117, 166) Steiermark, *Ph. dentatus* n. sp. (p. 117, 167) Bosnien, *Ph. Gestronis* n. sp. (p. 117, 169) patria?, *Ph. Frivaldskyi* n. sp. (p. 118, 170) Mehadia, *Ph. transsylvanicus* n. sp. (p. 119, 183), Siebenbürgen u. Wien, *Ph. immundus* n. sp. (p. 119, 188) Kleinasien, *Ph. cumanus* n. sp. (p. 118, 190) Ungarn.

Limobius mit 2 Arten (p. 192). — *Coniatus* mit 9 Arten (p. 193—194).

2. Petri.

Bestimmungstabelle der europ. Coleopt. 44. Curculionid. Hyperini. Paskau 1901. 42 pp.

Ein Auszug der dichotomischen Tabellen aus der grösseren Monographie der paläarktischen Arten des Autors über die Gattungen

¹⁾ *M. mysticus* ist nach briefl. Mittheilung des Autors von Faust beschrieben worden und die Angabe „i. lit.“ (p. 24) eine irrthümliche.

Macrotarsus, *Hypera*, *Phytonomus* u. *Coniatus*. Die Arten sind nur von Subtrib. *Hyperides* behandelt, während von Subtrib. *Cepurides* nur die 11 Gattungen nach Capiomont auseinandergesetzt sind, von denen eine (*Fronto*) als neu bezeichnet ist, jedoch ohne Angabe ihres Inhaltes. Die Gattung *Limonius* fehlt in der Tabelle der Gattungen, und auch die Gatt. *Eurychirus* Wat. ist fortgelassen. Im Uebrigen stimmt die Gattungstabelle mit der in der Monographie gegebenen überein. Besser aber wären sämtliche *Cepurinen* fortgelassen worden. Die Species-Tabellen stimmen mit denen der Monographie fast ganz überein, nur bringen sie stellenweis ausführlicher die letzte Auseinandersetzung nahestehender Arten, die in den Tabellen der Monographie nicht unterschieden waren. Die Eintheilung von *Phytonomus* in Untergattungen und Gruppen (Mon. p. 108—111) ist nicht wiedergegeben.

Vortheilhaft zeichnet sich die „Bestimmungstabelle“ vor der „Monographie“ durch richtige Schreibart der Speciesnamen aus.

Pic.

Curculionides d'Arabie.

(Ech. 17. p. 87--88).

Unter obigem Titel verbirgt sich eine dichotomische Auseinandersetzung von 5 Arten der Gattung *Aomus*, die von Tournier als *Elytrodon* n. spp. i. lit. benannt, aber nicht beschrieben waren, was der Autor verschweigt.²⁾ Ebenso wenig erfährt man, wo und wann die var. *brunnescens* Pic beschrieben wurde. Oder soll es vielleicht eine nov. var. sein? Dann hätte sie mit „nov. var.“ aber nicht mit „Pic“ bezeichnet werden müssen.

Die behandelten Arten.

Aomus minutissimus n. sp., *A. elongatus* n. sp., *A. politus* mit var. *brunnescens* n. var. (?) (p. 87), *A. similis* n. sp. u. *A. subdentatus* n. sp. (p. 88) Arabien.

1. Reitter.

1. Uebersicht der *Coeliodes*-Arten aus dem Coleopteren-subgenus *Cidnorhinus* Thoms.
2. Uebersicht der *Coeliodes*-Arten aus der Coleopteren-Gattung *Allodactylus* Wse aus der palaeartischen Fauna. (Wien. ent. Zeit. XX p. 86—88, 129—130).

Diese beiden dichotomischen Auseinandersetzungen hätten mit Vortheil zu einer Arbeit vereinigt werden können, wobei der Titel

²⁾ Nicht nur verschweigt der Autor diesen Umstand, sondern erweckt durch Hinzufügung des Namens „Tournier“ bei jeder Art geradezu die falsche Voraussetzung, dass sie von Tournier beschrieben sei. Nur durch brieflich erbetene Aufklärung konnte dieses falsum aufgeklärt werden. Sharp hat die Arten folgerichtig ignorirt.

weniger räthselhaft und weniger widerspruchsvoll zu gestalten gewesen wäre. Auch hätten die beiden Untergattungen charakterisirt werden sollen. Schultze z. B. will sie anders umgrenzen.

Uebersicht der behandelten Arten.

Coeliodes (Cidnorhinus) radula Hoch., *C. asperulus* Fsch., *C. Kaufmannii* n. sp. (p. 86) Ungarn, *C. rhinoncoides* n. sp. (p. 86, 87) Turkestan, *C. (Allodactylus) exiguus* Ol., *C. asperatus* Gyll., *C. macrasper* n. sp. (p. 130) Croatien, *C. fallax* Boh., *C. affinis* Payk., *C. transversicollis* Fst., *C. simplicicollis* n. sp. (p. 130) Ost-Sibirien, *C. Weisei* Rtt. gehört zu *Ceutorhynchus* subg. *Thomiocohus* (p. 129 Anm.).

2. Reitter.

Bestimmungs-Tabelle der europäischen *Tropiphorini* und *Alophini*.

(Wien. ent. Zeit. XX p. 203—214).

Eine dichotomische Auseinandersetzung der *Tropiphorus*-Arten (p. 203—207) und dann der Gattungen *Rhytidoderes*, *Alophus*, *Seidlitzia* und *Trachelomorphus* (p. 207—208) und ihrer Arten (p. 208—214).

Die behandelten Gattungen und Arten.

Tropiphorus micans Sch. mit var. *obesus* Fauv., *Tr. tomentosus* Marsh. (= *cinereus* Boh. = *tricristatus* Stierl. = *serdicanus* Dan.), *Tr. obtusus* Bousd. (= *pedemontanus* Strl. = *longicollis* Strl.), *Tr. caesius* Strl., *Tr. carinatus* Müll. (= *mercurialis* Fbr. = *abbreviatus* Strl.), *Tr. alophoides* Dan., *Tr. transylvanicus* Dan., *Tr. serbicus* n. sp. (p. 206) Serbien, *Tr. Bertolinii* Stierl., *Tr. globatus* Hrbst., *Tr. styriacus* Bed. (= *carinatus* Sch. nec Müll.), *Tr. ochraceosignatus* Sch., *Tr. cucullatus* Fauv.

Rhytidoderes plicatus Ol. mit var. *siculus* Sch.

Alophus nictitans Sch. (= *foraminosus* Strl. = *hebraeus* Strl. = *syriacus* Strl.), *A. squamiventris* n. sp. (= *nictitans* Reitt. 1894 nec Sch.) (p. 209) Griechenland, *A. agrestis* Sch. mit var. *armeniacus* Hochh., *A. asturiensis* Strl., *A. Hilfi* n. sp. (p. 210) Herzegowina, mit var. *Apfelbeckii* n. var. (p. 211) Bosnien, *A. Van Schrank*. (= *triguttatus* Reitt. 1894 nec Fbr.) mit var. *Weberi* Pen., var. *carpathicus* Reitt., var. *subcarinatus* Reitt., var. *uniformis* Reitt., var. *pseudelegans* n. nom. (p. 212) für *A. elegans* Reitt. 1894 nec Stierl., *A. triguttatus* Fbr. (= *obsoletus* Reitt.), *A. Kaufmannii* Stierl. mit var. *puncticollis* n. var. (p. 213) Krain, var. *Stierlinii* Reitt., var. *elegans* Stierl., var. *Sequentis* n. var. (p. 213) Croatien, *A. austriacus* Otto.

Seidlitzia maroccana Fairm.

Trachelomorphus Baudii Seidl.

Schilsky.

Küster, Käfer Europas. 38. 1901.

Eine umfassende Bearbeitung der paläarktischen *Apionen*, die hier begonnen und dadurch sehr vorthellhaft eingeleitet wird, dass

die ganze Gattung dichotomisch in 9 Untergattungen zerlegt ist (p. E—H), von welchen die ersten 8 zusammen nur 53 Arten enthalten, die alle ausführlich beschrieben werden, während die letzte (*Apion* i. sp.) deren über 450 umfassen wird, von denen zunächst nur 47 behandelt werden konnten; denn 100 ist die Normalzahl für jeden Band des unglücklich (als Sammlung von Einzelbeschreibungen) angelegten Küster'schen Werkes, das sich indess unter Schilsky's geschickter Bearbeitung sehr vortheilhaft zu einer Reihe von umfassenden Monographien umwandelt. Mit der durch nichts gerechtfertigten Zahl 100 sollte nun endlich auch gebrochen werden; denn die Gebrauchsfertigkeit einer Arbeit hängt doch nicht von der Arten-Zahl, sondern von den dargebotenen dichotomischen Auseinandersetzungen ab. So lange diese fehlen, bleibt selbst die beste Arbeit schwer benutzbar.

Die behandelten Untergatt. u. Arten.

- Apion* (*Onychapion* n. subg. p. E) mit 3 Arten: *A. Tamaricis* Gyll., *A. Poupillieri* Wenk., *A. pumilo* Desbr.
- A.* (*Phrissotrichium* n. subg. p. F) mit 7 Arten: *A. velatum* Gerst. (= *aerugineum* Kirsch = *helianthemi* Bed.), *A. Grenieri* Desbr., *A. rugicolle* Germ., *A. Perrisii* Wenk., *A. Revellieri* Perr., *A. tubiferum* Sch. mit var. *sicanum* Wenk., *Wenkeri* Bris.
- A.* (*Ceratapion* n. subg. p. F) mit 19 Arten: *A. carduorum* Kirb., *A. armatum* Gerst., *A. uniseriatum* Fst., *A. angulirostre* n. sp. (no. 14) Bucharei, *A. decolor* Desbr. mit var. *brevithorax* Desbr., *A. onopardi* Krb., *A. pilicorne* Desbr., *A. penetrans* Germ., *A. distans* Desbr. mit var. *spathula* Desbr. u. var. *subcaviceps* Desbr., *A. robusticorne* Desbr., *A. similans* n. sp. (no. 21) Ungarn, Dalmatien, Anatolien, *A. sareptanum* Desbr., *A. detritum* Rey mit var. *subsquamiferum* Desbr., *A. nitens* n. sp. (no. 24) Algier, *A. stolidum* Germ., *A. confluens* Kirb. mit var. *crenulatum* Desbr. u. var. *asiaticum* Desbr., *A. brunnipes* Sch., *A. sulcifrons* Hrbst., *A. Stevenii* Sch.
- A.* (*Exapion* Bed.) mit 11 Arten: *A. fuscirostre* Fbr., *A. elongatissimum* Desbr., *A. subparallelum* Desbr., *A. fulvum* Desbr., *A. Genistae* Kirb. (= *bivittatum* Gerst. = *funiculare* Muls.), *A. compactum* Desbr. (= *Genistae* Reitt.), *A. Ulicis* Forst., *A. uliciperda* Pand., *A. elongatum* Desbr. (= *longulum* Desbr.), *A. difficile* Herbst., (= *germanicum* Desbr., *A. corniculatum* Grm. (= *difficile* aut.).
- A.* (*Omphalapion* n. subg. p. G.) mit 4 Arten: *A. laevigatum* Payk., *A. extinctum* Kr. (= *Buddebergii* Bed.), *A. Hookeri* Kirb., *A. dispar* Germ. (= *Beuthinii* Hoffm.).
- A.* (*Oxytoma* Dum.) mit 6 Arten: *A. ochropus* Germ., *A. opeticum* Bach, *A. subulatum* Kirb. (= *Marshamii* Steph.), *A. cracciae* L., *A. cerdo* Gerst., *A. pomonae* Fbr.
- A.* (*Aspidapion* n. subg.) mit 2 Arten: *A. radiolus* Kirb., (= *aterrimum* Mars. = *oxyrurum* Kirb. = *aneum* Payk.) mit var. *ferruginipes* Wenk., *A. validum* Germ.
- A.* (*Alocentron* n. subg.) mit 1 Art: *A. curvirostre* Sch.

A. (i. sp.) mit zahlreichen Arten: *A. rubens* Steph. (= *algericum* Ev.), *A. sanguineum* Deg., *A. frumentarium* Payk. (= *haematodes* Kirb.) mit var. *occultans* Fst., *A. cruentatum* Walt., *A. minutum* Grm., *A. Horvathii* Schls., *A. aciculare* Grm. (= *pulchellum* Mill.), *A. simum* Grm., *A. curtirostre* Grm., *A. Lemoronis* Bris., *A. sedi* Grm., *A. brevirostre* Hrbst., *A. Marseullii* Wenk., *A. marchicum* Hrbst., *A. affine* Kirb. (= *aterrimum* Redtb.), *A. Hydrolapathi* Marsh., *A. violaceum* Krb. mit var. *virescens* n. var. (no. 70), var. *obscurum* Gerh. u. var. *alpinum* Desbr., *A. aeneum* Fbr. mit var. *chalceum* Marsh., *A. Artemisiae* Mor., *A. Limonii* Krb., *A. Chevrolatii* Sch. mit var. *carbonarium* Ev. u. var. *aenescens* n. var. (no. 74), *A. Truquii* Reich., *A. difforme* Abr. mit var. *tibiale* Desbr., *A. assimile* Grm. (= *heterocerum* Thoms.), *A. dentipes* Gerst. (= *armiferum* W. = *tubicen* W.), *A. gracilipes* Dietr., *A. nigrifemur* Krb. (= *Waterhousei* Sch.), *A. flavipes* Payk. (= *dichromum* Bed.) mit var. *maculicoxis* Desbr., var. *coxae* Desbr. u. var. *Lederi* Kirsch., *A. politum* Desbr., *A. Schönherrii* Sch., *A. laevicollis* Krb., *A. onanicola* Bach, *A. varipes* Grm., *A. apricans* Hrbst., *A. assimile* Krb. (= *incertum* Desbr.), *A. aestivum* Grm. mit var. *ruficus* Grm., var. *hipponense* Desbr. u. var. *Lindleri* W., *A. filirostre* Krb. (= *morio* Gyll.), *Kuenburgii* Reitt., *A. cretaceum* Rosh., *A. argentatum* Gerst. (= *squamigerum* Duv.) mit var. *nigrifemur* Desbr., *A. Malvae* Fbr., *A. urticarium* Hrbst., *A. distinctirostre* Desbr., *A. rufescens* Sch. mit var. *pallidulum* Sch., *A. semivittatum* Sch. mit var. *separandum* Aub., *A. Korbii* n. sp. (no. 99) Transcaspien, *A. insidiosum* Desbr.

Einzelbeschreibungen.

- Acalles Paulmeyeri* n. sp. **Reitter** (D. ent. Z. p. 184) Turkestan. — *A. rubetra* Er. besprach **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. 25 p. 31). — Siehe auch *Cryptorhynchus*.
- Adansonius* n. gen. (*Cryptorhynchini*) **Kolbe** (Allg. Zeit. Ent. VI p. 323), *A. fructuum* n. sp. (p. 394) Deutsch-Ostafrika.
- Alcides ceylonensis* n. sp. **Heller** (D. ent. Z. p. 344) u. *A. inermis* n. sp. (p. 345) Ceylon.
- Allodactylus* siehe *Coeliodes* u. **Reitter** pag. 242.
- Alocentron* siehe **Schilsky** pag. 243.
- Alophus Weberi* n. sp. **Penecke** (Wien. ent. Zeit. XX p. 19) Obersteiermark. — Siehe auch **Reitter** pag. 242.
- Alphitodes* n. gen. (bei *Sitones*) *indutus* n. sp. **Fairmaire** (Ann. Belg. 45 p. 215) Madagascar.
- Alsirhinus bilineatus* n. sp. **Fairmaire** (Ann. Belg. 45 p. 232) u. *A. histrio* n. sp. (p. 233), Madagascar.
- Anaptoplus* n. gen. (bei *Synaptoplus*) *Cottae* n. sp. **Fairmaire** (Ann. Belg. 45 p. 221) u. *A. convexifrons* n. sp. (p. 222) Madagascar.
- Anthonomus eversus* n. sp. **Scudder** (Geol. Surv. Canad. II. 2. p. 88 tab. XIII fig. 6), *A. fossilis* n. sp. (p. 88 tab. XIII fig. 7), *A. lapsus* n. sp. (p. 89 tab. XIII fig. 5) fossil in Canada.
- Aphiocephalus planicollis* n. sp. **Fairmaire** (Ann. Belg. 45 p. 240) Madagascar.
- Apion Henschii* n. sp. **Reitter** (Wien. ent. Zeit. XX p. 226) Herzegowina, *A. fortipubens* n. sp. (p. 226), *A. lobirostre* n. sp. (p. 227) u. *A. pseudarrojans*

- n. sp. (p. 227) Turkestan, *A. auletoides* n. sp. (p. 228) Ordubad. — *A. acrirostre* n. sp. **Desbrochers** (Frel. IX p. 77) Jericho, *A. oranense* n. sp.¹⁾ (p. 77, ibid. VII 1898 p. 35) Oran, *A. angustius* n. sp. (p. 78, ibid. VII 1898 p. 35) Lagonat, *A. subcrenulatatum* n. sp. (p. 79) Morières, *A. flavicrus* n. sp. (p. 80) Tanger, *A. Normandii* n. sp. (p. 81, ibid. VII 1898 p. 36) Tunis, *A. Meyeri* n. sp. (p. 82) Hamburg, *A. vicinum* var. *sulcithorax* n. var. (p. 82) Hamburg, *A. curtulum* var. *frontale* n. var. (p. 83) Genua. — *A. dentirostre* Gerst. von *carduorum* verschieden nach **Schilsky** (D. ent. Z. p. 365), *A. millum* Bach von *A. flavimanum* unterschieden (p. 367), *A. heterocerum* Thoms. = *dissimile* Germ. ♀ (p. 367), *A. medianum* Thoms. = *humile* (p. 367), *A. corniculatum* Germ. von *difficile* verschieden (p. 367), *A. germanicum* Desbr. = *corniculatum* Germ. (p. 367). — *A. Horvathii* n. sp. **Schilsky** (Term. Füz. 24. p. 153) Armenien. — *A. pisi* var. *Kossmannii* n. var. **Gerhardt** (Zeit. Ent. Bresl. 26. p. 17, D. ent. Z. p. 158) Schlesien. — *A. singhalense* n. sp. **Heller** (D. ent. Z. p. 341) Ceylon. — Siehe auch **Schilsky** pag. 243.
- Aplemonus dromedarius* n. sp. **Fairmaire** (Not. Leyd. Mus. 23 p. 75) Madagascar.
- Aprinus* siehe *Gymnetron*.
- Arammichnus* siehe *Otiorhynchus*.
- Araophila* n. gen. *cyphothorax* n. sp. **Heller** (Abh. Dresd. X. 2. p. 9) Neu-Guinea.
- Aspidapion* siehe **Schilsky** pag. 243.
- Assuanensius* n. gen. **Pic** (Bull. Autun XIII p. 29) für *Anthonomus discoidalis* Tourn.
- Auletes procerus* n. sp. **Reitter** (D. ent. Z. p. 83) Bucharei.
- Bagous robustior* n. sp. **Pic** (Bull. Autun XIII p. 29) Mersina, *B. pallidipes* n. sp. (p. 30) Libanon.
- Baris Perrieri* n. sp. **Fairmaire** (Ann. Belg. 55 p. 236), *B. temüstriga* n. sp., *B. suturata* n. sp. p. 237) u. *B. fusciventris* n. sp. (p. 238) Madagascar. — *B. Gudeni* n. sp. **Schultze** (Verh. Zool. bot. Ges. Wien 1901 p. 212, *Gudenusi*) mit var. *purpurascens* n. var. (p. 213) bei Wien. — *B. auliensis* n. sp. **Reitter** (D. ent. Z. p. 81) Turkestan, *B. perlucida* n. nom. für *B. dalmatina* Reitt. ol. (p. 192). — *B. striatocollis* n. sp. **Heller** (D. ent. Z. p. 348) u. *B. bivittata* n. sp. (p. 349) Ceylon. — *B. ignifer* n. sp. Fuente (Bol. Soc. esp. I p. 134) Spanien. — *B. Berthieri* n. sp. **Pic** (Bull. Autun XIII p. 29) Beirut.
- Belus viridimetallicus* n. sp. **Heller** (Abh. Dresd. X. 2. p. 16) Neu-Britannien.
- Brachycyrtus apicicornis* n. sp. u. *minor* n. sp. **Fairmaire** (Ann. Belg. 45 p. 220) Madagascar.
- Brachyrhinus* siehe *Otiorhynchus*.
- Bubalocephalus* siehe **Petri** pag. 240.
- Camptorhinus euchromus* n. 11 u. *fuliginosus* n. sp. **Fairmaire** (Ann. Belg. 45 p. 231) Madagascar. — Siehe auch *Cryptorhynchus*.
- Carterorhinus* n. gen. (*Brachyderides*) **Perrieri** n. sp. **Fairmaire** (Ann. Belg. 45 p. 222). u. *C. major* n. sp. (p. 223) Madagascar.
- Cataphractus elongatus* n. sp. **Heller** (Abh. Dresd. X. 2. p. 11) Neu-Guinea.

¹⁾ *A. oranense*, *angustius* u. *Normandii* sind schon 1898 in Anmerkungen kurz und so versteckt angedeutet worden, dass sie übersehen werden mussten, Sie werden daher jetzt nachträglich als n. spp. aufgeführt,

- Catapionus calvus* n. sp. **Reitter** (D. ent. Z. p. 183) Thian-Schan.
- Cathormiocerus densestriatus* n. sp. **Reitter** (Wien. ent. Zeit. XX p. 201) Toledo.
- Centrinus disjunctus* n. sp. **Sudder** (Geol. Surv. Canad. II. 2. p. 89 tab. XIII fig. 3) fossil in Canada.
- Cephalalgae*, *Cepurus* siehe Petri pag. 239.
- Ceutorhynchidius Spurnyi* n. sp. **Schultze** (D. ent. Z. p. 98) Süd-Tyrol, Begründung der Gattung (p. 98).
- Ceutorhynchus* (*Thamiocolus*) *Schultzeanus* n. sp. **Reitter** (D. ent. Z. p. 81) Bucharei, in diese Untergatt. gehört auch *Coeliodes Weisei* Reitt. (p. 129 Anm.). — *C. edentulus* Schltz. ♂ beschrieb **Schultze** (D. ent. Z. p. 58), *C. globicollis* Schltz. besprochen (p. 58), *C. sulcatus* Bris. bei Wien, von *canaliculatus* verschieden (p. 59), *C. venedicus* Ws. von *C. Euphorbiae* unterschieden (p. 59), *C. praeclarus* Schltz. = *Paszlavzkyi* Kuth. var. (p. 60), *C. Dohrnii* Fst. (*Coeliodes*) bildet mit *C. denticulatus* Schrk. u. *verrucatus* Gyll. eine Gruppe (p. 57), *C. imperialis* Schl. var. *Sieversii* n. var. (p. 94) u. var. *pulchellus* Schlz. 1896 (p. 95) Caucasus, *C. subfasciatus* Chvr. var. *nigrovittatus* n. var. (p. 95) Algier, *C. effrons* Fst. var. *pictarsis* n. var. (p. 96) Cairo, *C. italicus* Bris. var. *concolor* n. var. (p. 96) Tunis, *C. consputus* Germ. var. *libanoticus* n. var. (p. 96) Libanon, *C. Korbii* n. sp. Klein-Asien, *C. Splichalii* n. sp. (p. 102) Turkestan, *C. orbiculatus* n. sp. (p. 103) Angora, *C. calcaratus* n. sp. (p. 104) Anatolien, *C. Chobantii* n. sp. (p. 105) Algier, *C. iconiensis* n. sp. (p. 107) Konia, *C. spinicrus* n. sp. (p. 109) Bosnien, *C. ignicollis* n. sp. (p. 109) Algier, *C. deplanatus* n. sp. (p. 110) Turkmanien, *C. frater* n. sp. (p. 111) Algier, *C. flexirostris* n. sp. (p. 112) Algier.
- Chalcocybeus Massutei* n. sp. **Heller** (Abh. Dresd. X. 2. p. 16) Neu-Guinea.
- Chazarius* n. gen. (bei (*Aularhinus*) *inaequalis* n. sp. **Fairmaire** (Ann. Belg. 45 p. 230) Madagascar.
- Chlorastus Perrieri* n. sp. **Fairmaire** (Ann. Belg. 45 p. 209) Madagascar.
- Chloropholus* siehe Petri p. 239. — *Cidnorhinus* siehe *Coeliodes* u. **Reitter** p. 242.
- Cionus Donckieri* n. sp. **Pic** (Misc. Ent. 1898 p. 4).
- Coeliodes strigatirostris* Hochh. gehört zu *Oxyonyx* nach **Schultze** (D. ent. Z. p. 57), *C. Dohrnii* gehört zu *Ceutorhynchus*, *C. proximus* Schltz. von *C. simulans* Fst. verschieden (p. 64), *C. rubricus* Gyll. var. *murinus* n. var. (p. 93) Caucasus, *C. trifasciatus* var. *siculus* n. var. (p. 93) Sicilien, *N. rubicundus* Hrbst. var. *rubricollis* n. var. (p. 93) Caucasus, *C. plagiatus* Desbr. = *ruber* Marsh. var. *C. (Cidnorhinus) quadrimaculatus* var. *nigrotibialis* n. var. (p. 94), *C. strigirostris* n. sp. (p. 97) Caucasus, *C. (Allodactylus) Thomsonis* n. sp. **Schultze** (D. ent. Z. p. 100) Nord-China, Unterscheidung der Untergattungen *Allodactylus* u. *Cidnorhinus*, die der Autor „Gattungen“ nennt (p. 100). — Vergl. auch **Reitter** pag. 242.
- Coniaticrus* n. gen. (bei *Coniatus*) *euchromus* n. sp. **Reitter** (Wien. ent. Zeit. XX p. 162 tab. IV fig. 7) Transcaspien.
- Coniatus* siehe Petri pag. 240.
- Corigetus (Eusomidius) auliensis* n. sp. **Reitter** (D. ent. Z. p. 80) Turkestan, *C. setulifer* n. sp. (p. 182) Turkestan.
- Cratopopsis mauritanus* n. sp. u. *cribratus* n. sp. **Fairmaire** (Ann. Belg. 45 p. 219) Madagascar. — *Cr. centromaculatus* var. *subnotatus* n. var. **Pic** (Ech. 17. p. 82) Beirut.

Cryphiphorus siehe *Otiorynchus*.

Cryptorhynchus solidus Er. u. *inflatus* Er. bilden 1—2 neue Gattungen nach **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. 25. p. 30). — *Cr. dromedarius* Boisd. (= *Protopalus Stephensis* Boh.) nach **Lea** (Pr. Linn. Soc. N. S. Wales 26. p. 538 tab. XXX fig. 1—2), *Cr. lithodermus* Boisd. = *Poropterus varicosus* Pasc. (p. 538 fig. 3—4), *Cr. fuliginosus* Boisd. (= *Acalles immansuetus* Boh. = *Omydaus plinthoides* Pasc.) (p. 538 fig. 5—7), *Cr. ephippiger* Boisd. = *Camptorhinus* (p. 538 fig. 9—10).

Cycloteres paleatus n. sp. **Fairmaire** (Ann. Belg. 45 p. 224) Madagascar.

Cyclomaurus medianus n. sp. **Pic** (Frel. VI 1898 p. 42, 47¹).

Cyphogonus albosuturatus n. sp. **Fairmaire** (Ann. Belg. 45 p. 234) u. *C. atomus* n. sp. (p. 235) Madagascar.

Degorsia n. gen. (*Hadronomini*) **Bedel** (Bull. Fr. p. 359), *D. Champenoisii* n. sp. (p. 359) Frankreich.

Dereodus sparsus Boh. var. *prasina* n. var. **Heller** (D. ent. Z. p. 340) Ceylon.

Desmidophorus floccosus n. sp. **Fairmaire** (Ann. Belg. 45 p. 225) u. *D. rufovellus* n. sp. (p. 226) Madagascar.

Dorytomus dorsalis Hrbst. var. *basithorax* n. var. **Pic** (Ech. 17 p. 80). — Siehe auch *Desbrochers* pag. 238.

Drongis n. gen. (bei *Erirhinus Perrieri*) n. sp. **Fairmaire** (Ann. Belg. 45 p. 228) Madagascar.

Dryophthorus laticauda n. sp. **Fairmaire** (Ann. Belg. 45 p. 241) Madagascar.

Echinocnemus nereis Faust 1899 = *tychioides* Fairm. 1898 (*Erirhigous*) nach **Fairmaire** (Ann. Belg. p. 229).

Elassophilus elegantulus n. sp. **Heller** (D. ent. Z. p. 346) Ceylon.

Elauto bius n. gen. (*Rhynchitini*) **Heller** (D. ent. Z. p. 342) *Hornii* n. sp. (p. 343, fig.) Ceylon.

Epiphylax scabricollis n. sp. **Fairmaire** (Ann. Belg. 45 p. 238), *E. lineicollis* n. sp., *E. obscuratus* n. sp. u. *E. cervinopictus* n. sp. (p. 239) Madagascar.

Eremnus aequalis n. sp. **Fairmaire** (Ann. Belg. 45 p. 223) u. *E. bidentulus* n. sp. (p. 224) Madagascar.

Erirhigous Fairm. 1898 = *Echinocnemis* Sch. nach **Fairmaire** (Ann. Belg. 45 p. 229).

Erycus consumptus n. sp. **Scudder** (Geol. Surv. Canad. II. 2. p. 87 tab. XIII fig. 1, 2) fossil in Canada.

Etheadomorpha n. gen. (*Erirhinini*) **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. 25. p. 29), *clauda* n. sp. (p. 30) Victoria.

Eusomidius siehe *Corigetus*. — *Eurychirus* siehe *Petri* pag. 239.

Euthyphasis funerea n. sp. **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. 25. p. 26) Australien.

Exapion siehe *Schilsky* pag. 243.

Flamingorhynchus n. gen. **Heller** (Abb. Dresd. X. 2. p. 18), *Weiskei* n. sp. (p. 19) Neu-Guinea.

Foucartia Henschii n. sp. **Reitter** (Wien. ent. Zeit. XX p. 200) Slavonien.

Fronto siehe *Petri* pag. 240.

¹) Im Bericht pro 1898 p. 294 ist irrthümlich *Desbrochers* als Autor der Art genannt.

- Gonipterus reticulatus* Boisd. (= *Oxyops cancellata* Boh.) nach **Lea** (Pr. Linn. Soc. N. S. Wales 26. p. 539 tab. XXX fig. 11—14), *G. notographus* Boisd. (p. 539 fig. 15—16).
- Gymnetron semirubrum* var. *rubrofemoratum* n. var. **Pic** (Misc. ent. 1899 p. 141). — *G. (Aprinus) coreyrcum* n. sp. **Pic** (Ent. XVII p. 58) Corfu.
- Gymnopholus* n. gen. *Weiskei* n. sp. **Heller** (Abh. Dresd. X. 2. p. 8) Neu-Guinea).
- Heteronus elegans* n. sp. **Fairmaire** (Ann. Belg. 45 p. 240) Madagascar.
- Hylobiites cretaceus* n. sp. **Scudder** (Geol. Surv. Canada II. 1. 1895 p. 30 tab. II fig. 5) fossil in Canada.
- Hypera*, *Hyperini* siehe Petri pag. 240.
- Iphiomus Perrieri* n. sp. **Fairmaire** (Ann. Belg. 45 p. 226) und *I. viridisparvus* n. sp. (p. 227) Madagascar.
- Isaniris cribripennis* n. sp. **Fairmaire** (Ann. Belg. 45 p. 227) Madagascar.
- Isorhinus*, *Larinosomus* siehe Petri pag. 239.
- Larinus multiguttatus* n. sp. **Reitter** (D. ent. Z. p. 80) Transcaspien.
- Lepidophorus* siehe Petri pag. 239.
- Limnobaris Sahlbergii* n. sp. **Reitter** (D. ent. Z. p. 82) Turkestan.
- Limonius* siehe Petri pag. 240.
- Liothenus* n. gen. (bei *Psilocaulus*) *latevittatus* n. sp. **Fairmaire** (Ann. Belg. 45 p. 244) Madagascar.
- Lixis concaus* abgebildet von **Felt** (Bull. N. York Mus. 37. VIII. p. 30 fig. 52).
- Macrotarsus* siehe Petri pag. 240.
- Magdalis barbata* abgebildet von **Felt** *ibid.* (p. 22 fig. 33).
- Mandalotus rigidus* Er. = *crudus* Er. ♀ nach **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. 25. p. 27), *M. vetulus* Er. = *sterilis* Er. (p. 28).
- Metialma semisuturata* n. sp. **Fairmaire** (Ann. Belg. 45 p. 233) u. *M. curvirostris* n. sp. (p. 234) Madagascar. — *M. fulvirostris* n. sp. **Heller** (D. ent. Z. p. 347) Ceylon.
- Micrelus ericae* Gyll. var. *rufescens* n. var. **Schultze** (D. ent. Z. p. 94).
- Mononychus ireos* Pall. var. *interruptus* n. var. **Schultze** (D. ent. Z. p. 61) West-Sibirien, *M. punctum-album* Hrbst. var. *interponens* n. var. (p. 61) Südeuropa, zahlreiche synonymische Berichtigungen (p. 61—63), Verzeichniss der Arten u. Varietäten (p. 64).
- Mustelinus* n. gen. (bei *Ischnotrachelus*) **Fairmaire** (Ann. Belg. 45 p. 215), *Perrieri* n. sp. (p. 216) Madagascar.
- Nanophycs pleuralis* n. sp. **Fairmaire** (Ann. Belg. 45 p. 242), *N. fasciolatus* n. sp., *N. tesseraula* n. sp. (p. 242) u. *N. perelegans* n. sp. (p. 243) Madagascar. — *N. albicollis* n. sp. **Fairmaire** (Not. Leyd. Mus. 23. p. 76) u. *N. ornatus* n. sp. (p. 76) Madagascar. — *N. hemisphaericus* var. *lineatithorax* n. var. **Pic** (Ech. XVII p. 18) Caucasus u. var. *turkestanicus* n. var. (p. 19) Turkestan, *N. maculatus* Trn. var. *modicenotatus* n. var. (p. 19) Egypten, *N. auliensis* n. sp. (p. 90) Turkestan.
- Nemonyx scutellatus* n. sp. **Abeille** (Bull. Fr. p. 234) Algier. — *N. semirufus* n. sp. **Pic** (Misc. ent. 1898 p. 74, 113).
- Nosorhinus* n. gen. (*Baridiini*) *cuneatus* n. sp. **Fairmaire** (Ann. Belg. 45 p. 235) Madagascar, *N. gabonensis* n. sp. (p. 236) Congo, *N. orientalis* n. sp. (p. 236) Singapor.

- Ocalius seriefoveatus* n. sp. **Fairmaire** (Ann. Belg. 45 p. 229) Madagascar.
- Omphalapion* siehe Schilsky pag. 243.
- Omphasus Nalandae* n. sp. **Heller** (D. ent. Z. p. 344) Ceylon.
- Omydaus* siehe *Cryptorhynchus*.
- Onychapion* siehe Schilsky pag. 243.
- Orchestes Letournauxii* n. sp. **Pic** (Ech. XVII p. 11) Egypten, *O. Loniceræ* Hrbst. var. *sabaudus* n. var. (p. 86) Savoiën. — *O. avus* n. sp. **Scudder** (Geol. Surv. Canad. II 2 p. 89 tab. XIII fig. 4).
- Ospilia brevirostris* n. sp. **Heller** (D. ent. Z. p. 348) Ceylon.
- Otiiorhynchus (Cryphiphorus) molytoides* n. sp. **Reitter** (Wien. ent. Zeit. XX p. 24) Albanien. — *O. pseudonothus* n. sp. **Apfelbeck** (Verh. Zool. bot. Ges. Wien 1901 p. 533, 535) Alpen, dich. Tab. über 6 sp. aus der Verwandtschaft des *O. armadillo* (p. 535), *O. travnikanus* Stierl. = *pyrenaicus* (p. 533), *O. alutaceus* Germ. u. seine system. Stellung (p. 535–537), *O. cardinigeroides* Reitt., *O. gyllippus* Reitt. = *O. spalatrensis* Sch. varr. (p. 537–538), die 20 spp. von *O. i.* sp. verzeichnet (p. 539–540). — *O. epiroticus* n. sp. **Apfelbeck** (Mitth. Bosn. VIII p. 466) u. *O. peristericus* n. sp. (p. 466) Epirus. — *O. claviger* n. sp. **Penecke** (Wien. ent. Zeit. XX p. 17) Tauern, *O. stenorostris* Apfelb. bei Graz (p. 18), *O. Apfelbeckii* Strl. in Steiermark (p. 19). — *O. Fussianus* n. sp. **Csiki** (Term. Füzet. XXIV p. 489 fig. a) Siebenbürgen. — *O. Bagnolii* n. sp. **Stierlin** (Mitth. Schw. X p. 364) Neapel, *O. (Arammichnus) carinulatus* n. sp. (p. 365) Algier, *O. (Aramm.) Jaquetii* n. sp. (p. 365 u. Bul. Buch. IX p. 760) Bucharest, *O. (Tournieria) rufitarsis* n. sp. (p. 366) Syrien. — *O. pascurum* n. sp. **Peyerimhoff** (Ab. XXX p. 60 *Brachyrhinus*) Basses-Alpes. — *O. (Tournieria) Eduardi* n. sp. **Pic** (Ech. XVII p. 4) Türkei.
- Ocystoma* siehe Schilsky pag. 243.
- Pachomyx Perrieri* n. sp. **Fairmaire** (Ann. Belg. 45 p. 231) u. *P. seriatus* n. sp. p. 232) Madagascar.
- Pachytychius Poncyi* n. sp. **Stierlin** (Mitth. Schw. X p. 366 u. Bul. Buch. IX p. 761) Bucharest. — *P. hierosolymus* n. sp. **Desbrochers** (Ab. IX p. 84) Jerusalem.
- Pantomorus Olindæ* Perk. = *Aramigus Fulleri* nach **Chittenden** (Bull. Dep. Agr. Ent. 27 p. 88).
- Pantorhytes papillosus* n. sp. **Heller** (Abh. Dresd. X, 2 p. 11), *P. corallifer* n. sp., *P. rasmus* n. sp. (p. 12), *P. vibicifer* n. sp. u. *P. albopunctulatus* n. sp. (p. 13) Neu-Guinea, *P. Salomonis* n. sp. (p. 13) Salomon-Inseln, dich. Tab. der Arten p. 14.
- Parasphenogaster* n. gen. *gracilicollis* n. sp. **Heller** (ibid. p. 15) Neu-Guinea.
- Peleropus dentatus* n. sp. **Fairmaire** (Ann. Belg. 45 p. 229) Madagascar.
- Perperus languidus* Er. = *innocerus* Sch. nach **Blackburn** (Tr. R. S. Soc. Austr. 25 p. 28), *P. convexipennis* n. sp. (p. 28) Australien.
- Phellocaulus* n. gen. (bei *Proictidius*) **Fairmaire** (Ann. Belg. 45 p. 213) *gibbicollis* n. sp. (p. 214) Madagascar.
- Phelypera* siehe Petri pag. 239.
- Pholicodes alternans* n. p. **Reitter** (D. ent. Z. p. 182) Thian-Schan.
- Phrissotrichium* siehe Schilsky pag. 243.
- Phrystanus* n. gen. (bei *Stigmatrachus*) **Fairmaire** (Ann. Belg. 45. p. 218) *tribulus* n. sp. (p. 219) Madagascar.

- Phyllobius aetolicus* n. sp. **Apfelbeck** (Mitth. Bosn. VIII p. 467) Aetolien.
Phytobius Hartmannii n. sp. **Schultze** (D. ent. Z. p. 97) Nord-China.
Phytonomus siehe Petri pag 240.
Piazocaulus n. gen. (bei *Piazomius*) **Fairmaire** (Ann. Belg. 45 p. 217) *nossi-bianus* n. sp. (p. 218) Madagascar.
Picia distinctipennis n. sp. **Pic** (Ech. XVII p. 58) Bagdad.
Platytrachelus ovis n. sp. **Heller** (D. ent. Z. p. 341) Ceylon.
Polydrosus Dodonaeus n. sp. **Apfelbeck** (Mitth. Bosn. VIII p. 468).
Procas Milleri n. sp. **Pic** (Bull. Autun XIV p. 37) Syrien, *Pr. semihispidus* n. sp. (p. 38) Damas.
Proictes hystrix n. sp. **Fairmaire** (Ann. Belg. 45 p. 210), *Pr. asper* n. sp. (p. 210), *Pr. Coquerelii* n. sp. (p. 211), *Pr. Alluaudii* n. sp. (p. 211) u. *Pr. vittulatus* n. sp. (p. 212) Madagascar.
Proictidius n. gen. (bei *Proictes*) **Fairmaire** (Ann. Belg. 45 p. 212) *maculosus* n. sp. (p. 213) Madagascar.
Protopalus, *Protopterus* siehe *Cryptorhynchus*.
Psilocaulus n. gen. (bei *Derelomus*) *nigrinasus* n. sp. **Fairmaire** (Ann. Belg. 45 p. 243) Madagascar.
Ptochus albanicus n. sp. **Apfelbeck** (Mitth. Bosn. VIII p. 467) Epirus.
Rhadinocyba aenea n. sp. **Heller** (Abh. Dresd. X. 2. p. 17), *Rh. splendida* n. sp. (p. 17) u. *Rh. nigricollis* n. sp. (p. 18) Neu-Guinea.
Rhinomias austriacus Reitt. u. *forticornis* Sch. besprach **Penecke** (Wien. ent. Zeit. XX p. 19).
Rhinoncus guttalis Grav. var. *Lysholmii* n. var. **Pic** (Bull. Soc. Aut. 1899 p. 260, Misc. ent. 1899 p. 116). — *Rh. bruchoides* Hrbst. var. *chinensis* n. var. **Schultze** (D. ent. Z. p. 94) Nord-China, *Rh. guttalis* Grav. var. *rufofemoratus* n. var. (p. 94) Südeuropa, *Rh. bosnicus* Schlz. bei Wien (p. 208).
Rhinoscapha chloropunctata n. sp. **Heller** (Abh. Dresd. X. 2 p. 9) u. *Rh. impexa* n. sp. (p. 10) Neu-Guinea.
Rhyncolus nigripes n. sp. **Reitter** (D. ent. Z. p. 184) Turkestan.
Rhytidoderes siehe Reitter pag. 242.
Scythropus albidus n. sp. u. *Sc. miscix* n. sp. **Fall** (Tr. Ann. ent. Soc. 27 p. ?) Nord-Amerika.
Secania n. gen. (bei *Calandra*) **Fairmaire** (Ann. Belg. 45 p. 240), *cruralis* n. sp. (p. 241) Madagascar.
Seidlitzia siehe Reitter pag. 242.
Sibinia attalica var. *judaea* n. var. **Pic** (Ech. 17. p. 82) Palaestina.
Sympiezomias Kraatzii n. sp. **Heller** (D. ent. Z. p. 340) Ceylon.
Tanymecus morosus n. sp. **Fairmaire** (Ann. Belg. 45 p. 216) u. *T. costulicollis* n. sp. (p. 217) Madagascar.
Throgonius n. gen. (bei *Proictidius*) *paleatus* n. sp. **Fairmaire** (Ann. Belg. 45 p. 214) Madagascar.
Thylacites hirsutus n. sp. **Fuente** (Bol. Soc. esp. I p. 133) Spanien.
Tournieria siehe *Otiorhynchus*.
Trachelomorphus siehe Reitter pag. 242.
Trachyploeus orbipennis n. sp. **Desbrochers** (Frel. IX p. 136) Portugal.
Tropiphorus siehe Reitter pag. 242.

- Tychius Mozabitus* n. sp. **Pic** (Misc. ent. 1898 p. 4), *T. Caroli* n. sp. (p. 98). —
T. modestus Tourn. var. *subinterruptus* n. var. **Pic** (Ech. 17 p. 80) Syrien. —
T. (Ectatotychnus) herculeanus n. sp. **Reitter** (D. ent. Z. p. 185) Thian-Schan.
 — *T. mongolicus* n. sp. **Csiki** (Zichy Reise II p. 114) Urga.
- Tylopterus* siehe Petri pag. 239.
- Typhloglymma* n. gen. (bei *Dryotribus puteolatum* n. sp. **Dury** (Journ. Cincinn. Soc. XIX. p. 243).
- Zantes holoxanthus* n. sp. **Fairmaire** (Ann. Belg. 45 p. 224) u. *Z. rufosparsus* n. sp. (p. 225) Madagascar.
- Zopyrinus* n. gen. (bei *Cratoparis*) **Fairmaire** (Not. Leyd. Mus. 23 p. 76) *tuberosus* n. sp. (p. 77).

Fam. *Scolytidae*.

Barbey 1, 2, Brandes 1, Hopkins 3, 4, Knoche 1, 2, Kolbe 1, Mac Dougall 2, Reitter 24, Schröder 1, Xambeu 1.

Anatomie.

Schröder (1) untersuchte das Genitalorgan des ♂ von *Scolytus*.

Biologie.

Mac Dougall (2) behandelte die Biology von *Scolytus multi-striatus*.

Brandes (1) u. **Knoche** (1, 2) geriethen ob der Publication der Lebensweise einiger *Tomiciden* in persönlichen Streit.

Barby (1, 2) behandelte die Biologie der centraleuropäischen Arten.

Xambeu (1) beschrieb die Länge und die Gruppe von *Tomicus amitinus* (p. 54).

Paleontologie.

Hopkins (4) beschrieb die Fraassgänge von *Phloeosinus squalidens* Scudd. (p. 91—92 tab. XIV, XV).

Systematik.

Kolbe (1) sonderte die *Platypiden* als besondere Familie ab.

Umfassende Arbeit.

Barbey.

1. Les *Scolytides* de l'Europe centrale.
2. Die *Bostrichiden* Central-Europas. Uebers. v. Carl.

Eine übersichtliche Darstellung des über die Familie der Scolytiden in Central-Europa bekannt gewordenen Materials, besonders für Forstleute zum praktischen Gebrauch geeignet. Dichotomische Bestimmungstabellen (p. 15—28), Uebersicht nach Holzarten (p. 19—32)

sind gegeben, aber in den breit angelegten ausführlichen Beschreibungen vermisst man trotz Raumüberflusses jegliche Literatur-Angaben, wodurch der Gebrauch für wissenschaftliche Zwecke sehr beeinträchtigt ist.

Dendroctonus piceiperda n. sp. **Hopkins** (U. S. Dep. Agr. Ent. Bull. 28 p. 16 tab. II) Nord-Amerika.

Phloeosinus Henschii n. sp. **Reitter** (Wien. ent. Zeit. XX p. 201) Herzegowina.

Pityophthorus Buyssonis n. sp. **Reitter** (Wien. ent. Zeit. XX p. 101) Anatolien.

Thammurgus Petzii n. sp. **Reitter** (Wien. ent. Zeit. XX p. 182) Ober-Oestreich in krautartigen Pflanzen.

Fam. *Proterhinidae*.

Kolbe 1.

Kolbe (1) vereinigte die Familie mit den *Brachyceriden* in eine Gruppe, ohne sie von ihnen zu unterscheiden.

Fam. *Anthribidae*.

Blackburn 2, Fairmaire 4, 6, Gerhardt 3, 6, Jordan 2, Kolbe 1, Masaraky 1, Poppius 3, Vauloger 1.

Geographische Verbreitung.

Poppius (3) berichtete über die Einschleppung von *Araocerus fasciculatus* in Finnland.

Systematik.

Kolbe (1) vereinigte die Familie mit den *Rhinomacariden* zur Abth. A. der *Rhynchophoren*, der alle übrigen *Rhynchophoren* (excl. *Bruchiden*, die zu den *Anchistopoden* kommen) gegenüberstehen.

Einzelbeschreibungen.

Acorymus Conradtii n. sp. **Jordan** (D. ent. Z. p. 371) Kamerun.

Afrocedus simplex n. sp. **Jordan** (D. ent. Z. p. 371) Kamerun, siehe auch *Peltothrinus*.

Apatenia analis n. sp. **Jordan** (D. ent. Z. p. 369) u. *A. stigmatica* n. sp. (p. 369) Kamerun.

Batyrhinius n. gen. **Fairmaire** (Rev. Ent. 20 p. 202) *latifrons* n. sp. (p. 203) Madagascar.

Brachylaenus n. gen. **Kraatzii** n. sp. **Jordan** (D. ent. Z. p. 373) Kamerun.

Brachytarsus constrictus Stierl. von *Br. scapularis* Gebh. spezifisch verschieden nach **Masaraky** (Hor. ross. p. XXXVII), jedoch nur Färbungsunterschiede erwähnt.

Canaristes dorsatus n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. 20 p. 203) Insel Mauritius.

- Choragus Sheppardii* var. *nitidipennis* n. var. **Gerhardt** (Zeit. Ent. Bresl. 26 p. 17, D. Ent. Z. p. 158) Schlesien.
- Gulamentus pardalis* n. sp. **Jordan** (D. ent. Z. p. 372) u. *G. sellatus* n. sp. (p. 373) Kamerun.
- Hypseus* (?) *elongatus* n. sp. **Jordan** (D. ent. Z. p. 370) Kamerun.
- Litocerus anatinus* n. sp. **Jordan** (D. ent. Z. p. 371), *L. socius* n. sp. (p. 372) u. *L. infans* n. sp. (p. 372) Kamerun.
- Mylascopus* n. gen. *zebrinus* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. 20 p. 202).
- Nessiabrissus similis* n. sp. **Jordan** (D. ent. Z. p. 370) Kamerun.
- Peltorhinus latirostris* Kolbe (1895) = *Afrocedus episternalis* Jord. (1894) nach **Jordan** (D. ent. Z. p. 371).
- Phaenotherion africanum* n. sp. **Vauloger** (Bull. Fr. p. 233) Algier.
- Pseudocedus* n. gen. **Fairmaire** (Not. Leyd. Mus. 23. p. 74), *costulatus* n. sp. (p. 75) Madagascar.
- Tophoderes griseipes* n. sp. **Fairmaire** (Rev. ent. 20. p. 199) u. *griseovarius* n. sp. (p. 200) Madagascar.
- Trachycyphus* n. gen. *Cottae* n. sp. **Fairmaire** (ibid. p. 201) Madagascar.
- Tropideres musivus* Er. bildet 1 neue Gattung nach **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. 25. p. 31).

Fam. *Bruchidae*.

Bedel 4, Champion 4, Felt 1, Fleutiaux 2, Kolbe 1, Pic 38, 48a.

Biologie.

Fleutiaux (2) berichtete über den Schaden, den 1 *Bruchus* sp. an *Voandzeia subterranea* anrichtet (p. 181—182).

Felt (1) gab eine kurze Beschreibung und Abbildung der Larve u. der Puppe von *Bruchus obtectus* (p. 40 fig. 73).

Systematik.

Kolbe (1) stellte die Familie zwischen die *Cerambyciden* und *Chrysomeliden* und entfernte sie auf Grund der Gularnähte von den *Rhynchophoren*.

Umfassende Arbeiten.

Bedel.

Fauna des Coléoptères du bassin de la Seine.

V. *Phytophaga. Lariidae* p. 357—366.

(Beilage der Ann. Soc. ent. Fr. 1901).

Der Schluss der Familie *Bruchidae*, die der Autor jetzt *Lariidae* nennt. Auch der Anfang der Familie p. 341—356 ist zwar erst 1901 erschienen, lag jedoch den (verspätet erschienenen) Lieferungen der Annalen von 1900 bei und wurde daher schon im vorigen Jahresbericht genannt, aber noch nicht eingehend analysirt.

Die Familie wird in 2 Tribus geteilt, *Rhaebini* und *Lariini* (p. 342¹⁾). Die erstere für die Gattung *Rhaebus*, die nur erwähnt ist, aus der zweiten sind die Arten von *Bruchus* (als *Laria*) und *Spermophagus* eingehend behandelt, d. h. erst dichotomisch auseinander gesetzt (p. 343—354), dann nach Litteratur und Vorkommen erörtert (p. 355—366).

Die behandelten Gattungen und Arten

Bruchus mit 27 Arten (p. 343—354), v. d. 1 var. neu: *Br. affinis* Fröhl. var. *monticola* n. var. (p. 348) Algier.

Spermophagus mit 2 Arten (p. 354).

Einzelbeschreibungen.

Bruchus Millingenii n. sp. **Pic** (Bull. Autun XIII p. 31) Mesopotamien, *Br. spiniger* Baud. var. *rubrithorax* n. var. (p. 31) Jericho. — Mehrere britische und importirte Arten besprach **Champion** (Ent. Mont. Mag. 37. p. 144—145). — *Br. obtectus* u. *Br. pisorum* abgebildet von **Felt** (Bull. N. York Mus. 37. VIII. p. 40, 41, fig. 73, 74). — Siehe auch Bedel oben.

Caryopemon signaticolle n. sp. **Pic** (Ech. XVII p. 96) Madagascar.

Fam. *Brenthidae*.

Kolbe 1.

Kolbe (1) betonte (p. 142) zweimal die „Uebereinstimmung“ der *Brenthiden* mit den *Apioniden* (verwachsenes 1. u. 2. Abdominalsegment), benutzte sie aber nicht, um sie den *Apioniden* zu nähern, sondern verband sie (p. 144) näher mit den *Brachyceriden* und *Proterhiniden*, was entschieden unnatürlich ist.

Fam. *Cerambycidae*.

Beare 1, Bedel 2, 4, Belón 5, Bickhardt 1, Blackburn 2, Csiki 1, Dierckx 1, Daggett 1, Everts 1, 2, Fairmaire 1, 2, 4, 6, Felt 1, Gahan 1, Giard 1, Heller 1, Jakowleff 3, 4, Koenig 1, Kolbe 1, 6, Koningsberger 1, Lameere 2, Lampa 3, Lauffer 1, Martinez 1, 2, Monnot & Houlbert 1, Nicolas 1, Oberthür 1, Pic 6, 18, 29, 30, 34, 52, Reitter 8, 32, 33, 34, Ritsema 3, W. Schulz 1, Ssemenow 1, 2, 7, Villard 1, Viturat 1, Waterhouse 1, 2, Xambeu 2.

Morphologie.

Everts (2) bildete den Flügel von *Clytus arcuatus* nach Redtenbacher ab (p. 339 fig. 106).

Everts (1) besprach die Duftdrüsen von *Aromia moschata*.

¹⁾ Die Unterscheidung der beiden Tribus ist jedoch verfehlt, indem die Trochanteren-Bildung der *Rhaebini* irrthümlich den *Lariini* zugeschrieben ist u. umgekehrt.

Biologie.

Bedel (3) berichtete über die Lebensgewohnheiten von *Pseudomyrmecion* und über die Aehnlichkeit mit *Crematogaster*.

Viturat (1) berichtete über die Lebensweise von *Vesperus strepens*.

Xambeu (2) setzte die Bearbeitung der Larven fort, über die nach Schluss derselben referirt werden soll.

Everts (2) besprach die Larven der Familie im Allgemeinen (p. 339—340).

Ueber mehrere Arten am unteren Amazonenstrom berichtete **Schulz** (Berl. ent. Z. p. 333—335).

Koningsberger (1) berichtete über die Lebensweise von *Stenias franciscanus* (p. 89).

Daggett (1) berichtete über die Larve und die Puppe von *Prionus californicus*.

Felt (1) gab eine Abbildung der Larve von *Saperda tridentata* (p. 22 fig. 32) und eines Fraasstückes von *Plagionotus speciosus* (p. 20 fig. 27).

Bedel (5) brachte beim Abschluss des V. Bandes Nachträge zu den *Cerambyciden*, wobei 1 *Cortodera* n. var. beschrieben wurde (p. 367—382). Siehe Einzelbeschr.

Missbildungen.

Donkier (1) besprach eine Missbildung bei *Ptycholaemus* sp. (p. 174), und **Giard** (1) eine ähnliche bei *Prionus californicus* u. *Pr. coriaceus* (p. 199).

Geographisches.

Leptidia brevipennis als in England einheimisch zu betrachten nach **Beare** (Ent. Month. Mag. 37. p. 2).

Lampa (3) führte *Notorrhina muricata* aus Schweden auf (p. 160).

Systematik.

Kolbe (1) sonderte die *Prioniden* als besondere Familie aus, die er den Familien *Cerambyciden*, *Bruchiden* und *Chrysomeliden* gegenüberstellt.

Lameere (2) gab Notizen über die Verwandtschaft mehrerer *Prioniden* - Gattungen und zum Schluss eine Aufzählung von 81 Gattungen, die in 6 Tribus und 15 Gruppen vertheilt sind.

Pic (52) gab 1) Eine Liste der 1900 u. 1901 beschriebenen Arten u. verschiedene Notizen (p. 4—9), 2) Beschreibungen mehrerer Arten u. Varietäten, die neu zu sein scheinen, obgleich sie nicht als neu bezeichnet sind (p. 9—14), 3) Notizen (p. 15—19), 4) Ueber *Apatophysis* (p. 19—22), 5) Eine dichot. Tabelle über *Acmaeops* (p. 22—25), 6) Ueber *Pidonia* u. *Cortodera* (p. 25—27), 7) Notizen über chinesische u. japanische Arten (p. 27—29), 8) Ueber *Rham-*

nusium (p. 29—31), 9) Notizen u. 1 n. sp. (p. 32), 10) Fortsetzung des „Catalogue“ von 1900 (p. 67—74).

Pic (29) gab einige kurze systematische Notizen (dem Ref. nicht zugänglich).

Umfassende Arbeiten.

Everts.

Coleoptera Neerlandica. 71. Fam. *Cerambycidae*.
(p. 336—386).

Die Familie wird dichotomisch in 3 Unterfamilien und 5 Tribus (p. 340—341) und dann werden ebenso 52 Gattungen auseinander-gesetzt.

Die behandelten Gattungen und Arten.

Spondylis mit 1 Art: *Sp. buprestoides* (fig. 103 I u. II), *Prionus* mit 1 Art: *Pr. coriarius* (fig. 102), *Ergates* mit 1 Art, *Aegosoma* mit 1 Art.

Rhagium mit 4 Arten, *Rhamnusium* mit 1 Art, *Toxotus* mit 2 Arten, *Oxy-mirus* mit 1 Art, *Gaurotes* mit 1 Art, *Acmacops* mit 1 Art, *Cortodera* mit 1 Art, *Pidonia* mit 1 Art, *Grammoptera* mit 1 Art, *Allosterna* mit 1 Art, *Leptura* mit 21 Arten, *Necydalis* mit 2 Arten.

Caenoptera mit 2 Arten, *Stenopterus* mit 1 Art, *Callimus* mit 1 Art, *Obrium* mit 2 Arten, *Leptidea* mit 1 Art, *Gracilia* mit 1 Art, *Hesperophanes* mit 1 Art, *Criocephalus* mit 2 Arten, *Asemum* mit 1 Art, *Tetropium* mit 2 Arten, *Callidium* mit 6 Arten, *Rhopalopus* mit 2 Arten, *Semanotus* mit 1 Art, *Hylotrupes* mit 1 Art, *Aromia* mit 1 Art: *A. moschata* (fig. 104. I p. 338), *Purpuricenus* mit 1 Art, *Clytus* mit 12 Arten: *Cl. arcuatus* (fig. 106 p. 339), *Anaglyptus* mit 1 Art, *Cerambyx* mit 2 Arten: *C. cerdo* L. (fig. 103. III u. 105. p. 337, 338).

Dorcadion mit 1 Art, *Lamia* mit 1 Art, *Monohammus* mit 3 Arten, *Acanthoderes* mit 1 Art, *Acanthocinus* mit 2 Arten, *Liopus* mit 2 Arten, *Exocentrus* mit 2 Arten, *Hoplosia* mit 1 Art, *Pogonochaerus* Latr. mit 5 Arten, *Haploenemia* mit 2 Arten, *Anaesthetis* mit 1 Art, *Saperda* mit 5 Arten: *S. carcharias* (fig. 104. II. p. 338), *Tetrops* mit 1 Art, *Stenostola* mit 1 Art, *Oberea* mit 4 Arten, *Phytoecia* mit 5 Arten, *Agapanthia* mit 4 Arten.

Gahan.

Revision of *Astathes* Newm. and allied Genera of
Longicorn Coleoptera.

(Tr. ent. Soc. Lond. 1901 p. 37—74 tab. IV).

Eine Revision der Gattung *Astathes*, die in 5 Sectionen getheilt wird, u. von 6 verwandten Gattungen. Weder die Gattungen, noch die Sectionen, noch die Arten sind dichotomisch begründet, was der Benutzbarkeit der Arbeit grossen Abbruch thut.

Die behandelten Gattungen und die neuen Arten.

Astathes Newm. mit 38 sp., v. d. 7 neu: *A. posticatu* n. sp. (p. 40 tab. IV fig. 1) Philippinen, *A. bella* n. sp. (p. 40 fig. 2) Celebes, *A. perversa* n. sp. (p. 45

- fig. 3) Borneo, *A. fulgida* Fbr. (p. 47 fig. 4), *A. plagiata* n. sp. (p. 50) Philippinen, *A. instabilis* n. sp. (p. 51) Borneo, *A. montana* n. sp. (p. 52) Himalaya, *A. nitens* Fbr. (p. 53 fig. 5), *A. cincta* n. sp. (p. 58 fig. 6) Java, *A. fasciata* n. sp. (p. 58) Philippinen, *A. partita* n. nom. für *A. Daldorfi* Fbr. nec III.
- Anastathes* n. gen. (p. 60) mit 2 Arten: *biplagiata* n. sp. (p. 61 fig. 9) Siam, hierher auch *Astathes nigricornis* Thoms.
- Cleonaria* Thoms. mit 2 sp., v. d. 1 neu: *C. cingalensis* n. sp. (p. 63) Ceylon.
- Chretonoma* Pasc. mit 14 Arten, v. d. 1 neu: *Ch. comata* n. sp. (p. 67 fig. 8).
- Plaxomicrus* Thoms. mit 4 sp., v. d. 3 neu: *Pl. ellipticus* Thoms. (p. 69 tab. IV fig. 7), *Pl. ventralis* n. sp. (p. 70) Tonking, *Pl. latus* n. sp. (p. 70) Bhutan, *Pl. Oberthürri* n. sp. (p. 71) Assam.
- Lasiophrys* n. gen. (p. 71) mit 1 Art: *L. latifrons* n. sp. (p. 72 fig. 10) Bhutan.
- Momisis* Pasc. mit 2 sp., v. d. 1 neu: *M. melanura* n. sp. (p. 73 fig. 11) Australien.
- Bacchisa* Pasc. mit 1 Art (p. 73).

Jakowleff.

Etude sur les *Neodorcadion* de l'Asie Russe.

(Rev. russ. I. p. 146—166).

Eine dichotomische Auseinandersetzung aller aus dem Orient bekannten Arten (24), von denen 2 neu, die nebst einigen der neuen Varietäten ausserdem ausführlich beschrieben werden.

Die behandelten Arten.

Neodorcadion glaucopterus Gyll., *N. humerale* Gebh. mit var. *impluviatum* Fld. u. var. *trabeatum* n. var. (p. 152, 159), *N. involvens* Fisch. mit var. *Blessigii* Gglb. u. var. *vestita* n. var. (p. 152), *N. virgatum* Mot., *N. princeps* Jak., *N. Przewalskyi* Jak. mit var. *atrata* n. var. (p. 153), *N. maurum* Jak., *N. hirtipes* n. sp. (p. 154, 159) Mongolei, *N. morosum* n. sp. (p. 154, 162) Mongolei, *N. Oreadis* Reitt., *N. Oryx* Jak., *N. ornatum* Feld., *N. Potaninii* Jak., *N. heros* Jak., *N. Argali* Jak., *N. Dorcas* n. nom. (p. 156, 163) für *ornatum* Reitt. nec Fald. mit var. *pruinatum* n. var. (p. 154, 165), *N. mongolicum* Jak., *N. quinquevittatum* Hamm., *N. intermedium* Jak., *N. consentaneum* Jak. mit var. *hirticolle* n. var. (p. 154¹) und var. *insigne* n. var. (p. 160) Mongolei, *N. Catharinae* Reitt., *N. egregium* Reitt., *N. Brandtii* Gebl.

Martinez de la Escalera.

Especies españolas del género *Dorcadion* Dalm.

(Boll. Soc. Esp. Hist. nat. I 1901 p. 77—88).

Eine dichotomische Auseinandersetzung der spanischen Arten, die zuerst in 5 Sectionen getheilt werden.

¹) Fehlt unter den ausführlichen Beschreibungen, während var. *insigne* in der Tabelle fehlt.

Die behandelten Arten.

Sect. A. p. 80—88.

Dorcadion Graëllsii Gr. nec Chevr. (*alternatum* Chvr., *segovianum* Chvr., *costi-colle* Chvr.) mit var. *longipenne* Chvr. (*Graëllsii* Chvr., *Oberthürrii* Gangl.) u. var. *cinereum* Lauff., *D. hispanicum* Muls. (*nigrolineatum* Chvr.), *D. albicans* Chvr. (*Reinosae* Bris.), *D. Laufferi* Esc., *D. Ghilianii* Chvr. (*Reichei* Chvr.), *D. Perezii* Gr. mit var. *anthracinum* Chvr., *D. insidiosum* n. sp. (p. 87) Cuenca, *D. Dejeanii* Chvr.

Monnot & Houlbert.

Faune élémentaire de la France. *Longicornes*.
(Feuill. jeun. Nat. 31. p. 229—233, 233—258, 285—290, 2 tabb. u. 32. p. 19—20, 25—33).

Dichotomische Bestimmungstabellen. Dem Ref. nicht zugänglich.

1. Pic.

Synopsis des *Acmaeops* Lec. et *Pseudodinoptera* Pic.
(Mater. Longic. III. 3. p. 22—25).

Eine dichotomische Auseinandersetzung von 3 Untergattungen und 9 palaeartischen Arten.

Die behandelten Arten.

Acmaeops (*Pseudodinoptera* Pic) *daghestanica* Pic, *A.* (*Dinoptera*) *collaris* L., *A. minuta* Gebl., *A.* (i. sp.) *angusticollis* Gebl., *A. smaragdula* Fbr., *A. brachyptera* Dan., *A. marginata* Fbr. mit var. *spadicea* Schils., *A. pratensis* Laich., *A. alpestris* Pic, *A. septentrionis* Thms. mit var. *simplonica* Stierl.

2. Pic.

Contribution à l'étude du genre *Rhamnusium* Lat.
(Mater. Longic. III. 3. p. 29—31).

Eine dichotomische Auseinandersetzung von 7 Arten und mehreren Varietäten, von denen nur eine als neu bezeichnet ist.

Die behandelten Arten.

Rhamnusium graecum Schauf., *Rh. praeustum* Reitt., *Rh. algericum* Pic, *Rh. bicolor* Seb. mit var. *humerales* Bed., var. *ambustum* Heyd. und var. *glaucop-terum* Sch., *Rh. Delagrangi* Pic, *Rh. testaceipenne* Pic mit var. *anatolicum* Pic, *Rh. gracilicorne* Ther. mit var. *limbatum* Pic und var. *inapicale* n. var. (p. 31).

Reitter.

Uebersicht der Arten der Coleopteren-Gattung *Strangalia* Serv. aus der Verwandtschaft der *St. melanura* und *bifasciata* Müll.

(Wien. ent. Zeit. XX p. 77—80).

Eine dichotomische Auseinandersetzung über 25 palaeartische Arten, von denen 1 neu ist.

Die behandelten Arten.

Strangalia pubescens Fbr. mit var. *perobscura* n. var. (p. 77) Nord- und Mittel-Europa, *Str. approximans* Rosenh., *Str. melanura* L. mit var. *rubellata* n. var. (p. 77) Kaukasus, var. *georgiana* Pic u. var. *melanurella* n. var. (p. 78) Altai, *Str. Hecate* Reitt., *Str. novercalis* n. sp. (p. 78) Kaukasus, *Str. limbiventris* Reitt., *Str. Jägeri* Humm. mit var. *fenestrata* n. var. (p. 79) Circassien, *Str. ferruginipes* Pic, *Str. bifasciata* Müll. mit var. *immaculata* Pic, var. *nigriventris* Pic, var. *Sedakowii* Mannh., var. *nigrosuturalis* Reitt. u. var. *lanceolata* Muls., *Str. nigra* L., *Str. septempunctata* Fbr. mit var. *quinque-signata* Küst. u. var. *suturata* Reiche, *Str. verticalis* Germ., *Str. Adaliae* Reitt., *Str. emnipoda* Muls.

Einzelbeschreibungen.

- Acanthocinus*, *Acanthoderes* siehe Everts pag. 256.
- Acmaeops alpestris* n. sp. Pic (Mat. Long. II 1898 p. 54). — Siehe auch Everts pag. 256 u. Pic pag. 258.
- Aedeus brevicollis* n. sp. Fairmaire (Rev. Ent. 20 p. 213) Madagascar.
- Aegosoma* siehe Everts pag. 256.
- Agapanthia bucharica* n. sp. Pic (Mat. Long. III. 3. p. 13) Bucharei. — *A. Alexandri* n. sp. Pic (Ech. XVII p. 82 (Central-Asien). — *A. Hauseri* n. sp. Reitter (D. ent. Z. p. 185) Turkestan. — Siehe auch Everts pag. 256.
- Alcidion sexnotatum* n. sp. Waterhouse (Tr. Linn. Soc. Lond. VIII. p. 76) Brit. Guiana.
- Allosterna tabacicolor* var. *tokatensis* n. var. Pic (Ech. 17 p. 59) Tokat. — Siehe auch Everts pag. 256.
- Anaesthetis* siehe Everts pag. 256.
- Anaglyptus gibbosus* var. *obscuricornis* n. var. Pic (Mat. Long. II. 1898 p. 12), *A. obscurissimus* besprochen (ibid. III. 3. p. 8). — *A. obscurissimus* n. sp. Pic (Ech. XVII p. 59) Tokat. — Siehe auch Everts pag. 256.
- Anastathes* siehe Gahan pag. 257.
- Ancita dispar* n. sp. Blackburn (Tr. R. Soc. S. Austr. 25 p. 34), *A. didyma* n. sp. (p. 35) Australien.
- Ancylistes distinctus* n. sp. Fairmaire (Ent. 20 p. 229) Madagascar.
- Anisogaster pictipennis* n. sp. Fairmaire (ibid. p. 208), *A. maculipennis* n. sp. (p. 208), *A. Perrieri* n. sp. (p. 209) u. *A. Coquerelii* n. sp. (p. 210) Madagascar.
- Anoplistes forticornis* n. sp. Reitter (D. ent. Z. p. 84) Turkestan, dichot. Tab. über 7 Arten (p. 83–84). — *A. forticornis* Reitt. var. *Bang-Haasii* n. var. Pic (Mat. Long. III. 3 p. 8).
- Anoplodera*, *Anoploderomorpha* siehe *Leptura*.
- Apaturphysis ocularis* n. sp. Pic (Mat. Long. III. 3. p. 9) Tougourt, *A. barbarus* Luc., *tomentosus* Gebl. u. *Komarowii* Sem. besprochen (p. 19–22). — *A. mongolica* n. sp. Ssamenow (Rev. russ. I p. 28) Mongolei, *A. kashgarica* n. sp. (p. 29) Kashgar, *A. Roborowskyi* n. sp. (p. 29) Mongolei, *A. kashmiriana* n. sp. (p. 29) Kashmir, *A. sinica* n. sp. (p. 30) China, *A. caspica* n. sp. (p. 31) Transcaspien.
- Apharsatus multicostatus* n. sp. Fairmaire (Rev. Ent. 20. p. 221) Madagascar.
- Aromia*, *Asemum* siehe Everts pag. 256.

- Astathes* siehe Gahan pag. 256.
- Auca tenuis* n. sp. **Fairmaire** (ibid. p. 225) Madagascar.
- Bacchisa* siehe Gahan pag. 257.
- Bagdatocerambyx* n. gen. *Drurei* n. sp. **Pic** (Ech. XVII p. 11) Bagdad, auch besprochen (Mat. Long. III. 3. p. 7).
- Batocera victoriana* Thoms. und *Thomsonis* Juv. besprach **Oberthür** (Bull. Fr. p. 351). — *B. lincolata* var. *Joannisii* n. var. **Pic** (Mat. Long. III. 3 p. 28) China.
- Brachyta borealis* Gyll. var. *brunneonotata* n. var. **Pic** (Mat. Long. III. 3. p. 11) Sibirien u. *lateobscura* n. var. (p. 11), *Br. Rostii* **Pic** var. *brevinotata* n. var. (p. 16).
- Caenoptera Marmottanii* besprach **Pic** (Mat. Long. III. 3. p. 16). — Siehe **Everts** p. 256.
- Callidium*, *Callimus*, *Cerambyx* siehe **Everts** pag. 256.
- Chelidones rufovaria* n. sp. **Fairmaire** (Not. Leyd. Mus. 23. p. 80) Madagascar.
- Chreonoma*, *Cleonaria* siehe Gahan p. 257.
- Clitopus coelestinus* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. 20. p. 223) Madagascar.
- Clytus floralis* L. var. *aratensis* n. var. **Pic** (Mat. Long. III p. 11) Ararat, *Cl. (Clytanthus) glabrimaculatus* G. var. *unifasciatus* (ibid. II. 1898 p. 11). — — *Cl. Rhamni* Germ. var. *bifasciatus* n. var. **Nicolas** (Ech. 17. p. 29) Grande Chartreuse. — Siehe auch **Everts** pag. 256.
- Coedomaea vagepicta* n. sp. **Fairmaire** (ibid. p. 227), *C. semiluctuosa* n. sp. (p. 227), *C. apicepicta* n. sp., *C. niviscutata* n. sp. (p. 228) Madagascar.
- Compsodorcadion cribricolle* Kr. var. *altaiense* n. var. **Pic** (Mat. Long. II 1898 p. 44), *C. politipenne* **Pic** var. *conjunctum* n. var (p. 45).
- Corrhenes paucivilla* n. sp. **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. 25. p. 43) Australien.
- Coptosia albovittigera* Heyd. var. *conjuncta* n. var. **Pic** (Mat. Long. III. 3. p. 13) Syrien, *C. mardinensis* n. sp. (p. 13) Klein-Asien.
- Cortodera humeralis* var. *Nicolasii* n. var. **Bedel** (Faun. Col. Seine V p. 369). — *C. Birnbacheri* n. sp. mit var. *rubripes* n. var. **Pic** (Feuill. Nat. 1898 p. 111, 114), *C. parallela* n. sp. (p. 111, 113), *C. Reitteri* **Pic** var. *separata* n. var. (p. 111) u. var. *testaceipes* n. var. (p. 112), *C. haemorrhoidalis* n. sp. (p. 114), *C. umbripennis* Reitt. var. *armeniaca* n. var. (p. 114). — *C. holosericea* Fbr. var. *pilosa* n. var. **Pic** (Mat. Long. II 1898 p. 50). — *C. syriaca* n. sp. **Pic** (Ech. XVII p. 20) Syrien. — Siehe auch **Everts** p. 256.
- Criocephalus* siehe **Everts** p. 13.
- Derbidia* n. gen. *perelegans* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. 20. p. 220) Madagascar.
- Dinoptera* siehe **Pic** p. 258.
- Dorcadion Kalinowskyi* n. sp. **Koenig** (Wien. ent. Zeit. XX p. 10) Caucasus, = *D. Rostii* **Pic** 1900 nach **Reitter** (ibid. p. 98). — *D. vallisoletanum* n. sp. **Lauffer** (Boll. Soc. espan. I p. 89), *D. Escalerae* n. sp. (p. 89) Monte Cauno, *D. Becerrae* n. sp. (p. 90) Soria, *D. Graellsii* Gr. var. *Cazurronis* n. var. (p. 91) u. var. *cinereum* n. var. (p. 92), *D. hispanicum* Muls. var. *erythropus* n. var. (p. 93) u. var. *brunneofasciatum* n. var. (p. 94), *D. Perezii* Gr. var. *septemvittatum* n. var. (p. 95), *D. Ghilianii* Chor. var. *ebeninum* n. var. (p. 96), *D. Laufferi* Esc. var. *subpolitum* n. var. (p. 98) Spanien. — *D. Navasii* Esc. besprach **Fuente** (ibid. p. 135). — *D. insidiosum* Esc. = *Seguntianum* Dan. nach **Martinez** (ibid. p. 143). — *D. Pelops* n. sp. **Jakowleff** (Rev. russ. I

- p. 83) u. *D. semisetosum* n. sp. (p. 85) Klein-Asien, *D. subcostatum* Heyd. 1887 = *D. Dokhtouroffii* Ganglb. 1886 (p. 107), *D. Türkii* Ganglb. var. *transcaspicum* n. nom. (= *interruptum* Jak. ol.) (p. 108). — *D. Uragonis* var. *in-humerale* n. var. **Pic** (Mat. Long. II 1898 p. 21), *D. suturale* Chr. var. *insuturale* n. var. (p. 22), *D. cretosum* Ferr. var. *sobrinum* n. var. (p. 55), *D. costiferum* n. sp. (p. 57). — *D. (Cribridorcadion* n. subg.) (ibid. III. 3. 1901 p. 12) für *Dorcadion Mniszechii* Kr., *D. subsericatum* n. sp. (p. 12) Syrien, *D. impressicollis* Kr. var. *tokatense* n. var. (p. 12) Tokat, *D. (Compsodorcadion) mystacinum* Ball. var. *attaïnse* n. var. (p. 18 „*ataensis*“) Turkestan, *D. Piochardii* var. *Theophilei* n. var. (p. 32¹) Anatolien, *D. circumcinctum* Chr. var. *Sebastiani* n. var. (p. 32) Spanien. — *D. crux* var. *biinterruptum* n. var. **Pic** (Ech. 17. p. 19) Smyrna, *D. erivanicum* n. sp. (p. 91) Erivan. — Siehe auch Everts pag. 256 u. Martinez pag. 258.
- Dorcianus* n. gen. *angulicollis* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. 20. p. 214) Madagascar.
- Echaristha* n. gen. **Fairmaire** (ibid. p. 219), *pectipennis* n. sp. (p. 220) Madagascar.
- Elaphidion villosum* abgebildet von **Felt** (Bull. N. York Mus. 37. VIII. p. 20 fig. 28).
- Epepeotes* siehe *Pelargoderus*.
- Ergates* siehe Everts pag. 256.
- Eucilmus* n. gen. *insignicornis* n. sp. **Fairmaire** (ibid. p. 222) Madagascar.
- Eumimetes Decorsii* n. sp. **Fairmaire** (Not. Leyd. Mus. 23. p. 81), *Eu. cinerascens* n. sp. (p. 81) Madagascar.
- Exocentrus graecus* n. sp. **Pic** (Ech. XVII p. 52) Griechenland. — Siehe auch Everts pag. 256.
- Fallacia elegans* Feld. besprach **Pic** (Mat. Long. III. 3. p. 16), dichot. Tab. über 3 Varietäten.
- Ganasomus* n. gen. *elegans* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. XX p. 207) Madagascar.
- Gnurotes* siehe Everts pag. 256.
- Gnathoenia congoana* n. sp. **Belon** (Ann. Belg. 45. p. 246) Congo.
- Gracilia* siehe Everts pag. 256.
- Grammoptera aegrota* Bat., *Staudingeri* **Pic**, *insuturata* **Pic** und *Hormandii* **Pic** unterschied dichotomisch **Pic** (Mat. Long. III. 3. p. 27), siehe auch *Pidonia*. — Siehe auch Everts pag. 256.
- Haplocnemis* siehe Everts p. 256.
- Hesperophanes affinis* Luc. var. *pubescens* n. var. **Pic** (Mat. Long. II 1898 p. 9). — Siehe Everts pag. 256.
- Hoplosia*, *Hylotrupes* siehe Everts pag. 256.
- Icariotis testacea* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. 20. p. 214), *I. nigrans* n. sp., *I. pruinosa* n. sp. (p. 215), *I. tenuipes* n. sp., *I. limbipennis* n. sp. (p. 216), *I. basipennis* n. sp. (p. 217) Madagascar.
- Iresioides longipennis* n. sp. **Fairmaire** (Not. Leyd. Mus. 23. p. 79) Madagascar.
- Lamia adelpha* Ganglb. = *Lamiomimus Gottschei* Kolbe nach **Ssamenow** (Rev. russ. I p. 37). — Siehe auch Everts pag. 256.
- Lamiomimus* siehe *Lamia*.

¹) Der Name collidirt mit *Dorc. Theophilei* **Pic** (ibid. II 1898 p. 57).

Lasiophrys siehe Gahan pag. 257.

Lemula rufithorax n. sp. **Pic** (Bull. Mus. Par. 1901 p. 57) Japan.

Leptidea siehe Everts pag. 256.

Leptura (Pachytodes) erratica var. *Rosinae* n. var. **Pic** (Mat. Long. III. 3. p. 11) Anatolien. — *L. (Anoplodera) sexguttata* Fbr. var. *guttata* n. var. (ibid. II 1898 p. 4), *L. (Pachytodes) erratica* var. *akbesiana* n. var. (p. 6), *L. (Strangalia) aurulenta* var. *algerica* (p. 6). — *L. (Anoplodermomorpha* n. subg.) **Pic** (Bull. Mus. Paris 1901 p. 59) für *L. excavata* Bat. u. *L. cyanea* Gebl., *L. Bouvieri* n. sp. (p. 59), *L. dentatipennis* n. sp., *L. nymphala* var. *Lesnei* n. var. (p. 60), *L. (Strangalia) Harmandii* n. sp. u. *Maindronis* n. sp. (p. 61) Japan, *L. semicrassa* n. sp. **Pic** (Ech. XVII p. 58) Thoisy, *L. scotodes* Bat. var. *nipponensis* n. var. (p. 12) Japan. — *L. rubra* L. var. *Sattleri* n. var. **Bickhardt** (D. ent. Z. p. 362) Frankfurt a. M. — *L. sexmaculata* var. *nigra* n. var. **Csiki** (Zichy Reise II p. 115) Asien. — Siehe auch Everts p. 256.

Lepturasta n. gen. (bei *Icariotis*) *russa* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. 20. p. 218) Madagascar.

Lingoria n. gen. (bei *Icariotis*) **Fairmaire** (Bull. Fr. p. 126), *L. sanguinicollis* n. sp. (p. 127).

Linopheridius fuscipleuris berichtigte **Fairmaire** (Rev. Ent. 20. p. 224).

Liopus Ganglbaueri n. sp. **Csiki** (Zichy Reise II p. 116) Sibirien. — Siehe auch Everts pag. 256.

Logisticus obtusipennis n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. 20. p. 211) u. *L. plicicollis* n. sp. (p. 212) Madagascar.

Macrotoma Ferricri n. sp. **Fairmaire** (Bull. Fr. p. 96), *M. impressicollis* n. sp. (p. 97) Madagascar. — *M. androyana* n. sp. **Fairmaire** (Not. Leyd. Mus. 23. p. 77) u. *M. cariosa* n. sp. (p. 78) Madagascar. — *M. costulata* n. sp. (Rev. Ent. 20. p. 204), *M. Coquerelii* n. sp. (p. 205). — *M. incermis* n. sp. (p. 206) Madagascar.

Mallosia robusta n. sp. **Pic** (Mat. Long. III. 3. p. 19) Syrien.

Megasenum quadricostulatum Kr. var. *brevior* n. var. **Pic** (Ech. 17. p. 11) Japan.

Mesosa longipennis var. *subobliterata* **Pic** (Bull. Mus. Par. 1901 p. 62).

Moehotypa fuliginosa Klb. = *Wulfi* Bless. (*Tylophorus Wulfi*) nach **Ssemenow** (Rev. russ. I p. 183).

Momisis siehe Gahan pag. 257.

Monohammus longulus n. sp. **Pic** (Mat. Long. II p. 23). — Siehe auch Everts pag. 256.

Myiodola calceata n. sp. **Fairmaire** (Bull. Fr. p. 127) Madagascar. — *M. distincta* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. 20. p. 218), *M. maculosa* n. sp. (p. 218), *M. brachyptera* n. sp. (p. 219) Madagascar.

Necydalis siehe Everts pag. 256.

Neodorcadion ionicum n. sp. **Pic** (Ech. 17. p. 52) Zante, auch besprochen (Mat. Long III. 3. p. 9). — *N. Zichyi* n. sp. **Csiki** (Zichy Reise II p. 115) Mongolei. — Siehe auch **Jakowleff** p. 257.

Nethinius semirufus n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. 20. p. 223), *N. gracilior* n. sp. (p. 224) Madagascar.

Notoceresium n. gen. **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. 25. p. 32) *impressiceps* n. sp. (p. 33) Tasmanien.

- Oberea morio* Kr. var. *pictibasis* n. var. **Reitter** (D. ent. Z. p. 186) Thibet. — *O. anatolica* n. sp. **Pic** (Ech. XVII p. 19) Konia, *O. taygetana* n. sp. (p. 27) Griechenland. — Siehe auch Everts pag. 256.
- Obrium* siehe Everts pag. 256.
- Olenecamptus Gattangii* n. sp. **Villard** (Bull. Fr. p. 144, 263) Bagamoyo. — *O. madecassus* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. 20. p. 226) Madagascar.
- Opepharus verticalis* n. sp. **Fairmaire** (ibid. p. 225) Madagascar.
- Opsidota sculpticollis* n. sp. **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. 25. p. 33) Australien.
- Oxymirus* siehe Everts pag. 256.
- Paralocus Vacheri* n. sp. **Fairmaire** (Not. Leyd. Mus. 23. p. 79) Madagascar. — *P. longicollis* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. 20. p. 211) Madagascar.
- Paratoxotus* n. gen. **Fairmaire** (ibid. p. 212) *Argodii* n. sp. (p. 213) Madagascar.
- Pathocerus* n. gen. **Waterhouse** (Ann. Mag. Nat. Hist. VII. p. 522) *P. Wagneri* n. sp. (p. 523) Rio Janeiro.
- Pelargoderus vitticollis* Th. = *Epepeotes plorator* nach **Ritsema** (Not. Leyd. Mus. 23. p. 94), *P. Sijthoffi* n. sp. (p. 94) Sumatra.
- Penthea tigrina* n. sp. **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. 25. p. 37) Australien.
- Phacodes modicus* n. sp. **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. 25. p. 31) Australien.
- Phymatodes testaceus* var. *fulvipennis* n. var. **Reitter** (Wien. ent. Zeit. XX p. 101) Anatolien. — *Ph. (Pseudophymatodes* n. subg.) *altaicus* n. sp. **Pic** (Ech. XVI p. 12) Sibirien.
- Phytoecia Gaubili* var. *innotata* n. var. **Pic** (Mat. Long. II 1898 p. 14), *Ph. Wachanrui* Mes. var. *pallidithorax* n. var. (p. 24), *Ph. virgula* Charp. var. *major* n. var. (ibid. III. 3. p. 14) Syrien, *Ph. subannularis* n. sp. (p. 14) Syrien. — Siehe Everts pag. 256.
- Pidonia* unterschied von *Cortodera*, *Grammoptera* u. *Pseudopidonia* **Pic** (Mat. Long. III. 3. p. 25). — *P. Harmandii* n. sp. **Pic** (Bull. Mus. Par. 1901 p. 58) u. *P. insuturata* n. sp. (p. 59) Japan. — Siehe Everts pag. 256.
- Plagianotus lugubris* Men. var. *flavicornis* n. var. **Pic** (Mat. Long. II 1898 p. 19). — *Pl. speciosus* abgebildet von **Felt** (Bull. N. York Mus. 37. VIII. p. 20 fig. 26).
- Plaxomicrus* siehe Gahan pag. 257.
- Pogonocherus* siehe Everts pag. 256.
- Polyarthron afrum* Baud. var. *Baudii* n. var. **Pic** (Mat. Long. II 1898 p. 30), *P. Devauxii* Frm. var. *separatum* n. var. (p. 32), *P. unionis* n. sp. (p. 34¹), *P. Desvauxii* Fairm. var. *separatum* **Pic** besprochen (ibid. III. 3. p. 15), *P. (Pseudoprionus) Bang-Haasii* n. sp. (p. 32) Persien. — *P. Bienertii* Heyd. u. *Bang-Haasii* **Pic** unterschied **Pic** (Ech. 17. p. 83).
- Praonetha nivipicta* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. 20. p. 226) Madagascar.
- Prionocalus Emmae* n. sp. **Kolbe** (Berl. ent. Z. 1901 p. 480 tab. VII fig. 4) Ecuador.
- Prionus* siehe Everts p. 256.
- Pseudocentrus* n. gen. **Fairmaire** (Rev. Ent. 20. p. 230) *lineellus* n. sp. (p. 231) Madagascar.
- Pseudodinoptera* siehe **Pic** pag. 258.

¹) Im Bericht pro 1899 p. 347 nicht als n. sp. aufgeführt.

- Pseudomyrmecion* Bed. gehört zu den *Clytini* und ist mit *Microclytus* Lec. verwandt nach **Lameere** (Bull. Fr. p. 294). — **Bedel** besprach die Gatt. (ibid. p. 358).
- Pseudophymatodes* siehe *Phymatodes*.
- Pseudopidonia Staudingeri* n. sp. **Pic** (Ech. XVII p. 12) Japan.
- Purpuricenus Köhleri* var. *carbonarius* n. var. **Reitter** (Wien. ent. Zeit. XX p. 101) Meleda. — *P. dalmatinus* Strm. var. *biinterrupta* n. var. **Pic** (Mat. Long. III. 3. p. 11) Griechenland. — Siehe auch **Everts** pag. 256.
- Ranova forticornis* n. sp. **Fairmaire** (Not. Leyd. Mus. 23. p. 80) Madagascar.
- Rhagium* siehe **Everts** pag. 256.
- Rhamnusium Delagrangi* n. sp. **Pic** (Mat. Long. III. 3. p. 10) Smyrna, *Rh. geniculatum* n. sp. (p. 10) Anatolien, *Rh. testaceipenne* **Pic** var. *anatolicum* n. var. (p. 10) Amasia, *Rh. bicolor* var. *capitale* n. var. (ibid. II. 1898 p. 2). — Siehe auch **Everts** pag. 256 u. **Pic** pag. 258.
- Rhopalocerus* siehe **Everts** p. 256.
- Rhytiphora uniformis* n. sp. **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. 25 p. 40) u. *Rh. Simsonis* n. sp. (p. 41) Australien.
- Rosalia alpina* var. *quadripunctata* n. var. **Reitter** (Wien. ent. Zeit. XX p. 202) Ungarn.
- Saperda candida* abgebildet von **Felt** (Bull. N. York Mus. 37. VIII. p. 10 fig. 8). — Siehe auch **Everts** pag. 256.
- Semanotus, Spondylis, Stenopterus* siehe **Everts** pag. 256.
- Stenostola niponensis* n. sp. (?) **Pic** (Ech. XVII p. 12) Japan. — Siehe auch **Everts** pag. 256.
- Strangalia emmipoda* var. *subsignata* n. nom. **Pic** (Bull. Fr. p. 235) für *Str. Jaegeri* Fairm. 1866 nec Humm., *Str. Jaegeri* var. *Jekéli* n. var. (p. 236), *Str. melanura* var. *rubellata* Reitt. = var. *latesaturata* **Pic** 1891 (p. 236), *Str. approximans* Rosh. var. *Edmundi* n. nom. (p. 237) für *approximans* Reitt. nec Rosh., *Str. purpuripennis* Muls. = *approximans* Rosh. typ. (p. 237). — *Str. distigma* Charp besprach **Pic** (Mat. Long. III. 3. p. 6) und gab eine dichotomische Auseinandersetzung von 5 Varietäten derselben, *Str. ochraceofasciata* Mot. var. *inintegra* n. var. (p. 28) Japan. — *Str. Hecate* var. *auliensis* n. var. **Pic** (Ech. 17 p. 19) Turkestan, *Str. graeca* n. sp. (p. 52) Olympia, *Str. (Typocerus) attenuata* var. *obscuriventris* n. var. (p. 59) Sibirien. — *Str. hybridula* n. sp. **Reitter** (D. ent. Z. p. 188) Spanien. — *Str. latesaturata* **Pic** (Mat. I 1891) nicht im Buchhandel erschienen nach **Reitter** (Wien. ent. Z. p. 175). — Siehe auch *Leptura* u. **Reitter** pag. 259.
- Symphyletes lentus* n. sp. **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. 25 p. 38) u. *S. fasciatus* n. sp. (p. 39) Australien.
- Teorostrium* n. gen. **Fairmaire** (Rev. Ent. 20 p. 206), *brevipenne* n. sp. (p. 207) Madagascar.
- Tephrolamia* n. gen. *borbonica* n. sp. **Fairmaire** (ibid. p. 231) Bourbon.
- Tetropium Staudingeri* n. sp. **Pic** (Mat. Long. III. 3. p. 11). — Siehe auch **Everts** pag. 256.
- Tetrops* siehe **Everts** pag. 256.
- Toxotus homocerus* Dan. ist von *T. Quercus* nicht genügend unterschieden nach **Pic** (Mat. Long. III. 3. p. 5), *T. minutus* Gebl. var. *obscuripes* n. var. (p. 15) Sibirien (?) — Siehe auch **Everts** pag. 256.

Trachyliopus n. gen. **Fairmaire** (Rev. Ent. 20 p. 229), *annulicornis* n. sp. (p. 230)
Madagascar.

Tylophorus siehe *Moechotypa*. — *Typocerus* siehe *Strangalia*.

Zygocera concinna n. sp. **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. 25 p. 36) Australien.

Fam. Chrysomelidae.

Abeille 3, Bedel 4, Blackburn 1, 2, Champion & Chapman 1, Csiki 1, Everts 2, Fairmaire 2, 4, 6, Felt 1, Fritsch 1, Garman 1, Gestro 2, Jacobson 1, 4, 5, 6, Jacoby 1—6, Kemp 1, Kolbe 6, Lampa 5, Ménégau 1, Pic 24c, 30, 38, 48, Poppius 11, Reitter 3, 13, 23, 26, 32, 33, Sahlberg 9, W. Schulz 1, Scudder 1, Spaeth 1, 2, 3, Ssumakow 1, 2, Webster 5, Weise 1, 2, 5—15, Xambeu 1.

Biologie.

Weise (5) schilderte die Fraasstücke von *Hoplionota rubromarginata* Boh. (p. 49), die Larve u. die Puppe von *Epistictia matronula* Boh. (p. 50—51), das massenhafte Auftreten von *Galeruca laticollis* (6, p. 86), die Larve von *Melasoma saliceti* u. *Lochmaea suturalis* Thom. (p. 87), die Larve u. Puppe von *Haltica saliceti* Ws. (p. 89—90).

Ménégau (1) behandelte die Biologie von *Galeruca xanthomelaena*.

Poppius (11) beschrieb die Larve und die Puppe von *Phyllotreta armoraciae* (p. 106—111).

Everts (2) besprach die Larven der *Chrysomeliden* im Allgemeinen (p. 389) und (1) die Duftdrüsen von *Melasoma collare*.

Garman (1, p. 3—16) beschrieb die Larve und Puppe von *Diabrotica vittata* und *D. duodecimpunctata* (Schädlinge der Gurken) und gab Abbildungen derselben (fig. 1—3).

Champion & Chapman (1) berichteten über die Fortpflanzungsart mehrerer *Oreina*-Arten (Tr. ent. Soc. Lond. 1901 p. 1—18 tab. I u. II) u. bildeten die Larven von *O. gloriosa*, *O. Cacaliae*, *O. vittigera* u. *O. tristis* u. die Ovarien von *O. vittigera* ab.

Kemp (1) berichtete über die Futterpflanze von *Cassida equestris*.

Ueber mehrere Arten am unteren Amazonenstrom berichtete

Schulz (Berl. ent. Z. p. 335—338).

Webster (5) berichtete über *Myochrous denticollis* als Schädling der Getreidefelder.

Felt (1) gab eine Abbildung der Larve von *Haltica chalybea* (p. 15 fig. 18) u. *Crioceris duodecimpunctata* (p. 27 fig. 43), der Larve u. Puppe von *Diabrotica vittata* (p. 25 fig. 39).

Xambeu (1) beschrieb das Ei von *Chrysomela cerealis* (p. 50), die Larve von *Labidostomis longimana* (p. 41) u. *Timarcha* sp. (p. 62).

Geographisches.

Lampa (5) handelte über das Vorkommen von *Doryphora decemlineata* in Europa.

Sahlberg (9) berichtete das Vorkommen von *Clytra affinis* in Finnland statt *Cl. aurita* seines Cataloges (1900, 3).

Jacobson (4) berichtete, dass unter 113 in West-Sibirien gesammelten Arten, 42 weit verbreitete, 33 europäische, 18 ostsibirische und 20 indigene Arten sich befanden, von denen 6 u. dazu 16 Varietäten noch unbeschrieben waren.

Palaeontologie.

Scudder (1) beschrieb 4 Arten aus Canada, von denen *Cryptocephalites* neu. (Siehe Einzelb.).

Fritsch (1) beschrieb 1 *Chrysomelites*, die neu zu sein scheint, obgleich sie nicht als n. sp. bezeichnet ist. (Siehe Einzelb.).

Systematik.

Umfassende Arbeiten.

Bedel.

Faune des Coléoptères du bassin de la Seine.

1889—1901. Beilage der Ann. Soc. ent. Fr.

Der Schluss des V. Bandes (p. 357 - 423) bringt auch Nachträge zu der Fam. *Chrysomelidae*, wobei die dichot. Tabellen über *Chalcoides* u. *Thyamis* berichtet u. 2 *Aphthona* hinzu gefügt wurden (p. 383—405). Auch wird ein Verzeichniss der „neuen“ Gatt., Untergatt. etc. gegeben (p. 421), welches Gelegenheit giebt, dieselben im Zusammenhang aufzuzählen, da viele derselben in den früheren Jahresberichten übersehen wurden. Zumeist sind es Namensänderungen, die nicht immer einwandfrei sind.

Die neuen Gattungen, Arten etc.

Cryptocephalus octacosmus n. nom. (p. 131) für *Cr. sexpustulatus* Rossi nec Vill., *Cr. ocellatus* Drap. var. *nigrifrons* n. var. (p. 243).

Chrysonela diversipes n. nom. (p. 147) für *Chr. goettingensis* Gyll. nec L., *Chr. Olivieri* n. nom. (p. 148 Anm.) für *Chr. coerulea* Ol. 1807 nec 1790, *Chr. (Chrysochloa* Hop.) statt subg. *Oreina* eingeführt (p. 147, 148, 263¹) ohne jede Motivierung, *Chr. (Hypericia* n. subg. p. 258) für *Chr. hyperici* u. *didyma*, *Chr. (Sphaeromela* n. subg. p. 260) für *Chr. varians*.

Lythraria n. gen. (p. 168) für *Ochrosis Salicariae*.

Thyamis Menthae n. sp. (p. 189).

¹) Die Einführung des Hope'schen Namens ist unzulässig, da er nur den Werth eines Catalogsnamens hat, wie Erichson schon 1843 nachwies (Bericht pro 1841 p. 67). Der vollberechtigte Name *Oreina* Redtb. 1849 braucht ihm daher keineswegs zu weichen.

- Aphthona Illigeri* n. nom. (p. 195) für *A. laevigata* Ill. nec Fabr.
Psylliodes (Psyllomima n. nom.) für subg. *Macrocnema* Ws. nec Steph., *Ps. Napi*
 var. *Brisoutii* n. var. (p. 202).
Mantura Matthewsii Curt. var. *dichroa* n. nom. (p. 283¹) für var. *aeraria*
 Kutsch. nec Foudr.
Chalcooides lamina n. nom. (p. 398²) für *metallica* Redt. nec Duft.

Blackburn.

Revision of the Genus *Paropsis*. VI.
 (Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1901 p. 159—196).

Der Schluss der Monographie, wobei die 1. u. 2. (früher 2. + 5.) Gruppe behandelt werden, nachdem eine neue Eintheilung in 5 (früher 6) Gruppen gegeben worden (p. 160). Alle Arten sind dichotomisch aus einander gesetzt u. die neuen ausführlich beschrieben.

Die neuen Arten.

I. Gruppe (61 sp. p. 165—172).

- P. augusta* n. sp. (p. 165, 173), *P. Manto* n. sp. (p. 166, 174), *P. Hygea* n. sp. (p. 166, 176), *P. elytrura* n. sp. (p. 168, 178), *P. Omphale* n. sp. (p. 168, 179), *P. Mintha* n. sp. (p. 169, 180), *P. Sospita* n. sp. (p. 169—181), *P. Thyone* n. sp. (p. 169, 183), *P. rubidipes* n. sp. (p. 171, 183), *P. Latona* n. sp. (p. 171, 184), *P. Blandina* n. sp. (p. 172, 184), *P. Cassiope* (p. 172, 185).

II. Gruppe (25 sp. p. 187—189).

- P. Echo* n. sp. (p. 187, 190), *P. anomala* n. sp. (p. 188, 191), *P. Polyxo* n. sp. (p. 188, 192), *P. Selene* n. sp. (p. 188, 193), *l'. Philomela* n. sp. (p. 189, 194), *P. semifumata* n. sp. (p. 189, 195).
P. excisipennis n. sp. (p. 195) Nachtrag zu Gruppe IV Untergruppe 1.

Everts.

Coleoptera Neerlandica. II. 1. p. 387—400.

72. Fam. *Chrysomelidae*.

Die Familie ist in diesem Bande nur begonnen, wird nach Abschluss referirt werden.

Jacobson.

Symbola ad cognitionem *Chrysomelidarum*
 Rossiae asiaticae.

(Oefv. Finsk Förh. 43. p. 99—147).

Eine Aufzählung von 284 von Ferd. u. John Sahlberg in Sibirien gesammelter Arten mit zahlreichen Beschreibungen neuer Arten und Varietäten.

¹) Die Namensänderung ist nicht nothwendig, da der Foudras'sche Name als Synonym eingeht.

²) Die Namensänderung ist nicht nothwendig, da der Duftschmid'sche Name als Synonym eingeht.

Die behandelten Gattungen und Arten.

Donacia mit 6 Arten, v. d. 1 neu: *D. Sahlbergii* n. sp. (p. 103) mit var. *coeruleo-violacea* n. var. (p. 105), *D. thalassina* Germ. var. *rufovariegata* n. var. u. var. *coerulea* n. var. (p. 105), *D. vulgaris* Zsch. var. *issykensis* n. var. (p. 105) Sibirien.

Plateumaris mit 1 Art.

Orsodacna mit 1 Art, *Syneta* mit 1 Art, *Zygophora* mit 1 Art, *Lema* mit 4 Arten.

Crioceris mit 3 Arten, *Cr. quinquepunctata* Scop. var. *nigerrima* n. var. (p. 106 Anm.) Sarepta.

Labidostomis mit 7 Arten: *L. sibirica* Gebl. mit var. *altaica* Gebl., var. *transitoria* n. var. u. var. *fallacissima* n. var.

Chilotoma musciformis Goetz. var. *orientalis* n. var. (p. 107).

Gynandrophthalma mit 7 Arten, von d. 2 neu: *G. aurita* var. *Hammarstroemii* n. var. (p. 108), *G. Stenroosii* n. sp. (p. 108), *G. Sahlbergii* n. sp. (p. 109).

Clytra mit 4 Arten: *Cl. Atrophaxidis* var. *defecta* n. nom. (p. 110 Anm.) für var. *deficiens* Weise nec Heyden.

Tituboea mit 1 Art, *Coptocephala* mit 2 Arten.

Cryptocephalus mit 31 Arten, von d. 1 neu: *Cr. scapularis* Jac. var. *correspondens* n. var. u. var. *apicimaculatus* n. var. (p. 111) und *Cr. cordiger* L. var. *completus* n. var. (p. 111) Sibirien, *Cr. tataricus* Gebl. var. *ephippiatus* n. var. (p. 111) Margelan, *Cr. Stschukinii* Fld. var. *externopunctatus* n. var. (p. 112), *Cr. sarafschanensis* Solsk. var. *Stenroosii* n. var. (p. 112) u. var. *Solskjanum* n. nom. (p. 112 Anm.) für var. *Solskyi* Weis. nec Jacobs., *Cr. cruz* Gebl. var. *incompletus* n. var. (p. 112), *Cr. limbellus* Suffr. var. *obscurior* n. var. (p. 112), *Cr. regalis* Gebl. var. *cuprescens* n. var. (p. 113), *Cr. sibiricus* Mars. var. *flavomixtus* n. var. (p. 113) Sibirien, *Cr. hydrochoeridis* Suffr. var. *frigidum* n. nom. (p. 113 Anm.) für var. *cyanescens* Weise 1893 nec Weise 1887, *Cr. Wasastjerna* Gyll. var. *adocetus* n. var. (p. 114) Daurien, *Cr. dilutellus* n. sp. (p. 114) Issyk-kul, mit var. *Fetschenkonis* n. var. (p. 114 Anm.) am See Iskander.

Pachybrachys mit 5 Arten, v. d. 1 neu: *P. distinctopygus* n. sp. (p. 115) Daurien, *P. sexsignatus* Ws. var. *issykensis* n. var. (p. 116) Issyk-kul, *P. Newmanii* n. nom. (p. 116 Anm.) für *P. limbatus* Newm. nec Men.

Thelyterotarsus mit 1 Art, *Stylosomus* mit 4 Arten, *Parnops* mit 1 Art, *Ischyromus* mit 1 Art, *Chloropterus* mit 1 Art, *Atomyrta* mit 1 Art, *Chloropterus* mit 1 Art.

Aphilenia mit 2 Arten: *A. parvula* Ws. var. *nigrescens* n. var. (p. 117) Sibirien.

Pachnophorus mit 2 Arten, *Adoxus* mit 1 Art, *Chrysochares* mit 2 Arten, *Gastroidea* mit 3 Arten.

Entomoscelis mit 3 Arten: *E. Adonidis* Pall. var. *Hammarstroemii* n. var. (p. 118) Mongolei.

Oreomela mit 2 Arten, v. d. 1 neu: *O. clypealis* n. sp. (p. 119) Schamsi.

Timarcha mit 1 Art.

Crosita mit 5 Arten, v. d. 1 neu: *Cr. (Pezocrosita) Sahlbergiana* n. sp. (p. 120).

Gnathomela mit 1 Art.

Chrysomela mit 27 Arten, v. d. 1 neu: *Chr. convexicollis* n. sp. (p. 122), *Chr. rufilabris* Fald. var. *perfecta* n. var. u. var. *discriminata* n. var. (p. 124), *Chr. staphylea* L. var. *palliat*a n. var. (p. 125), *Chr. (Lithoptera) guttifera* Mot.

var. *sericata* n. var. (p. 125), *Chr. ussuriensis* n. nom. (p. 126) für *Chr. aeruginosa* Ws. nec Fald. (p. 126).

Oreina mit 1 Art: *O. basilea* Gebl. (p. 127, *Chrysochloa*¹).

Ambrostoma quadrimpressum Mot. var. *viridicyaneum* n. var. u. var. *purpureocupreum* n. var. (p. 127).

Paropsides mit 1 var.: *P. duodecimpustulata* Gebl. mit var. *hieroglyphica* Gebl. (p. 128).

Phyllodecta mit 8 Arten: *Ph. sibirica* Ws. var. *Sundmannii* n. var. (p. 128), *Ph. Linneana* Schr. var. *Bergrothii* n. var. mit subvar. *correspondens* n. subvar. u. subvar. *simplex* n. subvar. (p. 128), *Ph. quinquepunctata* var. *Aucupariae* n. nom. (p. 128) für var. *Sorbi* Ws. nec Mot., *Ph. viminalis* L. var. *transitoria* n. var. (p. 129).

Cercyonops mit 1 Art: *C. Caraganae* Gbl. var. *simplex* n. var., var. *sesquialtera* n. var., var. *hieroglyphica* n. var. u. var. *limbata* n. var. (p. 129) u. var. *Mene-triesii* Gebl.

Phyllodecta mit 3 Arten, *Hydrothassa* mit 3 Arten, *Prasocuris* mit 1 Art, *Phaedon* mit 3 Arten.

Sternoplatys Faustii Ws. var. *completus* n. var. (p. 131), *St. Clementzii* n. sp. (p. 131) Mongolei, *St. Tollii* n. sp. (p. 132) Sibirien, *St. fulvipes* Mot. var. *picipes* n. var. (p. 133) Ussuri, *St. Motschulskyi* n. sp. (p. 133) Transbaicalien.

Plagiodera mit 1 Art.

Melasma mit 7 Arten: *M. lapponicum* L. mit 8 var., v. d. 4 neu: var. *cruciatum* n. var., var. *quadripunctatum* n. var., var. *multipunctatum* n. var., var. *violaceipenne* n. var. (p. 133).

Gastrolina peltoides Gbl. var. *Cimex* n. var. (p. 134).

Agelastica mit 2 Arten, *Phyllobrotica* mit 2 Arten.

Luperus mit 7 Arten, v. d. 1 neu: *L. Ehnbergii* n. sp. (p. 135).

Lochmaea mit 2 Arten, *Galerucella* mit 5 Arten.

Dirrhabda mit 2 Arten, *Leptonyx* mit 1 Art, *Pallasia* mit 1 Art.

Galeruca mit 9 Arten: *G. nigrolincata* Mannh. var. *major* n. var. (p. 138).

Podagrica mit 1 Art, *Derocrepis* mit 1 Art, *Crepidodera* mit 2 Arten, *Epithrix* mit 1 Art, *Chalcoides* mit 4 Arten, *Hippuriphila* mit 1 Art, *Mantura* mit 1 Art.

Novo foudr asia n. nom. (p. 139) für *Foudrasia* Ws. (1900) nec Goz. (1881).

Chaetocnema mit 11 Arten, v. d. 1 neu: *Ch. Ahngeri* n. sp. (p. 139).

Psylliodes mit 4 Arten.

Phyllotreta mit 10 Arten, v. d. 1 neu: *Ph. misella* n. sp. (p. 141), *Ph. Weiseana* n. nom. (p. 141) für *Ph. denticornis* Ws. (1890) nec Horn (1889).

Aphthona mit 8 Arten, v. d. 2 neu: *A. Hammarstroemii* n. sp. (p. 142). *A. Sundmannii* n. sp. (p. 143).

Luperomorpha mit 1 Art.

Longitarsus mit 13 Arten, v. d. 1 neu: *L. Weisei* n. sp. (p. 144).

Dibolia mit 1 Art, *Argopus* mit 1 Art, *Hispa* mit 1 Art.

Ischyonota mit 2 Arten, *I. Salsolae* Beck. (*Jakowlewii* Reitt.) scheint = *I. desertorum* Gebl. ♂. *I. nitidula* Ws. scheint = *I. elevata* Reitt. ♀ (p. 146 Anm.).

Cassida mit 18 Arten, *Chiridula* mit 2 Arten.

¹) Auch Jacobson folgt hier ganz kritiklos (wie Weise) Bedeln, der *Chrysochloa* für *Oreina* einführen will. Vergl. pag. 266.

1. Reitter.

Uebersicht der Arten der Coleopteren-Gattung
Pachnephorus Redt. aus der palaearktischen Fauna.

(Wien. ent. Zeit. XX p. 53—54).

Eine dichotomische Auseinandersetzung von 13 Arten, von denen eine neu.

Die behandelten Arten.

Pachnephorus pilosus Ross., *P. tessellatus* Duft., *P. ruficornis* Lef., *P. canus* Wse.,
P. villosus Duft., *P. syriacus* Reitt., *P. impressus* Rosenh., *P. lateralis* n. sp.
(p. 54) Kaukasus, *P. bacticus* Weise, *P. hispidulus* Fairm., *P. robustus* Debr.
u. var. *micantipennis* u. var. (p. 54) Kleinasien, *P. cylindricus* Luc. (= *hipponensis* Desbr.), *P. laevicollis* Fairm.

2. Reitter.

Neue Uebersicht der Arten der Coleopteren-Gattung
Ischyronota Weise.

(Wien. ent. Zeit. XX p. 103—108).

Eine dichotomische Auseinandersetzung von 8 Arten, von denen eine neu ist.

Die behandelten Arten.

Ischyronota Brisoutii Reitt., *I. elevata* Reitt. mit var. *nitidula* Wse., *I. Späthii*
n. sp. (p. 108) Turkestan, mit var. *deserticola* n. var. (p. 108) Süd-Russland, *I.*
desertorum Gebl. mit var. *araxicola* Reitt. u. var. *basimargo* n. var. (p. 108)
Turkestan.

1. Weise.

Beitrag zur Kenntniss der afrikanischen *Galerucinen*.

(Deut. ent. Zeit. 1901 p. 273—300).

Eine dankenswerthe dichotomische Revision der Gruppe *Diacanthini*, in der 3 Gattungen auseinander gesetzt werden. Als Anfang werden noch 2 (wie es scheint, aber nicht gesagt wird) neue Gattungen (*Prosmidia* u. *Belona*), die von der Gruppe auszuschliessen sind, ebenso behandelt.

Die behandelten Gattungen und Arten.

Diacantha Chvr. (p. 274), dich. Tab. über 32 Arten, v. d. neu: *D. adusta* n. sp.
(p. 276, 282) Ashante, *D. nigricornis* n. sp. (p. 276, 282) Tanga, *D. nigripes*
n. sp. (p. 277, 283) Gabun, *D. flavescens* n. sp. (p. 276, 283) Ashante, *D. Jacobyi*
n. sp. (p. 277, 284), *D. pallipes* n. sp. (p. 277, 284), *D. melanoptera*
Thms. var. *bipunctata* n. var. (p. 277), *D. affinis* n. sp. (p. 278, 285) u. *D.*
robusta n. sp. (p. 278, 285) Gabun, *D. Pauli* n. sp. (p. 279, 285) u. *D. usambarica*
n. sp. (p. 279, 286) Mombo, *D. collaris* n. nom. (p. 279, 287¹) für *D.*

1) Warum ein neuer Name nöthig ist, wird nicht gesagt.

oculata All. 1888, *D. albidicornis* n. sp. (p. 280, 288) Sierra Leona, *D. diffusa* n. sp. (p. 280, 288) mit var. *pauvillia* n. var. u. var. *spilota* n. var. (p. 280, 288) Tanga, *D. varians* n. sp. (p. 281, 289) mit var. *incompta* n. var. (p. 281, 289) Ost-Afrika.

Sonchia n. gen. (p. 274, 290) für *Hyperacantha pectoralis* Jac. 1894 (= ? *Aulacophora granulata* All. 1888¹⁾).

Jacobyia n. gen. (p. 273, 290) *ochracea* n. sp. (p. 291) Madagascar, hierher auch *Aulacophora cavicollis* Fairm.

Prosmidia n. gen. (p. 293), dich. Tab. über 10 Arten: *Pr. capensis* n. sp. (p. 295, 296) Kap, *Pr. Bennigseni* n. sp. (p. 295, 297) Dar-es-Salam, *Pr. Passetii* All., *Pr. pygidialis* Fairm., *Pr. sexplagiata* Jac., *Pr. conifera* Fairm., *Pr. Suahelorum* n. sp. (p. 295, 298) Usambara, *Pr. Thomsonis* Jac. (p. 296), *Pr. divisa* Gerst., *Pr. tricolor* Weise (nov. sp.?²⁾).

Belona n. gen. (p. 299), dich. Tab. über 3 Arten (p. 299); *B. meridionalis* n. sp. (p. 299) Afrika, *B. occidentalis* n. sp. (p. 299, 300) Quango, *B. Petersii* Bert.

2. Weise.

Ostafrikanische *Criocerinen*.

(Arch. Nat. 67. I. 1901 p. 145—163).

Es werden mehrere ostafrikanische Arten der Gattungen *Lema* u. *Crioceris* einer Revision unterworfen und erstere auch dichotomisch auseinander gesetzt. (p. 146—151), wobei jedoch *L. Kolbei* fehlt. Inconsequent ist die Behandlung von *Brachylema*, bald als Untergattung (p. 146), bald als Gattung (p. 151, 152), so dass die eigentliche Ansicht des Autors verborgen bleibt.

Die behandelten Arten.

Lema (Bradylema) rusticella n. sp. (p. 146, 151) Mombo, *Cr. subcastanea* n. sp. (p. 146, 152) Usambara, *L. (i. sp.) macrodera* n. sp. (p. 146, 152) Kitui, *L. firma* n. sp. (p. 147, 154) Kwai, *L. Bennigsenii* n. sp. (p. 147, 153) Dar-es-Salaam, *L. sulcicollis* n. sp. (p. 147, 154) Delagoa-Bai, *L. chalcoptera* Lac., *L. planifrons* n. sp. (p. 147, 155) Usambara, *L. Mechowii* n. sp. (p. 147) Quango, *L. pauperata* Lac., *L. fuscitarsis* Jac., *L. hottentotta* Lac., *L. pubescens* Lac., *L. longula* Qued., *L. Regimbartii* Gestr., *L. Dregei* Lac., *L. brevicornis* Jac., *L. nigriventris* Gerst., *L. hirtifrons* n. sp. (p. 149, 156), Mombo, *L. Kolbei* n. sp. (p. 156) Usambara, *L. usambarica* n. sp. (p. 150, 157) mit var. *laetifica* n. var., *L. acutangula* n. sp. (p. 150, 158) Nguelo, *L. fugax* n. sp. (p. 150, 159), *L. azurea* Lac., *L. ictérica* n. sp. (p. 150, 160) Transvaal, *L. Pauli* n. sp. (p. 150, 161) Kwai, *L. marosa* Gerst., *L. Suahelorum* n. sp. (p. 150, 161) Mombo, *L. aurifrons* n. sp. (p. 151, 161) Kwai.

Crioceris crassicornis n. sp. (p. 162), *Cr. kwaiensis* n. sp. (p. 163) Kwai.

¹⁾ Allard's Beschreibung bezieht sich zwar nur auf die Färbung u. mag daher ungenügend sein, dass aber die Allard'sche Art nur i. litt. vorhanden u. „ohne Beschreibung“ publicirt sei, wie Weise angiebt, ist nicht zutreffend.

²⁾ Die Art ist in der Tabelle wie die übrigen neuen Arten mit einem „m.“ bezeichnet u. hat kein Citat, scheint also neu zu sein. Aber unter den ausführlichen Beschreibungen der neuen Arten kommt sie nicht vor.

3. Weise.

Ein Beitrag zur Kenntniss von *Paropsis* Ol.

(Arch. Nat. 67. I 1901 p. 164—174).

Eine nicht ganz umfassende systematische Sichtung der Gruppe aus der 6 Gattungen nach neuen Gesichtspunkten abgeordnet und dichotomisch begründet werden, während die grösste Zahl der Arten, den Gattungen *Paropsisipacha* Motsch., *Dicranosterna* Motsch., *Paropsisterna* Motsch., *Niliosoma* Motsch., *Trochalodes* (n. gen.?), *Chrysophtharta* (n. gen. in litt.) angehörend, vorläufig noch unentwirrt bleiben. Die Monographie von Blackburn (1897—1901 mit 338 Arten) war dem Autor noch nicht bekannt, hätte seine Untersuchungen auch nicht wesentlich fördern können, da sie alle Arten in der alten Gattung *Paropsis* zusammenfasst, die fast ganz nach Chapuis in Gruppen getheilt ist.

Die behandelten Gattungen u. Arten.

Paropsis Ol. (p. 165, 166) für 28 Arten der Gruppe I von Chap., v. d. genannt werden: *P. ornata* Marsh., *P. amboinensis* Ol. (= *atomaria* Marsh., Bal.), *P. obsoleta* Ol. (= *charybdis* Stål.), *P. lutea* Marsh. (= *aegrota* Boisd.), *P. reticulata* Marsh. (= *granulosa* Boisd.), *P. ornata* Marsh. (= *miliaris* Boisd.), *P. paphia* Stål, *P. irrorata* Chap. Ausgeschlossen werden: *P. crocata* Boisd. (= *Waterhousei* Bal.) u. *P. pictipes* Chap., die zu *Chrysophtharta* kommen.

Procris n. gen. (p. 165, 166) für *P. pictipennis* Boh. u. *P. trifasciata* Boisd.

Dicranosterna Mot.: *D. picea* Ol., *D. immaculata* Marsh., *D. oblonga* Chap., *D. semipunctata* Chap., *D. aeraria* Chap.

Trochalodes n. gen. (p. 167¹) für *P. Circe* Stål, *P. bipunctata* Chap., *P. umbrosa* Chap. u. a.

Chrysophtharta n. gen. (p. 166, 167¹) für *P. nobilitata* Er., *P. cassidoides* Boisd., *P. M-fuscum* Boh., *P. obovata* Chap., *P. vulgaris* Chap., *P. hectica* Chap. u. a.

Faex n. gen. (p. 165, 168) für *P. notatipennis* Chap., *P. subfasciata* Chap., *P. coadnuta* Chap. u. a.

Paropsides Mot. (p. 166, 168) mit 9 Arten, v. d. 2 neu: *P. duodecimpustulata* Gebl., *P. hieroglyphica* Gebl., *P. nigrofasciata* Jac., *P. nigropunctata* Jac., *P. maculicollis* Jac., *P. umbrosa* Chap.²), *P. sinuata* n. sp. (p. 169) Neu-Süd-Wales, *P. pellex* n. sp. (p. 170) Australien.

Philhydronopa n. gen. (p. 166, 170), *subaenea* n. sp. (p. 170) Australien, vielleicht auch *P. acneipennis* Chap.

Pyrgo n. gen. für zahlreiche Arten, v. d. 14 genannt werden, ferner: *P. obtusata* n. sp. (p. 172) Melbourne, *P. longula* n. sp. (p. 172), *P. personata* n. sp. (p. 173) u. *P. mansueta* n. sp. (p. 174) Australien.

¹) Fehlt in der dichot. Tabelle.

²) Diese Art ist bereits zu *Trochalodes* gebracht.

Einzelbeschreibungen.

- Achaenops mandibularis* n. sp. **Jacoby** (Tr. ent. Soc. Lond. 1901 p. 240) Natal.
- Adimonia mongolica* n. sp. **Csiki** (Zichy Reise II p. 119) Mongolei.
- Aethomorpha epistomata* n. sp. **Jacoby** (Tr. ent. Soc. Lond. 1901 p. 226) Kap.
- Alethaxius columbicus* n. sp. **Jacoby** (Berl. ent. Z. 1901 p. 482) Columbien.
- Ambrostoma* siehe **Jacobson** pag. 269.
- Aniaropsis* n. gen. **Fairmaire** (Rev. Ent. 20 p. 233), *latifrons* n. sp. (p. 234) Madagascar.
- Anomomera* Fairm. = *Centroscelis* nach **Jacoby** (Tr. ent. Soc. p. 253).
- Antsianaka Perrieri* n. sp. **Fairmaire** (ibid. p. 243), *A. rugipennis* n. sp., *A. pellucida* n. sp. (p. 244) u. *A. oxyops* n. sp. (p. 245) Madagascar.
- Aphilenia* siehe **Jacobson** pag. 268.
- Aphthona semicyanea* var. *phrygia* n. var. **Weise** (D. ent. Z. p. 204) Klein-Asien. — *A. Fuentei* n. sp. **Reitter** (Wien. ent. Z. 90 p. 202) Spanien. — *A. crunipes* n. sp. **Jacobson** (Hor. ross. 35 p. 92) mit var. *alata* n. var. (p. 93) West-Sibirien. — *A. semicyanea* n. sp. var. *atra* n. var. **Csiki** (Zichy Reise II p. 120). — Siehe auch **Bedel** pag. 267 u. **Jacobson** pag. 269.
- Apterocuris* n. gen. **Jacobson** (Hor. ross. 35 p. 85) für *Chrysomela sibirica* Gebl. mit var. *aurichalcea* n. var., var. *purpurea* n. var., var. *cyanea* n. var., var. *violacea* n. var. (p. 86) West-Sibirien.
- Arsoa* n. gen. *longimana* n. sp. **Fairmaire** (Not. Leyd. Mus. 23 p. 82), *A. aranea* n. sp. (p. 83) Madagascar.
- Asbecesta usambarica* n. sp. **Weise** (D. ent. Z. p. 306) Momo, *A. terminalis* n. sp. (p. 306) u. *A. Hintzii* n. sp. (p. 307) Usambara.
- Aspidomorpha Boisduvalii* Boh. gehört zu *Thlaspidula* nach **Spaeth** (Verh. Zool. bot. Ges. Wien 1901 p. 346) von *Thl. fimbriata* Sp. unterschieden (p. 347), *A. sedecimmaculata* Boh. gehört zu *Sindia* Ws. (p. 347). — *A. Kolbei* **Weise** var. *pelligera* n. var. (?) **Weise** (D. ent. Z. p. 309), *A. degenerata* n. sp. (p. 310) Afrika. — *A. vernicata* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. 20 p. 246) Madagascar.
- Baranosa* siehe **Goniochenia**.
- Barybaena humeralis* n. sp. **Jacoby** (Tr. ent. Soc. Lond. 1901 p. 227) Natal, *B. lurida* Lac. ♀ (p. 228).
- Bedelia viridicoerulea* n. sp. **Reitter** (D. ent. Z. p. 84) Bucharei.
- Belona*, *Bradylema* siehe **Weise** pag. 271.
- Callispa silacea* n. sp. **Weise** (D. ent. Z. p. 225) Congo.
- Campptolenes brevitarsis* n. sp. **Jacoby** (Tr. ent. Soc. Lond. 1901 p. 228 tab. X fig. 7) Süd-Afrika.
- Cassida* (i. sp.) *fovangula* n. sp. **Reitter** (Wien. ent. Zeit. XX p. 164 tab. III fig. 9) Turkestan. — *C. nigro-gilbosa* n. sp. **Spaeth** (Stett. ent. Zeit. 62. p. 10) Sumatra. — *C. profundestriata* **Spaeth** = *C. mira* Germ. var. nach **Spaeth** (Verh. Zool. bot. Ges. Wien 1901 p. 346) vergl. auch *Orectis*. — *C. sedecimmaculata* gehört zu *Sindia* (p. 347), *C. residua* n. sp. **Weise** (D. ent. Z. p. 53), *C. Hornii* n. sp. (p. 54) u. *C. (Odontonychia) gilva* n. sp. (p. 55) Ceylon. — *C. pallicolor* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. 20 p. 247). — Siehe auch *Ischyronota*.

- Cassidula interstitialis* n. sp. **Spaeth** (Stett. ent. Zeit. 62 p. 12) Sumatra.
- Cercyonia variabilis* n. sp. **Weise** (D. ent. Z. p. 303) mit var. *striolata* n. var., var. *maculata* n. var. u. var. *funesta* n. var. (p. 303, 304) Bagamojo.
- Cercyonops* n. gen. **Jacobson** (Hor. ross. 35 p. 83) für *Chrysomela caraganae* Gebl., mit var. *simplex* n. var. (p. 84), var. *sesquialtera* n. var., var. *hieroglyphica* n. var., var. *limbata* n. var. u. var. *Menetriesii* Gebl. (p. 84) Sibirien. — Siehe auch **Jacobson** pag. 269.
- Chaetocnema concinna* var. *nitidicollis* n. sp. n. var. **Jacobson** (Hor. ross. 35 p. 91). — Siehe auch **Jacobson** pag. 269.
- Chalcoides* siehe **Bedel** pag. 267.
- Charidotis Herminae* Sp. = *Ch. vitreata* Pert. nach **Spaeth** (Verh. Zool. bot. Wien 1901 p. 348).
- Cheiriphyle* n. gen. *metallica* **Jacoby** (Tr. ent. Soc. Lond. 1901 p. 241) Afrika.
- Chelysida* Fairm. unterschied von *Oxylepus* **Spaeth** (Verh. Zool. bot. Ges. 1901 p. 751), *Ch. obtecta* Fairm. genauer beschrieben (p. 751).
- Chilotoma* siehe **Jacobson** pag. 268.
- Chlamys Lacordairei* n. sp. **Jacoby** (Proc. Zool. Soc. 1901 I p. 153 tab. XIV fig. 8), *Chl. dentipes* n. sp. (p. 154 fig. 5), *Chl. Deyrollei* n. sp. (p. 155 Fig. 3), *Chl. discipennis* n. sp. (p. 156 fig. 1) u. *Chl. brasiliensis* n. sp. (p. 157) Brasilien, *Chl. insularis* n. sp. (p. 157) Haiti, *Chl. cordovensis* n. sp. (p. 158 fig. 7) Argentinien, *Chl. clypeata* n. sp. (p. 159 fig. 6) u. *Chl. loliviana* n. sp. (p. 159 fig. 2) Bolivien, *Chl. amazonica* n. sp. (p. 160 fig. 4), *Chl. tuberculicollis* n. sp. (p. 161) Brasilien, *Chl. peruana* n. sp. (p. 162) Peru, *Chl. indica* n. sp. (p. 163 fig. 9) Indien, *Chl. sumatrana* n. sp. (p. 163) Sumatra, *Chl. hirta* Koll. (tab. XIV fig. 10), *Chl. luteola* Germ. (fig. 11), *Chl. smaragdina* Kl. (fig. 12). — *Chl. Perrieri* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. 20 p. 235), *Chl. rubiginosa* n. sp. (p. 235) Madagascar.
- Chloropterus stigmaticollis* Frm. var. *Normandii* n. var. **Pic** (Ech. 17. p. 91) Tunis.
- Chrysispa squarrosa* n. sp. **Weise** (D. ent. Z. p. 231) Angola (?), *Chr. fera* (p. 232) Congo.
- Chrysochloa* siehe *Oreina* u. **Bedel** pag. 266 u. **Jacobson** pag. 269.
- Chrysomela transvalense* n. sp. **Jacoby** (Tr. ent. Soc. Lond. 1901 p. 253) Transvaal, *Chr. salisburyensis* n. sp. (p. 255) Mashonaland. — *Ch. numida* Reiche = *Chr. aegyptiaca* Ol. nach **Weise** (D. ent. Z. p. 256). — *Chr. montana*, *tibialis* u. *subcostata* besprach **Jacobson** (Hor. ross. 35 p. 81). — *Chr. distans* n. sp. **Csiki** (Zichy Reise II p. 116) Mongolei, *Chr. muralis* n. sp. u. *Chr. teichophila* n. sp. (p. 117) China, *Chr. urbana* n. sp. (p. 117) Sibirien. — Siehe auch **Bedel** pag. 266 u. **Jacobson** pag. 268.
- Chrysomelites simplex* n. sp. **Fritsch** (Arch. naturw. Land. Böhm. XI 1901 p. 175 fig. 22), fossil in Böhmen.
- Chrysophtharta* siehe **Weise** pag. 272.
- Clythra Lacordairei* n. sp. **Jacoby** (Tr. ent. Soc. Lond. 1901 p. 216) Mashonaland. — *Cl. madecassa* n. sp. **Fairmaire** (Not. Leyd. Mus. 23 p. 81) Madagascar. — Siehe auch **Jacobson** pag. 268.

- Coelaenomenodera costulata* Kolbe beschrieb ausführlicher Weise (D. ent. Z. 1901 p. 226).
- Coenobius Pauli* n. sp. **Weise** (D. ent. Z. p. 302) Mombo.
- Colaphus Sophiae* var. *iconiensis* n. var. **Pic** (Ech. 17 p. 35). — *C. duodecimpunctatus* Motsch. gehört zu *Pentamesa* nach **Jacobson** (Hor. ross. 35 p. LVII u. 93).
- Colaspis coneja* n. sp. **Kolbe** (Berl. ent. Z. 1901 p. 481) Columbien.
- Colasposoma semipurpurea* n. sp. **Jacoby** (Ann. Belg. 45 p. 293) Madagascar. — *C. curvipes* n. sp. **Jacoby** (Tr. ent. Soc. Lond. 1901 p. 251) Afrika.
- Coptocephala melanocephala* Ol. var. *tunisea* n. var. **Pic** (Ech. 17. p. 80) Tunis, *C. tetradyma* Kst. var. *subobliterata* n. var. (p. 83) Savoiien.
- Coptocyclus vitreata* Perty gehört zu *Charidotis* nach **Spaeth** (Verh. Zool. bot. Wien 1901 p. 348), *C. Westringii* Boh. ist eine echte *Chirida* und von *C. catenata* Boh., die eine *Metriona* ist, verschieden (p. 348). — *C. aruensis* n. sp. **Weise** (D. ent. Z. p. 354) Insel Aru. — *C. hyalocincta* n. sp. **Fairmaire** (Rev. ent. 20 p. 247) Madagascar.
- Corynodes auripes* n. sp. **Jacoby** (Tr. ent. Soc. Lond. 1901 p. 252) Afrika, *C. varicolor* n. sp. (p. 252) Dahomey.
- Crepidodera analis* gehört zu *Phygasia* nach **Jacoby** (Ann. Belg. 45 p. 302). — *Cr. coeruleicollis* **Pic** (Ech. XVII p. 20) Alpen.
- Crioceris transvalensis* n. sp. **Jacoby** (Tr. ent. Soc. Lond. 1901 p. 213) Transvaal. — *Cr. crassicornis* n. sp. **Weise** (Arch. Nat. 67 p. 162) u. *Cr. kwaiensis* (p. 163) Ost-Afrika. — *Cr. Asparagi* u. *Cr. duodecimpunctata* abgebildet von **Felt** (Bull. N. York Mus. 37. VIII. p. 27 fig. 42, 43). — Siehe auch **Weise** pag. 271 u. **Jacobson** pag. 268.
- Cropalatus* n. gen. (bei *Rhaebus*¹⁾ **Perrieri** n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. 20 p. 232) Madagascar.
- Crosita* (*Pezocrosita* n. subg.) *Kusnetzowii* n. sp. **Jacobson** (Hor. ross. 35 p. 78) West-Sibirien. — Siehe auch **Jacobson** pag. 000.
- Cryptocephalites* n. gen. *punctatus* n. sp. **Scudder** (Geol. Surv. Canad. II. 1. 1895 p. 33 tab. II fig. 4), fossil in Canada.
- Cryptocephalus vittatus* Fbr. var. *Desbrochersii* n. var. **Pic** (Misc. Ent. 1898 p. 139), *Cr. crassus* Ross. var. *posticemaculatus* (p. 139). — *Cr. Delagrangi* **Pic** var. *taurusiensis* n. var. **Pic** (Rev. Bourb. 1898 p. 93). — *Cr. distinctenotatus* n. sp. **Pic** (Ech. XVII p. 19) Libanon, *Cr. crassus* Ol. var. *praescutellaris* n. var. (p. 38) Algier, dich. Tab. über 4 var. (p. 38). — *Cr. libanensis* n. sp. **Pic** (Bull. Autun XIV p. 38) Libanon. — *Cr. atrifrons* n. sp. **Abeille** (Nouv. esp. Col. p. 6, Ech. XVII p. 70) See-Alpen. — *Cr. argenteohirsutus* n. sp. **Jacoby** (Ann. Belg. 45. p. 287), *Cr. coeruleipennis* n. sp. (p. 288) und *Cr. imitans* n. sp. (p. 289) Madagascar, *Cr. Fairmairei* n. nom. (p. 289) für *Cr. perelegans* Fairm. nec Baly. — *Cr. mashonanus* n. sp. **Jacoby** (Tr. ent. Soc. Lond. p. 234) Mashonaland, *Cr. Barkeri* n. sp. (p. 235 fig. 3) Natal, *Cr. lividus* n. sp. (p. 236 tab. X fig. 1) Mashonaland, *Cr. malvernensis* n. sp. (p. 237) Natal, *Cr. varie-*

¹⁾ Nur habituelle Aehnlichkeit, Kopf nicht rüsselförmig.

plagiatus n. sp. (p. 237 fig. 2) Mashonaland, *Cr. praetoriensis* n. sp. (p. 238) Praetoria, *Cr. benuensis* n. sp. (p. 239) Niger. — *Cr. nigricollis* n. sp. **Weise** (D. ent. Z. p. 301) Usambara, *Cr. senegalensis* var. *kerenensis* n. var. (p. 302). — *Cr. Krutovskiji* n. sp. **Jacobson** (Hor. ross. 35. p. 76) West-Sibirien, *Cr. octopunctatus* var. *apometus* n. var. (p. 77), *Cr. ongudajensis* n. sp. (p. 95) West-Sibirien, *Cr. Subovskiji* var. *flavovirroratus* n. var. (p. 97), dich. Tab. über 10 spp. (p. 98–99). — *Cr. dilutipes* n. sp. **Fairmaire** (Rev. ent. 20 p. 236), *Cr. flavocyaneus* n. sp. (p. 236), *Cr. oculicollis* n. sp., *Cr. argyroleurus* n. sp. (p. 237), *Cr. sulcostriatus* n. sp., *Cr. callinotus* n. sp. (p. 238) u. *Cr. minusculus* n. sp. (p. 239) Madagascar. — Siehe auch Bedel pag. 266 und Jacobson pag. 268.

Cteisella imitatrix n. sp. **Spaeth** (Verh. Zool. bot. Ges. Wien 1901 p. 348) Peru.

Ctenochira dissoluta n. sp. **Spaeth** (Verh. Zool. bot. Ges. Wien 1901 p. 349) Peru.

Dactylispa clavata n. sp. **Weise** (D. ent. Z. p. 235) Tanga, *D. misella* n. sp. (p. 236) u. *D. discreta* n. sp. (p. 237) Usambara, *D. lenta* n. sp. (p. 237) Ost-Afrika, *D. modica* n. sp. (p. 310) Ubugwe.

Decaria nigripennis n. sp. **Weise** (D. ent. Z. p. 305) u. *D. Jacobyi* n. sp. (p. 305) Mombo.

Diabrotica vittata abgebildet von **Felt** (Bull. N. York Mus. 37. VIII. pag. 25 fig. 39).

Diacantha, *Diacanthini* siehe **Weise** pag. 270.

Diapromorpha bomaensis n. sp. **Jacoby** (Tr. ent. Soc. Lond. 1901 p. 219) Congo, *D. tigrina* n. sp. (p. 220 tab. X fig. 8) Ost-Afrika, *D. terminata* n. sp. (p. 220 fig. 10) Mashonaland.

Dibolia siehe **Jacobson** pag. 269.

Dicranosterna siehe **Weise** pag. 272.

Disonycha floridana n. sp. **Jacoby** (The Ent. 34. p. 146) Florida, *D. argentinensis* n. sp. (p. 147) Argentinien, *D. labiata* n. sp. (p. 148) Mexico, *D. Venezuelae* n. sp. (p. 148) Venezuela.

Donacia transcaucasica n. sp. **Ssumakow** (Sitzb. Stat. Ges. Dorp. II p. 454) Batum. — Siehe auch **Jacobson** pag. 268.

Donaciasta n. nom. **Fairmaire** (Rev. Ent. 20 p. 233) für *Donacilla*.

Donacilla n. gen. (bei *Donacia*) **Fairmaire** (Bull. Fr. p. 127), *D. Perrieri* n. sp. (p. 128) Madagascar. — Siehe *Donaciasta*.

Downesia siehe **Hanoia**.

Emperochela n. gen. **Spaeth** (Verh. zool. bot. p. 333) für *Porphyraspis palmarum* Boh., *cyanea* Say, *xanthocera* Boh. u. vielleicht *P. Mulsantii* Boh., *Gundlachi* Boh., *Besckei* Boh. u. *fallax* Suffr.

Endoschyrus n. gen. (*Eumolpini*) **Jacoby** (Ann. Belg. 45 p. 294) für *Endocephalus retifer* Baly.

Entomoscelis siehe **Jacobson** pag. 268.

Epitrix cucumeris abgebildet durch **Felt** (Bull. N. York Mus. 37. VIII. p. 26 fig. 40).

- Eumolpus Sophiae* n. sp. **Kolbe** (Berl. ent. Z. 1901 p. 483 tab. VII fig. 7) Columbien.
- Eutornus madagascariensis* n. sp. **Jacoby** (Ann. Belg. 45 p. 300) Madagascar.
- Faex* siehe Weise pag. 272.
- Foudrasia* siehe *Novofoudrasia*.
- Galeruca fulvirmargo* n. sp. **Reitter** (D. ent. Z. p. 186) Turkestan. — *G. luteola* abgebildet von **Felt** (Bull. N. York Mus. 37. VIII. p. 21 fig. 29). — Siehe auch **Jacobson** pag. 269.
- Galerucella madagascariensis* n. sp. **Jacoby** (Ann. Belg. 45 p. 302) Madagascar. — *G. usambarica* n. sp. **Weise** (D. ent. Z. p. 307) Mombo. — *G. sibirica* n. sp. **Csiki** (Zichy Reise II p. 118) u. *G. Jakowleffii* n. sp. (p. 118) Sibirien.
- Gastrolina* siehe **Jacobson** pag. 269.
- Goniochenia (Baranosa) humilis* n. sp. **Späth** (Verh. Zool. bot. Ges. Wien 1901 p. 337) Peru, *G. (Baran.) decolor* Weise ♂ (p. 338) hierher auch *Mesomphalia Buckleyi* (p. 338).
- Gymandrophthalma triplagiata* n. sp. **Jacoby** (Pr. ent. Soc. Lond. 1901 p. 231) Mashonaland, *G. picturata* n. sp. (p. 231) u. *G. capensis* n. sp. (p. 232) Kap, *G. malvernensis* n. sp. (p. 233) Natal. — Siehe auch **Jacobson** pag. 268.
- Gyriodera sublaevicollis* n. sp. **Jacoby** (Tr. ent. Soc. Lond. 1901 p. 230 tab. X fig. 11 Natal.
- Haltica Alluandii* n. sp. u. *H. nitidicollis* n. sp. **Jacoby** (Ann. Belg. 45 p. 296) Madagascar. — *H. sajanica* n. sp. u. *H. sibirica* n. sp. **Csiki** (Zichy Reise II p. 119) Sibirien. — *H. chalybea* abgebildet von **Felt** (Bull. N. York. Mus. 37. VIII p. 15 fig. 18).
- Hanoia* Fairm. = *Downesia* nach **Gestro** (Bull. Soc. ent. ital.).
- Hemiphaedon* siehe *Phaedon*.
- Hemydacne unicolor* n. sp., **Fairmaire** (Rev. Ent. 20 p. 234) Madagascar.
- Hermacophaga* siehe *Leiometozona*.
- Himerida Clavareai* n. sp. **Jacoby** (Tr. ent. Soc. Lond. 1901 p. 242 tab. X fig. 12) Ost-Afrika.
- Hispa congoana* n. sp. **Weise** (D. ent. Z. p. 233) Congo, *H. melancholica* (p. 234) u. *H. pavidata* n. sp. (p. 234) Ost-Afrika, Nachträge u. Berichtigungen zu **Donkier's** Catalogue (ibid. p. 239–240).
- Hispellinus crassicornis* n. sp. **Weise** (D. ent. Z. p. 229) u. *H. militaris* n. sp. (p. 230) Ost-Afrika.
- Hispidae*. Berichtigungen zu **Donkier's** Catalog gab **Weise** (ibid. p. 238–240).
- Hispopria concinna* n. sp. **Gestro** (Bull. Soc. ent. ibid. 33 p. 84), *H. apicalis* n. sp. (p. 87).
- Hyphasis nigroscutata* n. sp. **Jacoby** (Ann. Belg. 45 p. 298) u. *H. similis* n. sp. (p. 299) Madagascar.
- Ikopista* n. gen. **Fairmaire** (Rev. Ent. 20 p. 245) *lutosa* n. sp. (p. 246) Madagascar.
- Ischyronota* besprach **Jacobson** (Wien. ent. Zeit. 1901 p. 125–127). — *I. salsolae* **Becker (Cassida)** ist nicht beschrieben nach **Reitter** (ibid. p. 175). — Siehe auch **Jacobson** pag. 269 u. **Reitter** pag. 270.

Jacoby siehe **Weise** pag. 271.

Labidostomis Korbii n. sp. **Weise** (D. ent. Z. p. 203) Klein-Asien. — *L. Tjutschewii* n. sp. **Jacobson** (Hor. ross. 35 p. 75) West-Sibirien. — Siehe auch **Jacobson** var. 268.

Lachnaea puncticollis Chor. var. *uninstigmata* n. var. **Pic** (Misc. Ent. 1898 p. 74).

Lefevrea semistriata n. sp. **Jacoby** (Tr. ent. Soc. Lond. 1901 p. 245) u. *L. thoracica* n. sp. (p. 246) Mashonaland.

Leimetopona suturalis Branc. = *Hermaeophaga rutilicollis* nach **Jacobson** (Hor. ross. 35. p. 91).

Lema sanguinipennis n. sp. **Jacoby** (Tr. ent. Soc. Lond. 1901 p. 209) Natal, *L. ashantiensis* n. sp. (p. 210) Ashanti. *L. impressicollis* n. sp. (p. 211) Delagoabay, *L. bifoveata* n. sp. (p. 212) Natal. — Siehe auch **Weise** pag. 271.

Leptispa Clavareau n. sp. **Weise** (D. ent. Z. p. 225) Congo.

Leucastea dahomeyensis n. sp. **Jacoby** (Tr. ent. Soc. Lond. 1901 p. 215) Afrika.

Lochmaea orientalis Reitt. = *Diorhabda Rickmersii* Ws. nach **Reitter** (Wien. ent. Zeit. XX p. 59).

Longitarsus. Siehe **Jacobson** pag. 269

Luperus (Calomicrus) Peyronis n. sp. **Pic** (Bull. Soc. Aut. 1899 p. 209). — Siehe **Jacobson** pag. 269.

Lymidus n. gen. *Coquerelii* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. 20 p. 241) Bourbon.

Lythriaria siehe **Bedel** pag. 266.

Macetes variegatus n. sp. **Jacoby** (Tr. ent. Soc. Lond. 1901 p. 242) u. *M. ornaticollis* n. sp. (p. 243) Süd-Afrika.

Macrocnema siehe **Bedel** pag. 267.

Malacosoma facialis n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. 20 p. 243) Madagascar.

Malegia latipennis n. sp. **Pic** (Ech. XVII p. 96) Madagascar. — *M. Jacobsonis* n. sp. **Ssumakow** (Rev. ross. I p. 179) Transcaspien.

Mantura siehe auch **Bedel** pag. 267.

Mashonania n. gen. *brunnea* n. sp. **Jacoby** (Tr. ent. Soc. Lond. 1901 p. 247) Mashonaland, *M. nigrata* n. sp. (p. 248) Natal.

Melasoma lapponicum var. *quadripustulatum* n. var. **Jacobson** (Hor. ross. 35. p. 90). — Siehe auch **Jacobson** pag. 269.

Mesomphalia nudoplagiata n. sp. **Späth** (Verh. Zool. bot. Ges. Wien 1901 p. 339) Brasilien, Unterscheidung von *Pseudomesomphalia* (p. 338), hierher gehören ferner: *M. gibbosa* F., *M. latipennis* Boh., *M. denudata* Boh., *M. 6-maculata* Boh., *M. variolaris* Boh., *M. turrita* Jll., *M. rectipennis* Boh. u. wahrscheinlich: *M. tumidata* Boh., *M. ampliata* Boh., *M. scrobiculata* Boh., *M. 6-maculosa* Boh. u. *M. albofasciata* Boh. — Vergl. auch *Pseudomesomphalia*.

Metriopecta longula n. sp. **Fairmaire** (Not. Leyd. Mus. 23 p. 84) Madagascar. — *M. impressicollis* n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. 20 p. 246) Madagascar.

Miopristis varipes n. sp. **Jacoby** (Tr. ent. Soc. Lond. 1901 p. 217 tab. X fig. 5) Kap, *M. hirta* n. sp. (p. 218 tab. X fig. 4) Mashonaland, *M. melanocephalus* n. sp. (p. 218 fig. 6) Kap.

- Myrcinella* n. gen. *minor* n. sp. **Jacoby** (Ann. Belg. 45 p. 301) Madagascar, hierher noch *Myrcina spectabilis* Bal. u. *Xenaltica picea* Baly.
- Neophaedon* siehe *Phaedon*.
- Nerissus tuberculatus* n. sp. **Jacoby** (Tr. ent. Soc. Lond. 1901 p. 244) Kamerun, *N. bicoloratus* n. sp. (p. 245) Senegal.
- Nisotra madagascariensis* n. sp. u. *N. apicicornis* n. sp. **Jacoby** (Ann. Belg. 45 p. 297) Madagascar.
- Nodostonopa* n. gen. (*Eumolpini*) **Jacoby** (Ann. Belg. 45 p. 293) *subcostata* n. sp. (p. 294) Madagascar.
- Novofoudrasia*. Siehe **Jacobson** pag. 269.
- Odontonychia* siehe *Cassida*.
- Oncoccephala nervosa* n. sp. **Weise** (D. ent. Z. 1901 p. 228) Tanga.
- Oocassida ceylonica* n. sp. **Weise** (ibid. p. 53) Ceylon.
- Orectis* n. gen. (*Cassidini*) **Spaeth** (Verh. Zool. bot. Ges. Wien 1901 p. 346) für *Cassida rugosa* Boh., u. subg. *Parorectis* n. subg. (p. 346) für *Cassida collosa* Boh.
- Oreina alpestris* var. *vinariensis* n. var. **Weise** (D. ent. Z. p. 240 *Crysochloa*¹⁾ Weimar. — *O. basilea* Gebl. var. *nigrocoerulea* n. var. **Jacobson** (Hor. ross. 35. p. 100 *Chrysochloa*), var. *virens* n. var., var. *aeneoviridis* n. var. u. var. *cuprescens* n. var. (p. 100) Westsibirien.
- Oreomela* siehe **Jacobson** pag. 268.
- Oreothassa* n. gen. **Jacobson** (Hor. ross. 35 p. 86) *Martjanowii* n. sp. (p. 88) Westsibirien, dich. Tab. über 12 Gatt. (p. 88–90).
- Oxylepus* Desbr. unterschied von *Chelysida* Fairm. **Spaeth** (Verh. Zool. bot. Ges. Wien 1901 p. 751), *O. Kossmatii* n. sp. (p. 752) Aden auf *Anabasis articulata*, dich. Tab. über 2 spp. u. 3 varr. (p. 752), *O. deflexicollis* Boh. var. *Sahlbergii* n. var. (p. 752, 755) Korfu, var. *capucinus* Desbr. u. var. *involutus* Fairm. (= *suadae* Hal. i. l.) (ibid. p. 756).
- Pachnephorus laevicollis* Frm. var. *Leprieurii* n. var. **Pic** (Misc. ent. 1898 p. 154). — *P. graecus* n. sp. **Pic** (Ech. XVII p. 35) Griechenland. — Siehe auch **Reitter** pag. 270.
- Pachylbrachys leopardinus* Chob. = *P. Caroli* Mars. nach **Pic** (Bull. Fr. p. 365). — *P. Gillotii* n. sp. **Pic** (Bull. Autun. XIV p. 39) Libanon. — Siehe auch **Jacobson** pag. 268.
- Paropsides* siehe **Jacobson** pag. 269 u. **Weise** pag. 272.
- Paropsis splendens* Macl. gehört zu *Augmela* nach **Blackburn** (Tr. R. Soc. S. Austr. 25. p. 131). — Siehe auch **Blackburn** pag. 267 und **Weise** pag. 272.
- Parorectis* siehe *Orectis*.
- Patrisma gibbosa* Gestr. gehört zu *Cassida* nach **Spaeth** (Verh. Zool. bot. Wien 1901 p. 347).

¹⁾ Ueber die Unzulässigkeit des Namens *Chrysochloa* ist das Nöthige schon im Bericht für 1900 p. 282 gesagt. Siehe auch **Bedel** pag. 266 Anm.

Pentamesa siehe *Colaphus*.

Peploptera fulvitaris Jac. = *zambesiana* Pering. nach **Jacoby** (Tr. ent. Soc. Lond. 1901 p. 221), *P. humeralis* Jac. vielleicht = *abyssinica* Lef., *P. curvilinea* n. sp. (p. 222 tab. X fig. 9), *P. Barkeri* n. sp. (p. 223) u. *P. irregularis* n. sp. (p. 224) Natal, *P. Marshallii* n. sp. (p. 225) Mashonaland.

Pezocrosita siehe *Crosita*.

Phaedon (*Neophaedon* n. subg.) **Jacobson** (Hor. ross. 35. p. 90) für *Ph. pyritosum*. — Siehe auch **Jacobson** pag. 269.

Pheloticus sulcatipennis n. sp. **Jacoby** (Ann. Belg. 45. p. 291) u. *Ph. fulvitaris* n. sp. (p. 292) Madagascar.

Philhydronopa siehe **Weise** pag. 272.

Phyllobroticella ochracea n. sp. **Weise** (D. ent. Z. p. 308) u. *Ph. piciceps* n. sp. (p. 309) Gabun.

Phylloreta judaea n. sp. **Pic** (Ech. XVII p. 27) Palaestina. — Siehe auch **Jacobson** pag. 269.

Physoma Klugii n. sp. **Jacoby** (Ann. Belg. 45 p. 299) Madagascar.

Phytodecta viminalis var. *reniplagiata* n. var. **Penecke** (Wien. ent. Zeit. XX p. 20) Steiermark, *Ph. flavicornis* var. *infernalis* n. var. (p. 20) Ragnitzthal. — *Ph. sibirica* var. *fraterna* n. var. **Jacobson** (Hor. ross. 35. p. 82). — Siehe auch **Jacobson** pag. 269.

Plagiodes nigrata n. sp. **Jacoby** (Ann. Belg. 45. p. 295) Madagascar.

Platypria Clavareaui n. sp. **Weise** (D. ent. Z. p. 226) Afrika.

Pleurispa n. gen. **Weise** (D. ent. Z. p. 230) *misella* n. sp. (p. 231) Ost-Afrika.

Poecilomorpha fulvicornis n. sp. **Jacoby** (Tr. ent. Soc. Lond. 1901 p. 213) Ost-Afrika, *P. bicolor* n. sp. (p. 214) Afrika, *P. fasciaticollis* n. sp. (p. 215) Mashonaland.

Polysticta confluens Gerst. var. *Marshallii* n. var. **Jacoby** (Tr. ent. Soc. Lond. 1901 p. 254) Mashonaland.

Porphyraspis sublaevis n. sp. **Spaeth** (Verh. Zool. bot. Ges. Wien 1901 p. 333), *P. Panamae* n. sp. (p. 334) u. *P. valida* n. sp. (p. 335) Columbien, von *Emperochea* dichot. unterschieden (p. 333).

Prasocuris Weisei n. sp. **Reitter** (Wien. ent. Zeit. XX p. 163 tab. III fig. 8). — *Pr. distincta* Lac. var. *pallidithorax* n. var. **Pic** (Ech. 17. p. 59) Tunis.

Prioptera rugosipennis n. sp. **Spaeth** (Stett. ent. Z. 62. p. 3) Sumatra.

Procris, *Prosmidia* siehe **Weise** pag. 272 u. pag. 271.

Pseudocolaspis akbesiana n. sp. **Pic** (Rev. Bourb. 1898 p. 94). — *Ps. Korbii* n. sp. **Pic** (Ech. XVII p. 19) Anatolien. — *Ps. Korbii* n. sp. **Weise** (D. ent. Z. p. 204) Klein-Asien.

Pseudomalegia tibialis n. sp. **Jacoby** (Tr. ent. Soc. Lond. 1901 p. 246) Kap.

Pseudomesomphalia n. gen. (?) **Spaeth** (Verh. Zool. bot. Ges. Wien 1901 p. 338¹⁾, *Ps. Nickelii* n. sp. p. 339) Brasilien, *Ps. nudicollis* Boh. var. *Sancti-Spiritus*

¹⁾ Der Autor lässt uns im Unklaren darüber, ob er *Pseudomesomphalia* als neue Gattung oder als Untergattung von *Mesomphalia* abtrennt.

n. var. (p. 340) Brasilien, *P. punctatissima* n. sp. (p. 340) Venezuela, *P. aurosetosa* n. sp. (p. 341) Ecuador, *P. Inca* n. sp. (p. 342) Peru, *P. trigonata* n. sp. (p. 343) Ecuador, *P. Marthae* n. sp. (p. 343) Peru, *P. huanocensis* n. sp. (p. 344) Peru, *P. croceo-vittata* n. sp. (p. 345) Bolivien.

Psyllomima, Psylliodes siehe Bedel pag. 267.

Pyrgo siehe Weise pag. 272.

Rhembastus coeruleipennis n. sp. **Jacoby** (Ann. Belg. 45 p. 290) u. *Rh. rugicollis* n. sp. (p. 291) Madagascar. — *Rh. semibrunneus* n. sp. **Jacoby** (Tr. ent. Soc. Lond. 1901 p. 249) Mashonaland, *Rh. inermis* n. sp. (p. 250) Zambesi, *Rh. mashonanus* n. sp. (p. 250) Mashonaland.

Sagra rugulipennis n. sp. **Weise** (D. ent. Z. p. 202) Neu-Guinea.

Scotosus n. gen. **Perrieri** n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. 20 p. 240) Madagascar.

Sonchia siehe Weise pag. 271.

Sphaeromela siehe *Chrysomela*.

Sternoplatys Weisei n. sp. **Csiki** (Zichy II p. 118) Mongolei. — Siehe auch **Jacobson** pag. 269.

Stylosomus externemaculatus n. sp. **Pic** (Bull. Soc. Aut. 1899 p. 261), *St. X-signum* n. sp. (p. 261).

Syagrus Lefevrei n. sp. **Jacoby** (Ann. Belg. 45 p. 289) Madagascar.

Syneta betulae F. var. *amurensis* n. var. **Pic** (Ech. 17 p. 19) Amur.

Systema frontalis abgebildet von **Felt** (Bull. N. York. Mus. 37. VIII p. 27 fig. 44).

Thlaspidosoma n. gen. **Spaeth** (Stett. ent. Z. 62. p. 4) *Dohrnii* n. sp. (p. 5) u. *Thl. fallaciosa* n. sp. (p. 7) Sumatra.

Thlaspidula n. gen. *fimbriata* n. sp. **Spaeth** (Stett. ent. Zeit. 62. p. 9) Borneo.

Thyamis apicalis Belk beschrieb **Bedel** (Fam. Col. Sein. V p. 402), dich. Tab. über 4 Arten (p. 401—402). — Siehe auch **Bedel** pag. 266.

Timarcha splendida Per. = *marginicollis* Rosh. var. nach **Weise** (D. ent. Z. p. 334).

Tituboea Lefevrei n. sp. **Jacoby** (Tr. ent. Soc. Lond. 1901 p. 229) Afrika.

Trichostola grandis n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. 20 p. 239) Madagascar, *Tr. rugulosa* n. sp. (p. 240) Bourbon.

Uroplata tibialis n. sp. **Kolbe** (Berl. ent. Z. 1901 p. 483 tab. VII fig. 8) Columbien.

Xanthophysca n. gen. **Perrieri** n. sp. **Fairmaire** (Rev. Ent. 20 p. 242) Madagascar.

Fam. *Coccinellidae.*

Felt 1, Garman 1, Gorham 2, 3, Kolbe 1, 6, J. Müller 3, Penecke 1, Schröder 39, Weise 3, 4, 6, Webster 3.

Biologie.

Weise (6) schilderte die Larve u. die Puppe von *Scymnus ater* (p. 90—92).

Webster (3) versandte erfolgreich lebende *Megilla maculata*, *Hippodamia parenthesis* u. *convergens*, *Coccinella 9-notata* u. *sanguinea* u. *Pentilia misella* nach Kapstadt, u. erhielt (4) von dort lebende *Exochomus nigromaculatus*.

Felt (1) gab eine Abbildung der Larve u. der Puppe von *Coccinella bipunctata* (?) (p. 42 fig. 77).

Garman (1) beschrieb die Larve u. Puppe (p. 16—17) von *Epilachna borealis* (Schädling der Gurken) und gab ihre Abbildung nach Chittenden (fig. 4).

Schröder (39) stellte eingehende Untersuchungen über die Variabilität von *Adalia bipunctata* an, die erst im folgenden Jahre zum Abschluss kommen.

Systematik.

Kolbe (1) vereinigte die Familie mit den *Eudomychiden* zur Abth. B. seiner *Anchistopoden*, deren Abth. A. aus den *Languriiden*, *Erotyliiden*, *Phalacriden*, *Cerambyciden*, *Bruchiden* u. *Chrysomeliden* bestehen.

Adalia bipunctata var. *decempustulata* n. var. *octopustulata* n. var. **Penecke** (Wien. ent. Zeit. XX p. 21) Graz, *A. Revelieri* var. *decepiens* Ws. bei Klagenfurt (p. 21).

Adonia variegata var. *transsylvanica* n. var. **Penecke** (Wien. ent. Zeit. XX p. 21) Siebenbürgen.

Bucolus Nuytsiae n. sp. **Lea** (Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 26 p. 508), *B. nigripes* n. sp. (p. 508) u. *B. obscurus* n. sp. (p. 509) Australien.

Chilocorus Cerberus Muls. ist von *Ch. nigritus* Fbr. verschieden nach **Weise** (Ann. Belg. 45 p. 92). — *Ch. cruentus* n. sp. **Gorham** (Ann. Mag. Nat. Hist. 1901. VII p. 413) u. *Ch. Marshallii* n. sp. (p. 414) Mashonaland.

Chilomenes biguttata Weis. var. *quadriguttata* n. var. u. var. *rufipennis* n. var. **Weise** (Ann. Belg. 45 p. 283) Tanga. — *Ch. Weisei* n. sp. **Gorham** (Ann. Mag. Nat. Hist. 1901. VII. p. 409) u. *Ch. picticollis* n. sp. (p. 410) Natal, *Ch. Geisha* n. sp. (p. 410) Mashonaland.

Cleothera Staudingeri n. sp. **Weise** (Ann. Belg. 45 p. 284) Peru.

Coccinella decempunctata var. *mediopunctata* n. var. **Penecke** (Wien. ent. Zeit. XX p. 21) Graz. — *C. (Myrrha) octodecimguttata* L. var. *flavopicta* n. var. **Müller** (Verh. Zool. bot. Ges. Wien 1901 p. 519) u. *C. i. sp. undecimpunctata* L. var. *oblique-signata* n. var. (p. 521) Dalmatien. — *C. religiosa* n. sp. **Lea** (Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 26. p. 488) Australien.

Ceolophora femorata n. sp. **Weise** (Ann. Belg. 45 p. 91) Sumatra.

Cyrtaulis sellata n. sp. **Gorham** (Ann. Mag. Nat. Hist. 1901. VII p. 414), *C. sexpustulata* n. sp. u. *C. tristis* n. sp. (p. 415) Natal.

Dysis Marshallii n. sp. **Gorham** (Ann. Mag. Nat. Hist. 1901 VII p. 408) Delagoa-Bay, *D. rufocincta* n. sp. (p. 409) Mashonaland.

- Epilachna vulgaris* n. sp. **Weise** (Ann. Belg. 45 p. 280) Gabun, *E. Clavareau* n. sp. (p. 280) Congo, *E. suspiciosa* n. sp. (p. 281) Daarjeling.
- Erithionyx albatius* n. sp. **Lea** (Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 26. p. 507) Australien.
- Exochomus justitiae* n. sp. **Gorham** (Ann. Mag. Nat. Hist. 1901. VII. p. 411) Natal.
- Halysia quatuordecimguttata* var. *concolor* n. var. **Penecke** (Wien. ent. Zeit. XX p. 21) Croatien, *H. octodecimpunctata* var. *Andersonis* Woll. aus Croatien (p. 21). — *H. exiguenotata* **Gorham** (Ann. Mag. Nat. Hist. 1901. VII. p. 407) Natal.
- Hippodamia Rickmersii* n. sp. **Weise** (Ann. Belg. 45 p. 281) Bucharei.
- Leis conformis* Boisd. var. *occidentalis* n. var. **Lea** (Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 26. p. 489) Australien.
- Lithophilus anatolicus* n. sp. **Pic** (Ech. XVII p. 81) Australien, *L. subobscurus* n. sp. (?) (p. 82) Libanon, *L. grandis* n. sp. (p. 82) Palaestina, *L. cribratellus* Fairm. var. *Henonis* n. var. (p. 82) Berrion. — *L. tauricus* n. sp. **Ssemenow** (Hor. ross. 35. p. 254) Krimm.
- Lotis bipunctiger* n. sp. **Gorham** (Ann. Mag. Nat. Hist. 1901. VII. p. 412) Mashonaland.
- Neda* n. sp. (ohne Namen) **Kolbe** (Berl. ent. Z. 1901 p. 485 tab. VII fig. 9).
- Novius tridens* n. sp. **Lea** (Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 26. p. 492), *N. immaculatus* n. sp. (p. 492) Australien.
- Orcus purpureotinctus* n. sp. **Lea** (Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 26. p. 490), *O. Citri* n. sp. (p. 491) u. *O. Australasiae* Boisd. var. *quadrinotatus* n. var. (p. 491) Australien.
- Ortalia Dohrnii* n. sp. **Gorham** (Stock. ent. Z. 62. p. 210) Sumatra. — *O. pectoralis* n. sp. **Weise** (Ann. Belg. 45 p. 284) Assam, *O. Wallacei* Crot. scheint zu *Rhynchortalia* Cr. zu gehören (ibid. p. 285).
- Pelina geometrica* n. sp. **Weise** (Ann. Belg. 45 p. 282) Bolivien.
- Platynaspis Weyersii* n. sp. **Weise** (Ann. Belg. 45 p. 92) Sumatra. — *Pl. obscura* n. sp. **Gorham** (Ann. Mag. Nat. Hist. 1901. VII. p. 412) Natal.
- Propiptus* n. gen. **Weise** (Ann. Belg. 45 p. 95) *subopacus* n. sp. (p. 96) Sumatra.
- Pullus Clavareau* n. sp. u. *P. impiger* n. sp. **Weise** (Ann. Belg. 45 p. 94) Sumatra, *P. saginatus* n. sp. (p. 285) Nguëlo. — Siehe auch *Scymnus*.
- Rhizobius tricolor* n. sp. **Lea** (Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 26. p. 493), *Rh. calomeloides* n. sp. (p. 494), *Rh. virgatus* n. sp. (p. 495), *Rh. alphabeticus* n. sp. (p. 495), *Rh. corticalis* n. sp. (p. 496) u. *Rh. confinis* n. sp. (p. 497) Australien.
- Rhynchortalia* siehe *Ortalia*.
- Rodolia punctigera* n. sp. **Weise** (Ann. Belg. 45 p. 93) Sumatra, *R. Rowlandii* Crot. = *R. (Macronovius) rufopilosa* Muls. (p. 93), *R. andamanica* n. sp. (p. 93) Andamanen.
- Scymnus (Pullus) subinctus* n. sp. **Gorham** (Stett. ent. Z. 62. p. 210) mit var. *Soekarandra* n. var. Sumatra. — *Sc. Apetzii* Muls. var. *quadriguttatus* n. var. u. var. *confluens* n. var. **Müller** (Verh. Zool. bot. Ges. 1901 p. 515) Dalmatien. — *Sc. striatus* n. sp. **Lea** (Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 26. p. 500), *Sc.*

trilobus n. sp. (p. 500), *Sc. indistinctus* n. sp. (p. 501), *Sc. triangularis* n. sp. (p. 501), *Sc. compositus* n. sp., *Sc. minicus* n. sp. (p. 502), *Sc. vittipennis* n. sp. (p. 503), *Sc. pectoralis* n. sp. (p. 504), *Sc. frater* n. sp. (p. 505), *Sc. elutus* n. sp. (p. 505) Australien. — Siehe auch *Pullus*.

Serangium microscopicum n. sp. **Lea** (Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 26. p. 510), *S. nigrum* n. sp., *S. punctipenne* n. sp. (p. 510), *S. moestum* n. sp. (p. 511) u. *S. obscuripes* n. sp. (p. 512) Australien.

Sidis relictus n. sp. **Weise** (Ann. Belg. 45 p. 96) Sumatra.

Solanophila togoënsis n. sp. **Weise** (Ann. Belg. 45 p. 273) Guinea, *S. Hintzii* n. sp. (p. 274) Tanga, *S. ovata* n. sp. (p. 274), *S. discrepans* n. sp. (p. 275) mit var. *nguëlensis* n. var. u. var. *consita* n. var. (p. 276) u. *S. gentilis* n. sp. (p. 277) mit var. *contraria* n. var. (p. 277) Usambara, *S. quadriguttata* ♂ u. ♀ unterschieden (p. 278), *S. occidentalis* Crot. var. *sedecimmaculata* n. var. (p. 278), *S. Callisto* var. *fibulata* n. var. (p. 279). —

Toxotoma rugulosa n. sp. **Weise** (Ann. Belg. 45 p. 273) Peru.

Hymenoptera.

Bearbeitet von **Dr. Robert Lucas** in Rixdorf bei Berlin.

A. Publikationen (Autoren, alphabetisch).

Adlerz, Gtfr. Biologiska Meddelanden om Rofsteklar. Entom. Tidskr. 21. Årg. 3./4. Hft. p. 161—200. — Ausz. von Chr. Schröder, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. No. 28 p. 285. — Betrifft die Familien Sphegidae, Cerceridae, Astatidae, Crabronidae u. Pompilidae.

Biologische Notizen zu folg. Formen: Sphegidae: *Ammophila sabulosa* (p. 163—170), *Miscus campestris* (p. 170—179). — Cerceridae: *Cerceris labiata* Fabr. (p. 179—180), *C. 5-fasciata* Rossi (p. 180), *C. arenaria* L. (p. 180—186), *C. rybiensis* L. (p. 186—187). — Astatidae: *Astata boops* (p. 187—191). — Crabronidae: *Crabro anxius* Wesm., *C. cavifrons* Thoms., *subterraneus* Fab., *Oxybelus uniglumis* L. — Pompilidae: *Salius sanguinolentus* Fab., *Ceropales maculata* Fab., *Pompilus viaticus* L., *P. unguicularis* Thoms. (p. 194—197). — Tillägg: *Psammophila hirsuta*, *Pomp. viaticus*, *Cerceris* etc. (p. 198—200).

Aigner, L. Abafi. A hangyák életéből. Rovart. Lapok, 8. köt. 5 füz. p. 87—93). Schluss: 6 füz. p. 120—126.

Aus dem Leben der Ameisen. Mit 3 Fig.

Alberti, A. Die Bienenzucht im Blätterstock. Lehrbuch der Theorie und Praxis der Bienenzucht, mit besonderer Berücksichtigung des Blätterstocks und seiner Anfertigung. 2. verm. u. verbess. Auflage. Mit Kunstbeilagen, dem Portr. d. Verf.'s und 68 in den Text gedr. Abbildgn. Berlin. C. A. Schwetschke & Sohn. 1901. 8°. IV u. 223 pp. M. 3,—.

Alfken, J. D. *Nomada Robertjeotiana* Panz., eine in zwei Formen auftretende Art. Zeitschr. f. system. Hymenopter. u. Dipter. (Konow) 1. Jhg. 4 Hft. p. 221—222.

Für die kleinere Form schlägt der Verf. die Namen *N. Tormen-tillae* vor. Nach Alfken liegt hier ein Fall vor, dass ein Schmarotzer dadurch, dass er ein anderes Wirthsthier, als gewöhnlich, erwählt hat, derartige Veränderungen erlitt, dass er zur neuen Form oder Art wurde.

— (2). *Nomada zonata* Panzer u. *N. rhenana* Mor. Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 6. Hft. p. 363—365.

- (3). *Halictus kriegeri* Alf. = *H. monstificus* Mor. ♀. t. c. 6. Hft. p. 365.
- Alfonsus, Alois.** Die Kunstschwarm-Bildung. Leichtfassliche Anleitung etc. Leipzig, Leipziger Bienenzeitg., 1901, 8°. 28 p. M. —, 50.
- Altmann, P.** Wie ergreift und verzehrt die Wespe eine Fliege? Zool. Garten, 42. Jhg. No. 2 p. 61.
- Andersson, J.** (1). Plommonsågstekeln (*Hoplocampa fulvicornis* Klug.). Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 57—60.
- (2). Myror såsom skadedjur i trädgården. t. c. p. 60—62. Ameisen als Schädlinge im Obstgarten.
- André, E.** (1). Mutillides, pp. 145—304, pls. VII—XII. Fascicules 74 u. 76 der Hyménoptères d'Europe et d'Algérie, vol. VIII.
- (2). Description de cinq nouvelles espèces de Mutilles de Madagascar. Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 3. Hft. p. 137—144.
- (3). Descriptions de quelques espèces et variétés nouvelles de Mutilles d'Amérique appartenant au Musée Civique de Gènes. t. c. Hft. 5 p. 257—264.
- 5 Sp., dar. 4 n. u. zwar *Mutilla* subg. *Traumatomutilla* (1 bek.), subg. *Ephuta* (1 n.), subg. *Photopsis* (1 n.), subg. *Scaptodactyla* (1 + [?] 1 n.).
- (4). Matériaux pour servir à la connaissance des Mutillides d'Afrique. t. c. Hft. 5. p. 279—288. Forts. 6. Hft. p. 305—352.
- p. 279—288: 8 Sp. (dar. 4 n.) u. zwar *Apterogyna* (2), *Methoca* (2 n.), *Mutilla*, subg. *Tricholabioides* Rad. (2 + 1 n.), subg. *Brachymutilla* subg. n. (1 n.). — p. 305—352. Subg. *Brachymutilla* (Forts.: 1 n.). — Subg. *Dasylabroides* n. (1). — Subg. *Dasylabris* (7 + 3 n.). — Subg. *Stenomutilla* (2 + 1 n.). — Subg. *Rhopalomutilla* n. (1 n.). — Subg. *Nanomutilla* (1 n.). — Subg. *Myrmilla* (1). — Subg. *Odonotomutilla* (1 + 1 n.). — Subg. *Barymutilla* n. (2). — Subg. *Dolichomutilla* (1). *Mutilla*. Hierin verschiedene Gruppen mit 11 Sp., darunt. 5 n.
- (5). Nouvelle contribution à la connaissance des Mutillides de l'Australie. Mém. Soc. Zool. France, T. 14 No. 4 p. 467—513.
- Mutilla*: 41 Sp., dar. 21 neue.
- (6). Sur la femelle probable de *Anomma nigricans* Illig. (Hymenopt.). Avec 4 figs. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris T. 6. No. 7 p. 364—368.
- Anglas, J.** (1). Observations sur les métamorphoses internes de la Guêpe et de l'Abeille. Avec 5 pls. (XIX—XXIII in 4°) et 8 figs. dans le texte. Revue (auch Bull.) Scient. France et Belg. T. 34 p. 363—464, 2 tabl. p. 466—467. litér. p. 469—473.
- Eine äusserst sorgfältige und eingehende Untersuchung der inneren Vorgänge, welche die Metamorphose der Wespe und

Biene begleiten. Von allgemeinen Schlüssen sei hervorgehoben: Der Begriff Metamorphose ist auf die Fälle zu beschränken, bei denen sich eine Lyocytose von Geweben durch die Thätigkeit fremder Gewebe zeigt. Geschieht die Erneuerung der Gewebe durch Elemente desselben u. üben letztere eine lyocytäre Wirkung aus, so hat man es nur mit einem einfachen Wiederauftreten von Wachstum zu thun, welches das Larvenstadium für den Augenblick aufgehoben hatte. Nimmt man an, dass es für das Gewebe selbst eine Art Metamorphose giebt, so kann doch diese Erscheinung kaum auf das Individuum als Ganzes bezogen werden. Vollständig verschwindende Organe sind Anpassungen an das Larvenleben. Die Lyocytose (verdauender Einfluss einzelner Zellen auf andere) ist von grösster Bedeutung für die Zerstörung der Gewebe. Sie tritt ein infolge Störung des dynamischen und chemischen Gleichgewichts infolge der Funktionslosigkeit der Organe des Larvenstadiums. Die Beziehungen zwischen den Lyocyten u. den aufgenommenen Elementen können wechseln. „Die Lyocytose kann auf Entfernung durch Einschliessen, mittelst Durchdringens u. durch Verschmelzung (Phagocytose) wirken. Mehrere Lyocyten können sich zu einem grossen Phagocyten vereinigen. Diese Beziehungen hängen von der Stetigkeit oder Beweglichkeit der vorhandenen Elemente, von ihrer gegenseitigen Gestalt u. der Oberflächenspannung ab. Die Insektenmetamorphose erscheint durch das Aufhören der die Ausbildung der Larve beherrschenden Anpassung bestimmt. Die biologische Umwandlung hat eine Störung des Gleichgewichts zur Folge (asphyxische Phänomene, Lyocytose). Gleichzeitig gewinnen die Kräfte der Entwicklung wieder die Oberhand über die der Anpassung.“ Das Charakteristicum der Metamorphose ist die Histolyse von Organen, deren Nutzen belanglos geworden ist. Tief eingreifende chemische Modifikationen haben die dynamische Unterlegenheit funktionsloser Organe zur Folge, die dadurch ausgeschaltet werden u. der Cytolyse verfallen. Tritt im Laufe der ontogenetischen Entwicklung keine bemerkbare Zerstörung der alten Gewebe auf, so haben wir es nicht mit einer Metamorphose, sondern nur mit einer mehr oder minder beträchtlichen Transformation zu thun. Von einer wirklichen Metamorphose können wir sprechen, wenn Gewebe oder Organe, infolge plötzlicher u. bedeutender Umbildung, unbrauchbar werden u. eine lyocytäre oder phagocytäre Einwirkung durch anderen Geweben zugehörenden Elementen erfahren. Nach dem Original und dem Referat v. Dr. Chr. Schröder, *Allgem. Zeitschr. f. Entom.* 66. Bd. 1901 p. 93.

— (2). Quelques remarques sur les métamorphoses internes des Hyménoptères. *Bull. Soc. Entom. France*, 1901. No. 4 p. 104—106.

Anglas bringt eine Erwiderung auf den Artikel von Pérez. Er stellt zunächst die Punkte fest, in denen er mit Pérez übereinstimmt. Diese sind: die histolog. Elemente der Gewebe der Larve sind voluminöser als die der homolog. Organe des erwachs. Insekts.

Finden wir bei einer Larve bestimmte Gewebe klein u. von embryonal. Aussehen, so können wir sicher annehmen, dass es sich um Imaginalgewebe handelt; sie haben sich nur noch weiter zu vermehren u. sich während des Nymphenstadiums zu differenzieren. Beispiele hierfür: die Imaginalfalten, die der locomotor. u. Genital-Anhänge, die Epithelien des Oesophagus, das Rektum u. das Nervensystem. Die Organe mit grossen Zellen unterliegen hingegen mehr oder weniger schnell einer vollständigen Histolyse (Spinn-drüsen, Malpighische Gefässe, Mitteldarm). Was die mesodermalen Elemente, Muskeln, Fettkörper anbelangt, so sind sie der Schauplatz komplizirter Erscheinungen. Mehr oder minder beträchtliche Rückbildung (vollständige Zerstörung einzelner Muskeln) mit darauffolgender Reorganisation. Die Rückbildung geht vor sich in mehr oder minder frühzeitigen Vorgängen von der „Phagocytose“ bis zur „chemischen Rückbildung“ der Autoren, in Wirklichkeit sind es Verdauungsformen, intracelluläre (Phagocytose) u. extracelluläre (Lyocytose) mit allen Zwischenformen. Verf. legt diesen Metamorphose-Erscheinungen eine chemische Bedeutung bei. In dem Nachforschen nach der ersten Ursache derselben weichen Anglas und Pérez auseinander. Pérez sucht denselben in der wiedererwachenden Thätigkeit embryonal gebliebener Elemente, die aus ihrer Cystenruhe unter dem Einfluss eines neuen Reizes heraustreten. Dieser Reiz beruhe nach Pérez in einer Ausscheidung der in der Entwicklung begriffenen Genitalzellen. Es ist dies leicht möglich, doch bedarf es der Beweise u. es bliebe auch noch die Erklärung übrig, warum die Arbeiter, deren Geschlechtsdrüsen nie in Funktion treten, sich ebenso wie die Männchen u. Weibchen verwandeln.

Anglas versucht auf Grund der bekannten Thatsachen den ersten Anstoss zur Metamorphose dadurch zu begründen:

Jedes funktionirende Organ scheidet Excrete aus (Kohlen-, Harn-, Milchsäure u. s. w.). Sobald das Larvenleben aufhört, stellen auch diese Organe mehr oder minder ihre Thätigkeit ein und daraus ergiebt sich eine chemische Umwandlung, die mehr oder weniger direkt die Metamorphose verursacht. Daraus lässt sich naturgemäss schliessen, dass diese Excrete, die keine hypothetischen sind, einen lähmenden Einfluss auf die zukünftigen, imaginalen Elemente ausgeübt und die Entwicklung derselben während der Larvenperiode verzögert haben. Sobald die Ursache der Verzögerung aufhört, nehmen sie ihre Thätigkeit wieder auf u. entwickeln sich. Die innern Sekrete der jungen embryonalen Gewebe verursachen dann die Auflösung, die Lyocytose der Larvenzellen, die von dem Schauplatz der Lebenserscheinungen abtreten. Zuweilen beschleunigt das mehr oder minder lebhaft eingreifen der Leucocyten den Process.

Diese Erklärung der Thatsachen gestattet es, die inneren Metamorphose-Erscheinungen jenen zahlreich. extracellularen Verdauungsvorgängen einzureihen, wie sie schon in der animalen u. vegetativen Embryologie (auch in der Pathologie) bekannt sind. Es existirt

ein dynamo-chemisches Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Zellsecreten; sobald eine Zelle oder ein Gewebe seine Activität verliert, so sind sie weniger differenzirten Geweben gegenüber im Nachtheil, was ihre Resorption zur Folge haben kann. Im vorliegenden Falle ist es die veränderte Lebensweise, bei welcher durch Ruhestadium u. Unbeweglichkeit der Nympe das Gleichgewicht gestört u. die Metamorphose veranlasst wird. Auf gleiche Weise erklärt sich der Mechanismus des Gesetzes von Geoffroy Saint-Hilaire: der mangelnde Gebrauch eines Organs schwächt dasselbe u. fördert die Tendenz es schwinden zu lassen.

Noch einige Bemerkungen im Besonderen:

Fettkörper: Es ist wenig wahrscheinlich, dass die Protoplasmastränge es sind, die die winkligen Ecken an der Gestalt des Kernes hervorrufen, etwa wie die Muskeln auf ihre Ansätze an den Knochen einwirken. Natürlicher ist es wohl, anzunehmen, dass das Protoplasma die Form des Kernes annimmt. Diese ist nun aber sehr unregelmässig, besonders bei den Vespidae, infolge direkter, oft unvollständiger Theilungen.

Das Fettgewebe der Larve geht in das der Imago über in Folge von Umwandlungen, die das Volumen der Kerne durch Knospung u. Fragmentirung reduzieren. Ein Theil des Gewebes geht bei der Wespe u. Hornisse durch Zerfall zu Grunde. Pérez nimmt an, dass bei den Ameisen alle Fettzellen die Veränderungen in Kern, Protoplasma u. Membran überdauern. Dabei spricht er ihnen eine grosse Zerbrechlichkeit zu, die bei den Vespiden so gross ist, dass schon blosse Körpercontractionen sie zerstören kann. Im Uebrigen haben die vom Messer zerrissenen Zellen ein ganz anderes Aussehen als die Zellen, die, in der Rückbildung begriffen, grosse zusammenfliessende Inseln bilden, wie sie Verf. bei Wespe u. Hornisse beobachtete. Doch ist diese Frage nur von secundärem Interesse.

Verdauungstraktus: Auf Grund erneuerter Untersuchungen ist der Verf. zu der Ueberzeugung gekommen, dass die imaginalen Darmzellen sich nicht vom Mitteldarm der Larve ableiten. Verf. giebt seine frühere Ansicht auf auf Grund folg. Thatsachen:

1. In sehr jungen Larvenzellen oder im Embryonalstadium, giebt es noch keine Ersatzzellen, so klein sie auch sein mögen.
2. Bei ihrem Auftreten werden sie an der Peripherie der Darmzellen oder selbst zwischen diesen Zellen sichtbar (bei d. Biene).
3. Zuerst sind es nur wenige, doch zeigen sie schon ihre Lage, Aussehen u. definitive Form.
4. Bald darauf treten sie zahlreich auf, bilden sich in Folge Theilung zu Ersatzzellen aus, die während des ganzen Larvenlebens im Ruhezustand verharren.

Diese Metamorphose ist also sozusagen, schon im Voraus vorbereitet u. geht zu zwei verschiedenen Zeiten vor sich, die durch das Ruhestadium während des Larvenlebens getrennt sind. Ein einzig stehendes Faktum unter den Umbildungen der anderen Organe, von besonderem Charakter u. spezieller Bedeutung.

— (3). Quelques caractères essentiels de l'histolyse pendant la métamorphose. t. c. p. 301—304.

Die vom Verf. an den Hymenopteren gewonnenen u. auch für andere Insekten bestätigten Beobachtungen stimmen mit den Resultaten anderer französ. u. ausländischer Forscher überein, wie: C. Vaney (Contribution à l'étude des phénomènes de métamorphose chez les Diptères. Compt. rend. Acad. Sci. Paris 5. nov. 1900. T. 131 No. 19 p. 758). C. Vaney et Conte (Compt. rend. Acad. Sci. Paris T. 130 1900 p. 1062—1064). F. Henneguy (Le corps adipeux des Muscides pendant l'histolyse. Compt. rend. Acad. Sci. Paris T. 131 1900 No. 22 p. 908). Vernon, L. Kellog (Histolyse et phagocytose. Americ. Naturalist, May 1901 vol. 35 p. 463—468). A. Berlese (Osservazioni su fenomeni che avvengono durante la ninfosi. Rivista di Patologia vegetale. Ann. X—XI (15. août 1901), p. 157—444, avec 57 figures dans le texte et 8 planches).

Schlussfolgerungen: 1. Beginnender Zerfall. Das mehr oder minder starke Auftreten jeder Histolyse besteht in einem Zerfall der Gewebe. Dies ist in den meisten Fällen leicht zu konstatieren. Der Rückschritt ist zuweilen, wenigstens im Anfange, an gewissen Muskeln wenig sichtbar. Die Spinnrüsen u. die excretorischen Drüsen der Wespen zeigen offenbar eine Entartung, die jeder direkten Thätigkeit der Leucocyten vorangeht. Die Entartung ist eine Auflösung, eine wirkliche Verdauung durch die Leibesflüssigkeit. Sie kann zu einer völligen Histolyse genügen. — 2. Dazwischentreten der Leucocyten. Diese ist nicht nothwendig, aber sehr häufig u. zeigt alle Grade von Intensität. Die Leucocyten treten secundär um die Malpighi'schen Gefässe auf u. besonders um die degenerirenden Speicheldrüsen. Von da an geht die Histolyse rasch ihrem Ende entgegen. Obgleich die Leucocyten häufig in die in der Histolyse sich befindenden Gewebe eintreten, so konnte Anglas doch nie feststellen, dass sie sich an der Phagocytose betheiligten, übrigens wären sie, trotz ihrer Anzahl, nicht im Stande die relativ grosse Masse des Larvenorgans zu bewältigen. Sie treten auch zu den in der Histolyse befindl. Muskeln, wenn die Fibrillen derselben noch nicht oder schon in Verfall geraten sind; zuweilen treten sie zwischen dieselben, sehr oft aber bleiben sie in unmittelbarer Nähe des Muskels u. treten nur selten in unmittelbarer Berührung mit demselben.

Während sie (bei den Hymenopt.) in den Muskeln der hinteren Region ziemlich zahlreich sind, ist ihre Zahl in der Mitte des Abdomens eine sehr beschränkte und im Thorax unbedeutend oder Null. In den beiden letztgen. Fällen ist es ausser Frage, dass keine Phagocytose stattfindet. Diese würde in typischer Form nur in den Fällen vollständiger u. rapider Zerstörung auftreten. Nach Anglas's Meinung sind die zahlr. Diskussionen über diesen Gegenstand durch eine übrigens leicht erklärliche Verwirrung entstanden. Man hat für Leucocyten Elemente angesehen, die vom Larvenkern herkommen. Das führt auf einen dritten Charakterzug der Histolyse, nämlich

3. Eliminationsprodukte des Kerns u. Protoplasmas. Vom Beginn der Histolyse ab nehmen die Muskelkerne (im hint. Theil des Abd.) merklich an Grösse zu, in einem hypertrophirten Sarcoplasma. Sie trennen sich von der Muskelfibrille, in Form kugliger Gebilde u. bilden das, was man Caryocyten (Berlese) nennt. In der mittl. u. vorderen Abdominalgegend sind die Caryocyten kaum grösser als die Leucocyten; ihr dunkleres Aussehen, ihr stärker färbbares Verhalten u. besonders ihr Ursprung lassen sie von den Leucocyten unterscheiden. Dasselbe gilt u. zwar in noch höherem Grade von den Muskeln des Thorax. Wenn die Muskel in ihre imaginalen Fibrillen zerfällt, so sind die unzähligen dazwischenliegenden Körperchen noch Caryocyten, die von den Larvenkernen stammen; aber sie sind klein, zerfallen schnell, es findet sich keine echte Leucocyte darunter.

Im vorigen ist noch nicht von Kernelementen gesprochen worden, die im allgemeinen sehr klein, ebenfalls vom Kern herstammend an der Fibrille haften bleiben u. zur Histogenese dienen. — Wir können also schliessen: Wenn ein Organ in Histolyse tritt (sei sie vollständig oder partiell) oder eine Umbildung zu Gunsten einer Anpassung erleidet, so findet im wechselnden Verhältnisse eine Ausscheidung von Kern- u. Protoplasma-Substanz statt. Das deckt sich übrigens mit der allgemeinen Thatsache der Volumenreduktion der Larvenelemente, sobald sie in das erwachs. Stadium des Thieres übergehen.

Bemerkung. Sehr ähnliche u. fast identische Eliminationserscheinungen hat der Verf. auch in der Histolyse des mittleren Darmepithels u. in der Hypodermis der Wespe u. Biene gefunden. Bei *Anobium paniceum* beschreibt Karawaiew etwas ähnl. für die Malpighi'schen Gefässe. Dieselben Prozesse können mit einigen Variationen in den verschiedensten Geweben gefunden werden; denn sie hängen von ganz allgemeinen Gesetzen ab.

Apicoltore siehe im system. Theil unter Apis.

L'Apiculteur desgl.

Ashmead, Wm. H. (Titel p. 292 sub No. 4 des vorigen Berichts).

Behandelt im einzelnen: **Vespoidea**: Bethylidae: Ateleopterus (1), Sierola (2). — **Cynipoidea**: Figitidae (Subf. III: Anacharinae): Anacharis (2). — (Subf. V: Eucoelinae): Trybliographa (1). — (subf. VI: Allotriinae): Allotria (1). — **Chalcidoidea**: Torymidae (subf. II: Toryminae): Torymus (1). — (Subf. IV: Megastigminae): Megastigmus (2 + 1 bek.). — Chalcididae (Subf. II: Chalcidinae): Haltichella (1), Encyrtocephalus n. g. (1). — Eurytomidae: Systole (1), Eurytoma (3). — Perilampidae: 0. — Eucharidae: Metagea (2). — Miscogasteridae (Subf. II: Tridyminae): Asemantus (1). — Cleonymidae (subf. I: Chalcedectinae): Systolomorpha n. g. (1), Agamerion (1). — (Subf. II: Cleonyminae): Thaumasa (1 + 1 bek.), Dinoura n. g. (2). — Encyrtidae: (subf. I: Eupelminae): Eupelmus (1). — (Subf. II: Encyrtinae): Cerchysius (1). — Pteromalidae:

(subf. I: Merisinae): *Brachyscelidiphaga* n. g. (1). — *Terobiella* n. g. (1), *Coelocyba* n. g. (1). — (Subf. II: Pteromalinae): *Pteromalus* (1 bek.). — (Subf. III: Sphegigasterinae): *Ophelosia* (1 bek.), *Tomocera* (1 bek.). — Elasmidae: *Euryischia* (1 bek.). — Eulophidae (subf. II: Aphelininae: Pteropterix). — (Subf. III: Tetrastichinae): *Tetrastichus* (1). — (Subf. IV: Elachistinae): *Euplectrus* (1). — (Subf. V: Eulophinae): *Dialuomorpha* (1). — **Ichneumonidae**: *Evaniidae*: (subf. III: Aulacinae): *Aulacus* (1). — *Ichneumonidae*: (Subf. I: Ichneumoninae): *Probolus* (3 bek.). (Subf. II: Cryptinae): *Chromocryptus* (1). — (Subf. III: Pimplinae): (Trib. I: Acoetini): *Leptobatopsis* (1). — (Trib. II: Labenini): *Bemerck*. — (Trib. III: Lissonotini): *Euctenopus* n. g. (1). — (Trib. IV: Pimplini): *Allothronia* n. gen. (1). — (Subf. IV: Tryphonini) (Trib. V: Bassini): *Bassus* (1). — (Subf. V: Ophioninae (Trib. IV: Anomalini): *Barylyta* (1). — (Trib. VI: Paniscini): *Paniscus* (1 bek.). — *Alysiidae*: (subf. III: Alysiinae): *Asobara* (1). — **Braconidae** (subf. Aphidiinae): *Lipolexis* (1). — (Subf. IV: Meteorinae: *Meteorus* (1). — (Subf. IX: Cheloninae): *Phanerotoma* (1). — (Subf. X: Agathidinae): *Orgiloneura* n. g. (1). — (Subf. XII: Microgasterinae): *Acoelius* (1), *Apanteles* (2). — (Subf. XIV: Opiinae): *Diachasma* (1). — (Subf. XV: Braconinae): *Einth.* in d. 3 Trib. — (Trib. II: Braconini): *Callibracon* n. g. (1 bek.), *Microbracon* (2). — *Iphiaulax* (2).

— (2). *Magrettina*, a new genus in the family Mymosidae. Proc. Entom. Soc. Washington, vol. 4 No. 4 p. 444—445.

— (3). Some Insects of the Hudsonian Zone in New Mexico II. Hymenoptera parasitica. Psyche vol. IX No. 298 p. 147—148.

— (4). Some Insects of the Hudsonian Zone in New Mexico. IV. Hymenoptera part. t. c. No. 300 p. 185—186.

— (5). A new *Pammegischia*. Entom. News vol. 12 No. 9 p. 277—278.

P. xiphydria.

— (6). Some Changes in the Generic Names in the Hymenoptera. Canad. Entom. vol. 32 No. 12 p. 368.

— (7). Three new parasitic Hymenoptera from South Africa. op. cit. vol. 33 No. 5 p. 138—140.

n. sp.: *Allotropa Loundsburyi*, *Coccidencyrtus flavus* u. *Tetrastichus prospaltae*.

— (8). New Species of *Evaniidae*. t. c. No. 11 p. 300—304. 10 n. sp.

— (9). Hymenoptera parasitica (Sandwich Islands). With 2 pls. (VIII, IX). Fauna Hawaiiensis vol. I P. III p. 277—364. — Siehe auch unter Fauna Hawaiiensis.

128 Sp., darunter 87 n.; n. g.: *Zacranium*, *Platymischoides*, *Hypodiranchis*, *Neolelaps*, *Mesolelaps*.

— (10). Siehe Needham & Betten.

Athimus, Fr. Beitrag zur Ichneumoniden-Fauna Belgiens. Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. No. 13 p. 197—199. Schluss: No. 14/15 p. 220—223.

Veröffentlichung der Liste der vom Autor u. seinem Kollegen Victor Deprez erbeuteten Ichneumoniden Belgiens.

Atlas für Bienenzucht. Anatomie — Histologie — Pathologie. — Bienenfeindliche Thiere. XXX kolorirte Tafeln, gezeichnet von Ingenieur F. Clerici nach mikroskopischen Präparaten des Grafen Gaetano Barbò. Hrsg. vom Central-Verein für Hebung und Verbreitung der Bienenzucht in Italien. Erklärender Text von A. von Rauschenfels. Autoris. deutsche Ausg. Berlin, C. A. Schwetschke u. Sohn 1901 8°. M. 9,—.

Text klar u. populär; Bilder roh, doch im ganzen richtig. Taf. I—VII. Königin nebst Organen derselben, Taf. VII—XI Drohne, Taf. XII—XXVI Arbeiterin. Die letzten Tafeln behandeln die Microorganismen der „Bienenpest“, Feinde der Bienen: Wachsmotte, Bienenlaus, Totenkopf. — K. Escherisch, der die Arbeit in der Allgem. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. referirt, findet folg. Ausstellungen: Einzelne Vergrößerungen (3 Ocellen auf der Stirn des ♂) ohne Details übertrieben (ganze Taf. IX). Präcisere Zeichnungen über Anatomie des Giftapparates bei der Königin u. anderen fehlt. Das Tracheensystem (Taf. XXI) ergiebt aus dem abgebildeten Luftspace keine richtige Vorstellung. Als Feind fehlt: Trichodes u. seine Larve.

— (2). Atalante di Apicoltura. Anatomia, istologia, patologia e parasitologia dell' Ape. 30 tavole colorate, disegnate da F. Clerici sulle preparazione microscopiche di G. Barbò, con testo esplicativo. Milano 1901. 8°. M. 8,—. Eine Uebersetzung dieser Arbeit in's Deutsche siehe unter Atlas.

Baer, W. Ueber das Brüten von Grabwespen in gekappten Baumzweigen. Mit 4 Abbilgn. nach Originalphotogr. Allgem. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. No. 11 p. 161—163.

Es handelt sich hierbei um mehrere gestutzte Zweige der Traueresche (*Fraxinus excelsior* L. var. *pendula* Vahl.). Die in Frage kommenden Wespen sind: *Psen atratus* Dahlb. u. *Crabro* (*Coelocrabro*) *capitosus* Shuck. Hierzu 4 Abb. Untersuchung des Larvenfutters; für *Psen*: *Psylla*, — für *Crabro capitosus* höchstwahrsch. die Dipt.: *Platypalpus*. — Ein weiteres Nest in *Ailantus glandulosa* Desf. von *Pemphredon* (*Cemonus*) *unicolor* (Fabr.) Latr. zu Primkenau. Futter: *Aphis*.

Barrington, R. M. and C. B. Moffat. Wasps in County Wicklow. *The Irish Naturalist*, vol. 10 No. 10 p. 197—201.

Bee Journal siehe im system. Theil unter *Apis*.

Berg, C. La essenza della ninfosi (sunto). *Monit. zool. ital.* vol. XI suppl. p. 31—33.

Berlese, Ant. Insetti nocivi agli alberi da frutto ed alla vite. Portisi. 1900. 183 p., 152 fig.

Insektenschädlinge am Weinstock. Als Schädlinge werden genannt, äusseren Befall erzeugend: *Formica* sp., *Vespa crabro* L., *V. vulgaris* L.

Berthoumieu, V. 6. Supplément aux Ichneumonides d'Europe. Bull. Soc. Entom. France, 1901 No. 18 p. 320—323.

13 n. sp.

No. 74—88. *Ichneumon aureipes* ♀, *strenuus* n. sp., *operosus* n. sp. — *Amblyteles atratus* n. sp., *Dicoelotus pumilus* Wesm. 1^o var. *punicus* ♀. 2^o var. *analisis*. 79. *Herpestomus pinetorum* n. sp., *Diadromus capitatus*, *Phaeogenes corcyriensis* n. sp., *Ph. major* n. sp., *Ph. inanis* n. sp., *minimus* n. sp., *tenuidens* n. sp., *Ph. atratus* n. sp., *Ph. nigrinus* n. sp.; *Ischnogaster fuscibucca*.

Bien. Zeitschrift. Siehe in system. Theil unter Apis.

Biene. Ungarische Zeitschrift. Siehe im system. Theil unter Apis.

Bienenfreund. Zeitschrift. Siehe im system. Theil unter Apis.

Bienenpflege. Zeitschrift. Siehe im system. Theil unter Apis.

Bienen-Zeitung. Schweizerisches Organ der Schweizerischen Vereine für Bienenzucht. Hrsg. vom Vereine Schweizer Bienenfreunde (Red. Lehrer R. Göldi-Braun). XXIV. Jahrg. 12 No. Aarau. Solothurn 8°. Neue Folge. Sauerländer & Co. in Comm., 1901. 8°. Abonn. M. 4,—.

Bienenzeitung. Organ des Vereins deutscher Bienenwirthe. Herausg. v. J. Dickel, Nördlingen. gr. 4°. Jhg. 57: 1901 (24 Nrn.) M. 3,—.

Bienen-Zeitung, Deutsche Illustrierte. Organ für die Gesamtinteressen d. Bienenzucht, herausgegeben von C. J. H. Gravenhorst. Braunschweig. gr. 8°. Jahrg. XVIII: 1900—1901 (12 Hfte.) M. 4,—.

Bienen-Zeitung, Leipziger. Organ für alle Imker deutscher Zunge. Redigirt von F. Liedloff. Leipzig, gr. 8°. — Jahrgang XVI: 1901 (12 Nrn.). M. 1,—.

Bienen-Zeitung, Oesterreichisch - Ungarische. Redig. von C. M. Schachinger. Herausg. v. A. Lauterböck. Wien, fol. — Jahrg. XXIV: 1901 (12 Nrn.). M. 2,—.

Bienen-Zeitung, Schlesische. Redig. von Liedloff. Brieg, 8°. Jahrg. XXIV: 1901 (12 Nrn.). M. 1,—.

Bienen-Zeitung, Schleswig-Holsteinsche. Redig. von A. Steenhusen. Ahrensburg, gr. 8°. Jahrgang XIII: 1901 (12 Nrn.). M. 1,80.

Bienenzucht. Siehe im system. Theil unter Apis.

Bignell, G. C. (1). The Ichneumonidae (parasitic flies) of South Devon. Part. II. Braconidae. Rep. Devonshire Ass. vol. XXXIII p. 657—692.

— (2). Corsican Ants. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) Jan. p. 8.

— (3). Corsican Ants bred (*Leptothorax angustulus* Nyl., and *Bothriomyrmex meridionalis* Roger). t. c. p. 127—128.

- (4). *Metopius dentatus* Fr. bred from *Bombyx quercus*. t. c. July, p. 171.
- (5). *Meteorus fragilis* Wasm., parasitic on *Phalera bucephala*. t. c. p. 278.
- (6). Inquiline Cynipidae. Shape of Galls. Entom. Record, vol. 13 No. 4 p. 126—127.
- (7). Inquiline Cynipidae. t. c. No. 12. p. 360—1.
- Bingham, C. T.** Description of Two new Species of Bracon from Bengal. Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 Dec. p. 555—557.
Br. *Nicévillei*, Br. *famulus*.
- Bi-Tidende.** Siehe im system. Theil unter *Apis*.
- Bloomfield, E. N.** Notes on Phytophagous Hymenoptera. 1800—1900. Entom. Record, vol. 13 No. 1 p. 18—20.
- Bogdanow, E. A.** theilt in seinem Artikel „Ueber Konservirung“ mit, dass er Gallen viele Monate hindurch ohne jede Veränderung in gesättigter unreiner Moskauer Kochsalzlösung aufbewahrt habe (Analyse: Na = 39,33%, Cl = 58,71%, Ca = 0,43%, Mg = 0,04%, SO₃ = 1,02%, unlösbarer Rückstand 0,25%). Reines Kochsalz lieferte nur negative Resultate. Vielleicht spielen also kleine Jod- oder Brommengen eine wichtige Rolle. Allgem. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 100—102.
- Bordas, St.** A hangyákról. Rovart. Lapok, 8. köt. 9. füz. Nov. p. 182—183. — Ueber die Ameisen. Ausz. Hft. 9 p. 21.
- Bouvier, E. L.** Les habitudes des *Bembex*. (Année psychol. [Binet]) Paris 1901. 8°. 73 p. avec figs. — Extr. Revue Scientif. (4.) T. 17. No. 5 p. 155.
- Bradley, J. Chester** (1). The North American Oryssidae. Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 No. 4 p. 317—318. 5 Sp.
- (2). The Evaniidae of America North of Mexico. With 1 pl. t. c. No. 4 p. 319—330.
4 n. sp., n. g.: *Deraidontus*, *Oleisoprister*.
- Bradley, Ralph. C.** *Pompilus approximatus* Sm. in North Wales. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) Oct. p. 259.
- Braun, Adam.** Z zakresu gospodarstwa posiecznego: Podkarmianie pszczół. [Aus dem Gebiete der Bienenzucht: Die Fütterung der Bienen.] Warszawa. E. Wende i. Sp. 1901. 16°. II & 143 spp.
- Brauns, H.** Ueber *Panorpes Fischeri* Spin. Termész. Füzetek, vol. 24 No. 3./4. p. 491—494.
- Brauns, J.** (Willowmore, Cape Colony.) Ueber die Lebensweise von *Dorylus* und *Aenictus*. Zeitschr. f. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 1. Hft. p. 14—17.
Die bisher bekannten Nester von *Dorylus* scheinen nur Wander-nester gewesen zu sein. Beschreibung eigentlicher Nester. — *Aenictus*-Züge. — (Im Text u. Titel steht ständig *Aenictus*).
- Brauns, . . .** (1). Nachträge zu *Lissonotinen*. Zeitschr. f. System. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 3. Hft. p. 157—160. Schluss 4. Hft. p. 179—183.

Mit Schmiedeknecht's Bearb. der Lissonot. ist zwar viel gebessert, die Sache aber noch nicht ganz abgethan (cf. vor. Bericht p. 322 sub No. 2). Es werden noch Aenderungen nöthig sein. Die Vereinigung der Förster'schen Untergatt. *Asphanodon*, *Bathycetes*, *Alloplasta*, *Asphragis*, *Ensimus* mit anderen, die von *Aphanodon* mit *Cryptopimpla*, die der beiden folg. mit *Meniscus*, die der beiden letzt. mit *Lissonota* im engeren Sinne ist annehmbar. Verf. giebt nun in der obig. Arbeit eine Anzahl von Nachträgen, theils nach den Exempl. seiner Samml., theils nach den Typ. Szepliget's in Term. Füz. v. 1900. — p. 157—160 bringt Bem. zu (vergl. hierzu den system. Theil des Berichts): 1. *Echthrodoxa* Schmiedekn., 2. *Anarthronota* Schmiedekn., 3. *Xenacis caligata* Grav., 4. *Cryptopimpla* Taschenb., 5. *Phytodietus*. p. 177—183: 6. *Syzeuctus* Först. Umgearbeitete Bestimmungstab. der Sp., nebst Bemerk. zu den einzeln. Sp., dar. neu: Schmiedeknechti.

— (2). Ein neuer *Ephialtes*. Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 4. Hft. p. 183—184.

E. sanguinicollis n. sp.

Brèthes, M. J. (frère du Julien). Notes biologiques sur trois Hyménoptères de Buenos Aires. Revista del Museo de la Plata, 1901. — Nach einer Anm. in Fertou, Ann. Soc. Entom. France, vol. 70 p. 111. — Dasselbst steht hinter dem Autornamen (frère du Judulien).

Buckton, G. B. Aphides in Ants' Nests. Science Gossip vol. VII p. 257.

Burbidge, F. W. Notes on Humble Bees. The Irish Naturalist, vol. 10 No. 9 p. 172. — *Bombus* betreff. Siehe ferner unter Fitzgerald.

du Buysson, R. (1). Sur quelques Chrysidides du Musée de Vienne. Ann. k. k. Naturhist. Hofmus. Wien, 16. Bd. No. 1/2 p. 97—104. — 7 n. sp.

— (2). Sur quelques Hyménoptères de Madagascar. Avec 11 figs. Ann. Soc. Entom. France vol. 69. 2. trim. p. 177—179, 180. — *Thrausmus* n. g. *Grandidieri*.

— (3). Sur deux *Mélipones* du Mexique. Avec 2 pl. (IV, V). Ann. Soc. Entom. France, vol. 70 1. Trim. p. 153—155, 156.

— (4). Sur deux *Mélipones* (Hyménoptères) de Mexique. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 1901 No. 2 p. 104—106.

— (5). Catalogue des Hyménoptères Melliférides des collections du Muséum. t. c. p. 207—214.

— (6). Sur la *Chrysis shanghaiensis* Smith. Bull. Soc. Entom. France, 1901 No. 2 p. 29—30.

Cameron, P. (1). On the Hymenoptera collected during the „Skeat Expedition“ to the Malay Peninsula. Proc. Zool. Soc. London, 1901 vol. 2 P. 1 p. 16—44. — 3 n. g.: *Atanyjoppa*, *Skeatia*, *Vagenatha*; 33 n. sp.

Von der Hymenopteren-Fauna der Malayischen Halbinsel ist bisher nicht viel bekannt. Smith zählt 136 Sp. auf. Bingham zählt

in seinen Hymenoptera of India 995 Arten auf, von denen nicht weniger als 376 von Tenasserim, dem im äusserst. Norden gelegenen Gebiete aufgeführt werden. Sicherlich wird sich die Halbinsel selbst äusserst reich an Hymenopt. erweisen. Einige stammen nicht von der Skeat Expedition. Im Einzelnen: Mutillidae: Mutilla (2 n.). — Scoliidae: Scolia (3 + 1 n.), Elis (Dielis) (1 + 1 n.). — Pompilidae: Pseudagenia (1 + 1 n. in Anmerk.), Pompilus (1 + 1 n.), Salius (1 + 3 n.). — Sphegidae: Sphegex (3), Ammophila (1), Sceliphron (2), Bembex (1 + 2 n.), Pison (1 n.). — Crabronidae: Crabro (1 n.), Trypoxylon (1 n.). — Vespidae: Vespa (1), Polistes (1), Icaria (2 n.), Eumenes (1), Odynerus (1 n.), Rhynchium (1 n.). — Apidae: Xylocopa (2 + 3 n.), Kophthortosoma (3), Megachile (3 n.), Trigona (1 + 1 n.). — Ichneumonidae: Joppini: Atanyjoppa n. g. (2 n.). — Mesostenini: Skeatia n. g. (2 n.), Vagenatha n. g. (1 n.). — Braconidae: Iphiaulax (1 n.). — Evaniidae: Evania (1 n.).

- (2). On the Hymenoptera collected in New Britain by Dr. Arth. Willey. t. c. vol. I. P. II p. 224—248. — 29 n. sp., n. g.: Cratobracon, Leptophion, Eurycryptus, Xanthocryptus.

Die Sammlung der Hymenoptera von New Britain durch Arthur Willey ist nicht umfangreich genug um einen Schluss auf die Verwandtschaft dieser Inselfauna zu gestatten. Die meisten Stücke stammen von der Gazelle-Halbinsel (jetzt als Neu-Pommern bekannt u. von den deutschen Geographen zum Bismarck-Archipel gerechnet). Es werden behandelt: Tenthredinidae: Sinoclia violaceipennis n. sp. — Evaniidae: Megischus violaceipennis. — Braconidae: Bracon diores n. sp., Cratobracon n. g. m. ruficeps n. sp. — Ichneumonidae: Ophionini: Leptophion n. g. u. longiventris n. sp., Eucospilus nigrinervis n. sp., Pimplini: Rhyssa fulva n. sp. u. Rh. tridentata n. sp., Xanthopimpla insularis n. sp., Cryptini: Eurycryptus n. g. mit laticeps n. sp., Xanthocryptus n. g., robustus n. sp. — Chrysididae: Stilbum splendidum Fab., Chrysis (Hexachrysis) Novo-Britannica n. sp., Ch. (Hexachr.) democraticus n. sp. — Mutillidae: Mutilla Novo-Britannica n. sp. — Scoliidae: Discolia foveifrons n. sp., D. pulchripennis n. sp. — Pompilidae: Salius insularis n. sp., S. basimacula n. sp., Willeyi n. sp. — Sphegidae: Spheg confrater Kohl, Spheg. umbrosus Christ, Spheg (Isodonta) insularis n. sp. — Vespidae: Vespa affinis Fab., Polistes maculipennis Sauss., Polistes Arthuri n. sp., P. lycus, P. asterope n. sp., Rhynchium brunneum Fab. — Anthophila: Melipona (Trigona) n. sp., Xylocopa Perkinsi n. sp., Anthophora zonata Fab., Megachile megistia n. sp., M. othona, M. malayana n. sp., Cricosa emarginata Lep., Nomia fulviventris n. sp., Nomia (Paranomia) pulchribalteata n. sp., Nomia metallica n. sp.

- (3). Description of new Genus of Bees from India. The Entomologist, vol. 34. Oct. p. 262—263. — Aglaopis n. g.
- (4). A Contribution towards a Revision of the British Torymina. t. c. Oct. p. 269—276.

- (5). Description of a new Species of *Crypturus* from Spain. t. c. Dec. p. 330—331. — *Cr. fulvipes*.
- (6). Description of a New Genus and Five New Species of Aculeate Hymenoptera from the Santa Fé Mountains, New Mexico. *Trans. Amer. Entom. Soc.* vol. 27 No. 4 p. 311—316. — n. g.: *Paramasaris*.
- (7). Hymenoptera of the Maldive and Laccadive Archipelagoes. (Cambridge, 1901). 4. 13 p. M. 2,50.
- (8). On a collection of Hymenoptera made in the neighbourhood of Wellington by Mr. G. V. Hudson, with descriptions of new genera and species. *Trans. New Zealand Inst.* vol. XXXIII p. 104—120.
- (9). Descriptions of seventeen new Genera of Ichneumonidae from India and one from Australia. *Ann. Nat. Hist.* 7 vol. 7 March p. 275—284 (Contin.) Apr. p. 374—385. May, p. 480—487. — concluded. June p. 523—531.
 Bringt folg. Formen: p. 275—284: *Gathetus* n. g. (1 n.), *Dimætha* n. g. (1 n.), *Facydes* n. g. (1 n.), *Leptojooppa* n. g. (1 n.), *Cratojooppa* n. g. (1 n.).
 p. 374—385: *Pachyjooppa* n. g. (1 n.), *Lagenesta* n. g. (1 n.), *Zanthojooppa* n. g. (1 n.), *Xestojooppa* n. g. (1 n.), *Aglaajooppa* n. g. (1 n.), *Charitojooppa* n. g. (1 n.).
 p. 480—487: *Magrettia* n. g. (1 n.), *Lamprojooppa* n. g. (1 n.), *Setanta* n. g. (1 n.), *Gyrodonata* n. g. (1 n.).
 p. 523—531: *Myermo* n. g. (1 n.), *Fileanta* n. g. (1 n.), *Poecilopterus* n. g. (1 n.), *Labium* Brullé (1 n.).
- (10). Descriptions of Three new Genera and Seven new Species of Hymenoptera from Eastern Asia and Australia. *Ann. Nat. Hist.* (7) vol. 8 Aug. p. 116—122.
Anthophila: *Ctenoapis* n. g. (2 n.). — *Fossores*: *Chrysolarra* n. g. (4 n.). — *Braconidae*: *Poecilobracon* n. g. (1 n.).
Canadian Bee-Journal. Siehe im system. Theil unter *Apis*.
- Carpentier, L.** Sur les larves de quelques Nématides. *Zeitschr. f. system. Hymenopt. u. Dipter.* (Konow) 1. Jhg. 4. Hft. p. 223.
- Carr, J. W.** *Astutus stigma* Panz. and other Aculeate Hymenoptera etc. on the Lincolnshire Coast. *Entom. Monthly Mag.* (2) vol. 12 (37) p. 15—16.
- Carter, A. E. J.** (1). Aculeate Hymenoptera in Perthshire. *Entom. Monthly Mag.* (2) vol. 12 (37) March, p. 67—68.
 Sammelliste.
 — (2). *Salius notatulus* Saund., and *Crabro aphidum* Lep. in Scotland. t. c. 12 (37) Nov. p. 277.
- Centralblatt, Bienenwirthschaftliches*. Siehe im system. Theil unter *Apis*.
- Charbonnier, H. J.** *Diptera* and *Nomadae* at *Halictus burrows*. *Entom. Monthly Mag.* (2) vol. 12 (37) Febr. p. 48.

Cholodkovsky, N. Ueber den Spinnapparat der Lyda-Larven. Mit 4 Abbdgn. Allgem. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. No. 2 p. 17—19.

Die Untersuchungen Pickel's erstreckten sich nur auf Spiritus-material. Cholodkovsky kann an frischem Material diese Beobachtungen ergänzen, berichtigen u. durch neue erweitern. Betäubung der zahlreich erbeuteten Larven von *Lyda erythrocephala* L. durch Aetherdämpfe, Präparation in Kochsalzlösung, Fixirung mit Pérényi'scher Flüssigkeit oder mit Platinchloridlösung nach Rabl, Konservirung in 70% Alkohol; Schnitte: I. Hauptstämme der Spinndrüsen der Lyda-Larven 2 mässig lange Drüsenschläuche (Längsschnitt Fig. 2). Wandung derselben besteh. 1. aus einer Lage flacher, nicht deutlich abgegrenzter Epithelzellen (von Pickel nicht bemerkt), 2. aus dicht an einander gereihten, gross., saftig., secernirenden Zellen, die mit dem das Sekret ausführendem „Halse“ zwischen den flachen Zellen in die Höhle des Hauptstammes münden. Nach vorne zu verschwinden sie u. zwar erst einseitig u. s. w. Weiter nach vorn besteht der Hauptstamm gänzlich u. allein aus flachen, sich allmählich erhöhenden Zellen. — II. Die Filippi'schen Drüsen (von Pickel etwas mangelhaft beschrieben). Sie repräsentiren einen ziemlich langen, unregelmässig gelappten, am blinden Ende etwas gegabelten Schlauchkörper. Das Lumen (Fig. 3, Längsschnitt Fig. 4) nicht weit, wie Pickel abbildet, sondern sehr eng u. mit Cuticula ausgekleidet. Dazu treten III. als neu die büschelförmigen Drüsen (*glandulae multifidae*), zarte, glashelle, zusammengesetzte tubulöse, dichotomisch sich verästelnde Drüsen, die in den weiten Ausführungsgang münden (Fig. 3). Vor dem Eintritt in die Unterlippe findet eine blasenförmige Erweiterung statt. Histologischer Bau der Drüsen: sub I wurde schon angedeutet. — sub II. Filippi'sche Drüsen: eine Schicht grosser Epithelzellen mit grossem, körnigem, etwas verästeltem Kern, umgeben von einer grossen hufeisenförmigen, scharf begrenzt., anscheinend mit eigener Wandung versehenen Vakuole (hierzu Fig. 4), (ob als Sammelreservoir für das Sekret der Zelle dienend?). — ad III. Die büschelf. Drüsen bestehen aus schönem, nicht sehr hohem Cylinderepithel (Zellgrenzen durch Fixir. mit Pérényi'scher Flüssigkeit u. Färb. mit Boraxcarmin sehr deutlich). Wozu die einzelnen Theile dieses komplizirten Spinnapparates dienen, ist jetzt noch nicht bestimmbar. Alle drei Drüsenpaare sind auf Fig. 1 dargestellt.

Chyzer, Kornel (1). Zemplén magye Hymenopterái. (Die Hymenopteren des Komitats Zemplén). Rovart Lapok, 8. köt. 9. füz. Nov. p. 184—188.

— (2). Zemplén magye Hymenopterái. II. Rovart Lapok, 8. köt. 10. füz. p. 206—209. — III. *ibid.* 9. köt. 1. füz. p. 16—18. — IV. *ibid.* 2. füz. p. 32—34. — Die Hymenopteren des Komitats Zemplén.

Ciesielskii, T. Bartnictwo czyli hodowla pszól dla zysku, oparta na nauce i wielo stronnem doświadczeniu. II. Gospodarka w pasiece. [Die Bienenzucht, gestützt auf Wissenschaft und vielseitige Erfahrung. II.]. Lwów, nakład autora. 1901. 8°. (360 p.) K. 5.

Clément, A. L. L'Apiculture moderne. Avec 153 grav. Paris, libr. Larousse, [1901]. 8°. 157 p. 2 frcs.

Cockerell, T. D. A. (1). Titel p. 298 sub No. 4 des vor. Berichts behandelt die n. sp. *Bombomelecta larvae* u. *Panurginus Porterae*, sowie 3 neue Varr.

- (2). Contributions from the Mexico Biological Station. — X. Observations on Bees collected at Las Vegas, New Mexico, and the adjacent Mountains. Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 Jan. p. 125—134. — Forts. vom vorigen Jahre (vor. Bericht p. 298 sub No. 7).

Zählt auf Species u. Varr. folg. Gatt. mit Angabe der Fundorte u. Fundpflanzen u. Zeit: *Colletes* (3), *Prosapis* (5), *Halictus* (10), *Agapostemon* (1), *Panurginus* (2), *Calliopsis* (2), *Perdita* (1), *Spinoliella* (1), *Melecta* (1), *Ashmeadiella* (2), *Melissodes* (7), *Xenoglossa* (1), *Anthophora* (5), *Clisodon* (1), *Apis* (1).

- (3). Contributions from the New Mexico biological Station. XI. New and little known insects from New Mexico. t. c. p. 333—337.

Von Hymenoptera werden behandelt: *Tenthredinidae*: *Euura Cooperae* n. sp. u. *salicis-nodus* Walsh. — *Apidae*: *Osmia fulgida* Cress., *armaticeps* Cress. var. *sapellonis* n., *Coelioxys Sayi* Roberts., *Monumetha argentifrons* Cress., *Stelis permaculata* (Ckll.) u. *Melissodes obliqua* (Say).

- (4). Flower and Insect records from New Mexico. Entom. News (Philad.) vol. 12 Febr. p. 38—43.
- (5). A new *Ceratina* from New Mexico. t. c. Febr. p. 43. *C. neomexicana*.
- (6). A new *Andrena* from California. t. c. March p. 74. — *A. Knuthiana* n. sp.
- (7). A Peculiar New Type of Halictine Bees. t. c. Sept. p. 208—209. — *Halictus Conanti* n. sp.
- (8). Hymenoptera Apoidea. Some Insects of the Hudsonian Zone in New Mexico. — III. Psyche, vol. 9 No. 298 p. 163—164. — 12 (2 n.) sp.
- (9). Some Insects of the Hudsonian Zone in New Mexico. VI. Cockerell, T. D. A. Hymenoptera, Apoidea II. t. c. No. 308 p. 282—286. — 10 sp., darunter 6 neue.
- (10). Variation in a Bee. Nature, vol. 64 No. 1650 p. 158. — *Epeolus bardus* Cress.
- (11). Descriptions of new Bees collected by Mr. H. H. Smith in Brazil. II. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1901 p. 216—222. — 9 n sp., 1 n. var., n. subg. *Corynuropsis*.

- (12). Contributions to the Entomology of New Mexico. I. A catalogue of the fossorial Hymenoptera of New Mexico. Proc. Davenport Acad. vol. VII p. 139—148.
- (13). Bees from Southern California, visiting Flowers of Eriogonum and Rhus. Canad. Entom. vol. 33 No. 10 p. 281—283.
n. sp.: *Prosopis polifolii*, *Perdita claypolei*, *P. rhois*.
- (14). New Bees of the Subfamily Anthophorinae from Southern California. Canad. Entom. vol. 33. No. 10 p. 286—287. No. 11 p. 297—298.
n. sp. *Anthophora catalinae*, *Melissodes personatella*, 1 n. subsp.
- (15). Species of *Brachycistis* (Fam. Myrmosidae) from Southern California. Canad. Entom. vol. 33 No. 12 p. 340. — *Br. Gaudii* n. sp.
- (16). A new Bee from California (*Anthrena Knuthiana* n. sp.) Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipter. 1. Jhg. Hft. 2 p. 80. — Dasselbe wie sub No. 6.
- (17). New and little known Bees from Nebraska. The Entomologist, vol. 34, July, p. 190—191.
7 Sp., dar. 3 n.
- (18). On some Bees of the Genus *Andrena* from New Jersey. Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 No. 3 p. 132—134.

Cockerell, T. D. A. and **Wilmatte F. Cockerell.** Contributions from the New Mexico Biological Station. — IX. On certain Genera of Bees. Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7. Jan. p. 46—50.

Bringt die neuen Gatt.: *Anthophoroides* und *Protanthidium*, sowie das neue Subgenus *Paranthidium*.

Behandeln folg. Gruppen: (1) **Anthophorinae**. Uebersicht über die Tribus: *Eucerini*, *Anthophorini* u. *Centrini*. 1. *Centrini*: Uebers. über die Gatt.: *Centris* Fabr., *Exomalopsis* Spin., *Anthophorula* Ckll. (*Diadasiella* Ashm.). Uebersicht über die einzeln. Sp. von New Mexico: *Centris* (3), *Exomalopsis* (2). — 2. *Anthophorini*: Uebers. über die Gatt.: *Saropoda* Latr., *Entechnia* Patton, *Anthophoroides* g. n., *Meliturga* Latr., *Diadasia* Patton, *Anthophora* Latr. u. *Emphoropsis* Ashm. Bemerk. zu *Anthophoroides* n. g., *Amegilla* Friese, *Meliturgopsis* Ashm. — 3. *Eucerini*. Uebers. der (6) Gatt. Bemerk. zu *Macroglossapis* Ckll. = *Macroglossa* Rads. (not Ochs.). — (2) **Anthidiinae**. Uebersicht über die Gatt.: *Paranthidium* n., *Dianthidium* Ckll., *Protanthidium* n., *Anthidium* Fabr. Bemerk. zu dies. Gatt.

Dahl, Friedrich. Das Leben der Ameisen im Bismarck-Archipel, nach eignen Beobachtungen vergleichend dargestellt. Mittheil. Zool. Mus. Berlin, 2. Bd. 1. Hft. (Tit., Inh., Vorw. p. 1, 3, 5—6, p. 7—62, 63—70). — Apart Berlin, R. Friedländer & Sohn, 1901. Imp. 8°. 70 p. — Ausz. von A. Sokolowsky. Naturw. Wochenschr. 16. Bd. No. 24 p. 279—282, desgl. P. Speiser, Allgem. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. No. 11 p. 171.

Vorwort (p. 5—6). Grundbedingungen für dergleichen Arbeiten. — Abhandl.: I. Uebersicht der Gattungen nach leicht erkennbaren Formenmerkmalen (p. 7—11) 34 Gatt. — II. Uebersicht der Arten nach leicht erkennb. Form- u. Farbenmerkmalen (p. 11—21.) Gattungsweise geordnet, 90 Spp. — III. Uebersicht der Fänge (p. 21—22 nebst 4 grossen Uebersichtstabellen). Der Stoff ist in folgender Weise geordnet: horizontal: Fundort u. Art. Fundzeit. Die einzelnen Spp. Weitere Arten. Bemerk. — Vertical: Gruppierung nach folg. Kapiteln: Grasland bei Ralum (No. 1—30). In der Pflanzung Ralum (31—79). Im Hause (80—97). Am Meeresstrande (98—115). An lichten Plätzen (p. 116—124). Auf Waldlichtungen (125—132). Im Walde (133—197). Nicht bei Ralum (198—226). Also insges. 226 No. des Fundortes u. Art des Vorkommens. — IV. Die Beziehungen der Ameisen zur Oertlichkeit (p. 23—24).

Unterscheidung der verschiedenen Geländeformen bei Ralum.

I. Das Festland (oder eigentlich die grösseren Inseln).

A. Das offene Gelände.

A. Kahler oder mit kurzem Grase bewachsener Boden.

a) Der Ufersaum des Meeres.

α) Der Sandstrand.

β) Die steile, aus lockeren Bestandtheilen (vulkanischer Asche oder Geröll) gebildete Uferwand.

γ) Der Korallenfels.

B. Mit langem, schilfartigem Grase bewachsenes Gelände (Grasland).

B. Das halbschattige Gelände.

A. Die Pflanzungen der Europäer, besonders die Kokospflanzung.

B. Die Dörfer, Gehöfte u. Pflanzungen der Eingeborenen.

C. Gebüsche, meist verlassene Pflanzungen d. Eingeborenen.

C. Das schattige Gelände.

A. Der ausgedehnte Wald der Ebene (Kabakaul, Wunamarita, der grösste Theil von Neu-Lauenburg).

B. Die Waldschluchten, das Lowon u. andere Waldthäler).

C. Der bewaldete Gipfel der Berge (Wunakokur).

II. Die kleinen Inseln.

Eine ausführliche Schilderung der Lebensbeding. im Bismarck-Archipel wurde im 3. Hft. der Mittheil. des zool. Mus. Berlin gegeben. Bei den Ameisen erscheint solche Betrachtung vorläufig erfolglos, doch werden nach Dahl auch hier durch die statistische Methode einheitliche Züge nachweisbar sein. — V. Die Beziehungen der Ameisen zur Jahreszeit (p. 24—27). Einfluss der Temperatur u. Regenmenge. Thätigkeit der Arbeiter Schwarmzeit. — VI. Die Nester der Ameisen (p. 27—37). Bei den darin angeg. kürz. Betrachtungen schliesst sich der Verf. eng an Forel's Darstellung des Nestbaues an (Die Nester der Ameisen. Zürich, 1892. Neujahrsblatt herausg. v. d. naturf. Gesellsch. auf das Jahr

1893 v. XCV). Eintheilung (siehe in system. Theil). Bemerk. zu den Nestern. 1. Erd-, 2. Holz-, 3. Mark-, 4. Mörtel- [u. andere Mörtelbauten], 5. Blatt-, 6. Spalt-, 7. Röhren-, 8. Kammer-Nester. 10. Zusammengesetzte Nester. — VII. Uebersicht der Ameisen nach der Lebensweise (p. 38—43). — VIII. Die Feinde der Ameisen (p. 43—44). Hierbei stellt Dahl folg. Gruppierung auf:

- I. Ausrauben ganzer Nester von erdbewohnenden Ameisen.
- II. Fang von Ameisen ausserhalb des Nestes.
 - A. Fang von Arbeitern u. Geschlechtsthieren in gleicher Weise, letztere aber nicht während des Fluges.
 - B. Fast ausschliessl. Fang geflügelter Geschlechtsthier.
 - a) Fang geflügelter Ameisen während des Sitzens u. Kriechens.
 - b) Fang geflügelt. Ameisen im Fluge.
 - C. Sammeln geflügelter Ameisen von der Oberfläche des Meeres.

Hierunter gruppiren sich 28 ameisenfressende Vogelarten im Bismarck-Archipel. — IX. Schaden u. Nutzen der Ameisen (p. 44—45). Verf. theilt nicht die allgemeine Ansicht, dass die Ameisen für sehr nützliche Thiere zu halten sind. — X. Ein Vergleich der Ameisenfauna des Bismarck-Archipels mit der Norddeutschlands (p. 46—62). Ein Vergleich zeigt, dass wohl keine einzige Ameisenart des Bismarck-Archipels einer mittel-europäischen Art in ihrer Lebensweise nach allen Seiten hin entspricht. 1. Uebersicht der norddeutschen Ameisenarten nach der Lebensweise [p. 46—49]. 2. Vergleich dieser Uebersicht mit der Uebersicht der Ameisen des Bismarck-Archipels nach der Lebensweise [p. 49—53]. a. Bei den Ameisen des B.-Archipels wissen wir in Bezug auf das Zusammenleben verschiedener Arten, das Vorkommen der Slaven, Schmarotzer und Gäste im fremden Neste fast noch gar nichts. b. Unterschied in der Zahl der Arten (siehe unten). Für die grössere Artenzahl eines Gebietes kann ein Theil der Arten an Lebensbedingungen angepasst sein, die in dem artenarmen Gebiete fehlen. 2. Die Spaltung in Arten und die damit zusammenhängende Anpassung an ganz specielle Lebensbedingungen kann in dem artenreicheren Gebiete weiter fortgeschritten sein als in dem artenarmen Gebiete. 3. Ein Theil der Arten des artenreichen Gebietes kann in dem artenarmen Gebiete durch Thiere anderer Gruppen vertreten und ersetzt sein. Schutz des Nestes u. s. w. Gegenüberstellung derj. Ameisenformen Norddeutschlands, welche mit einiger Sicherheit mit Formen des Archipels in Parallele zu bringen sind. Erörterungen dazu. — 3. Vergleich des Individuum-reichthums nach quantitativen Fängen (p. 53—62).

Verzeichnisse (p. 54—58). 1. Die Ameisenfauna des Bismarck-Archipels ist etwa 39 mal individuenreicher, als die Norddeutschlands (p. 58—59). 2. Wie in Norddeutschland, so sind auch im Bismarck-Archipel die verschiedenen Oertlichkeiten verschieden reich an

Ameisen (p. 59—60). Wie in Norddeutschl., so sind auch im B.-Arch. die Ameisenfänge in den verschiedenen Jahreszeiten verschieden reich (p. 60—61). — 4. Die Zahl der Ameisenarten ist im Bismarck-Archipel weit grösser als in Norddeutschland (p. 61—62).

XI. Kurze Uebersicht der Hauptresultate (p. 64—74).

1. Im Bism.-Arch. schwärmen einige Ameisenarten fast das ganze Jahr hindurch, doch lässt sich bei allen eine Hauptschwärmzeit unterscheiden (p. 25). — 2. Die Schwärmzeit oder Hauptschwärmzeit der meisten Arten scheint am Anfang der trockenen Jahreszeit zu liegen (p. 26, 27), da die Regenzeit für die Ameisen nahrungsreicher und deshalb für das Aufziehen der grossen Larven geeigneter ist (p. 60, 61). — 3. Die Geschlechtsthiere mancher Ameisen fliegen im Bism.-Arch. während der Dunkelheit und werden zum Theil in grossen Massen vom Lichte angelockt (p. 27). — 4. Die Ameisen des Bism.-Arch. besuchen um thierische Abscheidungen zu geniessen, nicht nur Blatt-, Schild- und Wurzel-läuse, sondern auch Cicadenlarven und Schmetterlingsraupen (p. 45.) — 5. Da der Bism.-Arch. sehr regenreich ist, bauen viele Ameisen Ställe für ihre Pflanzenläuse, theils in den Blütenschuppen und Blattscheiden (p. 22), theils auch frei an Blättern (p. 34); andere schleppen die Pflanzenläuse sogar in das Innere hohler Stengel (p. 35). — 6. Die Papierameise spannt ein Schutzdach auch über wunde Asttheile, um den austretenden geniessbaren Saft vor Regen zu schützen (p. 34). — 7. Die Knollen der epiphytischen Ameisenpflanze können frei an wenig belaubten Bäumen hängen, ohne unter Insektenfrass zu leiden, weil sie von Ameisen, die ihre labyrinthartigen Hohlräume bewohnen, vertheidigt werden (Symbiose) (p. 35 bis 37). — 8. Der Ameisenbaum des Bism.-Arch. wird von den Ameisen gegen die Eingriffe des Menschen und der Thiere vertheidigt; die Ameisen erhalten dafür Wohnung (Markröhren) und Nahrung (Mark, Saft, Sekrete) Symbiose (p. 29—32). — 9. *Camponotus quadriceps* ist auf *Endospermum* angewiesen; *Iridomyrmex cordatus* res. *myrmecodiae* nistet nicht nur in *Myrmecodia*, sondern auch in Astlöchern, Termitennestern etc. (p. 37). — 10. Im Gegensatz zu dem brasilianischen Ameisenbaum sind die Zweige von *Endospermum* ursprünglich mit Mark gefüllt (p. 29). — 11. Die Staaten (oder Kolonien) von *Camponotus quadriceps* bleiben sehr individuenarm, weil das Futter für die Larven leicht zu beschaffen ist (p. 31). — 12. Die Thätigkeit der Ameisenarbeiter steigert sich während der Regenzeit etwa auf das Doppelte (p. 60). — 13. Die schlimmsten Feinde der Ameisen sind im Bismarck-Archipel die Vögel; von 90 erbeuteten Landvogelarten hatten 28 Arten unter anderm auch Teile von Ameisen im Magen (p. 43—44.) — 14. Als schädliche Ameisen des Bismarck-Archipels sind bisher nur einige kleine, in den engen Spalten der Häuser und Schiffe nistende Tropenkosmopoliten zu bezeichnen (p. 45). — 15. Die Ameisenfauna d. Bism.-Arch. und die Norddeutschlands entsprechen nur in ihrer Gesammtheit einander, die einzelnen Arten weichen in ihrer Lebens-

weise immer stark von einander ab (p. 50—52). — 16. Die Ameisenfauna des Bism.-Arch. ist 5—6 mal reicher an Arten als die Norddeutschlands (p. 49, 61). — 17. Die Ameisenfauna des Bism.-Arch. ist etwa 30 mal individuenreicher als die Norddeutschlands (p. 53, 58). — 18. Dauernde Bewohner der Baumkronen, wie sie im Bism.-Arch. sehr häufig sind, können in einem gemässigten Klima nicht existieren, weil das Nest von der winterlichen Kälte geschützt sein muss (p. 50). — 19. Die grössere Artenzahl der Ameisen des Bism.-Arch. ist besonders auf eine speciellere Anpassung an ganz bestimmte Lebensbedingungen zurückzuführen, wie sie dann allgemein vom Pol nach den Tropen hin eine speciellere Anpassung zeigt (p. 50, 53, 62). — 20. Nester mit Kuppelbau fehlen im Bism.-Arch. gänzlich und Nester unter Steinen sind selten, weil derartige Einrichtungen, welche die Sonnenstrahlen besser zur Wirkung kommen lassen, dort überflüssig sind (p. 29). — 21. Wie bei uns sonnige, brachliegende Plätze mit sandigem Boden, so ist auch im Bism.-Arch. das Grasland mit lockerem, vulkanischem Boden am reichsten an Ameisen (p. 59). (Nach Forel wäre der Wald und seine Pflanzen sicher ergiebiger gewesen, als das Grasland). — 22. Der Boden im Urwald des Bism.-Arch. ist verhältnissmässig arm an Ameisen, aber doch sehr viel reicher als der mit Laub bedeckte, schattige Boden unserer Wälder (p. 59). — 23. Die Laufkäfer und Nacktschnecken unseres schattigen Waldbodens sind im Bism.-Arch. durch Ameisen vertreten, bei uns findet man im tiefen Waldeschatten keine Ameisen; im Bismarck-Archipel keine Laufkäfer und Nacktschnecken und die Nahrung ist in beiden Gruppen dieselbe (p. 60). — 24. Die Methode der „**vergleichenden Ethologie**“, ist wie auf die Vögel, so auch auf die Ameisen anwendbar.

XII. Register. Gesamtverzeichnis der behandelten Arten u. des Stoffes (p. 65—69). — Tafel-Erklärung (p. 70). Zweigstück des Ameisenbaumes und eine an Baumästen wachsende Ameisenpflanze, *Myrmecodia pentasperma* in natürl. Lage.

— (2). Was ist ein Experiment, was Statistik in der Ethologie. Biol. Centralbl., 21. Bd., p. 675—680.

Verf. bringt darin zu den jüngsten Ausführungen Wasmann's, denen er im Allgemeinen sehr wohl zustimmt, einige kurze Zusätze. Er giebt die volle Berechtigung des Wortes „Biologie“ statt des weit jüngeren Ausdrucks Ethologie sehr wohl zu u. will dasselbe erhalten wissen. Das Wort „Ethologie“ ist aber darum brauchbar, weil es völlig eindeutig ist. Wasmann's engere Deutung des Wortes „Ethologie ist die Lehre von den gesammten Lebensgewohnheiten der Thiere“ ist ihm gerade recht. W. giebt keine Definition der Worte „Experiment u. Statistik“. Hätte er es versucht, würde er die abweichende Ansicht Dahl's in diesem Punkte gefunden haben. Experimentum ist unser deutsches Wort Versuch im allerweitesten Sinne, „Untersuchung“ mit einschliessend. Man macht nach Dahl's Auffassung ein Experiment, wenn man beim

Verlauf eines Naturprocesses zur Erforschung dess. ganz bestimmte Bedingungen einschaltet, um dann den Erfolg abzuwarten. Bedingungen sind dabei also selbstständiges Handeln von Seiten des Thieres, 2. absichtl. Einschaltung abweichender Bedingungen, um irgend etwas zu erforschen. — Statistik ist diejenige wissenschaftliche Untersuchungsmethode, bei welcher ein Resultat durch genaues zahlenmässiges Aufzeichnen u. Vergleichen mehrerer einander entsprechender Einzelbeobachtungen gewonnen wird. Für ganz bestimmte Zwecke, namentl. für die Erkenntniss der Stellung der einzeln. Thierarten im Haushalt der Natur empfiehlt Dahl in der freien Natur Experimente u. Statistik für ethologische Untersuchungen zu verbinden. Bearbeiter für Dahl's diesbez. ungeheures Material nicht zu finden. Experimente an gefangenen Thieren sind zwar werthvoll, aber zur Erforschung der Nahrung u. des Aufenthaltes in der freien Natur von sehr geringem Werth. Erste Experimente von rein wissenschaftl. Interesse stellte Märker (1841) an, um die Gäste von *Formica rufa* zu erbeuten.

Art- u. Individualstatistik. Letztere hat sich in faunistischen Werken ganz allmählich herausgebildet [„selten“, „häufig“ etc.] u. zwar aus der unbestimmten, nicht aus der Artstatistik. Vollständige Individualstatistik wurde zuerst von Hensen angewendet. Statistische Unters. im engeren Sinne sind Wasmann's Arbeiten u. die anderer. In Vogelmagazinen sind auch die undefinirbaren Massen besonders zu verzeichnen u. das Verhältn. ders. zu den Erkennb. anzugeben. Rörig's Unters. über Krähen. Bei Rauschenplat's Unters. kann von einer vollständig. Statistik nicht die Rede sein. Jede wissenschaftl. brauchbare Statistik muss enthalt. zwei Grössen: Individuenzahl u. Gewichtszahl bezogen auf eine andere Individuenzahl, eine Raum-, eine Zeit- oder eine Gewichtsgrosse. Planktonstatistik am vollkommensten entwickelt. Die Zahl der in der freien Natur ausgeführten experimentell-statistischen Arbeiten ist sehr gering. Es sind Publik. von Dahl, Salvadori, Steuer, Buerkel (letzt. kritisiert von Brandt). Angabe weiterer diesbezügl. Arbeiten, wie auch fernere derartige Untersuchungen sind sehr erwünscht.

Dahlström, Jul. (Larven von *Lophyrus pini*). Insekten-Börse. 18. Jhg. No. 30 p. 237.

DalGLISH, Andr. Adie. Aculeate Hymenoptera in the West of Scotland. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) Jan. p. 6—8.

Liste der erbeuteten Arten; für Schottland neue Sp. (11), bereits erwähnt, doch selten (7).

Dalla Torre, C. G. de. (1). Catalogus Hymenopterorum hucusque descriptorum systematicus et synonymicus. Vol. III. Trigonalidae, Megalysidae, Stephanidae, Ichneumonidae, Agriotypidae, Evaniidae, Pelecinidae. Pars I (signatura 1—34). Lipsiae, sumptibus Gugl. Engelmann, 1901. 8°. (544 p.) M. 26,—.

— (2). *Catalogus Hymenopterorum hucusque descriptorum systematicus et synonymicus Lipsiae, Sumptibus Guilelmi Engelmann. 1892—1902. 8°.* (Königl. Bibl. Berlin No. Lt. 3027).

Bd. No.:	Er-scheinungs-jahr	Seitenzahl	Preis Mk	Widmung an	Inhalt
I	1894	VIII 459	20	Konow	Tenthredinidae incl. Uroceridae (Phyllophaga u. Xylophaga).
II	1893	id. 140	6	Mayr	Cynipidae.
III		id.		Kriechbaumer	Trigonalidae, Megalysidae, Stephanidae, Ichneumonidae, Agriotypidae, Evaniidae, Peleciniidae Part I (signat. 1—34), Part II (signat. 35—72).
I	1901	1—544	56	(† 2. 5. 1902)	
II	1902	545—1141			
IV	1898	id. 323	15	Marshall	Braconidae.
V	1898	id. 598	28	Howard u. Ashmead	Chalcididae, Proctotrupidae.
VI	1892	id. 118	5	Mocsáry	Chrysididae (Tubulifera).
VII	1893	id. 289	13	Emery	Formicidae (Heterogyna).
VIII	1897	id. 749	33	Kohl	Fossores (Sphegidae).
IX	1894	id. 181	8	Morawitz	Vespidae (Diptera).
X	1896	id. 643	28	Friese	Apidae (Anthophila).

Schlussband: Litteratura hymenopterologica und Generalregister der Gattungs- u. Artnamen in Band I—X.

von Dalla Torre, K. W. Ein paar nomenclatorische Bemerkungen zur Gruppe Ichneumoninae von W. H. Ashmead's Classification of the Ichneumon Flies or Superfamily Ichneumonidea in Proc. U. St. National-Museum v. XXIII, 1900 p. 1—220. Wien. Entom. Zeit. 20. Jhg. 3. Hft. p. 49—52.

Dedekind, Alex. Altägyptisches Bienenwesen im Lichte der modernen Welt-Bienenwirtschaft. Berlin, Meyer & Müller, 1901. Lex.-8° (32 p.) M. 1,—. Ausz. von Chr. Schröder, Allgem. Zeitschr. f. Entom. 6. Jhg. No. 19 p. 301.

Die ersten Seiten (p. 1—22) bringen unter der Ueberschrift: Der derzeitigen Vertreter für historische Bienenkunde unzulänglicher Kenntnisstand, betreffend altägyptisches Bienenwesen. Mittel zur Abhülfe, eine Kritik der einschlägigen Mittheilungen von Tony Kellen u. Albert Gmelin, worin der Verfasser der ruhigen, wissenschaftlich präzisen Darstellung eine oratorische, bilderreiche Sprache vorzieht. Ueber die alexandrinische Bibliothek.

Der Werth der zahlreichen altägyptischen, auf Bienenwesen bezügl. Notizen geht weit über die Grenzen der Philologie, betreffend

altägypt. Sprache, hinaus. Noch bis jetzt haben die Imker — selbst diejenigen, welche über Bienenwesen bei den alten Aegyptern geschrieben haben — nicht die geringste Spur eines absolut fachgemässen Beurtheilungsvermögens, betreffend die zahllosen eingehenden, die interessantesten Gesichtspunkte aufrrollenden Arbeiten von Aegyptologen über hierher gehörige Punkte. Die Folge davon ist, dass diese schriftstellernden Imker mit einer bodenlos dilettantischen Naivität über das in Rede stehende Thema gearbeitet haben. — Amulette aus vergoldetem Wachs im Wien. Mus., die befruchtende Anregungen für die moderne, an neuen Ideen vielfach Mangel leidende Kleinkunst geben u. durch glückliche Anregungen geschickter Meister ihr einen lohnenden Verdienst sichern könnten. Dedekind's Vortrag über antikes Wachs (p. 10 u. 11 in Anm.). Ueber die Bugonia u. Gmelin's Irrthümer. Beck von Mannagetta's Festrede „altägyptische Prinzessinnen in nilgrünen Gewändern“. Bei den Imkern muss der ganz specifisch historische Sinn für Imkerwesen noch mehr entwickelt werden. Wer auf dem in Rede stehenden sehr interess. Gebiete der historischen Bienenkunde auf guten soliden Boden stehen will, muss vor allem darnach trachten, sich sowohl auf dem grossen Wissenszweige der Bienenkultur, als auch auf dem nicht minder wichtigen und ausgedehnten Reiche der Aegyptologie eine zweckmässige Ausbildung zu erwerben.

Die sich unter 2. „Die Biene im Hieroglyphischen“ hieranschliessenden sehr interessanten Ausführungen lassen es dem Verf. nach dem Papyrus Harris No. 1 (u. and.) zweifelhaft erscheinen, ob die betreff. hieroglyphische Gruppe bisher richtig gefasst ist. Aussprache der Gruppe. Zusammenfassung (p. 27—28). 1. Das Bild der Biene in Verbindung mit den Königsnamen ist nur Sinn-determinativ u. daher garnicht auszusprechen oder steht ideographisch. Das Bild der Bienenkönigin ist das Bild der Herrschaft, diese Anwendung bezeugte die richtige Einsicht der alten Aegypter in das Bienenleben. Die Biene bezeichnet in Verbindung mit dem Pharaonen-Namen, oder in Gruppen den Grossherrn von Aegypten und so zugleich Aegypten selbst. 2. Das Bild der Biene ist falls es für die Biene selber (also ideographisch) steht „*āb en ebio*“ oder „*āf en ebio*“ zu lesen. 3. Zur Bezeichnung des Begriffs Honig ist es „*ebiō*“ zu sprechen. Im Aegyptischen hiess die Biene Fliege (ab) von Honig (ebio). Daher bei Jesaias der Parallelismus membrorum: „Die Fliegen und Bienen von Aegypten und Assyrien“. Das ägypt. „*āb-en-ebio*“ entspricht genau dem wissenschaftl. Namen der Biene „*apis mellifica*“. Das hieroglyph. Schriftwesen ist äusserst sinnreich. Das Zeichen für Wabe, Wachsgebäude bedeutet „die gebundene Marschroute“. Hinweis auf die demnächst erschein. Arbeit: „Raimund Friedrich, ein Wiener Imkerfürst“ (p. 28).

Der genannte Papyrus enthält die Mittheilung, das Ramses III. während seiner 31jähr. Regierungszeit den Haupttempeln Aegyptens grosse Mengen Honig u. Wachs gespendet habe, die nach der Verf. berichtigend umgerechneten „Hin“-Bemessungen (das „Hin“ =

0,455 l) etwa 10 964 kg 855 gr Honig betrogen, wenn Birch's Transcription richtig wäre. Es kommt aber weniger heraus. Die Wachsmenge war entsprechend geringer, da zur Bereitung von $\frac{1}{2}$ kg Wachs eine Kraftverbrauch von $5-7\frac{1}{2}$ kg Honig erforderlich ist. Jetzt wendet man bei uns künstliche Waben an. Gegenüber der jetzigen Honigproduktion schwinden die scheinbar riesigen, sich aber auf 31 Jahre vertheilenden Mengen von Wachs u. Honig gegenüber den jährl. Quantitäten gleicher Bienenprodukte in der jetzigen Welt-Bienenwirthschaft. Deutschland liefert jährlich mit 1,910,000 Stück Bienenkörben 20 000 Tonnen (à 1000 kg) Honig.

Dickel, Ferd. Ueber Petrunkevitch's Untersuchungsergebnisse von Bieneneiern. Zool. Anz. 25. Bd. No. 654 p. 20—27.

Auf Grund der gewonnenen Anschauungen behauptet Dickel: Die Freiburger Eistudien haben in Uebereinstimmung mit meinen Untersuchungsergebnissen ebenfalls dargethan, dass normale Drohnen-eier befruchtet sein müssen, und sie sprechen nicht gegen, sondern für meine Vorstellungen über die Entstehung der drei verschiedenen Bienenformen. Petrunkevitch hat in eigener Person konstatiert, dass seine aufgestellte Behauptung: „die von der Königin in Drohnenzellen abgesetzten Eier sind immer unbefruchtet“, thatsächlich falsch ist, denn in Drohnenzellen hat er Arbeitsbienen in Menge nachgewiesen, die unbestritten nur aus befruchteten Eiern hervorgehen. Da aber die Natur nicht irrt, so muss es das Mikroskop sein, welches Herrn Dr. Petrunkevitch in die Irre geführt hat u. es will daher dem Verf. dünken, dass der Ausspruch W. von Goethes: „Mikroskop und Fernrohre verwirren eigentlich den reinen Menschensinn“ auch heute noch in gewissem Sinne zutreffend sei. (Karsch hat diesen Ausspruch einem der letzt. Bände seiner Entom. Nachr. als Motto mitgegeben. Ref. Dr. R. Lucas).

— (2). Ueber die Entwicklungsweise der Honigbiene. t. c. No. 660 p. 39—56. — Siehe im system. Theil unter Apis.

— (3). Meine Ansicht über die Freiburger Untersuchungsergebnisse von Bieneneiern. Anat. Anz. 19. Bd. No. 3/4, p. 104—108. —Entgegnung von Aug. Weismann, *ibid.* p. 108—110.

Für Dickel sind die Weismann'schen Untersuchungen nicht nur zur Bestätigung seiner Ansicht geworden, sondern sie haben auch gleichzeitig die Erkenntnis bei ihm zum Durchbruch gebracht, dass wir jetzt die Ansicht aufgeben müssen: Ei und Samenkern sind die gleichwertigen Träger der Vererbung. — In die Bienenzellen abgesetzten Eier treten überhaupt keine Spermatozoen, sondern nur Abkömmlinge solcher ein, die sich in der Samenblase der Mutterbiene bilden. Die in Eiern aus Bienenzellen auf einer gewissen Entwicklungsstufe wahrnehmbare Strahlung hält Dickel für die Wirkung eines chemisch. Vorgangs, der den Zweck hat, die Bildungssubstanz des Eies auf eine im Sinne der Entwicklung höhere Potenz zu erheben. Eier, die ohne jeglichen Druck auf den Hinterleib der Mutterbiene abgesetzt worden, bleiben ohne jede

Lebensentwicklung. Verf. stellt auf Grund der Ergebnisse folg. Thesen auf: 1. Jene 2 Drüsen im Hinterleib der Mutterbiene, die neben der Samenblase liegen, mit ihr an gleicher Stelle ausmünden, u. deren Bedeutung bis jetzt unbekannt ist, werden in ihren rudimentären Funktionen gleich der Samenblase durch Druck regulirt. — 2. Beide Drüsen sind den durch die Mundteile funktionirenden, geschlechtsbestimmenden Drüsen der Arbeitsbiene analog. — 3. Wäre die Mutterbiene durch den dauernden Kolonieverband mit den Arbeitsbienen als selbständiges Thier nicht völlig rückgebildet, um zu einer Eierlegemaschine von hervorragender Leistungsfähigkeit zu werden, so würde sie im befruchteten Zustand heute noch, gleich den Wespen- u. Hornissenmüttern, ausschliesslich Arbeitern das Leben geben. — 4. Wespen- u. Hornissenmütter einer- u. Bienenmütter andererseits sind in ihren Leistungen hinsichtlich der Fortpflanzung nicht prinzipiell verschieden, sondern die Mutterbiene stellt jenen gegenüber nur einen weiter vorgeschrittenen Grad der Differenzirung dar, der die Folge ihres dauernden Kolonieverbandes mit den Arbeitern ist. — Darstellung des Entw.-Verlauf der Bienenwesen auf Grund der Drüsenforschung von Schiemenz.

Die Befruchtung des Eies hat, je nach der Form ders., entweder mikroskopisch feststellbare Strahlung im Gefolge oder nicht, u. die Neubildung wird sich auf Grund der Befruchtung insoweit vollziehen können, als sie die gemeinsame Grundlage bildet für die Entwickl. der verschied. Bienenformen. Von da ab wirken dabei 3 Drüsensysteme w (weiblich), m (männlich), N (Nährdrüse). N liefert die nach Leuckart u. v. Siebold „der Milch der Säugethiere“ vergleichbare, gemeinsame Ernährungsflüssigkeit für alle Larven- u. tritt daher erst in Funktion des Larvenzustandes, funktionirend bis kurz vor Bedeckelung der Zellen. So funktioniren während des Larvenzustandes unter normalen Verhältn. gleichzeitig in der Mutterzelle w u. N, in d. Drohnenzelle m u. N, in d. Arbeiterzelle w, m u. N. Der jugendliche Larvenzustand w, m, N der mit einer Larve besetzt. Arbeiterzelle kann noch umgewandelt werden in w, N od. m, N. Da die Wegnahme der Mutterbiene einen Reizzustand erzeugt, der auf baldige Nachschaffung neuer Geschlechtsthiere durch Drüsenhätigkeit hindrängt, so wird die bis jetzt unerklärliche Thatsache verständlich, warum die Arbeitsbienen Nachschaffungszellen stets über den Larven, nie über Eiern errichten. Zwecks Nachschaff. von Weibchen drängen Drüsen w u. N. zur Funktion hin. Im Larvenzustand können wohl beide gleichzeitig befriedigt werden, nicht aber im Eizustand. Hier fehlt jener Auslösungsreiz für Drüse N, der in den Lebensbewegungen der Larve selbst zu suchen ist. Wege zur Prüfung des Gesagten: Mikroskopische Prüfung des Spermatothoreninhalts der Drohnen, des Samenblaseninhalts befruchteter ♀. Vergleichung des Befundes in Bieneniern. Vergleich von Eiern aus noch nicht fertig gestellt. Drohnen- u. Arbeiterzellen, sowie der Larvenstadien aus den dreierlei Zellengattungen. Material liefert bereitwilligst der Ver-

fasser. — Hieran schliesst sich Weismann's Entgegnung p. 108—110 (siehe Weismann.) — Hierauf antwortet Dickel sub. No. 4:

- (4). Thatsachen entscheiden, nicht Ansichten, von F. Dickel. *ibid.* p. 110—111. — Are Drone Eggs Fertilised. *Abstr. Journ. Roy. Micr. Soc. London*, 1901, P. 4, p. 415—416. — Ausz. von R. Fick, *Zool. Centralbl.* 8. Jhg. No. 11, p. 366—367.

Weismann's Ansicht, die Beobachtungen über Rassenkreuzungen, welche Dickel auch heute wieder gegen die Dzierzon'sche Theorie geltend macht, seien bereits früher auf ihren richtigen Gehalt zurückgeführt worden, ist ein Irrtum.

Dickel führt als Gründe folgendes gegen Weismann-Dzierzon an: 1. Bei Kreuzung heller italien. u. dunkler Bienen zeigen gerade die Männchen besonders deutlich die väterliche Farbe [nach Weismann handelt es sich hierbei um zufällige Rückschlagserscheinungen, ganz reine Bienenrassen existieren heut kaum noch]. 2. D. will aus Eiern, die aus normalen Drohnenzellen in Arbeiterzellen eines drohnenbrütigen Volkes Arbeiterinnen erhalten haben. (Wird erst auf obenerwähnten Einwurf Weismann's angeführt). 3. Ein der Königin beraubtes normales Volk, das nur Arbeiterzellen hat, soll auch Männchen ziehen [Fick stellt in seinem Referat die Möglichkeit einer sicheren Entfernung aller Drohnenzellen in Frage. — Lässt sich sehr leicht durch Kunstwaben machen. — Ref. Dr. R. Lucas]. 4. Ein normales, auf lauter Drohnenzellen gesetztes Volk soll unter Umständen nur Arbeitsbienen zur Entwicklung bringen (Fick, l. c. stellt die Frage, ob eine neue Ablage von befruchteten Eiern sicher auszuschliessen ist). 5. Dickel sagt, er sei imstande, in besonders vorbereiteten Drohnenwaben auch Arbeiterinnen zu erzielen in einem sonst normalen Stock, aus dem nur die meisten Drohnenwaben entfernt worden sind. (Fick stellt bezügl. der Neuablage befruchteter Eier dieselbe Frage wie oben).

Die zahlreich. angeführten Thatsachen sind ihm für seine Behauptung genügend u. er stellt jetzt die Frage: Wie will man durch die von Weismann vertretene Vererbungstheorie die Thatsache erklären, dass die Arbeitsbienen Organe besitzen, die weder dem Vater noch der Mutter zukommen? Eine Prüfung der Dickel'schen Theorie mit dem Correlationsgesetz der Teile liefert die Erklärung. „Unmöglich kann die zoologische Wissenschaft noch länger an einer Anschauung festhalten, die durch jeden geschulten Bienenwirt heute als ein Irrtum nachweisbar ist, nachdem ich bezügl. der Bienenentwicklung endlich exacte empirische Untersuchungsmethoden festgestellt habe.“

- (5). Der gegenwärtige Standpunkt meiner Entwicklungstheorie der Honigbiene. *Naturw. Wochenschr.* 16. Bd. No. 16, p. 177—182.

Dominique, J. Description d'un Harpactes nouveau. *Bull. Soc. Ouest France* (2) vol. 1 p. 513—514, pl. VII.

Donisthorpe, Horace St. J. K. On some Experiments with myrmecophilous Coleoptera, and an Observation Nest of Formicaria. Entom. Record, vol. 13 No. 12 p. 349—353.

Doncaster, L. Curious nest of Odynerus. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) Sept. p. 228—229.

Ducke, Adf. (1). Beobachtungen über Blütenbesuch, Erscheinungszeit u. s. w. der bei Pará vorkommenden Bienen. Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 1. Hft. p. 25—32. (Fortsetz. u. Schluss) 2. Hft. p. 49—69.

Hft. 1 p. 25—32: Resultat der seit 1899 bei Pará angestellten Beobachtungen. Determination der Bienen durch Friese, der Pflanzen durch J. Huber. Untersuchungen schwierig, da viele Bienen die Blüten hoher Bäume besuchen (30 m Höhe u. mehr). Notorischer Blütenmangel der Tropenländer, so dass sich ein ausschliesslicher Besuch gewisser Blüten hier weniger scharf ausgeprägt vorfindet. Von den Bienen bevorzugte Pflanzenfamilien sind: Vor allem Papilionaceen (stark frequentirt wie in Europa), Solanaceae (in Europa gemieden), Caesalpiniaceae, Apocynaceae, Flacourtiaceae, Verbenaceae, Malvaceae, Convolvulaceae, Compositae u. Marantaceae. Einzelne Sp. gewisser Pflanzengenera werden von sehr verschied. Bienenarten besucht. Lebensdauer bei den Arten bei Pará zumeist länger als bei den europäischen. Erscheinungszeit unregelmässiger wie in Europa. Erscheinungszeit u. Lebensdauer der einzelnen Individuen ist nicht mit Flugzeit der Art zu verwechseln. Flugzeit bei vielen Arten das ganze Jahr bedingt durch lange Lebensdauer (*Acanthopus*), bei anderen Formen durch unregelmässige Erscheinungszeit (*Ceratina*).

Bienenreichster Monat bei Pará: Sept., — bienenärmster: Januar; während des Dezember rapides Abnehmen. Von manchen Arten finden sich in der nassen Jahreszeit nur ♀ (von der trocken. her übrig geblieben). Verschiedene Generationen. Tageszeit des Auftretens. Grosse Feuchtigkeit bei hellem Sonnenschein ist den Bienen am liebsten. Eigenthümliche Art des Ausruhens mit angebissenen Kiefern. Schnellflieg. Arten fliegen hoch, schlechte Flieger niedrig. Einzelne Geschlechter einer u. ders. Art besuchen ganz verschiedene Blüten. Wo bei manch. Arten das eine Geschlecht selten ist, besucht es vielleicht die Blüten hoher Bäume u. entzieht sich dadurch der Beobachtung. Waldbewohner: *Euglossa* u. *Melipona*; an den sonnigen Ufern der Waldflüsse: *Centris*; die übrig. Gatt. hauptsächlich in der Nähe bebauten Landes. Steppenthiere: *Eucera* bei Pará äusserst selten. Anzahl der bei Pará vorkomm. Bienenarten wohl nicht weit über 200, früher wohl bienenreicher, der fortschreitenden Urbarmachung weichend. Uebersicht der wichtigsten, dem Verf. bekannt gewordenen Bienenpflanzen u. deren Besucher (p. 30—32): Compositae (5 Pflanzenarten), Rubiaceae (1), Acanthaceae (1), Bignoniaceae (1), Solanaceae (4), Labiatae (1), Verbenaceae (2), Borragineae (1), Convolvulaceae (2), Apocynaceae (2), Gentianaceae (1), Melastomaceae (wenig von Insekten besucht, nur 1 Art von Hummeln

umschwärmt), Passifloraceae (1), Turneraceae (1), Flacourtiaceae (3), Bixaceae (1), Guttiferae (1).

Hft. 2 p. 49—67 (Forts. u. Schluss aus Hft. 1).

Malvaceae (2), Tiliaceae (2), Rhamnaceae (1), Sapindaceae (1), Polygalaceae (2), Malpighiaceae (2), Erythroxylaceae (1), Mimosaceae, Caesalpiniaceae (2), Papilionaceae (6), Amaranthaceae, Piperaceae, Orchidaceae (3), Marantaceae (1), Musaceae (2), Cyperaceae (2) (p. 49—51). — Bemerk. zu den einzelnen Bienengattungen u. -Arten (p. 51—67). I. **Solitäre Sammelbienen.** A. Proapidae. a) Sphecoidiinae. 1. *Temnosoma* Sm. (2 Sp.). — b) Prosopidinae. 2. *Prosopis* (4). — B. Podilegidae. c) Anthreninae. 3. *Colletes* Latr. (1). 4. *Oxaea* Klug (1) [Verf. zählt diese beiden Gatt. lieber hierher, als nach dem Katalog. hym. zu d. Prosop., letzt. zu den Podalir.], 5. *Halictus* Latr. (*Augochlora* Sm. ist hierherzuziehen, da nicht einmal deren Existenz als Subg. gerechtfertigt ist. — 25—30). — d) Panurginae. 6. *Megalopta* Sm. (1). — e) Xylocopinae. 7. *Ceratina* Latr. (10 + 1 bei Macapá), *Xylocopa* Latr. (6). — f) Podaliriinae: 9. *Eucera*. Subg. *Eucera* s. str. (1), Subg. *Macrocera* Latr. (3), *Ancyloscelis* Latr. (2). 10. *Podalirius* (1). 11. *Exomolopsis* (3). 12. *Tetrapedia* Klug (9). 13. *Ptilothrix* (2). 14. *Centris*, Subg. *Epicharis* Klug (8), Subg. *Centris* s. str. (19), 15. *Euglossa*, Subg. *Euglossa* s. str. (3), Subg. *Eumorpha* Friese (1), Subg. *Eulema* Lep. (9). — C. Gastrilegidae. g) *Megachilinae*. 16. *Megachile* Latr. (15). 17. *Anthidium* F. (4). — II. **Sociale Apiden.** — h) *Bombinae*. 18. *Bombus* Latr. (2). — i) *Apinae*. 19. *Melipona* Ill. *Melipona* s. str. (5), Subg. *Trigona* Jur. ([28 + 2]). — III. **Schmarotzerbienen.** — k) *Nomadinae*. 20. *Chrysantheda* Perty (3), *Acanthopus* Klug (1), *Melissa* Sm. (3), *Mesocheira* Lep. (3), *Rhathymus* Lep. (1), *Epeolus* Latr. (1), *Osiris* Sm. (3). — l) *Coelioxynae*. *Coelioxys* Latr. (10).

— (2). Zur Kenntniss einiger Sphegiden von Pará. t. c. 5. Hft. p. 241—242.

Bemerk. zu Arten folg. Gatt.: *Sphex* (11 Sp.), *Aulacophilus* (1), *Sceliphron* (1) u. *Monedula* (1).

— (3). Beiträge zur Kenntniss der geographischen Verbreitung der Chrysididen und Beschreibung von 3 neuen Arten. t. c. 6. Hft. p. 353—361.

I. Aufzählung der von mir in den Jahren 1890 bis 1895 u. 1898 bei Troppau und Odrau in Österreichisch-Schlesien gesammelten Species (p. 353). — II. Ueber einige seltenere Arten, beobachtet im österreichischen Küstenlande (p. 354—356). — III. Ueber Goldwespen von Pará (Nordbrasilien) (p. 356—361). 1. *Ellampus Huberi* n. sp., *E. (Holophrys) paraënsis* n. sp., *E. (Notozus) aequinoctialis* n. sp. sowie Liste von 13 weiteren Spp.

Dyar, Harr. G. (1). 1897. On the Larvae of certain Saw-Flies (*Tenthredinidae*). Journ. New York Entom. Soc. vol. 5 No. 1 p. 18—30.

- (2). 1897. New Saw-Flies (Tenthredinidae) with Descriptions of Larvae. t. c. No. 4 p. 190—201.
 — (3). Titel p. 300 des vor. Berichts lies Atomacera statt Atocera. — Behandelt Atomacera desmodii u. Priophorus irregularis n. sp., 1 n. var.

Elgar, Herb. (1). Rare Aculeate Hymenoptera at Halling, Kent. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) Jan. p. 17.

- (2). *Andrena polita* Smith, in Kent. t. c. Nov. p. 277.

Emery, E. (1). Ameisen gesammelt in Ceylon von Dr. W. Horn 1899. Mit 7 Textfig. Deutsch. Entom. Zeitschr. 1901. 1. Hft. p. 113—122. — 7 n. sp.; n. g. *Stereomyrmex*.

Dorylus (1), *Diacamma* (2), *Pachycondyla* (2), *Leptogenys* (3), *Odontomachus* (1), *Sima* (2 + 1 n. var.), *Atopomyrmex* (1 n. + 1 n. in Anm.), *Stereomyrmex* n. g. (1 n.), *Monomorium* (1 + 1 n.), *Pheidole* (3 + 2 n.), *Pheidologeton* (2), *Solenopsis* (1), *Crematogaster* (1), *Xiphomyrmex* (1), *Meranoplus* (1), *Cataulacus* (1), *Myrmicaria* (1), *Technomyrmex* (1), *Tapinoma* (1), *Acropyga* (1), *Plagiolipsis* (1), *Oecophylla* (1), *Prenolepis* (4), *Camponotus* (9 Form.), *Polyrhachis* (7 + 1 n.), *Hemioptica* (1).

- (2). Notes sur les sous-familles des Dorylines et Ponérines (famille des Formicidés). Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45. I. p. 32—54. — 7 n. sp.; n. subg.: *Pseudoponera*, *Mesoponera*, *Brachyponera*; n. g. *Neoponera*.

I. Ponerinae et Dorylinae (p. 32—37). Systematisches. Einteilung. Die Resultate der Untersuchungen, die auch im Thierreich zur Geltung kommen sollen, sind:

Gruppe I. Dorylinae s. str.

1. Tribus Dorylii.
2. „ Aenictii.
3. „ Ecitii.

Gruppe II. Cerapachinae.

4. Tribus Acanthostichii.
5. „ Cerapachyi.
6. „ *Cylindromyrmii*.

Subfamilien der Ponerinae.

- | | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| 1. Myrmecii. | 4. Ectatommi. | 7. Platythyrei. |
| 2. Amblyoponii. | 5. Proceratii. | 8. Ponerii. |
| 3. Paraponerii. | 6. Thaumatomyrmii. | 9. Leptogenyi. |
| | 10. Odontomachii. | 11. Melissotarsii. |

II. Le groupe des genres *Ponera*, *Pachycondyla*, *Ectomomyrmex*, etc. (p. 37—47). — Critique et essai de reclassement (p. 37—43). Synonymie, Gruppierung etc. *Ponera*, *Belonopelta*, *Pachycondyla* (mit 4 Untergatt.), *Euponera* (mit 3 Untergatt.) u. *Neoponera*, siehe im system. Theil. Liste des espèces (p. 44—47) u. zwar *Ponera* Latr. (32 Sp.), *Belonopelta* Mayr (5 Sp.), *Pachycondyla* F. Sm. Subg. *Pachycondyla* s. str. (8 Sp.), subg. *Bothroponera* Mayr (30 Sp.), subg. *Ectomomyrmex* Mayr (10 Sp.), subg. *Pseudoponera* (8 Sp.); *Euponera* For. subg. *Euponera* s. str. (1 Sp.), subg. *Mesoponera* Emery (14 Sp.), subg. *Brachyponera* Emery (8 Sp.), *Neoponera* 14 Sp.).

III. Espèces nouvelles ou critiques (p. 47—54): *Dinoponera* (1, mit 4 n. subsp.), *Pachycondyla* ([2 + 1 n.] Sp. + 1 n. subsp.), *Euponera* (1), *Psalidomyrmex* (1 n.), *Ectatomma* (2 n.), *Rhytidoponera* (1 n. + 1 n. var.), *Discothyrea* (1 n.), *Anochetus* (1 n.), *Odontomachus* (1 subsp.), *Cylindromyrmex* (1 n.).

- (3). A propos de la classification des Formicidae. Avec 3 figs. *Ann. Soc. Entom. Belg.* T. 45 VI, p. 197—198. — Bezieht sich auf Forel. — Siehe im system. Theil unter Formicidae. Abb. des Tibienendes von *Pseudoponera* u. *Brachyponera* Fig. 1, 2; Lamina subgenit. von *Paraponera* Fig. 3.
- (4). Formiciden von Celebes. Mit 5 Abbildgn. im Text. *Zool. Jahrb. Abth. f. System.* 14. Bd. 6. Hft. p. 565—580. — 120 Sp., dar. 6 n.

I. Zur Faunistik von Celebes (p. 565—572). Material. Verzeichniss der bis jetzt in Celebes gefundenen Formiciden u. zwar: Subf. *Dorylinae*: *Dorylus* (1), *Aenictus* (1), *Cerapachys* (1). — Subf. *Ponerinae*: *Stictoponera* (1), *Rhytidoponera* (1), *Trapeziopelta* (2), *Diacamma* (2), *Pachycondyla* (1), *Ponera* (1), *Leptogenys* (3), *Anochetus* (1), *Odontomachus* (4), *Ponera* (4 Sp. von F. Sm., doch Gatt. unsicher). — Subf. *Pseudomyrminae*: *Sima* (1). — Subf. *Myrmecinae*: *Myrmecina* (1), *Vollenhovia* (2), *Atopomyrmex?* (1), *Monomorium* (2), *Ichnomyrmex* (2), *Pheidole* (4), *Crematogaster* (3 + 3 n.), *Pheidologeton* (2 + 1 n.), *Solenopsis* (1), *Tetramorium* (1), *Cataulacus* (1), *Myrmica* (3, doch Gatt. fraglich). — Subf. *Dolichoderinae*: *Dolichoderus* (1), *Technomyrmex* (1), *Tapinoma?* (1), *Iridomyrmex* (1). — Subf. *Camponotidae*: *Plagiolipsis* (1), *Acropyga* (1), *Oecophylla* (1), *Prenolepis* (1), *Pseudolasius* (2), *Camponotus* (10, dar. 5 zweifelh. von F. Sm.), *Polyrhachis* (45, dar. 2 n.), *Echinopla* (4). — Insgesamt also 120 Arten mit Unterart. u. Varr. — Von diesen finden sich 58 auf den Sunda-inseln wieder, 27 auf Neu-Guinea u. den Molukken, 17 sind beiden Gebieten gemeinsam. Die Ameisenfauna von Celebes trägt also hauptsächlich indo-malayischen Charakter. Gleiches Resultat ergibt die Gatt. *Polyrhachis*. Bemerkenswerth ist das Vorkommen der unterirdisch lebenden *Dorylus levigatus*, deren Uebertragung von einem Land zum andern nur durch eine continentale Verbindung möglich erscheint. *Rhytidoponera* ist typisch f. das austral-papuanische Gebiet. Dabei weist die Ameisenfauna von Celebes merkwürdige negative Eigenschaften auf. So fehlt die für Hinterindien, die Sunda-Inseln u. die Philippinen charakt. *Odontoponera transversa* F. Sm., die Gatt. *Myrmecaria*, sowie der sehr auffallende, von jedem Sammler mitgenommene *Camponotus gigas* Latr. Bemerk. zur geolog. Bildung der Insel (nach Sarasin) die Ameisen bestätigen die Ansicht. Darnach ist Celebes erst im Miocän aus dem Meere aufgetaucht. Im mittl. Tertiär fand dann die erste Einwanderung von Landthieren aus Asien auf unbekanntem Wege statt. Während des Pliocäns war Celebes von Borneo vollständig getrennt, stand aber durch 4 Landbrücken mit Java, Flores, den Molukken und

den Philippinen eine Zeitlang in Verbindung, wodurch ein Artenaustausch mit jenen Inseln möglich wurde. — Die Ameisen sind aber im Allgemeinen zur Lösung solcher genauer faunistischen Fragen wenig geeignet, weil die Fauna der Ameisen noch zu wenig erforscht u. ihre Verbreitung durch den Wind (geflügelte Weibchen) leicht möglich ist.

II. Neue oder kritische Arten (p. 573—580). *Pheidole longicornis* Emery, *Crematogaster deformis* F. Sm. emend., *C. pauli* n. sp., *C. fritzi* n. sp., *C. fruhstorferi* n. sp., *Pheidologeton* (*Aneleus*) *sarsinorum* n. sp., *Polyrhachis smithi* n. sp. u. *P. gibba*. Die Textfig. stellen Abb. des Thorax etc. dar.

- (5). Remarques sur un petit groupe de *Pheidole* de la région sonorienne. Bull. Soc. Entom. France, 1901, No. 5 p. 119—121. — siehe im system. Theil.
- (6). Sul polymorfismo delle Formiche e particolarmente dei Dorilini. Monit. Zool. Ital. Ann. 11 suppl. p. 47.
- (7). Le formiche in rapporta alla fauna di Selebes. Monit. Zool. Ital. Ann. 12 No. 7 p. 178. — Union. Zool. Ital.
- (8). Der Geschlechtspolymorphismus der Treiberameisen [*Anomma*] und die flügellose Urform der Ameisenweibchen. Naturw. Wochenschr. 17. Bd. No. 3 p. 54—55.

Treiberameisen. Streif- und Jagdzüge. Auswanderungszüge. *Anomma*, das ♂ dazu ist *Dorylus nigricans*. *Dorylus* ist auf die männlichen Formen der als *Anomma* u. *Tylopone* beschrieb. Arbeiterinnen begründet. Die ♀ dazu sind *Dichthadia glaberrima*. 1880 von Trimen bewiesen. Alle bis jetzt von *Dorylus* gefundenen ♀ zeigen mehr oder weniger verstümmelte Tarsen. — Die ♂ von *Eciton* in Amerika sind längst als *Labidus*, die von *Typhlatta* als *Aenictus* bekannt. Die ♀ aller dieser Formen sind ebenso wie die ♀ von *Dorylus* flügellose, blinde oder mit sehr kleinen Augen versehene Insekten, wodurch der Geschlechtspolymorphismus der drei Gatt. ein besonderes Gepräge erhält. Diese Verhältnisse liegen aber nicht unvermittelt da. Bereits die Königinnen von *Eciton* u. besonders von *Aenictus* weichen von den betreff. Arbeiterinnen weniger ab als die von *Dorylus*. Noch mehr zeigt sich dies bei *Acanthostichus*, *Leptogenys* etc. Vermuthlich liegt hier ein ursprünglicher Zustand vor. Es ist anzunehmen, dass bei den primitiven Ameisen die ♀ ungeflügelt u. arbeiterähnlich waren u. sich im Laufe der Phylogenese nach 2 Punkten hin differenzirten: in der einen durch sekundäre Erwerbung (richtiger: Wiedererwerbung) der früher dem männlichen Geschlecht eigenen Flügel, wodurch das bei den meisten Ameisen verbreitete Verhältniss zustande kam; in der anderen Richtung durch Vergrößerung des Leibesumfanges u. Entstehung anderer Eigenthümlichkeiten des Körperbaues, welche in der *Dichthadia*-form von *Dorylus* ihren Endzustand erreichten.

- (9). Note sulle Doriline. Con 8 [14] Fig. Bull. Soc. Entom. Ital. An. 33 1. Trim. p. 43—56.

I. La femmina del genere *Aenictus*. — II. Nuove Species di *Aenictus* [de A. Forel; 2 n. sp., 1 n. var.]. — III. *Aenictogiton fossiceps* n. g., n. sp. — IV. Specie [4] e varietà [2] Nuove del genere *Eciton*.

— (10). Spicilegio mirmecologico. Con 1 fig. Bull. Soc. Entom. Ital. Ann. 33. 1. Trim. p. 57—63.

Behandelt Formiche raccolte in Cefalonia dal Dott. Domen. Sangiorgi: 1 n. sp. — Alcune Formiche della Colonia eritrea: 18 sp., dar. 1 n.

— (11). Siehe Mocsáry & Szépliget.

Enderlein, Günth. (1). Neue Evaniiden, Stephaniden, Mutilliden (Apterogyna), Proctotrupiden und Chalcididen mit einer Bestimmungstabellen der afrikanischen Stephaniden. Aus dem Kgl. Zool. Museum zu Berlin. Mit 9 Abbildgn. im Text. Arch. f. Naturg. 67. Jhg. 1. Bd. 3. Hft. p. 188—220.

Behandelt unter anderem 28 n. sp. — Inhalt: Evaniidae: Evania (2 + 7 n. sp.); Gasteruption: (2 n. sp. + 1 nom. nov.), Trigonalys (1 bek. Sp.). — Stephanidae: Stephanus (1 + 8 n. + 1 n. var.), Stenophasmus (3 n.). — Mutillidae: Apterogyna (1 n.). — Proctotrupidae: Pristocera (3 n.), Calyoza (1 n.). — Chalcididae: Leucospis (2 + 3 n.). — Bestimmungstabelle der afrikanischen Vertreter der Gatt. Stephanus Jur.; desgl. der Gatt. Stenophasmus.

— (2). Neue Pepsis-Arten aus dem Kgl. Museum für Naturkunde zu Berlin. Mit 8 Figg. Stettin. Entom. Zeitung 62. Jhg. No. 1—6 p. 145—150. — 3 n. sp.

— (3). Hymenopterologische Berichtigung betreffend die Familie der Pompiliden. Stett. Entom. Zeitung 62. Jhg. No. 1—6 p. 151—153.

Bringt Bemerk. zu *Pompilus (Homonotus) ibex* Sauss. ♂ (= *P. [Salius] petiolaris* Sauss. ♀). — 2. *Pepsis diselene* ist wie schon Lucas angiebt, keine *Pepsis*, sondern ein *Salius*. — 3. *Pompilus radoszkowskyi* Rad. ist ein *Salius*. Originalbesch. u. Besch. d. Type.

Siehe im system. Theil.

Die Entomologischen Nachrichten (begründet von Dr. F. Katter in Putbus) schliessen mit dem Ablauf des Jahres 1900 (verbessere in diesem Sinne p. 301 des vor. Berichts) ihre ruhmvolle Thätigkeit, nachdem sie lange Zeit hindurch (seit 1884) unter der glücklichen Aegide des Herrn Prof. Dr. F. Karsch (in Berlin) gestanden haben.

Enteman, Miss Minnie. On the behaviour of *Polistes*. Science, N. S. vol. 13 No. 316 p. 112—113. — Zool. Club, Univ. Chicago.

Evans, W. M. (1). *Bembex rostrata* L. in New Jersey. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) Jan. p. 17.

— (2). The pale variety of *Bombus Smithianus* White in Scotland. t. c. Febr. p. 47.

— (3). *Chrysis Ruddii* Shuck. in Scotland. t. c. Febr. p. 48.

- (4). Scottish Aculeates. t. c. Jan. p. 15, Febr. p. 48.
 - (5). *Mimesa Dahlbomi* and other Aculeates in Scotland. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) Dec. p. 301.
Mimesa Dahlbomi, *Andrena similis* und *Salix exaltatus*.
 - (6). Scottish Chrysidids. Ann. Scott. Nat. Hist. 1901. Apr. p. 118—119.
 - (7). *Agriotypus armatus* Curtis in Midlothian. Ann. Scott. Nat. Hist. 1901 July, p. 183—184.
- Fabre, J. H.** Insect Life. Souvenirs of a Naturalist. [1st series] translated from the French by the author of 'Mademoiselle Mori', with a preface by D. Sharp. Edited by F. Merri-field. Illustrated by M. P. Parker. London 1901. 8°. XII 320 p.
- Fauna Hawaiiensis**, or the Zoology of the Sandwich (Hawaiian) Isles. Being Results of the Explorations instituted by the Joint Committee appointed by the Royal Society of London for promoting natural knowledge and the British Association for the Advancement of Science, Acqd. carried on with the assistance of those Bodies and of the Trustees of the Bernice Peuhahi Bishop Museum at Honolulu. Edited by David Sharp. vol. I. P. III. Hymenoptera Parasitica. By W. H. Ashmead, (p. 277—364), pls. VIII and IX. 1901. 12 s. (subscr. 6 s.)
- Ferton, Ch.** Description de l'*Osmia corsica* n. sp. et observations sur la faune corse. Bull. Soc. Entom. France 1901 No. 4. p. 61—66.
- (2). Notes détachées sur l'instinct des Hyménoptères mellifères et ravisseurs avec la description de quelques espèces. Avec 3 pls. Ann. Soc. Entom. France, vol. 70. 1. Trim. p. 83—145—148.

Etwaige Einwürfe, dass der Verf. zu viel Gewicht auf Einzelheiten des Instinkts legt, weist er damit zurück, dass der Instinkt der Hym. bemerkenswerth constant ist, dass er immer wieder in denselben, wie in weit von einander entfernten Gegenden mit derselben Constanz u. Identität auftritt. Die Gewohnheiten der Hym. variiren nicht mehr von einander als einige ihrer anatom. Charaktere, sie variiren weniger als die Färbung des Teguments u. d. Behaarung. Wer die Variabilität des Instinkts dieser obengen. Insekt. studiren will, muss bis aufs Kleinste die Details studiren, da er nur unter diesen Variationen finden wird. — Die meisten Beobachtungen des Verf.'s wurden auf Corsica angestellt, einer Insel, die sich während der Pleistocen- (pleistocène ou chelléenne) Zeit vom Festland (u. zwar von der Provence) gesondert hat, u. dess. Hym. sich seit dieser Zeit mit denen des Festlandes nicht gekreuzt haben. Das Studium der Hym. dieser Insel, sowie derj. der Provence wird interess. Schlüsse über die Variabilität des Instinkts ergeben.

Sur l'époque de reveil des Bourdons et des Psithyres à Bonifacio. (p. 84—85) Die diesbezügl. Notizen betreffen *Bombus*

xanthopus Kriechb., *B. corsicus* Schult.-Rechb., *muscorum* var. *nigripes* Pérez u. *Psithyrus Perezi* Schult.-Rechb.

Gastrilégides (p. 85—88). *Osmia tunensis* Lep., *O. emarginata* Lep., *O. Lepeletieri* Pérez, *O. mucida* Dours.

Sur le peu de variabilité de l'instinct chez les Hyménoptères. (p. 88—93). Die Färbungen verschiedener Sp. von *Bombus*, *Psithyrus*, *Anthidium*, *Stizus*, *Ammophila*, *Planiceps*, *Miscophus*, *Colletes*, *Andrena*, haben sich im Laufe des Isolirtseins geändert, die Instinkte nicht. Bemerk. zu *Osmia versicolor* Latr. et *viridana* Moraw., *O. papaveris* Latr. u. *Perezi* Fertou, *Megachile sericans* Fonsc. u. *Anthidium strigatum* Pz.

Sur la dispersion des Hyménoptères résiniers. (p. 93—94). Hym., die Harz zu ihrem Zellenbau gebrauchen, sind an harzende Bäume gebunden. Diese sind auf Corsica überall in der *Pinus laryx* vorhanden. Bemerk. zum Bau von *Andrena morio* Brullé u. *Nomada corsica* Pérez in litt. (spec. inedit.) u. *Prosopis hyalinata* Smith.

Odeur émise par les *Andrena nigroolivacea* Dours et *molesta* Pérez (p. 94—95).

Fleurs et insectes (p. 95—98). *Muscari comosum* Mill. (rôle vexillaire du panache) u. seine Besucher.

Sphégides (p. 98—103). Behandelt: *Notogonia* (1), *Tachysphex* (6), *Tachytes* (1), *Sylaon* (1), *Astata* (1).

Liste des Hémiptères capturés par des *Astata* spp., *Alyson Ratzeburgii* Dhlb. (p. 103—104), des *Gorytes* 3 spp. (p. 104—105). — Liste des Hémiptères capturés par des *Gorytes*; diverse Spp. (p. 105—106).

Hyménoptères chasseurs d'Hémiptères (p. 106—107).

Sur les moeurs des *Nysson* Latr. *Sphex maxillosus* F. u. *Cerceris specularis* Costa (p. 107—108). — Proies de quelques espèces de *Cerceris* à Bonifacio (p. 109).

Sur l'état de conservation des Diptères capturés par les *Oxybelus* Latr. Die Fliegen werden, wie Verf. zahlreich feststellen konnte, nur gestochen, der Thorax wird nicht, wie Wesenberg, Peckham, G. W. u. E. G., auch Verhoeff angeben, zertrümmert, Von Zertrümmerung kann Verf. nur in ein. Falle berichten (p. 110—112).

Sur la diversité des proies capturées par quelques chasseurs de Diptères (p. 113—114). Beutethiere von *Bembex oculata*, *Crabro* 2 sp. u. *Lindenius armatus* V.-D.-L. u. *Lindenius n. sp.*? — *Pompilides* (p. 114—123). Instinkte von *Pompilus* (9 sp., darunter 2 n.), *Planiceps* (1), *Priocnemis* (3).

Liste des Araignées capturées par des *Pompilides* (p. 124—125) u. zwar von 10 *Pompilus*-, 1 *Aporus*-, 1 *Planiceps*-, 4 *Priocnemis*-Arten.

Sur la position de l'oeuf des Hyménoptères ravisseurs (p. 125—128). Zusammenstellung, Aufzählung u. Unterscheidung der betreff. Hym.-Formen nach ihren Beuteobjekten: Dipteren-,

Ameisen-, Hemipteren-, Orthopteren-, Raupen- u. Spinnen-Jäger. — *Vespidæ* (p. 128 sq.) *Associations de Polistes gallica* L. pour la fondation des nids (p. 128—129). *Odynerus* (p. 129—132) Nester, biol. Notizen u. s. w. von 13 Sp., (darunter 1 neu). — Sur les nids d'*Eumenes* Latr. (p. 132—133). — Parasites d'*Eumenes* (p. 133). — Sur l'habitude qu'ont les *Odynerus* et les *Eumenes* de suspendre leur oeuf à l'extrémité d'un fil (p. 133—139). Bemerk. zu *Ceramius lusitanicus* Klug u. *Celonites abbreviatus* Vill.

Sur les moyens de protection de certaines chenilles contre les Hyménoptères ravisseurs (p. 139—141). — Intelligence et instinct (p. 141—144): Bemerk. zu *Ammophila holosericea*, *Pompilus viaticus* L., *Odynerus parietum* L., *Heriades truncorum* L., *Perisenus 3-aerolatus* Först. = *fuscicornis* Walk. — Gesteht wie viele andere Entomologen nur in seltenen Fällen den Hymenopteren das Vermögen zu, die gewohnheitsmäßige Reihe von Vorgängen, die ihnen der Instinkt vorschreibt, in den geringsten Details ihres Lebens nachdenkend zu modificieren.

Diptères parasites d'Hyménoptères nidifiants (p. 144—145). Bemerk. zu *Sphex albisectus* Lep. u. *Panurgus canescens* Latr. — Explication des figures. Planche 1—3 (p. 145—146). — Table des matières (p. 147—148).

Fielde, Adele, M. (1). A Study of an Ant. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. vol. 53. 1901 p. 425—449. — *Stenamma fulvum piceum*. — Ausz. von R. von Hanstein. Naturw. Rundschau, 17. Jhg. No. 16 p. 198—199.

— (2). Further Study of an Ant. With 1 diagr. and 1 fig. Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. 1901. p. 521—544. — Abstr. Journ. Roy. Micr. Soc. London, 1902. P. 1 p. 39—40. *Stenamma fulvum piceum* betreffend.

Fiske, Will. F. siehe Weed (vor. Bericht p. 327).

Fitzgerald, Jam. R. Habits of Humble Bees. The Irish Naturalist, vol. 10 No. 10 p. 203. — Answer by F. Burbidge *ibid.* p. 204.

Fleming, Will. St. *Sirex gigas* in Co. Waterford. The Irish Naturalist, vol. 10 Dec. p. 255.

Forel, A. (1). Titel p. 302 sub No. 6 des vor. Bericht. Translated by A. P. Morse. I. *Psyche*, vol. 9 No. 304 p. 231—239. — II. *ibid.* No. 305 p. 435—422. Extr. aus Riv. Sc. Biol. vol. 2 No. 3. — Ein Auszug aus der genannten Arbeit findet sich von Chr. Schröder, in: Allgem. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. No. 4 p. 62.

Bericht des Verf.'s an die belgische entomologische Gesellschaft über seine myrmekologische Reise in Nordamerika, auf welcher in Toronto (Canada), Worcester (Massachusetts), Morgenton, Black Mountain u. Faisons (alle drei in Nord Carolina) Station gemacht wurde. Interessant ist, dass die Ameisen in nördl. Amerika, bis auf seltene Ausnahmen, weder Kuppel- noch Mauer-Bauten oder

andere ausführen, während ihre Hügel allerwärts in Europa so häufig sind. Die Fauna steht der europäischen sehr nahe. Trotzdem leben die unsere *Lasius niger* etc. vertretenden Formen in unterirdischen verborgenen Nestern, die sich mit einem Krater nach oben öffnen, oder auch unter Steinen. *Formica exsectoides* baut als einzige Art des westl. Nordamerika regelmässig grosse, hohe, kuppelförmige Nester „die Ant Hills“. Dieselben öffnen sich an der Basis und Peripherie in Löchern, besitzen also keine von den ♂ angelegt. Wege wie bei *rufa*. Zuweilen baut auch *Form. fusca* var. *subsericea* u. *pallide-fusca* kleine Hügel. Die Bauten dienen nach des Verf. früheren Ausführungen zur Aufsammlung der Sonnenwärme für die Larven. In Amerika sind nun die Temperaturen des Winters und Sommers sehr extrem. Infolgedessen sind im Sommer die Hügel nicht nöthig u. im Winter fehlen sie, daher legen die Ameisen ihre Bauten tief an oder bauen im Schatten u. s. w. Der *Camponotus ligniperdus* Europas baut auch in Amerika seine Nester an nach Osten gerichteten Abhängen. Zahlreiche Parallelen der nordamerikanischen Ameisen-Fauna mit der unsrigen.

- (2). Einige neue Ameisen aus Südbrasilien, Java, Natal und Mossamedes. Mittheil. Schweiz. entom. Ges. Bd. 10. Hft. 8. p. 297—310, 11 n. sp. — Abstr.: Journ. Roy. Micr. Soc. London, 1901 P. 3 p. 273.
- (3). Formiciden aus dem Bismarck-Archipel, auf Grundlage des von Prof. Dr. F. Dahl gesammelten Materials bearbeitet. Mittheil. Zool. Mus. Berlin, 2. Bd. 1. Hft. Tit., Vorw. p. 1, 3; p. 5—37.

Während aus Australien (spec. Queensland), den Sandwich-, Viti-, Ellice- und Tonga-Inseln relativ viele Ameisen bekannt sind, war bisher der Bismarck-Archipel in dieser Richtung wenig erforscht. Seine Lage zwischen Neu-Guinea u. den ozeanischen Inseln lässt es begreiflich erscheinen, dass seine Fauna aus einem Gemisch der ozean. Fauna mit Neu-Guinea-Formen besteht. Einige Formen stimmen mit Formen aus Hawaii völlig überein. Dahl hat eine Reihe neuer Arten erbeutet, von welchen abzuwarten bleibt, ob sie Lokal-Arten oder Varietäten sind, oder aber in den benachbart. Inseln, vor allem in Neu-Guinea auch vorkommen. — Die erbeuteten Formen (Arten, Varr., Rassen etc.) vertheilen sich folgendermaassen: I. Subf. **Ponerinae** Lep. 1. Sippe *Amblyoponii*: *Myopopone* (1), *Prionopelta* (1). 2. Sippe *Odontomachii*: *Odontomachus* (3), *Anochetus* (1 + 1 n.). 3. Sippe *Ponerii*: *Ectatomma* [Untergatt. *Rhytidoponera*] (2), *Diacamma* (1), *Leptogenys* [Unterg. *Leptogenys*] (1 n.), [Unterg. *Lobopelta*] (1 n. var.), *Ponera* [Untergatt. *Ponera*] (2 + 2 n.), [Unterg. *Ectomomyrmex*] (1 n.), *Platythyrea* (1). — II. Subfam. **Dorylinae** Shuck. In der Dahl'schen Sammlung nicht vertreten. — III. Subfam. **Myrmicinae** Lep. 1. Sippe *Dacetii*: *Strumigenys* (2 + 1 n. var.), 2. Sippe *Tetramorii*: *Triglyphothrix* (1), *Tetramorium* [Untergatt. *Tetramorium*] (5), [Unterg. *Xiphomyrmex*] (1 n.). 3. Sippe *Myrmicii*: *Vollenhovia* (1), *Monomorium*

(3), Cardiocondyla (2), Podomyrma (1), Pheidole (3 + 1 n. st.), Pheidologeton (1), Solenopsis (1 + 1 n.). 4. Sippe Crematogastrii: Crematogaster (2 n.). — IV. Subfam. **Dolichoderinae** Forel: Dolichoderus (1), Tapinoma (1), Technomyrmex (1), Bothriomyrmex (1?), Turneria (1 n.), Iridomyrmex ([2 + 3 n.] sp. + 1 var. + [1 + 1 n. (von Mackay in Anm.)] rac. + 3 n. st.). — V. Subfam. **Camponotidae** Forel: 1. Sippe Plagiolepidii: Plagiolepis (1 + 1 n.), Acropyga (1). 2. Sippe mit Oecophylla (1). 3. Sippe Formiciei: Pseudolasius (1 + 1 n.), Prenolepis (1 + 1 n. [in Anm. von New S. Wales, Austral.] sp. + 3 n. st. + 1 rac. (n.?) in Anm.). 4. Sippe Camponotii: Opisthopsis (1 n.), Camponotus ([3 + 1 n.] sp. + 1 var. + 3 rac.), Polyrhachis ([11 + 7 n.] sp. + [2 + 4 n.] var. + 2 rac. + 1 n. st.).

Schlussbetrachtung: Vom Bismarckarchipel hat Dahl 90 verschiedene Ameisenarten gesammelt, dar. ist eine (Bothriomyrmex) nicht näher bestimmbar. Dazu kommen 6 Rassen oder Subsp. u. 2 Varr. einiger jener Spp. Viele andere Spp. sind überhaupt nur durch Lokalrassen oder Lokalvarietäten oder durch solche Rassen oder Varr. vertreten, die bereits den benachbarten Faunen (Neu-Guinea, ocean. Inseln oder Australien) eigen sind. Ferner wurden 7 Arten auf Celebes, in Singapore oder auf dem Dampfschiff gesammelt. — Bezügl. der faunist. Verbreitung der Formen kann genannte Sammlung folgenderm. eingetheilt werden (von unbedeutenden Varr. abgesehen):

	Arten	Rassen	Varr.
Dem Bismarck-Archipel eigen:	25	7	3
Mit Neu-Guinea allein gemeinsam:	8	5	3
Mit Neu-Guinea u. den Molukken gemeinsam:	10	3	—
Mit d. Indo-malesisch. Fauna (excl. Molukk.) gemeinsam:	3	1	—
Mit Nord-Australien allein gemeinsam:	1	1	—
Mit Australien (Queensland) u. Neu-Guinea gemeinsam:	—	1	—
Mit Neu-Guinea, den Molukken u. der Indo-malesischen Fauna gemeinsam:	7	—	—
Mit Neu-Guinea, den Molukken u. den Salomons-Inseln gemeinsam:	1	—	—
Mit Neu-Guinea, den Molukken, der Indo-malesischen Fauna u. Australien gemeinsam:	1	—	—
Mit Neu-Guinea u. Neu-Caledonien gemeinsam:	1	—	—
Mit Indien u. den Sandwich-Inseln gemeinsam:	1	—	—
Mit Neu-Guinea u. den Oceanischen Inseln gemeinsam:	1	—	—
Mit den Tonga- oder den Sandwich-Inseln gemeinsam:	2	—	2
Mit der Insel Aru gemeinsam:	1	—	—
Kosmopolitisch in den Tropen:	7	1	—

Daraus darf nicht geschlossen werden, dass genannte Formen eine wirklich nur so enge Verbreitung haben. Jährlich erweitert sich die Kenntniss des Verbreitungsbezirks durch neue Entdeckungen. — Die Gattungen sind so zu sagen durchweg mit Neu-Guinea

gemeinschaftlich, nur eine bisher rein australisch. Nachträgliche Bemerk. Der Wald und u. seine Pflanzen wären ergiebiger gewesen als das Grasland. Beispiele hierfür: bei Ralum am Fusse eines Stammes unter anderen allein 3 n. sp. u. 1 n. st. etc.

Emery hat viele Stücke der Dahl'schen Sammlung mit den Biro'schen Typen aus Neu-Guinea verglichen, wodurch die Bestimmung sehr korrekt wurde.

- (4). Die psychischen Fähigkeiten der Ameisen und einiger anderer Insekten. Mit Anhang über die Eigenthümlichkeiten des Geruchsinnens bei jenen Thieren. Verlag Ernst Reinhardt. München. 1901. Gr. 8^o. 58 p. mit 1 Taf. M. 1,50.

Der ausgezeichnete Psychiater setzt sich zunächst darin mit allen denen auseinander, die mehr oder weniger glücklich über „Instinkt oder Ueberlegung“ geschrieben haben. Es bespricht dann mit genauer Sachkenntniss die den Insekten eigenen Sinne: Gesicht, Geruch, Geschmack u. Tastsinn (Gehörsinn ist zweifelhaft) u. geht dann ein auf das Gebiet der Erkenntniss, das Gebiet des Willens, das Gebiet des Gefühls u. die psychischen Wechselbeziehungen und kommt schliesslich zu folgenden Thesen:

1. Vom naturwissenschaftlichen Standpunkt aus muss an der psychophysiologischen Identitätshypothese (Monismus) im Gegensatz zum Dualismus festgehalten werden, weil sie allein mit den That-sachen u. speziell mit dem Gesetz der Erhaltung der Energie übereinstimmt. Unsere Seele muss zugleich von innen direkt u. von aussen mittelst der Biologie u. in den Bedingungen ihres Zustandekommens, indirekt studirt werden. So giebt es eine vergleichende Psychologie der Anderen neben der eigenen u. auf diesem Wege gelangt man zur Thierpsychologie. Der Analogieschluss, vorsichtig angewendet, ist hierbei unerlässlich u. zulässig.

2. Die Sinne der Insekten sind die unsrigen. Nur der Gehörsinn bleibt noch zweifelhaft bezüglich Sitz u. Deutung. Ein sechster Sinn ist bisher nicht nachzuweisen u. ein eigener Richtungs- oder Orientierungssinn fehlt bestimmt. Der Vestibularapparat der Wirbelthiere ist nur Gleichgewichtssinn u. giebt innere Beschleunigungsempfindungen, aber orientirt nicht im Raum ausserhalb des Körpers. Dagegen bieten Gesichts- u. Geruchssinn der Insekten Varietäten der Leistungsart u. der spezifischen Energien dar (Sehen des Ultravioletts, Funktionsweise des fazettirten Auges, topochemischer Antennen-Sinn u. Kontaktgeruch).

3. Reflexe, Instinkte u. plastische, individuelle anpassungsfähige centrale Nerventhätigkeiten gehen allmählich ineinander über. Höhere Complicationen jener centralen oder psychischen Funktionen entsprechen complicirteren Apparaten übergeordneter Neuromen-complexe (Grosshirne).

4. Ohne gegensätzlich zu werden, complicirt sich die centrale Nerventhätigkeit bei verschiedenen Thiergruppen und Arten auf zwei Weisen: a) durch Vererbung (Zuchtwahl u. A. m.) complicirter

zweckmässiger Automatismen oder Instinkte; b) durch innere mannigfaltigere Möglichkeiten plastischer, individuell anpassbarer Thätigkeiten, verbunden mit der Fähigkeit individuelle secundäre Automatismen (Gewohnheiten) allmählich zu bilden. Der zweite Modus erfordert viel mehr Nerven-elemente. Durch erbliche Anlagen (unfertige Instinkte) mehr oder weniger gefestigter Art, bietet er Uebergänge zum ersten Modus.

5. Bei socialen Insekten lässt sich das Verhältniss entwickelter psychischer Fähigkeiten zur Grösse des Gehirns direkt beobachten.

6. Bei demselben kann man Gedächtniss, Associationen von Sinnesbildern, Wahrnehmungen, Aufmerksamkeit, Gewohnheiten, einfaches Schlussvermögen aus Analogien, Benutzung von individuellen Erfahrungen, somit deutliche, wenn auch geringe individuelle plastische Ueberlegungen oder Anpassungen nachweisen.

7. Auch eine entsprechende, einfachere Form des Willens, d. h. Durchführung individueller Entschlüsse in längerer zeitlicher Folge, durch verschiedene Instinktketten hindurch; ferner verschiedene Arten von Lust- und Unlustaffekten, sowie Wechselwirkungen und Antagonismen zwischen jenen diversen psychischen Kräften sind nachweisbar.

8. Bei den Handlungen der Insekten tritt die Thätigkeit der Aufmerksamkeit einseitig u. stark in den Vordergrund. Sie engt ihr Gebiet stark ein und macht das Thier vorübergehend blind (unaufmerksam) für andere Sinneseindrücke.

So sehr also die Ausbildung und die Anpassungen der automatischen u. der plastischen, centralen Neurokymthätigkeit bei verschiedenen Thiergehirnen verschieden ist, so sicher lassen sich dennoch gewisse allgemein gültige Erscheinungsreihen u. ihre Grundgesetze erkennen.

Die 1877 von Forel aufgestellte These: Sämmtliche Eigenschaften der menschlichen Seele können aus Eigenschaften der Seele höherer Thiere abgeleitet werden, wird jetzt dahin erweitert: Und sämmtliche Seeleneigenschaften höherer Thiere lassen sich aus denjenigen niederer Thiere ableiten. D. h. die Evolutionstheorie gilt auf dem psychischen Gebiete wie auf allen anderen Gebieten des organischen Lebens. — Ein Anhang handelt über die Eigenthümlichkeiten des Geruchsinns bei den Insekten. Forel bespricht darin die psychologische Qualität des Antennengeruches u. zeigt, wie die Ameisen mittelst des „topochemischen Geruchssinnes“ ihren Weg finden. Bethe wird nach den Forel'schen Ausführungen vollständig kalt gestellt.

— (5). Formiciden des Naturhistorischen Museums zu Hamburg. Neue Calyptomyrmex-, Dacryon-, Podomyrma- und Echinopla-Arten. Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. 18. Jhg. 2. Beiht. p. (43) 45—82. — Apart: Hamburg, Lucas Gräfe & Sillem in Comm., 1901. 8°. M. —, 60.

Bearbeitung des Formiciden-Materials des Hamburger Museums. Präparation der Ameisen am besten: Niemals spessen; sorgfältiges

Aufkleben am Rande eines breiten Kartonstückchens, damit das wichtige Mittelstück des schmalen Thorax der Arbeiter nicht zerstört wird, was selbst durch feinste Nadeln und Silberdraht geschieht. Die vorliegende Arbeit enthält ausser denj. Spp., deren Fundorte von besonderem Interesse sind, 23 neue Spp., 21 neue Rass. oder Subsp. u. 12 neue Varr., davon sind 11 neue Spp., 19 n. Rass. u. 9 neue Varr. aus dem Mus. Hamb., 11 n. Spp., 2 n. Rass. u. 3 n. Varr. aus Forel's Samml., dazu 1 nom. nov. — Die behandelten Formen vertheilen sich folgendermassen:

I. Subf. Ponerinae Lep.: *Pachycondyla* (2), *Platythyrea* (1), *Ponera* (1 + 1 n. var.), *Diacamma* (1), *Leptogenys* (3), *Belonopelta* (1), *Odontomachus* (1). — II. Subf. Dorylinae: *Dorylus* (5), *Eciton* ([7 + 2 n.] sp. + 2 n. st.). — III. Subf. Myrmicinae: *Atta* ([2 + 1?] sp. + 1 n. st.), *Cryptocerus* (2), *Procryptocerus* (1), *Calyptomymex*. Besch. d. ♂ (2 n. sp.), *Tetramorium* (1), *Triglyphothrix* (1 n. st.), *Sima* (1 + 1 n.), *Pseudomyrma* (1), *Podomyrma* (7 n. sp. + 1 n. var. + 1 n. st.), *Dacryon* (1 n.), *Stenamamma* (3 + 1 n. var.), *Megalomyrma* (1), *Myrmica* (1), *Tranopelta* (1 n.), *Myrmicaria* (4), *Pheidole* (1 + 2 n. st. + 1 n. var. + 1 nom. nov.), *Cremastogaster* (2 + 2 n. st.). — IV. Subf. Dolichoderinae: *Dolichoderus* (1 n. var.), *Azteca* (3), *Technomyrma* (1). — V. Subf. Camponotinae: *Prenolepis* (1 + 1 n. var.), *Formica* (2 + 1 n. var.), *Lasius* (3), *Myrmecocystes* (1 n. st.), *Camponotus* ([28 + 4 n.] Form. [darunter diverse von maculatus] + 7 n. st. + 2 n. var. + 1 n. [?] r.), *Echinopla* ([1 + 4 n.] sp. + 1 n. var.), *Polyrhachis* (5 + 1 n. st. + 2 n. var.). — Anhang: Ameisen, die mit exotischen Pflanzen nach der Station für Pflanzenschutz in Hamburg eingeschleppt wurden. *Pheidole* ([1 + 1 n.] sp. + 2 n. st.), *Myrmica* (1 r. + 1 n. st.), *Prenolepis* (1 n. var.), *Ectatomma* (1), *Odontomachus* (1), *Pheidole* (1), *Iridomyrma* (1), *Monomorium* (2), *Leptogenys* (1), *Stenamamma* (2), *Lasius* (1), *Pheidole* (1).

— (6). Critique des expériences faites dès 1887 avec quelques nouvelles expériences. Troisième partie. *Revist. Biol. gen.* III p. 7—62. — Quatrième partie, t. c. p. 241—282. — Cinquième partie, t. c. p. 401—460.

— (7). Sketch of the habits of North American ants. I. *Psyche* vol. IX p. 231—238. — II. t. c. p. 243—245.

I. Ein Auszug aus Forel p. 301 sub No. 1 des vor. Berichts.

— (8). Quelques espèces de Ponerinae (avec un nouveau sous-genre et une espèce nouvelle d'*Eciton*). *Revue Suisse Zool.* T. 9. fasc. 3 p. 325—353. — 16 n. sp., n. subg.: *Hagensia*.

— (9). Fourmis mexicaines recoltées par M. Prof. W. M. Wheeler. *Ann. Soc. Entom. Belg.* T. 45. IV. p. 123—136.

41 Sp., dar. 8 n.

Wheeler hat insgesamt gesammelt 41 versch. Formen, von denen 8 Spp., 2 Rassen u. 4 Varr. neu sind u. diese 41 Formen zeigen fast alle die Charaktere der neotropischen Fauna.

- (10). A propos de la classification des Fourmis. Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45. IV. p. 136—141. — Polemik gegen Emery (siehe dort).
- (11). Variétés myrmécologiques. Avec 2 figs. Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45. XI. p. 334—382. — 22 n. sp., n. g.: *Emeryella*; n. subg.: *Eumecopone*, *Mictoponera* u. *Oxygyne*.

A. Formes néotropiques et néarctiques (p. 334—371): *Emeryella* n. g. (1 n.), *Neoponera* subg. *Eumecopone* n. subg. (1 n.), *Pachycondyla* (1 n. var.), *Atta* (1 n. st.), *Cryptocerus* (1 n. var.), *Procryptocerus* (1 n.), *Strumigenys* (1 n. var.), *Pogonomyrmex* (1 n.), *Macromischa* (1 n.), *Pseudomyrma* (1 n. var. + 1 n. st.), *Solenopsis* (2 + 1 n. + 2 n. st.), *Stenamma* subg. *Stenamma* s. str. (1 + [1 + 1 n.] var. + 1 n. st.), *Pheidole* ([13 + 7 n.] sp. + 7 n. var. + 3 r. + 4 n. st.). *Dolichoderinae* et *Camponotinae*: *Azteca* (1 var.), *Prenolepis* (1), *Lasius* (1 n.), *Camponotus* ([2 + 1 n.] sp. + 1 var. + 1 nom. nov.). — B. Formes du Japon (p. 371—372): *Prenolepis* (1), *Pristomyrmex*, *Myrmica* (1 sp. + 1 n. var.), *Leptothorax* (1 n. var.), *Cremastogaster* (1 n. var.). — C. Formes d'autres pays (p. 372—380): *Ectatomma* subg. *Mictogonera* (1 n.), *Leptanilla* (1 n.), *Vollenhovia* (1 n.), *Cremastogaster* (1 n.), subg. *Oxygyne* n. (1 n.), *Monomorium* (1 n.), *Polyrhachis* (1 n. st.), *Pheidole* (1), *Cardiocondyla* (1 r.), *Cataulacus* (1 n.), *Euponera* (1 n.). — D. Notice biologique: Nids des rameaux secs. Fourmilières polydomes. Mit Abb. (p. 380—382).

Früher beobachtete Fälle vom Nebeneinanderlaufen mehrerer Ameisenspezies leiteten, geschärft durch neue Beobachtungen im tropischen Amerika, den Verf. zur system. Untersuchung eines gefällten Nussbaumes, der im Innern ein schönes Nest von *Lasius fuliginosus* barg und dessen trockene Zweige 9 Nester von *Dolichoderus 4-punctatus*, 7 von *Leptothorax affinis* u. 2 von *Colobopsis truncata* mit Larven u. Nymphen in allen Stadien bargen. Verfasser zieht aus seinen Beobachtungen folgende Schlüsse:

1. Die 3 genannten Spp. nisten gewöhnlich in den trockenen u. hohlen Zweigen unserer Bäume, haupts. unserer Nussbäume, auf denen man sie überall laufen sieht;

2. Sie bilden eine echte myrmekologische Baumfauna unserer Länder (unzweifelhaft analog mit anderen, besonders den *Leptothorax*, *Camponotus marginatus* etc.), spezieller noch eine Fauna der Nussbäume u. ihre Nester sind häufig u. nicht, wie man früher annahm, sehr selten;

3. Die *Leptothorax affinis* leben darauf in gesonderten Nestern u. getrennten Ameisenhaufen, während die *Dolichoderus* für einen u. denselben Baum (im vorliegenden Falle wenigstens) einen einzigen polydomen Ameisenhaufen bilden.

Letzterer Fall erinnert an einen riesigen Baum der Savannen von Trinidad, der ebenfalls von einem u. demselben (polydomen?) Haufen von *Dolichoderus bidens* bewohnt wurde.

p. 382. Berichtigung zu einem Artikel Titel p. 301 sub No. 4 Binghami statt Binghamiri. Somit bestätigt sich die p. 445 letzt. Zeile des vor. Berichts vom Refer. ausgesprochene Vermutung.

— (13). *Fourmis termitophages, lestobiose, Atta tardigrada, sous-genres d'Euponera.* t. c. p. 389—398.

Unter den zusammengesetzten Nestern muss man unterscheiden: 1) solche, die zufällig zusammengesetzt sind, dafür Plesiobiose u. solche, die absichtlich neben einander errichtet sind, um die Brut zu morden u. sich davon zu nähren (Diebesameisen Wasmann's): Cleptobiose. Letzterer Ausdruck nach Forel, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 394 nicht exact. Er passt besser auf die Lebensweise der *Tapinoma*, *Dorymyrmex*, die infolge ihrer Beweglichkeit sich am Neste auf die Beute u. die Leiber grösserer Arten stürzen u. sie auf der Flucht rauben, wie echte „*acrobates voleurs*“. Ganz verschieden davon ist das Leben der *Solenopsis*, der *Carebara*, der *Aeromyrma*, unzweifelhaft auch der *Oligomyrmex*, der verschiedenen *Monomorium* u. s. w. gegenüber den Ameisen u. Termiten, die viel grösser sind als sie. Sie bilden eine biolog. Gruppe, die ein morphologisches Correlat bildet (grosser Geschlechtsdimorphismus u. ein „*vie hypogée*“ der Arbeiter). Hierfür ist ein besonderer Name nöthig, aber er muss genau bezeichnen, dass es sich um Raub u. nicht um Diebstahl handelt. Die Bezeichn. „*parasite-assassin*“, ist zwar bezeichnend genug, doch ist das Räuberleben einfacher gestaltet. Forel nennt es daher *Lestobiose*. Trotz ihrer Kleinheit sind die Ameisen sehr kriegerisch u. muthig, stürzen sich in grosser Zahl auf die grössere Art u. verzehren dessen Brut. — Die Bezeichnung *Xenobiose* (Wheeler) ist sehr gut. Sie entspricht der der *Myrmekophilie*. Aber *Dichothorax Pergandei* lebt nicht darnach. Der von Emery auf Grund einer Notiz von Pergande citierte Fall ist rein zufällig. Forel beobachtete beide Nester in Nordcarolina. Sie leben beide in unabhängigen Haufen, im Moose am Holz u. nahebei in der Erde, wie gewöhnl. *Leptothorax*. Die wunderbare Entdeckung Wheeler's über die Lebensweise von *Leptothorax Emersoni* (der als Gast bei *Myrmica scabrinodis* r. *brevinodis* lebt, auf den Kopf derselben klettert, sie am Epistom der Antennen so lange kitzelt, bis sie etwas von dem Honigsafte von sich giebt, dafür aber ihre Brut pflegt u. in einem besonderen Falle, von *Myrmica* isoliert, ihr sogar der Zutritt zu derselben verwehrt) enthüllt uns nach Forel einen neuen ganz speziellen Fall von *Xenobiose*, der einzig in seiner Art ist.

Was Wasmann Bundeskolonien genannt hat, d. h. der Zustand, in dem 2 Weibchen verschiedener Spp. sich zusammenthun u. eine gemischte Kolonie gründen, könnte man allgemein = *Allometrobiose* oder „*Symbiose sociale par allométrie*“ nennen. Sehr häufig ist er nur Zufall. Aber bei *Strongylognathus* wird er instinktmässig u. adaptiv gesucht von Seiten verschiedener Spp. dieser Gatt. mit *Tetramorium caespitum*. Es ist dies eine parasitische oder

wenigstens xenobiotische Allometrobiose. Die Bezeichnung Synclerobiose bezieht sich auf heterogene Fälle. Wheeler vereinigt unter Doulosis (esclavigisme) die Fälle von Polyergus, Formica u. Tomognathus. In allen diesen Fällen unterwirft sich eine Sp. der Macht der anderen u. arbeitet für sie. Uebrigens sind die Methoden u. Art der Symbiose sehr verschiedene.

III. *Atta tardigrada* u. IV. *Euponera* siehe im system. Theil.

- (14). Die psychischen Fähigkeiten der Ameisen und einiger anderer Insekten. Tagebl. V. Internat. Zool. Congr. No. 3 p. 5—6. Ausz. Zeitschr. f. Naturw. (Halle), 74. Bd. 1/2. Hft. p. 133—134.

Ein Auszug aus No. 4.

„Forel wendet sich gegen Bethe u. andere, welche aus den Insekten reine Reflexmaschinen machen wollen; er untersucht zunächst die psychischen Fähigkeiten der Thiere überhaupt, das Verhältniss des Bewusstseins zur Gehirnthätigkeit, die Sinnesqualitäten der Insekten u. die zwei Grundformen des psychophysiologischen Geschehens: Der Automatismus u. die „Plastizität“. Beispiele von psychischen Eigenschaften bei Ameisen, Bienen u. s. w. und insbesondere Nachweis ihres Gedächtnisses und Associationsvermögens.

Er tritt für die Identitätshypothese ein, stellt fest, dass die Sinne der Insekten die gleichen sind, wie die unserigen, immerhin mit einipen Modificationen der Eigenthümlichkeiten des Gesichts- und Geruchssinnes (Sehen des Ultraviolettes), Funktionsweise des fazettierten Auges (Topochemischer Antennensinn u. Kontaktgeruch). Reflexe, Instinkte u. plastische, individuell anpassbare Nerven-thätigkeiten gehen allmählich in einander über. Höheren Komplikationen jener zentralen Funktionen entsprechen komplizierten Apparaten übergeordnete Neuronenkomplexe (Grosshirn). Bei sozialen Insekten lässt sich das Verhältniss entwickelterer psychischer Fähigkeiten zur Grösse des Gehirns direkt beobachten.

Bei den letzteren kann man Gedächtniss, Association von Sinnesbildern, Wahrnehmungen, Aufmerksamkeit, Gewohnheiten, einfaches Schlussvermögen aus Analogien, Benutzung von individuellen Erfahrungen, somit deutliche, wenn auch geringe individuelle plastische Ueberlegungen oder Anpassungen nachweisen. Auch einfachere Formen des Willens (Durchführung von Entschlüssen), ferner verschiedene Arten von Lust- und Unlustaffekten, sowie Wechselwirkungen und Antagonismen zwischen jenen diversen psychischen Kräften sind nachweisbar.

Endlich tritt die Thätigkeit der Aufmerksamkeit einseitig und stark in den Vordergrund bei den Handlungen der Insekten. Sie engt ihr Gebiet stark ein und macht das Thier vorübergehend blind (unaufmerksam) für andere Sinnesindrücke“ (5. internat. Zool. Kongr., Berlin 1901).

- Fox, William, J.** (1). Two new Bembicine Wasps. Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 No. 2 p. 83—84. — *Bembex Beutenmülleri*, *Steniolia sulfurea*.
- (2). 1900. (The Proper Name of the Honey Bee). Entom. News (Philad.) vol. 12 No. 9 p. 285.
- (3). The Proper Names of certain Genera of Hymenoptera. t. c. p. 267—269.
- Frey-Gessner, E.** Bemerkungen über die Imhoff'schen Apiden-Arten (Oken's Isis). Mittheil. Schweiz. entom. Ges. 10. Bd. 8. Hft. p. 311—332.
- Frič (Fritsch) A.** Die thierischen Reste der Peruczer Schichten. Arch. naturw. Landesdurchf. Böhm. XI. 1901 p. 163—180. — Bringt auch Hymenopteren. — Referate: Meunier, F. Allgem. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 347 u. P. Speiser, op. cit. 7. Bd. p. 541.
- Friese, H.** (1). Die Bienen Europas. Theil VI. Solitäre Apiden, Panurginae, Melittinae, Xylocopinae. Innsbruck. 1901. 8°. 284 p.
- (2). Monographie der Bienengattung *Centris* (s. lat.) Ann. k. k. naturh. Hofmus. Wien, 15. Bd. 1900. No. 3/4 p. 237—350. Wurde bereits im system. Theil des vor. Jahrganges p. 367—369 berücksichtigt. — 196 Sp., dar. 3 n., 11 n. varr., sowie die n. subg.: *Melanocentris*, *Rhodocentris*, *Cyanocentris* u. *Poecilocentris*.
- (3). Neue afrikanische *Megachile*-Arten. Zeitschr. f. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 2. Hft. p. 69—72. — 5 n. sp.
- (4). Zur Synonymie der Apiden. I. t. c. 4. Hft. p. 224. *Anthidium binghami* Friese u. *Megachile steloides* Bingham nebst Beschr. d. ♀ des letzt.
- (5). Neue Arten der Bienengattung *Trigona* Jur. t. c. 5. Hft. p. 265—271.
- 11 Formen, darunter 9 neue und zwar 9 n. sp. u. 2 n. var.
- Frionnet, C.** La rareté des *Bombus* en Suisse Feuille jaun. Natural. (4) 32. Ann. No. 373 p. 23.
- Froggatt, Walt. W.** The Pear and Cherry Slug (*Eriocampa limacina* Retz.), generally known as *Selandria cerasi*, with Notes on Australian Sawflies. With 4 pls. Agric. Gaz. N. S. Wales, vol. 12 P. 9 p. 1063—1071, 1072—1073.
- Gale, All.** (1). Bee Calendar. February. Agric. Gazette N. S. Wales, vol. 12 P. 2 p. 302. — March, *ibid.* P. 3 p. 378. — September. P. 9 p. 1164. — October P. 10 p. 1265. — November t. c. P. 11 p. 1436.
- (2). Bees and How to Manage Them. Agric. Gaz. N. S. Wales, vol. 12 P. 6 p. 698—701, P. 7 p. 840—845, P. 9 p. 1083—1085. — Honig. — Propolis; holen die Bienen aus dem Mais Honig? etc.
- (3). Apiculture. With 1 pl. Agric. Gaz. N. S. Wales, vol. 12, P. 1 (Federation Number) p. 213—217.

- (4). Foul-brood in Bees. Agric. Gazette N. S. Wales vol. 12 P. 2 p. 244—247; P. 3 p. 363—366; concluded P. 4 p. 498—501.
- (5). Bee-keeping for women. Agric. Gaz. N. S. Wales, vol. 12 P. 11 p. 1395—1397.
- Gardner, Willoughby.** (1). A List of the Hymenoptera-Aculeata so far as observed in the Counties of Lancashire and Cheshire, with Notes on the Habits of the Genera. Trans. L'pool Biol. Soc. vol. 15 p. 363—423 1 map. (61 p.).
- (2). Observations on Sphecodes. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) May, p. 127.
- (3). *Coelioxys mandibularis* Nyl., an Addition to the British List of Aculeates. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) July, p. 166—167.
- (4). *Coelioxys mandibularis* Nyl., at Wallasey. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) Nov. p. 279.
- Gasperini, Rikard.** Notizie sulla fauna imenotterologica dalmata. IV. Hymenoptera symphyta Gerst. Progr. Staats-Realschule Spalato 1900/1901 (19 p.).
- Ghigi, A.** Note biologiche e faunistiche. Bull. Soc. Entom. Ital. vol. 33 p. 183—196. — Behandelt Coleoptera u. Hymenoptera.
- Giard, A.** Un nouvel ennemi des Abeilles (*Phyllotocus macleayi* Fischer) [Coleopt.] Bull. Soc. Entom. France 1900 No. 8 p. 182—183.
- Hagen, B.** bespricht in einer Arbeit über seine Reise, in Globus 1901 No. 16—17, die Insekten am Vulkan Kaba auf Sumatra. Es werden darin auch einige Hym.: *Bombus*, *Xylocopa* u. s. w. erwähnt.
- Hall, W. Hessel.** Do Bees obtain Honey from Coca (Maize)? Agric. Gaz. N. S. Wales, vol. 12 P. 9 p. 1086—1091.
- Hamm, A. H.** *Andrena hattorfiana* Fab. and *Nomada armata* H.-Sch. near Oxford. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) Jan. p. 16.
- Astatus stigma* Panz. u. andere Hym. Aculeata an der Lincolnshire-Küste. (*Pompilus plumbeus* Fab., *gibbus* Fab., *Tachytes unicolor* Panz., *Megachile*, *Coelioxys*, *Tachytes*, *Oxybelus*, *Crabro*, *Andrena*, *Prosopis* etc.) Carr. p. 15—16.
- Handlirsch, Ant.** (1). Vier neue Arten der Hymenopteren-Gattung *Gorytes*. Mit 5 Fig. Verhdlgn. k. k. zool.-bot. Ges. Wien, 51. Bd. 5. Hft. p. 351—356.
- (2). Zur Kenntniss der afrikanischen Arten des Grabwespen-Genus *Gorytes*. Mit 8 Fig. im Texte. Verhdlgn. k. k. zool. bot. Ges. Wien, 51. Bd. 6. Hft. p. 426—429. — 1 n. sp.: *G. Braunsii*.
- (3). Neue Arten der Grabwespen-Gattung *Stizus*. Mit 4 Fig. im Texte. Verhdlgn. k. k. zool.-bot. Ges. Wien, 51. Bd. 7. Hft. p. 506—510. — 4 n. sp.

- (4). Ein neuer Nysson aus Oran. Verhdlgn. k. k. zool.-bot. Ges. Wien, 51. Bd. 7. Hft. p. 510. — Nysson Costae. Publik. No. 1—4 siehe im system. Theil.

Harrington, W. Hague. Note on Baeus. Canad. Entom. vol. 33. No. 12 p. 331—332.

von Heyden, Lucas. Contribuciones á la fauna ibérica. Mutillidae. Bol. Soc. Españ. Hist. Nat. T. 1 No. 5 Mayo p. 222—223. 16 Spp.

Hocking, J. H. Hymenoptera Aculeata of Suffolk. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) March p. 68—69.
Listen der erbeuteten Fossores, Diploptera u. Anthophila.

Hoffer, Ed. Tifel p. 364 des vorig. Berichts.

Hoffer schildert in einem Vortrage das Leben der Wespen Steiermarks. Wir müssen vor diesen Thieren hohe Achtung haben, denn sie sind ungemein geschickte Bildner u. Papiererzeuger, die bei all ihren Arbeiten einen Fleiss u. einen Scharfsinn bekunden, der den Menschen zu beschämen im Stande ist. Durch die Beobachtungen Hoffer's stellen sich viele in Fachkreisen über das Leben der Hornisse und anderer Wespen herrschende Anschauungen als Irrthümer heraus.

Höppner, H. (1). Beiträge zur Bienenfauna der Lüneburger Heide. Aus der Heimath — für die Heimath 1900 p. 9—22.

— (2). *Lophyrus pallidus* Klg. eine Kiefernblattwespe. t. c. p. 54—56.

— (3). Zur Biologie der Gattung *Prosopis*. t. c. p. 56—58.

— (4). Die Bienenfauna der Dünen und Weserabhänge zwischen Uesen und Baden. Beitr. z. nordwestdeutschen Volks- und Ldskde. 3. Hft. p. 231—255.

Sorgfältige Studie der Apiden-Fauna des etwa 2 $\frac{1}{2}$ Meilen südlich von Bremen am rechten Weserufer gelegenen Gebietes, das in eigenartiger Weise Marschland am Weserufer, Dünenbildung, Geestabhänge u. die „Badener Berge“ verbindet. Die Flora ist, wie auch die Bienenfauna, eine eigenthümliche. Charakt. für die Dünen sind: *Prosopis variegata* F., *Anthrena argentata* Gm., *A. nigriceps* K., *Colletes cuncularia* L., *C. marginata* Gm., *Panurgus calcaratus* Scop. (?), *Epeolus produstus* Thoms.; häufiger als anderorts: *Podalirius* Pz., *Panurgus banksianus* K., *Coelioxys conoidea* Illg. Die Reichhaltigkeit der Fauna an den Abhängen ist grösser, reicher u. mannigfaltiger, bedingt durch geschützte Lage, lehmig-sandigen Boden, Gebüsch u. s. w. Ill. weisst $\frac{2}{3}$ der bisher in Nordwestdeutschland beobachteten Bienen für jenes Gebiet nach. Faunistische u. biologische Notizen.

— (5). Weitere Beiträge zur Biologie nordwestdeutscher Hymenopteren. Allgem. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. No. 3 p. 33—35.

I. *Eucera difficilis* (Duf.) Perez. Biologische Beobachtungen des Verf. über dieselben bei Freissenbüttel.

- (6). Weitere Beiträge zur Biologie nordwestdeutscher Hymenopteren. Allgem. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. No. 9 p. 132—134.

II. Ueber das Vorkommen mehrerer *Bombus*-Arten in einem Neste.

Beobachtungen an Hummelnestern bei Freissenbüttel. H. findet auf Grund von Beobachtungen u. Versuchen: 1. In einem Hummelneste, welches einen Theil (den grösseren) seiner ♀ verloren hat u. dadurch geschwächt ist, werden ♀ einer anderen Art aufgenommen. 2. Geht ein Hummelnest durch irgend welchen Umstand zu Grunde, so suchen die überlebenden ♀ bei in der Nähe bauenden Hummelarten unterzukommen.

Als Nachtrag I folgt Abb. der Nestanlage von *Eucera difficilis* (Duf.) Perez.

- (7). Weitere Beiträge zur Biologie nordwestdeutscher Hymenopteren. III. *Prosopis Kriechbaumeri* Förster. Allgem. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. No. 19 p. 291—292.

Lebensweise derselben.

Howard, L. O. *Smyrna fig culture in the United States.* Yearb. U. S. Dep. Agric. 1900 p. 79—106.

Hubbard, H. G. [the late]. *Letters from the South-west.* Proc. Entom. Soc. Washington, vol. IV p. 361—364, 374—378, 381—383.

Handelt von Insekten in den Gängen der Vertebraten; p. 381; *Dasyllirion wheeleri*.

Husser, S. siehe Kuchenmüller, Max.

Il Naturaliste Siciliano. Palermo existiert seit 1899 nicht mehr.

Imker, der deutsche, aus Böhmen. Monatschrift für die Interessen der Bienenzucht. Redigirt von H. Bassler, Prag. 8°. Jahrgang XIV, 1901 (12 Nrn.) M. 4,—.

Imker, der schlesische. Organ des österreich-schlesischen Landesvereins für Bienenzucht. Redig. v. Albert Engelbrecher. 25—27. Jhg. (je 12 No.). Troppau, Verein, 1898—1900. 8°. — 25.: Tit., Inh. 148 p. — 26.: Tit., Inh. 148 p. — 27.: Tit., Inh. 148 p. — dito 28. Jhg. 1901. Tit., Inh. 144 p.

Imkerkalender, badischer, 1901. Von J. M. Roth, Karlsruhe, J. J. Reiff, 1900. 8°. (Mit Portr., 49 p. Tabellen u. weisses Papier p. 50—66). M. —,30.

Jacob, B. *La rareté des Bombus en Suisse.* — Question. Feuille jeun. Natural. 31. Ann. (4 S. 1. Ann.) No. 372 p. 293.

Janet, C. (1). Im Bericht für 1898 ist die Nummerirung der J.'schen Arbeiten von p. 359 ab um eine No. weiter zu verschieben.

- (2). *Recherches sur l'Anatomie de la fourmi et essai sur la constitution morphologique de la tete de l'Insecte.* Paris. 1900. 8°. 205 p. 13 pls.

Johnson, W. F. *Spathius exaratus* L., parasitic on *Anobium domesticum* Fourcr. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) Jan. p. 15.

Johnson, W. G. *Aphelinus fuscipennis* an important Parasite upon the San José Scale in Eastern United States. 31. Ann. Rep. Entom. Soc. Ontario, 1900, p. 103—104.

Kaiser. Siehe im systematischen Theil unter *Apis* (Mathematik der Bienenzelle).

Kieffer, J. J. (1). Remarque sur les Figitines avec description d'une nouvelle espèce. Bull. Soc. Entom. France, 1901 No. 3 p. 49—50. — *Diastrophus aphidivorus* zu *Trichiza* zu stellen. *Figites corsica* n. sp. u. *Reinhardi* n. sp.

— (2). Revision des Onychiinae D. T. t. c. No. 7 p. 157—161. — 10 n. sp., n. g.: *Lambertonia*, *Tavaresia*.

— (3). Remarque sur le genre *Xyalaspis* Hart. t. c. No. 7 p. 161.

— (4). Notes sur les Cynipides. t. c. No. 19 p. 343—344. — 3 n. sp. 1 n. g.: *Xyalophora*.

Onychia Marshalli n. sp., *O. Fonscolombei* var. *minima* n. var.; *Xyalophora* n. g., *Kleidotoma* (*Pentacrita*) *subtruncata* n. sp.; *Kl.* (*Heptameris*) *striata* n. sp. Ueber die system. Stell. einiger anderer Sp. aus den Gatt.: *Coptereucoila* (1), *Kleidotoma* (1), *Roptromeris* (1), *Trybliographa* u. *Cothonaspis*.

— (5). Revision des Eucelinae (Hymén., Cynip.). Feuille jeune. Natural. (4) 31. Ann. No. 366 p. 158—162 (Fin.) No. 367 p. 172—176.

— (6). Synopsis des Zoocécidies d'Europe. Ann. Soc. Entom. France vol. 70 p. 233—579.

Vorwort p. 233—237. Was ist ein Cecidium: Jede Deformation an einer Pflanze, die durch die Reaktion ders. auf den Eingriff eines Parasiten entsteht oder kurz: Jede Bildung von neuem Gewebe an einer Pflanze, das von einem Parasiten verursacht wird. Zoo- u. Phytocecidium. Zucht ders. zur Erlangung des Erregers etc. — Synopsis. Liste der Pflanzen (alphabetisch) mit ihren Erregern. Beschreib. der Gallen (p. 238—(384), (385)—553. Es kommen dabei verschiedene Thier- (und Insekten-) Ordnungen in Frage. — Supplément (p. 554—556): Chermes-Gallen. — Von Rudow (1891) unvollk. beschrieb. und desh. wenig brauchbare (29 Arten) von Gallen (p. 556—558). — Nachtrag (p. 558—561). Noch einige alphab. geordn. Pflanzen (p. 561) (mit ihren Cecidien). — Tabelle der Substrata der Cecidien: I. Cryptogamen, II. Phanerogamen, Dicotyl., III. Phan., Monocotyl. Tabelle der Cecidozoen (p. 562—579). Alphabetisch nebst Paginirung: 1°. Dipt.: 364 *Cecidomyd.* u. 55 *Musc.* (p. 562—568). — 2°. Hym.: 201 *Cynip.*, 44 *Tenthred.*, 15 *Chalcid.* (p. 568—571). — 3°. *Acarid.*: 106 *Phytopt.*, 2 *Tromb.* (p. 571—574). — 4°. *Homopt.*: 98 *Aphid.*, 35 *Psyll.*, 6 *Coccid.* (p. 574—576). — 5°. *Coleopt.*: 73 *Curcul.*, 1 *Longic.*, 1 *Scolyt.*, 1 *Buprest.* (p. 576—578). — 6°. *Lepidopt.*: 1 *Pyral.*, 20 *Tortr.*,

18 Tin., 2 Pteroph., 5 Alucit., 4 Sesiid. (p. 578—579). — 7^o. Helminth.: 11 Nematoden (p. 579). — 8^o. Heteropt.: 2 Tingit. (p. 579). — 9^o. Copepoda: 1 (p. 579). — 10^o. Rotifera: 1 (p. 579).

King, Geo. B. (1). A Check-List of the Massachusetts Formicidae with some Notes on the Species. Psyche, vol. 9 No. 306 p. 260—262.

— (2). Some new Records of the New England Formicidae. Psyche, vol. 9 No. 307 Nov. p. 270—271.

Kirby, W. F. Hymenoptera, Hemiptera, Heteroptera, Homoptera, Neuroptera and Orthoptera [in] Report on a collection . . . British Guiana. Trans. Linn. Soc. London, vol. VIII p. 71—73.

Klinge, J. Ueber die Honigbäume des Ostbalticums und die Beutkiefern Westpreussens. Schrift. der Naturf. Ges. Danzig, N. F. 10. Bd. Hft. 2/3 p. 215—234. — Refer. Naturw. Wochenschr. N. F. I. No. 31. 1901 p. 365—369. Mit 4 Abb. (Honigbäume darstellend).

Man versteht darunter Bäume in voller Vegetation, in welche man Bienenbaue in primitivster Form hineinsetzte, indem man einfach der Vorliebe der Bienen, ihren Bau in Baumhöhlungen anzulegen, Rechnung trug und so dem natürlichen Triebe dieser Thiere entgegenkam. Schilderung der Konstruktion dieser Bäume. Anlage der Höhlung. Schutzvorrichtungen gegen Bären. Demonstration der Vorrichtung zum Besteigen der Bäume. Honigbäume im Neuhausen'schen Gebiet (Westpreuss.). Die Ertragsfähigkeit eines alten Honigbaumes war im Vergleich zu den Bienenstöcken unserer Gärten eine weit grössere, das 10—20fache der jetzigen. Die damaligen Verhältnisse waren günstiger. Die fortschreitende Landwirtschaft und Kultur hat unserem Lande ein ganz anderes Gepräge aufgedrückt. Ausschlaggebend für die Abschaffung dieser Bäume war die direkte Gefahr für die Waldwirtschaft durch Brände. Die Honigbäume sind von entscheidender Veränderung der ursprünglichen Vegetationsformation des Ostbalticums gewesen, da die Heidevegetation eine durch Raubwirtschaft auf Kosten des Waldes hervorgegangene synanthrope Bildung ist, wie das unschwer bei allen ausgedehnten Heidecomplexen nachgewiesen werden kann. — Der 2. Theil der Abhandlung bespricht die Beutkiefern Westpreussens.

Kohl, F. F. (1). 1893. Hymenoptera (Stuhlmann, Ostafrika), Zool. Ergebn. Reise Ost-Afrikas, 2. Bd. (1) (13 p., 1 Taf.). — Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt.

— (2). Zur Kenntniss der Sandwespen (Gen. *Ammophila* Kirby) Ann. Hofmuseum Wien. 16. Bd. p. 142—164. Taf. VII, VIII. Siehe im systematischen Theil.

— (3). Zur Kenntniss der paläarktischen *Diodontus*-Arten. Mit 1 Taf. Verhdlgn. k. k. zool.-bot. Ges. 51. Bd. 2. Hft. p. 120—133—134. — 3 n. sp.

- (4). Ueber neue Arten der Hymenopteren-Gattung *Tachysphex*. Mit 1 Taf. t. c. 10. Hft. p. 777—784.
- (5). Titel sub No. 3 des vorig. Berichts. — Gynandromorphy in a Wasp [*Ammophila abbreviata* F.]. Abstr.: Journ. Roy. Micr. Soc. London, 1902 P. 1 p. 40.
- (6). Siehe Mocsáry & Szépligeti.
- Kokoujew, N.** (1). *Celor Semenovi* gen. et sp. nov. (Hymenopt. Ichneum.) *Horae Soc. Entom. Ross.* T. 35 No. 1/2 p. 210—216.
- (2). *Braconides nouveaux d'Australie. I. Helconides.* *Revue Russe d'Entom.* T. 1. No. 1/2. p. 13—17. — Ausz. von N. von Adelung, *Zool. Centralbl.* 9. Jhg. No. 4/5 p. 136. *Parahelcon* n. g. *Helconid.* n. g. mit 2 n. sp.: *Konowi u. australianus*.
- (3). *Gyroneuron mirum* gen. et sp. nov. (Hymenoptera, Braconidae) Cum 1 fig. *Revue Russe d'Entom.* T. 1 No. 6 p. 231—233. — Ausz. von N. v. Adelung, *Zool. Centralbl.* 9. Jhg. No. 4/5 p. 136.
- Konow, Fr. W.** (1). Die Gattung *Sunoxa* Cam. *Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipter.* 1. Jhg. 1. Hft. p. 17.
Wird (in ironischer Weise) als ein wahrscheinlich bekannter *Stromboceros* gedeutet.
- (2). Neue *Chalastogastra*-Arten. *Termész. Füzetek* 24. Bd. 1/2. Hft. p. 57—72.
21 n. sp., sowie die n. g.: *Stelidarge*, *Eriglenum*, *Canonias* u. *Haplostegus*.
- (3). Eine neue *Tenthredinide* aus Norwegen. *Zeitschr. f. Hym. u. Dipter.* 1. Jhg. 2. Hft. p. 92. — *Lygaeonematus strandi* n. sp.
- (4). Revision der *Nematiden*-Gattung *Pontania* Costa. t. c. 2. Hft. p. 81—91. — 7 n. sp. Schluss 3. Hft. p. 127—136. 22 sp., dar. 6 n.
- (5). Ueber einige zweifelhafte *Nematiden*. t. c. 5. Hft. p. 278. 1. *N. nigricornis* Zadd., 2. *N. Klugi* Gimmerthal, 3. *N. viridissimus* Möll.
- (6). Ueber „*Nematus suavis*“ Ruthe. t. c. 6. Hft. p. 366.
- (7). Systematische Zusammenstellung der bisher bekannt gewordenen *Chalastogastra* (Hymenopterorum subordo tertius). *Teschendorf bei Stargard, Mecklbg., Selbstverl. des Verf.'s* 1901. 8°. (80 p.). Anhang zur *Zeitschr. f. system. Hymenopter. u. Dipter.*: 1. Hft. p. 33 [1]—48 [16]. — 2. Hft. p. 97—112 [auch p. 17—32]. — 3. Hft. p. 161—176 [p. 33—48]. — 4. Hft. p. 225—240 [p. 49—64]. — 5. Hft. p. 289—304 [p. 65—80]. — Forts. folgt.
- Koschevnikov, G.** Titel p. 308 des vorigen Berichts, Ausz. von K. Escherich, *Allgem. Zeitschr. f. Entom.* 6. Bd. No. 14/15 p. 232.

Kowalevsky, Alexander (geboren 7./12. Novemb. 1840, gestorben 9./12. Novemb. 1901 an den Folgen einer Apoplexie).

Kraepelin, Karl. Ueber die durch den Schiffsverkehr in Hamburg eingeschleppten Thiere. Jahrb. Hamb. wiss. Anst. 18. Bd. 2. Beihft. p. 185—209.

Die Hymenopt. behandeln p. 193—194. — Apidae (No. 132—135). — Vespidae (No. 136—137). — Formicidae (No. 138—167). — Chalcididae (No. 168—169). — Proctotrupidae (No. 170—173). — Braconidae (No. 174—178). — Evaniidae: Evania (N. 180). — Siricidae (No. 181—184).

Kriechbaumer, J. (1). (Titel p. 308 sub No. 1 des vor. Berichts):

Liste p. 97—99. *Acanthobracon* n. g. (1 n.), *Bracon* (1 n.), *Chrysis* (1), *Pepsis* (3 + 1 n. var.), *Priocnemis* (1 n.), *Polistes* (5), *Synoeca* (1), *Polybia* (6), *Zethus* (1 n.), *Odynerus* (1 n.), *Nectarinia* (1), *Trigona* (3), *Tetrapedia* (1), *Tetralonia* (1), *Coelioxys* (1), *Eulema* (1), *Bombus* (2), *Xylocopa* (2 + 1 n.). — Besch. d. n. sp. p. 99—107.

— (2). Bemerkungen über Ophioniden. Zeitschr. f. system. Hymenopt. u. Dipt. 1. Jhg. 1. Hft. p. 18—24. Forts. 2. Hft. p. 73—79 [3 n. sp.]. — Forts. u. Schluss 3. Hft. p. 152—155
2 n. sp.

1. Hft. p. 18—24.

Weitere u. engere Auffassung des Begriffs: „Ophioniden.“ Die Weitere versteht darunter jene echte Schlupfwespen, die sich durch einen gestielten u. gegen das Ende zusammengedrückten Hinterleib auszeichnen (die erst. 8 Fam. der Foerster'schen Synopsis). — Engere Fassung: Ophion im Gravenhorst'schen Sinne, die den 3 Gatt. Ophion (5), *Allocamptus* (7) u. *Eremotylus* (8) der Synopsis entspricht. *Parabates* (6) macht Schwierigkeiten, wahrscheinlich ist darunter die *Hellwigia obscura* Gr. zu verstehen. Bemerk. zu *H. elegans* u. *obscura*. Von den Unterscheidungsmerkmalen der Gravenhorst'schen Ophionen hat Foerster wohl das passendste ausgewählt um für eine weitere systematische Gliederung eine sichere Grundlage zu schaffen, indem er die Form der Diskokubitalader in erster Linie berücksichtigte u. zunächst 2 Gruppen bildete, deren erste Ophion ist mit: Diskokubitalader winklig gebrochen, demgegenüber Disk. nicht winklig gebrochen (genau genommen nicht zutreffend). Mangel an Sorgfalt in der Bearb. der Schlupfwespen in d. Biol. Centr. Amer. von Cameron (zahlr. Fehler). Bestimmungstab. für die deutsch. Ophionen (p. 22: Ophion, *Camptoneura*, *Cymatoneura*, *Henicospilus* u. *Dispilus*). — Die Gatt. *Stauropoctonus* Brauns (p. 22—24). — Forts. p. 73 sq.: Ophion *inflexus* Rtzb., *Tipulophion* m., nov. gen. *Ophionidarum*, *gigas* n. sp., *Cymatoneura* *Algoensis* m. ♀, *C. Iku-thana* m. ♀ ♂.

3. Hft. p. 152—155. Schluss. *Eremotylus* *Druryi* m., *E. tenuigena* m., *Dispilus* *Braunsii* m.

— (3). Weitere Bemerkungen über *Scolobates italicus*. t. c. 2. Hft. p. 93—96.

— (4). Ueber die Gattungen der von Tosquinet in seinen *Ichneumonides d'Afrique* beschriebenen Ophion-Arten. t. c. 3. Hft. p. 155—156.

Tosquinet's fleissige Arbeit in *Mém. Soc. Ent. Belg.* (1896) würde noch höheren Werth besitzen, wenn der Autor durch Bestimmungstabellen unter Verwendung der auffallendsten, wichtigsten u. sichersten Merkmale der Gatt. u. Art. oder durch kurze, selbe besonders hervorhebende Bemerk. die Bestimm. der beschrieb. Thiere erleichtert hätte. Erläuterungen hierzu.

— (5). *Ichneumonologica varia*. t. c. 5. Hft. p. 243—251. — 4 Sp. Besprechung folg. Ichn.-Formen. 1. Ueber den *Ichneumon semirufus* auct. (p. 243—246). — 2. Eine vermuthliche Varietät des *Ichn. quaesitorius* ♂ (var. *subfasciatus* m.) (p. 246—248). — Ueber den *Ichn. leucomelas* Gm. Wsm. — 4. Ein ♂ des *Ichn. albicollis* mit weissem Fühlersattel. — 5. Ueber den *Ichn. subannulatus*.

— (6). Neue Ichneumoniden. t. c. 5. Hft. p. 252—255.

Poecilocryptus n. g. mit *nigrosignatus* n. sp., *Mesostenus albovinctus* n. sp.

— (7). Ist „*tenuigena*“ eine sprachliche unmögliche Bildung u. durch *tenuigenis* zu ersetzen? t. c. p. 224 u. Ist „*tenuigena*“ eine sprachlich unmögliche Bildung? t. c. p. 256.

Konow tadelt in einer Anmerk. zur Beschr. des neuen *Eremotylus* die Bildung des Sp.-Namens: *tenuigena*, weil sie eine sprachl. Unmöglichkeit sei. Es entspinnt sich daraus eine Diskussion (p. 152, 224, 256) wobei jeder Autor an seiner Meinung festhält.

Krieger, Rich. (1). Ueber die Ichneumoniden-Gattung *Certonotus* Kriechb. Mit 1 Taf. *Zeitschr. f. system. Hymenopt. u. Dipt.* 1. Jhg. 3. Hft. p. 113—126. — 4 n. sp.

— (2). Bemerkung zur Nomenklatur des Geäders im Hinterflügel der Ichneumoniden. t. c. 4. Hft. p. 184.

Berichtigungen zu einem Artikel Kriechbaumer's: „Offenbare Unrichtigkeiten etc.“ (cf. vor. Bericht p. 309 sub No. 6.) Es ist Thomson nicht eingefallen, die Ausdrücke *ante-* u. *postfurcalis* in diesem Sinne zu gebrauchen. Er sagt, wo er sie erklärt (auf deutsch): „Aber von grösserer Bedeutung ist seine Lage im Verhältniss zur Gabelung des *Brachiums* (das Gesperrete ist von Krieger) und setzt dann die Bedeutung von n. tr. *postfurcalis*, *oppositus* u. *ante-furcalis* näher auseinander.“

Kuchenmüller, Max u. S. Husser. *Praktisches Handbuch für Bienenzüchter*. 3. umgearb. Aufl. Karlsruhe. J. J. Reiff, 1901. 8°. 64 p. M. —, 70.

Kunachowitsch, A. F. *Bienen und Bienenzucht*. (Russisch). St. Petersburg. 1900. 8°. 227 p. m. 76 Textabbildgn.

Lagerheim, G. Titel p. 309 des vorig. Berichts. Ausz. von F. Ludwig, *Allgem. Zeitschr. f. Entom.* 6. Bd. No. 13 p. 203.

Laloy, L. Instinct et intelligence chez les insectes. Le Naturaliste, 1901 p. 24—26.

Die am höchsten stehenden Insekten, die gesellig lebenden Bienen, Ameisen u. Termiten, führen Thätigkeiten aus, die nicht anders als durch intellectuelle Begabung zu erklären sind. Beispiele. Wenn man die psychischen Fähigkeiten der Insekten untersucht, muss man die rein instinktiven Handlungen von den mehr oder weniger intellectuellen sorgfältig trennen. Unter den ersteren findet sich eine ganze Reihe, die, falls sie auf Nachdenken beruhen, eine Intelligenz erforderten, die der des Menschen zum mindesten gleichgestellt werden müsste. Dazu gehört bei den Hymenopteren der Bau der Nester, sowie das Aufsuchen von Nährstoffen für die Jungen. Beispiele. In allen solchen Fällen kann von einem zielbewussten Handeln nicht die Rede sein. Ein von Blütensaft lebendes Thier müsste z. B. folgendes wissen: 1. Dass seine Larve zum Leben animalischer Kost bedarf, 2. dass dieselbe eine lebende Beute von bestimmter Art nöthig hat, 3. dass diese Beute am besten sich hält, wenn sie durch einen Stich in's Nervensystem paralytisch wird. Dasselbe müsste kennen 4. die Lage der Ganglien, die bei den versch. Thieren eine andere ist, 5. den besten Ort für die Eiablage, wo die Larve am wenigsten von Räubern belästigt wird und müsste eine Reihe anatomischer Kenntnisse sammeln u. s. w. — Würden solche Handlungen vom Verstand geleitet, so müsste dieser ausserordentlich hoch entwickelt sein. — Nun beobachten wir aber folgendes. Je sicherer ein Insekt bei den angeführten Aktionen auftritt, desto unfähiger zeigt es sich, zu handeln, wenn die gewöhnliche Reihenfolge seiner Thätigkeit durch einen gewaltsamen Eingriff von aussen gestört wird. — Aus den citirten Beispielen ergibt sich, dass die instinktiven Funktionen rein mechanische Handlungen sind, deren Aufeinanderfolge nicht gestört werden darf. Auch noch eine Reihe anderer Thatsachen zeigt uns die Ohnmacht des Instinkts. Die Hymenopteren kennen ihre Feinde (in der Insektenwelt) sehr wohl, stossen klagende Töne aus, denken aber nicht daran den Feind zu verjagen. Es erscheint doch höchst merkwürdig, dass im Laufe der Zeit die Thiere nicht gelernt haben, sich mittelst ihrer natürlichen Waffen gegen die Feinde ihrer Rasse mit Erfolg zu vertheidigen. — Sehen wir von diesen rätselhaften u. unerklärlichen Thatsachen ab, so können wir zwischen einfachen u. zusammengesetzten Instinkten unterscheiden, mitunter sogar bei ein u. derselben Gattung. Beispiele. Es ist also ein Uebergang zu konstatiren von der Fähigkeit, verschiedenes zu benutzen (Zeichen der Intelligenz), zu dem ausschliesslichen Gebrauch eines bestimmten Mittels (Zeichen des Instinktes). Unter den ihre Opfer paralytischen Hymenopt. lässt sich eine ähnliche Reihe aufstellen. *Eumenes* u. *Odynerus* paralytiren ihre Opfer, Raupen, unvollständig, *Ammophila hirsuta* sticht in die Mitte jedes Segments. *Cerceris*, *Sphex*, *Tachytes*, *Scolia*, *Pompilus* verletzen ihr Opfer durch einen Stich u. wählen dabei Thiere mit sehr hoch entwickeltem Nervensystem, die sie in

Folge dessen durch einen Stich in dasselbe leicht lähmen können. — Man kann nun annehmen, dass die gradweise Steigerung, welche man zwischen den verschiedenen Arten beobachtet, in früheren Zeiten in ein und derselben Art existirt hat u. dass die Hym. mit entwickelterem Instinkt sich nach u. nach von den niedriger stehenden abgelöst u. auf eine höhere Stufe erhoben haben. Die Thiere mit einfachem Instinkt würden dann von Formen stammen, die auf einer niedrigen Stufe stehen geblieben sind. Der Instinkt der ihre Opfer paralyisirenden Arten ist schwieriger zu erklären u. erfordert eine vollkommene Geschicklichkeit. Wir können hiernach annehmen, dass die Rassen der ungeschickten Operateure ausstarben, während die Geschicklichkeit der überlebenden sich immer mehr entwickelte. Die Frage, wie die Hymenopteren mit reiner Pflanzennahrung den Instinkt erworben haben könnten, ihre Brut mit thierischer Nahrung zu versorgen, harret noch wie so viele andere der Lösung.

Lampert, Kurt. Aus dem Leben der Ameisen. Jahreshfte. Ver. Vaterl. Naturk. Württemb. 57. Jhg. Sitzungsber. p. CXVIII —CXXI.

Landois, H. *Bombus lapidarius* über 1½ Stunden in Copula. 28. Jahresber. d. zool. Sekt. des westfäl. Prov.-Vereins für Wissensch. u. Kunst f. das Etatsjahr 1899—1900 p. 28—29.

Landquart, H. Th. Schmetterlinge und Ameisen. Beobachtungen über eine Symbiose zwischen *Lycaena argus* L. und *Formica cinerea* Mayr. Mit 1 Taf. Chur, Jos. Casanova, 1901. 8°. 40 p. — Ausz. von Chr. Schröder, Allgem. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. No. 8 p. 123.

Die *Lycaena argus*-Raupen besitzen auf dem drittletzten Segment ein Honig absonderndes Dorsalorgan. Zwischen den beiden Lippen der Spalte wird der Honigtropfen auf einem Zäpfchen getragen. Das vorletzte Segment besitzt zwei eigenartige, ausführlicher dargestellte, wahrscheinlich im Zusammenhange mit der Honigdrüse stehende, hervorstülpbare „Tuben“ (möglicherweise Duftorgane darstellend). Die ganze Haut zeigt ein empfindliches Tastvermögen, das vielleicht als Grundlage für den Verkehr zwischen Raupe und Ameise dient. Solche Symbiose ist noch nachgewiesen für *dorylas* W. V., *orion* Pall. u. *corydon* Poda. Aehnliche Organe sind ferner gefunden bei *baëtica* L., *icarus* v. Rott., *argiolus* L., *aegon* L. u. *medon* Hufn. — Die myrmecophilen R. sind echte Gäste oder Symphilen. Die Raupen werden von den Ameisen aufgesucht, beleckt u. vertheidigt. Bei der Verpuppung geleiten letzter die Raupen in ihre unterirdische Bauten (am Kapland leben einige *Lyc.*-Raupen sogar in den Ameisennestern). Der Schmetterling gilt als anerkannter Gast u. wird sogar beim Ausschlüpfen von seinen Wirten unterstützt.

Launoy, L. Modification des échanges respiratoires consécutive à la piqûre d'un Hyménoptère chez les larves de Cétonie dorée. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris VI. p. 383, 385.

Le Roy de Weld. Titel p. 327 u. 443 des vor. Berichts wird auch refer. in d. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 397.

Lie-Pettersen, O. J. (1). Biologische Beobachtungen an norwegischen Hummeln. Bergens Mus. Aarbog, 1901, No. 6, p. 1—19.

— (2). Bidrag til kundskaben om Vestlandets Bombus- og Psityrusarter. (Bergens, Mus. Aarb.) 1901. gr. 8°. (19 p.) separ. M. 2,—.

Lie-Pettersen behandelt Bombus (14 Sp.), Psityrus (4), Verbreitungsübersicht (p. 19).

Lombroso, Gina. Il polimorfismo degli insetti sociali e degli uomini. Rivista di Sc. Biologiche vol. II. No. 4/5. Como, 1900.

— Ref. P. Speiser, Allgem. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 366.

Lovell, John H. (1). The Bees of Maine and Indiana. Entom. News, vol. 12. Jan. p. 4—9.

Bibliographie der nordamerikanischen Prosopis Species p. 7—9.

— (2). Prosopis Ziziae. Entom. News vol. 12. June, p. 162—163.

Ludwig, N. (1). Neuer erfolgreicher Bienenzuchtbetrieb. Leipzig. „Leipziger Bienen-Zeitung“. 1901. 8°. 64 p. M.—,50.

— (2). Ueber den Orientierungssinn und das Gedächtniss der Bienen. Naturw. Wochenschr. 16. Bd. No. 14. p. 153—155.

Ausserhalb des Stockes orientiren sich die Bienen durch den Gesichtssinn, auf dem Flugbrette u. im Stocke durch den Tastsinn der Fühler u. Geruchssinn (wie Versuche beweisen). Die Geruchsorgane treten auch bei den Ausflügen in Thätigkeit. Es ist in dieser Beziehung bei den Honigbienen so wie bei den Ameisen: Leitung der Thiere beim Auffinden von Nahrungsquellen durch den Duftstrom. Ueber den Orientierungsausflug junger Bienen. Aehnlich ist es auch beim Füttern von Honig im Freien. Einfliegen der Bienen. Das Ortsgedächtniss beruht nach Ludwig auf einen mechanischen blinden Naturtrieb. Junge Bienen, die im Begriff sind auszufiegen, kehren zu dem Käfig zurück, in dem man sie einschloss. Die bezügliche Beobachtungen an hohen Wohnungen mit 2 Fluglöchern, nach Verschluss des oberen. Auffallendes Verhalten der Bienen nach dem Schwarmakt. Ohne Königin fliegen sie zurück, mit einer solchen halten sie ein grosses Vorspiel u. fliegen sich ein. Beim Frühjahrsvorspiel fliegen sie sich eventuell auf dem neuen Platze ebenfalls ein, wenn auch der alte nicht vergessen ist. Gewohnte Futterplätze bleiben ihnen 2—3 Monate im Gedächtniss. Beim Orientiren der Arbeiter im Aufsuchen von Nahrung, also beim Befliegen u. Erkennen von Honig- u. Pollenspendern ist offenbar der Formen-, Farben- u. Geruchssinn der Thiere gleichzeitig betheilig. Infolge ihres anerkanntermassen ausserordentlich feinfühligem Verhaltens für ganz besondere specif. Duftstoffe ist es erklärlich, dass die Arbeiter, sofern sie eine Zeit lang an einer bestimmten Pflanze Pollen u. Honig gesammelt haben, so mächtig durch den specif. Geruch der Blüthenheile beeinflusst werden, dass sie bei der ferneren Sammelarbeit immer nur der gleichen Pflanzenart ihre Aufmerksamkeit zuwenden u. andere

Blüten unberücksichtigt lassen. Es erhellt daraus, dass Orientierungssinn u. Gedächtniss der Bienen, in Bezug auf ihre Natur u. Lebensweise u. unter gleichzeitiger Anpassung an wichtige Vorgänge im Pflanzenleben höchst zweckentsprechend ausgebildet sind.

— (3). Das Vorkommen von Säuren bei den Honigbienen. Naturw. Wochenschr. 16. Bd. No. 29, p. 333—335.

Luff, W. A. *Bembex rostrata* L. in Jersey. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) Febr. p. 48.

Lücke, —. Zur Lyda-Kalamität. Zeitsch. Forst. Jagd, 1900 p. 288—297. — Ausz. Allgem. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 92.

Die Bekämpfung dieser Kieferschädlinge wird erschwert: 1) durch die Zählebigkeit der Larven (Platzregen vernichtete allerdings Larven wie Puppen), — 2) die ausserordentliche Vermehrungsfähigkeit (Vervierfachung im Flugjahre), — 3) das Fehlen namhafter Feinde (nur Meisen, Finken, wahrsch. auch wohl Libellen), — 4) die Schwierigkeit der Voreinschätzung der Flugstärke. — Bewährteste Gegenmittel: Das Leimen, Stockroden, Einsammeln der Wespen an trüben Tagen oder sonst in den Morgen- und späten Abendstunden. Das Abschütteln der Räumchen hat nur geringen Erfolg.

Macgillivray siehe Needham & Betten.

Maeterlinck, Maur. (1). Het leven der bijen. Vertal. van Mevr. G. M. van der Wissel-Herderscheê, Amsterdam, C. L. G. Veldt, 1901. 8° (IV) 248 p. — Dasselbe französisch:

— (2). La vie des Abeilles. Paris 1901, 8°, 311 p. — Dasselbe englisch:

— (3). The Life of the Bee. Transl. by Alfr. Sutro, London, Ges. Allen, 1901, 8°, 348 p., 5 s. — Dasselbe:

— (4). Das Leben der Biene. Deutsch von F. v. Oppeln-Bronikowski, Leipzig, 1901, 8°, 256 p.

Mallock, J. R. *Aculeate Hymenoptera* in Dumbartonshire. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) Jan. p. 5—6.

Liste der erbeuteten Species.

Mantero, G. Descrizione di alcune specie nuove di Imenotteri scavatori provenienti dal Rio Santa Cruz in Patagonia. Bull. Soc. Entom. Ital. vol. XXXIII p. 197—203.

Marchal, Paul, Sur un nouvel Hyménoptère aquatique, le *Limnodytes gerriphagus* n. gen. n. sp. Avec 4 figs dans le texte. Ann. Soc. Entom. France, vol. 69, 2. trim., p. 171—176.

Marchand, E. Sur le retour au nid du *Bembex Fabr.* Bull. Soc. Ouest France, X p. 247—250.

Marshall, T. A. (1). Titel p. 311 sub No. 1 des vor. Berichts. Behandelt *Bracon melanothrix* u. *Microplitis tunetensis*.

— (2). Description of a new Ichneumon (*Nyxeophilus corsicus* n. sp.). With 2 textfigs. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) Dec. p. 290—292.

— (3). Description de deux espèces nouvelles de Braconides. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris T. VI p. 290—292.

Martynow, W. A. [Ein Bienenvolk ausschliesslich mit Drohnenwaben]. (Russisch.) [Mittheil. d. Mosk. landwirthsch. Institut. 7. Jhg. Bd. 1 (4 p.) (Russisch.) — Ausz. von N. von Adellung, Zool. Centralbl. 9. Jhg. No. 4/5 p. 137.

Mayr, G. Formiciden (Stuhlmann, Ost-Afrika). Zool. Ergebn. Ost-Afrikas, 2. Bd. (2) (9 p.). — Jahrb. Hamb. wiss. Anstalt.

— (2). Der Erzeuger der Sodom's-Aepfel. Wien. Entom. Zeit. 20. Jhg. 4. Hft. p. 65—68. — *Cynips insana*.

— (3). Drei neue Formiciden aus Kamerun, gesammelt von Hrn. Prof. Dr. Reinhold Buchholz. Entom. Tidskr. 21. Årg. 3./4. Hft. p. 273—279.

Tetramorium colosseum, *Pheidole minima*, Ph. Buchholzi.

— (4). Südafrikanische Formiciden, gesammelt von Dr. Hans Brauns. Ann. Hofmus. Wien, 16. Bd. p. 1—30, pls. I, II.

Im Einzelnen: *Aenictus* (2 n.), *Probolomyrmex* n. g. (1 n.), *Euponera* (1 n.), *Anochetus* (1 n.), *Leptothorax* (1 n.), *Monomorium* (1 + 1 n.), *Pheidole* (3 n., dar. 1 n. aus Ostafr. in Anm.), *Cremaatogaster* (1 n. + 1), *Solenopsis* (1 + 1 n.), *Diplomorium* n. g. (1 n.), *Rhoptromyrmex* n. g. (2 n.), *Tetramorium* (2 n. + 1), *Triglyphothrix* (1 n.), *Meranoplus* (1 n. subsp.), *Strumigenys* (1 n.), *Cataulacus* (1 n. subsp.), *Camponotus* (1 + 1 n. subsp. + 1 n. sp. aus Ostafr. in Anm.).

Mc Lachlan, R. Notes on *Athalia spinarum* L. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) May, p. 128.

— (2). Attractive of the Flowers of *Ampelopsis tricuspidata* (Veitchii) for the Hive Bees. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) Oct. p. 259.

Mehring, J. Das neue Einwesen-System als Grundlage zur Bienenzucht. Neu herausgegeben von F. Gerstung. Freiburg 1901, gr. 8°, 8 u. 68 pag. u. 1 Portrait.

de Meijere, J. C. H. Ueber das letzte Glied der Beine bei den Arthropoden. Zool. Jahrb. f. Anat. 14. Bd. p. 417—476, Taf. XXX—XXXVII.

Meisenheimer, J. Die neuen Forschungen über die geistigen Fähigkeiten der Ameisen und Bienen. Naturw. Wochenschr. 17. Bd. No. 4 p. 37—41.

Ist ein Sammelreferat der Publik. von Bethe (Bericht f. 1898 p. 335 und f. 1900 p. 294), Wasmann (Bericht f. 1899 p. 457) u. von Buttler-Reepen (Ber. f. 1900 p. 295 u. 356).

I. Ameisen. Orientungsvermögen derselb. Im wesentlichen dreierlei Lebensäusserungen, die in Betracht kommen: 1. Erkennungs-, 2. Orientierungs- u. 3. Mittheilungs-Vermögen.

II. Bienen. Ebenfalls die drei genannten Gesichtspunkte in's Auge fassend. — Abb. Drehungsexperimente mit Zinkstreifen (Demonstr. der Polarisation etc.). Bienenwolke vor dem Stocke und Bienenwolke an ders. Stelle in der freien Luft, wenn der Stock verschoben ist.

Melzer, Herm. Der praktische Bienenmeister. Eine Anleitung zum lohnenden Betriebe der Bienenzucht. Neudamm, J. Neumann. 1901. 8°. (VIII, 128 p., 64 Fig im Text) M. 1,80.

Meunier, Fern. Contribution à la faune des Mymarides ou „atomes ailés“ de l'ambre. Avec 1 pl. Ann. Soc. Scient. Bruxelles, T. 25. 9 p. — Ausz. von Chr. Schröder, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. No. 16/17 p. 261.

Eine weitere Publikation über die Bernsteinfauna auf Grund der Sammlung von Bernsteineinschlüssen vom Königsberger Provinzialmuseum. Ihre Seltenheit ist wohl auf die Kleinheit der Mym. zurückzuführen. Ihre Beobachtung verlangt eine 100—500fache Linearvergrößerung. Beschrieben werden: *Anaphes*, aff. *Anaphes* u. *Alaptus*; *Litus* Hal.; *Limacis* Först.; *Malfattia* et *Palaeomymar* Meun., deren Einzelheiten in sorgfält. Ausführung auf der Tafel wiedergegeben werden. Sie scheinen der Eocän-Fauna des unteren Oligocän vom Samland anzugehören. Die von Duisburg vorläufig beschriebene Mymaride reiht sich nach ihren Antennen in das Genus *Eustochus* Hal. ein. Echte *Mymar*. Halid. sind noch nicht fossil gefunden. Zusammenstellung der fossilen Proctotrypidae.

Michaelis, Reinhold. (1). Podręcznik dla pszczelarzy, zawierający najważniejsze zasady, nauki i reguły pszczelnictwa, przełożony na polskie. A. Chelmiński [Handbuch für Bienenzüchter] Wyd. 2-gie. Poznań, nakład i druk Fr. Chocieszynskiego, 1901 16° (34 p.).

— (2) Merkbüchlein für Bienenzüchter u. s. w. 7. verm. Aufl. Leipzig, Leipziger Bienenztg. 1901 16°. 44 p. M. 0,35.

Mocsáry, Alex. u. Viet. Szépligeti. Hymenopteren. In: Zoologische Ergebnisse der Dritten Asiat. Forschungsreise des Grafen E. Zichy, 2. Bd. p. (121), 121—169.

Enthält die Beschreib. eines *Pompilus* von Kohl und zweier Formiciden-Varr. von Emery.

Moffat, J. Alston. Parasites in the Eggs of *Chrysopa*. With 1 fig. 31. Ann. Rep. Entom. Soc. Ontario, 1900 p. 51—52. — Ichneumoniden.

Molliard, M. Sur la galle de l'*Aulax papaveris*. Rev. gen. Botan. vol. XI 1899 p. 209—217. — Ausz. Centralbl. f. Bakter. u. Parasitk. Abth. II 6. Bd. p. 159.

Morice, F. D. (1). The Century's Work among the Aculeate Hymenoptera. Entom. Record, vol. 13 No. 1 p. 12—14.

— (2). The Century's Work among the Chrysidæ. Entom. Record, vol. 13 No. 1 p. 14—15.

— (3). 1898. Illustrations of specific characters in the armature and ultimate ventral segments of *Andrena* ♂. With 3 pls. Trans. Entom. Soc. London, 1900 P. II 229—243.

Siehe im system. Theil.

— (4). Notes on *Andrena taraxaci* Giraud and the Species most resembling it, with synoptical tables, and descriptions of two new Species. t. c. p. 243—252.

2 n. sp.: *A. curtivalvis* u. *A. stabiana*.

- (5). Illustrations of the 6th ♂ ventral segment in 17 *Osmia*-species of the *adunca* Group, with a Note on the synonymy of four species, and descriptions of four which seem new. With 2 pls. (VII, VIII). Trans. Entom. Soc. London, 1901, P. II p. 161—177, 178.
 - (6). *Andrena helvola* L. and *ambigua* Perkins. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) Jan. p. 4.
 - (7). Two Saw-flies new to Britain. t. c. Jan. p. 5.
Tomostethus gagathinus Klg. u. *T. funereus* Klg.
 - (8). Observations on *Sphecodes*. t. c. Febr. p. 53—56, March, p. 57—58.
 - (9). Hymenopterological Notes. t. c. April p. 96—98.
Die Notizen betreffen: 1. *Formica fusca* ♂♂ u. ♀♀ in einem Neste von *F. sanguinea*. — 2. *Melecta luctuosa* Scop. u. *armata* Panz. — 3. *Eucera longicornis* L. — 4. *Ellampus caeruleus* Dahlb. (?).
 - 5. *Odynerus laevipes* Shuck. — 6. *Athalia spinarum* F.
 - (10). Hermaphrodite specimen of *Podalirius retusus* L. With 2 figs. t. c. June, p. 141—142.
 - (11). Two unrecorded British Hymenoptera. *Hedychrum rutilans* Dahlbom and (?) *Salix propinquus* Lep. t. c. Oct. p. 247.
 - (12). Hymenoptera near Woking in the latter part of 1901. t. c. Nov. p. 278.
 - (13). On *Gorytes niger* Costa ♂ and ♀. Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 6. Hft p. 362.
- Morice, F. D. and T. D. A. Cockerell.** The American Bees of the Genus *Andrena* described by F. Smith. Canad. Entom. vol. 33 No. 4 p. 123—124, No. 4 p. 149—155.
- Morley, Claude.** (1). Evolution of our Knowledge of the Ichneumonidae during the Nineteenth Century. Entom. Record, vol. 13 No. 1 p. 15—18.
- (2). *Blacus armatulus* Ruthe near Ipswich. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) Jan. p. 17.
 - (3). Note on *Athalia spinarum*. t. c. June, p. 142.
 - (4). On an Ichneumonid Genus, and two Species new to Britain. t. c. Oct. p. 249—251. — [*Dinotomus*] Först.
- Morton, K. J.** Note on *Agriotypus armatus* Curtis. Ann. Scott. Nat. Hist. 1901. Apr. p. 120.
- Müllner, Mich. Ferd.** Neue Zerr-Eichen-Cynipiden und deren Gallen. Mit 2 Taf. Verhdlgn. k. k. zool.-bot. Ges. Wien 51. Bd. 7. Hft. p. 524—529, 530.
- Behandelt: *Dryocosmus Mayri* n. sp. Beschr. einer neuen Galle (ob 2. Generat. der vorig. Sp.?), *Neuroterus cerrifloralis* n. sp. u. *Andricus vindobonensis* n. sp. — Erklär. der Abb. p. 530.
- Nassonow, N.** Kursus der Entomologie. I. Theil. Die äusseren Decken der Insekten. Warsaw. 1901. 219 p. 4 pls. — Russisch.

Needham, J. G. & Betten, C. Aquatic insects in the Adirondacks. Bull. N. York Mus. 47. p. 383—612, 36 pls.

Enthält neue Tenthredinidae von Macgillivray u. neue Hymenopteren anderer Familien von Ashmead.

Netter, Abraham. (1). Examen des moeurs des Abeilles au double point de vue des Mathématiques et de la Physiologie expérimentale. (Titel p. 314, Besprech. p. 359 des vorig. Berichts). Extr.: Naturaliste, 1901 p. 9. — Ausz. in Insektenbörse 18. Jhg. p. 28.

Nevinson, E. B. (1). Aculeate Hymenoptera in North Wales. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) March p. 72.

— (2). Aculeate Hymenoptera in the New Forest. t. c. 72.

Nielsen, J. C. 1901. Biologiske Studier over Gravehvespe. Med 13 fig. Vidensk. Meddel. Naturh. Foren. Kjobenhavn, 1900 (6) 2. Aarg. p. 255—276. — Résumé ibid. p. 278—280. — Auch separat als:

— (2). (Recherches biologiques sur les Hyménoptères fouisseurs. (Dänisch mit franz. Résumé). 1901. gr. in 8°. 26 p. avec 12 figures M. 2,50.

Es werden, zum Theil durch sehr instruktive Abbildgn. den Text erläuternd, die Nistgewohnheiten folg. 23 Grabwespenarten besprochen: *Clytochrysus chrysostomus* Lep. (im Résumé steht *lapidarius* Pz.), *Coelocrabro leucostomus* L., *Coelocrabro cloëvorax* n. sp., *Rhopalum clavipes* L., *Passaloeus turionum* Dahlb., *Ceratophorus morio* Shuck, *Solenius vagus* L., *Crossocerus palmarius* Schb., *Rhopalum tibiale* F., *Lindenius albilabris* F. — *Cerceris truncatula* Dahlb., *Cerceris labiata* F. — *Tachytes pectinipes* L., *Trypoxylon figulus* L., *Psen atratus* Dahlb., *Passaloeus monilicornis* Dahlb., *Cemonus lethifer* Shuck., *C. unicolor* Pz., *Diodontus tristis* v. d. Lind., *D. minutus* F. — *Pompilus spinus* Schiödte, *P. fumipennis* Zett., *Pseudogenia carbonaria* Dahlb.

— (3). Biologische Studien über einige Grabwespen und solitäre Bienen. Mit 1 Abbildgn. Allgem. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. No. 20 p. 307—308.

Im Anschluss an Baer's Mittheilung zieht Nielsen einiges Vergleichsmaterial zu Rathe und findet 1) dass das Deckelchen der Pempredonen aus zwei von einander unabhängigen Bestandtheilen zusammengesetzt wird, deren einer den Pempredonen eigen, deren anderer ein rudimentärer Kokon ist, 2) dass einige Arten der Pempredonen einen vollständigen Kokon herstellen. Zur Erklärung für den rudimentären Zustand des Kokons einiger Arten ist die Bedeutung des Kokons, die Larve oder Nymphe vor Kälte oder Feuchtigkeit zu schützen, zu erwägen. In dürren Zweigen ist der Kokon überflüssig, in lebenden ist ein Schutz nöthig. Ein anderes Beispiel fakultativer Herstellung des Kokons bietet die Blattwespe *Poecilosoma pulverata* Retz. Sie baut in trockenen Zweigen keinen, in feuchten Zweigen einen Kokon. — Die sonderbare Lagerung der

Futterreste über dem Kokon erklärt sich aus der Stellung des Nestes, nämlich in herabhängenden Zweigen. Verf. fand einen analogen Fall bei solitären Bienen: *Osmia Solskyi* Mor. u. *Chelostoma maxillosum* L. (cf. syst. Theil).

Niezabitowski, Ed. L. (1) p. 315 des vor. Berichts lies *Materyaly* statt *Materialy*.

— (2). *Materyaly do fauny rosliniarek (Phytophaga) Galicyi*. Sprawozd. Kom. Krajo vol. XXXIV p. 3—18.

Nordenström, H. Några bidrag till kännedomen om Svenska Hymenopterers geografiska utbredning. Entom. Tidskr. 21. Årg. Hef 3/4 p. 201—208.

Parasitsteklar: Ichneumonidae: *Chasmodes* (1), *Exephanes* (1), *Ichneumon* (21). — *Ichn. Amblypygi*: *Amblyteles* (10), *Spilichneumon* (1), *Limerodes* (1), *Alomyia* (1). — *Cryptidae*: *Linoceras* (1), *Cryptus* (4), *Liocryptus* (1), *Gonicryptus* (1), *Pycnocryptus* (1), *Habrocryptus* (1), *Mesocryptus* (1), *Cratocryptus* (1), *Stylocryptus* (1), *Acanthocryptus* (1), *Microcryptus* (2), *Hemiteles* (1). — *Ophionidae*: *Ophion* (2), *Anomalon* (2), *Campoplex* (1), *Limneria* (1), *Pyracmon* (1), *Exetastes* (3). — *Pimplariae*: *Ephialtes* (1), *Perithous* (1), *Pimpla* (5), *Glypta* (6), *Lampronota* (1), *Lissonota* (2), *Meniscus* (3), *Xorides* (1), *Xylonomus* (1), *Odontomerus* (1). — *Tryphonidae*: *Catoglyptus* (1), *Euryproctus* (1), *Notopygus* (1), *Priopoda* (1), *Perilissus* (1), *Mesoleius* (2), *Tryphon* (5), *Polyblastus* (1), *Exenterus* (1). — **Växsteteklar:** *Cimbex* (2), *Emphytus* (1), *Selandria* (1), *Strongylogaster* (1), *Tenthredo* (1), *Perineura* (1), *Dolerus* (2), *Sirex* (1), *Oryssus* (1). — *Vespidae*: *Odynerina*: *Hoplomerus* (2), *Ancistrocerus* (1), *Odynerus* (1). — *Fossores*: *Mutilla* (1), *Agenia* (1), *Priocnemis* (3), *Mimesa* (1), *Cerceris* (1), *Crabro* (6). — *Apidae*: *Andrena* (5), *Halictus* (3), *Colletes* (1), *Nomada* (2), *Epeolus* (1), *Megachile* (1), *Osmia* (1), *Coelioxys* (1). — **Tillägg:** *Ichneumon* (18), *Hepiopelmus* (1), *Probolus* (1). — *Crypti*: *Cryptus* (1), *Plectocryptus* (1), *Microcryptus* (3), *Phygadeuon* (1). — *Tryphonidae*: *Mesoleptus* (1), *Mesoleius* (1), *Tryphon* (1), *Exenterus* (1). — *Pimplariae*: *Meniscus* (1), *Xorides* (1). — *Ophionidae*: *Banchus* (1).

Ormerod, Eleanor. (Titel siehe unter *Lepidoptera*, p. 612 d. Ber. f. 1900) behandelt auch die schädlichen Hym.: *Selandria* und *Eriocampa*.

Oudemans, J. Th. (1). Ein merkwürdiges Nest von *Vespa vulgaris* L. Mit 1 Taf. u. 2 Textfig. Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. No. 7 p. 97—100, Schluss No. 8 p. 119—122.

Das Nest liefert ein schönes Beispiel von der Art und Weise, wie sich die Bienen zu helfen wissen, wenn Raummangel in Bezug auf Ausdehnung des Nestes in der normalen Richtung eintritt. Die Beobachtung hat auch einen gewissen Werth für das Studium der geistigen Fähigkeiten dieser Thiere.

- (2). Zwei merkwürdige Hymenopteren-Nester von *Lasius fuliginosus* Latr. und von *Osmia rufa* L. Mit 2 Abbildungen. t. c. No. 12 p. 179—181.

Nest von *Lasius fulig.* aus Torf gebaut. Nest von *Osmia rufa* var. L. in einer schwedischen Streichhölzerschachtel.

Pack-Beresford, Denis R. The Male of *Vespa austriaca*. The Irish Naturalist, vol. 10 No. 10 p. 195—196.

Palmén, J. A. 1900. Bo af *Vespa vulgaris*. Meddel. Soc. Fauna Flora Fenn. 24. Heft p. 5—6. — Grosses Nest von *Vesp. vulg.* (Deutsch. Ausz.) *ibid.* p. 185.

La parthénogenese chez les abeilles. Revue Scientif. (4) T. 16 No. 17 p. 537—538. — Nach Dickel und Weissmann.

Paulcke, Wilh. Der p. 316 sub No. 2 des vor. Berichts gegebene Titel ist folgendermaassen zu ergänzen. Ueber die Differenzirung der Zellelemente im Ovarium der Bienenkönigin (*Apis mellifica* ♀). Mit 4 Taf. (12, 12a, 13, 13a) u. 1 Textfig. Zool. Jahrb. Abth. f. Anat. 14. Bd. 2. Heft p. 177—197, 198—202. — Ausz. von R. Heymons, Zool. Centralbl. 8. Jhg. No. 11 p. 368—369 u. P. Speiser, Allgemeine Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. No. 21 p. 333; desgl. Zool. Centralbl. 8. Jhg. 1901 p. 368—369. — Abstr. Journ. Roy. Micr. Soc. London, 1901 P. 3 p. 272—273. — Schon im vor. Bericht p. 353—355 behandelt.

Pérez, Ch. (1). Sur quelques phénomènes de nymphose chez la Fourmi rousse. Compt. rend. Soc. Biol. Paris T. 53 No. 38 p. 1046—1049.

- (2). Sur quelques points de la Métamorphose des Fourmis. Bull. Soc. Entom. France, 1901 No. 2 p. 22—25.

Der Fettkörper. Bei ganz jungen Ameisenlarven hängen die Zellen desselb. ziemlich fest mit einander zusammen. Sie bilden unregelmässige flottirende Massen, die durchaus nicht die zwischen den Organen befindlichen Zwischenräume der Körperhöhle ausfüllen. Jede Zelle ist verhältnissmässig klein u. zeigt ein netzförmig., sehr vacuolenreiches, eosinophiles Protoplasma, das hauptsächlich auf die Peripherie beschränkt ist u. dicke, radiäre Stränge zeigt. Der voluminöse Kern ist fast regulär ovoid u. seine deutl. Kontur zeigt einige spitzige Vorsprünge, nämlich die Ansatzpunkte der kräftigsten Protoplasmastränge. Im Verlauf des Larvenlebens treten nach und nach zwischen den Maschen des Protoplasmas Fettkügelchen auf, deren Zahl sich bald ungeheuer vermehrt. Die Fettzelle dehnt sich und erreicht eine bedeutende Grösse, so dass die Fettkörpermaasse (ohne Zunahme der Zahl der Zellen) fast die ganzen zwischen den Organen gelegenen Räume erfüllt. Bei den alten Larven werden die Zellen durch wechselseitigen Druck polyedrisch und schliesslich so von Fettkügelchen erfüllt, dass die Protoplasmastränge, die zwischen den Kügelchen liegen, fast nicht mehr wahrnehmbar werden. Gleiches gilt auch von der periphären, die Zelle begrenzenden

Protopl.-Schicht. Die sonderbarsten Veränderungen betreffen den Kern. Dieser nimmt, von den Fettkügelchen immer mehr eingeengt, zuerst eine Sternform an, dann erleidet er, gleichsam in seine Stränge ausfliessend, zahlreiche Einbuchtungen u. zeigt schliesslich, mit weniger deutl. Umriss, das Aussehen eines unregelmässigen Plasmodiums. In diesem Stadium hängen alle Zellen noch vollständig aneinander. Abgesehen von den Eigenthümlichkeiten des Kernes, spielt sich diese fortschreitende Differenzirung, die nicht mit einer fettigen Degeneration zu verwechseln ist, in denselben grossen Umrissen bei allen Insekten ab. Man kann sie experimentell hemmen, dadurch, dass man die Larve eine Zeit lang hungern lässt. Naturgemäss tritt dies auch ein bei Larven, die von inneren Parasiten heimgesucht sind. Dies hat Pantel nachgewiesen bei Phasmiden (von *Thrixion Halidayanum* heimgesucht) u. Pérez an den Raupen von *Hyponomeuta* (von *Encyrtus fuscicollis* geplagt) gezeigt. Bei den erwachsenen, zum Verspinnen bereiten Raupen zeigten die Fettzellen noch die jugendliche Form. Sogleich beim Beginn der Nymphose verändern die Fettzellen ihr Aussehen, sie verlieren die glänzend weisse Färbung und werden rein cremegelb. Sie lösen sich von einander los, isoliren sich, gewinnen wieder Kugelgestalt, werden leicht zerbrechlich und lassen im frischen Zustande bei der geringsten Quetschung ihren Inhalt ausfliessen. Nach der Fixirung nehmen sie eine mehlig-e, äusserst zerreibbare Consistenz an. In den Paraffinschnitten werden die Fettkörper sehr leicht vom Messer aus den zertrümmerten Zellgrenzen herausgerissen. Auf diese technischen Fehler lassen sich zweifellos die irrthümlichen Schlüsse verschiedener Forscher zurückführen. Untersuchung frischen Materials lehrt die vollständige Integrität der Zellmembran der isolirten Fettzellen (Trophocyten Berlese), die während des ganzen Nymphenstadiums anhält.

In den letzten Stadien der Nymphose verlieren die Trophocyten allmählich ihre Nährkügelchen, von Neuem werden die Protoplasmastränge u. die periphere Schicht sichtbar und bei der ausschlüpfenden Imago beobachten wir wieder Stadien, die an diejenigen der jüngeren Larve erinnern würden, wenn die Kerne nicht, als Zeichen ihrer durch Alter erlittenen Veränderungen ihre unregelmässige plasmodiale Gestalt zurückbehalten hätten. Die Trophocyten schwinden allmählich ohne Zutreten von Phagocytose. Im Verlauf des Nymphenlebens kann man im Innern der Fettzellen ein sehr sporadisches Auftreten von Leucocyten beobachten, doch ist denselben wohl keine grosse physiologische Bedeutung beizumessen. Diese bei den Untersuchungen verschiedener Ameisen, wie *Formica*, *Lasius*, *Camponotus*, *Myrmica*, *Aphaenogaster*, auch an *Vespa crabro* gewonnenen Resultaten stimmen mit denen Berlese's u. Henneguy an den Musciden überein.

2. Der Darmtraktus. Eine noch strittige Frage ist die über den Ursprung der Zellen, die den Darmkanal ersetzen. Bei den Larven erkennt man in einem gewissen Alter an der Basis der

funktionirenden Epithelzellen die Grundlagen des späteren Darmes als Gruppen von 3, 4—5 kleinen, zusammengelagerten Zellen, durch deren Vermehrung die Inseln mit ihren Rändern verwachsen und ein neues, manschettenartiges Epithelgewebe bilden, in welchem das Larvenepithel aufgesaugt wird. Sie scheinen nicht vom Darmrohr herzustammen. Man hat sie für wandernde Amöbocyten gehalten; doch je weiter wir die Jugendstadien zurückverfolgen, immer wieder treten diese durch Lage und Aussehen charakteristischen Gruppen auf, wenn auch geringer an Zahl (zuweilen sogar nur einzelne Zellen). Wir müssen weit zurückgehen, um ihren Ursprung zu verfolgen, um festzustellen, dass wir es nicht mit dem Darmepithel fremden Elementen zu thun haben, um zu finden, dass wir in ihnen gleichzeitige Elemente der vorhandenen thätigen Zellen zu erblicken haben und deren Abzweigung bis in die Differenzirung der Organe des Embryo zurückreicht. Dies ist übrigens keine einzigstehende Thatsache, und man kann wohlallgemein behaupten, dass schon im Embryo der Insekten sich die Keime zu allen Organen der Imago anlegen. In dem Augenblick, in dem die Larve ausgeschlüpft, kann man in ihr zwei Kategorien von Zellen unterscheiden. Die erstere, die Mehrzahl der Zellen, hat schon den Endpunkt ihrer histologischen Differenzirung erreicht. Wir erkennen in ihnen Epithel-, Drüsen-, Muskelzellen u. s. w. Sie bilden die funktionirenden Organe der Larve und genügen zum Wachsthum derselben, indem sie selber wachsen. Die zweite Gruppe umfasst Zellen, die in kleinen Gruppen im Körper zerstreut sind und als Inseln verschiedenen Organen anliegen. Man kann sie Embryonalzellen nennen, wenn man damit ausdrücken will, dass sie noch keinen bestimmten histologischen Charakter tragen. Doch muss man diese kleinen Zellen als chemisch u. physiologisch hoch differenzirt betrachten, was sich z. B. aus ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Parasiten (Coelom-Coccidien) u. allgemein aus ihrem latenten Leben, ihrer langen Encystierung im Innern der Larvenorgane, der Unfähigkeit ihrer Assimilation von Seiten der sie umgebenden Organe äussert, erklären lässt. Sie sind von Anfang an als Imaginalzellen zu betrachten, sie sind es, die unter dem Einfluss neuer Reize aus ihrer Cystenruhe hervortretend auf einmal eine neue Vermehrungsthätigkeit u. morpholog. Differenzirung beginnen u. in ihrem Endstadium die Organe der Imago liefern. Noch eins ist hervorzuheben: das ausserordentliche Missverhältniss in der Grösse der Zellen homologer Gewebe der Larve u. der Imago. Bei letzt. sind die histolog. Elemente unverhältnissmässig kleiner als bei der Larve. Oft treten dazu noch andere Differenzirungen, so als krasses Beispiel, bei den Hymenopteren, die imaginalen Muskel mit klein. axialen Kernen u. larvalen Muskeln mit peripheren grossen Kernen. Man hat nach des Verf. Ansicht noch viel zu wenig Gewicht auf diese Thatsachen gelegt.

- (3). Histolyse des tubes de Malpighi et des glandes séricigènes chez la Fourmi rousse. Bull. Soc. Entom. France, 1901, No. 17 p. 307—310.

Karawaïew (1898) beschreibt bei *Lasius* eine fortschreitende Degeneration, an der die Phagocyten keinen Antheil haben. — Anglas (1900) hat fast dasselbe für die Biene und Wespe festgestellt, zuerst ein Zerfall des Cytoplasmas und des Kernes der Malpighi'schen Zellen, erst später findet man einige Leucocyten um die Organreste, doch funktionieren sie nicht als Phagocyten. — Berlese (1901) beschreibt bei *Pheidole pallidula* eine feine Zusammenziehung, ein Zurücktreten zu Anfang der Nymphase; dann bleiben die Verhältnisse so wie sie sind bis zum Ausschlüpfen der erwachsenen Form. Er konnte nicht feststellen, ob die Larvenorgane ihre erste physiologische Thätigkeit wieder aufnehmen, oder ob sie durch analoge Neubildungen ersetzt werden. Bei *Cynips tozae* hat er die Entstehung der imaginalen Malpighi'schen Gefässe beobachtet. Er beschreibt eine Art Athmung der larvalen Gefässe im Innern der Darmhöhle, wo sie verdaut würden.

Aus Beobachtungen an *Formica rufa* kann Verf. feststellen, dass die Zerstörung der 4 Malpighi'schen Röhren durch eine ganz typische leucocytäre Phagocytose vor sich geht. Kurz vor dem Uebergang ins Nymphenstadium werden die larval. Malpighi'schen Gefässe, die bisher ihren Charakter unversehrt behalten haben, von einer Menge Leucocyten umgeben. Diese sammeln sich zunächst an der Oberfläche der Zellen, senken sich dann in die Grenzen und schliesslich in das Protoplasma derselben ein. Bald werden die einzelnen Zellen von einander durch die Einwanderung der Leucocyten isolirt, diese dringen immer mehr ins Cytoplasma, das an seinen Rändern Ausschnitte zeigt u. nach u. nach schwindet. Der Kern ist noch intakt. Nach dem totalen Verschwinden des Cytoplasmas wird auch der Kern angegriffen, u. zwar erst nachdem eine Durchbohrung der Kernmembran seitens der Phagocyten dem Inhalt des Kernes die Möglichkeit gegeben hat, sich mit der Leibessflüssigkeit zu vermischen. Im Verlauf dieses Zerfalls sieht man in den Phagocyten Einschlüsse, eosinophile u. chromatische, welche verdaute Fragmente des Cytoplasmas und des Kernes repräsentiren.

Die Leucocyten haben beträchtlich an Grösse zugenommen, ihr Durchmesser ist von 10 auf 16 μ gestiegen. Nach der Aufnahme der Partikel bewahren sie ihre Grösse u. man findet sie in der Flüssigkeit der Leibeshöhle herumschwimmend, erkenntlich am Cytoplasma, das dicht mit eosinophilen Körnern erfüllt ist.

Litteratur über die Histolyse der Speichel- u. Spinn-Drüsen: Kowalewsky (1887), von Rees (1888), de Bruyne (1897), Karawaïew (1898), Anglas (1900), Berlese (1901).

Pérez beobachtete die Zerstörung der Spinnrüsen durch das thätige Eingreifen der Leucocyten. Der Process ist ganz ähnlich

dem, wie er vorher bei den Malpighi'schen Gefässen beschrieben wurde.

Die Histolyse der Spinndrüsen und Malpighi'schen Gefässe findet gleichzeitig statt und, wie gesagt, kurz vor der Häutung. Zu dieser Zeit haben sich fast alle Leucocyten ausschliesslich in der Nähe dieser Organe versammelt. Es ist allemal zu bemerken, dass in der Nähe des Hinterrandes des Ventricul. chylic., da, wo die Schlingen der larval. Malpighi'schen Gefässe mit den imaginalen Röhren zusammenkommen, die letzt. von einer Art „zone d'influence“ umgeben sind, wo es keine Leucocysten giebt; dagegen beobachtet man an den larval. Röhren einen Zufluss von Leucocyten, die mit ihnen in Berührung treten u. sie zerstören.

Der Zerfall der beiden Organe beginnt schnell und geht rasch vor sich u. ein u. dasselbe Individuum zeigt, im geeigneten Moment beobachtet, alle Stadien der phagocytären Histolyse neben einander. An einem Schnitt kann man in 20 μ Entfernung eine Sektion vollkommen intakt, umgeben von einem Kranze junger Leucocyten beobachten u. wiederum eine Parthie, in der die Phagocytose ihr Ende erreicht hat und die Amöbocyten mit Einschlüssen beladen sind.

Bibliographische Zusammenstellung: Villanes (1882), Kowalevsky (1887), van Rees (1888), Karawaïew (1898), Anglas (1900), Berlese (1901).

— (4). Sur les oenocytes de la Fourmi rousse. Bull. Soc. Entom. France, 1901, No. 19, p. 351—353. — *Formica rufa* betreff.

Wielowiejsky hat zuerst das Augenmerk auf die schon durch ihre Färbung charakterist. Oenocyten gelenkt. Ihr Vorhandensein scheint bei den Insekten ziemlich allgemein zu sein; ihre Rolle ist räthselhaft, viele Beobachter haben sie gesehen, einige derselb. haben sie als Drüsenzellen beschrieben, so Karawaïew bei *Lasius flavus*. Bei der Nymphe hat er diese Elemente nicht wiedererkannt und glaubt an ihr völliges Schwinden. Berlese hat ihre Lagerung bei den Larven von *Tapinoma erraticum* u. *Pheidole pallidula* präcisirt. Bei den Nymphen findet er eine sehr beträchtliche Zahl von Oenocyten, frei in der Leibeshöhle u. mit amöboider Bewegung.

Bei der von Pérez studierten *Formica rufa* stellen sich die Oenocyten als grosse Zellen (100 μ) dar, die in Haufen von 15—20 in langgestreckten Gruppen in der Nähe der Quermuskel der Abdominalsegmente liegen. Sie stellen nur lokale Deformationen dar, die niemals ihren lockeren Zusammenhang mit einander aufgeben. Ihr Cytoplasma färbt sich stark durch Eosin. Beim Beginn der Nymphose entstehen aus den larvalen Oenocyten durch direkte Theilung eine grosse Zahl freier kuglig., ihnen analoger, aber viel kleinerer Elemente (25 μ). Der Kern der letzteren hat normaler Weise nur einen grossen Nucleus.

Der Kern des larval. Oenocyten theilt sich ungleichmässig und giebt zur Peripherie einen kleinen Kern ab, dann löst sich durch

bogenförmig. Einschnitt ein Theil des Cytoplasmas los, das den kleinen Kern umgiebt. Sobald die kleinen Oenocyten frei geworden sind, vermehren sie sich aufs Neue. Pérez konnte alle Stadien ihrer direkten u. äqualen Theilung verfolgen. Typisch folgt der Zweitheilung des Nucleolus eine Theilung durch Einschnürung des Kernes u. dieser eine Abschnürung des Cytoplasmas. Da aber die Vermehrung sehr rasch vor sich geht, so greifen die aufeinanderfolgenden Theilungen gewissermaassen ineinander; man bemerkt oft Zweitheilung der Nucleolen, sogar eine zweite Theilung der Tochterkerne, während das Cytoplasma der Mutterzelle noch ungetheilt ist. Man findet dann z. B. einen Oenocyten mit 3 Kernen, von denen einer 1—2 Nucleolen hat.

Die Zahl der neuen Oenocyten wird bald sehr beträchtlich; sie schwimmen in der Leibeshöhle, zwischen den Fettzellen des Abdomens, und flottiren in den zwischen den Organen des Kopfes, des Thorax und des Abdomens gelegenen Räumen. Sie bilden so zu sagen eine neue Art von Leucocyten, aber wohl verschieden von den eigentlichen Leucocyten (10μ). Sie dringen zuweilen in das Innere der Gewebe (Hypodermis, Fettzellen), der beste Beweis für ihren Amöboismus. Ihre Pseudopodien sieht man häufig, sogar in Schnitten. Doch niemals beobachtet man eine von diesen Oenocyten hervorgerufene phagocytäre Vereinigung.

Ziemlich häufig findet man einen Phagocyten vollständig von einem andern umgeben, der die Form einer mit leichter excentrischer Aushöhlung versehenen Kugel hat. Man könnte hier an eine Zusammenhäufung glauben. Es ist aber nach Pérez, ein specieller und ganz besonderer Fall der Theilung. Die larvalen Oenocyten erschöpfen sich nicht in der Bildung der freien Elemente. In dem Augenblick, wo einige von ihnen in ihrer höchsten Vermehrungsthätigkeit stehen, werden andere durch die leucocytäre Phagocytose zerstört.

Pérez, J. Contribution à l'étude des Xylocopes. Act. Soc. Lim. Bordeaux, vol. 56, 1 fasc. p. 1—64, 2 fasc. p. 65—125, 126—128. — 36 n. sp.

Pergande, T. The ant-decapitating fly. Proc. Entom. Soc. Washington, vol. IV p. 497—501.

Péringuey, L. Description of seven new species of the family Mutillidae in the South African Museum. Ann. S. African Museum, vol. II p. 127—132.

Perkins, R. C. L. (1). Hermaphrodite Hawaiian Odynerus. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) June p. 139—140.

— (2). Notes on Hawaiian Aculeate Hymenoptera. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) Nov. p. 264—268.

Berichtigungen zur „Fauna Hawaiiensis“ betreffs: *Pison iridipennis* Sm., *Crabro distinctus* Sm., *Polistes hebraeus* Fab., *Xylocopa aeneipennis* de Geer; Eumenidae, Odynerus. Uebersichtstabellen der zahlr. Sp., die mit Ausnahme der weit verbreiteten *O. nigripennis*

u. O. frater, möglicherweise auch erro, alle für Oahu eigenthümlich sind.

Perrier, E. L'instinct. Naturaliste 1901 p. 257—260.

Petrunkewitsch, Alex. Die Richtungskörper und ihr Schicksal im befruchteten und unbefruchteten Bienenei. — Mit 4 Taf. und 1 Textfig. Zool. Jahrb. Abth. f. Anat. 14. Bd. 4. Hft. p. 573—603, 604—608. — Ausz. Die Richtungskörperchen und ihr Schicksal im Bienenei. Ausz.: Naturw. Rundschau, 16. Jhg. No. 38 p. 482—484. — Abstr. Maturation in the Eggs of Hive-Bees. Journ. Roy. Micr. Soc. London. 1901, P. 5 p. 524.

Einleitung (p. 573—575). Bedeutung der Eireifungserscheinungen. Die Arbeit zerfällt in 3 Theile: 1. Beweise für die parthenogenetische Entstehung der Drohneneier. — 2. Die Eireifung. — 3. Das Schicksal der Richtungskörper in befruchteten und unbefruchteten Bieneneiern. — Methoden (p. 575—576). Die rasche Entwicklung u. die grosse Zartheit der Bieneneier fordern besondere Methoden. Eireifungsprocess in ca. 30 Min. abspielend.

Bestiftung der Zellen im Sonnenschein. Die meisten Conservierungsflüssigkeiten benetzen das Ei erst sehr spät u. es kann sich weiter entwickeln. Bester Erfolg mit Gilson'scher Flüssigkeit in Modif. (in ccm): Aq. destill. 300, Alkoh. absol. 200, Acid. acet. glaciale 90, Acid. nitric. pur. 10, Sublim. corros. bis zur Sättigung (muss schönen Aldehydgeruch besitzen und vor direkt. Sonnenlicht geschützt werden). Dauer der Einwirk. 6—36 St. (24 Std. durchschnittl.), dann in 70% Alkohol, mit etw. Tinctura jodi. (Wasser ist zu vermeiden). Sie dringt rasch ein und fixirt gut das Chromatin u. Plasma und erlaubt alle möglichen Färbungen. Hämatoxylin nach Böhmer u. Delafield, Haematein u. Safranin. Vorfärbung mit Parakarmin (Schnitt 5 μ Dicke).

I. Beweise für die parthenogenetische Entstehung der Drohnen (p. 576—585). Geschichtliches. Dziezon - Leuckart, Dickel. — Die Theorie von Dickel lässt sich in folgend. Sätzen zusammenfassen: 1. Die Königin legt nur befruchtete Eier. — 2. Das Geschlecht wird von den Arbeiterinnen bestimmt, indem sie die Eier mit verschiedenem Speichel bespeicheln. — 3. Die aus unbefruchteten Eiern entstand. Drohnen sind fortpflanzungsfähig (einerlei, ob sie von Arbeiterinnen oder von einer unbegatteten Königin abstammen) und sind schon deshalb als falsche Drohnen zu bezeichnen. — Die Bespeichelung — falls eine solche überhaupt von den Arbeitsbienen vorgenommen wird — übt keine Wirkung auf die Strahlung aus. Das hat auch Dickel schon erkannt und er glaubt nunmehr, dass die Zelle bespeichelt wird. Widerlegung der Dickel'schen Vermuthungen. Die Resultate der Untersuchungen über das Vorhandensein des Spermias in den Bieneneiern können in folg. Tabelle zusammengefasst werden:

Stadium der Eireifung		Eier aus Drohnenzellen		Eier aus Arbeiterinnenzellen	
		unbertührt	normal	unbertührt	normal
Erste Richtungs- spindel	Gesamtzahl.	9	94	20	29
	Darunter mit Spermastrahlung.	—	—	5	23
	Procentsatz.	0%	0%	25%	79,2%
Zweite Richtungs- spindel	Gesamtzahl.		272	1	61
	Darunter mit Spermastrahlung.		1	1	61
	Procentsatz.		0,36%	(?) 100%	100%

Täuschungen der Bienenkönigin bei der Eiablage.

Die Liebenswürdigkeit des Herrn Dickel bei der schwierigen Beschaffung des Materials muss leider mit einem Umsturz seiner Theorie beantwortet werden. Die alte Theorie von Dzierzon ist richtig. Genaue Beobachtung der Königin bei der Eiablage. Die Verschiedenartigkeit der Zellen übt event. eine reflexive Wirkung auf den Ausführungsgang des Recept. schliessend. Sphincter aus u. lassen ihn in tonischer Contraction. — Kann man aus Drohnen-eiern Arbeiterinnen u. sogar Mutterbienen erziehen? Dickel's Angabe hierüber. Bedenken P.'s hierüber. Beweiskräftiger wäre folg. Experim.: Eben abgelegte Drohneneier müssten in grosser Zahl in Arbeits- u. Mutterbienzellen einer solchen Wabe übertragen werden, aus der alle anderen Eier sorgfältig entfernt wären. Diese Wabe wäre in ein entweiseltes Volk zu bringen. Entwickeln sich nun aus diesen Drohneneiern in 16 Tg. Mutterbienen u. in 20 Tg. Arbeiterinnen, so könnte man sicher sagen, dass aus Drohneneiern auch weibliche Thiere gezogen werden könnten. Es würde dieses Experim. aber auch bloß beweisen, dass bei den Bienen auch Weibchen aus unbefrucht. Eiern entstehen könnten, wie es auch bei verschied. and. Insekten (*Chermes abietis* L.) bekannt ist.

Die Frage aber nach der parthenog. Entstehung der Drohnen kann nur auf dem Wege mikrosk. Untersuchung gegeben werden.

II. Die Eireifung (p. 585—594). Henking hat gefunden, dass ohne Zutritt eines Samenkernes bei der parthenog. Entwickl. von *Rhodites rosae* eine Verdoppelung der Chromosomen stattgefunden hat (In der Deutung der Reduktion hat er sich getäuscht). Bezüglich der „achromatischen Richtungskörper“ oder Thelyide [Verf. versteht darunter den mittl. Theil der Spindelfasern, die nach der Bildung der Richtungskörper in Form eines Kreuzes oder einer Platte noch lange zwischen diesen u. dem „Spaltkern“ resp. Eikern zu sehen sein sollen] kommt Henking zu dem sonderb. Resultat, „dass der zweite Richtungskern in Verbindung mit dem ersten Thelyid männliche Funktionen erfüllt, während der vom ersten Richtungskörperchen herrührende Kern als Femininum fungirt“.

Es liegen bis jetzt im Ganzen folg. Beobachtungen über das Vorhandensein zweier Richtungskörper bei parthenog. Insekteneiern vor: *Liparis dispar* [nach Plattner], *Apis mellifica* [nach Blochmann], *Lasius niger*, *Rhodites rosae*, *Bombyx mori* u. *Leucoma salicis* [sämmtlich nach Henking]. — Die Eireifung bei den Bieneneiern. „Richtungsplasma“. Gruppierung der Chromosomen. Verdoppelung der reducirten Chromosomenzahl im reifen Ei. Verhalten im befruchteten Bienenei u. im Drohnenei? Königindrohnen u. Arbeitsdrohnen. Im Ei der ersteren sind die Chromosomen quadrivalent, in dem der letztern nicht.

III. Das Schicksal der Richtungskörper (p. 594—603). Blochmann findet: die Vacuole (Richtungskernmasse) ist noch in den ersten Stadien der Blastodermbildung leicht nachzuweisen. Henking's „Richtungscopulationskern“. Das Schicksal der Richtungskörper im Bienenei. Die festgestellten Thatsachen lassen sich folgendermassen zusammenfassen: 1. Die von der Königin in die Drohnzellen abgesetzten Eier sind immer unbefruchtet. — 2. Wie in den befruchteten, so auch in den parthenogenetischen Eiern wird der erste Richtungskörper nach einer Aequationstheilung getrennt. — 3. Bei der Abtrennung des zweiten Richtungskörpers findet in allen Fällen eine Reduction der Chromosomenzahl um die Hälfte statt. — 4. Ebenso theilt sich immer der erste Richtungskörper mit einer Reduction in 2 Hälften, von denen die periphere aus dem Ei entfernt wird u. zu Grunde geht. — 5. Die Herstellung der Chromosomenzahl im weiblichen Pronucleus der Drohneneier geschieht vermuthlich durch Längsspaltung der Chromosomen mit einem Ausbleiben der entsprechenden Theilung in zwei Tochterkerne. — 6. Die centrale Hälfte des ersten Richtungskörpers copulirt regelmässig mit dem zweiten Richtungskörper und giebt so einen Richtungscopulationskern mit normaler Zahl der Chromosomen. — 7. Im Drohnenei entstehen aus diesem Richtungscopulationskern durch dreifache Theilung 8 Zellen mit doppelten Kernen. — 8. In befruchteten Eiern sowie in Arbeitsdrohneneiern bildet sich der Richtungscopulationskern zu einer Spindel um, diese geht aber einfach zu Grunde oder liefert 1—4 Zellen, die aber immer Zerfallserscheinungen des Chromatins aufweisen u. schliesslich auch zu Grunde gehen. — Litteraturverzeichnis (p. 604—605) 29 Publik. — Erklär. der Abb. zu Taf. 43—46 (p. 606—608).

— (2). Die Parthenogenese bei der Honigbiene. Naturw. Wochen-Wochenschr. 16. Bd. No. 21 p. 237—238.

P. bringt noch einige Erläuterungen u. Erklärungen zu seinen Untersuchungen. Das Endresultat ist, dass die alte Theorie Dzierzon's unerschütterter ist u. die Drohnen thatsächlich aus unbefruchteten Eiern entstehen.

Siehe im system. Theil unter Apistik.

Pfankuch, K. *Arctia purpurata* L. und die Schlupfwespe *Erigorgus purpuratae*. Abhdlgn. Naturw. Ver. Bremen 17. Bd. 1 Heft, p. 153—156.

Pic, M. (1). Ichneumoniens de Riom et environs. L'Échange. Rev. Linn. 17. Ann. No. 195 p. 23—24.

Ichneumon Quittardi.

— (2). Un Stenodontus français nouveau. L'Échange, Rev. Linn. 17. Ann. No. 204 p. 93.

St. Theresae n. sp.

— (3). Communications diverses. L'Échange, Rev. Linn. 17. Ann. No. 202 p. 79—80.

Coléoptères et Ichneumoniens recueillis dans la Haute-Savoie.

— (4). Répertoire des publications zoologiques (1898—1899) de Pic. Liste der Publicationen desselben. Ann. Soc. Entom. France, 1898 p. 191—224. — 1. Supplement. t. c. 1901 p. 157 (160), (161)—166. — Nach Zeitschr. geordnet. — Deuxième partie. Liste der n. g. u. n. sp. p. 166—173.

Enthält auch einige hymenopter. Arbeiten.

Pierre, . . . Titel p. 317 des vor. Berichts.

Ausz. von R. Tümpel, Allgem. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. No. 22 p. 350.

La piqûre des Mutilles. Revue Scientif. (4) T. 16 No. 11 p. 349—350.

Plateau, F. Observations sur le phénomène de la constance chez quelques Hyménoptères. Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45, p. 56—83. — Ausz. v. Chr. Schröder, Allgem. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. No. 13 p. 205.

Unter Konstanz bei der Honigbiene z. B. versteht Plateau die Beschränkung der Thätigkeit auf die Blüten einer bestimmten Pflanzart während der Dauer eines Ausfluges aus dem Stock. Mehrere ausführl. Tabellen zeigen, welche Blüten von der Honigbiene, von verschiedenen Hummelarten, wie einigen Spp. der Gattungen Anthidium, Megachile u. Coelioxys bevorzugt werden. Eine absolute Konstanz, also lediglicher Besuch einer bestimmten Blume wurde nicht beobachtet. Besonders sind die Hummeln darin sehr inkonstant. Anthidium manicatum L. u. Apis mellifica zeigen grosse Konstanz, doch finden sich auch hier Ausnahmen. Gehen Hymenopteren von einer Blüte auf eine andere über, so richten sie sich nicht im Geringsten nach einer Uebereinstimmung der zweiten Blüte mit der ersten in Bezug auf Form und Farbe; maassgebend ist für sie das Vorhandensein von Nektar u. Pollen. Eine stärker ausgebildete Konstanz verleiht dem betreffenden Insekt eine grössere Geschicklichkeit im Sammeln von Pollen und Honig, lässt also Zeit gewinnen; doch sind die Vortheile nur Konsequenzen, keine dem Thiere eigenen Absichten.

Die Arbeit gliedert sich folgendermassen: § 1. Avant-Propos. (p. 56—58). Plateau's Arb. v. 1899: Le choix des couleurs etc. und Loew 1884 etc. Oligotropismus. — § 2. Historique. (p. 58—61). Historische Uebersicht. — Tabellen. I. Apis mellifica. Pflanzen, Färb. d. Blüthe, Besuch (p. 62—63). Betrachtungen (p. 64—66), Ord's Schlüsse — § 3. Recherches Personelles p. 66 sq. a) Bombus p. 67.

Divers. Sp.; Tabelle II der Besuche. Pflanzen, Färb. d. Blüthe u. s. w. (p. 68—69), Bemerk. p. 70. — b) Anthidium (p. 70 sq.), Pflanzen u. s. w. (p. 72—73), Bemerk. (p. 74). — d) Apis mellifica L. p. 74—75), Tabelle IV (p. 76—77), Bemerk. (p. 78). — § 4. Les Causes de la Constance (p. 78—82). — § 5. Conclusions (p. 82—83). 6 Punkte.

A *Polistes gallica* egyéne necröl. Rovart Lapok, 8 köt. 9 füz. Nov. p. 180—182. — Die Individuen von *Polistes gallica*. Ausz. Hft. 9 p. 21.

Poulton, E. B. (1). Apparatus do determine the strength of the formic acid discharged by the ant in defence of its nest. Trans. Entom. Soc. London 1901 P. II Proc. p. X.

— (2). The influence of Darwin upon entomology. Entom. Record. vol. 13 p. 72—76.

— (3). [and others]. Balearic Insects. Entom. Monthly Mag. (2) vol. (12) 37 p. 205—211, 239—240, 272—274. — E. Saunders beschreibt darin 2 neue Hymenopteren-Sp.

Prowazek, St. (1). Pteromaliden-Larven in Schildläusen. Mit 1 Taf. (IV). Allgem. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. No. 19 p. 289—291, 352.

— (2). Ameisenbeobachtungen. Zool. Garten 42. Jhg. No. 2 p. 49—52. — Siehe im system. Theil unter Formicidae.

Quail, A. Hymenopterous parasite of ovum of *Vanessa gonerilla*. Trans. New Zealand Inst. vol. XXXIII p. 153, 154 pl. VIII.

de Rauschenfels. L'Ape e la sua coltivazione nell' arnia verticale e nell' orizzontale a soffitta e fondo mobili. Trattato teorico-pratico. Milano 1901 8. 20 e 380 pg. c. 66 figure M. 4.50.

Revue internationale d'Apiculture, dirigée par E. Bertrand. Nyon. gr. in 8° Année 23: 1901 (12 nos). M. 4,—.

Revue Russe d'Entomologie. Diese Zeitschrift ist in Folge des Mangels einer in kürzeren Zwischenpausen erscheinenden russischen entomolog. Zeitschrift entstanden. Es wird dadurch den russischen Forschern ermöglicht, kleinere Mittheilungen in kurzer Zeit zu veröffentlichen. Neben Originalartikeln über alle Gebiete der Entomologie bringt sie auch eine Uebersicht über die neue entomolog. Litteratur nebst Referaten, kleinere Nachrichten u. Anzeigen. Sie ist durch das Zusammenwirken einer Anzahl russischer Entomologen entstanden (D. Glasounow, A. Jakowlew, N. Kokouyew, N. Schiriajew, A. Semenow u. T. Tschitschérine).

Sur la rareté des *Bombus* (Réponse à M. Jacob). Par C. M. Feuille jeun. Natural. (4) An. 32 No. 374 p. 41.

Reitter, Edm. missbilligt in d. Wien. Ent. Zeit. 20. Jhg. p. 45 den Entschluss Konow's zu einer Herausgabe der genannten Zeitschrift. Für die Dipteren wäre bisher die Wien. Ent. Zeit. eine fast centrale Stelle gewesen und keine der Konow'schen Arbeiten wäre bisher nicht zurückgewiesen worden und hätte auch fernerhin Aufnahme darin gefunden.

- Robertson, Charles.** (1). Some new Aculeate Hymenoptera from Illinois and Florida. Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 No. 3 p. 195—204. — 23 sp., dar. 20 n.
- (2). Some new or little-known Bees. Canad. Entom. vol. 33 No. 8 p. 229—231. — 6 n. sp., 2 n. g.; *Tripeolus*, *Chelostomoides*.
- (3). Synonymy of *Prosopis*. Entom. News vol. 12. March, p. 77—78, — 3 sp.
- (4). Homologies of the wing veins of Hymenoptera. Science, vol. XI, No. 264 1900 p. 112—113.
- (5). Titel p. 320 sub. No. 2 des vor. Berichts.

Anschließend an Comstock's u. Needham's Arbeiten über das Flügelgeäder der Insekten, giebt Verf. in obig. Arbeit seine abweichende Meinung über die Homologien im Geäder der Hymenopteren kund. Die Querader m verbindet M_2 und $M_3 + Cu_1$ (im Flügel von *Pantares* u. *Rhamphomyia*). Die als $m-cu$ bezeichnete Querader bei *Leptis* existiert auf dem Hymenopterenflügel nicht, da sie durch die Vereinigung der genannten Adern obliteriert ist. M_4 ist Cu_1 u. Cu_1 ist Cu_2 . Die Querader von $m-cu$ ist nicht mit jener von *Leptis* homolog, sie gehört dem Arculus an. Die Ader Cu_2 findet sich nur bei den Hymenopteren in der Gattung *Pamphilus*. Viele Eigentümlichkeiten im Geäder der Hymenopteren sind auf eine starke Verlängerung des arculus u. sein Abschweifen von der Flügelbasis zurückzuführen.

van Rossum, A. J. (Parthenogenetische Kweckingen van bladwespen.). Entom. Tijdskr. Nederl. Entom. Vereen. 44. D. 1 Af. Versl. p. 24—34 u. 57—66.

Rothney, G. A. James. Aculeate Hymenoptera at Tintagel, North Cornwall. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) June p. 150.

Aufzählung der erbeuteten Species.

Rudow, F. (1). Die Wohnungen der Hautflügler Europas mit Berücksichtigung der wichtigen Ausländer. Mit Beiträgen von C. Kopp. (Fortsetzung.) Berlin. Entom. Zeitschr., 46. Bd., 2./3. Hft., p. 339—378 u. Schluss p. 383—429.

Teil 1900. Ausz. von R. von Hanstein. Naturwiss. Rundschau, 16. Jhg. No. 23 p. 292—293.

Vespidae Forts. (p. 339—358). — Crabroniden (p. 358—363). — Sphegiden (p. 363—378). — Anthophiliden (p. 383—429).

— (2). Einige Beobachtungen an Insektenbauten. Insektenbörse, 17. Jhg. p. 76.

Betrifft: *Ancistrocerus parietum* L., *Osmia bicornis* L., *Eumenes pomiformis* R. u. *coarctatus* L. Gastfreundschaft der Wespen bei and. Hym. u. Lep. (an den Gespinnsten ders.) Sonstige ungewöhnliche Nistorte.

— (3). Kleinere Mittheilungen. t. c. p. 324—325.

Diese beziehen sich auf *Bracon ficicola* (Parasit der Honigmotte), Verkrüppelungen von Kürbistengeln durch *Aphis* u. *Phytoptus*. Das Zusammenleben verschiedener Insektenfamilien (*Coleopt.* mit *Hym.*, siehe *Xiphidria*), *Cryptus myrmeleocontis* n. sp. (aus *Myrmeleon*-Puppenkugeln u. d. *Neuropt.* *Osmylus*).

— (4). Einige Beobachtungen an Insektenbauten. t. c. p. 394—395.

Dieselben betreffen *Odynerus*, *Eumenes*, *Vespa*, *Apis delesserti*, *Ancistrocerus* u. *Ceratina*.

— (5). Titel p. 398 sub No. 5 des Berichts f. 1899 betrifft: p. 69—70: *Polybia socialis* Sauss., *scutellaris* White u. *sericea* Sauss. — p. 74—76: *P. pygmaea*, *minutissima*, *ampullaria* Cr., *Pelopaeus figulus* Db., *Chalybion Zimmermanni* Db., *Montezumia chalybaeus* Sss., *Eumenes* div. Spp. u. *Trypoxylon*.

Sahlberg, J. 1900. (Ett egendomligt formadt getingbo af *Vespa rufa*). Meddel. Soc. Fauna Flora Fenn. 26. Hft. p. 44. — Ausz. p. 219.

Sajó, Karl (1). Nochmals über Bienenstachel und Bienengift. Mit 2 Abbildgn. *Prometheus*, No. 579. 12. Jhg. No. 7 p. 97—103. — No. 580, No. 8, p. 115—122.

— (2). Verhalten der Immen neuen Blumen gegenüber. t. c., No. 620, 12. Jhg., No. 48, p. 767.

— (3). Die Caprification der Feigen. Mit 11 Abbildgn., t. c. No. 622, 12. Jhg., No. 50 p. 788—792, No. 623, No. 51, p. 807—811. (Schluss): No. 624, No. 52, p. 823—827.

Wir verdanken diese hochedle Frucht, die Feige, ausschliesslich einem Insektenirrtum. Abb. v. *Blastophaga grossorum*. ♀, ♂, Puppe, Details. Abb. 669 p. 791. — Hinterleib des ♀ in 3 Stell. Abb. 700 p. 792. — Ei, Larve etc. Abb. 701 p. 792. — caprif. u. nicht caprif. Feigen Abb. 710 p. 808.

Würden die männlichen Feigenblüten sich durch Geruch auszeichnen, so dass das Insekt sicher wüsste, in welcher Feige sie das für die Brut nöthige Substrat findet, wir hätten keine *Smyrna*-feigenkultur. Eben während des Herumspürens reiben die Thiere den an ihrem Körper haftenden Blütenstaub an die weibliche Blüthe der *Smyrna*-Feigen, wodurch letztere befruchtet werden. — Parasiten der *Blastophaga*, Abb. von Feigenbäumen etc., wilde Feigen zur Caprif. Abb. 711—714 p. 719—721. Beschreib. der künstl. Caprif. etc.

Liste der übrigen (20) Feigen *Hym.*-Gatt. (p. 826). Die vorzüglichste Feigensorte des Welthandels verdankt ihr Entstehen einer unbedingt erforderlichen Kreuzbefruchtung. Sie ist die beste, weil sie keine männlichen Blüten hat u. daher nur mittelst fremden Pollens zur Entwicklung gelangt.

Samson, G. G. Bees for Pleasure and Profit: Guide to Manipulation of Bees, Production of Honey, and General Management of Apiary. 2 edit. London, Lockwood, 1901, 8°, 1 s.

Saunders, Edw. Balearic Insects. Hymenoptera aculeata collected in Majorca and Minorca (March and April 1900) by E. B. Poulton, Oldf. Thomas and R. J. Pocock with descriptions of new Species. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) Sept. p. 208.

48 Sp.. dar. 2 n.: *Halictus soror*, *Nomada Poultoni*.

— (2). Hymenoptera aculeata, collected in Algeria by the Rev. A. E. Eaton, and the Rev. F. D. Morice, Part I. Heterogyna and Fossores to the end of Pompilidae. Trans. Entom. Soc. London 1901 p. 515—563.

Material. Fundorte u. Pflanzen etc. (p. 515—525). Die Aufzählung der Sp. umfasst (525—563): Formicidae: *Camponotus* (macul. in 3 Rassen; *rufoglaucus* 1 Rasse; *Sichelii*), *Myrmecocystus* (3), *Plagirolepis* (1), *Bothriomyrmex* (1), *Dorylus* (1), *Tetramorium* (1), *Leptothorax* (1), *Monomorium* (2), *Aphaenogaster* (2), *Pheidole* (1), *Solenopsis* (1), *Cremastogaster* (2). — Mutillidae: *Mutilla* (14 + 4 var.), *Myrmosa* (2), *Apterogyna* (2). — Myzinidae: *Myzine* ([4 + 3 n.] + 1 var. + 2 sp.?). — Tiphidae: *Tiphia* (1), *Scolia* ([11 + 2 n. + 1 sp.?). — Sapygidae: *Sapyga* (1 n.). — Pompilidae: *Pompilus* ([17 + 13 n.] sp. + 9 sp.), *Salius* ([8 + 3 n.] sp. + 1 var. + 2 sp.), *Agencia* (1), *Ceropales* (2).

— (3). *Coelioxys mandibularis* Nyl. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) July, p. 167.

— (4). Gynandrous specimen of *Halictus quadricinctus* Fabr. t. c. p. 278—279.

Sch(en)kling, S. giebt einen Auszug aus Laloy, L. in der Insektenbörse, 18. Jhg. p. 83—84.

Schiller-Tietz, . . . Die Bergung und Konservierung des Honigs durch Bienen. Prometheus, 13. Jhg. (No. 637) p. 196—198.

Schirmer, Carl. Verzeichniss der in der Umgebung Berlins beobachteten Tenthrediniden (Blatt- u. Holzwespen). Allgem. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. No. 18 p. 279—282, No. 19 p. 293—294.

Seit Hartigs Werk (vor 41 Jahren) hat sich die Umgebung Berlins sehr geändert; trotzdem hat der Verf. noch eine Reihe von Arten gefunden, die Hartig nicht kannte. Es ist wohl anzunehmen, dass sie eingewandert sind, wobei die Einführung der Pflanzen von anderen Gebieten her eine Rolle spielen mag. Die Liste umfasst 301 Sp. nebst benannt. Varr., davon neu 69 Sp., von Hartig angegeben, aber noch nicht wiedergefunden 52 Sp. Angabe des Fundortes nebst Datum. p. 280—1 umfasst Sp. 1—128, p. 293—296 Sp. 129—301.

von Schlechtendal, D. Ueber *Selandria coronata* Klug. sp. Mit 7 Fig. Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. No. 9 p. 129—131.

Mit 7 (8) Figg. Abb. von Wedeln, Ei, (eierlegendes) Weibchen, Ausschlüpfen, Eiablage, Beschreib. des Eies, Frass, Sägeapparat der Raupe, Erklär. d. Abbildungen.

— (2). *Monophadnus elongatulus* (Klug) Konow als Rosenschädling. Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. No. 10 p. 145—147.

Schletterer, Aug. Beitrag zur Hymenopteren-Fauna von Süd-Istrien. Verhdlgn. k. k. zool. botan. Ges. Wien, 51. Bd., 3. Hft. p. 215—220. — Gasteruption Sowae.

Das Verzeichniss bildet einen Nachtrag zu den Programmaufsätzen des Verf.'s „Zur Hymenopteren-Fauna von Süd-Istrien“ (IV. Jahresbericht des k. k. Staatsgymnasiums zu Pola. 1894) und „Zur Bienenfauna des südlichen Istriens“ (V. Jahresber. d. k. k. etc., 1895). — Die Fauna von Süd-Istrien weist nunmehr 151 Gatt. mit 554 Arten auf.

Verzeichniss folg. Gatt. nebst Zahl der Spp. (eingeklammert): *Halictus* (5), *Andrena* (7), *Ceratina* (1), *Eucera* (2), *Podalirius* (3), *Osmia* (2), *Megachile* (3), *Anthidium* (1), *Epeolus* (1), *Melecta* (1), *Nomada* (3), *Stelis* (1), *Sirex* (1), *Macrocephalus* (1), *Monoplopus* (1), *Rhodinoceraea* (1), *Arge* (1), *Athalia* (1), *Amasis* (1), *Emphytus* (1), *Macrophya* (2), *Tenthredopsis* (3), *Methoca* (1), *Rhynchium* (1), *Odynerus* (4), *Psen* (1), *Nysson* (1), *Gorytes* (1), *Trypoxylon* (1), *Philanthus* (1), *Cerceris* (1), *Crabro* (1), *Pompilus* (1), *Myrmosa* (1), *Evania* (1), *Aulacus* (1), *Gasteruption* (1 n.: *Sowae*), *Holopyga* (1), *Chrysogona* (1), *Hedychridium* (2), *Chrysis* (3).

Schmiedeknecht, O. Subtropische Fauna und Flora im paläarktischen Gebiet. Allgem. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 54—58.

Behandelt die Fauna um Jericho. Aufzählung der Hymenoptera excl. Ichneumoniden u. Braconiden. — Der einst von Josua ausgesprochene Fluch ist nur zum Theil in Erfüllung gegangen. Für den Naturforscher ist das Gebiet ein Eldorado, ein den Wendekreisen entrücktes Stück Tropenland.

Schneider, J. Sparre. Coleoptera og Lepidoptera ved Bergen og i naermeste omegn. Mit deutschem Résumé. Mit 1 color. Taf. Bergens Mus. Aarb. 1901. 1. Hft. (p. 217, 218, Résumé p. [220] 221—223.

402 Coleopt., 292 Lepidopt., Liste von 42 Hemipteren; 12 Arten von *Bombus*.

Schönichen, Walter. (Ueber den Ortssinn der Hymenopteren). Mit 4 Abbildgn. Prometheus, No. 588, 12. Jhg. No. 16 p. 253.

Nach Bethe, Buttell-Reepen, Peckham etc.

— (2). Pilzzucht bei *Lasius fuliginosus*. Prometheus, No. 602 12. Jhg. No. 30 p. 467—468.

— (3). Verf. giebt ein Ref. der Arbeiten von Peckham G. u. E. in Prometheus, 12. Jhg. p. 253—254 u. bildet darin ab die Flugbahn von *Sphex ichneumonea* (Abb. 186), *Astata bicolor* (Abb. 187), Flugspur von *Cerceris deserta* (Abb. 188) u. Kriechspur von *Tachytes*.

Schrottky, C. Biologische Notizen solitärer Bienen von S.-Paulo (Brasilien). Allgem. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. No. 14/15 p. 209—216.

Viele der Beobachtungen decken sich mit denen von Ducke. Temperaturverhältnisse in S. Paulo. Bemerkungen zu *Centris collaris*, *discolor* u. *furcata*, *Euglossa nigrita*, *Megacilissa eximia* Sm. etc. Uebersicht der hauptsächlich von Bienen besuchten Pflanzen (nach Familien geordnet) p. 211—213. — Flugzeit, Blütenbesuch etc. der einzelnen Arten. Haupttageszeit für das Fliegen der solitären Bienen ist sehr verschieden. Artenzahl der bei Pará flieg. Bienen mindestens 500. Dass die relative Häufigkeit der beiden Geschlechter bei nahe verw. Arten eine oft ganz entgegengesetzte ist, vermag Schr. nicht zu bestätigen. Das Bekanntwerden der eigentlichen Futterpflanzen der betreff. Bienen wird Klärung bringen. — I. *Protopidae*. II. *Colletidae*. III. *Megachilidae*. IV. *Xylocopidae*. V. *Ceratinidae*. VI. *Nomadidae*. VII. *Anthophoridae*. VIII. *Euglossidae*. — p. 213—215. Ueber die sozialen Bienen ist nicht viel zu sagen.

Am besuchtesten sind die Blüten von *Papilionaceen*, *Caesalpinaceen* u. *Solanaceen*.

Der Umstand, dass die grossen *Nomadiden*-Gatt.: *Acantopus*, *Cyphomelissa* u. *Oxynedys*-Arten vornehmlich *Papilionaceen*, die kleinen, wie *Melissa*, *Mesocheira* u. *Thalestria*, *Labiaten* vorziehen, deutet auf eine nicht allzunahe Verwandtschaft.

Schulz, W. A. (1). Ueber das Nest von *Bombus cayennensis* (L.) Verhdlgn. k. k. zool. bot. Ges. Wien 51. Bd. 5. Hft. p. 361—362.

— (2). Nachtrag zu meinem Bericht über das Nest von *Bombus cayennensis* (L.) t. c. 10. Hft. p. 762.

— (3). *Xylocopa tranquebarica* (Faber). Ein synonymischer Beitrag. Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt. (Konow). 1. Jhg. Hft. 5. p. 273—274.

Schwarz, E. A. A season's experience with figs and fig-insects in California. Proc. Entom. Soc. Washington, vol. 4 No. 4 p. 502—507.

Schwenkfeld, Caspar. (1563—1609). Besprechung seiner Naturgeschichte in der Insektenbörse 17. Jhg.

Scudder, S. H. Some insects of special interest from Florissant, Colorado and other points in the tertiaries of Colorado and Utah. Bull. U. S. Geol. Survey. No. 93 1892, p. 1—29 tab. I—III. — Behandelt auch Hymenoptera.

S. Edw. siehe Poulton.

Semenow, Andr. (1). *Chrysididarum species novae vel parum cognitae* (Hymenoptera). I. Avec 2 figs. Revue Russe d'Entom. T. 1. No. 1/2 p. 23—27. — Ausz. v. N. von Adelung, Zool. Centralblatt, 9. Jhg. No. 4/5 p. 136—137.

N. sp.: *Pseudochrysis rusalka* (Transcaspien), *Parnopes Glasnuowi* (aus dem westl. Turkestan), n. g.: *Isadelphus* (für *Parnopes schmiedeknechti* Mocs.).

— (2) [Captures, en Russie, de *Konowia megapolitana* Brauns. (Hymenoptera, *Siricidae*), t. c. No. 3 p. 80—82 (Russisch).

— (3). *Sphex* (Chlorion) *Semenowi* (F. Moraw. 1890) ♂ nondum descriptus (Hymenoptera, Crabronidae). *Revue Russe d'Entom.* T. 1 No. 1/2 p. 55—56.

— (4). Notice sur quelques espèces de la sous-famille des Xiphydriides (Hymenoptera, Siricidae). *Revue Russe d'Entom.* T. 1 No. 4/5 p. 185—186.

Seurat, M. L. G. (1). Les Hyménoptères parasites: Observations biologiques. *Bull. Mus. Hist. Nat. Paris* 1900, p. 137—140. *Insectol. Agric.*

Die Larve von *Callidium sanguineum* lebt in den frisch geschlagenen Eichen. Nach zweijähriger Lebensweise im Holze kehrt sie unter die Borke zurück. Schmarotzer sind in diesem Stadium für *Call. sanguineum*, *Doryctes gallicus* Rheinb., *Helcon tardator* Nees, *Phytodietus corvinus* Grav., — für *Call. variabile*: *Doryctes gallicus* Rheinb., *Xylonomus praedatorius* F., *Xyl. scaber* Grav. und *Xorides nitens*. Aeusserst feines Geruchsvermögen dieser Schmarotzer. Sitz dafür die Riechgrube in jedem Antennengliede. — Schmarotzer von *Scolytes intricatus*: *Dendrosoter protuberans* Nees, diese wiederum bilden das Wirthsthier für einen Chalcidier. Da die Scolytiden ihren Larvengang als Puppenkammer nicht erweitern, ist *Dend. protub.* zu entomophager Lebensweise gezwungen.

— (2). Observations biologiques sur les parasites des chênes de la Tunisie. 10 Fig. 34 p. *Ann. Sci. Natur. Zool.* (Paris) 8. sér.

Charakteristik der Insektenschädlinge an stehenden u. gefällten Eichen (*Quercus suber* L. u. *Mirbecki*) in Tunis nebst ihren Schmarotzern. Von Hymenopteren wird besonders eine Ameisenart *Cremastogaster scutellaris* Ol. verderblich, die in Südeuropa, Kleinasien, Tunis u. Nordamerika zu Hause ist.

— (3). Observations sur les organes génitaux des Braconides. Ausz. von P. Speiser, *Allg. Zeitschr. f. Entom.* 6. Bd. No. 11 p. 172.

Skach, Jos. Baupläne für bienenwirtschaftliche Bauten, enthaltend Pavillons, Bienenhäuser, Bienenhütten etc. 2. Folge. 2. Aufl. Mit 31 Abbildgn. in Holzschn. Berlin. C. A. Schwetschke & Sohn. 1901. 8^o. 25 p. M. 1,—.

Skarytka, W. Volksbienenzucht. Eingehende Belehrung über ertragreiche Behandlung der Klotz-, Bretter-, Lagerbeute und des Strohkorbcs nebst Berücksichtigung des Ueberganges zum Mobilbau. Mit 100 Abbildgn. Wien, Pest u. Leipzig. 1901. A. Hartleben's Verldlg. 8^o. VIII, 138 p. M. 2,25.

Smith, John B. Notes on some Digger Bees. I. *Journ. N. York Entom. Soc.* vol. 9 No. 1 p. 29—40. — II. With 3 pls. and 3 figs in the text. *ibid.* No. 2 p. 52—72.

Ssilantiew, A. Bericht über die Arbeiten der Expedition des Kaiserlichen Forstdepartements (Zoologische Abtheilung) für die Jahre 1894—1896. St. Petersburg, 1898. (Aus:

Arb. d. Exp. d. Forstdep. wissensch. Abth. T. VII Lief. 2 1898).
220 p. Holzschn. im Text. (Russisch mit deutschem Résumé).

Die gefundenen Thierformen wurden von verschiedenen Spezialisten bearbeitet. (Die Cynipidae vom Verf. selbst).

Von Insekten wurden gefunden: Orthoptera 46 Sp.; Hemiptera-Heteroptera 82 Sp., Coleoptera 480 Sp. (u. 18 var.), Lepidoptera 296 Sp., Aphaniptera 15 Sp., davon 10 n.

Für Russland neu sind folgende Insekten: *Episema scoriacea* Esp., *Hadena leuconota* H.-S., *Lignyodes muerlei* Ferrari, 15 Puliciden-Arten (davon 10 n.).

De Stefani, T. Ulteriori osservazioni sulla nidificazione dello *Sphex paludosus*. Monit. Zool. Ital. Ann. 12 No. 8 p. 222—223 (Union. Zool. Ital.).

Stoll, Otto. Zur Kenntnis der geographischen Verbreitung d. Ameisen in der Schweiz. Entom. Gesellsch., 10. Bd. p. 120. — Bespr. v. Dönitz, Berlin. Entom. Zeitschr., 45. Bd., Sitz.-Ber. p. 4—5.

Strand, Embr. 1900 (1). Om nogle Staphylinider og Phytophage Hymenoptera. Arch. f. Mathem. og Naturvis. 22. Bd., 2./3. Heft, 15 p. — Hym. (p. 12—15):

Arge (1), Hemichroa (1), Dineura (1), Pontania (1), Lygaeonematus (2), Pristophora (1), Monoctenus (2), Poecilosoma (3), Emphytus (1), Dolerus (3), Rhogogastera (3), Cephaleia (1), Pachyprotasis (1), Tenthredo (5).

— (2). Et lidet bidrag til Norges entomologiske Fauna. Entom. Tidskr. 20. Årg. p. 287—292.

Von Hymenopt. aculeata werden erwähnt: *Apis mellifica* L., *Halictus laevis* Kirby, *H. cylindricus* Fabr., *H. flavipes* Fabr., *Sphcodes similis* Wesm., *Nomada 5-spinosa* Thoms., *Vespa media* De G., *V. saxonica* Fabr., *V. rufa* L., *V. vulgaris* L.

Strobl, Gabr. (1). Hymenopteren aus Ungarn und Siebenbürgen. Verhdlgn. u. Mittheil. Siebenb. Ver. f. Hermannst., 50. Bd., 1900, p. 43—79.

Blatt- u. Schlupfwespen; 9 n. sp., n. g.: *Parentypoma*.

Angabe der Sammelroute. Die Arten sind Grenzthiere, die sowohl für Trans- als auch für Cisleithanien angeführt werden können. Einige Thiere stammen von Fiume; eine Anzahl wurden von Thalhammer bei Kalocsa etc. gesammelt. Die Belegstücke befinden sich im naturhist. Mus. zu Admont, Steiermark. — Die Aufzählung umfasst die Schlupf- u. Blattwespen. Litteratur für die Ichneumoniden des betreff. Gebietes: Grav., Ratz., Brischke, Hlmgr., Thoms. (p. 44 : 5 Publ.).

Ichneumonidae (p. 44—72). I. Fam. Ichneumonidae genuinae: (Litt. Wesm., Taschb., Tischb.; 3 Publ.): *Ichneumon* (17), *Hoplismenus* (1), *Amblyteles* (7), *Platylabus* (1 n.), *Apaeleticus* (1), *Colpognathus* (1), *Phaeogenes* (3), *Ischnus* (1), *Alomyia* (1). — II. Fam. Cryptidae: (Litt.: Taschb., Först., Tschek, Schmiedekn., p. 48; 6 Publ.).

Cryptus (4), Idiolisma (1), Chaeretymma (1), Aritranis (1), Pycnocraptus (2), Spilocryptus (2), Mesostenus (1), Plectocryptus (2), Microcryptus (1), Stylocryptus (2), Phygadeuon (6), Hemiteles (5), Adelogonathus (1), Pezomachus (3), Atractodes (3+1 var.), Ktenostilpnus (1). — III. Fam. Pimplariae (Litt.: Taschen, Schmiedekn. p. 51; 2 Publ.). Ephialtes (3), Perithous (1), Theronia (1), Pimpla (12+1 var.), Glypta (5), Lissonota (6+1 var.), Procinetus (1), Coleocentrus (1), Acoenites (4), Odontomerus (1), Crypturus (1). — IV. Fam. Tryphonidae: (Litt. Holmgr. p. 54 3 Publ.): Mesoleptus (2 + 1 n.), Euryproctus (1 + 1 n.) Callidiotes (1), Notopygus (1), Ctenopelma (1), Prionopoda (1 n.), Perilissus (1), Mesoleius (1), Trematopygus (1 n.), Tryphon (5), Polyblastus (1), Monoblastus (1), Erromenus (1), Exyston (1), Colpotrichia (1), Exochus (2), Orthocentrus (4), Bassus (10). — V. Fam. Ophionidae: (Litt.: Holmgr. Först., Brauns, Thomps. p. 62; 4 Publ.). Ophion (3), Exochilum (1), Anomalon (4), Opheltes (1), Campoplex (4), Charops (1), Cymodusa (1), Sagaritis (2), Casinaria (1), Limneria (9+1 n.), Meloboris (1), Mesochorus (3), Porizon (3), Thersilochus (3+1 n.), Exetastes (2). — VI. Fam. Plectiscoidae (Litt.: Thomp. u. Först. p. 68; 2 Publ.). Aperileptus (4), Plectiscus (1+1 n. + 2 var.), Proclitus (2), Pontisarthrus (1), Parentypoma n. g. (1 n.).

Tenthredinidae, Blattwespen (p. 73—79). Litt.: Konow u. André: Lyda (8), Tarpa (3), Cephus (2+1 n. var.), Cimbex (1), Clavellaria (1), Abia (4), Amasis (1), Arge (9), Cyphona (1), Lophyrus (4), Priophorus (1), Pteronus (1), Nematus (1), Pachynematus (1), Pristiphora (1), Tomostethus (2), Monophadnus (1), Athalia (3), Selandria (2), Thrinax (1), Dolerus (1), Rhogogastera (2), Tenthredopsis (4), Pachyprotasis (1), Macrophyta (4+1 var.+1 n. var.), Allantus (8), Tenthredo (3).

- (2). Icheumoniden Steiermarks (und der Nachbarländer). Mitth. Naturw. Ver. Steiermarks, Jhg. 1900, p. 132—257.
- Divers. n. sp.; n. g. Ktenostilpnus.

Subarew, A. F. Bienenzucht (Russisch). 3. Auflage, St. Petersburg. 1900. 8°. 236 p. M. 5,—.

Sutro siehe Maeterlinck.

Szépligeti, Gy. (1). Braconiden aus Syrien und Palästina. Termész. Füzetek. 24. Bd. 1./2. Hft. p. 152. — 11 Sp., dar. n.: Bracon palaestinis.

- (2). Tropische Cenocoelioniden und Braconiden aus der Sammlung des Ungarischen Nationalmuseums Termész. vol. 24. P. 3./4. p. 353—402.

96 n. sp.; n. g.: Evaniodes, Evaniomorpha, Rhytimorpha, Stenobracon, Leptobracon und Liobracon.

- (3). A palaearktibus Braconidák meghatározó táblázatai. Potfuz. Termes. Kozl. vol. XXXIII. p. 174—184 u. 261—288.

- (4). siehe Mocsáry und Szépligeti.

Tanshin, W. Beiträge zur Bienenzucht des Nordens. Wie und wann kann man vorthelhaft Bienen züchten? Praktisches

Handbuch für Imker mit den nothwendigsten Kenntnissen für jeden, der sich mit Bienenzucht beschäftigt. (Russisch). Perm. 1901. 8°. 105 p. mit 1 Taf.

Terre, M. L. Titel p. 324 sub No. 4 des vorig. Berichts.

Die Histolyse des Fettkörpers bei der Biene ist nach den Versuchen Terre's eine Art Verdauung, eine chemische Degenerescenz. Sie ist ein von der leucocytären Phagocytose unabhängiger Process wie die Muskel-Histolyse. Wie bei den Muskeln ist auch hier diese Umbildung von der Karyolyse begleitet.

Thomann, H. Schmetterlinge und Ameisen. Beobachtungen einer Symbiose zwischen *Lycaena argus* L. und *Formica cinerea* Mayr. Jahresber. Ges. Graubünd., 44. Bd. p. 1—40, 1 Taf. Ausz. von Escherich, Zool. Centralbl., 1902, p. 89—91. — Auch: Symbiose de fourmis et de chenilles. Revue Scientif. (4) T. 15 No. 5 p. 153—154. — Referat: Prometheus 12. Bd. p. 431. — Ferner: Naturwissenschaftl. Wochenschrift N. F. 1 No. 20 p. 235.

Einleitung (p. 1—3). Entdeckung dieser Symbiose. Geschichtliches über die Symbiose zwischen beiden (1836, 1864, 1894). — 1. Ueber die Lebensweise der *Lycaena argus* L. (p. 4—6). — 2. Erste Beobachtungen über den Verkehr zwischen Raupen und Ameisen (p. 6—8). — 3. Die gegenseitigen Beziehungen zwischen *Lycaena argus* L. u. *Formica cinerea* Mayr. (p. 8 sq.) a) Ueber den Nutzen, der *Lycaena argus* L. aus der Symbiose erwächst (p. 8—13). Die Ameisen suchen die Raupen zu schützen. Die *Lycaena*-Puppen fand Verf. regelmässig in den Gängen und Nestern der sie besuchenden Ameisenart, also der *Formica cinerea* Mayr. (in Indien führen Ameisen die Raupen von *Tarucus theophrastus* Fabr. zur Verpuppung ins Nest). Nicéville's Beobachtung. b) Ueber den Nutzen, den die Ameise aus der Symbiose zieht (p. 13—17). Die Drüse am drittletzten Segment ist eine Art Honigdrüse. c) Ueber zwei weitere, mit der Symbiose in Beziehung stehende Organe der *Lycaenaraupe* (p. 17—21). Beschr. u. Abb. ders. Es handelt sich dabei um zwei, am Ende mit einem Kranz feiner u. steifer Börstchen versehener Tuben. Das Innere durchzieht ein nach unten sich verzweigender Kanal; de Niceville hält die Gebilde für bloss Signale für die Ameisen. Zum Furchteinjagen dienen sie nicht. Sie stehen vielmehr in irgend einem Zusammenhange mit der Honigdrüse u. in den jüngeren Stadien, da die Raupe den Feinden am meisten ausgesetzt ist, sind weder Tuben noch Honigdrüse wahrzunehmen.

Thormann's Untersuchungen bringen Verf. zu dem folgenden Schluss: Die in Frage kommenden Röhren sind zwei in voller Funktion stehende Organe, die als Duftorgan aufzufassen sind. Ob Tastorgan? — d) die Körperhaut der *Lycaenaraupe* in ihren Beziehungen zur Symbiose (p. 21—30). Eine genaue Untersuchung der Körperdecke der *Lycaena*-Raupe lehrt, dass dieselbe ein empfindliches Tastorgan darstellt, durch welches der Verkehr zwischen der Raupe u. ihrer Umgebung, und namentlich zwischen

ihr und den Ameisen gewissermassen vermittelt wird. — 4. Uebersicht über die mymecophilen Lepidopteren (p. 30—33). Liste nach Wasmann's Verzeichniss etc. Wir gelangen hierbei durch aufmerksame Verfolgung der einschlägigen Litteratur zu dem beinahe überraschenden Resultate, dass von unsern einheimischen Lycaeniden bereits bei vier Arten (*Lycaena argus* L., *L. dorylas* W. V., *L. Orion* Pall. u. *L. corydon* Poda) die Symbiose mit den Ameisen direkt beobachtet wurde und fünf weitere Arten bekannt sind, welche mit Wahrscheinlichkeit eine ähnliche Lebensweise führen. — 5. Die Stellung der Lycaeniden im Heere der Ameisengäste. Die Hauptklassen der Wasmann'schen Eintheilung. Symbiose der Lycaeniden. Leistung und Gegenleistung. Die Beziehungen der Lyc. zu ihren Wirthen sind viel engere als die der Blattläuse zu den Ameisen. Sie nehmen eine Sonderstellung ein. Schon die Art und Weise der Pflege ist eine andere; die Ameisen haben nichts mit der Ernährung ihres Schützlings zu thun. Das Verhältniss ist umgekehrt, die Ameise erhält Nahrung von der Raupe, während die myrmekoph. Käfer ihren Wirthen kein eigentliches Nahrungs-, sondern nur ein Genussmittel zu bieten vermögen.

Die Lycaeniden sind ferner ganz harmlose Thiere u. können dem Bestande der Ameisenkolonie garnicht schädlich werden. Wir haben hier einen Fall von wirklicher Gleichberechtigung u. echter Symbiose.

Litteraturverzeichniss über myrmekophile Lepidopteren (p. 38—39). a) Ueber myrmecophile Lycaeniden (17 Publ.). b) Ueber andere Lepidopteren (indifferent geduldete Einmieter [7 Publ.]). Erkl. d. Taf. p. 40. Querschnitt durch die Haut der Raupe, Längsschnitt, Tubus u. s. w.

Thompson (geb. 13. Okt. 1824, gest. 20. Sept. 1899). Biographie m. Porträt, Liste seiner sämmtl. Publikationen (73). Entom. Tidskr. 21. Årg. p. 1—11; p. 11—16. — Zahlr. Hym.-Arbeit.

Titus, E. G. (1). On some Bees of the Genus *Angochlora*. With 1 fig. Canad. Entom. vol. 33 No. 5 p. 133—137.

A. coloradensis, *cleomis* n. spp.

— (2). A new Genus in the *Coelioxinae*. Canad. Entom. vol. 33 p. 9, p. 256. — *Chrysopheon aurifuscus* n. sp.

— (3). Notes on the Genus *Osmia*. With 1 fig. Canad. Entom. vol. 33. No. 9 p. 257—258.

Tournier, H. Descriptions de quelques Hyménoptères d'Europe et confins. Bol. Soc. Españ. Hist. Nat. T. 1 No. 5 Juni p. 252—259. — 8 n. spp.

Trotter, A. Description de deux Cynipides nouveaux. Bull. Soc. Entom. France, 1901 No. 9 p. 175—176.

Cynips mediterranea u. *tomentosa*.

Trubnikoff, J. J. Leitfaden für russische Bienenzüchter. (Russisch). Moskau. 1900. 8°. 116 p.

Tryon, H. Harvesting Ants. Queensland Agric. Journ. 1900 p. 71—79. Abdruck einer Publikation von 1885. Bezieht sich auf austral. Insekten.

- (2). Caterpillar plague (*Leucania unipunctata* Haw.). t. c. p. 135—147, 3 pls. (CLXXII—CLXXIV).

Bringt auch die Hym.-Feinde dieses Lep.

- Tutt, J. W.** Our century number [Insecta]. Entom. Record, vol. XIII p. 1—79.

Bringt auch Hymenopt.-Berichte verschiedener Autoren: Morice, Morley, Poulton.

- Ule, E.** Ueber Ameisen-Gärten im Amazonen-Gebiet. Botan. Jahrb. 30 oder 31; siehe Nature, vol. 64 p. 553.

- Vachal, J.** Contributions hyménoptériques. II—V.. Hymenoptera mellifera americana nova. Ann. Soc. Entom. France, vol. 70, 1. Trim. p. 77—82. — II. [Forts. von Ann. Soc. Entom. France, 1899, p. 534—539. — Siehe im Bericht für 1899 p. 403]. Beschreibung von 15 n. sp. der folg. Gatt.: *Andrena* (1), *Halictus* (2), *Caupolicana* (1), *Pasiphaë* (2), *Prosopis* (9).

- Veth, H. J.** Twee anteekeningen. Tijdschr. v. Entomol. Nederl. Entom. Vereen. 43. D. 3/4. Af. p. 311.

Chlorida festiva L. — Apicultuur.

- Viereck, Henry L.** New Species of the Subfamily Pseninae. Trans. Amer. Ent. Soc. vol. 27 No. 4 p. 338—342. — 3 n. sp.; n. g. [n. nom.]: *Neofoxia*.

- Wainwright, Colbran, J.** (1). Observations on Sphecodes. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) March p. 72—73.

- (2). Diptera and Hymenoptera in Norfolk. The Entomologist, vol. 34 p. 201—203.

Sammelliste der erbeuteten Sp. aus beiden Ordnungen.

- Walker, F. A.** Hornets: British and Foreign. Journ. Vict. Instit. vol. XXXIII p. 362—392.

- Walton, L. B.** The metathoracic pterygota of the Hexapoda and their relation to the wings. American Naturalist, vol. 35, p. 357—362.

- Wasmann, E.** (1). Zum Orientirungsvermögen der Ameisen. Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. No. 2 p. 10—21, No. 3 p. 41—43.

p. 19—21. Bei vielen Arten ist hauptsächlich der Geruchssinn der leitende Faktor. Von einer Polarisierung der von den Ameisen hinterlassenen Fährte kann nicht die Rede sein, ebenso wenig von einer rein mechanischen „chemoreflektorischen“ Verfolgung der Fährte.

Die meisten Formica-Arten finden ihren Weg zurück, selbst wenn eine Strecke weit der Sand abgehoben u. die Stelle aller „Geruchsfährten“ völlig bar ist. Bei einer Beobachtungskolonie des Verf.'s betrug der Abstand zweier Nester 18 m. Bei einer Ueberaschung des einen Nestes flohen verschiedene Ameisen schnurstracks zum andern. Die psychologische Erklärung ist in einem besonders lebhaften Gedächtnisseindrucke zu suchen. Andere versteckten ihre Kokons in der Nähe. Hauptsächlich spielt der Gesichtssinn eine Rolle. Wasmann nimmt als für den ganzen Vorgang wahrscheinlich an: aus den einzelnen Gesichtseindrücken, welche

beim Verfolgen einer bestimmten Wegestrecke sich aneinanderreihen, entsteht ein in seinen Einzelheiten undeutliches, in seiner Gesamtheit jedoch sicher leitendes „Richtungsbild“, welches die Grundlage des „instinktiven“ Richtungsgefühls bildet (Beispiele hierfür auch beim Menschen.)

p. 41—44. Ueber Versuche, welche den Zweck haben, die Beteiligung des Gesichtssinnes der Ameisen an ihrem Orientirungsvermögen zu erforschen. Es ist dabei zu unterscheiden zwischen Reaktion der Ameisen auf Lichteindrücke u. zwischen ihrer Leitung durch jene Eindrücke. Versuche mit einem „Abfallnest“.

— (2). Neues über die zusammengesetzten Nester und gemischten Kolonien der Ameisen. Allgem. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 353—355, 369—371.

Allgem. Vorbem. Zuwachs des Beobachtungsmaterials seit 1891, seit dem Erscheinen des Wasmann'schen Buches: „Die zusammengesetzten Nester und gemischten Kolonien der Ameisen.“ I. Neue gesetzmässige Formen gemischter Kolonien bei den Gatt. *Polyergus* u. *Formica* (p. 353—355). 1. Ueberblick über die bisher bekannten Erscheinungen mit einigen neuen Beobachtungen. Die Kolonien der sogen. sklavenhaltenden Ameisen. Unter unseren nord- u. mitteleuropäischen Ameisen gehören hierher als Sklavenhalter die rothe Amazonenameise (*Polyergus rufescens* Latr.) u. die blutrote Raubameise (*Formica sanguinea* Latr.) Beide haben als gewöhnliche Sklaven die Arbeiterinnen von *Formica fusca* L. In Nordamerika hat *Polyergus lucidus* als normale Hilfsameise nach McCook die *Formica schaufussi* Mayr (hierunter wurden versch. Rassen v. *F. pallidefulva* zusammengefasst oder besser gesagt: *P. lucidus* u. wahrsch. auch *P. breviceps* besitzen als normale Hilfsameisen versch. Rassen (Subspecies) von *Formica pallidefulva* Latr. so *P. luc.* die *F. pallid.* subsp. *nitidiventris* Em. — Die nordamerik. Formen unserer *Formica sanguinea* Latr. (von Emery als *F. rubicunda* u. *subintegra* beschr.) haben als normale Hilfsameisen die nordamerik. Rassen unserer schwarzgrauen Sklavenameise (*F. fusca* L.) insbesondere die *F. subsericea* Say. — *Formica Pergandei*. Das beobachtete Nest (Nordamerika) war früher frei von dieser Form u. besass nur *F. pallidefulva*, wahrscheinlich wurde auf einem Raubzuge d. *F. Perg.* das Nest in Beschlag genommen. Raubnicht Bundeskolonie auf Grund der Verwandtschaft d. *F. Perg.* mit *sanguinea*. Wheeler theilt einen Fall mit, in dem *F. Perg.* die *Formica fusca* subsp. *neogagates* Em. als Hilfsameise hielt p. 369—371. 2. *Polyergus bicolor* n. subsp., eine neue Amazonenameise aus Wisconsin (p. 369—370). Nachtrag zu I, 1 u. 2 (p. 371).

Ergänzungen auf Grund der Wheeler'schen Schrift. The compound and mixed nests of American ants. Boston, 1901.

Formica sanguinea subsp. *rubicunda* Em. hat auch nach Wheeler's Beobacht. als gewöhnl. Sklavenart *F. subsericea*. Einmal fand er aber bei Rockford im Staate Illinois eine Kolonie, deren Hilfsameisen zu gleichen Theilen aus *Formica pallidefulva* Latr. subsp.

nitidiventris Em. u. *F. fusca* var. *subaenescens* Em. bestanden. — *F. rubicunda* var. *integra* Em. auch von Wheeler auf der Naushon-Insel (Massachusetts) mit *F. subsericea* als Hilfsameisen gefunden. *F. rub.* var. *subnuda* Em. hatte ebenfalls diese *F. subsericea* als Sklaven. — *F. sanguinea* subsp. *puberula* Em. aus Kolorado scheint nach McCook als Hilfsameisen theils die *F. Schaufussi* (bezw. *pallidiflava* Latr.), theils eine kleine Var. von *F. fusca* zu haben. Für *F. sanguinea* subsp. *obtusopilosa* Em. aus Neu-Mexiko sind die Hilfsameisen noch nicht festgestellt, wahrsch. werden sie den dortigen Rassen oder Var. von *F. fusca* entnommen. Bei der Gatt. *Polyergus* bemerkt Wheeler, dass die von McCook in Kolorado beobachtete Amazonenameise der subsp. *breviceps* Em. angehören. Als Sklaven nannte McCook *F. Schaufussi* etc., *Polyergus bicolor* var. *Foreli* Wheeler n. var.

- (3). Zur Kenntniss der myrmekophilen Antennophorus u. anderer auf Ameisen und Termiten reitender Acarinen. Zool. Anz. 25. Bd. No. 661 p. 66—76.

Hauptsächlich auf *Lasius* vorkommende Formen. p. 76 giebt ein einschlägiges Litteraturverzeichniss (11 Publikationen). — Im Uebrigen siehe in Lief. 2 dieses Bandes unter *Acarina*.

- (4). Zur Kenntniss der bosnischen Myrmekophilen und Ameisen. Wiss. Mittheil. Bosnien u. Herzegowina. Bd. 6. 1899 3 Fig. 6 p.

Von Hymenopt. werden aufgeführt: *Pachylomma buccata* Nees bei *Lasius flavus* Deg. u. *alienus*.

Ameisen ohne Gäste sind: *Polyergus rufescens* Latr., *Formica rufibarbis* F., *rufib.* var. *fusco-rufibarbis*, *gagates* Latr., *Plagiolepis pygmaea* Latr., *Tapinomma erraticum* Latr., *Ponera coarctata* Latr., *Myrmica laevinodis* Nyl., *Leptothorax tuberum* F. var. *unifasciatus* Latr.

- (5). Nervenphysiologie und Thierpsychologie. Biol. Centralbl. 21. Bd. p. 23—31.

W. sucht darin in aller Kürze klarzulegen, inwieweit er mit dem von Uexküll u. dessen Kollegen im Biol. Centralbl. 20 No. 15 möglichst klar formulirten u. durch philosoph. Gründe zu rechtfertigen gesuchten Standpunkt bezügl. der vergleich. Thierpsychologie übereinstimmt u. inwieweit er dieselben als unannehmbar hält.

Er macht darauf aufmerksam, dass mit Bethe eine völlige Verschiebung des ursprüngl. Fragepunktes (einer Kontroverse) stattgefunden hat. Kurze Darstellung dieser Verschiebung: Bethe: Analogieschluss auf dem Gebiete der vergleich. Psychologie nicht zu entbehren. Modifikationsvermögen. Wasmann's Widerlegung. v. Buttell-Reepen's ähnliche Resultate wie Wasmann. Auf die Einzelheiten u. die ihm theils zu weitgehend erscheinenden Nomenklaturvorschläge geht W. hier nicht ein. Er bespricht nur den Kern der Frage: Ist es berechtigt, die vergleichende Thierpsychologie auf die Nervenphysiologie zu beschränken und jede Anwendung des Analogieschlusses zur Erforschung der psychischen Vorgänge als

unwissenschaftlich zu verwerfen? Prüfung der Uexküll'schen Gründe. W. betont demgegenüber: Ein gesetzmässiger Causalzusammenhang zwischen physiologischem u. psychischem Geschehen ist nicht bloss möglich, sondern ist wirklich, wie durch die physiologische Psychologie mit Sicherheit bewiesen wird. Hiermit dürfte die Berechtigung, ja die logische Nothwendigkeit der Anwendung des Analogieschlusses in der vergleich. Physiologie klar bewiesen sein. Eine Ablehnung desselben führt zu unhaltb. Skepticismus. Erkennt man ihn prinzipiell an, so muss man auch zugeben, dass eine vorsichtige Anwendung desselb. in der vergleich. Thierphysiologie durchaus wissenschaftlich ist. Das „wie“ des gesetzmässigen Zusammenhanges zu erklären, welcher thatsächlich zwischen mechanisch-physiologischem und psychischem Geschehen besteht, bietet nicht geringe theoretische Schwierigkeiten. — Nothwendigkeit der Annahme einer Seele und einer substantiellen Einheit von Seele u. Leib im empfindenden Subjekte. Die Seele ist kein „altes Gerümpel“ (Uexküll).

Auf Uexküll's 3. Grund erwidert Wasm.: Wir vermögen über die Qualität der thierischen Empfindungen auf Grund der bisher. biolog. Methode sehr Vieles auszusagen, was von wissenschaftl. Werthe ist für die vergleichende Thierpsychologie. Belege: A Forel's „Fourmis de la Suisse“, J. Lubbock's „Observations on ants, bees and wasps“ u. Wasmann's „Psychische Fähigkeiten der Ameisen“. — In seiner 4. Begründung verwechselt Uexküll offenbar den psychol. Inhalt jener Begriffe mit dem nervenphysiolog. Inhalte ders. — Wasmann's Grundlage der Philosophie. — Die richtige Forschungsmethode in der vergleichenden Psychologie ist jene, welche den Mittelweg einhält zwischen zwei gleich gefährl. Extremen: zwischen der kritiklosen Vermenschlichung der thierischen Lebensäusserungen einerseits, u. der ausschliesslich mechanisch-physiologischen Erklärung ders. andererseits. Uexküll's neuester Versuch bestärkt W. wiederum in dieser Ansicht.

— (6). Biologie oder Ethologie. t. c. p. 391—400.

Verf. untersucht, ob der Begriff „Ethologie“ wirklich zutreffend ist. Ethologie, Oekologie. Nach dem Prioritätsgesetz muss der alte Name für den alten Begriff erhalten bleiben, während der neue Begriff einen neuen Namen bekommt. In Frankreich hat man sich seit Jahrzehnten daran gewöhnt, die Zellforschung, ja sogar vielfach die ganze mikroskopische Erforschung der Lebewesen als „Biologie“ zu bezeichnen, wobei „Cytologie“ die Lebensvorgänge der Zelle bezeichnete. Durch Weiterfassung wurde „Biologie“ ein Mischbegriff. In Deutschland ist er in der weiteren Fassung garnicht allgemein angenommen worden. Ethologie war also, als ein eigener Zweig der biolog. Wissenschaft, für unsere westl. Nachbarn nur eine logische Consequenz.

Vergleich des Begriffs Biologie mit Morphologie u. Definition einer Reihe von anderen Begriffen.

I. Das Sein der Organismen.

Morphologie. (Lehre von den Formen u. Formbestandtheilen der Organismen).

Wir unterscheiden nach verschiedenen Gesichtspunkten

- a) eine deskriptive, b) eine vergleichende,
oder
a) eine äussere (Hauptmaterial für die Systematik).

b) eine innere = Anatomie $\left\{ \begin{array}{l} \text{a) makroskopische} \\ \text{b) mikroskopische} \end{array} \right\}$ od. $\left\{ \begin{array}{l} \text{a) eigentl. topo-} \\ \text{graphische,} \\ \text{b) Gewebelehre} \\ \text{(Histologie),} \\ \text{c) Zellenlehre} \\ \text{(Cytologie).} \end{array} \right.$

II. Die Thätigkeit, Werden (= Lebensvorgänge) der Organismen:

- 1) Entwicklungsprozesse der Organismen. . . . A. Morphogenie.
- 2) Die äusseren Thätigkeiten der Organe als Individuen B. Biologie (im engeren Sinne).
- 3) Funktionen der einzelnen Organe, Gewebe und Zellen des Organismus C. Physiologie.

A. Morphogenie $\left\{ \begin{array}{l} \text{Phylogenie, Stammes-} \\ \text{gesch. d. Organismen.} \\ \text{Ontogenie, Individuelle } \left\{ \begin{array}{l} \text{Embryologie, Keimesgeschichte.} \\ \text{Entwicklungsgeschicht. } \left\{ \begin{array}{l} \text{Postembryonal-Entwicklung.} \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right.$

Je nach den Formbestandtheilen, deren Werden die Morphogenie untersucht, gliedert sie sich wiederum in 1) eine Morphogenie im engeren Sinne, 2) eine Histologie u. 3) eine Cytogenie.

Die beiden letzt. von der mechanistischen Seite betrachtet, bilden die Entwicklungsmechanik u. Entwicklungsdynamik der Organismen, von der vitalistischen Seite betrachtet, umschliessen sie die Gesetze der Kern- u. Zelltheilung u. der Befruchtung, die Bildungsgesetze der Gewebe und Organe u. s. w.

1. Entwicklungsprozess der Organismen A. Morphogenie.
- 2 Thätigkeiten d. $\left\{ \begin{array}{l} \text{1) Thätigkeit, die dem Organismus als} \\ \text{Ganzes zukommen B. Biologie.} \\ \text{2) Thätigkeiten (Lebens-Funktionen) der} \\ \text{einzelnen Theile C. Physiologie.} \end{array} \right.$

C. Physiologie $\left\{ \begin{array}{l} \text{der Organe} \\ \text{der Gewebe} \\ \text{der Zellen} \end{array} \right\}$ Betrachtungsweise vorwieg. physik.-chemisch.

Letztere ist ihrer Natur nach innig verwandt mit der Biophysik und der Biochemie und bildet die eigentliche Grundlage für

unsere philosophische Kenntniss vom Wesen des organischen Lebens. Die Biologie gehört in den Forschungsbereich der Physiologie. Letztere hat die Funktionen des vegetativen Lebens u. den Zusammenhang ders. mit den Funktionen des psychischen Lebens zum eigenthüml. Gegenstande. Die psychischen Prozesse gehören in die Psychologie. Die Biologie lässt sich also definiren: Die Biologie ist die Lehre von den äusseren Lebensthätigkeiten, die den Organismen als Individuen zukommen, u. die zugleich auch ihr Verhältniss zu den übrigen Organismen u. zu den anorganischen Existenzbedingungen regeln. Die Physiologie der Fortpflanzung beschäftigt sich in den Einzelheiten mit der Art der Fortpflanzung, ob auf geschlechtl. oder ungeschlechtl. Wege, ob Parthogenese oder Pädogenese etc. Hier greifen verschiedene Gebiete in einander. Die Biologie kann man eintheilen in Makrobiologie und Mikrobiologie, in beobachtende u. experimentelle B. Mikrobiologie ist die direkte Beobacht. des Lebens der kleinsten einzelligen Organismen. Cellularbiologie der Metazoen, bei denen die einzelnen Zellen ihren Charakter als selbständige Individuen verloren haben, ist nicht mehr Biologie im engeren Sinne. Das Formalobjekt dieser Zellenbiologie fällt zusammen mit Cytogenie (Studium der Entwicklungsvorgänge) u. Cytophysiology (Stud. der Ernährungsvorgänge u. anderer Lebensfunktionen der Zellen). Die Cytologie gliedert sich in Cytomorphologie, Cytogenie (einschl. Cytomechanik) u. Cytophysiology (einschl. Cytochemie), von Cytobiologie ist nur bei einzelligen Mikroorganismen zu reden.

Die Biologie im engeren Sinne umfasst 1) die Kunde von der Lebensweise der Thiere u. Pflanzen, von ihrer Ernährung, Wohnung, Fortpflanzung, Brutpflege u. Entwicklung, soweit dieselbe in die äussere Erscheinung fällt. 2. Die Kunde von den Lebensbeziehungen, welche die Individuen derselben Art untereinander u. mit anderen Arten verknüpfen (hierher sämmtl. Erscheinungen des Parasitismus, der Symbiose etc.) 3. Die Kunde von den Existenzbedingungen der Thiere und Pflanzen, welche zu ihrem Leben und ihrem Gedeihen erforderlich sind. Sachlich fällt die Biologie in engerem Sinne zusammen mit der Ethologie oder der Kunde von den Lebensgewohnheiten der Thiere. Der ältere Name „Biologie“ oder Lehre von der äusseren Lebensweise der Organismen ist beizubehalten.

— (7). Giebt es thatsächlich Arten, die heute noch in der Stammesentwicklung begriffen sind? Zugleich mit allgemeineren Bemerkungen über die Entwicklung der Myrmekophilie und Termitophilie und über das Wesen der Sympilie. t. c. p. 689—711, 737—752.

I. p. 689—691. Plate's Kritik der Fleischmann'schen Arbeit. Plate fürchtet, dass die „orthodoxe Theologie u. Philosophie“ sich dieses Buches mit grosser Freude bemächtigen werde u. dass die Schöpfungstheorie wieder in ihr Recht eintrete. Er sieht zu schwarz.

Seine Beweismittel, Variabilität der Arten, schaden nur. Die Erfahrungen der Systematiker lehren mit aller nur wünschenswerthen Deutlichkeit, dass die Arten sich gewöhnlich scharf umgrenzen lassen, weil die Variabilität sich meist nur innerhalb der Artgrenzen bewegt. Variabilität der gegenwärtig lebenden Fauna u. Flora in fast allen Fällen eine spezif. begrenzte, wie dies Delage (1895) treffend ausgedrückt hat. (Wiedergabe des Citats). — II. p. 691—711. Das Gesagte ist nur eine sachliche Mittheilung zu den folgenden Erörterungen. Sie soll das Missverständniss ausschliessen, als ob W. der Descendenztheorie absolut ablehnend gegenübersteht, weil er die normale Konstanz der organischen Arten als Thatsache erkennt. Lässt sich wirklich in einer Konstanzperiode die Umbildung neuer Arten unmittelbar beobachten? W. bietet eine Reihe zusammengehöriger Beispiele auf Grund eigener Beobachtung und Erfahrung an *Dinarda* (einer zu den Aleocharinen gehörig. Staphylgattung). Verf. findet, dass die 4 bek. Formen nicht einfachhin gleichwerthige Rassen sind, sondern Rassen, die auf verschiedenen Entwicklungsstufen zur Speciesbildung stehen. Wir haben in *Dinarda pygmaea* ein sehr anschauliches Beispiel von einer gegenwärtig noch sich vollziehenden Artbildung vor uns, die auf dem Wege der Varietätenbildung und Rassenbildung an verschiedenen Punkten ihres geograph. Verbreitungsgebietes verschieden weit vorangeschritten ist. Durch denselben Entwicklungsprozess muss aber auch die Differenzirung der übrig. zweifarb. *Dinarda* sowie die Differenzirung sämmtlicher *Dinarda*-Arten u. ursprünglich auch die Ausbildung des generischen Trutztypus von *Dinarda* erfolgt sein; denn wir brauchen dafür gar keine anderen Entwicklungsfaktoren anzunehmen als jene, welche heute noch thatsächlich für die Entwicklung von *Dinarda pygmaea* thätig sind. — Für die geographische Vertheilung der mitteleuropäischen *Dinarda* lassen sich folg. Sätze aufstellen:

- 1) *Formica fusco-rufibarbis* besitzt nicht in allen Theilen ihres geograph. Verbreitungsbezirks eine eigene *Dinarda*-Form, sondern nur in einigen, während sie in anderen Theilen ihres Gebietes verschiedene Uebergangsformen von *dentata* zu *pygmaea* beherbergt, in anderen Theilen endlich gar keine *Dinarda* als Gast hat. —
- 2) Auch *F. exsecta* besitzt nicht in allen Theilen ihres geogr. Verbr.-Bezirks eine eigene D.-Form, sondern nur in bestimmten Theilen desselben. —
- 3) Die Gebiete, in denen eine eigene D.-Form bei *F. fusco-rufibarbis* u. bei *F. exsecta* vorkommt, fallen wahrscheinlich zus. —
- 4) Dagegen ist *D. dentata* bei *F. sanguinea* u. *D. märkeli* bei *F. rufa* in ganz Mitteleuropa zu finden. Soweit dem Verf. bekannt, fehlen diese D.-Formen in kein. einzig. Theile des ungeheuren Verbreitungsgebietes dieser beid. paläarct. *Formica*-Arten. —
- 5) Die Anpassung v. *D. dentata* an *F. sang.* u. von *D. Märk.* an *F. rufa* trägt somit den Charakter der lokal. Allgemeinheit, während die Anpass. von *D. pygmaea* an *F. fusco-rufibarbis* u. von *D. Hagensi* an *F. exs.* den Charakter der lokalen Beschränktheit

zeigt. — 6) Die Anpassung von *D. dentata* an *F. sanguinea* u. von *D. Märk.* an *F. rufa* trägt somit das Gepräge eines höheren historischen Alters als die beiden letzt. Anpass. — 7) Es giebt somit in dem paläarkt. D.-Gebiete verschiedene Bezirke, in denen die spezifische Entwickl. der D.-Formen verschieden weit vorangeschritten ist. 8) Am weitest. fortgeschritten ist die specif. Entw. der D.-Formen in jenen Theilen des europ. Continentalgebietes, die am Ende der letzt. Eiszeit zuerst eis- u. meeresfrei wurden (Rheinthal oberhalb des Siebengebirges, Niederösterreich, Schlesien, Böhmen u. s. w.). Am wenigsten weit fortgeschritten ist sie dagegen in jen. Gebieten, die am längst. vom Gletschereis einerseits u. vom Meereis andererseits bedeckt blieben (Centralalpen u. nordwestl. Küsten von Mitteleuropa). Zwisch. dies. extrem. Gebieten liegen die Uebergangsgebiete, in denen die Vertheilung der D.-Formen durch Anpassung an die betreffenden Wirthe erst jetzt sich allmählich vollzieht. (z. B. Holländisch-Limburg, Nordseeküste etc.) — No. 8 zwar hypothetisch, aber sachlich begründet und sachlich verificirbar. — Auf entwicklungstheoretische Hypothesen darf die denkende Naturforschung nicht verzichten, sonst wird sie ein blosses Thatsachenmagazin. Tabelle zur Veranschaulichung der natürl. Verwandtschaft u. der Phylogenese der zur Gruppe der Dinardini gehörigen Formen (p. 707). Entwicklung der zeitlich. Aufeinanderfolge der Dinardini (p. 708—711).

III. p. 737—740. Verf. macht darin auf einige (8) Punkte von allgemeiner Bedeutung aufmerksam, welche die Entwicklungstheorie betreffen u. auf welche er bei seinen Beobachtungen u. Studien über Myrmekophilen u. Termitophilen gelegentlich aufmerksam wurde. 1) Convergencescheinungen zwisch. den neotrop. u. äthiopischen Dorylinengästen. — 2) Entwicklungsfaktoren für die Differenzirung der Gäste des Mimikrytypus. — 3) Entwicklungsfakt. für die Convergence zwischen manchen Gästen von verschied. biolog. Typus. — 4) Vergleich der neotrop. Eciton-Gäste m. den gleichfalls neotrop. Atta-Gästen u. Ergebnisse. — 5) Bethheiligung der Natúrauslese bei der Entwickl. der verschied. biolog. Kategorien der Myrmekophilie u. Termitophilie eine sehr verschiedene. Verhältnis der Symphilie zur Selektionstheorie. — 6) Bei der Symphilie erscheint eine neue Form der Selektion, welche grossentheils an die Stelle der bloss negativ wirkenden Natúrauslese tritt, die nur das minder Passende beseitigt. Dagegen ist die neue Selektion eine von den Wirthen (Anaisen oder Termiten) ausgeübte positiv wirkende Auslese, die Wasmann als Amicalselektion bezeichnet. Sie beruht auf dem Adoptionsinstinkt der betreffenden Wirthe. — 7) Diese Amicalselektion wurde von der Naturselektion insofern unterstützt, als letztere zu gleicher Zeit die Widerstandsfähigkeit der Gäste gegen ihre oftmals gewaltsame Behandlung von seiten der Wirthe erhöhte u. indem sie überhaupt die Entwicklung jener Charaktere bei den Gästen förderte, welche kein Gegenstand der Amicalselektion sein konnten, aber dennoch für die Symphilie indirekt

nützlich waren. — 8) In anderer Beziehung wirkte dagegen die Amicalselektion der Naturselektion direkt entgegen u. trug über sie den Sieg davon durch Ausbildung der Symphilie zu den verderblichsten Brutparasiten. Aus diesem Antagonismus zwischen Amicalselektion u. Naturalselektion u. aus dem Siege der ersteren über die letztere erklärt sich der scheinbare Widerspruch, dass die Ameisen in manchen ihrer echten Gäste (besonders aus den Gatt. *Lomechusa* u. *Atemeles*) ihre grössten Feinde gezüchtet haben u. noch gegenwärtig züchten.

IV. p. 740—750. Gegen Escherich (Zool. Centralbl. 1899, No. p. 17—18). Auch die Symphilie ist nichts anderes als eine parasitäre Infektionskrankheit. Wasm.'s Gründe. 1) Das Grundprinzip der E.'schen Beweissführung ist nicht allgemein giltig. — 2) Vergleich des erblichen Instinkts mit Schafen, welche zufällig mit Cercarien besetzte Pflanzen fressen oder mit einer parasitären toxotischen Krankheit ist unverständlich. — 3) „Symphilie nichts anderes als eine parasitäre Infektionskrankheit“ ist unhaltbar. Nicht der allgemeine Adoptionstrieb sondern ganz bestimmte specif. Instinkte, welche sämmtl. Kolonien einer Art oder einer Rasse eigen sind, bilden die nächste Grundlage der Symphilie. *Formica* sang. frisst den *Atemeles* emarg. einfach auf, statt ihn zu pflegen, nur *Form. fusca* thut es etc. Die eigenthümlichen Anpassungscharaktere der Symphilen an ihre betreff. Wirthe sind ja, soweit es sich um wirklich symphile Charaktere handelt, als ein positives Produkt der Amicalsektion zu betrachten. Verf. geht dann auf das Wesen der Symphilie näher ein. Wesen derselben: Gastliche Pflege; nahe verwandt damit ist das biolog. Band, das die Ameisen mit den Aphiden, Cocciden etc. u. den „Honigraupen“ verbindet (siehe Thomann). Beispiele in Anm. Die Beziehung, in welcher der Parasitismus zur Symphilie steht, kann eine doppelte sein, ersterer oder letztere können das primäre, resp. secundäre Verhältniss sein, doch bleiben beide wesentlich verschiedene biologische Beziehungen. Das Wesen der S. kann nie und nimmer zu einer „parasitären Infektionskrankheit“ werden. Der krankhafte Zustand der betreff. Kolonien würde stets nur eine sekundäre Folge der S. sein u. an dem Wesen ders. garnichts ändern. Die Symphilie würde trotzdem ein echtes Gastverhältniss bleiben. Schliesslich erklärt für diesen Fall Wasmann die Descendenztheorie als die beste Erklärung der Thatsachen, ohne die man hier nicht fertig wird. Er wahrt sich aber dagegen, ihr auch dort mit allen „Consequenzen“ u. „Postulaten“ beizupflichten, wo sie nicht bewiesen ist. Litteraturverzeichniss: 32 Publ. (p. 750—752). — Nachtrag: 1. Ueber *Dinarda clavigera* Fol. 2. Zur Stammesentwicklung der *Dinardini* (p. 752).

— (8). Titel p. 325 sub No. 1 des vor. Berichts wird von Dr. Chr. Schröder in: Allgem. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 15 besprochen.

— (9). Titel p. 326 sub No. 2 des vorigen Berichts.

Einleitung (p. 216—217). Biologische Eigenthümlichkeiten der Dorylinen u. ihre Gäste (Kenntniss der letzteren seit 1887 datirend). — In folg. werden beschr. von Gästen Coleoptera: Staphylinidae, 7 n. g., 17 n. sp.; Acarina, Gamasidae, 2 n. sp.

I. Neue Eciton-Gäste aus Brasilien (p. 218—256). —

1. Ecitogaster schmalzi n. g., n. sp., ein Eciton-Gast des Symphilentypus (p. 218—224). — 2. Ecitophya (n. g.) simulans Wasm. (p. 224—231). — 3. Ecitoxenia mirabilis n. g., n. sp. (p. 231—233). — 4. Ecitodolus crassicornis n. g. n. sp. (p. 233—235). — 5. Tetradonia goeldii n. sp. (p. 235—237). — 6. Ecitopora major n. sp. (237—239), Tabelle der Ecitopora-Arten (p. 238). — Myrmedonia legionis n. sp. (p. 239—240). — 8. Aleochara densula Tol. i. l. n. sp. (p. 240—241). — 9. Zur Kenntniss der Gattung Xenocephalus Wasm. (p. 241—244). — 10. Xenocephalus schmalzi n. sp. (p. 242—243). — 11. X. limulus n. sp. (p. 243—244). — 12. X. goeldii n. sp. (p. 244—245.) — 13. Ecitoxenus heyeri n. g. n. sp. (p. 245—247). — 14. Zur Kenntniss der Gatt. Ecitonides Wasm., Ecitonides longiceps n. sp. u. brevicornis n. sp. (p. 247—250). — 15. Teratosoma longipes Lew., ein Eciton-Gast des Symphilentypus (p. 250—254). — 16. Antennophorus barbatus n. sp. (p. 254—256). — 17. Laelaps ecitonis n. sp. (p. 256).

II. Neue Gäste der afrikanischen Treiberameisen. (Anomma) (p. 257—266). 18. Sympolemon anommatis n. g. n. sp., ein Anomma-Gast des Symphilentypus „der Treiberameise Kriegskamerad“ (p. 258—263). — 19. Doryloxenus lujae n. sp. (p. 263—266).

III. Ein neuer Gast von Dorylus helvolus L. aus Süd-Afrika. 20. Dorylostethus raffrayi Brauns i. l. n. sp. (p. 266—268).

IV. Ein neuer Aenictus-Gast aus Süd-Afrika. 21. Aenictonia cornigera n. g. n. sp. (p. 268—270).

V. Verzeichniss der bisher bekannt gewordenen Dorylinen-Gäste, nach den Faunengebieten und den Wirthsameisen geordnet (p. 271—275). A. *Neotropisches Gebiet* (Eciton-Gäste). I. Brasilien. Bei Eciton foreli Mayr (hamatum autorum): 15. — Bei Eciton quadriglume Haliday: 7. — Bei Eciton praedator F. Sm. (omnivorum autorum): 20. — Bei coecum Latr.: 3. — Bei Eciton legionis F. Smith: 4. — II. Mittelamerika: Eciton Sp.: 1. — Nordamerika: Bei Eciton californicum subsp. opacithorax Em.: 2. — Bei E. carolinense Em.: 1. Bemerk. dazu. — B. *Mediterranes Gebiet*. Bei Dorylus juvenulus Shuck.: 1. — C. *Aethiopesches Gebiet*. Bei Dorylus helvolus L.: 10. — Bei Dorylus (subg. Anomma) wilwerthi Em.: 2. — Bei Aenictus eugenii Em.: 2.

Unter den obigen afrikanischen Dorylinengästen ist der Symphilentypus vertreten durch Sympolemon, der Mimicrytypus durch Dorylostethus u. Dorylobius, der Trutztypus (Schutzdachtypus) durch Doryloxenus, Pygostenus u. Trilobitidens. Die Doryl.-Gäste des äthiop. Gebietes sind erst fragmentär bekannt.

VI. Vergleich zwischen den Dorylinengästen des neotropischen u. des äthiop. Faunengebiets (p. 275—281).

Ein Vergleich der Eciton-Gäste Amerikas mit den Dorylus-, Anomma- u. Aenictus-Gästen Afrikas auf Grund des sub V gegebenen Verzeichnisses ergibt: 1) Nur die kosmopolitische Gatt. Myrmedonia ist als gemeinschaftl. Element in der Dorylinen-Fauna beider Welttheile vertreten. Diese Gatt. liefert auch ein beträchtl. Contingent zur Termitophilenfauna Afrikas u. Ostindiens. — 2) Bei den Gatt., welche zum Mimicrytypus, zum Symphilentypus u. zum Trutztypus der Doryl.-Gäste gehören, ist keine nähere system. Verwandtschaft zwischen den betreff. Vertretern der alten u. neuen Welt, obgleich eine Abzweigung von einer gemeinsamen Stammform nicht ausgeschlossen ist. — 3. Trotzdem zeigen die 3 genannten Typen der Doryl.-Gäste der alten und neuen Welt vielfach auffallend analoge Formen, welche aus der durch die analoge Lebensweise bedingten analogen Entwicklungsrichtung ihrer Anpassungscharaktere erklärlich sind. Beispiele:

	Neotropisch.	Aethiopisch.
Mimicrytypus:	Mimeciton, Ecitomorpha, Ecitomorpha.	Dorylostethus, Dorylobius.
Symphilentypus:	Ecitogaster.	Sympolemon.
Trutztypus (Schutzdachtypus).	Xenocephalini (Xenocephalus), Cephaloplectus, Ecitoxenus.	Pygostenini (Pygostenus, Doryloxenus, Mimacete).

Völlig isolirt steht als hochgradigster Vertreter des Trutztypus der Dorylinengäste Afr.'s das einer Silphidenlarve gleichende, völlig aberrante Staphilinidengenus Trilobitidens Raffray; ein Analogon aus der neotrop. Doryl.-Fauna fehlt. — 4. Vergleicht man die Eciton-Gäste des Mimicrytypus unter einander, so zeigt sich, dass die Vertreter dieser Typus sogar bei den Arten derselb. Wirtsgattung meist ganz verschiedenen Gatt. angehören, die unter sich nicht näher verwandt sind, sondern blos analoge Formen darstellen, welche durch die Analogie der Lebensweise bedingt sind. Beispiele. Im Allgemeinen kann man sagen: eine je höhere Stufe der Mimicrytypus erreicht, desto exclusiver ist auch seine systematische Eigenschaft gegenüber den analogen Formen desselb. Typus, welche bei anderen Spp. u. bei anderen Gattungen von Dorylinen leben. — 5. Ganz anders liegen die Verhältnisse bei den zum Trutztypus (Schutzdachtypus) gehörigen Dorylinengästen. Ein Vergleich derselben lehrt, dass alle zu einer eigenen systemat. Unterfamilie, den Xenocephalini (Cephaloplectini) gehören.

Ebenso bilden die altweltl. Dorylinengäste desselben Typus eine eigene system. Unterfamilie, die Pygostenini. Bei diesen beiden Gruppen geht somit die biolog. Differenzirung Hand in Hand mit der system. (natürlichen) Verwandtschaft, indem beide Gruppen eine allen ihren Vertretern gemeinsame Summe von hochgradigen Anpassungscharakteren aufweisen, welche dieselben auch zu je einer natürlichen systemat. Abtheilung vereinigt u. für dieselben überdies je einen gemeinsamen monophyletischen Ursprung wahr-

scheinlich macht. Weitere Begründung der Ansicht u. s. w. — 6. Eine sonderbare Eigenthümlichkeit mancher äthiop. Dorylinengäste sowohl des Symphilentypus (*Sympolemon*) wie des Trutztypus (*Doryloxenus*) ist die Verkrümmung der Tarsen, welche scheinbar ungegliedert u. mit langen Stachelborsten u. Hafthaaren besetzt sind, woraus wir schliessen müssen, dass diese Thiere ihre Wirthe als Reittiere benutzen, um denselben folgen zu können. Bei neotrop. Doryl.-Gästen findet sich niemals solche Umbildung, höchstens ist bei manchen kleinen Gästen (*Ecitochara* u. *Ecitophila*) das Klauenglied stark entwickelt, wodurch sie sich an die Brust der Wirthe anklammern können. — 7. Die Mimicry ist bei sämtlichen Dorylinengästen des Mimicrytypus primär auf die Täuschung des Fühlertastsinnes der Wirthe berechnet. Sie äussert sich daher in der Aehnlichkeit der Sculptur u. Behaarung, der wirklichen Form der einzeln. Körperabschnitte, wobei besonders der verlängerte Kopf auffällt, und endlich in der Gleichheit der Fühlerbildung von Gast u. Wirth (typ. Beispiele: *Mimeciton*, *Ecitophya*, *Dorylostethus*). Secundär tritt dazu bei den Gästen jener Eciton-Arten, welche relativ gut entwickelte Augen (Ocellen) besitzen (z. B. *Eciton foreli*, *quadriglume*, *legionis*), auch eine gesetzmässige Aehnlichkeit der Färbung zwischen Gast und Wirth; sobald die Wirthe blind sind fehlt sie. — 8. Ein Vergleich der Fauna der Dorylinengäste mit der übrigen Myrmekophilenfauna zeigt ein stark numerisches Ueberwiegen der Staphyliniden. Von den in obiger Liste aufgeführten 67 Dorylinengästen sind 61 Coleopt., darunter 56 Staphyliniden, während andere Coleopterenfamilien (z. B. Paussidae, Clavigeridae), welche zur übrigen Myrmecophylenfauna der altweltl. Tropen ein beträchtl. Contingent stellen, völlig fehlen oder (*Lathridiidae*) nur schwach vertreten sind. An zweiter Stelle kommen wenigstens unter den neotrop. Dorylinengästen die Histeriden. Das Ueberwiegen der Staphylin. erklärt sich aus dem Umstand, dass sie die beweglichsten u. biologisch schmiegsamsten Coleopterenformen enthalten, welche sich an die unstete Lebensweise u. unersättliche Raubgier der Wirthe viel besser anzupassen vermochten als andere Coleopt. — 9. Unter den bisher bekannt gewordenen Dorylinengästen ist eine Histeride, *Teratosoma longipes*, die einzige, die hochgradig entwickelte, denen unserer *Lomechusa* völlig analoge, gelbe Haarbüschel besitzt, während unter der sehr gross. Zahl der mit Dorylin. in Symbiose lebend. Staphyliniden nur wenige als Symphilen zu betrachten sind (*Ecitogaster*, *Ecitophya*, *Sympolemon*). Bei diesen sind die Exsudatrichome viel schwächer entwickelt. In der arktisch. u. nearkt. Myrmekophilenfauna ist das Gegentheil der Fall. Muthmassliche Erklärung dieser Erscheinung. Bei den Gästen dieser unsteten u. kampflustigen Formen war eine Anpassung viel schwieriger. Es waren vor allem Schutzvorrichtungen nötig: 1) Ausgesprochener Trutztypus (*Schutzdachtypus*, *Xenocephalini*, *Pygostenini*). 2) Den Fühlertastsinn täuschende Mimicry. 3) Durch solide Fühlerkeule, durch Furchen u. Kiele

des Halsschildes u. der Flügeldecken allseitig geschützte Symphilio (*Ecitogaster*, *Sympolemon*). Bei den ecitophilen Histeriden war eher die Möglichkeit zu einem Verhältniss von Symphilio gegeben, zumal ihr Körper schon von Haus aus geschützt ist. Die obigen Reflexionen über die Entwicklung der zwischen den Dorylinengästen u. ihren Wirthen bestehenden biologischen Beziehungen sind zwar theilweise hypothetischer Natur, beruhen aber immerhin auf einer genügenden thatsächlichen Basis um in den Bereich wissenschaftl. Forschung gezogen zu werden.

VII. Nachtrag (p. 281—286).

Für jene physogastrer Termitophilen (z. B. *Orthogonius*-Larven), wo die äussersten Fettgewebsschichten unter der Hypodermis von breiten Blutmassen umspült werden u. keine speciellen Hautdrüsen nachweisbar sind, ist die von Wasmann aufgestellte Hypothese, dass das Exsudat der Symphilen Blutflüssigkeit sei, wahrscheinlicher als für seine hartschaligen Coleopteren (*Lomechusa*, *Paussus* etc.), bei denen die Verbindung der Fettgewebsschichten mit den äusseren Exsudatororganen meist durch verschiedene Formen von Hautdrüsen vermittelt wird. Aber auch in letzterem Falle dürfte das Exsudat ein Fettprodukt sein. Weiteres soll in einer späteren Arbeit folgen.

Zu Seite 254: *Antennophorus raffrayi* p. 282. — Zu Seite 272: *Xantholinus* (*Eulissus*) *badariottii* n. sp. — Zu Seite 273: Ad Liste Nordamerika: Bei *Eciton nigrescens* Cress. 3 Gäste, darunter 2 neue Staphylin., deren Beschreib. (p. 283—285) folgt: *Ecitonidia* n. g. *Aleocharinorum* mit *wheeleri* n. sp. u. *Ecitopora tenella* n. sp. — Vergleich zwischen den nordamerikanischen u. den brasilianischen *Eciton*-Gästen (p. 285—286). Die bisher bek. ecitophilen Staphylin. des *Mimicrytypus* aus Nordamerika stehen in kein. näheren system. Verwandtschaft m. den brasilian. Vertretern (*Ecitonusa*, *Ecitonidia*). Sie stellen analoge, aber schwächer differenzierte Stufen jenes biolog. Typus dar u. sind auch unter einander systematisch näher verwandt als die brasil. *Eciton*-Gäste des *Mimicrytypus* u. s. w. Es ergeben sich daraus folg. Schlüsse: a) Die *Eciton*-Gäste von Nordamerika sind wahrscheinlich autochthonen Ursprungs, nicht mit dem *Eciton* eingewandert, sondern diesen erst später angepasst. b) Die Dauer ihrer Symbiose ist noch nicht so alt wie bei den südamerikanischen *Ecitophilen*. Anhang (p. 286—287): Forts. des in *Zoologica*, Hft. 26, p. 132 enthaltenen Verzeichnisses der Publikationen des Autors. No. 95—113. — Erklärung der Abb. p. 288—289.

Webster, W. B. Book of Bee-keeping: Practical and Complete Manual on proper management of Bees. 2. edit. London, L. U. Gill, 1901. 8°. 1 s.

Wegweiser, Praktischer, für Bienenzüchter. Redacteur: A. Hintz. Oranienburg. Gr. 8° m. Abbildungen. — Jahrgang VI. 1901. (24 Hefte.) M 2,50.

Weismann, A. (1). Titel p. 327 des vorig. Berichts. Ausz. von R. Fick. Zool. Centralbl. 8. Jhg. No. 5/6. p. 173—174.
— Abstr.: American Naturalist, vol. 35, March p. 231—233.

Bericht über die Fortsetzung der in seinem Institute seit drei Jahren ausgeführten Untersuchungen über die Bienenparthenogenese. Paulcke hatte die Ergebnisse seiner Untersuchungen bereits 1899 u. 1900 (Titel p. 315 u. 316 u. 353 pp.) niedergelegt, hat aber einige Lücken u. Unsicherheiten nicht richtigstellen können, da er sich der Geologie zugewandt hat. Weismann u. Petrunkevitch haben die Lücken beseitigt. Das Material lieferte in liebenswürdigster Weise der Gegner Dickel. Petrunkevitch untersuchte Serienschritte von Arbeiterzellen im Stadium der ersten Richtungsspindel u. fand in 23 von 29 Eiern aus Arbeiterzellen (also 79%) eine Samenstrahlung, in 94 Eiern aus Drohnenzellen keine. Im Stadium der zweiten Richtungsspindel fand sich in 62 Eiern aus Arbeiterzellen u. zwar in allen Samenstrahlung, unter 272 Drohnen-Eiern nur einmal eine solche (ob Irrthum der Königin?). Dickel stellte die Forscher auf die Probe durch Vertauschung der Etiketten. P. war über den Befund von Samenstrahlung in Drohnenzelleneiern sehr erstaunt u. erhielt nach einer Reise zu Dickel die nöthige Aufklärung.

Wir können es wohl jetzt als erwiesen betrachten, dass thatsächlich normalerweise alle Drohnenzellen unbefruchtete Eier, die Arbeiterzellen befruchtete enthalten, also die Dzierzon-Leukart'sche Lehre zu Recht besteht. Die Bespeichelung der Eier für die Entwicklung ist allerdings auch wesentlich, wie Dickel nachwies, denn Eier, die durch ein feines Gacnetz von der Bespeichelung abgeschlossen waren, gingen alle, wenn auch oft erst in späten Embryonalstadien zu Grunde. Das Geschlecht wird also durch die Befruchtung bestimmt, Ausbleiben derselben erzeugt männliche Entwicklung. Qualität u. Quantität der Nahrung, vielleicht auch Bespeichelung, bestimmen ob Arbeiterin oder Königin. Gleiche Einflüsse bestimmen wohl auch die Geschlechtsform bei den Termiten. Die Nahrung spielt bei diesen Thier wohl hierbei keine Rolle.

Dickel behauptet sub 3 u. 4 (siehe p. 309—311 dieses Berichts) u. a. „in die in Bienen- (Arbeiterin-) Zellen abgesetzten Eier treten überhaupt keine Spermatozoen, sondern nur Abkömmlinge solcher ein, die sich in der Samenblase der Mutterbienen bilden.“ Nach seiner Ansicht wirkt nicht die Befruchtung, sondern das Sekret gewisser Drüsen der Bienen bestimmend auf das Geschlecht. Weismann dagegen hält seine im Zool. Centralbl. 8. Bd. No. 173 besprochenen Untersuchungs-Ergebnisse für beweiskräftig zu Gunsten der Dzierzon'schen Theorie, deren Details durch die demnächst erscheinende Arbeit Petrunkevitch's bewiesen werden soll. Weismann giebt zu, dass es vielleicht nicht die Befruchtung ist, die den entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung hat, sondern, dass es vielleicht andere Umstände (verschiedene Bespeichelung u. s. w.) sein

können, die endgültig auf die Bestimmung des Geschlechts wirken. Dagegen spricht aber die Thatsache, dass aus von Arbeiterinnen abgelegten Eiern, die doch stets unbefruchtet sind, immer nur Männchen hervorgehen. Es scheint den Arbeiterinnen also nicht möglich zu sein, durch andere Bespeichelung aus den unbefruchteten Eiern Weibchen zu ziehen, während sie aus befruchteten (aus denen sonst Arbeiter hervorgehen) Königinnen erziehen können.

— (2). Ueber die Dzierzon'sche Theorie. Ausz. von Chr. Schröder. Allgem. f. Zeitschr. Entom. 6. Bd. No. 19. p. 300.

— (3). siehe Dickel.

Wenn Dickel's Vermutung richtig wäre, wenn die Arbeiterinnen es wirklich in der Hand hätten durch Secret gewisser Drüsen ein Ei zur Männlichkeit oder zur Weiblichkeit zu bestimmen, dann müsste man erwarten, dass sie in kritischen Lagen (bei Ablage von Eiern von einer Arbeitsbiene) von dieser Fähigkeit Gebrauch machen würden, so wie sie ja auch von ihrer Fähigkeit junge Arbeiterinnenlarven durch eine besondere Fütterungsmethode zu Königinnen umzubilden, Gebrauch machen.

Weith, R. J. A Protest. Canad. Entom. vol. 33, No. 9, p. 263.

Wendet sich gegen die Aenderung der Nomenclatur der Hymenopteren.

de Weld. Siehe Le Roy.

Westerlund, A. 1900. Künka *Bombus alkaa pesärakenteensa*. Meddel. Soc. Fauna Flora Fenn. 24. Heft, p. 103—105. — Ausz. Das Betragen von *B. pratorum* und *agrorum* *ibid.* p. 183.

Wheeler, F. D. *Macrogaster arundinis* in Norfolk. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) Jan. p. 14.

Wheeler, Wm. Morton. (1). The Compound and Mixed Nests of American Ants. Part. I. Observations on a new Guest Ant. With 9 figs. Amer. Naturalist, vol. 35, June, p. 431—448. — *Leptothorax Emersoni* n. sp.

Die Symbiose zwischen zwei Ameisen. Ausz. Insekten-Börse, 18. Jhg. No. 48 p. 381. — La symbiose chez les fourmis. Extr. Revue Scientif. (4.) T. 16 No. 6 p. 185—186. Dass. auch im Ausz. La vie sociale des fourmis. Revue Scient. (4.) T. 16 No. 19 p. 599—600. — Weitere Auszüge: Krause, E., Prometheus, No. 619, 12. Jhg. No 47. p. 747—748. — P. Speiser, Allgem. Zeitschrift f. Entom. 6. Bd. No. 14/15. p. 233.

Es handelt sich hierbei um *Myrmica brevinodis* Emery u. *Leptothorax emersoni* Wheeler n. sp., die beide in demselben Nest gefunden u. deren Lebensweise in einem künstlichen Lubbock'schen Neste beobachtet wurde. Sobald das Nest eingesetzt war, brachten die Ameisen beider Arten ihre Larven u. Puppen in Sicherheit, jede die der ihrigen Art, wechselseitige Fälle waren selten. Einige Arbeiterinnen hatten bald die Schale mit Syrup entdeckt, von dem sie ihnen sie begnenden Genossen mittheilten. Kaum hatte eine

Arbeiterin von *Leptothorax* dies bemerkt, als sie sofort auf den Rücken eines *Myrmica*-Weibchens stieg u. es eifrig leckte. Die *Myrmica* lies darauf einen Tropfen süßer Flüssigkeit aus ihrem Munde heraustreten, der von *Leptothorax* gierig aufgesogen wurde. Bald verliess die *Leptothorax* die *Myrmica* und stieg auf den Rücken einer anderen, woselbst sich das gleiche Manöver wiederholte. Niemals aber machte sich eine *Leptothorax* an ein Männchen oder eine Königin von *Myrmica*. Kampf zwischen beiden Arten wurde nie beobachtet. Jede Species bewohnte einen besonderen Theil des Nestes. Zuweilen kam auch eine *Myrmica* in das Nest der *Leptothorax*, doch wurde sie bald in freundlicher Weise hinauscomplimentirt. Ein Vorteil der Nachbarschaft zwischen beiden Arten erscheint für *Myrmica* fraglich. Man könnte eher von einem Nachtheil reden, da den *Myrmica* u. ihren Larven durch die Befreundung mit *Leptothorax* Nahrung entzogen wird.

— (2). *Idem*. Part. II. With 5 (10) figs. t. c. vol. 35. July p. 513—539, Sept. p. 701—724.

II. p. 513—539. The known cases of social Symbiosis among American Ants. Wiedergabe der Wasmann'schen Tabelle (aus seiner Arbeit: Zusammengesetzte Nester etc. 1891. p. 176—178) p. 514—516 (englisch). Im logischen Aufbau lässt die Tabelle nichts zu wünschen übrig, dagegen ist sie kaum noch ein adäquater Ausdruck für die Thatfachen, wie sie gegenwärtig bekannt sind, was auch weiter nicht verwunderlich ist, da seitdem über ein Dezennium vergangen ist. Es scheint Wheeler rathsamer, eine natürliche Gruppierung vorzunehmen, selbst auf die Gefahr hin die Zahl der Kategorien zu vermehren. Er unterscheidet:

I. Plesiobiosis. Doppelnester (im Forel'schen Sinne); Wasmann's zufällige Formen von zusammengesetzten Nestern (A I, 1 u. 2).

II. Parabiosis (Forel 1899). Nicht in Wasmann's Tabelle enthalten.

III. Cleptobiosis. Wasmann's „Diebsameisen“; erste reguläre Form des zusammengesetzten Nestes (A II, 1).

IV. Xenobiosis. Inquilinen; Wasmann's „Gastameisen“; zweite reguläre Form des zusammengesetzten Nestes (A II, 2).

V. Dulosis. Sklaverei („Esclavagisme“ Forel). Wasmann's normale Formen gemischter Kolonien (B I, 1 u. 2).

VI. Colacobiosis. Socialer Parasitismus (Forel); Wasmann's dritter Fall von normalen gemischten Kolonien (B I, 3).

VII. Synclerobiosis. Gemischte Nester ungewissen Ursprungs u. Zwecks. Wasmann's letzte Form (B II, 3c) zufälliger (abnormer) gemischter Kolonien.

B II, 1, 2 in Wasm.'s Tab. (zufäll. künstl. gemischte Kolonien durch Annahme an Kindesstatt u. durch Raub [in Gefangenschaft]) fehlen darin, weil noch wenig untersucht. — Erläuterung u. Besprechung der einzelnen Begriffe. I. Plesiobiosis (p. 517—524). Zwei Reihen von Doppelnestern. — 1. *Myrmecina graminicola*

Förster (p. 519). 2. *Leptothorax muscorum* Nyl. (p. 519—520). 3. *Monomorium minutum* Mayr., var. *mininum* Buckley (p. 521). 4. *Forelius foetidus* Buckley (= *Forelius mccooki* Forel) (p. 521—522). 5. *Dorymyrmex pyramicus* Roger (p. 521—522). 6. *Dorymyrmex pyramicus* Roger var. *flavus* Mc Cook (p. 522). — *Pheidole carbonaria* Pergande subsp. *calens* Forel (p. 523). — 8. *Formica sanguinea* Latr. (p. 523—524). — II. *Parabiosis* (p. 524—528). 9. *Dolichoderus* u. *Cremastogaster* (p. 524—525). — 10. Nests in *Tillandsias* (p. 526—528). Verf. sammelte aus dens. in kurzer Zeit 7 Sp., dar. 3 n. 1. *Cremastogaster brevispinosa* Mayr., var. *minutior* Forel. 2. *Camponotus abdominalis* Sm. subsp. oder var. zwischen *esuriens* Sm. u. *mediopallidus* Forel. 2. *C. rectangularis* Em. var. *rubroniger* Forel. 4. *Cryptocerus aztecus* Forel. 5. *Cr. wheeleri* Forel. 6. *Leptothorax petiolatus* Forel u. 7. *Pseudomyrma gracilis* Fabr., var. *mexicana* Em. Bemerk. dazu. — III. *Cleptobiosis* (p. 528—535). Alle cleptobiotischen Ameisen sind sehr klein und führen eine unterirdische Lebensweise. Es gehören hierher die kleinen Arten der Gatt. *Solenopsis* u. nach Forel einige Spp. der Gatt. *Monomorium* (*M. andrei* Saunders) u. die Spp. der oriental. Gatt. *Oligomyrmex*, *Melissotarsus*, *Carebara*, *Tranopelta* u. *Aëromyrma*. *Monomorium termitobium* zeigt cleptobiotische Beziehungen zu Termiten von Madagascar. *Solenopsis fugax* Latr. ♂, flügelloses ♀, Arbeiter. Theil eines Nestes im Querschnitt. Fig. 10. 11. *Solenopsis molesta* Say (p. 533—534), *Pheidole lamia* n. sp. Abb. Fig. 11 Soldat. Arbeiter. — IV. *Xenobiosis* (p. 535—539). 13. *Xenomyrme stollii* Forel (Fig. 13) Arbeiter (p. 538—539). 14. *Leptothorax (Dichothorax) pergandei* Emery (Fig. 14). *Leptothorax emersoni* n. sp. — Forts. p. 701—724. V. *Dulosis* (p. 701—716). Charakt. dieser Kategorie. Bemerk. zu den europäischen Formen. *Formica sanguinea* Latr., *Polyergus rufescens* Latr. (p. 705). Abb. v. *Polyergus rufesc.* Latr., subsp. *breviceps* Emery, Arbeiter, Fig. 15 ab; *F. fusca* L. var. *subsericea* Say cd. *Tomognathus sublaevis* Mayr Fig. 16 ♂♀. *Strongylognathus*. — Amerik. Formen: 16. *Formica sanguinea* Latr., subsp. *rubicunda* Emery (p. 711—712). — 17. *Form. sang.* Latr., subsp. *rubicunda* Em. var. *subintegra* Emery (p. 713). 18. *Form. sang.* Latr., subsp. *rubic.* Em. var. *subnuda* Em. 19. *Form. sang. Latr.*, subsp. *puberula* Em. 20. *Form. sang. Latr.*, subsp. *obtusopilosa* Em. p. 713. 21. *Polyergus rufescens* Latr., subsp. *lucidus* Mayr. (p. 713—714). — *Polyergus rufesc.* Latr., subsp. *breviceps* Em. (p. 714—715). — 23. *Polyergus rufesc.* Latr., subsp. *mexicanus* Forel. 24. *Tomognathus americanus* Em. Fig. 17 Arbeiter. — VI. *Colacobiosis* (p. 716—721). — 24. *Leptothorax curvispinosus* Mayr., Arbeiter, Fig. 18. *Anergates atratulus* Schenk, Fig. 19, a) ♂, b) fertil. ♀, c) Abb. des ♀ juv. (p. 718—725). *Epoecus pergandei* Emery, Fig. 20, Profil von ♂ u. ♀ (p. 720—721). — VII. *Synclerobiosis* (p. 721—724) (interess., aber sehr selten). 26. *Formica pergandei* Em. u. *F. pallidiflava* Latr. (p. 722). — 27. *Form. exsectoides* Forel u. *F. sub-*

sericea Say (p. 722—723). — 28. *Dorymyrmex pyramicus* Roger vars. *niger* Forel u. *flavus* Mc Cook (p. 723). — 29. *barbatus* Sm. u. seine Verw. var. *molificiens* Buckley (p. 723—724). — 30. *Stenamma tennesseense* Mayr u. *S. fulvum* Roger, subsp. *aquia* Buckley var. *piceum* Emery (p. 724).

— (3). Idem. Part III. Symbiogenesis and Psychogenesis. (Conclusion). t. c. Oct. p. 791—815—818.

Part III. p. 791—818. Symbiogenesis and Psychogenesis. Geschichtliches. Eine Anzahl von Spp. zeigt eine ausgesprochene Neigung mit anderen in innige symbiotische Beziehung zu treten, wie folg. Zusammenstellung lehrt: 1. Die europäische *L. muscorum* lebt oft in Plesiobiosis mit *Formica rufa*. — 2. Eine ähnliche Tendenz zeigt unzweifelhaft die amerikanische *L. canadensis* Provencher (Bemerk. dazu). — 3. *L. pergandei* lebt wahrscheinlich als Gast in den Nestern von *Monomorium minimum* var. *minimum*. — 4. Die einzige Kolonie des mexikanischen *L. petiolatus*, die Verf. beobachtete, lebt in Parabiosis mit Arten von *Cryptocerus* u. *Cremastogaster*. — 5. *L. tuberosum* var. *unifasciatus* lebt mit d. europ. *Formicoxenus ravouxi* zusammen. Die Beziehungen derselben zu einander sind dieselben wie die von *Formica rufa* u. *Formicoxenus nitidulus*. — 6. *L. muscorum*, *L. acervorum* u. *L. tuberum* leben als Sklaven oder Hilfsameisen bei der europ. *Tomognathus sublaevis*. — 7. *L. curvispinosus* spielt wahrscheinlich dieselbe Rolle in den Nestern von *T. americanus*. — 8. *L. tuberum* ist in Gesellschaft v. *Strongylognathus testaceus* gefunden. Hier scheint aber *Leptothorax* die Rolle des Sklaven bei der dulotisch. Rasse zu spielen. — 9. *L. emersoni* lebt mit *Myrmica brevinodis* zusammen (siehe im ersten Theil). Das zusammenges. Nest ähnelt dem von *L. canadensis* m. *Cremastogaster* u. dem von *Formicoxenus nitidulus* mit *Formica rufa*. Beziehung. ders. zu einander aber wie in gemischten Nestern. Die Reihe der biolog. Eigenthümlichkeiten wird noch erweitert, wenn wir die Gatt. *Tomognathus* u. *Formicoxenus*, die beide der vorig. nahe verwandt sind, in Betracht ziehen. Nach ihrer Morphologie müssen alle drei einen gemeinsamen Ursprung haben. Trotzdem sind die Gewohnheiten ders. so verschieden, dass sie alle Formen socialer Symbiose aufweisen ausser dem extremst. Fall von Colacobiosis, wie er bei *Anergates* gefunden wird. Die Ameisen dieser Gattungen müssen also einst gewisse Züge besessen haben, die es ihnen leicht ermöglichten mit andern Formiciden-Arten in Symbiose zu treten. Viele *Leptothorax*-Arten lassen dieselben noch erkennen. Es sind:

1. Die sehr weite geographische Verbreitung, eine Voraussetzung für die Bildung der zahlr. u. verschiedenartig. Beziehungen mit andern Ameisen. — 2. Die Arten sind alle klein. Eine unzweifelhafte Befähigung für ihr Zusammenleben mit andern Ameisen. — 3. Die Kolonien bestehen aus einer kleinen Anzahl von Individuen, was ihre Lebensweise als Gäste oder Parasiten in den Nestern anderer Ameisen sehr erleichtert. — 4. Viele Arten sind ziemlich

furchtsam, oder wenigstens nicht kriegerisch. Sie besitzen daher ein stärker adaptives Temperament als viele andere Ameisen von ders. Grösse (z. B. *Tetramorium caespitum*). — 5. Bei den Königinnen u. den Arbeitern von *Leptothorax* herrscht kein grosser Unterschied. Auch dies erleichtert die Symbiosis. — 6. Die Aehnlichkeit in dem Instinkt von Königinnen u. Arbeiter findet ihren physischen Ausdruck im heutigen Vorkommen von Zwischen- oder ergatogynen Formen. Sogen. *microgyne* Individuen, oder geflügelte Königinnen, nicht grösser wie Arbeiter, sind häufig von Forel bei *L. acervorum* beobachtet worden. Weitere Unterschiede in den heterogynen Instinkten von *Leptothorax* u. *Verw.* — Die Instinkte derselb. Sp. können so verallgemeinert werden, dass sie wie ein Mensch, als Sklave oder Herr funktioniren kann, je nach den Umständen. Ansichten von Wasmann, Loeb, Binet etc. (siehe im Original). — Bibliographie (p. 815—818).

- (4). The parasitic origin of *Macroergates* among Ants. With 3 figs. t. c. Nov. No. 419 p. 877—886. Abstr. Journ. Roy. Micr. Soc. London 1902, P. 1 p. 40.

Merkwürdigkeiten der Gatt. *Pheidole*. 2 Arbeiterformen:
a) Kleine, kleinköpfige, thätige, eigentliche Arbeiter. b) Grössere, dickköpfige, träge Soldaten. Es finden sich aber hier ganze Reihen von Zwischenformen. *Macroergate* Formen von *Ph. commutata* infolge von Parasiten (*Mermis* sp.), die mit der Nahrung in die Larve eingewandert sein mögen. Der Stimulus zu einer erhöhten Nahrungsaufnahme, der das *Macroergaten*stadium zur Folge hat, liegt naturgemäss in der Larve u. nicht in den Arbeitern, die die Larven füttern. — Schlüsse, die sich hieraus ergeben u. Wasmann's Betrachtungen.

- (5). An extraordinary Ant-Guest. t. c. p. 1007—1016. — Eine Diptere.

Eine Phoride bei der Ameise *Pachycondyla harpax*. Abb. Fig. 1 Ameisenlarven mit Phoride; Fig. 2 Puppenstadium ders. aus dem Kokon von *P. harpax*. Die Fliege selbst schlüpfte leider nicht aus. — Zusammenfass. p. 1014—1016.

- (6). Notice biologique sur les fourmis mexicaines. Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45, VI, p. 199—201. — 41 sp.; Biologie der von Forel beschriebenen Ameisen.

Biolog. Bemerk. zu 41 Sp., die sich auf folg. Gatt. vertheilen: *Eciton* (2), *Odontomachus* (1), *Ponera* (2), *Leptogenys* (1), *Atta* (1), *Cyphomyrmex* (1), *Cryptocerus* (2), *Tetramorium* (1), *Wasmannia* (1), *Leptothorax* (1), *Stenamma* (1), *Pogonomyrmex* (1), *Pheidole* (7), *Solenopsis* (2), *Cremastogaster* (2), *Pseudomyrma* (2), *Iridomyrmex* (1), *Dorymyrmex* (1), *Forelius* (1), *Camponotus* (7), *Myrmecocystus* (1), *Brachymyrmex* (1), *Prenolepis* (1).

- (7). Titel p. 1229 sub No. 2 des vorigen Berichts.

Attaphila fungicola (Blattide) ein neuer Gast von *Atta fervens*. Die Blattiden nähren sich ebenfalls von dem von den Ameisen gebauten Pilze. Fall von *Myrmekoklepsie*; von einer Symbiose

(Myrmekoxenie) kann keine Rede sein, da die Attaphilen den Wirthsthiern keine Gegendienste leisten. Nach S. Sch. (der die Arbeit in der Insektenbörse, 18. Jhg, p. 241 referirt) kann man eher von Synoekie sprechen, da die bei Myrmekoklepsie charakt. Feindschaft des Wirthes fehlt.

- (8). *Microdon Larvae in Pseudomyrma Nests*. Psyche, 1901. p. 222—224, 1 fig.

Verf. macht auf das Vorkommen von *Microdon*-Larven in Ameisennestern aufmerksam. Diese Syrphiden-Larven erinnern bekanntlich in ihrem Aeussern eher an Schnecken oder Planarien als an Insektenlarven. Wasmann, auch Adlerz haben sie schon bei verschiedenen Formica- u. Camponotus-Arten nachgewiesen. Wheeler findet sie nun auch in Mexiko bei *Pseudomyrma gracilis* var. *mexicana* Emery, mitten unter den Ameisen. Da sich letztere garnicht um sie zu kümmern scheinen, so rechnet sie Wheeler in Uebereinstimmung mit den beiden obengenannten Autoren zu den indifferent geduldeten Gästen.

- (9). Die Lebensgewohnheiten der Ponerinen (Nach Biol. Bull. vol. II, 1900. — cf. p. 327 sub No. 2 u. No. 3 des vorig. Berichts) zusammengestellt von Meisenheimer in Naturw. Wochenschr. 1901 17. Bd. N. F. I. No. 41 p. 487—489 mit Abb. von *Leptogenys elongata* Buckt. Fig. 1—3 ♂, ♀, ♀, Kopf des ♀, Larve.

Die P. stellen in einem grossen Teile ihrer Lebenserscheinungen eine primitivere Stufe der hochentw. übrig. Ameis. dar, wie es sich ausprägt in dem weniger scharf angedeuteten Polymorphismus der einzelnen Stände, in der Kleinheit der Kolonien, der Einfachheit des Nestbaues, der leichten Vereinigung zweier fremder Kolonien, der Gründung neuer Nester, vor allem aber in der Art der Larvenfütterung. Die letztere erinnert durchaus an die unterste Stufe socialer Entwicklung, wie wir sie bei den Wespen antreffen. Die bisherige trennende Kluft wurde durch Wheeler's Beobachtungen überbrückt. Er fand vermittelnde Uebergangsformen bei den Myrmicinen. Von diesen besitzt *Stenamma* (*Aphaenogaster*) *fulvum* Rog. ganz die gleichen Gewohnheiten beim Füttern der Larven u. in Ausnahmefällen wurde dieselbe sogar bei *Lasius* u. *Tetramorium* durch Janet beobachtet, womit die Möglichkeit einer phyletischen Ableitung der stark spezialisierten Instinkte bei Formicinen u. Myrmicinen von den einfacheren der Ponerinen gegeben ist.

- (10). Treiber- und Wanderameisen. (Aus p. 327 des vorig. Berichts sub No. 1). *Prometheus* 12. Bd. p. 747—748. — *Eciton*-♀ etc. betreff. — Von E. K. nach Wheeler u. Belt. **Wheeler, W. M. and W. H. Long.** The males of some Texan *Ecitons*. With 3 (7) figs. *Americ. Naturalist*, vol. 35 March, p. 157—173.

Ausz. v. K. Escherich. *Allgem. Zeitschr. f. Entom.* 6. Bd. No. 14/15. p. 231. — Abstr.: *Journ. Roy. Micr. Soc. London*, 1901,

P. 4 p. 415. — Ausz. v. R. v. Hanstein. Naturw. Rundschau, 16. Jhg. No. 27. p. 344—345.

Die Berufung Wheeler's an die Universität in Texas gab ihm Gelegenheit, die dort häufigen, aber noch wenig bekannten Dorylinen zu studieren. Beschreib. des ♂ von *Eciton schmitti*, das nicht den unangenehmen Geruch der Arbeiter hat, sondern einen milden angenehmen Geruch wie die ♀ besitzt. Dies ist auch wohl der Grund, warum sie manchmal buchstäblich von Arbeitern bedeckt u. letztere ganz vernarrt in dieselben sind; sie lecken sie überall ab, sogar an den Mandibeln u. den Flügeln; selbst tote ♂♂ werden noch eine Zeitlang beleckt. Sie sind manchmal mit den Arbeitern so beladen, dass sie nicht von der Stelle kommen und durch Schütteln sich der Last zu erledigen versuchen. Kämpfe der Männchen untereinander, sowie Nahrungsaufnahme wurde nicht beobachtet. Aus dem letzt. Grunde betrachtet Wheeler die überaus grossen Mandibeln lediglich als secundäre Sexualcharaktere (wie bei den Lucaniden). Beschr. d. ♂ v. *Eciton opacithorax*, desgl. von Barrisi u. eine Var. davon (bei Laterne gefangen). Abb. d. Köpfe. Zum Schluss Diskussion der Ansicht W. Müller's, wonach bei den männlichen Larven verschiedener *Eciton* ein Dimorphismus vorkommen soll. Wh. ist nicht der Ansicht, sondern er nimmt an, dass eine von den beiden Larvenformen einem fremden Thier, das als Beute eingeschleppt wurde, angehört.

Van der Wissel-Herderscheë. Siehe Maeterlinck.

Wyse, L. H. Bonaparte. *Sirex gigas* L. in Co. Down. The Irish Naturalist, vol. 10. No. 10. p. 203.

Zander, Enoch. Titel p. 327 des vor. Berichts. Ausz. vom Verf. Zool. Centralbl. 8. Jhg. No. 5/6. p. 174—175.

Zeitschrift für systematische Hymenopterologie und Dip-
terologie. Hrsg. von Fr. W. Konow. I. Jahrg. Teschen-
dorf bei Stargard. Selbstverl. d. Verf.'s, Leipzig, Max Weg
in Comm., 1901. 8°. pro cplt. M. 10,—. — 1. Hft. Aus-
geg. 1. Jan. 1901. p. 1—48, (p. 33—48 auch als [p. 1—16]).
— 2. Hft. p. 49—112 (p. 97—112 auch als [p. 17—32]). —
3. Hft. p. 113—176 (p. 161—176 auch als [p. 33—48]) 2 Taf.
— 4. Hft. 1. Juli. p. 177—240 (p. 225—240 auch als
[p. 49—64]). — 5. u. 6. Hft. pp. sq.

Nachtrag

(grösstentheils zu Publikationen in früheren Berichten).

du Buysson, R. Titel p. 296 sub No. 2 des vorig. Berichts. Be-
handelt: *Thrausus n. g.* (1 n.), *Nomia* (1), *Odynerus* (1). —
Fig.-Erklär.

— (2). Titel p. 296 sub No. 4 des vorig. Berichts. Behandelt:
1. *Stelis aeterrima* Latr., 2. *Nematus septentrionalis* L., 3. *Scolia*

- melanaria Burm., 4. Anomalon tenuicorne Grav.
- Carr.** 1897—1898 s. *Osmia rufa*.
- Cockerell, T. D. A.** Titel p. 299 des vorig. Berichts sub No. 10. Behandelt: Insekten aus dem Mesilla-Park, N. M. auf Blüthen v. Mesquite (*Prosopis glandulosa* Torrey): *Centris* (3), *Anthidium* (1), *Megachile* (3 + 1 n.), *Lithurgus* (1), *Colletes* (1 + 1 n.).
- E. K.** siehe Wheeler (10).
- Ferton** (Titel p. 318 dieses Berichts sub No. 1).
Osmia corsica n. sp. — Betrachtungen über die Fauna. Bezüglich der *Osmia*-Arten siehe im system. Theil. Ausschliessl. Fehlen der alpinen Fauna. Geologische Betrachtungen. Mit Nordafrika hat Corsica gemeinsam: *Osmia ferruginea* Lep., *Andrena antilope* Pérez, *Prionemis Vachali* Ferton, *Miscophus bonifaciensis* Ferton. Diese fehlen dem Gebiete der Provence und Toscana. Bemerk. zu diesen Sp.
- Forbes, S. A.** . . . (20 lt. Rep. St. Entom. Illinois) siehe Sch. „dass eine Bahnwespe Eisenbahnen gefährlich werden könnte, . . . in: Die Natur 47. Bd.
- Kriechbaumer, Jos.** Titel p. 309 des vorig. Berichts sub No. 3 behandelt: *Ichneumon* (1), *Lissonota* (2), *Erigorgus* (2).
- Reeker, H.** 1897/1898. Ueber den Instinkt der Bienen. 26. Jahrbuch. zool. Sekt. Westf. Prov.-Ver. p. 22—23.
 — Ueber das Leben der Ameisen. t. c. p. 54—59.
- Rollason, Mark A.** siehe unter Chrysididae: *Stilbia anomala*.
- Rudow.** Einige entomologische Beobachtungen. Insektenbörse, 16. Jhg. p. 128. — Betrifft Hymenoptera.
- Strand, Embr.** Titel p. 1007 des Berichts für 1899 sub Orthoptera. p. 289 behandelt unter A. Hymenoptera (10 Sp.): *Apis* (1), *Halictus* (3), *Sphecodes* (1), *Nomada* (1), *Vespa* (4).

B. Uebersicht nach dem Stoff.

Erklärung u. Eintheilung einer Reihe von Begriffen, die das Sein, Werden u. die Thätigkeit der Organismen behandeln: Wasmann⁶⁾.

Geschichte: Dedekind (altägyptisches Bienenwesen), Schwenckfeld, C.

Nekrolog: Thompson, (Kowalewsky).

Systematik: Emery ²⁾, ³⁾ (Ameisen), ⁵⁾ (Ameis.: Pheidole), Forel ¹⁰⁾ (Formicidae), ¹¹⁾ (Euponera).

Zusammenstellung, systematische: Konow ⁷⁾ (der bisher bekannt geword. Chalastogastra).

Kataloge: du Buysson (*Hymenopt. mellifera* des Mus. Paris), Dalla Torre ¹⁾ (vol. III, 1), ²⁾ (*Hym. omnia*).

Revisionen: Cameron ⁴⁾ (*Torymina*), Kieffer ²⁾ (*Onychiinae*), ⁵⁾ (*Eucoelinae*), Konow ⁴⁾ (*Pontania*), Krieger ¹⁾ (*Certonotus*), Pérez (*Xylocopa*, s. dort).

Verzeichnisse: Athimus (Ichneumon. Belgiens), Ducke³) (1. Chrysididae von Troppau u. Odrau, österr. Schlesien. — 2. des österr. Küstenlandes. — 3. von Pará, nur 16 Spp.), Emery⁴) (Ameisen von Celebes), Schletterer (Hym. von von Süd-Istrien), Wasmann⁹) (der Dorylinen-Gäste nach Faunengebiet und Wirthsameisen geordnet).

Listen: Ducke¹) (der Bienenpflanzen bei Pará u. Besucher), Emery⁴) (Ameisen von Celebes), Gardner¹), Ferton²), King¹) (Massachusetts Formic.), Hocking (Hym. aculeata von Suffolk).

der Beutethiere: a) (Rhynch.), der Astata: Ferton²).

b) (Arachn.) der Pompil.: Kraepelin (importirte Hymenopt.), Pic⁴), (Publikationen dess.), Schletterer (Hym. von S.-Istrien), Thompson (Publikationen), Wasmann⁹) (der bisher bekannt gewordenen Dorylinen-Gäste), (Fortsetz. der Liste seiner Publikationen, No. p. 95—113).

Tabellen: Dahl¹) (III. — Fangtabellen auf dem Bismarck-Archipel) (Norddeutsche Ameisen).

Synonymie: Friese¹), ⁴) (Apiden), Morice u. Cockerell (Andrena), Robertson³) (Prosopis), Schulz³) (Xylocopa).

Nomenklatur: Krieger²) (Geäder im Hinterflgl. d. Ichneum.).

Eigentliche Namen:

der Honigbiene: Fox²).

einiger Hym.-Gatt.: Fox³).

Nomenklatorische Bemerkungen u. Berichtigungen: von Dalla Torre, K. W., Weith (ist gegen eine Aenderung ders. bei den Hym.).

Wechsel in den Gattungsnamen: André¹) (Mutillidae Europae), Ashmead⁶).

Monographien: Friese¹) (Apidae Europae. Bd. VI, ²) (Centris).

Synopsis: Kieffer⁶) (Zoocecidien Europas).

Beiträge: André (Mutillidae), Ducke³) (Chrysididae), Fielde (zum Studium von Stenammas), Höppner (Bienenfauna der Lüneburger Heide), Kohl²) Sandwespen), ³) (paläarkt. Diodontus Spp.), Niezabitowski²) (schwed. Hym.), Nordenström (schwed. Hym.), Pérez, J. (zum Studium der Xylocopa), Stoll (Ameisen der Schweiz), Taushin (zur Bienenzucht).

Ansätze: Berg (essenza della ninfosi).

Bemerkungen: von Dalla Torre (nomenklatorische), Emery²), ³) (zur Eintheilung der Formicidae), ⁵) (Pheidole), ⁹) (Dorilini), ¹⁰) (Formic.), Ferton²) (Instinkt der Hym., Apid. u. Foss.), Froggatt (zu Eriocampa limacina u. austral. „Saw flies“), Gasperini (Hym. symphyta Gerst. dalmat.), Harrington (Note on Baens), Kieffer, J. J.¹) (Figitines), ³) (Xyalaspis), ⁵) (Cynipides), King¹) (Massachusetts Form.), Kriechbaumer²) (Ophioniden), ³) (über Scolobates italicus), ⁴) (Tosquinet's Ichneum.), ⁵) (Ichneumonologica varia), Perkins²) (Hawaiische Hymenopt.), Schulz³) (Xylocopa), Semenov (zu einigen Xiphidriidae), Smith (Grabwespen), Titus³) (Osmia), Veth (Chlorida festiva L. — Agricultur).

Nachträge: Brauns (zu den Lissonotinae), Schulz²) (Bombus-Nest).

Publikationen: Pic⁴) (Liste ders.), Schletterer (Hym. v. S.-Istrien), Wasmann⁹), (Forts. der Liste seiner Publikat. No. 95—113).

Theorien: Weismann²⁾ (die Dzierzon'sche Theorie).

Einfluss Darwin's auf die Entomologie: Poulton²⁾.

Entwicklungstheorie der Honigbiene (gegenwärtiger Stand):
Dickel⁵⁾.

Vergleich: (zwischen den Doryl-Gästen des neotropischen u. äthiopischen Faunengebiets): Wasmann⁹⁾.

Kritik: Forel⁶⁾ (der psychologischen Experimente an Ameisen), Wasmann⁷⁾ (Plate's Kritik der Weismann'schen Arbeit).

Diskussion: Konow u. Kriechbaumer („tenuigena, tenuigenis“), Krieger (Certo-notus).

Mittheilungen: (Bienen- u. Wespen-Ueberfälle im Jahre 1901, sehr zahlreich), Pic³⁾, Rudow³⁾, ferner Insektenbörse, 18. Jhg., p. 293 (Briefkasten).

Beobachtungen: Ducke¹⁾ (Bienen bei Pará), Landquart (Symbiose zw. Ameisen u. Schmetterlingen), Lie-Pettersen (Biolog. an norweg. Hummeln), Pfankuch (Arctia purp. u. Erigorgus purp.), Plateau (Konstanz der Apidae), Prowazek (an Ameisen), Rudow (an Insektenbauten), Wainwright¹⁾ (Sphecodes).

Kritische Arten: Emery⁴⁾ (von Ameisen).

Besprechungen einzelner Gattungen oder Gruppen: Ducke¹⁾ (über die Bienenpflanzen bei Pará u. Besucher).

Uebersichten: Dahl¹⁾ (III. Fänge auf dem Bismarck-Archipel).

Berichte: Ssilantiew (Cynipides).

Centenar-Bericht: Morice, Morley, Poulton, Tutt.

Atlanten: siehe Atlas für Bienenzucht.

Bibliographie: Bloomfield (Phytophaga 1800—1900), Lovell¹⁾ (der nordamerik. Prosopis-Arten), Pic⁴⁾ (Repertoire seiner Publikationen).

Typen: Imhoff'sche Apiden-Arten (Oken's Isis), Bemerk. dazu: Frey-Gessner.

Deutung: Konow¹⁾ (Stunoza, ²⁾ zweifelhafte Nematiden), ⁴⁾ (Nem. suavis),

Berichtigungen: von Dalla Torre, K. W., Dyar³⁾ Enderlein³⁾, Forel¹¹⁾, (Entomologische Nachrichten), ^{*}), Niezabitowski, Paulcke, Perkins²⁾.

Referate: Schönichen (Peckham).

Sammlungen: du Buysson¹⁾ (Chrysididen des Wiener Mus.), Forel⁵⁾ (Formic. des Mus. Hamburg), Péringuey (S. Afr. Mus.), Szépligeti²⁾ (tropische Cenocoe-lioniden u. Braconiden des Mus. Hung.).

Expeditionen: Cameron (malayische Halbinsel), ⁸⁾ (Hudson's Ausbeute).

Zeitschriften: neue: Revue Russe d'Entomologie, Zeitschrift für system. Hym. (vergl. dazu Reitter).

eingegangene: Il Naturaliste siciliano (1899).

apistische: s. unter Apistik.

Experimente: Donisthorpe (mit myrmekophilen Käfern bei Ameisen).

Mathematik: Kaiser (Biene), Netter (Biene).

Larven: Carpentier (Nematiden), Dahlström (Lophyrus pini), Dyar¹⁾ ²⁾ (Saw-Flies), Cholodkovsky (Spinnapparat derselben), Prowazek (Pteromaliden-Larven in Schildläusen), Wheeler⁸⁾ (Microdon-Larv. in Ameisennestern).

^{*}) p. 330. Der unter Hamm stehende Abschnitt gehört zu Carr.

Morphologie. Anatomie. Histologie.**Morphologie, Anatomie:** Janet²⁾ (Myrmica).des Kopfes, Stomodäum, Proctodäum, Segmentirung,
Darmkanal: Janet²⁾ (Ameise etc.).der Endsegmente, Stachel, Giftdrüse: Janet²⁾ (Myrmica).

des Tarsus, speciell des Endgliedes: de Meijere.

Fühlerglied, langes zweites: Mayr⁴⁾ (p. 25) (bei den Tetra-
morium-♂ aus mehr. verwachs. Gliedern zusammengesetzt).**Stirn** (Auffassung ders.) Konow*).**Greifkiefer:** Dahl¹⁾ (p. 41 bei Ameisen). **Mandibeln,** sichelförmige: Dahl¹⁾ (p. 46).**Metathoracic Pterygota** (der Hexapoden u. ihre Beziehung zu den
Flügeln): Walton.**Geschlechtsorgane:** Anatomie des 7. Ventralsegments: Morice (♂-Osmia),
Seurat³⁾ (Braconidae).**Geäder:** Krieger²⁾ (im Hinterflgl. d. Ichneum.).

Scheinadern: Kriechbaumer**) (ob system. Bedeutung?).

Homologien im Flügelgeäder: Robertson⁴⁾.**Histologie:** Oenocyten: Pérez⁴⁾.

Tracheensystem: Seurat (Bembex).

Spinndrüsen (Histolyse ders.): Pérez³⁾.Drüsensystem: Spinnapparat: Cholodkovsky (Filippi's Drüsen bei
Hymenopteren, Lyda-Larven).Malpighi'sche Gefäße (Histolyse ders.): Pérez³⁾.der Metamorphose: Pérez²⁾ (Formicidae).**Sekretzellen:** Vorhandensein mächtiger Fettzellschichten unter
der Hypodermis: Wasmann⁹⁾ (p. 219—220 in Anm.: an den Körperstellen
jener Gäste, wo die gelben Haarbüschel stehen, die von den Wirten beleckt
werden).**Entwicklung.****Entwicklung:** Prowazek (Pteromalide).**Metamorphose:** Anglas¹⁾ (Biene, Wespe), Pérez²⁾ (Formicidae).des Fettkörper: Anglas²⁾, Pérez²⁾.des Verdauungstraktus: Anglas²⁾, Pérez²⁾.Oenocyten, Ovarien, Nervensystem: Pérez³⁾ (Formica).Histologie der Metamorphose: Pérez²⁾ (Formicidae).**Nymphose:** Das Wesen derselben: Berg.Erscheinungen ders.: Pérez¹⁾.**Histolyse:** Natur derselben: Anglas³⁾.Histolyse der Malpighischen Gefäße und Spinndrüsen:
Pérez³⁾ (Formica).

des Fettkörpers: Terre.

Richtungskörper im befruchteten und unbefruchteten Bienenei: Petrunke-
witsch¹⁾.

*) Illustr. Zeitschr. f. Entom. 5. Bd. p. 117.

**) Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 3. Hft. p. 154. Anm.

Etiologie der Entwicklung des Bieneieies u. der Geschlechter: Dickel¹⁾, ²⁾.
Parthenogenesis: Dickel¹⁾, ²⁾, ³⁾, ⁴⁾ (der ♂-Apis), (La Parthénogénèse), Petrunkevitch²⁾, van Rossum (Blattwespen), Weismann¹⁾ (Biene), ³⁾ (dito, contra Dickel³⁾ u. ⁴⁾.

Phylogenie. Vererbung.

Flügellose Urform: Emery⁶⁾ (der Ameisenweibchen).
Artentwicklung (gegenwärtig sich vollziehende): Wasmann⁷⁾.
Artbildung: Alfken¹⁾ (Nomada).
Vererbung, Fruchtbarkeit: Dickel u. Weismann (der Eier von Apis).
Amicalselection: Wasmann*).

Physiologie.

Physiologie (experimentelle): Netter (Biene).
Physiologie des Sehens und Schwebens: Rádl**).
Augen sehr klein bei unterirdischer Lebensweise: Dahl¹⁾ (p. 41).
Nervenphysiologie: Wasmann⁵⁾.
Duft (der verschiedenen Andrena-Arten): Ferton²⁾ (p. 95: Viele Apiarier duften nach Verbenen, Citrone etc.).
Spinnstoff: Dahl¹⁾ (der Ameisen, p. 33).
Gift, Stachel: Sajó¹⁾.
Stich: (La piqûre des Mutilles).
 Modifizirende Wirkung desselben auf die Atmung der Larve: Launoy.
Säure: Vorkommen ders.: Ludwig³⁾ (bei den Bienen).
 Apparat zur Bestimmung der Stärke der Ameisensäure: Poulton¹⁾***).
Exsudattrichome: Wasmann⁹⁾ (p. 220: gelbe Härchen u. Exsudate der darunter gelegenen Gewebe).
Exsudat: Wasmann⁹⁾ (VII. Das Exsudat der Symphilen ist Blutflüssigkeit und ein Fettprodukt †).
Physogastrie: Wasmann⁹⁾ (bei Ameisengästen. Vorhandensein eines einzigen sehr grossen Eies, dass schon Embryonalentwickl. durchmacht, bei Ecitogaster p. 220, bei Ecitophya p. 229; diese also wohl vivipar).

*) Biol. Centralbl. 21. Bd. p. 739.

**) Untersuchungen über die Lichtreaktionen der Arthropoden. Archiv f. die gesammte Physiologie 87. Bd. p. 418—466.

***) Zur Bestimm. der reinen Säure. Bei Dicranura vinula 45%; fürs Auge schmerzhaft. Sie soll nur schmerzhaft sein, so lange sich Larven und Puppen im Neste befänden, also ein reines Schutzmittel sein. Beare, Hudson u. Donisthorpe berichten, dass die Haut von Formica rufa mit Säure bespritzt sich löse u. die Handschuhe fleckenweise Brandstellen zeigten. Trans. Entom. Soc. London 1901 (p. X).

†) Das Fettgewebe ist ein Blutbildungsgewebe. Wasmann⁹⁾ p. 220 in Anm.

Metamorphose, Nymphose, Histolyse: Physiologie ders.: siehe unter Entwicklung.

Oenocyten: Pérez ⁴⁾ (Formica rufa).

Macroergatismus: Wheeler ⁴⁾ (durch Parasiten verursacht).

Bienenvolk mit ausschliesslichen Drohnzellen: Martinow.

Psychologie.

Experimente: Forel ⁶⁾ (an Ameisen u. Kritik ders.).

Psychische Fähigkeiten: Forel ⁴⁾, ¹⁴⁾.

Ueberblick über die neuesten Arbeiten über Insekten-Psychologie: Forel ⁴⁾.

Psychologie: *) , Wasmann ⁷⁾ (Orientierungsvermögen der Ameisen).

Psychologie und Nervenpsychologie: Wasmann ⁵⁾.

Bienen als Reflexmaschinen: Netter.

Instinkt: Laloy, Ferton ²⁾, Maeterlinck, Perrier, Wasmann ¹⁾ (Ameisen).

Geringe Variation dess.: Ferton ²⁾ (bei Fossores).

Intelligenz: Laloy.

Orientierungssinn: Ludwig ²⁾ (der Bienen).

Gedächtnis: Ludwig ²⁾ (der Bienen).

Zurückfinden: Marchand (Bembex). **Ortssinn:** Schoenichen.

Schutzvorrichtungen, Schutzmittel: Ferton ²⁾, Wasmann ⁵⁾.

Teratologie. Variation etc.

Abnormitäten: Forel ^{**)} (Formicide m. abnorm. Pedicellus).

Monstrositäten: Konow ^{***)}, Kriebhaumer ²⁾ (Beine- und Flügel-Geäder von *Dispilus Braunsii*).

Aehnlichkeit: Townsend (*Systropus* [Dipt.] m. *Ammophila*).

Variation: Cockerell ¹⁰⁾ (bei *Epeolus bardus* Cress.).

Geringe Variation des Instinkts: Ferton ²⁾.

Polymorphismus: Emery ⁶⁾ (Formiciden, spez. Dorilini), Lombroso.

der Geschlechter: Emery ⁸⁾ (Treiberameisen).

Hermaphroditismus: Morice (*Podalirius*), Perkins ¹⁾ (*Odynerus*) †, Saunders ⁴⁾ (*Halictus*).

*) Ueber das Seelenleben der Insekten. Referat aus einem Vortrag von Bastian Schmidt in der psycholog. Ges. München in der Insektenbörse, 17. Jhg. p. 211—212. — Berührt auch die Ameisenpsychologie etc.

***) *Revue Suisse Zool.* vol. IX p. 338.

****) *Insektenbörse* 17. Jhg. p. 146.

†) *Odynerus*-Exempl. von Hawaii. — Hermaphroditen sind unter den Hymenopteren äusserst selten. Perkins hat in den verg. Jahren (von 1901 zurückgerechnet) unter etwa 20 000 Stücken nur ein hermaphrodit. Stück (*Stenamma Westwoodi*) gefunden.

Gynandromorphismus: Kohl (cf. vor. Bericht p. 307 sub No. 3), Saunders⁴) (Halictus quadricinctus)*).

Ethologie, Biologie etc.

Ethologie oder Biologie: Dahl²), Wasmann⁶) (Erörterung der Begriffe).

Ethologie der Ameisen, allgemeines u. vergleichendes Studium ders. im Bismarck-Archipel: Dahl¹) (Nester ders.).

Biologie, Nahrung, Parasiten, Intelligenz u. s. w.: Fertons²) (der Hymenoptera Aculeata).

Instinkt u. Lebensweise der Bienen: Maeterlinck, (Sutro).

Aupassung in der Lebensweise: Dahl¹) (Ameisen).

Fundorte u. Vorkommen: Dahl¹) (für Ameisen, s. im system. Theil unter Formicidae).

Uebersicht nach der Lebensweise: Dahl¹) (p. 38, Ameisen).

Biologie: Adlerz (Fossores), Aigner (Ameisen), Baer (Brüten von Grabwespen in gekappten Zweigen), Bordas, St. (Ameisen), Bouvier (Bembex), Brauns (Aenictus u. Dorylus), Brèthes (3 Hym. von Buenos Aires), Burbidge (Bombus), Dahl¹) (der Ameisen im Bismarck-Archipel), Du Buysson (Chrysis shanghaiensis), Ducke¹) (Bienen bei Pará), Emery¹) (Biol. der grossen u. kleinen Formen von Pheidologeton), Enteman (Polistes), Fabre, Fertons (korsischer Apidae u. Fossores, der Nysson etc.), Fitzgerald (Bombus, Forel⁷) (der nordamerik. Ameisen), Gardner¹) (Aculeata von Lancashire u. Cheshire), ²) (Sphecodes), Ghigi, Hoffer (Wespen), Höppner³) (Prosopis), ⁵) (nordwestdeutsche Hymenopt.), Lampert (Ameisen), Lie-Petteisen¹), (norwegische Hummeln), ²) (Bombus in Norweg.), Marchand (Bembex), Nielsen¹), ²) (Fossores), ³) (Grabwespen u. solitäre Bienen), Schrottky (Bienen in S. Paulo), Seurat (Hym. parasit.), ²) (Parasiten an den Eichen von Tunis), Westerlund (Bombus), Wheeler¹⁻⁴), ⁵) (der Larve einer anscheinend. Phoride in Ameisen-Nestern), ⁶) (mexik. Ameisen), Ule.

Wohnungen: Rudow¹) (Hymenoptera).

Nisten: Du Buysson (Melipona), Höppner (Eucera), (zwei Bombus-Species in einem Nest).

Nistgewohnheiten: Nielsen¹) ²) (Grabwespen).

Nestbau: Dahl¹) (VI) (Ameisen, p. 27), De Stefani (Sphecx paludosus), Doncaster (Odynerus).

Nester: Dahl¹) (p. 27), Fertons²) (Eumenes), Forel**), Mayr⁴) (Cremastogaster), Oudemans¹) (bemerkenswerthes, von Vespa vulgaris), ²) (Lasius fuliginosus [aus Torf] u. Osmia rufa, in Streichholzschachtel), Schulz¹) ²) (Bombus).

Eigentliche Nester: Brauns (von Aenictus u. Dorylus).

Sonderbares Nest: Doncaster (Odynerus), Oudemans¹) (Vespa).

Grosses Nest: Palmén.

*) Anm. Derselbe findet sich am öftesten bei den Apiden (Apis mellifica) u. Ameisen. Bei den Pompiliden wurden bis jetzt 2 Fälle (Pepsis) u. je 1 bei Mutilliden u. Scoliden, bei den Vesparien u. Sphegididen bis jetzt keiner beobachtet.

**) Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 380—382. Lasius fuliginosus.

Blatt-Nester: Dahl¹⁾ (p. 28, 33).

Doppel-Nester: Dahl¹⁾ (p. 37).

Gelegenheits-Nester: Rudow (s. *Ancistrocerus*).

Kammer-Nester: Dahl¹⁾ (p. 35).

Karton-Nester: Dahl¹⁾ (p. 28, 33), Mayr⁴⁾ (p. 13—14).

Kunst-Nester: Dahl¹⁾ (p. 28).

Ameisen-Nester: Forel¹¹⁾ (neue Formen).

Mark-Nester: Dahl¹⁾ (p. 29).

Mörtel-Nester: Dahl¹⁾ (p. 32).

Natur-Nester: Dahl¹⁾ (p. 28).

Papier-Nester: Dahl¹⁾ (p. 42).

Röhren-Nester: Dahl¹⁾ (p. 35).

Spalt-Nester: Dahl¹⁾ (p. 28, 34, 47).

Wander-Nester: Brauns (*Aenictus* u. *Dorylus*).

Zusammengesetzte Nester: Dahl¹⁾ (p. 37).

Zusammengesetzte u. gemischte Ameisennester: Wasmann²⁾, Wheeler¹⁾²⁾³⁾⁴⁾.

Bauten:

(der wichtigst. Ausländer): Rudow¹⁾ (p. 405—506: in morschem Holz aller Art: Pumpenrohre etc., Stengel, Rohr auf Dächern)^{2—5)}. — siehe ferner oben unter Nestbau.

Kuppelbau: Dahl¹⁾ (p. 29, 48).

Mörtelbauten: Dahl¹⁾ (p. 32).

Futterhäuser: Dahl¹⁾ (p. 34).

Kornkammern: Dahl¹⁾ (p. 29).

Ställe: für Nutzthiere (Aphiden): Dahl¹⁾.

Termitennest, als Nistplatz für Ameisen: Dahl¹⁾ (p. 35 etc.).

Termitengänge: Dahl¹⁾ (p. 29, 41, Ameisen in denselben).

Honigbäume: Klinge.

Staaten, individuenarme: Dahl¹⁾.

individuenreiche: Dahl¹⁾.

Kolonien des Ameisennestes: Dahl¹⁾ (p. 31, 33).

Nistplätze (der Ameisen) s. Fundorte.

Gänge, Strassen: Gänge der Ameisen: Dahl¹⁾ (p. 32, 42, 49), Smith (Andrena).

Gänge der Apiden (Ausdehnung etc.): Nielsen (Biologie einiger Hymenoptera fossoria u. *Osmia solskyi*).

Strassen der Ameisen: Dahl¹⁾ (p. 34, 48 etc.).

Züge: Streif-, Jagd- u. Auswanderungszüge: Emery⁸⁾

Minirhätigkeit: Dahl¹⁾ (p. 29).

Mauerthätigkeit: Dahl¹⁾ (p. 29, 32, sq.).

Erdwall um die Nestmündung: Dahl¹⁾ (p. 29).

Vorwalten einer Bauart: Dahl¹⁾ (p. 27, bei Ameisen).

Haufen der Waldameise: Dahl¹⁾ (p. 48, 51).

Lebensart:

Inquilinen: Bignell⁶⁾ 7) (Cynipiden).

Erntende Ameisen: Tryon.

Raubameisen: Dahl¹⁾ (p. 37, 43, 46).

Treiber- und Wanderameisen: Wheeler¹⁰⁾.

Schmarotzameisen: Dahl¹⁾ (p. 46, 49).

Termitenfresser: Dahl¹⁾ (p. 41, Ameisen).

Art der Nahrungsaufnahme: Altmann.

Nahrung:

Brutfutter: Baer (Hymenopt. fossoria).

Aas als (Ameisen-)Nahrung: Dahl¹⁾ (p. 39, 41, 53, 61).

Manna als Nahrung: Dahl¹⁾ (p. 34, 41).

Pflanzensaft als Nahrung: Dahl¹⁾ (p. 30, sq.).

Saftsauger: Smith, W. W. (Ichneumoniden).

Verzehren der Beute: Altmann (Vespa).

Mark von Pflanzen: Dahl¹⁾ (p. 31, 32).

Beutethiere: Erhaltungszustand ders.: Ferton²⁾.

Verschiedenheit ders.: Ferton²⁾.

Geschlechtsformen: Auftreten: siehe weiter unten.

Arbeiter: fehlen: Dahl¹⁾ (p. 46).

verschieden gross: Dahl¹⁾ (p. 17, 42).

Männchen: Pack-Beresford (von *Vespa austriaca*), Wheeler & Long (von *Eciton*).

Vergleich: der Zahl der Arten: Dahl¹⁾ (p. 61, Ameisen des Bism.-Arch. im Vergleich zu Norddeutschl.).

der Individuen: Dahl¹⁾ (p. 53, 58); (*Polistes gallica*).

Larven als Spinnapparat: Dahl¹⁾ (p. 32, sq.).

Zeit ihres Vorkommens: Dahl¹⁾ (p. 61).

Nächtliche Lebensweise: Dahl¹⁾ (Ameisen, p. 30 etc.).

Lebensbedingungen im Bismarck-Archipel: Dahl¹⁾ (p. 23).

Vorkommen (der Ameisen): s. Fundorte u. im system. Theil unter Formicidae.

Sociales Leben einer Ameise: Fielde.

Periodicität: Dahl¹⁾ (bei Ameisen, p. 24).

Flug: Dücke¹⁾.

Höhe desselben: Dahl¹⁾ (p. 27).

bei Ameisen unsichtbar: Dahl¹⁾ (p. 38).

Flug- u. Kriechspuren: Schönichen³⁾.

Verbreitung: Importirte Hymenopteren: Kraepelin (durch Schiffsverkehr in Hamburg).

Seltenheit: Frionnet (*Bombus* in der Schweiz), Jacob; siehe ferner (rareté de *Bombus* en Suisse).

Schwärmen: Dahl¹⁾ (p. 25).

Auftreten, massenhaftes, der Geschlechtsthier: Dahl¹⁾ (p. 25).

Tageszeit dess.: Dücke.

Ausruhen, Art dess.: Dücke¹⁾.

Gespinnst: Dahl¹⁾ (p. 33).

Copula, langdauernde (1½ Std.): Landois (*Bombus lapidarius*).

Eiablage: Ferton²⁾ (der Fossoria).

Käfer, als Vertreter von Ameisen: Dahl¹⁾ (p. 60).

Schnecken, als Vertreter der Ameisen: Dahl¹⁾ (p. 60).

Mimicry-, Symphilen- u. Trutz-(Schutzdach-)Typus: Wasmann⁹⁾.

Beziehungen: zwischen *Polyergus* u. *Formica*: Wasmann²⁾.

— zwischen *Formica fusca* u. *sanguinea*: Morice⁹⁾.

Zusammenleben: Ferton²⁾.

— verschiedene Insektenfamilien: Rudow³⁾. — 1. Aus einem Stück eines alten Kirschbaums bei Zerbst wurden neben *Necydalis major* (Col.) die Holzwespe *Xiphidria dromedarius* in mehreren Stücken, *Oryssus vespertilio* in wenig Stücken gezogen. — 2. Bei Dessau: *Gasterocercus depressirostris* Fb. mit *Xiphidria annulata* Jur. aus Eichenkloben).

Coleopteren bei Ameisen: Donisthorpe (Experimente).

Staphyliniden bei „ Wasmann⁹⁾.

Acariden „ „ Wasmann⁹⁾.

Gäste der Ameisen: Dahl¹⁾ (p. 47, sq.), Wasmann⁹⁾ (neue, der Dorylinen), Wheeler¹⁾ (neue, der Ameisen), ⁵⁾ (Dipt.), ⁷⁾ (Blattide).

Wirthsameisen: Wasmann⁹⁾ (Gäste derselben nach Faunengebieten geordnet).

Gastfreundschaft: Rudow. (Wespen beanspruchen gern dieselbe bei anderen Hymenopt. u. Lepid. für ihre Nester. Anlagen ihrer Nester an den Gespinst. ders., in Falten von Zuggardinen).

— Acarinen, auf Ameisen reitende: Wasmann³⁾ (vorzugsweise auf *Lasius*).

Allometrie: Forel¹³⁾.

Allometrobiosis: (parasitische): Forel¹³⁾.

Bundeskolonien: Forel¹³⁾.

Cleptobiosis: Forel¹³⁾, Wheeler¹⁾.

Colacobiosis: Wheeler¹⁾.

Douloosis: Forel¹³⁾, Wheeler¹⁾.

Lestobiosis: Forel¹³⁾.

Myrmecophilie: Wasmann⁴⁾ (Bosnien).

Myrmecoxenie: **)

Myrmekokleptie: Wheeler⁷⁾ (Blattide, Gast von *Atta fervens*), **).

Parabiosis: Wheeler¹⁾.

Phoresie: **).

Plesiobiosis: Forel¹³⁾, Wheeler¹⁾.

Psychogenesis: Wheeler¹⁾ ⁴⁾.

Symbiogenesis: Wheeler¹⁾ ⁴⁾.

Symbiose: Buckton (Aphiden im Ameisennest), Cockerell (Cocciden im Ameisennest), Dahl¹⁾ (p. 29, 31, 37; mit *Myrmecodia* p. 34—36), Landquart (Ameise u. *Lycaena*-Raupe), Pérez (Acari u. *Xylocopa*), Ponselle (*Atemeles* u. Ameisen), Shelford*) (dito), Thomann (*Lycaena*-Raupen u. *Formica*), Wheeler²⁾.

Synclerobiosis: Forel¹³⁾, Wheeler¹⁾.

Synechthrie: **).

Synoekie: **).

Termitophagie: Forel¹³⁾.

Xenobiosis: Forel¹³⁾, Wheeler¹⁾.

Parasitismus: Dahl (p. 31, 37, bei Ameisen), Morice (*Sphécodes*).

*) Rep. Brit. Ass. 1901. p. 690.

***) Erklärung des Begriffs. Insektenbörse, 15. Jhg. p. 141—142.

Kosmopoliten: Dahl¹⁾ (p. 39, 40).

Soldaten: Dahl¹⁾ (p. 39, 42, 52).

Sklassen: Dahl¹⁾ (p. 43, 46, 49).

Erdnister: Rudow.

Bodenbewohner: Dahl¹⁾ (p. 59).

Unterirdische Arten: Dahl¹⁾ (p. 40, 41, 47).

Beziehungen zu Thieren (ausser den schon in den vorigen Zeilen erwähnten, hier noch folgendes): Diptera u. Nomadae in Halictus-Gängen: Charbonnier.

Schmetterlinge u. Ameisen: Thomann.

Schmetterlingsraupen von Ameisen besucht: Dahl¹⁾ (p. 45).

Schnecken als Vertreter der Ameisen: Dahl¹⁾ (p. 60).

Käfer als Vertreter der Ameisen: Dahl¹⁾ (p. 60).

Säfte von Thieren als Nahrung: Dahl¹⁾ (p. 45).

Aphiden in Ameisen-Nestern: Buckton.

Blattläuse als Milchkühe s. Pflanzenläuse.

Cicadenlarven von Ameisenlarven besucht: Dahl¹⁾ (p. 45).

Pflanzenläuse von Ameisen gehalten: Dahl¹⁾.

Ställe oder Kammern für Pflanzenläuse: Dahl¹⁾ (p. 29, 32, 34, 42).

Futterhäuser: Dahl¹⁾ (p. 34).

Wurzelläuse im Ameisennest: Dahl¹⁾ (p. 29, 41, 45).

Gefangenhaltung von Wurzelläusen: Dahl¹⁾ (p. 45).

Siehe ferner unter Feinde.

Beziehungen zu Pflanzen:

Blumen und Insekten: Cockerell⁴⁾ (in New Mexico), Ferton, Sajo²⁾ (Bienen), Schröder.

Pflanzenbewohner: Dahl¹⁾ (p. 59, 62).

Ameisenpflanzen: Dahl¹⁾ (p. 29, 35).

Bestäubung durch Ameisen: Dahl¹⁾ (p. 36).

Ameisenbaum (*Endospermum formicarum*): Dahl¹⁾ (p. 29, 36, 41).

Erigonum u. Rhus. Apidae auf denselben in S. Californien: Cockerell¹³⁾.

Myrmecodia, Beziehung der Ameisen zu ders.: Dahl¹⁾ (p. 34—36).

Muscari comosum: Ferton¹⁾ (Besucher).

Knollen, Zweck u. Schutz ders.: Dahl¹⁾ (p. 36).

Konstanz der Bienen im Besuch bestimmter Blüten: Plateau (Apidae).

Samenverbreitung (durch Ameisen): Dahl¹⁾ (p. 36).

Blütenbesuch: Ducke¹⁾ (bei Pará).

Insekten u. Blüten: Ferton, Schröder.

Gallen: Bogdanow (Conservierung ders.), Müllner*) (neue Galle, Erzeuger?), **).

Ameisengärten: Ule.

Pilzgärten, Pilzzucht (*Lasius*): Schönichen.

*) Auf *Quercus cerris* L., neue Blattgalle. Beschr. Müllner, Verhdlgn. zool.-bot. Ges. Wien. 51. Jahrg. p. 527. — Ob Gallen zweier zusammengehöriger Generationen von *Neuroterus minutulus*?

**) An *Vinca*, ähnl. der von *Andricus curvator* nach Hartig 1840. Kieffer, p. 551.

Beziehungen zur Jahres- u. Tageszeit: Dahl¹⁾ (V) (Ameisen).

Regenzeit, Ameisenreichtum während ders.: Dahl¹⁾ (p. 60).

Trockenzeit, ameisenarm: Dahl¹⁾ (p. 60).

Tageszeit, Einfluss ders. auf den Flug: Dahl¹⁾ (p. 27, bei Ameisen).

Erscheinungszeit: Ducke¹⁾ (Apidae bei Pará). — **Auftreten:** (p. 397).

Erwachen: Ferton²⁾ (Bombus u. Psithyrus zu Bonifacio).

Beziehungen zur Oertlichkeit, Licht u. s. w.: Dahl¹⁾ (V) (Ameisen).

Wald, ameisenarm: Dahl¹⁾ (p. 59).

„ **nahrungsreich:** Dahl¹⁾ (p. 60).

Urwald, Insektenreichtum gering: Dahl¹⁾ (p. 59).

Artenreichtum der Tropen: Dahl¹⁾ (p. 49, 53).

Landbrise führt Ameisen aufs Meer: Dahl¹⁾ (p. 27.)

Sonnenstrahlen (Wirkung ders. auf Ameisen): Dahl¹⁾ (p. 29, 48, 59).

Licht lockt manche Ameisen an: Dahl¹⁾ (p. 27).

Parasiten: Ferton²⁾ (von Eumenes), Quail (im Ei von Gonerilla).

der San José Scale: Johnson, W. F. (Aphelinus fuscipennis).

von Anobium domesticum Johnson, W. G. (Spathius exaratus).

Feinde: Feinde d. Ameisen: Dahl¹⁾ (p. 43).

Insektenfresser als Ameisenfeinde: Dahl¹⁾ (p. 43).

Vögel als Feinde (der Ameisen): Dahl¹⁾ (p. 43).

Ameisenköpfende Fliege: Pergande.

Mageninhalt der Vögel: Dahl¹⁾ (p. 43, 44).

Schichtung der Erde: Zerlegung der oberst. 30—40 cm dick. Schicht wie folgt, unten Kies u. Steine, darauf 20—30 cm dicke Schicht fein. Sand infolge der Thätigkeit der Insekten: Rasenameisen, Sandwespen. Insektenbörse, 17. Jhg. p. 12.

Nutzen (der Ameisen): Dahl¹⁾ (p. 44).

Genussmittel: *

Caprification in America: Howard, Sajó³⁾, Schwarz.

Feigenkultur: Howard.

Schaden **), (Bienen- u. Wespen-Ueberfälle, 1901 sehr zahlreich). — Dahl¹⁾ (p. 44 der Ameisen), Tryon²⁾.

Tod eines Menschen (Säugling, 5 Wochen alt) durch Ameisen: Plawina *).**

*) Ameisen an Stelle von Caviar. Viele Arbeiter und Fuhrleute in den Holzschlägerdistrikten Minnesotas u. Wisconsin haben eine Vorliebe für gewisse Gatt. von Ameisen von roter Farbe u. ziemlicher Grösse, in grossen Mengen unter der Rinde abgestorbener Bäume lebend. Nach dem Abtöten durch Abbrühen u. Trocknen in der Sonne bilden sie ein derbes, braunes, sehr angenehm aromatisches Pulver, dass einen Geschmack wie feiner Obst-Essig hat. Nach Insektenbörse 18. Jhg. p. 205.

**) Insektenbörse 18. Jhg. p. 293 (Briefkasten).

***) In dem nahe bei Marienbad (Böhmen) gelegenen Orte Lang haben in Zeit einer halben Stunde viele Tausende A. Nase, Augen, Mund bedeckt, ja sogar in den Leib waren sie eingedrungen. Dr. O. Plawina, Insektenbörse, 18. Jhg. p. 285.

Lästiger Gast: *)

Beziehung zu Landwirthschaft, Forstwirthschaft, Hauswirthschaft und

Gartenbau: Andersson²⁾ (Ameisen, Schaden ders.), Berlese, Ormerod.

Apfel: **).

Birne: †††).

Farne: von Schlechtendal (Selandria).

Kiefer: Höppner²⁾ (Lophyrus pallidus Klug).

Kirsche: ***).

Koniferen: Lücke (Lyda).

Orchideen: siehe Isosoma (Cattleya wesp).

Pflaume: Andersson ([Plum saw-fly] Hoplocampa fuliginosa).

Rose: Schlechtendal²⁾ (Monophadnus).

Stachelbeere: †).

Weinstock: Berlese.

Bekämpfungsmittel: Lücke (Lyda).

Methoden. Technik etc.

Experimente u. Statistik: Dahl²⁾.

Art- u. Individual-Statistik: Dahl²⁾.

Quantitative Methode (der Untersuchung): Dahl¹⁾ (p. 5, 53).

Fänge: Dahl¹⁾ (III) (Uebersichten ders. auf dem Bismarck-Archipel).

Sammeln: Dahl¹⁾ (p. 21. — Oecophylla bei dems. lästig).

Quantitative Fänge: Dahl¹⁾ (p. 54). **Köderfänge:** Dahl¹⁾.

Falle für Ameisen: Dahl¹⁾ (p. 53). **Fanglaterne:** Dahl¹⁾ (p. 25).

Fangregister: Dahl¹⁾ (p. 21, 38).

Präparation der Ameisen: Forel⁵⁾.

Zucht: Bignell, G. C.³⁾ (Corsischer Ameisen),⁴⁾ (Metopius dentatus Fr. aus Bombyx quercus).

Behälter zur Larvenzucht: du Buysson, H. ††).

Konservirung: Bogdanow (Gallen).

Apparat zur Bestimmung der Stärke der Ameisensäure: Poulton¹⁾ †††).

Fauna. Verbreitung.

Verbreitung: Ferton²⁾ (der an harzende Bäume gebundener Hym.).

Tropenfauna, Unterschiede von einer gemässigten: Dahl (p. 46, 50, 60)

Baumfauna, myrmekologische: Forel¹¹⁾.

Strandfauna: Dahl¹⁾ (p. 53, Ameisen).

*) brasil. graues Hymen., dessen Larv. sich unt. reichl. Wachsausscheid. in Schlüssellochern verpuppen. Insektenbörse 17. Jhg. p. 100. — Auskratzen mit heiss. Messern.

**) The apple Saw-fly (Hoplocampa testudinea). Journ. Board of Agricult. v. VII p. 183—187.

***) Pear a. Cherry saw-fly. Board of Agricult. No. 62.

†) Gooseberry saw-fly. Board of Agricult. No. 12.

††) Feuille jeun. Naturalist T. 31 p. 226—227, 257.

†††) siehe Physiologie (p. 393) unter Säure.

Fauna von Celebes: Emery⁴⁾ (Ameisen).

des Bismarck-Archipel: Dahl¹⁾.

der Sandwich-Inseln: Ashmead, Sharp (Titel auch unter Fauna Hawaïiensis).

Tropische Formen: Szépligeti²⁾ (Cenocoelioniden u. Braconiden).

Vergleich verschiedener Faunen: Dahl¹⁾ (p. 49).

Ungleichmässigkeit in der Verbreitung: Dahl¹⁾ (p. 23).

Faunen: Mischung ders. durch Verschleppung u. Importation von Ameisen mit fremden Hölzern u. Pflanzen: Forel⁵⁾ (p. 82).

Importirte Hymenopt.: (durch Schiffsverkehr in Hamburg eingeschleppt): Forel⁵⁾ (p. 82, Ameisen), Kraepelin (Liste von 53 Spp., p. 193 u. 194).

1. Arktisches und Antarktisches Gebiet.

vacat.

2. Inselwelt.

Hawaiische Inseln: Ashmead⁹⁾, Perkins.

Bismarck-Archipel: Dahl¹⁾ (Formicidae), Forel⁹⁾.

Neu-Britanien: Cameron²⁾ (Willey's Exped.).

Neu-Guinea: Enderlein, Krieger.

Neu-England: King²⁾ (Formicidae).

Neu-Seeland: Ashmead¹⁾ (Hym. Parasitica), Cameron⁹⁾, Forel¹¹⁾.

Lakkadiven u. Malediven: Cameron⁷⁾.

3. Paläarktisches Gebiet.

- a) Insgesamt oder mehrere der folgenden Gebiete zusammen:
 André, Berthoumieu, Handlirsch, Kieffer, Kohl²⁾ (Ammophila), ³⁾ (Diodontus Spp.), ⁴⁾ (Tachysphex), Mocsáry u. Szépligeti, Pérez, Szépligeti³⁾ (Braconiden), Tournier.

Subtropische Fauna in demselben: Schmiedeknecht.

4. Europa.

- b) Europäisches Gebiet insgesamt:

Berthoumieu (Ichneum.), Friese, Kieffer (Zoocecidien), Konow, Rudow (Bauten).

- c) Europäisches Gebiet im einzelnen:

Norddeutschland: Dahl¹⁾ (Ameisen: Bestimm.-Tabelle).

Berlin: Schirmer (Tenthrediniden).

Nordwestdeutschland: Bienenfauna der Dünen u. Weserabhänge zwischen Uesen u. Baden: Höppner⁴⁾ ⁵⁾ ⁶⁾ ⁷⁾ (weitere Beiträge).

Ostbalticum: Klinge (Honigbäume).

Westpreussen: Klinge (Beutkiefern).

Schweiz: Brauns, Frionnet (Seltenheit von Bombus).

Oesterreich:

Schlesien: Ducke³⁾, Müllner. — Troppau, Odrau: Ducke³⁾ (Liste der Chrysididae).

- Küstenland: Ducke³) (Liste der seltneren Chrysididae).
 Dalmatien: Gasperini (Hym. symphyt.).
 Galizien: Niezabitowski (Sprawozd. Kom. Krajo vol. XXXV p. 35—40)
 (Chrysidae), ²) (Phytophaga).
 Niederösterreich: Müllner (Dryocosmus n. sp.).
 Steiermark u. Nachbarländer: Hoffer (Leben der Wespen), Strobl²)
 (Ichneumoniden).
 S. Istrien: Schletterer.
 Wien: Müllner (Neuroterus n. sp., Andricus n. sp.).
 Siebenbürgen: Strobl¹).
 Ungarn: Chyzer ¹), ²), Strobl ¹).
 Russland (europäisches): Kokoujew ¹) (Celor), Semenow (Konowia).
 Frankreich: Fertou, Marshall, Pic²) (Stenodontus n. sp.).
 Corsica: Fertou, Marshall, Pic. Haute-Savoie: Pic³) (Ichneum.).
 Loire-inférieure: Dominique*) (Fossoria, Vespidae, Chrysidae).
 Riom u. Umgegend: Pic ¹) (Ichneum.).
 Grossbritannien: Cameron⁴) (Revision der Torymina), Gardner³) (Coelioxys
 mandibularis, für Fauna neu), Morice¹¹) (für Fauna neu), Morley (für Fauna
 neu), **) (Pezomachus).
 Alderney. Luff***). Von dieser interess. Insel werden 113 Hymenopt. er-
 wähnt, 31 davon kommen nicht in Guernsey vor. Unter den nicht in
 Britannien vorkomm. Insekt. finden sich *Andrena fessae* u. 2 Ichneum.
 Devon, South: Bignell¹) (Braconidae).
 Halling, Kent: Elgar²).
 Jersey: Evans (Bembex), Luff (Bembex).
 North Cornwall, Tintagel: Rothney.
 Co Down: Wyse (*Sirex gigas*).
 Lancashire, Cheshire: Gardner¹) (Aculeata).
 Lincolnshire (Coast): Carr (Aculeata).
 New Forest: Nevinson²) (Aculeata).
 Northhamptonshire: Goss†). Norfolk: Wainwright.
 North Wales: Bradley¹) (*Pompilus approximatus*), Nevinson (Aculeata).
 Nottinghamshire: Liste v. 75 Aculeat. The Entomologist, vol. 33 p. 180.
 Erwähnt *Ellampus auratus*.
 Oxford: Hamm (*Andrena* u. *Nomada*).
 Suffolk: Hocking (Hym. aculeata). Wallasey: Gardner⁴) (Coelioxys).
 Wicklow, County: Barrington u. Moffatt.
 Perthshire: Carter¹) (Aculeata). Tintagel, N. Cornwall: Rothney.
 Woking: Morice¹²). Waterford, Co.: Flemyng.

*) Bull. Soc. Ouest. France (2) vol. 1 p. 505—511.

**) Trans. Leicester Soc. vol. V p. 295—301.

***) cf. vor. Bericht p. 311.

†) The Insects of Northamptonshire. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12
 (37) p. 148.

Schottland: Carter (*Salius notatulus* Saund. u. *Crabro aphidum*), Evans *)
 1) (*Chrysis Ruddii*), 2) (*Bombus Smithianus* var. pall.), 4) 5) (*Aculeata*),
 6) (*Chrysidae* **), Malloch ***), Morton (*Agriotypus*).

West-Schottland: Dalglish.

Dumbartonshire: Malloch.

Midlothian: Evans 7) (*Agriotypus armatus*).

Perthshire: Carter (*Aculeata*).

Norwegen: Konow 3) (*Lygaeonematus* n. sp.), Lie Pettersen (biolog. Beobacht. an
 Hummeln), Strand 1) (*Hym. Phytophaga*), 2) (*Aculeata*).

Rosvand: Strand †).

Bergen: Schneider.

Schweden: Adlerz.

Belgien: Athimus (*Ichneumonidae*).

Spanien: Cameron 5) (*Crypturus* n. sp.), von Heyden ††).

Barcelona: Handlirsch 3) (*Stizus* n. sp.).

Balearen: Poulton 3), Saunders 1).

Italien: Rom: Lepri †††) (*Apidae*).

Corsica: Bignell 2) 3) (*Formicidae*), Ferton (Biologie), Kieffer, Marshall.

Malta: Kohl 4) (*Ammophila* n. sp.).

✓ **Griechenland:** Cephalonia: Emery 10), Ghigi.

Bosnien: Kohl 4) (*Tachysphex* n. sp.), Wasmann 4) (*Myrmekophilen* u. *Ameisen*).

Transcaspien: Kohl 4) (*Tachysphex*, 3 n. sp.).

Süd-Europa u. Mittelmeergebiet: Ferton, Morice.

Mediterranes Gebiet: Handlirsch 3) (*Stizus*), Wasmann 9) (*Eciton-Gäste*).

Balearen: s. unter Spanien.

5. Asien.

Asien: Emery 11) (*Formic.* 2 n.).

Sibirien: Kohl 2) (*Ammophila* n. sp.).

Südost-Sibirien, Korea: Kohl 2) (*Ammophila* n. sp.).

Semipalatinsk: Saissan: Kohl 2) (*Ammophila* n. sp.).

Ostasien: Cameron 10).

Japan: Forel 11) (*Ameisen*).

Nordchina: Tientsin, Kalgan: Kohl 2) (*Ammophila* n. sp.).

Nördl. Mongolei: du Buysson 1) (*Ellampus* n. var.), Kohl 2) (*Ammophila* n. sp.).

Centralasien: du Buysson, Semenow.

Sefir-Kul: Handlirsch (*Stizus* n. sp.).

Issyk-Kul, Ton-Fluss: du Buysson 1) (*Holopyga* n. spp.).

Transcaspien: Iman-baba: du Buysson 1) (*Chrysis*), Kokoujew 1) (*Celor*).

Dschungarei: Kohl 2) (*Ammophila* n. sp.).

*) Entom. Monthly Mag. (2) vol. (12) 37 p. 15.

**) Ann. Scott. Nat. Hist. 1901 p. 133.

***) Entom. Monthly Mag. (2) vol. (12) 37 p. 259.

†) Bemerk. zum Fundort. Strand) (p. 15).

††) Mutilla. Bol. Soc. Españ. vol. I p. 222.

†††) Boll. Soc. Zool. Ital. vol. IX p. 141—148 etc.

- Turkestan:** Samarkand: Kohl²⁾ (Ammophila n. sp.).
Bucharei: Kohl²⁾ (Ammophila n. sp.).
Westasien: Kokujew. **Persien:** Szépligetli.
Südpersien: Kohl²⁾ (Ammophila n. sp.).
Arabien: Friese, Kohl²⁾ (Ammophila n. sp.).
 For: Kohl²⁾ (Ammophila n. sp.).
 Aden: Kohl²⁾ (Ammophila n. sp.).
 Assab: Kohl²⁾ (Ammophila n. sp.).
Gebiet des Roten Meeres: Kohl²⁾ (Ammophila n. sp.).
Syrien: Jerusalem, Brammana: Kohl²⁾ (Ammophila n. sp.).
 Palästina: Szépligetli¹⁾ (Braconiden).
 Jericho: Kohl²⁾ (Ammophila n. sp.), Szépligetli¹⁾ (Braconiden).
Mesopotamien: Kohl²⁾ (Ammophila n. sp.).
Kleinasien: Kohl²⁾ (Ammophila n. sp.).
Cypern: Kohl²⁾ (Ammophila n. sp.).
Indien: Cameron³⁾ (Aglaoapis n. g.),⁹⁾ (Ichneum. 17 n. g.).
Bengalen: Bingham (Bracon. 2 n. sp.).
Assam: Kokouyew³⁾ (Gyroneuron 4 n. g.).
Ceylon: Emery⁴⁾ (Ameisen),⁷⁾ (wohl ein Auszug aus⁴⁾).
 Badurelia: Kohl²⁾ (Tachysphex n. sp.).
Malayischer Archipel: Cameron¹⁾ (Skeat Expedition), Forel⁵⁾ ⁶⁾, Friese, Konow, Pérez, Szépligetli.
Sumatra: Hagen. **Java:** Forel²⁾.
Borneo: Cameron¹⁾ ¹⁰⁾, Emery⁴⁾ (Ameisenfauna; Theorie der Entstehung der Insel).
Celebes: Emery⁴⁾. **Tomohon:** Emery⁴⁾.
Key Eilanden, Amboina, Nederland India: Friese⁵⁾ (Trigona n. sp.).
Lakkadiven und Malediven siehe unter Inselwelt.

6. Afrika.

- Aethiopisches Gebiet:** Handlirsch²⁾ (p. 426, verhältnismässig arm an Gorytes-Arten), Wasmann⁹⁾ (Eciton-Gäste).
Afrika: André, Ashmead, du Buysson⁶⁾, Emery²⁾,⁹⁾,¹⁰⁾, Enderlein¹⁾, Forel, Friese³⁾, Handlirsch²⁾, Kohl²⁾ (Ammophila n. sp.), Kriechbaumer, Mayr, Pérez, Péringuey, Szépligetli, Wasmann⁹⁾ (Treiberameisen, neue Gäste derselben).
Nordwest-Afrika: Dakar: André¹⁾ (Mutilla n. sp.).
 Lybische Wüste: Kohl²⁾ (Ammophila n. sp.).
Algier: Forel, Handlirsch, Kohl²⁾ (Ammophila 2 n. sp.), Saunders²⁾ (Heterogyna, Fossores).
 Biskra: Kohl²⁾ (Ammophila n. sp.).
Oran: Handlirsch⁴⁾ (Nysson n. sp.).
Tunis: Kohl²⁾ (Ammophila n. sp.), Marshall, Seurat²⁾ (Parasiten an d. Eichen).
Tripolis: Kohl²⁾ (Ammophila n. sp.).
Nordost-Afrika (Golf v. Aden): Kohl²⁾ (Ammophila n. sp.),⁴⁾ (Tachysphex n. sp.).
 Colonia eritraea: Emery¹⁰⁾ (Form.).
Egypten: Kohl²⁾ (A. n. spp.), Kriechbaumer.

- Kairo: Kohl²⁾ (*Ammophila* n. sp.).
 Fayun: Kohl²⁾ (*Ammophila* n. sp.)
Ost-Afrika: Dar-es-Salaam: André (*Mutilla* n. sp.), du Buysson¹⁾ (*Chrysis* n. sp.), Handlirsch³⁾ (*Stizus* n. sp.).
 Wabeniland: André (*Mutilla* n. sp.), du Buysson¹⁾ (*Chrysis* n. sp.), Kohl¹⁾,
 Mayr (Formic.: *Pheidole* n. sp., *Camponotus* n. sp.).
Kordofan: Kohl²⁾ (*Ammophila* n. sp.).
West-Afrika: Kamerun: Mayr (*Rhoptromyrmex* n. g., 3 n. sp., ab. nicht beschr.).
 Mossamedes: Forel²⁾.
Congo: Kohl²⁾ (*Ammophila* n. sp.).
Süd-Afrika: Ashmead⁷⁾ (Hym. parasit. 3 n.), Brauns, J. (Lebensweise von *Dorylus* u. *Aenictus*), Péringuey (*Mutillidae* 7 n. sp.), Wasmann⁹⁾ (Ameisengäste).
Oranje Freistaat: Reddersburg: Mayr (Formiciden).
 Bothaville: Mayr (Formiciden).
Capcolonie: Natal: Forel²⁾ (Ameisen).
 Port Elizabeth: Mayr (Formiciden).
Delagoabay: Kohl²⁾ (*Ammophila* n. sp.).
Madagascar: André²⁾, du Buysson¹⁾ (*Chrysis* n. var.), ²⁾.
Seychellen: André²⁾. **Maskarenen:** André²⁾.

7. Amerika.

- Nearktisches Gebiet:** Forel¹¹⁾ (Ameisen).
Amerika: Vachal (Hym. mellifera).
Nordamerika: Ashmead^{1) 2) 3) 4) 8)}, Bradley¹⁾ (*Oryssidae*, ²⁾ (*Evaniidae*),
 du Buysson¹⁾, Cameron, Cockerell, Emery⁹⁾, Forel¹⁾ ⁷⁾, Fox¹⁾, Lovell,
 Morice u. Cockerell, Pérez, Robertson, Titus, Viereck, Wasmann⁹⁾ (*Eciton-*
Gäste), Wheeler.
Adirondacks: Ashmead¹⁰⁾, Macgillivray (*Tenthredinide*).
Südwest: Hubbard (*Dasyliiron*). **Alaska:** Viereck*) (*Apidae*).
Californien: Cockerell^{6) 18)} (*Andrena* n. sp.).
 Süd: Cockerell¹³⁾ (*Apidae*), ¹⁴⁾ (*Anthophorinae* n. spp.), ¹⁵⁾ (Spp. von
Brachycistis).
Indiana: Lovell. **Maine:** Lovell.
Florida: Robertson¹⁾. **Illinois:** Robertson¹⁾.
Massachusetts: King^{1) 2)} (*Formicidae*),
Colorado, Florissant: Scudder (interess. Hym.).
Colorado u. Utah: Scudder. **Nebraska:** Cockerell¹⁷⁾ (*Apidae*).
New Jersey: Ashmead**, Cockerell¹⁵⁾ (*Andrena* n. spp.).
Washington-Territory: du Buysson¹⁾ (*Cleptes*; *Ellampus* n. sp.).
Texas: Wheeler u. Long (*Eciton*-♂).
Vereinigte Staaten: Howard (*Feigencultur*).
 östliche: Johnson, W. G. (*Aphelinus fuscipennis*).

*) Entom. News (Philad.) vol. XII p. 325.

***) Titel p. 343 des vorig. Berichts.

- Mexico, Cordoba:** du Buysson ³ ⁴) (2 Meliponen), Forel ⁹), Wheeler ⁸) (Ameisen).
- Neu-Mexico:** Cockerell ³) (Tenthred., Apidae), ⁴) (Blumen u. Insekten), ⁵) (Ceratina n. sp.), ¹²) (Fossoria), Cockerell u. Porter (Apidea).
- Santa Fé Mountains:** Cameron ⁶) (Aculeata n. g., 5 n. sp.).
- Las Vegas:** Cockerell ²).
- Hudsonian Zone:** Ashmead ³), ⁴), Cockerell ⁸) ⁹) (Apoidea).
- Neotropisches Gebiet:** Forel ¹¹).
- Neotropisches u. äthiopisches Faunengebiet:** Vergleich der Dorylinen-Gäste beider: Wasmann ⁹).
- Centralamerika:** Emery ²) ⁹), Forel ⁵) ⁹) ¹¹), Pérez, Szépligeti, Vachal, Wheeler.
- Mittelamerika:** Wasmann ⁹) (Eciton-Gäste).
- Westindische Inseln:**
- Antillen:** Ashmead ⁸), Forel ¹¹).
- Bahamas:** Forel ¹¹).
- Trinidad:** Ashmead ⁸).
- Südamerika:** du Buysson, Cockerell, Dominique, Ducke ¹) ²) ³), Emery ²) ⁹), Enderlein ¹) ²), Forel ²) ⁵) ⁸) ¹¹) ¹³), Friese ²) ⁵), Handlirsch ¹), Konow ²), Kriechbaumer ¹), ⁶), Pérez, Schrottky, Szépligeti, Vachal.
- Buenos Aires:** Brèthes (Biologie dreier Hym.).
- British-Guiana:** Cockerell ¹¹) (Apidae n. spp.), du Buysson ¹) (Holopyga n. sp., Chrysis n. sp.), Kirby.
- Brasilien:** Wasmann ⁹) (Neue Eciton-Gäste I, Liste der Gäste V).
- Amazonas-Gebiet:** Ule (Ameisen-Gärten).
- Blumena u:** Friese ⁵) (Trigona n. var.).
- Rio Anajas auf der Insel Marajó, Pará:** Friese ⁵).
- Rio Grande do Sul:** du Buysson ¹) (Holophrys), Handlirsch ¹) (Gorytes, 2 n. sp.).
- San Leopoldo:** Handlirsch ¹) (Gorytes, 2 n. sp.).
- São Paulo:** Friese ⁵) (Trigona), Schrottky ³).
- Pará:** Ducke ¹) (Apidae: Erscheinungszeit, Blütenbesuch etc.), ²) (Sphegidae), ³) (Chrysididae, desgl. Liste), Friese ⁵) (Trigona n. spp.), (Bienen u. ihre Besuchspflanzen).
- Süd-Brasilien:** Forel ²).
- Columbien:** Popayan: Friese ⁵) (Trigona n. spp.).
- Britisch-Columbia, Yale:** du Buysson ¹) (Notozus, Ellampus).
- Ecuador:** Friese ⁵) (Trigona).
- Paraguay, Porto Casado:** André ³) (Mutilla n. sp.).
- Villa Rica:** Friese ⁵) (Trigona n. sp.).
- Patagonien:** Rio Santa Cruz: André ³) (Mutilla n. sp.), Mantero.

8. Australien.

- Australien:** André ⁵), Ashmead ¹) (Hym. Parasitica), Cameron ⁹) (Ichneum., n. g.), ¹⁰), Froggatt (Saw-flies., Bemerk. dazu), Kokoujew (Braconides, Tryon ¹) (erntende Ameisen).
- Neu-Seeland** s. unter Inselwelt.

Paläontologie.**Kalk von Böhmen, Perucer Schichten:** Frič.**Mymaridae des Bernsteins:** Meunier.**Mymaridae.***Anaphes splendens, schellwieniens* Meunier, Ann. Soc. Bruxelles T. XXV p. 284 (im Bernstein).*Limacis baltica* Meunier, t. c. p. 286 (Bernstein).*Litus elegans* Meunier, t. c. p. 285 (Bernstein).*Malfattia* n. g. Mymaridarum Meunier, t. c. p. 287. — *molitorae* p. 287 (Bernstein).*Mymar duisburgi* zu *Eustochus* gezogen. Meunier, t. c. p. 290.*Palacomymar* n. g. *succini* n. sp. Meunier, t. c. p. 289 (Bernstein).**Tenthredinidae.***Atocus* n. g. Scudder, Bull. U. S. Geol. Surv. No. 93 p. 24. — *depressus* p. 25 Taf. I Fig. 5 (Tertiär. — Nordamerika).**C. Systematischer Theil.**Aculeata. Bemerk. zu einigen Sp. (*Vespa*, *Nomada*, *Crabro*, *Passaloecus*) Evans, Will.**Suborder Heterophaga.****Subfamilia I. Apoidea.****Apidae** (Fam. I—XIV).

(Es gehören hierher folg. Familien: Apidae, Bombidae, Euglossidae, Psithyridae, Anthophoridae, Nomadidae, Ceratinidae, Xylocopidae, Megachilidae, Stelididae, Panurgidae, Andrenidae, Colletidae u. Prosopidae).

Autoren: Alfken, Anglas, du Buysson, Cameron, Cockerell, Cockerell u. Cockerell, Dedekind, Ducke, Ferton, Frey-Gessner, Friese, Höppner, Lie Pettersen, Lovell, Maeterlink, Martynow, Mocsáry u. Szépligeti, Morice, Morice u. Cockerell, Nielsen, Oudemans, Pérez, Petrunkevitch, Plateau, Robertson, Rudow, Saunders, Schrottky, Smith, Sutro, Titus, Tournier, Vachal.

Apidae Europae. Pars VI: Panurginae, Melittinae, Xylocopinae. Friese.

Apidae. Verbreitung schwedischer. Nordenström, p. 206—207.

Apidae von New Jersey in Smith's Insects of New Jersey, 1900 p. 500 sq. — Titel p. 343 des vorig. Berichts.

Instinkt der Honigbiene: Geschlechtsbestimmung. Dickel.**Gewohnheiten u. Instinkt:** Maeterlink, Sutro.**Bienen ausschliesslich auf Drohenwaben:** Martynow.

Gewohnheiten verschiedener europäischer Bienen, Instinkt, Geruch.

Blumen u. Bienen: Ferton (Ann. Soc. Entom. France, vol. 70, p. 84—95).

Biologie brasilianischer Bienen: Schrottky (Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 209—216).

Bemerkungen zu Bienen von Para, Futterpflanzen, Zeit des Erscheinens u. s. w.: Ducke.

Wohnungen der Hautflügler, Nester der Bienen: Rudow.

Richtungskörper u. ihr Schicksal im befruchteten u. unbefruchteten Ei: Petrunkevitch.

Beschreibungen der Bienen in der Isis von 1832, 34. — Wiedergabe ders. nebst Anmerk.: Frey-Gessner.

Honigproduktion im alten Aegypten: Dedekind.

Anthophorinae. Liste der A. des Mus. Paris: du Buysson (5). Eintheilung ders.: Cockerell u. Cockerell.

Acanthopus Klug. Hat lange Lebensdauer. **Ducke, A.** (1) p. 27. Bei Para nur *A. splendidus* F., ob Schmarotzer bei *Euglossa* oder *Centris*? **Ducke, A.** Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 2. Hft. p. 66. — *excellens*, ♂ ♀ auf *Crotalaria paulina* Schum. **Schrottky**, p. 212. (Futterpflanze f. Januar, Februar). — *splendidus* F. besucht bei Pará ausschliesslich die Blüten der Liane *Dioclea lasiocarpa* Mart. (Papil.). **Ducke, A.**, l. c. p. 25.

Agapostemon sp. Flugzeit bei S. Paulo. **Schrottky**, p. 213.

Agapostemon texanus Cress. zahlr. Fundorte, Fundpflanzen u. -Zeiten in New Mexico. **Cockerell, T. D. A.** Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 128.

Aglaopis n. g. Stelididarum. **Cameron** (3). — *brevipennis* p. 263 (Bombay).

Amegilla Friese (*Anthophora cleomis* Ckll. u. *A. cardui* Ckll.) zu dieser Gatt. gehörig, die Ashmead als Gatt. behandelt. Mundtheile wie *Anthophora*. Nach **Cockerell, T. D. A. u. W. P.** am besten als Subg. zu behandeln.

Ammobates latitarsis, syriacus u. *rostratus* Friese n. spp. bei Jericho. **Schmiedeknecht**, p. 57. — n. sp. bei Jericho, Palaest. **Morice** (5) p. 169.

Andrena. Flugzeit. Lage der Wohnungen, Bau ders.; Nahrung der Larven; ♂ mancher Arten sehr selten; die Bienen sind nicht bösartig. Es gelang bis jetzt die Bauten folg. Spp. zu entdecken: *aestiva* Sm. mit nur wenigen Zellen, *albicans* Kb. zahlr. bevölkert, *cingulata* Fbr. mit zierlichen Zellen zu einem wallnussgrossen Ballen vereinigt, *albicus* Kb., *fulvicrus* Kb., *cinerariae* L., *Smithella* Kb., *Clarckella* Kb., *Trimmerana* Kb., alle mit grösseren, aber leicht zerfallenden Nestanlagen. **Rudow**, p. 400—401.

— Synonymie der nordamerikanischen Spp. **Morice u. Cockerell**, Canad. Entom. vol. XXXIII, p. 123—124, 149—155. — Gänge von *vicina*, *viola* u. *bicolor*. **Smith**, Journ. New York Entom. Soc. v. IX, p. 37—39.

Cetii Schr. bei King's Cross, für Schottland neu. **Dalglisch**, p. 7. — *cineraria* Linn. Bei Strathbane u. Pirumill Arran für Schottl. selten. **Dalglisch**, p. 7. — Gwynana bei King's Cross.

Im Einzelnen: *analis* at Levenside Moor. **Malloch**, p. 6.
antilope Pérez. Auf Corsica. **Ferton**, p. 65.

- fucata Smith bei Jamestown. — fuscipes Kirby u. analis Panz. auf den Levenside Moor. **Malloch**, p. 6.
- Cetii u. bimaculata bei West Runton, Norfolk. **Wainwright**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 102.
- chrysoseles Kirby u. denticulata auf den Kalkdünen bei Upper Halling. **Elgar**, H. p. 17.
- an Crotalaria paulina Schum. **Schrottky**, p. 214.
- Hattorfiana Fab. u. Nomada armata H.-Schff. bei Oxford. **Hamm**, p. 16.
- helvola Linn. in Scotland. **Malloch**, J. R., Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 259.
- helvola L. and ambigua Perkins. **Morice**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 4. — Bei Leatherhead, Mitte Mai auf Alliaria officinalis. — Beide eine Sp.?
- morio Brullé. Bemerk. zum Nestbau. **Ferton**, Ann. Soc. Entom. France, vol. 70, p. 93—94, Gang Taf. I, Fig. 7.
- nigroaenea K. u. Andrena afzelliella K., auf Corsica, fast roth. **Ferton**, t. c. p. 88.
- nigroolivacea Dours. ♀ u. ♂ riechen (wenn gedrückt) nach Verbena citriodora, bei molesta Pérez riecht nur das ♀. **Ferton**, p. 95.
- Spp. in Norfolk. **Wainwright**.
- polita Smith in Kent. **Elgar**, H. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 277. — proxima Kirby auf den Kalkdünen bei Upper Hall. **Elgar**, H. t. c. p. 17.
- vetula Lep. = megacephala Smith und die Pflanze Muscari comosum Mill. **Ferton**, p. 96.
- morio Brullé, Castle Bellver, Majorca. **Saunders** (1) p. 209. — rosae Pz., Miramar. — sp.? (stylopisirt) Miramar p. 209. — Gwynana K. ♀ var.? sehr dunkles. — nigro-olivacea Dours. p. 209. — flavipes Pz. = fulvicrus Kirb., Castle Bellver, Pollensa. — var.? ♀. — Sp.? (zur Gruppe Afzelliella gehörig). **Saunders** (1), p. 209.
- Neu: *brasiliensis* (einzige südl. vom Aequator vorkommende Sp. der Gatt.) **Vachal**, Ann. Soc. Entom. France, 1901, p. 77. ♀♂ (Brésil: Santa Cruz). — Die A. cyanescens Haliday von Chili gehört nach Smith zu Colletes oder vielleicht zu einer anderen Gatt.
- Moricei* Friese n. sp. u. *speciosa* Friese n. sp. bei Jericho. **Schmiedeknecht** p. 57.
- kriigiana* **Robertson**, Canad. Entom. vol. 33 p. 229 (Illinois). — *carlini* (= bicolor Rob. nec Fabr.) **Cockerell**, Canad. Entom. vol. XXXIII, p. 150. — *cupreotincta* p. 153. — *pluvialis* p. 154. — *anograe* p. 154 (alle vier aus Nord-Amerika). — *birtwelli* **Cockerell**, Psyche vol. IX, p. 283. — *merriami* p. 284. — *Washingtoni* p. 284 (ebenfalls alle drei aus Nord-Amerika).
- apacheorum Ckll. etc. p. 345 des vorig. Berichts. Hierzu ergänze **Cockerell**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 5.
- Anthidiinae. Untersch. d. Gatt. nach **Cockerell**, T. D. A. u. W. P. p. 49.
2. Glied der Labialpalp. ungefähr 2 mal so lang wie das dritte. 1.
2. Glied der Labialpalp. nicht oder nicht viel länger als das erste. 2.

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Max.-Palp. 3-gliedrig | Paranthidium n. |
| Max.-Palp. 2-gliedrig | Dianthidium Oкл. |
| 2. Max.-Palp. 3-gliedrig | Protanthidium n. |
| Max.-Palp. 2-gliedrig | Anthidium Fabr. |

Anthidium. Wollbiene, wegen der eigenthüml. Einrichtung ihrer Larvenzellen.
manicatum Ltr. u. *florentinum* Ltr. Beschr. des Nestes, Gewohnheiten der Mutterbiene.

diadema Ltr., *oblongatum* Ltr. (Schmarotzer derselben die Dipt.: *Tachina larvarum* L. u. Hym. Chalc. *Leucaspis gibba* Klg.; *Stelis* als Gast), *punctatum* L. (Nest in Stengeln von *Tanacetum* u. *Cirsium* auch verlass. Crabroniden-Nester in Brombeerstengeln). **Rudow**, p. 407—409. — Gesumme durchdringend; Anzahl der Geschlechter, wechselnd bei Bozen in einem Sommer, von manic. u. florent. auf 10 ♂ ein ♀. Kennzeichen ders. Welchen Zweck die spitzen, dornartigen Fortsätze am Rückenschildchen haben, ist noch ungewiss. p. 409—410.

— F. bei Pará 4 leicht unterscheidbare Sp., die vom Verf. aber noch nicht bestimmt sind. **Ducke, A.** Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 2. Hft. p. 63. — hierher Sp. wie *manicatum* u. die amerik. *Porterae* u. *maculosum*. **Cockerell, T. D. A. u. W. P.** p. 50. — *binghami* Friese von Tenasserim = *A. fraternum* Bingham nec Pérez 1895. **Friese**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 4. Hft. p. 224. — *steloides* Bingh. siehe *Megachile*. — *litratum* Latr. hat seine Farb. auf Corsica geändert u. ist weiss geworden. **Ferton**, Ann. Soc. Entom. France, vol. 70. p. 88. — *manicatum* L. ♂ ♀. Futterpflanze: *Leonurus sibiricus* L. **Schrottky**, p. 212. — Flugzeit. **Schrottky**, p. 213. — Sonderbares Nest einiger noch unbeschr. Sp. — *oblongatum* siehe *Odynerus parietum*. **K. W. v. Dalla Torre**. — *7-dentatum* Latr. Castle Bellver. **Saunders** (1), p. 210. — sp. in Norfolk. **Wainwright**. — *spiniventre* n. sp. u. *rufomaculatum* Friese n. sp. Bei Jericho. **Schniedeknecht**, p. 57. — *strigatum* Pz. Nestbau. **Ferton**, Ann. Soc. Entom. France, vol. 70 p. 92—93. — *strigatum* Pz. Zelle. Taf. III Fig. 2. **Ferton**. — *strigatum* Ltr. Trägt den Namen Wollbiene mit Unrecht. Zellen schwarz, flaschenförmig, aus Harz, zu 3—6 an Steinen nebeneinander, mit Längsseite festsetzend. **Rudow**, p. 391. — Schmarotzer ders., auch *Stelis aterrima*, siehe dort.

Anthocopa papaveris Ltr. Nest; aus festem Lehm lässt es sich für die Sammlung gewinnen, aus losem Sand nicht. **Rudow**, p. 395.

— Schmarotzer: *Coelioxys*, siehe dort.

Anthophilidae. Ihrer Kunstfertigkeit nach theilt man die Baumeister dieser Gruppe ein (**Rudow**, p. 384—385) in:

1. Verfertiger von Wachszellen, geselliglebende.
2. von Harzzellen, einsamlebende.
3. Erdnister: Bienen, welche Löcher u. Röhren in die Erde graben, darin Zellen anfertigen u. ihre Brut in diesen zeitigen.
4. Bewohner von Lehmwänden oder Mauerfugen, in welche sie Gänge graben, den Eingang aber mit einer Schutzröhre versehen.

5. Erbauer von einzelnen oder gruppenweisen Zellen zu Ballen vereinigt, aus wenig festem Lehm oder aus Sand bestehend, in Erdhöhlen.
6. echte Mauerbienen, welche Zellenballen aus festem, mörtelförmigem Stoffe von grosser Widerstandsfähigkeit herstellen.
7. Holzbewohner, welche in meist morschem Holze Gänge anlegen oder schon vorhandene zur Einrichtung von Larvenwohnungen benutzen.
8. Bienen, welche sich günstige Nistgelegenheiten zu Nutze machen.

Bei jeder Gruppe treten wieder besondere Eigenthümlichkeiten auf, auch finden Uebergänge von einer zur andern statt, so dass erst bei Betrachtung der Einzelheiten alles genauer angegeben werden kann.

— Nester ders. **Rudow**, p. 383 (Apidae, Bombidae, etc.). Feinde der Anthophilidae: **Rudow**, p. 386 (Lep., Hym., Coleopt., Dipt.).

Anthophora u. *Podalirius*. Erdnister. Schilderung des Baues der Zellen u. des Nestes. **Rudow**, p. 391—393. — Bei ihnen tritt, trotzdem sie einsam lebende, nur als ♂ u. ♀ vorkommende sind, schon eine gewisse Gemeinsamkeit auf, da mehrere ♀ einer Brut friedlich neben einander in einem Bau arbeiten u. die Zellen durcheinander lagern. — *parietina* Fbr. abweichender Bau, Schilderung dess. p. 394—395.

Anthophora furcata Pz. Bei oberflächlicher Betrachtung könnte man den Bau ders. auch für den einer *Megachile* halten, da er von denen anderer A.-Arten stark abweicht. Bemerk. dazu. **Rudow**, p. 413. — *parietina* Zahl d. Zell. in Norddeutschl. 5, in Süddeutschl. bis 22. **Rudow**, p. 413.

— Schmarotzer ders.: *Crocisa* etc. siehe dort.

Anthophora (*Amegilla*) *cardui* Ckll. Las Vegas. **Cockerell**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 131. — (*Amegilla*) *cleomis* Ckll. Fundorte in New Mexico p. 131. — (*Amegilla*) *montana* Cress., Las Vegas etc. p. 131. — (*Amegilla*) *urbani* var. *alamosana* (Ckll.). Beim ♂ sind die Thoraxhaare nicht m. schwarzen untermischt, Clypeus u. seith. Gesichtszeichnung weiss, Las Vegas p. 131. *zonata* Fab. v. New Britain, eine gewöhnl. orient. Sp. **Cameron**, P., Proc. Zool. Soc. London 1901 p. 244.

Neu: *catalinae* **Cockerell**, Canad. Entom. vol. 33 p. 297 (Californien).

Anthophorinae. Tribus ders. **Cockerell**, T. D. A. & **Wilmatte**, P. p. 47. — *Asm.*s Tabellen (1899) sind ungenügend.

Paraglossae very long, hairy

Eucerini (*Eucerae* Patton,
Bull. U. S. Geol. Surv. v. 471).

Paraglossae not or hardly exceeding first joint of labial palpi

Anthophorini (*Anthophorae* Patton, tom. cit. 475).

Paraglossae very short; form robust, hind legs of ♀ with a copious scopa; neotropical types

Centrini.

Anthophorini. **Cockerell**, T. D. A. & **Wilmatte**, P.

Max.-Palp. 4-gliedr, Labial-Palp. 2-gliedr.

Saropoda Latr.

Max.-Palp. 5-gliedr.

1.

Max.-Palp. 6-gliedr.

2.

1. Blatt (blade) der Max. stark verlängert, Geißel (whip) - ähnlich, Zunge äusserst lang
 Entechnia Patton.
 Nicht so Anthophoroides n. g.
2. 3. Glied des Labial-Palp. an der Spitze des 2. inserirt; die beiden ersten Glieder lang behaart
 Meliturga Latr.
3. Glied des Labial-Palp. an der Seite des 2. inserirt. 3.
3. Blatt (blade) der Max. an der Basis breit, plötzlich zu einem schlanken Endtheil sich verschmälernd
 Diadasia Patton.
 Blatt der Max. breit, sich ganz allmählich zu einer mehr oder weniger stumpfen Spitze verschmälernd. 4.
4. 2. Glied d. Max.-Palp. sehr viel länger als das erste
 Anthophora Latr.
 2. Glied d. Max.-Palp. nicht viel länger als das erste
 Emphoropsis Ashm.

Die letzt. drei Gatt. sind auch gut durch's Geäder getrennt (vergl. die Tabellen von Ashmead u. Cresson).

Anthophoroides n. g. Type: *A. vallorum* (*Podalirius vallorum* Ckll.) Maxill.-Palp. 5 glied., 2. Glied lang, letzt. sehr klein. Die oberflächl. ähnl. *Anthophora*. *Lesquerellae* Ckll. ist eine echte *Anthophora*. **Cockerell, T. D. A. u. Wilmatte, P.** p. 48.

Anthrena csikiana **Mocsáry**, in Zool. Ergebn. etc., Zichy vol. II, p. 165 (Sibirien). —

Knuthiana (segregans Ckll. von New Mexico ähnl., doch leicht unterscheidbar durch non-tessellate clypeus; auch *apacheorum* etc. nahe) **Cockerell**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 2. Hft. p. 80 ♀ ♂ (Berkeley, California. — Auf Blüten von *Daucus carota*).

Ashmeadiella buconis (Say). Las Vegas, auf Blüten von *Verbesina encelioides*. **Cockerell, T. D. A.** Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 129. — *cactorum* Ckll. Las Vegas, auf Blüten von *Convolvulus arvensis*.

Augochlora von Ducke eingezogen, nicht einmal als Subgenus anerkannt, wird von **Schrottky**, p. 211 nicht begründet. — *Micania scandens* selten von ihr besucht; div. Sp. auf *Solanum albissii* Dun., (gelegentlich) auch auf *Solanum paniculatum*; auf *Capsicum microcarpum* D. C. p. 212; auf einigen *Melastomaceen* p. 212; div. Sp. auf *Rubus rosaefolius* Sm. p. 212.

lumeralis. Gewohnheiten, Gänge, Lebensgeschichte, Einrichtungen zum Graben etc. **Smith**, Journ. New York Entom. Soc. vol. IX p. 52—72 pls. III—V.

Neu sind: *callichroma* **Cockerell**, Proc. Acad. Philad. vol. LIII p. 221. — *beatissima* p. 222 (beide aus Brasilien). — *coloradensis* **Titus**, Canad. Entom. vol. XXXIII p. 132. — *cleomis* p. 135 (Colorado).

Bombus. Lebensweise, Zellenbau, Nester, Aufsuchen bequemer Nistgelegenheiten: in Backofennestern von Zaunkönigen (besonders die Mooshummeln), im Nestbeutel einer Schwanzmeise, Elsternestern, hohlen Bäumen. — Hummeln nicht bösartig, trotz ihrer Grösse; Zeichen ihrer Gutmüthigkeit. Aufzählung der zahlreichen Feinde, darunter besonders *Psithyrus*. **Rudow**. — Biologische Bemerkungen. **Lie Pettersen**. — Vernichtung durch Parasiten. **Jacob**, Feuille jeun. Natur. vol. XXXI p. 293. — Dito.

- Friquet**, op. cit. vol. XXXII p. 23 u. **C. M.** p. 41. — Die Hummel „*Apis fera*“ in Casp. Schwenckfeld's Entomologie. **Sigm. Schenkling**, Insektenbörse, 17. Jhg. p. 116. — Zwei Arten in einem Neste.
- Höppner**. — Latr. Bei Para nur *B. cayennensis* F. an den verschiedensten Blüten, besonders häufig an Solanum-Arten; bei Macapá nur *B. carbonarius* Handl. (violaceus Lep.); erstere also mehr Wald-, letztere mehr Steppenbewohner. **Ducke** (1).
- arenicola* Ths. u. *B. silvarum* L. in einem Neste. **Höppner** (6). II. — Versuche mit andern *Bombus*-Arten.
- cayennensis* (L.). Beschreib. des Nestes. **Schulz, W. A.** Verhdlgn. k. k. zool.-bot. Ges. Wien, 51. Bd. p. 361—362. — Bei Pará. Nachtrag dazu t. c. p. 762. — Verf. findet, dass über das Nest schon eine Beobachtung des Italieners Ghiliani (1851) vorliegt. (Citat).
- cayennensis* F. u. *B. carbonarius* Handlirsch an *Tradescantia dimetica* Mart. **Schrottky**, p. 213.
- Jonellus Sm. Irvine Moor, King's Cross. **DalGLISH**, p. 8. — *soroensis* Fab. in Schottland: Ayrshire, Kilkerran, Dundonald u. Kilsyth, p. 8.
- terrestris* L. var. *ferrugineus* Schmiedekn. Castle Bellver, Miramar, Pollensa Puig de Maria. **Saunders** (1), p. 211.
- xanthopus* Kriechb., *corsicus* Schult. Rechb., *muscorum* var. *nigripes* Pérez. Biolog. Bemerk., Ueberwinterung, erstes Auftreten u. s. w. auf Corsica. **Ferton**, Ann. Soc. Entom. France, vol. 70 p. 84—84.
- Smithianus White. Blasse Var. ders. in Schottland. **Evans**, Will. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 47.
- **Lie Pettersen** behandelt folg. norwegische Formen: *hortorum* L. nebst var. *Harrisella* Kirb. u. *consobrinus* p. 4—6. — *Latreillelus* Kirb. (= *Apis subterranea* Lin.) p. 6—7. — *alpinus* L. nebst Bemerk. zu *smithianus* White p. 8—9. — *distinguendus* Mor. p. 7. — *nivalis* Dahlb. p. 7—8. — *lapponicus* Fabr. p. 9—10. — *pratorum* L. p. 10—11. — *scrimshiranus* Kirb. p. 11. — *hypnorum* L. p. 11. — *Rajellus* Kirb. p. 12. — *agrorum* Fabr. p. 12—13. — *lapidarius* L. p. 13—14. — *mastrucatus* Gerst. p. 14—15. — *terrestris* L. p. 15. — Uebersicht über deren Verbreitung p. 19.
- Caupolicana* **Gaulei**. **Vachal**, Ann. Soc. Entom. France, 1901, p. 78—79 ♂ (Brésil: Sao Paulo).
- Calicurgus hyalinatus* von Wyre Forest. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 11 (36) p. 67.
- Calliopsis coloradensis* Cresson, La Vegas. Augen im Leben blass salbeigrün. **Cockerell**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 128. — *lepidus* Cresson, var. α ♀ *C. rhodophilus* nahest., aber Gesichtszeichn. weiss. Sonst. Bemerk. Fundorte in New Mexico. p. 128.
- Centrini*. Gatt. ders. **Cockerell, T. D. A. u. Wilmatte, P.** p. 47.
- Max.-Palp. 4-gliedr. **Centris** Fabr.
- Max.-Palp. 6-gliedr., Paragloss. sehr kurz, breit, dünn, schuppenähnlich 1.
1. Die erst. 3 Glied. d. Max.-Palp. 2 mal so dick, oder wenigst. merklich dicker als die 3 letzt., 4. Glied ungefähr so lang wie das 3.
- Exomalopsis** Spin.

Alle Glied. d. Max.-Palp. ungefähr gleich dick u. schlank; 4. Glied läng. als das 3.; 1. nicht über die Hälfte des 4.; Clypeus beim ♂ gelb Anthophorula Ckll. (*Diadasiella* Ashm.)

Centris. Spp. bei Pará etc. biolog. Bemerk., Flug, Besuchspflanzen u. s. w.

Ducke, A. Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 2. Hft. — Subg. *Epicharis* Klug. Weicht von den echten *Centris* durch weniger rapiden u. weniger hohen Flug ab u. daher weniger schwierig zu beobachten; *rustica* Ol., *lateralis* Sm. (wozu *excisa* Mocs. als ♂ gehört), *quadrinotata* Mocs., *umbraculata* F., *maculata* Sm., *duckei* Friese u. 2 noch undeterm. Spp., p. 56—57. — Subg. *Centris* s. str.; hier dürfte noch mancherlei zu entdecken sein, da die meisten Arten dieser Subgenus sich vor allen übrig. Bienen durch ausserordentl. schnellen Flug auszeichnen, fast nur hoch über den Boden befindl. Blüten aufsuchen u. sehr scheu sind, besonders die ♂; bisher 19 Spp. bei Pará beobachtet. *conspersa* Mocs. (sehr variable Sp., unter verschiedenen Namen beschrieben, die eingezogen werden müssen. Charakteristik einzeln. Formen bei Pará) Vorkommen bei Macapá u. Mazagãs. — *lineolata* Lep. p. 57. — *personata* Sm. bei Pará, Macapá u. Marajó auftreten, Tageszeit u. s. w. p. 57—58. — *flavilabris* Mocs., *rubella* Sm., *plumipes* Sm. p. 58. — *proxima* Friese, *flavifrons* F., *aenea* Lep., *minuta* Mocs., *lanipes* F., *tarsata* Sm. u. verschied. noch undeterminierte Spp., ausserdem noch *nitens* Lep. ♂ u. *fasciata* Sm. bei Macapá.

— Futterpflanzen wohl einzig Leguminosen. **Schrottky**, p. 212.

— Die grossen *Centris* u. *Epicharis*-Arten fliegen bei Pará von 9—4, auch *Euglossis* u. *Oxaea* sind noch bis nach 3 Uhr zu finden. **Schrottky**, p. 211.

— Die ♂ grosser Arten erscheinen bei Beginn der Morgendämmerung u. fliegen vereinzelt bis spät am Nachmittag, die ♀ nur von 9—12. **Ducke** (1) p. 28. — Ausrufen in angebissener Stellung. p. 29. — Sind schnellfliegende Arten u. besuchen hohe Bäume.

— **Cockerell, D. T. A. u. Wilmatte, P.** p. 47. Uebers. der Sp.

Letzt. Glied der Max.-Palp. kurz, nicht halb so lang wie das vorletzte Glied; vorletzt. (3.) Glied weniger als halb so lang wie das 2.; Flug langsam *C. pallida* Fox.

Letzt. Glied d. Max.-Palp. länger, über halb so lang wie das vorletzte; vorletzt. Glied $\frac{2}{3}$ so lang wie das 2.; Flug sehr schnell *C. rhodopus* Ckll.; *C. Hoffmansseggiae* Ckll.

Maasse für die 3 letzt. Glied. d. Max.-Palp.:

pallida (2) 430, (3) 189, (4) 84 μ .

rhodopus (2) 300, (3) 235, (4) 138 μ .

bicolor Lep. ♀, auf *Solanum balbisii* Dun. **Schrottky**, p. 212. — *discolor* Sm. ♀, auf *Cassia splendida* Vog.

collaris Lep., ♂♀, *xanthocnemis* Pertz., ♂♀, *pauloënsis* Fr. ♂♀, auf *Crotalaria paulina* Schum. p. 212. — *nitens* Lep., *labrosa* etc. (gelegentlich) auf *Melissa azurea* Lep. p. 212. — *collaris* Lep., ♂♀, auf *bicapsularis* L. (Futterpflanze für letztere), *xanthocnemis* Pertz., ♂♀, *pauloënsis* Friese. — *collaris* Lep., *xanthocnemis* Pertz.; *pauloënsis* Friese, *discolor* Sm., *furcata* F. (♂ der letzt. an sandig. Flussufern u. s. w.

- zu beobachten; rapider Flug. p. 214. — *denudans* Lep., *bicolor* Lep., *versicolor* F., *bimaculata* Lep., *aenea* Lep., *labrosa* Friese, *nitens* Lep., *lanipes* F. p. 215. Die Zahl der im Staate S. Paulo vorkomm. *Centris* sp. schätzt Schrottky auf ca. 50. Hauptflugzeit Nov. — März. — *denudans* Lep. an einer noch nicht bestimmten kletternden Leguminose p. 212. — *C.*-Individuen an Orchideen. p. 213. — *lanipes* F. ♀, gelegentlich auf *Stachytarpha dichotoma* Vahl. p. 212.
- lateralis* Sm. hat bei Pará nur eine Generation, *C. maculata* Sm. dagegen 2. **Ducke** (1) p. 28. — *personata*. ♂ besonders an *Dioclea*, ♀ an *Solanum grandiflorum*. — *lineolata* ♂ an *Dioclea*, ♀ an *Cassia alata*. p. 29.
- Ceratina*. 10 Sp. bei Pará, 1 bei Macapá. Bei der Unterscheidung ist auf die Skulptur des ersten Abdominalsegments besonderes Augenmerk zu richten, was bisher kein Autor gethan hat. Die Skulptur der übrig. Theile u. Farbe äusserst veränderlich. Auftreten. Besuchspflanzen bei Pará. **Ducke, A.** Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 2. Hft. p. 53. — Unregelmässige Erscheinungszeit der Individuen. **Ducke, A.** (1) p. 27.
- Lange Zeit für Schmarotzer gehalten wegen des glatten Körpers. Sie bauen selbständige Nester u. tragen Larvenfutter ein. Wohnung gleicht der von *Osmia spinulosa*. Futtermasse. Ueber den Nestbau der grösseren Europäer: *callosa* Fbr., *egregia* Gerst., *dentiventris* Gerst. ist nichts näheres bek. **Rudow**, p. 417.
- bispinosa* Handl., *parvula* Smith, *mandibularis* Friese n. sp. u. *laevifrons* Morice. bei Jericho. **Schmiedeknecht**, p. 57.
- cyanea* Fab. auf den Kalkdünen bei Upper Halling. **Elgar, H.** p. 17.
- sp. Flugzeit bei S. Paulo. **Schrottky**, p. 214.
- Dallatorreana* Friese. Inca, Majorca. **Saunders** (1), p. 209.
- Neu: *neomexicana*. **Cockerell**, Entom. News Philad. vol. XII, p. 43 (Nordamerika).
- Chalicodoma sicula* Rossi, Minorca, near Mahon etc. Majorca u. Minorca. **Saunders** (1), p. 210.
- muraria* Fbr., grosse Kunstfertigkeit im Bauen. In Norddeustchl. sehr selten, im Süden häufiger, bis 1200 m Höhe, je höher, desto weniger wild. Darstellung des Nestbaues. Einmieter: einige Osmien; echte Schmarotzer: *Stelis nasuta* Costa. **Rudow** p. 421—423. — Nester von *sicula* Rossi aus Palermo u. aus Aegypten. Die letzt. aus der Vertiefungen der in den Mauern eingemeisselten Hieroglyphen losgelöst, für angefangene Schwalbennester gehalten. Baustoff: Nilschlamm. Schmarotzer. **Rudow** p. 423. — Erdballen um einen Zweig herum befestigt bei *rufescens*, *rufitarsis* u. *pyrhopeza*. Beschreib. der Nester ders. p. 423—424. Bemerk. zur Färb. b. ♂ u. ♀ p. 425.
- Chelostomoides* n. g. (Type: *Megachile rufimanus* Rob.) **Robertson**, Canad. Entom. vol. XXXIII, p. 231.
- Chelostoma maxillosum* Ltr. baut in Pfosten u. Balken aus nicht zu hartem Holz. Bau; Larvennahrung; sind träge, ♀ etwas lebhafter, leicht zu fangen. **Rudow**, p. 418. — *campanularum* Kirby von Solihull. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (32) p. 21.

- Chrysantheda* Perty 3 Spp. bei Pará, besonders in Wäldern, wo die grossen Euglossen fliegen, bei denen sie wahrscheinlich schmarotzen. *dentata* L., *frontalis* Guér. u. *smaragdina* Guér. **Ducke, A.** Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 2. Hft. p. 66. — *smaragdina* Guér. ♀ November bei S. Paulo. **Schrottky** p. 214.
dentata L. ♂ selten. **Ducke** (1), p. 27. — *frontalis* ♀ seltener als ♂.
- Chrysopheon* n. g. (Dioxys nahe) **Titus**, Canad. Entom. vol XXXIII, p. 256. — *aurifuscus* p. 256 (Colorado).
- Clisodon terminalis* Cresson Fundorte in New Mexico. Spec. der canadischen Zone. **Cockerell**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 131.
- Cilissa*. Aeusserlich u. im Nestbau den *Andrenen* ähnlich. Nestanlage. **Rudow**, p. 401. — Spp. in Norfolk. **Wainwright**.
melanura Nyl., *Ieporina* Panz., *haemorrhoidalis* Fab. auf den Kalkdünen bei Upper Halling. **Elgar, H.** p. 17.
- Coelioxys* Latr. bei Pará 10 gut unterscheidbare Sp. Schmarotzen sicher bei *Megachile*. **Ducke, A.**, Zeitschr. f. system. Hym. und Dipt. 1. Jahrg. 2. Hft. p. 67.
- Kegelbienen schmarotzen bei *Dasyпода*, grösseren *Halictus*, *Anthocopa paveris* u. einig. and. Erdnistern, auch bei *Tetralonia* u. *Eucera*.
 div. Sp. auf *Crotalaria paulina* Schum. als Futterpflanze. **Schrottky** p. 212. spp. in Norfolk. **Wainwright**.
mandibularis Nyl. at Wallasey. **Willoughby Gardner**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 279. — an addition to the British List of Aculeates. **Gardner, Willoughby**, p. 166. — Bei Wallasey in Cheshire. — Beschreib. (Unterschiede von verwandt. Sp. u. s. w.) **Saunders, Edw.**, t. c. p. 167.
- Sayi* Roberts. Las Vegas, für Lokalfauna neu. **Cockerell**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 336.
- Colletes*. Nester. Beschr. ders. Die ♀ entwickeln sich schneller als die ♂ (3 Tg. später). Weiss sich den Verhältnissen anzupassen; spielt unter Umständen auch Einmieter. **Rudow** p. 403—405.
 — Latr. 1 Sp. bei Pará. **Ducke, A.**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 1. Hft. p. 51 u. 52. — spp. in Norfolk. **Wainwright**.
- compacta*. Gewohnheiten, Gänge. **Smith**, Journ. New York Entom. Soc. vol. XI p. 30—36. — Neu: *clypeatus* **Mocsáry**, Zool. Ergebn. etc. Zichy vol. II p. 165 (Sibirien).
- americana* Cress., Las Vegas, auf Blüten von *Solidago canadensis*. **Cockerell**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 125. — *bigeloviae* Ckll., Beulah p. 125. — *gilensis* Ckll. Fundorte in New Mexico. Maasse der Glieder der Maxillarpalpen (1—6: 200, 110, 140, 130, 110, 110 μ). — Labialpalpen (1—4: 170, 150, 140, 160) p. 125.
- montanus* Mor. für Schottland selten, bei Irvine gefang. **Dalglisch** p. 7. — *coitana* bei King's Cross, Arran. p. 7.
- rufipes* Sm. Futterpflanze: *Vernonia* sp. **Schrottky** p. 211; 2 n. sp.; Flugzeit bei S. Paulo p. 213.
- succinctus* L. auf Corsica fast roth. **Ferton**, Ann. Soc. Entom. France, vol. 70 p. 88.

Conanthalictus subg. n. siehe *Halictus*.

Corynura jucunda Sm. (= *oenigma* Grib.) **Cockerell**, Proc. Acad. Philad. vol. LIII p. 220. — Neu: *atromarginata* **Cockerell**, t. c. p. 217. — *pseudobaccha* p. 219. — *semimarginata* p. 219. — *chapadicola* p. 219. — *Corynuropsis* subg. n. p. 220. — *sublata* p. 221 (sämtl. aus Brasilien).

Corynuropsis subg. n. siehe *Corynura*.

Cricosa emarginata Lep. v. New Britain, bisher bekannt vom Himalaya, von China, Indien u. S. Africa. **Cameron, P.**, Proc. Zool. Soc. London, 1901 p. 246.

Crocisa u. *Melecta* leben in den Nestern von *Anthophora* u. *Megachile*. **Rudow** p. 428.

Ctenoapis n. g. (allgem. Aussehen wie *Panurgus*, aber ist nicht mit dieser zu verwechseln. Gekämmte Sporen und Tarsen wie bei *Ctenoplectra*, aber hier ist das Labrum nicht eingeschnitten, Medianquerader deutl. hint. d. Basalquerader mündend u. nicht interstitial wie dort. Die beiden neu beschr. Sp. sind sich sehr unähnlich). **Cameron, P.**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 116—7. — *lutea* p. 117 (Ferozopore, Punjab). — *flavomaculata* p. 117—18. (Ferozopore, Punjab).

Cyphomelissa velutina n. sp. ♂ ♀ auf *Crotalaria paulina* Schum. als Futterpflanze. **Schrottky** p. 212. — Januar, Februar. **Schrottky** p. 214.

Dasypoda. Lage der Nester u. s. w., für Sammlungen schwer zu gewinnen. **Rudow** p. 397—398. — Selbst Eingiessen bindender Lösungen führte zu keinem Erfolg.

Schmarotzer: *Coelioxys* u. *Epeolus variegatus* siehe dort.

Diadasia rinconis subsp. opuntiae n. **Cockerell**, Canad. Entom. vol. XXXIII p. 286.

Dianthidium Ckll. wurde als Subg. beschrieb., ist aber besser als Gatt. zu betrachten. **Cockerell, T. D. A. & W. P.**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 50. Type: *D. curvatum* (*Anthidium curvatum* Smith) u. *D. parvum* (*Anthidium parvum* Cress.). Hierher die kleine Gruppe von *D. gilense* (Ckll.), *D. Ehrhorni* (Ckll.), *D. notatum* (Latr.), *D. perplexum* (Smith) u. *D. strigatum* (Panz.), alle als *Anthidium* beschrieben, bezügl. der Labialpalp. fallen sie mehr oder weniger zwischen *Anthidium* u. *Dianthidium*. *D. gilense* im besond. fällt zu *Anthidium*, wenn man den Mund allein betrachtet. Maasse der 1. und 2. Glieder der Labialpalpen in μ :

<i>D. strigatum</i> (1) 650, (2) 870.	<i>D. perpictum</i> (1) 650, (2) 1200.
gilense (1) 720, (2) 760.	manicatum (1) 1300, (2) 1320.
parvum (1) 720, (2) 1220.	Porterae (1) 1200, (2) 1000.

Die Nistgewohnheiten von *Dianth.* u. *Anthid.* scheinen nicht dieselben zu sein, vergl. hierzu *D. consimile* (Ent. News, 1896, p. 25) m. *Anthidium manicatum* u. *A. paroselae*.

Dioxys cineta Jur. San Cristobal, Minorca. **Saunders** (1) p. 209.

Dufourea halictula Nyl. die einzige Mellifere, die Corsica mit den Sud-Ouest gemeinsam hat, sie ist aber auch keine ausschliessl. Gebirgsform. **Ferton**, Bull. Soc. Entom. France 1901 p. 63.

Emphoropsis n. g. Ashmead. Type der Gatt. nach briefl. Mittheilung an **Cockerell, T. D. A. u. W. P.** p. 48: *Habropoda floridana* Smith. — Es

gehören zu dieser Gatt.: *Emphoropsis floridanus* (*Habropoda floridana* Sm.), *E. miserabilis* (*H. miserabilis* Cress.), *E. Morrisoni* (*H. Morrisoni* Cress.) u. *E. salviarum* (*H. salviarum* Ckll.). — Die Gatt. unterscheidet sich von *Habropoda* durch das relativ lange erst. Glied der Max.-Palp., 2. nicht so lang als 4–6 zusammen u. s. w.

Epeolus bei Para (1 unsich. u. 1 sich.) mit *Eucera*-Arten zusammenfliegend.

Ducke, A., Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 2. Hft. p. 67.

lectoides **Robertson**, Canad. Entom. vol. 33 p. 231 (Illinois).

productus Thoms. Irvine Moor, für Schottland neu. **DalGLISH** p. 7.

sp. in Norfolk. **Wainwright**.

variegatus Latr. m. schwarz. Kreuzzeichn. auf weiss. Hleib schmarotzt bei *Dasyпода*. **Rudow** p. 428.

Epicharis. Futterpflanzen wohl einzig Leguminosen. **Schrottky** p. 212. — *cockerelli* Friese gelegentlich auf *Baccharis dracunculifolia* D.-C. **Schrottky** p. 211. — *rustica* Ol. ♀ u. *schrottkyi* (gelegentlich) auf *Solanum grandiflorum* R. Pav. **Schrottky** p. 212. — *rustica* Oliv., ♂♀ auf *Crotalaria paulina* Schum. **Schrottky** p. 212. — Flugzeit u. Besuchspflanzen. Desgl. v. *schrottkyi* Friese, *cockerelli* Friese u. div. Sp. p. 214. — *schrottkyi* Friese ♂♀ (Futterpflanze) auf *Lühea paniculata* Mart. p. 212.

— siehe *Centris*.

Eriades fasciatus n. sp. bei Jericho. **Schmiedeknecht** p. 57.

Eucera, *Tetralonia*, *Macrocera*. Nester schwer zu gewinnen für die Sammlung. Nestanlage u. s. w. **Rudow** p. 396–397.

— Scop. für Steppengegend charakt., bei Pará schwach vertreten, in der Savannengegend von Macapá an Individuen die erste Stelle einnehmend. Subg. *Eucera* s. str. (1 Sp.), Subg. *Macrocera* Latr. bei Pará 3 versch. Sp., Subg. *Ancyloscelis* Latr. Die Arten der letz. weichen in den Lebensgewohnheiten von den übrig. *Euceren* merklich ab und wären wohl besser als eigene Gatt. aufzufassen. Bemerk. zu *armata* Sm. bei Pará ♂ sehr häufig, ♀ selten u. *duckei* Friese bei Macapá p. 54. **Ducke, A.**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. Hft. 2 p. 54.

— Ein bei S. Paulo an Arten reich vertretenes Genus, scheint wenig consequent im Besuch bestimmter Blüten zu sein. Fundzeit. **Schrottky** p. 214. — div. Sp. auf *Plumbago* sp. im botan. Garten von S. Paulo, p. 212. — sp. auf *Solanum occarpum* Sendt. p. 212.

— Schmarotzer: *Coelioxys*, siehe dort.

interrupta Baer (in d. Publ. Titel p. 346 sub 1 des Ber. f. 1898 falsch. Fundort u. Datum stammt v. Troppau; bei Odrau nur *difficilis* vorkommt. **Ducke**, Entom. Nachr. 26. Jhg. p. 10.

longicornis L. Synon. (Verwirr. in ders.). Bemerk. u. Fundort. **Morice** (9) p. 97.

numida Lep. near Mahon. **Saunders** (1) p. 210. — *nigrilabris* Lep., Palma, Castle Bellver. — *grisea* Fabr., Minorca bei Talayot of Trepuco, Inca, Majorca, Porto Pi etc. p. 210.

Eucerini. **Cockerell, T. D. A. u. W. P.** p. 49 theilen dieselb. folgendermassen ein:

Max.-Palp. 4-gliedr.	1.
Max.-Palp. 5-gliedr.	2.
1. Scopa des ♀ mit federart. Haaren	Melissotes Latr.
Scopa des ♀ mit einfach. Haaren	Anthedon Rob.
2. Zwei Submarginalzellen	Eucera Scop.
Drei Submarginalzellen	Xenoglossa Smith, Xenoglossodes Ashm., Florilegus Rob. etc.

- Englossa Latr. Hochinteressante u schöne Gatt. Spp. bei Pará etc. **Ducke, A.** Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 2. Hft. p. 60—63. — Subg. Englossa s. str. ♂ ebenso häufig oder häufiger als ♀, fliegen auch in den heissen Mittagsstunden: cordata L. (variabilis Friese). Sehr häufig bei Pará, Macapá u. auf Marajó. Nester ders. von Ducke nie frei beobachtet, wie Friese angiebt. Zucht durch Schimmel zerstört. — piliventris Guér. ♀ gerne an Stämmen den ausfliess. Saft aufsaugend, auch das stark duftende Harz von Protium heptaphyllum March. (Burseraceae) aufnehmend, das anscheinend beim Bau ihres noch unbekanntes Nestes verwendet wird. ♂ an Catasetum (Orchidee). Beschr. des Vorgangs der Befruchtung nach Engler u. Prantl. Gewohnheit weiche Pflanzentheile zu verzehren. p. 60—61. — brullei Lep. bei Pará, auf Marajó u. bei Mazagão. p. 61. — subg. Eumorpha Friese. Scheint besonders dem Gebiete des oberen Amazonas anzugehören. Bei Pará nur 1 Sp. p. 61. — subg. Eulema Lep. Bei allen Arten die ♂ seltener als die ♀. smaragdina Perty bei Pará, Macapá u. auf Marajó. p. 61—62. — fallax Sm., elegans Lep., ornata Mocs. (♀ = limbata Mocs.), dimidiata F., fasciata Lep., mocsaryi Friese. p. 62. — nigrita Lep., polyzona Mocs. p. 63. Fundorte bei Pará, Macapá u. auf Marajó.
- Vormittags fliegend, die ♂ mancher grosser Arten ziehen sich schon vor 10 Uhr Vorm. zurück. **Ducke (1)**, p. 28. — ♂ vorzugsweise an Orchideen, ♀ nie daran. p. 29.
- nigrita Lep. ♂♀. Futterpflanze: Conepia grandiflora Benth. **Schrottky**, p. 212; — ♂ gelegentlich an Ananas sativus var. bracteatus. p. 213; — Die eigentliche, wenn auch nicht einzige Futterpflanze ders. ist: Conepia grandiflora. p. 210; — ♀ gelegentlich auf einer Caprifoliacee gen.? spec.? p. 211; — ♀ auf Solanum occarpum Sendt. p. 212. — violacea Blanch., nigrita Lep. u. violascens Mocs. Fundzeit bei S. Paulo. p. 215.
- hat lange Lebensdauer. **Ducke, A. (1)** p. 27.
- Exomalopsis Spin. Bei Pará 3 Spp.: globosa F. u. planiceps Sm. zusammen an Stachytarpha etc. ♀ in der trocken. Zeit gemein, in der nass. nur sehr einzeln, ♂ sehr selten, vielleicht beide Varr. nur einer Sp. Am Rio Anajás auf Marajó nur globosa. **Ducke, A.** Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 2. Hft. p. 54. — aureopilosa Spin.?
- **Cockerell, T. D. A. u. Wilmatte, Porter.** p. 48.
3. Glied des Labialpalpus sichtlich dicker als das 4. E. Solani Ckll.
3. u. 4. Glied des Labialpalpus lang u. schlank, gleichmässig dick E. penelope Ckll.
- aurosericae Friese. Flugzeit bei S. Paulo. **Schrottky**, p. 214.
- globosa F. u. planiceps Sm. ♀ ganz gemein, ♂ sehr selten. **Ducke, A. (1)**, p. 27.

sp. auf *Crotalaria vitellina* Ker., var. minor von *Eucera* div. sp. **Schrottky**, p. 212.

Halictoides u. *Systropha* fliegen mit *Panurgus* zusammen u. übernachten gemeinschaftlich mit ihr, doch konnte ihre Bauhätigkeit noch nicht gewiss festgestellt werden. **Rudow**, p. 399.

Halictus (auch *Augochlora* Sm. hierher zu ziehen, die nicht einmal als Subgenus existenzberechtigt ist) 25—30 Spp. bei Pará, kosinopol. Gatt. **Ducke, A.** *Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt.* 1. Jhg. 2. Hft. p. 52.

— Ballenbiene (bis faustgrosse Ballen von Zellen anfertigend). Die Nester werden in bis kopfgrossen Höhlen angelegt. Anordn. der Zellen. Baustoff etc. Als Einmieter in einem Neste von *Colletes*. Feinde u. Schmarotzer. **Rudow**, p. 401—403.

— Diptera u. Nomadae in den Gängen ders. **Charbonnier**, p. 48.

— 3 n. sp. Flugzeit bei S. Paulo. **Schrottky**, p. 213. — Sp. in Norfolk. **Wainwright**.

— gröss. Spp. Schmarotzer: *Coelioxys*, siehe dort.

amicus Ckll. var. α (Gesicht schmäler als bei der Type, möglicherweise eine bestimmte Species). **Cockerell, T. D. A.** *Ann. Nat. Hist.* (7) vol. 7 p. 126. — *anomalus* Kob. hat nur 2 Submarginalzellen, Grösse u. Form wie *perdifficilis*. Untersch. von *anomalus* von Las Vegas (\varnothing) u. *perdifficilis*; Type v. Santa Fé. Untersch. d. *anomalus* von *semicaeruleus*. p. 126—127. — *armaticeps* Cresson, Las Vegas. Bemerk. hierzu p. 127. — *bardus*, Beulah, auf *Salix*; *coriaceus* Smith., Beulah, auf *Salix*; *mesillensis* (Ckll.) var. α \varnothing , Kopf u. Thorax olivengrün, Las Vegas, Untersch. von *nymphalis* durch deutl. punkt. 1. Abd. Sgm., kleiner, dunkl., weniger hell gefärbte Tegulae. Die originale *mesillensis* als Var. von *nymphalis* beschr., hat punkt. 1. Abd.-Sgm. p. 127. — *pruinosis* Rob. Las Vegas, auf Blumen von *Verbesina encelioides* etc. p. 127. — *ruidosensis* Ckll., Beulah p. 127. — *sisymbrii* Ckll., Las Vegas auf versch. Blüten p. 127—128.

Kriegeri Alf. = *H. monstificus* Mor. Er ist das bisher unbekannte \varnothing der letzt. Art. **Alfken, J. D.** *Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt.* 1. Jhg. 6. Hft. p. 365.

laevigatus zu Sutton. *Entom. Monthly Mag.* (2.) vol. 11 (36) p. 67.

laevigatus Kirb. auf den Kalkdünen bei Upper Halling. **Elgar, H.** p. 17. — *quadricinctus* u. *xanthopus*, *maculatus* Smith auf den Kalkdünen bei Upper Halling. p. 17. — *quadricinctus* Fab. Gynandromorphes Stück. **Edward Saunders**. — *tumulorum* Linn. bei King's Cross., für Schottland neu. **DalGLISH**, p. 7; — bei Dunbar u. Longuidry. **Evans**, p. 48. — *leucopus*, \varnothing , Invershin, Scotl. **Saunders, Edw.** (sub No. 8 des vorig. Berichts) p. 266; at St. David's in Fife, Blair Atholl, Schottl. **Evans** (sub No. 2 des vorig. Berichts) p. 266.

scabiosae Rossi. Castle Bellver, Miramar etc. Majorca. **Saunders** (1) p. 208. — *malachurus* K. Pollensa, Puig de Maria. — *villosulus* K. Castle Bellver, Pollensa, Monte Sentnioc. — sp.? Castle Bellver, Pollensa. — *cephalicus* Mor., Pollensa, Puig de Maria. p. 208. — Neu: *soror* (*morioni* affinis). **Saunders** (1) p. 209 σ \varnothing (Algier). — *truncatus* **Robertson**, *Canad. Entom.* vol. XXXIII p. 230 (Nordamerika). —

- peraltus*. **Cockerell**, Psyche, vol. IX p. 164 (New Mexico). — *virgata*. **Cockerell**, t. c. p. 284. — *hemimelas* p. 285. — *dasyphorae* p. 285. — *veganus* p. 286 (alle 4 aus New Mexico).
- (*Conanthalictus*) subg. n. **Cockerell**, Entom. News Philad. vol. XII p. 208. — *conanthi* p. 208 (New Mexico).
- (*Agapostemon*) *Sicheli* (antennae longae, articulis 4—13 cocleatim contortis). **Vachal**, Ann. Soc. Entom. France, 1901 p. 77—78 ♂♀ (Mexique). — *H.* (*Rhopalictus*) *Buyssoni* (caput longissimum angustissimumque) p. 78 ♀ (Pérou: Callanga).
- Heriades* u. *Trypetes*. Nestbau wie bei *Chelostoma*. Nestbau. Nur Ameisen stellen dem Inhalt nach. **Rudow**, p. 419.
- Hypomacrotera callops* Ckll. & Port. subsp. *persimilis* n. (kleiner als Typ. ♀ m. Fleck an Flgl.-Spitze, ♂ m. creamgelb. Useite d. Flag. etc.) **Cockerell**, T. O. A. The Entomologist, vol. 33 p. 64 (Phoenix, Arizona; auf Blüten v. *Tribulus grandiflorus* u. *Physalis*).
- Koptorthosoma* u. Milben. **Shelford**, Rep. Brit. Assoc. 1901 p. 690. — Siehe *Xylocopa*.
- caeruleum* Fab. von Kuala Aring, aestuans Linn. häufig in der orientalischen Region, latipes Drury häufig auf der malayischen Halbinsel. **Cameron**, P., Proc. Zool. Soc. London 1901 vol. 2 p. 34.
- Lithurgus*. Nest aus steinhart. Massen bestehend. **Rudow** p. 425.
- Macrocera*. Div. Sp. auf *Melissa azurea* Lep. (Futterpflanze?). **Schrottky** p. 212.
- Nest, siehe *Eucera*.
- Macroglossapis* Ckll. = *Macroglossa* Rads. (not Ochs.) von Ashmead ausgelassen; von den anderen *Anthophorinen* versch. durch 3gliedr. Maxillarpalp., Zunge so lang wie der Körper, Antennen fadenförm., so lang wie der Thorax. **Cockerell**, T. D. A. & W. P. p. 49.
- Macropis fulvipes* Fabr. wohl ähnliche Lebensweise wie *Dasygaster*. **Rudow** p. 398.
- Megachile* Latr. ist nach *Haliectus* dasjenige der Genera von Pará, welches die ärgsten Schwierigkeiten bei der Artunterscheidung u. besonders beim Herausfinden der Zusammengehörigkeit der Geschlechter bietet; etwa 15 Sp. bei Pará. **Ducke**, A., Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 2. Hft. p. 63.
- spp. in Norfolk. **Wainwright**.
- div. Sp. ♂♀ auf *Crotalaria paulina* Schum. als Futterpflanze. **Schrottky** p. 212. — Flugzeit, Blütenbesuch etc. p. 213.
- Schmarotzer ders. *Crocisa*, siehe dort.
- (Sp.?) Biologisches siehe **Max Müller**, Insektenbörse 16. Jhg. p. 136.
- sericans* Fonsc. Beschr. des Nestbaues. **Ferton**, Ann. Soc. Entom. France vol. 70 p. 90—92. — Steht in Bezug auf Nestbau u. Gewohnheiten *M. cricetorum* Lep. nahe. — *sericans* Fonsc. **Ferton**, Nest Taf. I Fig. 1. — isolirte Zelle, Fig. 2 mit Hülle, Fig. 3 ohne Hülle, Fig. 4 Inneres.
- steloides* Bingham von Sikkim = *Anthidium steloides*! wohl nur versehentlich zu *Megachile* gestellt, da die gelb. Binden schon auf *A.* weisen. Beschr. d. ♂. **Friese**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jahrg. 4. Hft. p. 224 ♂ (Khasia Hills, India).

Neu: *erythropoda* (nigra, pedibus rufis; capite dorsoque thoracis dense rufopilosis; scapo antennarum rufo; alis fulvo-hyalinis, apice fere fumatis; stigmatibus nervisque fulvis. — Steht dimidiata Sm. nahe) **Cameron, P.**, Proc. Zool. Soc. London 1901 vol. 2 p. 34—35 ♀ (Singapore). — *Frederici* (ähnelt bicanaliculata von Borneo, ebenfalls noch unbeschrieben. Beide sind gross, haben schwarze Pubescenz, ausser der blossen Abdom.-Spitze u. der hellrothen Scopa) p. 35 ♀ (Kuala-Aring, Malay Peninsula). — Beide unterscheiden sich:

Kopf u. Thorax dicht u. stark punktirt; Apikalsegm. des Abd. mit blass. Pubescenz bedeckt, Mesonotum seitlich nicht gefurcht. Länge 21 mm *frederici*.

Kopf u. Thorax spärlich punktirt; die beiden Apikalsegmente mit blasser Pubescenz bedeckt; Mesonotum jederseits mit weiter, tiefer Furche, Länge 23—25 mm *bicanaliculata* p. 35—36 (Borneo, Matang, 3000').

megistia (nigra, dense nigro hirsuta; fronte, facieque clypeoque longe alba-pilosis; alis nigro-violaceis. — alecto Smith von New Guinea am nächsten. — Unterschiede). **Cameron, P.**, Proc. Zool. Soc. London 1901 p. 244—5 ♂ (New Britain). — *othona* (nigra, abdomine late rufovestito; pedib. anticis rufis; alis fusco-violaceis) p. 245 ♂ (New Britain). — Verwandt mit dieser ist: *malayana* (nigr., capit. thoraceque dense nigro pilosis; abdominis dorso rufo-vestito; alis fusco-violaceis (verw. mit bicolor Fabr.) p. 245—246 ♂ (New Britain).

aurivillii (der adeloptera Schlett. in Form u. Habitus sehr ähnlich, aber die Scopa ist roth u. auch die Oberseite des Abdomen, besonders auf Sgm. 4—6, ist rot befilzt, Flgl. bis auf den breiten dunkl. Rand gelblich). **Ducke, A.**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 2. Hft. p. 69 ♀ (Kamerun, Westafrika). — *caerulea* (einzig dastehend durch rote Farbe und rote Behaarung des 1. Sgms., wie durch blaugrüne 2.—5. Sgm. unter 500 Sp.) p. 70—71 ♀ (N'Ganai, S.-Afr.). — *arabica* (coerulea in Form u. Farbe nahe, doch Abd. schwarz, nicht blau u. Scopa weiss) p. 71 ♀ (Arabien). — *wahlbergi* (ebenfalls in Form der coerulea nahe, ab. mit ganz schwarz. Abd., Sgm. 1 weiss, 2.—5. dunkel schwarzbraun bandirt, Scopa ganz rostrot) p. 71—2 ♀ (N'Gami, S.-Afr.). — *sjoestedti* (in Färb. an disjuncta, hat aber scheerenartige Mandibel [also nicht zum Subg. Eumegachile gehörig] und gelblichweisse Behaarung; Abd. dreieckig m. rostrot. Scopa) p. 72 ♀ (West-Afr.).

lucidula **Mocsáry**, Zool. Ergebn. etc. Zichy vol. II p. 167 (Sibirien).

Megacilissa eximia Sm. fliegt vor Sonnenaufgang, zu hunderten an der au Japan bei Pará eingeführten *Eriobotrya japonica* Lindl., tagsüber ist sie unsichtbar; nach Sonnenuntergang noch $\frac{1}{2}$ Std. fliegend. **Schrottky**, p. 210. — *eximia* Sm. ♀ gelegentlich an *Tradescantia dimetica* Mart. p. 213; — auf *Solanum balbisii* Dun. u. *Sol. juciri* Mart. p. 212. — auf *Eriobotrya japonica* Lindl. (Futterpflanze). — *eximia* Sm. u. *obscura* n. sp. p. 215.

Megalopta Sm. einzelnes ♀, bei Pará an *Banara guyanensis* Anbl. (Flacourtiaceae) gefangen. **Ducke, A.** Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 2. Hft. p. 52.

Melecta luctuosa Scop. u. *armata* Pz. Man nimmt allgemein an, dass beide Sp. bei *Anthophora retusa* L. resp. *pilipes* F. parasitiren. Nach **Morice** (9), p. 96–97, kommt wohl *luctuosa* nicht bei *pilipes* vor, aber *armata* allem Anschein nach bei beiden.

luctuosa Scop., Castle Bellver, Miramar bis Valldemosa; Pollensa bis Castle del Rey, Inca, Majorca. — *plurinotata* Brullé, Castle Bellver. **Saunders** (1) p. 210. — siehe *Crocisa*.

miranda Fox, Las Vegas auf Blüten von *Zinnia grandiflora*. Var. α kleiner, ungefähr 9 mm lang (Las Vegas). **Cockereil, T. D. A.** Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 129.

Melipona Ill. Darüber liesse sich ein ganzes Buch schreiben. Hier nur Zusammenstellung der bisher gemachten (bei diesem Genus wohl noch sehr unvollständigen) Beobachtungen über den Blütenbesuch der einzelnen Sp. Die einzeln. Sp. haben eine Vorliebe für ganz bestimmte Blumen, die sich aber bei der gross. Individuenzahl der Thiere einerseits u. dem Blütenmangel in der Gegend von Pará andererseits nicht so scharf ausprägen konnte, wie bei vielen solitären Apiden. — Fundorte, Besuchspflanzen u.s.w. Subg. *Melipona* s. str. — Folg. Spp.: *interrupta* Latr., *bicolor* Lep., *fuscata* Lep., *marginata* Lep., *titania* Gribodo. p. 64. — Subg. *Trigona* Jur.: *capitata* Sm., *fulviventris* Guér., *hyalinata* Lep., *ruficus* Latr., *fuscipennis* Friese, *subterranea* Friese, *bipunctata* Lep., *latitarsis* Friese, *crassipes* F., *heideri* Friese, *clavipes* F. (= *elongata* Lep.), *angustata* Lep., *portoi* Friese, *jatyi* Sm., *testaceicornis* Lep., *punctata* Sm., *bilineata* Say, *goeldiana* Friese, *kohli* Friese, *rhumleri* Friese, *varia* Lep., *duckei* Friese, *huberi* Friese sowie 5 weitere undeterm. Sp. — Ausserdem auf Marajó noch *fraissei* Friese u. bei Macapá *handlirschi* Friese.

— *fulvipes* Guérin aus der Umgebung des Zacoalco-Sees, im Staate Jalisco (Mexico). Nest derselben (in Holz) mit lebend. Individ. gehalten (in der warmen Jahreszeit) im entomol. Laboratorium u. später in den Treibhäusern des Museum zu Paris. Ergänzende Beschr. u. Abb. zu ♂, ♀ etc. Das vielleicht der Wirklichkeit nicht ganz entsprechende Verhältnis der Geschlechtsformen war 20 ♂, 4 jung. u. 1 eierlegendes ♀, ca. 400 ♀. Abb. von Details der Mundtheile, des ♂. Copulationsapparates (Taf. 5) Fig. 1–8. Schnitt durchs Nest Taf. (4). **de Buysson**, Ann. Soc. Entom. France, 1901, p. 153–155. — *M. (Trigona) lineata* Lepel. von Yucatan ebenfalls mehrere Monate am Leben erhalten, in einem Stumpfe von Campêche-Holz (1 ♀, ? ♂ u. ca. 1200 ♀), Honig stark duftend, sehr flüssig. Abb. von Mandibeln Taf. 5, Fig. 9 ♀, 10 ♂, p. 155. **du Buysson**, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 1901, p. 106. — Nach Felipe Pocoy in *Memorias sobre la Historia natural de la Isla de Cuba*, t. I 1851 p. 174 beträgt die mittlere Zahl der Formen eines Nestes 12 ♂, 1 ♀, ca. 1000 ♀. — (*Trigona*)sp. von New Britain. **Cameron**, Proc. Zool. Soc. London. 1901 p. 243. — *quinque-fasciata* Lep. (Heimath: Brasil.) aus Argentinien, Rosario eingeschleppt nach Hamburg mit Quebrachoholz. **Kraepelin**, p. 193. Gröss. Teile des Baues mit Honig u. Pollentöpfen, Brutwab. u. zahlr. lebend. Bienen. — sp. dito, ohne Thiere. — *fulvipes* Guér. Nest Abb. (Querschn. durch Holz) **de Buysson**, Ann. Soc. Entom. France, vol. 70 pl. IV.

- ruficus. Pollensammelnd auf einer Scleria Sp. (Cyperacee), die sonst von Insekten überhaupt nicht besucht wird. **Ducke** (1) p. 29.
- Neu: *personatella* Cockerell, Canad. Entom. vol. XXXIII p. 297 (Californien).
— *cnici* **Robertson**, t. c. p. 230. — *trinodis* p. 231 (beide aus Nordamerika).
- Melissa** Sm. bei Pará 3 spp., stets mit *Centris* zusammenflieg., auch wohl dort schmarotzend: *regalis* Sm., *azurea* Lep., *duckei* Friese. **Ducke, A.**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 2. Hft. p. 66—67. — *maculata* Friese, ♂, Octob., Flugzeit bei S. Paulo. **Schrottky** p. 114. — *azurea* Lep., ♂ u. ♀ an *Leonurus sibiricus* L. Flugzeit bei S. Paulo.
- Melissodes agilis** Cress. Las Vegas, Sapello Cañon, San Ignacio. **Cockerell, T. D. A.** Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 129. — var. α hat keinen gelb. Fleck auf den Mandibeln. Las Vegas p. 129. — *agilis* var. *aurigenia* (Cresson). Romerovilla etc. Fundpflanzen p. 129—130. — *gilensis* Ckll., Las Vegas. — *grindeliae* Ckll., Las Vegas etc. — *pallidicincta* Ckll. Zahlreiche Fundorte in New-Mexico. — *tristis* Ckll. ist wahrsehnlich das ♂ zu *pallidicincta*, dann wäre die Seltenheit ders. bemerkenswerth. — *ruidosensis* Ckll., Beulab, Las Vegas p. 130.
- *obliqua* Say. Fundorte in New Mexico. **Cockerell**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 337.
- Meliturgopsis** Ashm. Ashmead citirt keine Type. Dieselbe ist, wie sich **Cockerell, T. D. A.** u. **W. P.** nach Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 49 überzeugen konnte, eine unbeschriebene Form von San Francisco Co., Calif., oberflächl. der *Anthophora Porterae* Ckll. ähnl., doch nicht congenerisch. In Cresson's Tabelle gelangte man bei der Bestimmung auf *Habropoda*, aber Cresson's *Habropoda* ist = *Emphoropsis*. Die 2. Submarginalzelle am Cubitus kürzer als 1. oder 3., wohingegen bei *E. salviarum* u. *floridanus* sie ungefähr gleich der 3. ist. Das ♂-*Meliturgopsis* hat ganz schwarzen Schaft. Clyp. abgese. von Vorderrand u. Seiten weiss. Seitl. Gesichtszeichn. V-förm., Thoraxhaare weisslich grau mit schwarz, Abd. ohne Bänder, 1. Sgm. dicht grauweiss behaart. — *M.* scheint = *Emphoropsis* zu sein. Der letzt. Name hat dann die Priorität.
- Meliturga**, mehr südlich vorkommende Arten, einzig bis Mitteldeutschland. *M. praestans* Gir. Lebensweise wie *Dasypoda*. **Rudow** p. 398.
- Mesocheira** Lep. Fliegen in Gesellsch. der klein. *Centris*-Arten, bei denen sie wohl schmarotzen; bei Pará: *sericea* Guér., *bicolor* F. u. sp.? **Ducke, A.**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 2. Hft. p. 67. — *bicolor* Lep. ♀ u. sp. Flugzeit bei S. Paulo. **Schrottky** p. 214.
- Monumetha argentifrons** Cresson, gewöhnl. als *M. borealis* bezeichnet, doch arg. hat die Priorität. **Cockerell**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 336 (West Fork, Gila River; Olympia Washington State).
- Nectarinia** kleine Spp. mit grossen Bauten. Beschr. ders. **Rudow**, p. 342—343.
— *mellifica* Say p. 343.
- Nomadae** in *Halictus* Gängen. **Charbonnier**.
- Nomada** Spp. in Norfolk. **Wainwright**.
- Schmarotzer. Wirthsbienen: sandnistende *Andrena*- u. *Halictus*-Arten. Lebensweise. **Rudow**, p. 427—428.

- alternata Kirb. u. solidaginis Panz. Auf den Kalkdünen bei Upper Halling. **Elgar**, p. 17.
- armata siehe *Andrena hattorfiana*. **A. H. Hamm**.
- fucata Pz. var. iberica, ♀, von den Balearen. **Saunders** (1), p. 209. — *Poultoni* p. 209—210 ♂♀ (Castle Bellver) (etwas m. poecilnota Pérez verw.).
- lineola var. sibirica n. **Mocsáry**, Zool. Ergebn. etc. Zichy, vol. II, p. 167.
- Moricei* Friese n. sp., bei Jericho. **Schmiedeknecht**, p. 57.
- ochrostoma Kirb. bei Barr, Ayrshire. — Fabriciana Linn. bei King's Cross. für Schottland neu. **DalGLISH**, p. 7. — obtusifrons Nyl. bei King's Cross, Arran.
- obtusifrons bei West Runton, Norfolk. **Wainwright**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 102.
- obtusifrons Nyl., Levenside Moor u. Jamestown. — borealis Zett. bei Bonhill. **Malloch**, p. 6.
- ochrostoma u. *Nomada flavoguttata* Kirb. auf den Kalkdünen bei Upper Halling. **Elgar**, p. 17.
- Roberjeotiana Panz. eine in zwei Formen auftretende Art. Wie bei mehr. and. N.-Arten: *N. ochrostoma* K., *flavoguttata* K., *alboguttata* H.-Sch. u. *ferruginata* L. lässt sich b. N. Roberj. das Auftreten zweier Form. od. Varr. einer gröss. u. ein. klein. beobachten. Beschr. d. ♀. (♀: 3. Sgm. m. Ausnahme d. weiss. Seitenfleck. ganz schwarz, klein. ♀ 2. u. 3. Sgm. ganz roth). (♂ gross: Analsgm. schwach eingeschnitt., b. den klein. abgestutzt. etc.) für die kleine Form schlägt Alfken den Namen *Nomada roberjeotiana tormentillae* vor. Auch biolog. unterscheidbar. Die kleine m. ihr. Wirthe *Anthrena tarsata* Nyl. Ende Juni auf *Potentilla erecta*; die grosse Anf. u. Mitte Juli auf *Jasione montana* L., Wirth vermuthl. *Anthrena nigriceps* K. **Alfken**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 4. Hft. p. 221—222.
- zonata Panz. u. *N. rhenana* Mor. **Alfken, J. D.** Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 6. Hft. p. 363—365. — Die *rhenana* Mor. ist als die schwach gezeichnete, rothe — nördliche Form der *N. zonata* Panz. aufzufassen. Beschr. d. ♂. — Das ♀ der *N. rhenana* Mor. stimmt in allen plastischen Merkmalen mit dem der *N. zonata* Panz. überein, bei beiden vor allem dieselbe Dornbildung an der Spitze des Ausserrandes der Hinterschienen. Schenck beschreibt die *rhenana* Mor. als *N. rufipes*. Dieser Name ist nach Alfken für *N. solidaginis* Panz. einzuführen. — Im Katalog von Dalla Torre ist bei *N. rhenana* Nor. das Citat *N. rufipes* Schenck zu streichen. *N. zonata* Panz. Form *rhenana* Mor. erscheint bei Hannover in 2 Generationen. Frühjahrs-generation an den Nistplätzen von *Anthrena lathyri* Alfken., Herbst-generation mit d. 2. Generation von *Anthrena afzeliella* K., welche mit der *A. albofasciata* Thoms. identisch ist.
- Nomada corsica* (sp. inedita) Nestbau. **Ferton**, Ann. Soc. Entom. France. vol. 70 p. 93—94. — *quadrifasciata* Mocsáry, Zool. Ergebn. etc. Zichy vol. II p. 168. — *zichyana* p. 169 (beide aus Russland).
- Neu demnach: *poultoni*, *roberjeotiana* var. *tormentillae*, *lineola* var. *sibirica*, *Moricei*, *corsica*, *quadrifasciata* u. *zichyana*.

Nomia fulviventris (fulva, mesonoto, scutello abdominisque dorso late nigris; pedibus fulvis; tibiis posticis late nigris; alis hyalinis, costa stigmatique nigris, nervis fuscis). **Cameron**, Proc. Zool. Soc. London, 1901 p. 246 ♂. — (*Paranomia pulchribalteata* (nigra, capite thorace pedibusque dense griseo-hirsutis, abdominis segmentis virido-marginatis; alis fere hyalinis, stigmatibus nervisque nigris; post-scutello spinis duabus armatis) p. 247 ♀ ♂ (New Britain). — *metallica* (leicht zu unterscheiden von *pulchribalteata* durch geringere Grösse, Kopf u. Thorax mit kupfrigmetall. Schimmer, Kopf an der Stirn nicht gekielt, Abd. nicht mit grünl. gelb. Bändern) p. 247—248 ♂ (New Britain). — *Nomia* schmarotzt bei *Osmia*, die freistehende Erdzellen bauen. **Rudow** p. 428.

Osis wahrscheinlicher Schmarotzer von *Tetrapedia*, siehe dort. — 3 sp. bei Pará, Macapá u. auf Marajó. Stets in Gesellschaft der gelben *Tetrapedien*. **Ducke, A.**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 2. Hft. p. 67.

Osmia. Bemerk. zur Gruppierung in **Ducke's** Monographie. **Ferton**, Ann. Soc. Entom. France, 1901 vol. 70 p. 87—88 in Anm.

— Der Nestbau einiger *Osm.* geschieht noch auf andere Weise, indem sie sich als wirkliche Baumeister zeigen, welche ihre Larvenwohnungen von Grund aus anfertigen, darin aber mit Bienen abweichender Gatt. übereinstimmen. Ankleben von Zellen an Steinen und Holz, die Entstehungszeiten an Wülsten u. Höckern erkennbar. **Rudow** p. 419. — *bicornis*, *adunca* Pz., *bicolor* (Larvenfutter), *caementaria* Gerst. (Bau an einem Hornissenest), Futterbau, Schmarotz. d. letzt., *xanthomelaena* Kb. Nester, Bemerk. zu denselben p. 419—421. — Schutzhäuser in *Helix* erbaut v. *O. aurulenta* Pz. u. *rufobirta* Ltr. Ankleben von Pflanzenhäufchen. Beschreib. solcher p. 425—427.

— Schmarotzer ders. *Nomia* u. *Stelis*, siehe dort.

— Im Nestbau den *Megachilen* ähnl. Auftreten; in der Wahl der Nistplätze sind sie nicht verlegen. Alles passt ihnen, wenn es nur einen kleinen Schlupfwinkel gewährt. Bau der Höhlung u. Anlage des Nestes. Beschreib. der Puppenhüllen. Streitigkeiten mit *Odynerus*arten etc. Sind wenig scheu; lassen sich bei der Arbeit beobachten. In gleicher Weise wie *bicornis* nisten noch *tricornis* Latr., *fulviventris* Pz., *Panzeri* Mor., *aenea* L., *melanogaster* Spin., *tridentata* Duf. u. manchmal *O. bicolor* Schr., obgleich letzt. vielfach andere, auffall. Gewohnheiten zeigt. Nest von *O. spinulosa* Sp. — Sonstige Nistplätze. **Rudow**, p. 413—418. Schmarotzer, Holzstengel zu Wohnungen wählen ferner: *O. rhinoceros* Gir., *rubicola* Gir. u. *parietina* Curt. p. 416. — Eine Ausnahme macht *O. gallarum* Spin., welche fertig vorhandene Schlupf-orte benutzt: Eichengallen etc. — *parvula* Duf. auch in Brombeerstengeln, auch aus Gallen von *Lipara lucens* an Schilfrohr erhalten. p. 416. — *fulviventris* Pz. Nest zwischen den Zinken einer Wäsche-klammer. p. 416—417.

— Maxillarpalpen. **Titus**, Canad. Entom. vol. XXXIII p. 257.

— Abbild. des 6. ♂ Ventralsegments von 17 Spp. der *adunca*-Gruppe, nebst Synonymie von 4 Spp. u. Beschreibungen neuer Spp. **Morice, F. D.**, Trans. Entom. Soc. London 1901 p. 161 sq. Bemerk. zu den Segment.

(p. 161—173). — Synonymie von 4 Spp. (p. 173—176). Nach Ansicht des Verf.'s ist

1. loti Mor. (♂!) (♀?) (= morawitzi Gerst.!)
2. morawitzi Perez (nec Gerst.? nec Ducke!)
3. difformis Perez (nec Ducke! = morawitzi Ducke).
4. pallidicornis Friese (= difformis Ducke! nec Perez!)

— Species quas pro novis habeo diagnoses (p. 176—177): *manicata* (adunca sehr ähnlich) p. 176 ♂ Abb. Fig. 3, 3a, 23, 23a (Algier, Ionische Inseln). — *romana* n. sp. (caementaria sehr ähnlich) p. 176—177 ♂ (Rom). — *flabellifera* (lepelletieri sehr ähnlich) p. 177 ♂ ♀ (Judäa, Syrien). — *libanensis* (adunca sehr ähnlich, kleiner) p. 177 ♂ ♀ (Syrien: Brumana). — Tafel VII bringt das 6. ♂-Ventralsgm., ventral gesehen von: Fig. 1. adunca Pz. 2. lysholmi Friese. 3. manicata n. sp. 4. morawitzi Perez (nec Ducke). 5. pici Friese. 6. caementaria Gerst. 7. lepelletieri Perez. 8. romana n. sp. 9. flabellifera n. sp. 10. jheringi Ducke. 11. loti Mor.(?). 12. difformis Perez (morawitzi Ducke). 13. pallicornis Friese (difformis Ducke). 14. insularis Schmiedekn. 15. fertoni Perez. 16. vaulogeri Perez. 17. libanensis n. sp. 18. adunca ♂-femur. 19. morawitzi Perez. 20. loti 7. u. 8. ♂-V.-Segm. 21. dito genitalia. — Abb. der ♂-Antennen bringt Taf. VIII: Fig. 22. lysholmi. 23 u. 23a. manicata. 24 m. 24a u. b. morawitzi Perez. 25. pici. 26. romana (Apex). 27. nebst a u. b. loti(?). 28. difformis m. a u. b. 29. pallicornis m. a u. b. 30. libanensis. 31. 7. Dorsalsegm. von flabellifera.

— *corsica* (zur adunca-Gruppe gehörig. Aehnelt difformis Pérez, pallidicornis Friese u. vor allem Iheringii Ducke. Untersch.: ♀ clypeo nitido, parce punctato, punctis latis et profunde impressis; ♂ antennis non difformibus, cum articulo, ultimo late rotundato, segmento sexto abdominis margine apicali crenulato). **Ferton**, Bull. Soc. Entom. France, 1901 p. 61 sq. (Corsica). — Diese Sp. u. O. lineola Pérez sind bis jetzt die einzigen f. Corsica specif. O.-Arten. Die andern hat die Insel wenigstens mit einem der beiden Continente gemeinsam, merkwürdig ist es, dass sich darunter keine Bergform aus den Pyrenäen oder den Alpen findet, obgleich der grösste Theil von Corsica mit Granitfelsen bedeckt ist. Gleiches gilt von den anderen Apiarii, von denen nur Dufourea halictula Nyl. auf Corsica gefunden wird. — Also ausschliessl. Fehlen der alpinen Fauna auf Corsica. — Geologische Betrachtungen. — ferruginea Lepel. p. 65

— *bicornis* L. ein vielseitiger Baumeister. Beschr. der Nester u. der Zellen. **Rudow** p. 405.

— *rufa* Linn. Carr erhielt in der erst. November-Woche 1897 das Thürschloss eines (Aussen)-Gebäudes von Nottingham, das mit 65 Lehmzellen der obigen Species besetzt war. Es schlüpfen im warmen Zimmer vom 15. III.—1. IV. 46 ♂, 5 ♀ aus, in den übrigen Kokons befanden sich 9 tote ♂ u. 5 tote ♀. Die Imagines fanden sich schon im Herbst entwickelt. **Carr**, On the Nesting Habits of Osm. ruf. L. Proceedings Nottingham Naturalist's Society for 1897/1898 p. 33.

- bicolor Schrk. auf d. Kalkdünen bei Upper Halling. **Elgar**, H. p. 17.
- longispina Pérez ♀, ♂, Taf. 10 Fig. 1: Dors.-Sgm. 5, 6, 7 des ♂. Fig. 2: linke Mand. d. ♀, Fig. 5: Nest, Kokon, Nestbau. **de Buysson**, Ann. Soc. Entom. France, vol. 68 1899 (1900) p. 666—7. — gallarum Spin., Morawitzi Gerst., adunca Latr., derasa Pérez u. Latreillei Spin. aus Am Draham (Tunis) p. 667. — tricornis Latr., vidua Gerst., Latreillei Spin. von Le Bardo bei Tunis p. 667. — aenea L., derasa Pérez igneopurpurea Costa von Le Belvédère, Tunis p. 668. — cornuta Latr. (Variété à poils de l'écusson et du métathorax roux vif) von Le Bardo p. 668. — *pulsata* (O. Giraudi Schm. u. punica Pérez nahe, grösser) p. 668 ♂ Taf. 10 Fig. 3 u. 4 Dors.-Segm., 6 u. 7 im Profil u. Aufsicht. (Jardin du Belvédère, près Tunis).
- cornuta Latr. ♀, Miramar. — Latreillei, Castle Bellver, Minorca, bei Talayot of Trepuco. — subnicans Mor. bei Talayot of Trepuco, Mahon, San Cristobal, Minorca. — caerulescens L., San Cristobal, Minorca. **Saunders** (1) p. 210.
- versicolor u. viridana Moraw. papaveris Latr. u. Perezi Ferton. Nestbau auf Corsica, letzt. bei Bonifacio einmal Mohn benutzend. **Ferton** p. 90. — tunensis Lep. Nest in Helix candidissima Taf. I Fig. 5. — desgl. von O. rufohirta tab. cit. Fig. 6. — lanosa Pérez, rufohirta Latr., emarginata Lep. u. Perezi bauen in d. Provence u. auf Corsica das Nest auf gleiche Weise. **Ferton** p. 89.
- tunensis Lep. (p. 85—86), emarginata Lep. (p. 86—87), Lepeletieri Pérez (p. 87) u. mucida Dours (p. 87—88), Biologie, Nestbau, Auftreten u. s. w. **Ferton**, Ann. Soc. Entom. France, vol. 70 p. 85—88.
- bicornis L. Nest in einen aus den Rohrstengeln von Arundo donax hergestellt. Tisch. **Rudow**, Insektenbörse, 18. Jhg. p. 76.
- fulgida Cress. zu Beulah (für Mexico neu). **Cockerell**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 336. — armaticeps Cresson, var. *sapellonis* var. n. p. 336 (Hill above Beulah).
- rufa L. (bicornis L.) Nest in einer leeren schwedischen Streichhölzerschachtel. Abb. **Oudemans**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 180.
- Solskyi Mor. u. Chelosoma maxillosum L. nisten sehr oft in Dachrohrstengeln an Häusern. Die Biene bringt das Futter am Boden unter u. die Larve frisst das Futter von unten, indem sie ihre Excremente hinter sich entleert, also gegen das Flugloch des Nestes. Erwachsen behält sie diese Stellung, mit dem Kopfe vom Flugloch abgewendet, bei. Zur Zeit der Verpuppung, dreht sie sich u. der Kopf liegt nun gegen das Flugloch gewendet u. die Biene kann sich nach der Entwicklung gerade nach oben herausnagen. **Nielsen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 308. — Abb. solchen Nestes von O. Solskyi (schematisch).
- Neue Spp. sind also: *corsica*, *manicata*, *romana*, *flabellifera*, *libanensis* u. *foxi*.
- Oxaea. Futterpflanzen wohl einzig Leguminosen. **Schrottky**, p. 212.
- austera Gerst. ♀ gelegentlich auf Solanum occarpum Sendt. u. grandiflorum R.-Pav. p. 212; — ♂ gelegentl. auf Leonurus sibiricus L. p. 212.
- austera Gerst. ♂ ♀, flavescens Klug ♂ ♀ auf Crotalaria paulina Schum. **Schrottky** p. 212.
- — u. flavescens Klug. Fundorte. **Schrottky** p. 215.

- festiva Sm. ♀ nach Centris-Art mit grosser Schnelligkeit an den Blüten von *Solanum grandiflorum*, ♂ wohl andere Pflanzen besuchend. **Ducke, A.**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 2. Hft. p. 52.
- siehe *Centris*. — Neu: *Oxaea tachytiformis* **Cameron**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. XXVII p. 315 (New Mexico).
- Oxydys beroni* n. sp. ♂ ♀, auf *Crotalaria paulina* Schum. (Futterpflanze). **Schrottky** p. 212.
- Pachycentris schrottkyi* Friese. Flugzeit, Nester. 10 m Höhe in d. Erdwand eines Eisenbahn-Durchschnittes. **Schrottky** p. 215.
- Panurginus Boylei* (Ckll.) Las Vegas. Fundpflanzen. var. α . mit gelb. Linie auf d. Vorderseite des Schafts. Ein Stück styloisirt. **Cockerell, T. D. A.**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 128. — pauper var. *flavotinctus* Ckll. Las Vegas p. 128.
- Neu: *verus* **Cockerell**, Psyche vol. IX p. 163 (New Mexico).
- Panurgus*. Thaubedeckte, in Blüten übernächigende ♂ riechen nach Citronen.
- *cyanescens*. Biolog. Bemerk.; duften nach Verbena etc. **Ferton** p. 95.
- Verhältniss der Geschlechter sehr ungleich. ♀:♂ = 1:12. Anlage des Nestes u. Gewohnheiten. **Rudow** p. 399.
- canescens* Latr. Beobacht. der Eiablage von Dipt. in einen Gang, der mehreren *Panurgus*-♀ zum Nistort dient. **Ferton**, Ann. Soc. Entom. France 1901 vol. 70 p. 145.
- Neu: *pyropygus* **Friese**, Apidae europae T. VI p. 107 (Syrien). — *dentatus* p. 112 (Egypten).
- Paradioxys pannonica* Mocs. bei Jericho. **Schmiedeknecht** p. 57.
- Paralictus* n. g. (Type: *Halictus cephalicus*). **Robertson**, Canad. Entom. vol. XXXIII p. 229. — *simplex* p. 230 (Illinois).
- Paranthidium* subg. n. (? von *Anthidium*) (Type: *Dianthidium perpictum* [*Anthidium perpictum* (Ckll.)]). Diese zeigt den primitiv. Charakter d. 3-gliedr. Max.-Palp., aber das Geäder von *Dianthidium*). **Cockerell, T. D. A. u. W. P.** p. 50.
- Pasiphoë Bowieri* **Vachal**, Ann. Soc. Entom. France 1901 p. 79 ♀ ♂ (Pérou: Cusco). — *Boliviensis* p. 79 ♀ (Bolivie). — *rufiventris* Spin. hat grauhyaline Flügel, schwarzes Geäder, der erste nerv. *recurrens* ist viel weiter entfernt als der zweite von dem entspr. Winkel, p. 79.
- Pasites Schotti* Latr. ♀ rot, ♂ schwarz. Wirtsbienen: sandnistende *Andrena*-u. *Halictus*-Arten. **Rudow** p. 428.
- Perdita zebrata* Cresson (Gallinas River at La Cueva. var. α klein, nur 5 mm lang, 1. Abd.-Sgm. oben ganz schwarz auf *Cleome serrulata*, Las Vegas). **Cockerell**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 129.
- Neu: *claypolei* **Cockerell**, Canad. Entom. vol. XXXII p. 281. — *rhois* p. 282 (beide aus Californien).
- Podalirius*. Nest, siehe *Anthophora*.
- bei S. Paulo selten, an Blüten noch nicht beobachtet. **Schrottky** p. 214. *acervorum* ♀ und die „Ciste rose“. **Ferton** p. 98.
- (= *Anthophora*) *retusus*. Beschreib. eines Hermaphroditen. **Morice**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 141—2. — Mit 2 Fig. Copulationsorg. (*Stipes*, *Sagitta*).

- quadrifasciatus Villers, Minorca. **Saunders** (1) p. 210. — pilipes F., Palma, Castle Beller, Miramar, Valldemosa, Pollensa. — nigrocinctus Lep. p. 210, Fundorte auf Minorca u. Majorca. — balearicus Friese, Castle Beller, Pollensa bis Castle del Rey.
- (*Entechnia*) taureus Say bei Pará, eine 2. Sp. auf der Insel Marajó auf Solanum toxicarium. **Ducke, A.**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 2. Hft. p. 54.
- Prosopis basalis* Smith. Beulah, für New Mexico neu, **Cockerell**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 125. — mesillae Ckll. Las Vegas p. 125. — rudbeckiae subsp. ruidosensis Ckll., Beulah. — tridens Ckll., Beulah, für New Mexico neu. p. 126. — varifrons Cress., Beulah, Dailay Cañon, für New Mexico neu. p. 126.
- Prosopis* wurde für einen Schmarotzer gehalten. Fundorte. Duften stark nach Veilchen oder Iris (besonders in der Hand). Wohnungen in Stengeln von Achillea. Einrichtung wie bei *Osmia*. **Rudow** p. 417—418.
- bei Pará 4 Arten. **Ducke A.**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 1. Hft. p. 51. — Bemerk. zu nordamerik. Spp. nebst Liste. **Lovell**, Entom. News, Philad. vol. XII p. 4—9. — Synonymie nordamerikan. Spp. **Robertson**, t. c. p. 77.
- 3. n. sp. Flugzeit bei S. Paulo. **Schrottky** p. 213. — affinis siehe *ziziae*. *brevicornis* Nyl. Irvine, für Schottland neu. **DalGLISH** p. 7.
- cornuta* Sm. u. *dilatata* K. at Woking. **Morice** (12).
- dilatata* Kirb. Auf den Kalkdünen bei Upper Halling. **Elgar** p. 17.
- hyalinata* Smith. Nestbau. **Ferton**, Ann. Soc. Entom. France, vol. 70 p. 94. *kriechbaumeri* Förster. Biologie. Nist-Gewohnheiten. **Höppner** (7). — *modesta* siehe affinis.
- sp.? (♂ Masoni Saund. sehr nahest.). **Saunders** (1). p. 208. (Pollensa, Monte Sentuiri).
- Spinolae* Friese u. *albofasciata* Friese n. sp. bei Jericho. **Schmiedeknecht**, p. 57. — *ziziae*, affinis, *modesta*. Synonymie. **Lovell**, Entom. News, Philad. vol. XII p. 162.
- Neu: *scrobicauda* (scutellum fere totum flavum etc.; segmentum primum, variolosum, secundum foveis rarioribus etc.) **Vachal**, Ann. Soc. Entom. France, 1901, p. 79—80 ♀ (Bolivie). — *apricollis* (vorig. ähnl., Untersch. p. 80 ♀ (Pérou: Callanga). — *stilbaspis* (mesonotum et mesopleurae fortiter insculpta, scutellis abdomineque laevibus, nitidis) p. 80 ♀ (Bolivie). — *fissa* (Opacula, haud vel lenissime sculpta; segmento mediali rotundato, spatio cordiformi rimula basali longit. tantum fisso. Alae paulo infuscatae. — ♀ collari sat crasso, luteo. — ♂ Prototarsis posterioribus basi luteis) p. 80 ♀ ♂ (Bolivie). — *breviradia* (cellula radialis lata, latitudine maxima vix duplo longiore, haud acuta) p. 80 — 81 ♀ (Bolivie). — *palmaris* p. 81 ♂ (Bolivie). — *arsenica* (nigra, flavo ornata, labro, mandibulis antennis tarsisque rufis vel rufescentibus) p. 81—82 ♀ (Brésil: Goyas). — *cribellata* (könnte das ♂ zu *arsenica* sein) p. 82 ♂ (de Callanga). — *atripes* (nigra, vittae tres faciei, laterales longissimae, media clypeum haud superans, callique margo posticus tantum flavi) p. 82 ♀ (Pérou: Callanga). — *polifolii* **Cockerell**, Canad. Entom. vol. XXXIII p. 281 (Californien).

- Protanthidium* n. g. **Cockerell, T. D. A. u. W. P.** p. 49. — Type: *steloides* [Megachile *steloides* Bingham] ♂ von Khasia Hills, India. Gesicht unterhalb d. Antennen gelb; Scutellum prominent u. zweilappig, Abd. an d. apikal. Sgnten. gelb gezeichnet. Mundtheile fast wie Megachile, aber „the ornaments“ eines Anthidiiums. Scheint die primitivste aller Anthidiinae zu sein.
- Psithyrus Perezii* Schult. Rechb., Parasit v. *B. xanthopus*, hat sich auf Corsica seinem Wirthe anpassen müssen. **Ferton**, Ann. Soc. Entom. France, vol. 70 p. 85.
- **Lie Petterson** behandelt folgende norwegische Arten: *rupestris* Fabr. p. 16.
— *vestalis* Fourcr. p. 16—17. — *quadricolor* Lep. p. 17. — *globosus* Eversm. p. 17—18. — Uebers. über die Verbr. p. 17.
- Pterochilus* n. sp. bei Jericho. **Schmiedeknecht** p. 57.
- Ptilothrix* bei Pará 2 Spp.: *plumata* Sm., *duckeii* Friese bei Pará. **Ducke, A.**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 2. Hft. p. 55.
- Rhathymus* Lep. bisher bei Pará nur *bicolor* Lep. **Ducke, A.**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 2. Hft. p. 67. — Oefter in Gesellschaft der *Centris umbraculata*.
- Saropoda quadrimaculata* Fabr. u. *senescens* Lep. Nest ders. **Rudow** p. 394.
- Sphécodes*. Bemerk. dazu **Morice**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 53—(56), (57)—58. — Beobacht. darüber: **Wainwright, Colbran, J.**, t. c., p. 72—73.
- Observations on. *Sph. pilifrons* ♀ in den Gängen von *Colletes cunicularia* bei Wallasey. **Gardner, Willoughby**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 127. — Verwandtschaft mit *Halictus* u. *Andrena*. **Morice** (8). — oder *Dichroa*. Besch. u. Anlage des Nestes. Diese lassen sich leichter gewinnen als diejenigen von *Dasyopoda*. **Rudow**, p. 398—399.
- hyalinatus* Scheinck zu Jamestown u. Bonhill. — *variegatus* v. Hag. von Levenside Moor u. Bonhill. **Malloch** p. 6.
- fuscipennis* Germ. (var. mit rothen Beinen). Pollensa, am Fusse des Monte Sentuiri; Cas. **Saunders** (1) p. 208.
- puncticeps* u. *spinulosus* v. Hag. auf den Kalkdünen bei Upper Halling. **Elgar, H.** p. 17.
- Neu: *antigae* **Tournier**, Bol. Soc. españ. vol. I, p. 258 (Barcelona).
- Spinoliella scitula* (Cresson) Las Vegas, auf *Cleome serrulata*. **Cockerell**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 129.
- Nach Ashmead (in litt.) gehören folgende als *Calliopius* beschriebene Sp. zu *Spinoliella*: *S. scitula* (Cress.), *S. australior* (Ckll.), *S. zebrata* (Cress.), *S. maculata* (Smith) u. *S. Edwardsii* (Cress.). Ferner sind wohl noch hinzuzufügen: *S. cincta* Cress., *S. interrupta* (Prov.), *S. quadrilineata* (Prov.), *S. meliloti* (Ckll.), *S. scutellaris* (Fowler), *S. visaliensis* (Fowler), *S. anthidius* (Fowler).
- Stelis* sp. in Norfolk. **Wainwright**.
- denticulata* Friese n. sp. u. *bidentata* Friese n. sp. bei Jericho. **Schmiedeknecht**, p. 57.
- permaculata* (Ckll.) Santa Fé, New Mexico; gute Sp. **Cockerell**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 337.
- maculata* Smith, at Mayford, near Woking. **Morice** (12).

— schmarotzen bei den ihnen ähnl. Holzbewohnern Trypetes u. Osmien.
Rudow p. 428. — Die grösste Sp. *aterrima* Pz. wohnt auch bei Anthidium.

Systropha siehe Halictoides.

Temnosoma metallicum var. *chapadae* n. **Cockerell**, Proc. Acad. Philad. vol. LIII p. 217.

Triepeolus n. g. pro parte Epeoli. — Type: *concauus* (Cress.) **Robertson**, Canad. Entom. vol. XXXIII p. 231.

Tetrapedia, ein schlechter Flieger. **Ducke** (1) p. 29. — div. Spp. auf Heteropterus sp. **Schrottky** p. 212; Flugzeit bei S. Paulo, p. 214.

— Klug bei Pará 9 Arten: *nasuta* Sm., *diversipes* Klug, *duckei* Friese, *testacea* Sm., *elongata* Friese, *mandibularis* Friese, *lugubris* Cress. u. 2 dem Verf. unbek. Sp. — Die Tetrap.-Arten sind in der Farbe, ja sogar in der charakt. Behaarung der Hinterbeine recht variabel, so dass hier beim Aufstellen neuer Spp. grosse Vorsicht angebracht ist. Wahrscheinl. Schmarotzer ist *Osiris*. **Ducke, A.**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 2. Hft. p. 55.

?*bunchosiae* Friese gelegentlich auf einer Bignoniacee. **Schrottky** p. 212.

Thalestria smaragdina Sm. ♂♀ auf *Stachytarpha dichotoma* Vahl. (Futterpflanze) **Schrottky** p. 212, Flugzeit p. 214.

Trachusa serratulae Pz. ist wie im Körperbau, so auch in der Bauhätigkeit von den nahest. Spp. abweichend. Wohnung nicht im Holz, sondern nur in der Erde, grosse Aehnlichkeit mit dem von *A. papaveris*. **Rudow** p. 412—413.

Temnosoma Sm. wenig bekannt, gleicht der europäischen artenreichen *Sphecodes*, versch. sofort durch prächtige blaugrüne Metallfarbe des Körpers. — 2 noch nicht sicher bestimmte Spp. bei Pará. **Ducke, A.**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 2. Hft. p. 51.

Tetralonia. Nest siehe *Eucera*. — Schmarotzer: *Coelioxys*, siehe dort.

Trigona subterranea (ähnelte äusserlich *fulvohirta* am meisten, aber ist grösser, hat einfarbig getrübt Flgl. u. schwarz behaartes Mesonotum). **Friese**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 5. Hft. p. 265 ♀ (São Paulo; Nest umfangreich, einige m tief [unterirdisch]. Beschr. soll folgen. — Pará). — *peckolli* (durch Tibienbildung dicht bei *cupira*, durch Färbung bei *molesta*; von erst. versch. durch rotgelb. Kopf u. Thorax, von letzt. durch Grösse u. Tibienbildung. Auch alfeni nicht unähnlich, aber Wangen viel kürzer u. Körper heller ohne die scharfe gelbe Zeichn.) p. 265—266 ♀ (Columbien: Popayan; Ecuador). — *schultzei* (gleicht äusserlich der *testaceicornis*, ab. kleiner und hat dicht glänzendes schwach skulpturirtes Mesonotum, ohne gelbe Seitenränder) p. 266—267 ♀ (Pará). — *dutrae* (vor. sehr nahe, ist kleiner, m. sparsam unregelmässig punkt. Gesicht, besonders auf d. Stirn m. grossen glatten Partien, stark glänzend, Meson. von anderer Struktur) p. 267—268 ♀ (Pará). — *fraissei* (ähnelte *schrottkyi*, ist kleiner, hat deutl. Wangen, Kopf wie Thorax, m. weiss. Haartupfen; von *duckei* durch ganz feine u. matte Skulptur verschieden) p. 268 ♀ (vom Rio Anajas auf der Insel Marajó des Amazonenstroms, unweit Pará, N. Brasil.). — *capitata* var. *virgilia* (von Stammf. versch. durch rudim. oft verschwundene gelb. Zeichn. des Thorax; auf Abd. vollk. fehl.; dunkelschwarzbraun) p. 268

- (Blumenau, St. Catharina, Brasil.). — *huberi* (zu den grösst. Sp. gehörig, durch Färb. u. Grösse, ähn. *capitata*, hat aber gelb. Gesicht, kaum skulpt. glänz. Thorax und glatt., glänz. Abd.) p. 269 ♀ (Pará, an Labiaten und Amaranthaceen). — *pallida* var. *nigrita* (wie Stammform, aber Mesonot. schwarzbraun bis auf die Seitenränder; Abd. ebenfalls dunkelbr. werdend, Flgl. gelbl. getrübt) p. 269 ♂♀ (Mexico: Corduba). — *lehmanni* (in Form eng an *angustata*, aber ganz schwarzbraun u. schwarz behaart, so ähnl., dass Friese sie für eine schwarze Var. ders. anzusehen geneigt ist) p. 270 ♀ (Popayan, Columbia). — *nigripes* (unter den klein. schwarzbraun. Arten der Gruppe *molesta* durch das ganz schwarze Gesicht auffallend) p. 270—1 ♀ (Villa Rica, Paraguay). — *keyensis* n. sp. (i. l.) (*atripes* am nächsten, hat aber lange Wangen, dunkles Mittelsgm. u. gleichmässig getrübe Flgl.) p. 271 ♀ (Key-Eilanden, Amboina, Nederland India).
- collina* Sm. von Patalung, Smith beschr. sie von Mount Ophir, Malacca. **Cameron, P.**, Proc. Zool. Soc. London 1901 vol. 2. p. 36. — *testaceitarsis* (*nigra*, capite, thoraceque dense albo-pilosis; scapo antennarum apiceque tarsorum testaceis; alis hyalin., nervis stigmatique piceis) p. 36 ♀ (Patani, Malay Peninsula).
- amerina*. Theile des Baues mit einig. Bienen aus Argentinien nach Hamburg eingeschleppt. **Kraepelin** p. 193.
- lineata*. Nest. **du Buysson**, Ann. Soc. Entom. France vol. 70 p. 155.
- Trypetes*. Nest, siehe *Heriades*. — Schmarotzer: *Stelis*, siehe dort.
- Xenoglossa pruinosa* (Say). Fundorte in New Mexico nebst Fundpflanzen. **Cockerell, T. D. A.**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 130.
- Xylocopa* Latr. — Revision. Symbiose mit Acari. **Pérez**, Act. Soc. Bordeaux, vol. LVI p. 1—128. — Die n. spp. siehe am Schluss.
- bei Pará bisher die 6 Arten: *frontalis* Oliv. Stammform nebst var. *morio* F. ♀ bei Pará, Marajó u. bei Macapá. — *brasilianorum* L., *aurulenta* F., *lucida* Sm., *metallica* Sm., *anthophoroides* Sm. bei Pará, nebst Besuchspflanzen. **Ducke, A.**, Zeitschr. f. syst. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 1. Hft. p. 53. — 7 sp. bei X. *barbata* F. bei Marcapá; fliegt schnell u. stossweise, oft ruhig schwebend wie *Meliturga* ♂. **Ducke, A.**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 2. Hft. p. 53.
- aeneipennis* de Geer v. Hawaii = X. *chloroptera*. **Perkins**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 264.
- aestuans* L. u. *hottentotta* Smith bei Jericho. **Schmiedeknecht** p. 57.
- brasilianorum* L. ♀, *colona* Lep. ♀ u. X. *frontalis* Ol. var. *moris* Lep. auf *Solanum* Arten. **Schrottky** p. 212. — (? Futterpflanze) p. 212. — *colona* Lep. ♂ gelegentlich auf *Bacharis dracunculifolia* D. C. p. 211; Futterpflanze: *Tecoma ipé* Mart.
- frontalis* var. *morio* F. ♀, X. *crotalariae* n. sp. ♀, X. *brasilianorum* (L.) ♀, *splendidula* Lep. ♀ auf *Crotalaria paulina* Schum. — *frontalis* Oliv. u. dessen var. *morio* F. ♀. Flugzeit. Letzt. häufiger als die typische Form, doch giebt es zahlreiche Uebergänge. — *brasilianorum* L., *crotalariae* n. sp., *solona* (Lep.), *splendidula* F., *pulchra* Sm. u. *cryso-poda* n. sp. (möglicherweise das ♂ zu *pulchra*). Flugzeit bei S. Paulo u. Blüten. **Schrottky** p. 213—214.

tranquebarica (Fabr.). Ein synonymer Beitrag. **Schulz, W. A.** Scheint nicht gerade häßlich zu sein. — Die Synonymie der Sp. lautet nunmehr: *X. tranq.* = *Bombus tranquebaricus* Fabr. 1804 = *B. tranq.* Illiger 1806 = *Xylocopa rufescens* Smith 1874 = *X. rufescens* Bingham 1893 = *X. rufescens* Dalla Torre 1896 = *Bombus tranquebaricus* Dalla Torre 1896 = *X. rufescens* Bingham 1897.

violacea L. Nester ders. Beschr. einiger interess. Nester aus Dalmatien, Palermo, Bozen etc. **Rudow** p. 406—407. — *minuta* Lep. (Nest in Umbellatenstengeln) — Nester tropisch. Arten in mullmigen Baumstämmen.

violacea L. *Valldemosa* Majorca. **Saunders** (1) p. 210.

malayana (nigra, thoraceque supra abdominisque basi dense fulvo-pilosis; tarsis anterioribus longe albopilosis; alis fusco-viol.) **Cameron, P.**, Proc. Zool. Soc. London, 1901 vol. 2 p. 32 ♂ (Singapore). — *ceylonica* (dense ferrug.-pilosa, thorace supra abdominisque basi olivaceo-pilosis; alis fusco-violaceis) p. 32—33 ♂ (Ceylon). — Aehnelt sehr *X. rufescens*, ist aber schlanker. — *collaris* Linn., *Xyloc. pictifrons* Smith ♂, welches mit Bingham's Beschr., aber nicht mit Smith's Originalbeschr. stimmt. p. 33. — *grandiceps* (nigra, dense fulva-pilosa; tarsis ferrugineo-pilosis; alis fulvo-hyalinis, nervis nigris) p. 33—34 ♀ (Singapore). Gute Sp., die röthl. Färb. der Pubescenz macht sie *rufescens* Smith ähnlich, doch davon abgesehen ist ruf. eine Koptorthosoma.

Perkinsi (aestuans nahe, versch. dadurch, dass b. Perk. nicht die ganze Oberseite des Thorax mit gelbl. Haaren bedeckt ist. Sie kann möglicherw. eine Form von *X. provida* Smith von Mysol u. Waigiou sein). **Cameron, P.**, Proc. Zool. Soc. London, 1901 p. 243—9 ♀.

— **Pérez** beschreibt in den Act. Soc. Linn. Bordeaux vol. LVI eine Reihe neuer Spp. u. zwar: *morawitzi* p. 16 (Turkestan). — *erivanensis* p. 19 (Erivan). — *uclesiensis* p. 22 (Spanien). — *cribrata* p. 24 (Assinia). — *aethiopica* p. 26 (Abyssinien). — *distinguenda* p. 30 (Sierra Leone). — *sycofanta* p. 34 (Ostafrika). — *caloptera* p. 34 (Ostafrika). — *confusa* p. 39 (Afrika). — *fuliginata* p. 41 (Mindanao). — *attenuata* p. 46 (Shanghai). — *insidiosa* p. 53 (Celebes). — *amauroptera* p. 54 (Palawan). — *sulcifrons* p. 55 (Palawan). — *confusa* p. 57 (Java). — *vachali* p. 60 (Palawan). — *euchlora* p. 61 (Palawan). — *ocularis* p. 62 (Timor). — *eunota* p. 63 (Aru). — *adusta* p. 65 (Mindanao). — *alternata* p. 66 (Celebes). — *cavicornis* p. 70 (Uruguay). — *binotata* p. 72 (Chiriqui). — *subcyanea* p. 74 (Brasilien). — *mastrucata* p. 85 (Venezuela). — *eximia* p. 87 (Bolivia). — *ocellaris* p. 90 (Chiriqui). — *nasica* p. 91 (Chiriqui). — *columbiensis* p. 94 (Chiriqui). — *transitoria* p. 95 (Argentinien). — *nigrocaudata* p. 107 (Surinam). — *amblardi* p. 115 (Californien). — *singularis* p. 116 (Mexiko).

Neu sind also insgesamt die eben genannten Pérez'schen Arten, ferner noch *malayana*, *ceylonica*, *grandiceps* u. *Perkinsi*.

Apistik:

Zusammenstellung der wichtigsten diesbezüglichen Resultate aus dem Jahre 1901.

Der im Folgenden die Biene betreffende Stoff ist nach folg. Gesichtspunkten geordnet:

1. Litteratur u. Geschichte.
2. Systematik (u. Synonymie),
3. Heimath. Fauna. Verbreitung.
4. Morphologie.
5. Drüsen. Oenocyten. Fettkörper.
6. Entwicklung.
 - a) Statistisches: Zeitdauer der Entw.-Zustände. Zugang und Abgang etc.
 - b) Parthenogenesis etc.
 - c) Innere Entwicklungsvorgänge.
7. Biologie.
 - a) Statistische Angaben.
 - b) Bevölkerungsverhältnisse. Flug.
 - c) Bau. (Gestalt der Zellen, Maasse, Gewichte etc.).
8. Physiologie. Muskelkraft. — Säure. — Gewichts-Abnahme u. Zunahme. — Dunkelheit im Bienenstock. — Schwarze Farbe. — Orientierungssinn. — Temperatureinflüsse siehe sub No. 15.
9. Krankheiten. Schädlinge. Parasiten. Feinde
10. Stich. Gift.
11. Zucht.
12. Technik.
 - a) Hilfsmittel. — Winke. — Bienennährpflanzen siehe sub No. 16.
 - b) Honig. Wachs.
13. Statistik.
14. Bienen-Gesetze etc.
15. Temperatureinflüsse.
16. Vermischtes (Bienen im Haushalt der Natur, Einfluss auf Befruchtung der Blüten, Bienennährpflanzen, Diverses).

1. Geschichte, Litteratur etc.

Altägyptisches Bienenwesen: Dedekind.

Autoren: Unter A. (Autoren alphabetisch) wurden bereits aufgeführt: Alberti, Alfonsus, (Atlas für Bienenzucht), diverse Bienenzeitungen (p. 294), Ciesielskij, Clément, Dedekind, Dickel, Gale, Giard, (Imker, Imkerkalender), Kaiser, Klinge, Kuchenmüller u. Husser, Kunachowitsch, Maeterlinck, Martynow, Mehrung, Melzer, Michaelis, Netter, Petrunkevitch, de Rauschenfels, (Revue internationale), Sajó, Samson, Schiller-Tietz, Schulz (Buckow)[siehe unter Technik], Skach, Skarytka, Subarew, Tanshin, Webster, Weissmann, van der Wissel-Herderscheê.

Lehrbücher: Alberti, Alfonsus, Ciesielskii [polnisch], Clément [französisch], Kuchenmüller u. Husser, Kunachowitsch [russisch], Ludwig, Mehrung, Melzer, Michaelis [polnisch], de Rauschenfels [italienisch], Samson [englisch], Skarytka, Subarew [russisch], Tanshin [russisch], Trubnikoff [russisch].

Dazu kommen noch folgende:

Apicoltore. Periodico dell' Associazione centrale d'incoraggiamento per l'Apicoltura in Italia di 1867. Roma. in 8° gr. c. figure. Anno 1901. (12 nri.). M. 7,—.

Bee Journal, The British. Edited by Th. W. Cowan, London, roy. 8°. With illustrations. vol. XXIX. Year 1901. 52 nrs. M. 6,—.

L'Apiculteur. Journal des cultivateurs d'Abeilles etc., dirigé p. E. Sevalle. Paris. 8°. Année 45: 1901 (12 nrs.) M. 5,—.

Bien. Vejleder i Biavl, Fjerkraeavl og Havebrug. Redigeret og udgivet af A. E. Andersen. Nyborg. 4. Jahrgang XVI: 1901. (12 Nrn.) M. 1,20.

Biene, Ungarische. Organ des Landesvereins der Bienenzüchter in Ungarn. Redacteur: F. Kühne. Budapest. gr. 8°. Jahrgang 29: 1901. (12 Nrn.)

Bienenfreund, Deutscher. Zeitung für praktische Bienenzucht; Organ für Deutsche Bienenwirthe. Herausg. v. L. Krancher. Leipzig. gr. 8°. M. Abbildgn. — Jahrg. 37: 1901. (24 Nrn.) M. 2,25.

Bienenfreund, Illustrierter Schweizerischer. Redigirt von U. Studer, Niederried. 8. — Jahrg. XIII. 1901. (24 Nrn.) M. 4,—.

Die Bienenpflege. Monatsschrift zur Verbreitung bienenwirtschaftlicher Kenntnisse. Herausgegeben von Blind. Ludwigsburg. gr. 8°. — Jahrgang 23: 1901. (12 Nrn.) M. 2,40.

Bienenzucht, die deutsche, in Theorie und Praxis. Herausgegeben von F. Gerstung. Leipzig. gr. 8°. M. Abbildungen. — Jahrg. IX: 1901 (12 Nrn.) M. 4,—.

Bi-Tidende, Den Danske. Tidsskrift für Biavl. Udgivet af Danmarks Biavler-Forening, redigeret af N. S. Kristensen. Røskilde. 4. — Jahrgang XXXV. 1901. (18 Nrn.) M. 3,—.

Canadian Bee Journal. R. F. Holterman, Editor. Brantford, Canada. 8°. — New Series. volume IX. Year 1901. (12 nrs.). M. 6,—.

Centralblatt, Bienenwirtschaftliches. Herausg. v. G. Lehzen. Hannover. gr. 8°. — Jahrg. 37: 1901. (24 Nrn.) M. 3,—

Cowan, T. W. The Honey Bee; its Natural History, Anatomy and Physiology. XI u. 220 p., 72 Fig. u. Titelbl. 8°. London. 1891.

Preuss, Emil. Der Titel p. 397 des Berichts für 1899 lautet: Meine Bienenzucht-Betriebweise und ihre Erfolge etc. — Zu haben beim Verf. in Potsdam, Persiusstrasse 5. Der Preis beträgt daselbst M. 2,60.

Ueberschaer, G., Tischlermeister. Die Volksbienenzucht, wie sie der einfache Mann in Zukunft mit Nutzen treibt. Berlin. Selbstverlag (S., Oranienstrasse 60). Preis M. —,50.

Verfasser trieb Bienenzucht mitten in Berlin, 4 Treppen hoch u. giebt eine Anleitung zur Volksbienenzucht nach seiner Methode. Wichtig für die

Betriebsweise sein Schwarmverhinderungsapparat. Auch Dr. Krancher betrieb als Anfänger im Lehrfach mitten in Leipzig, 3 Tr. hoch Bienenzucht mit recht guten Erfolgen.

Nekrolog bekannter Imker f. 1900 u. 1901. Krancher's Bien.-Kal. f. 1902 p. 161—163.

Beutkiefern Westpreussens u. Honigbäume des Ostbaltikums: Klinge.
Baupläne: Skach.

Zeitschriften. Siehe im Autorenverzeichniss unter Bienen-, Imker-, ferner oben.

2. Systematik.

Kellen, J. B. behandelt in der Luxemburger Bienenzeitung unter dem Titel „Wahlzucht in der Bienenzucht“ unter anderem auch die Arten und Abarten resp. die Rassen der Honigbienen. Einen gedrängten Auszug giebt auch Dr. Kr. in seinem Kal. des deutsch. Bienenfr. f. 1902 p. 155—157.

Darnach theilt er die Gatt. ein:

1. Die *Honigbiene* oder *Imme* (*Apis mellifica*).

Sie zerfällt nach Farbe, Grösse u. anderen Eigenthümlichkeiten in 4 Rassen.

a) Die **dunkle europäische Biene, auch nordische Biene** (gegenwärtige Heimath: Nord-Europa, Frankreich, Spanien, Portugal, Griechenland, Nord-Asien u. Amerika). Hier unterscheidet er folgende Nebenrassen:

I. Die **gemeine dunkle Biene** (von dunkelgrauer, dunkelbrauner bis schwarzer Färbung). (Deutschland, Belgien, Luxemburg).

II. Die **niederwestösterreichische Biene** (heller als die deutsche). (Niederösterreich, südl. von Wien).

III. Die **Haidebiene der Lüneburger Haide** (von dunkelgrauer und schwarzer Farbe).

IV. Die **Krainer Biene** (grau gefärbt mit weisslich. Hinterleibshaar [*Apis carnica*]). (Krain, Oesterreich).

b) Die **bunte europäische Biene**. Ihre ersten Hinterleibsringe sind gelb, der übrige Theil des Körpers ist dunkel gefärbt. (Im grössten Theile Italiens, in der ital. Schweiz, auf der Insel Sicilien, in Kleinasien u. im Kaukasus). Nebenrassen ders.:

I. Die **italienische oder ligurische Biene**. Schwarzes Brustschild, die ersten 2—2½ Hinterleibsringe gelbröthlich bis orangefarbig. (*Apis ligustica*). Nicht so stechlustig als die dunkl. europ. Biene.

II. Die **bunte europäische Biene mit gelbem Brustschildchen**. (Holland, Südfrankreich, Sicilien, Kaukasus, Kleinasien). — Auf der Insel Cypern als „cyprische Biene“ bekannt.

III. Die **kaukasische Biene mit einigen gelben Hinterleibsringen u. mit grauer Behaarung**.

IV. Die griechische oder cecropische Biene, auch Hymettus-Biene genannt. (*Apis cecropia*). Die beiden ersten Hinterleibsringe sind rostfarbig.

c) Die **dunkle oder schwarze Biene, afrikanische** (*Apis unicolor*), auch madagaskarische Biene genannt. Kleiner als die nordische, ganz dunkel u. schwärzlich behaart. Nur auf den afrikan. Inseln Madagascar (Bourbon) u. Mauritius. Nebenrassen wohl nicht vorhanden.

d) Die **bunte afrikanische Biene**. 2 Nebenrassen:

I. Die gemeine afrikanische Biene (*Apis adansonii*) mit rötlichem Schildchen u. graugelber bis lichtbrauner Behaarung. Kleiner als die nordische Biene.

II. Die ägyptische Biene (*Apis fasciata*). Merklich kleiner als die nordische, kleiner sogar als die vorige. Die 2—2 $\frac{1}{2}$ ersten Hinterleibsringe wachsgelb, ihre Behaarung weisslich.) (Aegypten, Arabien, Syrien, China). Sehr böseartig, neigt zur Drohnenerzeugung.

2. Die **grosse ostindische Biene** (*Apis dorsata*), grösser als *A. mellif.*

3. Die **südasiatische oder indische Biene** (*Apis indica*), um die Hälfte kleiner als *Ap. mellif.*

4. Die **kleine südasiatische Biene** (*Apis florea*), noch kleiner als die indische Biene.

Die sub 2—4 genannten Arten eignen sich wenig oder garnicht zur Bienenzucht.

Synonymie.

Apis mellifera, nicht *mellifica*. Fox, Entom. News, Philad. vol. XII p. 285.

3. Heimat. Fauna. Verbreitung.

Apis. Die Tropen-Formen sammeln keinen oder nur wenig Honig, da Nahrung stets vorhanden ist. Rudow p. 385. — Die einzelnen Arten in Europa, Afrika, Asien. — Feinde p. 385—387. Hym., Col., Dipt., Lep.

— Honigbiene in den Kolonien. Refer. eines Vortrags aus d. französ. Handelskammer (Marseille). Insektenbörse 17. Jhg. p. 372. — In den Kolonien überall wild in hohlen Bäumen. Auf Madagaskar rationell gezogen. Von Mahanoro bis zu 50000 kg Wachs ausgeführt, also könnte Madag. jährl. etwas über 200 Tonn. Wachs liefern. — Tropischer Honig von delicat. Aroma u. ausgezeichn. Geschmack. — Auf Reunion sogen. grüner Honig aus *Saxifragae*, *Weinmannia tinctoria*, sehr beliebt.

mellifera var. *ligustica* Spinola, Las Vegas, New Mexico. Cockerell, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 131.

mellifica Linn. in Majorca, Minorca, Talayot of Trepuco. Saunders p. 211.

4. Morphologie.

Abbildung des Stachelapparats der Honigbiene. Prometheus 12. Bd. p. 99 Fig. 58
nebst vergröss. Stachel mit Widerhaken.

5. Drüsen. Önoocyten. Fettkörper.

Publikationen fehlen.

6. Entwicklung.

a. Statistisches.

Periodischer Gang der Lebensäusserungen der Bienen in d. Prov. Preussen:

Zeiträume und Perioden.	Erscheinungen	Durchschn. Datum
I. Erwachen der Bienen aus der Winterruhe		
1. Austritt aus ders.	Erste Reinigungsausflüge	15. III.
2. Frühlingsräuberei und Hungerschwärme	Allgem. Vorspiel., Fächeln u. Sterzen	20. IV.
3. Stärk. Brutansatz	Erster Drohnenbrutansatz	1. V.
II. Entfalt des Bienenleb.		
1. Entfernte Vorzeichen des Schwärmens	Erstes Auftreten der Drohnen	20. V
2. Nähere Vorz. dess.	Starker Drohnenbrutansatz	1. VI.
3. Volle Schwarmzeit	Grösste Drohnenzahl	21. VI.
III. Zurücksinken d. regen Bienenlebens		
1. Stillstand in d. Entwickl.	Fortbestand d. Drohnen	20. VII.
2. Merklich. Zurücksinken	Drohenschlacht	1. VIII.
3. Herbsträuberei, Noth- schwärme	Einstell. des abendl. Brausens	15. VIII.
IV. Eintritt in d. Winterr.		
1. Thätigkeits- u. Ruhe- wechsel	Kurze Trachtausflüge	1. IX.
2. Vorwinterl. Reinigung	Seltene Reinigungsausflüge	20. IX.
3. Beginnend. Winterr.	Seltene, kurze Vorspiele	15. X.
V. Winterruhe	Selt., krz., schwach. Rein.-Vorsp.	1. XI.

Zeitdauer der verschiedenen Entwicklungszustände der Bienen:

Gegenstände Beobacht. bei einer Temp. von 27° u. 28° R. im Brutnest	Tage		
	Königin	Arbeits- biene	Drohne
1. Eizustand	3	3	3
2. Larve in offener Zelle	5 ¹ / ₂	6	6
Vom Augenblick des gelegt. Eies ab bis zur Bedecklung	8 ¹ / ₂	9	9
3. Die Larve spinnt den Kokon in bedeckt. Zelle	1	1 ¹ / ₂	3
4. Larvenzustand nach dem Einspinnen	2 ² / ₃	3	2 ¹ / ₂
5. Dauer des Nymphenstadiums	4 ⁵ / ₆	6 ¹ / ₂	9 ¹ / ₂
Zeitdauer des bedeckten Zustandes	8 ¹ / ₂	11	15
Zeitdauer vom Moment der Ei-Ablage des Eies bis zum Verlassen der Zelle	17	20	24
6. Zeitdauer der Entw. unt. günstigst. Umständ.	16	19	24
7. Zeitdauer der Entw. unt. ungünst. Umständ.	22	26	28
8. Gefangenhalten der jung. Königin in d. Zelle	8-10	—	—
9. Nach dem Verlassen der Zelle erwacht bei Alleinherrschaft die Brunst der Königin . .	3	—	—
10. Durchschnittsalter bis zu welch. die Königin befruchtungsfähig bleibt	60	—	—
11. Beginn der Eiablage nach geschehener Be- gattung	2	—	—
12. Zeitdauer der Ausbildung des Körpers nach dem Verlassen der Zelle	1/2	2	2
13. Verweilen der jungen Bienen im Stocke nach erlangter Ausbildung	—	6	6
14. Erstes Vorspiel nach d. Verlass. d. Zelle . .	—	8	8-12
15. Erster Trachtausflug der Arbeiter nach Verlassen der Zelle	—	16-18	—
16. Vom Ablegen des Eies bis zur vollen Selbst- ständigkeit	22	36	32

Etwaiger Zu- u. Abgang eines Bienenvolkes im Kreislauf des Jahres. Kal. d. deutsch. Bienenfr. f. 1902 p. 141 nach Matthes, W. in Dorndorf (Deutsch. Bienenfr. p. 51).

(Die Drohnen sind nicht berücksichtigt.)

	Bestand	Zugang	Abgang		Bestand	Zugang	Abgang
März	15 000	2 400	5 000	September	30 000	3 600	12 600
April	12 400	7 000	5 000	October	21 000	—	5 000
Mai	14 400	14 200	6 400	November	16 000	—	200
Juni	22 200	23 400	2 400	Dezember	15 800	—	200
Juli	43 200	16 200	21 200	Januar	15 600	—	200
August	38 000	7 800	15 800	Februar	15 400	—	400

Gang der Bevölkerungszahl.

Tag	Charakter der Zeit	Z a h l			Verhältniszahl		
		Arbeitsb.	Hausb.	Trachtb.	Arbeitsb.	Hausb.	Trachtb.
1. März	Allgemeiner Eintritt der Thätigkeit d. Biens .	13 750	6 875	6 875	8	4	4
1. Mai	Beginn der Volltracht . .	27 500	13 750	13 750	16	8	8
21. Juni	Höchste Entwicklung . . .	55 000	27 500	27 500	32	16	16
29. Sept.	Erlöschen der Tracht . . .	27 500	—	—	16	—	—
1. Nov.	Winterruhe	13 750	—	—	8	—	—

Bevölkerungsbewegung im Bien.

(Zahl der Arbeiter bei Beginn der Zählung berechnet auf 14 978).

	1. Febr.		28. Febr.		22. März		14. April		8. Mai	
	3 Tg. à 26 Eier		3 Tg. à 120		3 Tg. à 186		3 Tg. à 568		3 Tg. à 980	
	Zahl	%	Zahl	%	Zahl	%	Zahl	%	Zahl	%
1. Eier	78	3	360	3	558	3	1 704	3	2 940	3
2. Offene Larven	128	4,923	614	5,033	938	5,041	2 896	5,098	4 904	5,004
3. Bedeckelte Brut	340	13,076	1548	12,9	2418	13,01.	7 088	13,007	12 696	13,057
4. Eben ausge- schlüpfte Arbeiter . .	49	1,888	250	2,0833	370	1,988	—	—	—	—
5. In den Zellen befindl. Brut	546	21	2522	21,016	3914	21,043	—	—	—	—
Brut überhaupt:	595	22,884	2772	23,1	4294	23,032	11 688	20,577	20 540	20,948

b) Parthenogenese etc.

Referat über die im vor. Jahre bericht. parthen. Untersuchungen (Widerlegung der Dzierzon'schen Lehre durch Dickel u. Kipping) Insektenbörse 17. Jhg. p. 114.

Entwicklung der Bieneneier. Einfluss der Befruchtung. Gegenwärtiger Standpunkt: Dickel (p. 309–311 dieses Berichts), Petrunkevitch, Weissmann.

Es sei ferner noch angeführt:

Dickel, Ferd. Ist Dr. med. Kipping's oder meine Ansicht besser begründet? Krancher's Kal. f. Bienen, f. 1902 p. 102.

Die von Dr. med. Kipping zu Roda ausgeführt. Experimente überzeugten Kipping wie die Dickel'schen davon, dass alle in Zellen abgesetzten Eier einer

befruchteten Mutterbiene, auch die in Drohnenzellen abgesetzten, befruchtet sind, und dass die Einflüsse der Arbeitsbienen über die Entwicklungsrichtung ders. entscheiden. Kipping's Erklärungsweise dieser Einflüsse (in der Leipziger Bienenzeitung) sagt D. nicht zu. Nach K. soll die verschiedene, gereichte Larvennahrung die Geschlechtsdifferenz herbeiführen. Der Mechanismus des Legevorgangs schliesst einen Einfluss der Mutterbiene aus. Gegentheilige Beweise. 1. Einem entweiselten u. aller offenen Brut beraubt. Stocke wurde eine 2 Tg. zuvor bestiftete Drohnenwabe eingehängt. Ueber den ersten Larven wurden Weiselnöpfe gebaut. Resultat: Drohnen und Wesen, die äusserlich Drohnenform zeigten, Missbildungen, oder die Larven starben schon früher ab. Sie waren also in geschlechtlicher Hinsicht bereits bestimmt — 2. Erbauung von Drohnenwaben durch starke Völker. Ausspritzen der Brut. Einstellen der Waben in Völker auf lauter Drohnenbau. Waren die Eier dort $1\frac{1}{2}$ Tg. alt, wurden sie ein. kleiner., grösser. u. ganz starken Volke eingehängt. Nach Kipping müssten überall daraus Drohnen werden. Resultat: Die klein. Völker zogen aus den Eiern von dem gleichen Mutterthier 600—700 Arbeiter, die mittl. weniger, die stark. 70 bis 100 Arb., im übrig. Drohnen. Die Kontrollwaben im Volke auf Drohnenbau zeigten nur vereinz. Drohnen, sonst Arbeiter. Kipping's Ansicht also auch für die Entwicklung der Arbeitsbienen ein Irrthum. Die letzt. Versuche bestätigen nach Dickel zugleich seine Ansicht über die geschlechtl. Stellung der Arbeiterlarven. Sie sind geschlechtl. indifferent (was schon 1750 Pastor Schirach entdeckte). Die Entstehung von Drohnen aus Arbeiterlarven ist von Dutzenden von Bienenwirthen konstatiert. — Wichtig ist dabei, dass dann ausschliessl. nur noch Drohnen aus den gereichten Eiern entstanden, sobald etwa $1\frac{1}{2}$ Tg. später die erste hochgewölbte Zelle gedeckelt wurde. — Diese Untersuchungsergebnisse beirren D. nicht mehr in seiner Ueberzeugung. — Auch die Mikroskope täuschen, sie beweisen nicht das Unbefruchtetsein normaler Drohneneier.

— (2). Ueber die Entwicklungsweise der Honigbiene. **Dickel, Ferd.** (2) t. c. No. 660 p. 39—56.

Einleitung (p. 39—42). Darstellung der verworrenen Verhältnisse über die Entstehung der dreierlei Bienenwesen in einer Bienenkolonie. Ansichten der Autoren: Réaumur, Leuckart, Schiemenz, Dzierzon u. Petrunkevitch. Angesichts der abweichenden Untersuchungsergebnisse sucht Verfasser im Folgenden durch umfassende, planmässige Versuche an der Bienenkolonie den wahren Entwicklungsvorgängen auf die Spur zu kommen.

A. Experimente und deren Ergebnisse (p. 42—45).

Versuch I. Einer Bienenkolonie wird während des Sommerhalbjahres die Mutterbiene und alle offene Brut in den kleinen Arbeiterzellen, aus welchen sie eine solche nachziehen könnten, entzogen. Bildung von Weiselnöpfchen. Besetzung mit Eiern von befruchtungsunfähigen Arbeitsbienen. Die Eier entwickeln sich nie zu Larven. In den Arbeiterzellen entsteht Buckelbrut. Diese in Drohnen- wie Arbeiterzellen heranwachs. Larven zeigen sehr häufig ein kränkliches, schmieriggelb. Aussehen u. sterben ab.

Versuch II. Im April oder noch besser Ende Juli, Anfang August wird bei andauernd trachtloser Zeit für die Bienen einer schwachen Kolonie oder ein.

spät gefallenen Schwarm eine sicher befrucht. Mutterbiene, eine mit ganz jung. Brut besetzte Drohnenwabe eingehängt, die einer starken Normalkolonie entnommen ist. Entleerung der Zellen, da der Trieb zur Zucht der ♂ entweder erloschen oder noch nicht erwacht ist. Ein gleichzeitiger Versuch mit junger Brut aus einer buckelbrütigen Kolonie, sowie das Einstellen von Dohntenbrut im Frühjahr: Die Drohnen werden geduldet.

Versuch III. Einer Kolonie wird Mutterbiene u. alle offene Brut genommen. Einstellen einer Drohnenwabe mit 1—2 Tage alt. Eiern. Bildung von Nachschaffungszellen, Behandl. der einlieg. Larven als Mutterthiere, doch kommen solche niemals zu Stande. Die Larven sterben entweder oder es entwickeln sich Wesen von äusserlich echter Drohnenform. (Miss- u. Rückbildungen in den Geschlechtsorganen.)

Versuch IV. Alte, junge und ganz frisch abgesetzte Eier werden unter Drahtgazeverschluss in's Brutnest zurück gebracht. Diejenigen Eier entwickeln sich nicht zu Larven, sondern trocknen ein, die nur minuten- bis wenige Stunden lang in den Zellen weilten, bevor sie gegen den directen Zutritt der Bienen abgesperrt wurden.

Versuch V. Ein Volk mit befruchteter, alter oder junger Mutterbiene wird auf lauter Drohnenbau gesetzt (im April, zur Zeit regen Flugs). Eiablage. Nach 10 Tagen Zellen theils flach, theils hochgewölbt bedeckelt. Entwicklung beider Bienenformen in wechselnden Gruppen nebeneinander. Zahl der Drohnen immer geringer. Mitte August nur noch Arbeitsbienen. Anders verläuft der Versuch, wenn er erst gegen Mitte August begonnen wird. Die abgesetzten Eier, selbst Embryonen werden anfangs stets entfernt. Nach einigen Tagen regelmässige Brutpflege u. es entwickeln sich ausschliesslich Arbeitsbienen. Mässige Fütterung zur Fortsetz. der Brutpflege bis zum Spätsommer. Fortnahme der Mutterbienen. Nach 4—10 Tagen neben Nachschaffungszellen für Mutterbienen auch wieder einige, ja bei reichl. vorhand. Larvenmaterial u. Eiern oft viele Dutzende hochgewölbte Zellen sichtbar. Erstere ergeben echte Mutterthiere, letzt. echte Männchen. Demnach Nachzucht von Bienen beiderlei Geschlechts aus den vorhandenen Larven für Arbeitsbienen. — Wurde von Lehrer Heck (Dudenrod) u. Lehrer Henzel (Hirzenbain) mit gleichem Erfolge angestellt mit Kolonien, die sowohl alte, als solche, die junge Mutterbienen besassen.

Versuch VI. Entfernung der Larven aus einer brutbesetzt., einem Normalvolk entnommenen Drohnenwabe. Uebertragung von jungen Larven aus Arbeiterzellen eines tadellosen Volkes in die Zellen. Diese Wabe wird einem entmutterten Volke, ohne offene Brut, eingehängt. Schon nach 4—6 Tagen werden die Zellen theils nieder- u. flach-, theils hochgewölbt u. theils in Mutterzellen umgewandelt, geschlossen sein. Die hochgewölbten ergeben anstatt Arbeitsbienen Drohnen. Dieser Versuch von Dickel u. Mulot (Darmstadt) in grossem Maassstabe gemeinsam ausgeführt. Nach 6 Tg. durch die Art des Zellenverschlusses festgestellt: 17 % Weibchen, 46 % Männchen, 37 % Arbeits-

bienen. 1901 wurden 6 Arbeiterlarven übertragen. Resultat: 1 Mutterzelle, 2 flache, 2 gewölbte geschloss. Zellen. Die 6. Larve war verschwunden.

Versuch VII. Entfernung der Larven. Uebertragung des Futtersaftes aus noch offenen Mutterzellen in beliebige Drohnen- oder Arbeiterzellen einer leeren Wabe u. Einbettung von Larven aus Arbeiterzellen. Einstellen in ein entmuttertes Volk, das selbst schon Nachschaffungszellen über der eigenen Arbeiterbrut angelegt haben darf. Am nächsten Morgen sind (bei geschickter Ausföhrung) alle Zellen zu Mutterzellenanfängen umgeformt. Die Larven werden, je nachdem sie in der breiartigen Masse oder auf der mehr ölartig. Substanz lagern, theils entfernt, theils gepflegt u. liefern echte Mutterbienen.

Versuch VIII. Von den nach Experiment V behandelten Waben füge man nach der Schwarmzeit eine ders. in das Brutnest eines starken Volkes auf lauter Arbeiterzellenbau leer ein. Wird dieselbe von der Mutterbiene mit Eiern besetzt, so entstehen Drohnen u. Arbeitsbienen bunt gemischt auf dieser Drohnenwabe.

Versuch IX. Eine aus Italien bezogene, echt befruchtete Mutterbiene der italien. gelb. Rasse wird im Frühjahr einer deutschen Kolonie dunkler Rasse beigegeben. Die im Laufe des Sommers gezogenen Drohnen zeigen alle die gleiche, den italien. Bienenmännchen eigene Färbung. Die Arbeiterbrut verwende man zur Nachzucht zahlr. jung. Mutterbienen. Es ist das Auftreten von Kreuzungen zu erwarten. Die Untersuchung der im folg. Jahre dadurch entstandenen Drohnen liefert weit auffallendere Färbungsdifferenzen als die von der gleichen Mutter herrührenden Arbeitsbienen, die nur in seltenen Fällen die Färbung der italien. Bienen nicht zeigen. Dieses Experiment ist schon oft mit gleichem Erfolge ausgeführt.

B. Aus den Experimenten gezogene Folgerungen (p. 46—56).

ad Versuch I. Aus unbefruchteten Bieneneiern gehen unter allen Umständen nur u. ausschliesslich männliche Bienenformen hervor. Die Eier sind stets unbefruchtet, weil den Arbeitsbienen das spermaaufnehmende Receptaculum fehlt.

ad Versuch II. Weder Eier noch Larven sind an sich auf ihre Qualität hin durch die Bienen unterscheidbar. Dieses Erkenntnis ist wichtig, denn sie besagt uns erstens: „Der Reizanlass zur Entfernung echter Drohnenbrut im Gegensatz zu der falscher kann nicht gesucht werden in Eigenthümlichkeiten, welche den Eiern durch das Legethier anhaften, sondern nur in solchen, die durch deren Entwicklungsschicksal nach Eintritt in die Aussenwelt bedingt sind. Zweitens: Wäre die befruchtete Mutterbiene fähig, nach Belieben befruchtete oder unbefruchtete Eier absetzen zu können, so müsste ihr gleichzeitig die zweite Fähigkeit zustehen, die Arbeitsbienen in jedem Einzelfall darüber zu informiren, was sie zu thun geruht hat, wenn z. B. in ein u. derselben Zellenform Arbeitsbienen u. Drohnenbrut gemischt neben einander zur Welt kommen, denn wie chemisch nachgewiesen ist, sind zur Heranzucht der dreierlei Bienen-

formen dreierlei chemisch als abweichend von einander erkannte Substanzen erforderlich. Versuch V zeigt, dass Zustände genannter Art in jeder Bienekolonie mit Sicherheit herbeigeführt werden können.

ad Versuch III. Versuch der Beantwortung der Frage: auf welcher Entwicklungsstufe die Geschlechtsdifferenzierung ihren Anfang nimmt. Verf. glaubt festgestellt zu haben, die Geschlechtsdifferenz müsse für männliche Geschlechtstiere, die sich von Anbeginn in Drohnenzellen entwickeln, auf einer früheren Embryonalstufe, also während des Eizustandes schon beginnen. Unterstützung dieser Annahme durch die Thatsache, dass die Arbeitsbienen schon bald nach Besetzung der Zellen mit Eiern diese bekriechen. Die dabei beobacht. zuckende Bewegung des Hinterleibes ist als Absonderungsvorgang zu deuten, der wohl nur auf Beeinflussung des freischwebenden Eipoles gerichtet sein kann.

ad Versuch IV. Nachweis der Beeinflussung der Eier durch die Bienen als wahre Entwicklungsursache derselben. Die bisherige Ansicht, dass das Chorion des Bieneneies für Flüssigkeiten unzugänglich sei, ist falsch. Flach aufliegende Eier entwickeln sich niemals zu Larven.

ad Versuch V. Diente zur Nachprüfung der zur Erhärtung der Dzierzonschen Theorie aufgestellten Behauptung, dass von da ab die Mutterbiene eigentlich erst den Rang einer „Königin“ erhalten würde, die mit wunderbarer Weisheit die Geschlechtsentwicklungsvorgänge durchschaut u. dieselben zum Wohle des Staates ordnet. — Das Entwicklungsabweichende der Arbeiterlarven gegenüber der Originaldrohnenlarve charakterisirt sich dadurch, dass bei der jungen Arbeiterlarve die Entwicklung der Geschlechtsorgane noch unbestimmt oder wenigstens umbildungsfähig sein muss, während die Originaldrohnenlarve ihren Geschlechtscharakter bereits angenommen hat, sobald sie in den Larvenzustand tritt.

ad Versuch VI. Diente zur anderweitigen Erhärtung dieses Schlusses. Uebertragung von Drohneiern normaler Völker in Arbeiterzellen buckelbrütiger Völker; die meisten verschwanden wegen Aufhebung der innigen Verbindung zwischen Ei u. Zellenboden. Trotzdem wurden im Laufe der Jahre gegen 40 Arbeitsbienen, von Hensel sogar Königinnen gezogen.

ad Versuch VII. Liefert nach D.'s Ansicht den schlagendsten Beweis für die Richtigkeit seiner Schlüsse bezüglich der Lösung des Räthsel der Geschlechtsentwicklungsvorgänge im Prinzip. — Bienenwachs in dem noch nie Bienen erbrütet wurden, enthielt Chitin, dasselbe findet sich höchst wahrscheinlich auch in den Absonderungen, welche die Bienen beim Futtern gelegentlich an die Wände von Weinflaschen abgesetzt hatten. Die Erscheinungen, dass unbefruchtete Eier, die in echte Weiselnäpfschen abgesetzt werden, niemals zur Entwicklung gelangen, sowie die des Krankwerdens u. Absterbens so vieler aus unbefruchteten Eiern hervorgehender Larven in Drohnen- u. Arbeiterzellen findet dadurch ihre natürliche Erklärung. D. zieht auf Grund seiner Beobachtungen folg. Schlüsse: Die Entstehung der männlichen Formen ist an den Eikern, die der weiblichen Formen an den Samenkern gebunden und da, wie

Versuch IX lehrt, auch bei den Bienen die Vererbung väterlicher Eigenschaften auf die Söhne stattfindet, so muss bei Auslösung des männlichen Geschlechts eine Substanz in Wirksamkeit treten, die jene Vererbungselemente des Spermas, aus welchem die weiblichen Geschlechtsorgane hervorgehen, am Wachstum verhindert. Nach D.'s Vermuthungen vermögen sich dieselben jedoch durch Theilung zu vermehren, treten als Zellkerne auf irgend welchem Wege in die Zellen des werdenden Individuums ein u. spielen höchst wahrscheinlich beim Aufbau des Organismus eine uns bis jetzt noch unbekanntere Rolle u. s. w.

— VII. Liefert den Beweis dafür, dass hier Geruchsreize im Spiele sein müssen. Wie erklärt die Dzierzon'sche Theorie die Erscheinungen?

Die Ausdrücke Speichel, Bespeichelung, umspeicheln sind nur in Ermangelung sachlich zutreffender Bezeichnungen beibehalten worden. Nach D.'s Behauptung handelt es sich hier wie bei den meisten Uebertragungen von Drüsenabsonderungen durch die Mundwerkzeuge der Bienen, um Geschlechtsacte, deren Vollzug für die Thiere von Lustempfindungen begleitet ist. Besonders bei der Fütterung der Mutterbiene scheint dies der Fall zu sein; diese stirbt schon nach Stunden, auf den besten Futterröthen sitzend. Von Darreichung geläuterten Honigs kann schon aus chemischen Gründen keine Rede sein. Nur diese Annahme macht es begreiflich, warum nach Wegnahme der Mutterbiene u. offenen Brut nach einiger Zeit zahlreiche Arbeitsbienen in Folge der Zufuhr reichlicher Drüsensecret durch ihre Genossen zur Eiablage befähigt werden, Die Arbeitsbienen sind keine Philosophen, die jeder Ausübung geschlechtlicher Acte mit ihren anspornenden Reizen entsagen u. s. w., sondern nach D. echte Thiere, deren fieberhafte Thätigkeit als der Ausdruck ihres regen Geschlechtstriebes in eigenthümlicher Form zu Tage tritt. Vielleicht ist sogar das Sammeln in Form der „Höschchen“ eine Form der Befriedigung des Geschlechtstriebes der Arbeitsbiene. Leuckart äussert sich über die D.'sche Anschauung folgendermaassen: „In der That wäre das die einfachste u. natürlichste Lösung der Schwierigkeiten, besonders jener, die uns die Insekten bisher bereiten.“

Erschienen: Zool. Anz. 20. Bd. 1902 p. 39 sq. Eingegangen: 24. Sept. 1901.

Bienenvolk, ausschliesslich mit Drohnenwaben. **Martynow** ver setzte ein Bienenvolk in einen aus 4 Hofmann'schen Rahmen mit Drohnenwaben bestehenden Stock, wodurch die Königin gezwungen werden sollte, ihre Eier in Drohnenwaben abzulegen. Etwa von den Bienen nun angesetzte Arbeiterzellen wurden ausgeschnitten. Nun begannen die Bienen die Drohnenzellen umzubauen. Es wurden entweder kleine Zellen zwischen den grossen angelegt (1—3 mm tiefe, mit 3- oder 4eckigem oder unregelmässigem Boden) oder die Drohnenzellen wurden durch Verdickung der Wände kleiner gemacht. Aus den unverändert gebliebenen Zellen entwickelten sich Drohnen, aus den verengten meist Drohnen u. wenige Arbeiter von normaler Grösse, aber längeren Zungen als die normalen Bienen. Aus den Zwergzellen wurde die junge Brut einfach hinausgeworfen.

C. Innere Entwicklungsvorgänge.

Metamorphose. Innere Vorgänge bei derselben. **Anglas.**

7. Biologie.

Statistische Angaben.

a) Lebensdauer.

Art des Bienenwesens	Durchschnittl. Lebensalter		Höchstes beobacht. Lebensalter	
	Jahr	Monat	Jahr	Monat
Königin, deutsch.	3—4	—	5	6
„ italien.	2—3	—	—	—
Drohne	—	3	—	10
Arbeitsbiene	—	—	—	10
a) Sommer	—	1½*)	—	—
b) Ruhezeit	—	6—8	—	—

*) Bei starker Tracht nur 2—3 Wch.

b) Bevölkerungsverhältniss. Flug.

Bevölkerungsverhältniss im Bien.
(Ende Mai.) — Nach Prof. Menzel u. s. w.

No.	Objekte der Zählung	Zahl	Ver- hältniss	Zahl	Ver- hältniss
		überhaupt		überhaupt	
1	Eier	—	—	5 400	3
2	Unbedeckte Larven	—	—	9 000	5
3	Bedeckte Thiere	—	—	23 400	13
	a) In Zellen befindliche Brutobjekte	37 800	21	—	—
4	Imbecille	—	—	3 600	2
	b) Brutobjekte überhaupt	41 400	23	—	—
5	Im Stock verweilende Hausbienen	—	—	9 000	5
6	Zeitweise hervorkommende Hausbienen	—	—	19 800	11
	c) Hausbienen im Ganzen: Brutpfleger u. Bauarbeiter	28 800	16	—	—
7	Pollensammler	—	—	9 600	5,33
8	Mischtrachtsammler	—	—	9 600	5,33
9	Honigsammler	—	—	9 600	5,33
	7/8 Pollensammler mit der Hälfte der Mischtrachtsammler	—	—	14 400	8
	8/9 Honigsammler	—	—	14 400	8
	d) Trachtbienen im Ganzen	28 800	16	—	—
	e) Haus- u. Trachtbienen	57 600	32	—	—
	f) Imbecille, Haus- u. Trachtbienen	61 200	34	—	—
	In Zellen befindliche Brutobjekte	99 000	55	—	—
	Frei im Stocke sich beweg. Arbeiter			—	—

Für Völkerteilung etc. wichtig; z. B. Zahl der Eier 2400, die der unbedeck. Larven = x, so $3:5 = 2400:x$. $x = 4000$; etc. — Hierbei Annahme, dass die Königin pro Tag 1800 Eier legt.

Flug der Trachtbienen.
(Zählung am 8. Juni an ein. Stock ohne vorspiel. Bienen.)

Tageszeit	Min.	Zahl			kommen auf 1 Minute		
		der beladen heimkehr. Bienen			mit Honig	mit Pollen	überhaupt
		mit Honig	mit Pollen	überhaupt	mit Honig	mit Pollen	überhaupt
6—7	60	—	6	6	—	0,1	0,1
7—8	60	8	460	468	0,13	7,6	7,8
8—9	60	59	1 297	1 356	0,9	21,6	22,6
9—10	60	186	3 896	4 082	3,1	64,9	68,03
10—11	60	208	7 410	7 618	3,4	123,5	126,9
11—12	60	1 936	9 345	11 281	32,2	155,7	188,01
12—1	60	4 148	8 106	12 254	69,1	135,1	204,2
1—2	60	6 980	5 424	12 404	116,3	90,4	206,7
2—3	60	9 840	3 187	13 027	164,0	53,1	217,1
3—4	60	9 859	1 391	11 250	164,3	23,1	187,5
4—5	60	8 439	432	8 871	140,6	7,1	147,8
5—6	60	5 948	209	6 157	99,1	3,4	102,6
6—7	60	973	65	1 038	16,2	1,08	17,3
7—8	60	36	8	44	0,6	0,13	0,73
14 Std.	840	48 620	41 236	89 856	57,8	49,09	106,97

c) Bau.

Gestalt der Zellen.

Kaiser sprach über die Gestalt der Bienenzellen. Jahrb. d. Nassauisch. Ver. f. Naturk. 54. Jhg. Ber. über wissensch. Abendunterhalt. p. XLIV—XLV.

Die bekannte Form, welche die Bienen ihren Zellen geben, ist nach mathem. Gesetzen die einzig mögliche, wenn Sparsamkeit im Verbrauch von Arbeit u. Material als oberster Grundsatz gelten. Rings um einen Punkt lassen sich nur gleichseit. Dreiecke, Quadrate, regelmäss. Sechsecke so anordnen, dass kein freier Raum bleibt. Der sechseckige Bau ist der vorteilhafteste. In der von der Decke herabhängenden Doppelwabe liegen die Zellen horizontal, nach beiden Seiten hin offen, nach der Zwischenwand zu geschlossen. Dieser Abschluss wird aber nicht durch ein ebenes Sechseck, sondern durch drei in einer stumpfen Ecke zusammenstossenden Rhomben gebildet. Die Zwischenwand ist demnach keine Ebene, sondern eine gebrochene Fläche mit ein- u. ausspring. dreiseitig. körperl. Ecken. Der rhomboëdrische Schluss gewährt gegenüber einem Deckel den Vortheil, dass bei gleichem Rauminhalt die Gesamtfläche der Zelle ein Minimum, der Wachsverbrauch u. Arbeitsaufwand so klein wie möglich ist. Die Rhomben einer Ecke zeigen interessante geometrische Verhältnisse; ihre Winkel sind gleich den Flächenwinkeln des regul. Oktaëders u. Tetraëders, die Neigungswinkel der Ecke betragen 120° u. die Ecken der Bienenzelle entsprechen denen des Granatoëders (Rhombendodekaëder) etc. Die Bienen verstehen sich auf mathem. Dinge sehr wohl u. es ist fraglich ob man zwischen diesen mathem. Instinkt von *Apis mellifica* u. dem mathem. Verstand von *homo sapiens* einen grundsätzl. Unterschied machen darf (!).

d) Maasse u. Gewichte.

I. Längenmaasse des Bienenbaues.

No.	Gegenstand der Messung	mm
a) Zellen.		
1	Wachsschüppchen der Arbeitsbiene	
	lang	2,25
	breit	1,5
2	Tiefe der Arbeiter-Brutzelle bis zur Wabenmitte	11,5
3	" " " " " " " Zellenbasis	12,5
4	Weite der Arbeiter-Zelle von Wand zu Wand	5,15625
5	Durchmesser der Arbeiterzelle von Ecke zu Ecke	5,5938
6	Weite der Drohnenzelle von Seite zu Seite	6,874998
7	" " " " " " " Ecke zu Ecke	7,9386
8	Länge der bedeckelten Weiselzelle	19—24
9	Länge ihres Raumes vom Grunde aus bis zur Mündung . .	16—21
10	Grösster Lichtendurchmesser der Weiselzelle	6,5—9,2
11	Durchmesser ihrer Mündung	4,8—5,6
12	Ring ihrer Oeffnung im Durchschnitt	16,378
b) Waben.		
13	Halbe Dicke der Arbeiterwabe	11,5
14	Ganze Dicke	23,0
15	Abstand der Mittelwand (Mitte) von Mittelwand	34,5
16	Normaler (kleiner) Durchmesser der Wabengasse	11,5
17	Abstand der Waben vom Bodenbrett	14—18

II. Flächenmaasse des Bienenbaues.

No.	Fläche	□ cm
1	Querschnitt der Arbeiterzelle	0,2302446
2	Gesamtoberfläche der Zellenwände	1,9598610
3	Es kommen zu beiden Seiten der Mittelwand 8,6862 Arbeiterzellen auf	1,0
4	Eine Wabe von 5343 Zellen (25 cm l., 20 cm hoch)	500,0
5	Querschnitt der Drohnenzelle	0,4093339
6	Es kommen 4,2341 Drohnenzellen zu beiden Seiten der Mittelwand auf	1,0

Körpermaasse des Bienenbaues.

No.	R a u m	cbcm
	a) Kubikinhalte der Zellenwandungen u. Hohlräume.	
1	Inhalt einer Arbeiterzelle	0,2647
2	Inhalt eines □cm Arbeiterwabe	229,9237
	b) Kubikinhalte der Wachsmasse der Wandungen.	
3	Bei der einzelnen Arbeiterzelle	0,000620
4	Bei dem □cm	0,05389
	c) Raumcapacität.	
5	Der einzelnen Arbeiterzelle	0,2641
6	1 □dm Wabe	229,94041

III. Gewichtsverhältnisse.

Gewichte des Wachses und Wachsbaues.

Spec. Gew. des Wachses = 0,97

No.	G e g e n s t ä n d e	mmg
1	Die 4 Paare Wachsschuppen der Arbeitsbiene	1,48
2	Ein einzelnes Wachsschüppchen	0,185
3	Die Wachsmasse einer Arbeiterzelle	6,3964
	Die Wachsmasse aller Wandungen einer einzeln. Zelle	10,5
4	Wachsmasse des Deckels der Arbeiterzelle	0,76
	1 Nymphenhäutchen einer Arbeiternymphe	1,7
5	5000 Arbeiterzellen	31981,5
6	5000 Wachsdeckel	3800,0
7	5000 Arbeiterzellen, einmal bebrütet	12300,0

Gewichte des Honigs und Pollens.

Spec. Gew. des Honigs zw. 1,415 u 1,440. Mittel 1,427.

No	G e g e n s t ä n d e.	mmg
	a) Honig.	
1	Der Honig in der Honigblase einer heimkehrenden Biene .	62,1274
	Eine mit Honig beladene heimkehrende Biene	166,6274
2	Der Honig einer Arbeiterzelle (Honigmenge von 5—6 Trachtausflügen)	367,95
	b) Pollen.	
3	Eine Pollenladung wiegt im Durchschnitt	26,03125
4	18 Pollenladungen als Füllmasse einer Arbeiterzelle bis 2 mm unter dem Zellenrand	468,56250

8. Physiologie.

Muskelkraft der Arbeitsbiene (nach Plateau).

H = Hebekraft; T = Tragkraft.

A r t	Zahl der geprüften Thiere bei		Mittl. Gewicht der Thiere in g bei		Höchste gehobene Gewichte in g bei		Mittlere Verhältnisszahl bei		Höchste bei einem Thiere beobachtete Verhältnisszahl bei	
	H	T	H	T	H	T	H	T	H	T
Erdhummel Bombus terrestris , . . .	6	9	0,194	0,873	3,125	0,691	16,108	0,7915	22,0	1,17
Honigbiene Apis mellifica	6	9	0,087	0,155	1,760	0,157	20,229	1,0129	24,9	1,62

b) Säure. Vorkommen derselben bei Bienen. Ludwig.

Bisher wurde bei allen, die Säure bei den Bienen betreffenden, Forschungen nur die Ameisensäure in Betracht gezogen. Lehrer Ph. Reidenbach (Herausgeber der „Pfälzer Bienenzucht“), fand in den alten mehrjährigen Bienenwaben Weinsäure. Reaktion: das in die Zellen gegossene Wasser ist nach 24 Std. stark sauer u. eingegossene Lakmuspinktur rot. Methode der Darstellung der reinen Weinsäure u. Reaktionen. Gewinnung der Weinsäure aus frischem Brutfutter und zwar darin 3,9 %. Wässriger Extrakt von 5800 Bienenköpfen zeigte gekocht nur Spuren von Säure, wahrscheinlich Essigsäure. Der Rückstand enthielt reichlich Weinsäure. Das Vorkommen von Weinsäure in den Speicheldrüsen der Bienen, überhaupt im Thierkörper war bisher nicht bekannt. — Ein 45 gr altes Wabenstück lieferte 0,15 gr reine Säure.

Der Erzeugungsort der Ameisensäure im Bienenstaat sind nicht die Bienen, sondern die Brutwaben. Unter Vorsichtsmaassregeln in den Bienenklumpen gebrachtes Lakmuspapier bleibt blau, während der Nacht vor das Flugloch gebracht, färbt es sich stark roth. Diesbezügliche Versuche. Lakmuspapier in nicht bebrüteten Waben blieb dauernd blau, in bebrüteten wurde es über Nacht tiefroth. Sie soll sich in den Nymphenhäutchen, dem Kokon, dem Gespinnst der Larve finden und wurde von R. auch im Gewebe der Spinnen wie in den Waben der Hummeln nachgewiesen. Man geht jedoch wohl nicht fehl, wenn man sie überhaupt als Oxydationsprodukt bei den Ernährungs- u. Wachstumsvorgängen der Bienen u. anderer Insektenbrut betrachtet, wahrscheinlich in Folge der Oxydation der Weinsäure. Desinfizierende Wirkung.

Die Qualität der von Bertrand empfohlenen Menge Ameisensäure zur Conservirung des Honigs entspricht der im Buchweizen-Honig enthaltenen Menge.

c) Längenmaasse der Biene in ihren verschiedenen Entwicklungszuständen vom Ei bis zum flugfähigen Insekt.

No.	Gegenstände der Messung	Länge in mm			Normal- breite in mm	Flugbreite in mm		Gewichte durchschn. von 50, resp. 5 u. 2 Objekt. in mmg
		kleine	mittl.	grosse		kleine	normale	
1	Das Bienenei	—	—	1,2	0,20	—	—	0,165
2	Die eben ausgeschlüpfte Larve	—	—	1,0	0,18	—	—	0,135
3	Die ausgewachsene Larve							
	a) Arbeiterlarve ¹⁾	8,5	11,8	13,2	3,80	—	—	h=75. a =150.
	a) Königl. Larve	8,6	12,9	14,5	4,12	—	—	h=150. a =300.
	c) Drohnenlarve	10,0	14,0	15,6	4,52	—	—	h=180. a =360.
4	Die Nymphe							
	a) Arbeiternymphe	7,9	11,0	11,6	—	—	—	²⁾ =128,5. ³⁾ =126.
	b) Königl. Nymphe	7,2	11,4	12,5	—	—	—	—
	c) Drohnennymphe	8,5	12,4	13,5	—	—	—	—
5	Ausgeschlüpfte Bienen- wesen							
	a) Arbeitsbiene	8,0	11,4	12,6	—	—	—	107,5
	b) Königin	9,4	11,9	12,5	—	—	—	146,0
	c) Drohne	10,0	14,0	15,6	—	—	—	216,0
6	Flugfähige Bienenwesen							
	a) Arbeitsbiene	8,5	11,8	13,5	—	20,0	23,6	104,5 †)
	b) Königin	10,0	14,8	16,5	—	21,0	24,5	—
	c) Drohne	12,0	16,0	18,1	—	25,5	29,5	200

a = ausgewachsen. h = halbausgewachsen. † = vom Ausflug an, längere Zeit von der Reinigung zurückgehalten = 122.

d) Gewichts-Abnahme u Zunahme der Brut und der Biene.

No.	Objekte.	Ab- nahme mmg	Zu- nahme mmg
1	Vom Ei bis zur eben ausgeschlüpfen Larve	0,03	—
2	Von der eben ausgeschlüpf. Arbeiterlarve bis zur erwachs.	—	149,865
3	Von der eben ausgeschl. königl. Larve bis zur ausgewachs	—	299,865
4	Von der eben ausgeschl. Drohnenlarve bis zur ausgewachs.	—	359,865
5	Von der ausgewachs. Arbeiterlarve bis zur reifen Nymphe	24,0	—
6	Von der reifen Nymphe bis zur sammelnden Arbeitsbiene	21,5	—
7	Arbeitsbiene vom Ausschlüpfen bis zur Selbständigkeit	3,0	—
8	Auswurf bei der Reinigung der jungen Arbeitsbiene . .	17,5	—
9	Von der ausgewachs. Drohnenlarve bis zur eben aus- geschl. Drohne	144,0	—
10	Von der eben ausgeschl. Drohne bis zur flieg. Drohne, die in den Stock zurückkehrt	16,0	—
11	Vom Tode d. Arbeitsbiene bis zur lufttrocken verdunsteten	58,2	—

¹⁾ eingesponnene Arb.-Larve = 132. ²⁾ kurz nach Verwandl., ³⁾ vor dem Ausschl.

e) Warum es im Bienenstock dunkel sein muss. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 364–365. — Der bei Tage gesammelte Honig würde unter dem Einfluss des Sonnenlichtes bald crystallisiren. Darum suchen schon die Bienen selbst das Eindringen der Strahlen zu hindern, was ihnen durch Glasfenster sehr erschwert wird. — Da ferner die Lebensfähigkeit der jungen Bienen ganz allein von der flüssigen Beschaffenheit der ihnen gereichten Zuckernahrung abhängt, so würde aller Wahrscheinlichkeit nach der Zutritt des Sonnenlichtes in den Stock für das Leben der Bewohner sehr verhängnissvoll werden. Glasscheiben sind deshalb am Stock wegzulassen oder so zu wählen, dass nur sehr gedämpftes Licht hindurch kann.

f) Orientirungssinn.

Die Biene u. die schwarze Farbe. Nach den Mittheilungen des American Bee Journal 1901 besitzen die Bienen eine ausgesprochene Abneigung gegen die schwarze Farbe. Schwarzgekleidete Personen, schwarze Pferde, schwarze Hühner werden häufiger verfolgt als helle. Weiße Filzhüte von schwarzer Farbe weisen häufig ausgerissene Bienenstachel auf. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 372.

9. Krankheiten, Schädlinge, Parasiten, Feinde.

a) Behandlung weisellos drohnenbrütiger Völker. 2 Methoden, angegeb. auf der 45. Wanderversammlung nach Kalend. d. deutsch. Bienenfr. f. 1902 p. 154. — I. Betäubung mittelst Salpeterlunten u. Holz im Schmoker. Zusatz der Königin, die stets angenommen wird. — II. Zuführung junger Bienen. Zuhängen einiger Brutwaben mit offener Brut u. möglichst viel jungen Bienen ohne Königin. Nach 24 Std. Zusatz einer Königin. — Im Herbst werden solche Völker am besten abgeschafft.

b) Faulbrut. **Gale (4)**, und **Alberti** ferner

Harrison, Francis C. The Foul Broud of Bees. *Bacillus alvei* (Cheshire and W. Cheyne). With 4 figs. Centralbl. f. Bakter., Paras. u. Infektionskr. 2. Abth. VI. Bd. 1900 p. 421–427, 457–469, 481–496, 513–517.

Historisches Résumé (25 Autoren) (p. 421–425.) — Symptome (p. 425–427). — Abgestorbene Brut (p. 427). Dieselbe wurde öfter mit der Faulbrut verwechselt. In ersterem Falle werden die Larven erst grau, dann dunkler u. schwarz. Zähne Fadenbildung findet nicht statt. — Geographische Verbreitung (p. 457–458). — Der Organismus (p. 458–459): *Bacillus alvei*. Morphologische Charaktere: Färbung, Geißeln, Sporenbildung, Keimung der Sporen, Polymorphismus, abnorme Formen (Abb. Fig. 1–4 p. 460 u. 461). — Biologische Charaktere (p. 459–466). Die verschiedenen Nährkulturen. Sonstiges Verhalten. — Verhalten zur Wärme (p. 466–469): Maxim.: (40–50 ° C.) 47 ° C.; Optim.: 37,5 ° C.; Minim.: 16 ° C. — Versuche über den tödtlichen Wärmepunkt. Resultate: Sporen aus 7 Monate alten Kulturen in Bouillon starben bei 100 ° C. nach 1 Std. 20 Min. — 2. Sporen aus 2½ Monate alten Kult. auf Agar nach 2½ Std. — 3. Sporen auf 9 Tg. alt. Agar leicht. Wachstum nach 2 Std. 45 Min., nach 3 Std. kein Wachstum. — 4. Sporen 14 u. 21 Tg. alt nach dreistündig. Kochen tot. — Weitere diesbezügl. Versuche. — Lebensfähigkeit auf verschiedenen Medien (p. 481–483). — Oekonomische Betrachtungen (p. 483

—485). — Art der Infektion. Verbreitung. Prädisposition der verschiedenen Rassen. Nach **Quinby** u. **Aspinall** werden die schwarzen Bienen leichter als die italien. infiziert, de **Layens** ist umgekehrter Ansicht. — Heilmittel (p. 485—496, 513—515).

3 Methoden: 1. The Stamping out System, radikale Vernichtung von Bienen, Brut u. Bau. Desinfektion der Kästen. — 2. The Starving method, Hungermethode. Ueberführung in reine Bauten etc. — 3. Behandlung mit chemischen Agentien: Carbonsäure. Salycylsäure, Salycylsäure-Dämpfe, Camphor, Thymian, Thymol, Carbonsäure u. Theer, Creolin u. Phenyl u. antiseptische Wirkung ders., antisept. Wirkung des Creolins, Eucalyptus, Naphthol beta, Naphthalin, Ameisensäure (p. 485—496). — (Forts.): Ameisensäure, Schwefelsäure, Sulfaminol u. versch. Combinationen vorhergenannter Stoffe. Verschied. Drogen (p. 513—515). — Ansteckung (p. 515). — Fütterung (alle 3 Tg. 3 Wochen lang) von *Bac. alv.* — Kulturen in Syrup. Nach 3 Wochen hatte der Stock die Faulbrut. — Litteratur (p. 516—517) (80 Publ.) — Gesetzgebung (p. 515—516). In den Vereinigten Staaten haben 6 Staaten Gesetze zur Urterdrückung der Faulbrut: New York, Wisconsin, Michigan, Utah, Colorado u. Californien. In Canada hat die Provinz Ontario u. in Europa Mecklenburg solche. Die Statuten sind sehr verschied. u. einige so beschaffen, dass eine Umgehung des Gesetzes leicht möglich ist. Die besten hat wohl Wisconsin. Die wichtigsten Punkte sind: 1. Ernennung eines Inspektors. 2. Besichtigung aller als verseucht gemeldeten Stücke, Instruktionen zur Behandlung derselben. 3. Der Inspektor hat auf einem zweiten Besuch die Verbrennung aller nicht geheilten Stücke anzuordnen. 4. Verschiedene Geldstrafen, im Rückfall Freiheitsstrafen, beim Verkauf oder Weggabe kranker Stücke, Verkauf von Bienen nach Behandl. oder Aussetzung ansteckender Mittel, bei Widersetzlichkeit gegen Aufsichtsbeamte. 5. Anmeldepflicht. 6. Jährl. Bericht des Aufsichtsbeamten über Zeit, Ort etc. des Auftretens der Faulbrut.

c) Sonstige Krankheiten: **Alberti**.

d) Bienenfeinde, **Alberti**. — neuer: *Phyllotocus macleayi*. **Giard**.

10. Stich. Gift.

Langer, J., hat in der Deutsch. illustr. Bienenzeitung über das Bienengift berichtet. Ausz. in **Krancher**, Kal. des Deutsch. Bienenfr. f. 1902 p. 110.

Untersuchung der Giftdrüse von etwa 25000 Bienen: klare Flüssigkeit, leicht in Wasser löslich, bitter. Geschmack, angenehm. Aroma. Dieser leicht flüssige Stoff kann das Gift nicht sein. Auch die deutl. sauer reagir. Ameisensäure ist sehr flüchtig. Der Drüseninhalt bewahrt seine giftig. Eigenschaften auch wenn er getrocknet u. erhitzt worden ist. Das eigentl. Gift ist wahrsch. ein Alkaloid, eine pflanzl. Basis. Auf die unverletzte Haut gebracht, übt es keine Wirkung aus. Unter die Haut gespritzt, treten die bekannten Erscheinungen ein; in grössere Blutbahnen gebracht, bewirkt es Störung des Allgemeinbefindens; Wirkung ähnlich der des Schlangengiftes.

Bienenstich als Volksheilmittel. **Sajo**.

Der Bienenstachel ist bisher so oft in der verschiedensten Weise aufgefasst, aber nach **Sajo's** Ansicht noch immer nicht in einer zufriedenstellenden.

Um zu einer richtigen Auffass. des Bienenstachels zu gelangen, darf man nicht bei der Honigbiene stehen bleiben. Ein Stechapparat mit Widerhaken ist ein sehr schlechter Stechapparat, wenn er mit dem Körper des stechenden Individuums organisch zusammenhängt. Ein wirklich zum Stechen eingerichteter Stachel muss glatt sein. Auf 40—50000 Arbeiterindividuen kommen in der Regel kaum 20—30 in die Lage zu stechen. Für diese wenigen Individuen wird ihr Stachel die Ursache ihres Verderbens, aber für die Art selbst ist der Stachel, den nur wenige zum Angriff gebrauchen, vom grössten Nutzen. Und im Kampfe um's Dasein ist immer das Interesse der Erhaltung der Art der regierende u. massgebende Factor, wenn dabei auch einige Einzelthiere in Gefahr kommen sollten. Es ist nicht unmöglich, dass hie u. da Rückgänge in der Ausbildung des Stachels stattgefunden haben u. dass solche Bienenarten bei uns zu Grunde gegangen sind. — Stachellose Bienen (Meliponen) in Brasil. u. auf den Inseln tropischer Meere. Sie beißen dafür tüchtig.

Entwicklung des Stachelapparates mit Widerhaken. Die Apiarier sind erst später aufgetretene Formen. Die Mordwaffe war ursprünglich nur den Mordinsekten eigen u. ist bei diesen (Crabronidae) auch glatt. Schilderung des Vorganges, wie die Immen aus den Mordimmen ihren Ursprung nahmen. Abstammung der pollensammelnden Stachelinsekten. Beispiele für die Scharfsinnigkeit u. Modificationsfähigkeit der Bienen. Beispiele aus Preuss: Zweifel der Bienen in Bezug auf Tragfähigkeit der Wabenträger. Plündern schwacher Völker; Angreifen von Obst. Finanzielle Spekulationen mancher Menschen auf die Erfindungsgabe der Bienen. In den siebziger u. achtziger Jahren wurde in Paris Raubbienenzucht in der Nähe der Zuckerraffinerien getrieben. Schaden des Besitzers der grösst. Raffin. des XII. Arrondissements in einem Jahre 25000 Fr. Eine Verordn. d. Polizeipräfekten am 10. Jan. 1882 schaffte radicale Hilfe. Gleiches ereignete sich zu Nantes. Hier schaffte das Anbringen schmalmaschiger Gitter an allen Oeffnungen Abhilfe. Die „Zuckerraub-Imkereien“ schwanden rapide. 1880 waren v. 300 Stücken kaum noch 10 vorhanden.

Die Insekten (natürlich einzelne bevorzugte Individuen) sind also sicherlich zu Neuerungen fähig. p. 115. Welche Bedeutung für den Naturhaushalt hat die Entstehung solcher Stachelimmen, welche in Folge fehlerhafter Stachelformation ihre Brut mit vegetabilischer Kost versahen? Ungeheurer Einfluss auf die Entwicklung der Phanerogamen, Blumen- und Obstgärtnerei (etc.) und Imkerei. — Nicht alle Immen mit Widerhakenstacheln wurden zu Blumenimmen, einige Gruppen wurden zu Parasiten. Die Neigung zum Stechen ist bei den Blütenstaubsammelnden Bienen zurückgegangen u. erwacht nur im Jähzorn u. Uebermüthe, bei vielen einsam lebenden nur in Fällen extremster Erregung. Man kann sagen, dass die Blütenstaubsammler zu ihren Ahnen, den Mordwespen, in demselb. Verhältnis stehen wie bei den Menschen die Völker, welche Ackerbau treiben, zu denen, welche nur von der Jagd oder vom Raub leben. Die auf die Descendenztheorie begründete heutige Naturanschauung beweist uns, dass in den Verrichtungen und Erscheinungen jeglicher Art. also auch in den psychologischen u. in den gesellschaftlichen, bei Thieren u. Menschen dieselben Grundgesetze zur Geltung kommen, u. dass zwischen menschlichen u. thierischen Erscheinungen u. Aeusserungen kein wesentlicher, sondern nur ein quantitativer Unterschied herrscht. — Versuche (12) mit dem Bienenstich, die Verf. an sich selbst anstellte. Sie zeigen, dass das Abreissen des Stachels der Honigbiene

die Regel ist, weil unter 6 Stichen in die menschliche Haut nur einer vorkam, in welchem sich die Biene befreite. — Bienenstich als Volksheilmittel. Als Specificum gegen rheumatische Leiden u. Lähmungen. — 1. Fernand la Vingeanne (1870/71), ferner in Entom. Nachr. (1878), Terc in Marburg (1888). Injektion von Ameisensäure seitens der Aerzte half nichts. Die Thiere bilden 2 Stoffe in 2 abgesonderten Drüsen. Die eine Flüssigkeit ist Ameisensäure (besitzt allein nicht die energische Wirkung), die andere ein Alkaloid.

Künstliche Zusammenstellung ist zwecklos, da Bienen überall zu haben sind. Anwendung: im Tüllsäckchen an die betreff. Stelle zu setzen. Immen mit widerhakigem Giftstachel machen den Eindruck einer widersinnigen Vorkehrung, nur die gegebenen Erklärungen lassen das Räthsel lösen. Die Stachel waren ursprünglich keine Schutz Waffen, sondern dienten nur zur Erbeutung der Nahrung für die Brut. Die Männchen haben keine Stachel.

11. Zucht.

Lehrbücher etc.: Alberti, Ciesielskii, Gale (Kalender etc.).

Bienenzucht für Frauen: Gale (5).

Monats-Arbeiten des Bienenzüchters von Hemman, P., Limbach, in Krancher's Bienenkalender f. 1902 p. 2 sq.—66(—68).

Atlas für Bienenzucht (cf. p. 293 dies. Berichts).

Beutekiefern Westpreussens etc.: Klinge.

Huck, Friedrich. Die Bienenzucht als Beruf. t. c. p. 92—96.

Wehrmann giebt in seiner Arbeit: „Wodurch kann der Mobilbau dem Anfänger verleidet werden?“ (in Bienenwirtsch. Centralbl.) nach Krancher's Kal. des d. Bienenfr. f. 1902 p. 157 folg. sehr wichtige Lehren für Anfänger:

1. Anschaffung ordentlicher Wohnungen nach einer Musterbeute Weglassen aller Verbesserungen u. Vereinfachungen (wenigst. die ersten 6 Jahre). Wähle nur Wohnungen, die schnelle Behandlung neben guter Entwicklung der Völker verbürgen.
2. Lerne die Eigenthümlichkeiten der Bienen kennen. Sie bauen keine guten Waben vor dem Schwärmen oder zur Zeit der Weiserlosigkeit oder während des Vorhandenseins einer unbefruchteten Königin im Stock. Es bauen dagegen und gestatten das Verwenden leerer Rähmchen: Schwärme u. bei guter Tracht auch wieder richtig beweiselte Mutterstöcke.
3. Wende Kunstwaben an, des Nutzens u. Vortheils wegen, wie die Berechnung zeigt.

Fütterung. Förderung der Brut.

Fütterung: Braun.

Spekulationsfütterung. Rathschläge für dieselbe. Schweiz. Bienenzeitung. Wiedergabe: Kal. d. deutsch. Bienenfr. f. 1902 p. 144.

Wer im Frühjahr den Brutansatz durch Reizfütterung zu fördern gedenkt, der merke sich: der gehoffte Erfolg bleibt aus a) bei Mangel an Pollen, b) bei Mangel an Vorräthen, c) bei geringer Königin u. schwachem Volk. — Bei schlechtem Wetter ist zu tränken.

Schmiedeknecht, K. H. Beförderung der Brut vor der Haupttracht. t. c. p. 118—122.

Fütterung mit dünnflüssig. Honig ($\frac{2}{5}$ Wasser); pro Volk 3—4 Pfd. mit Wasser verdünnt. Honig in 2—3 täg. Zwischenräumen je 1 Pfd. Die Lüneburger Imker sind in der spekulativ. Fütterung Meister; sie beginnen damit, sobald die Eiche ausschlägt. Beschr. d. Verfahrens. Beim Mobilbau reicht man am besten Honigwaben Candis ersetzt den Zucker. Auf 4 Pfd. Candis 4 Pfd. Wasser. — Aufgelöster Rohrzucker, eingedickte Bierwürze, Pollenersatz durch Getreidemehl (Weizenmehl vor d. Roggenmehl; am besten u. liebsten, weil am süssesten, Hafermehl). — Mehl trocken, nicht feucht, sonst entsteht leicht Faulbrut. Als Treibfutter alter Buchweizenhonig. Gegohrener Stampfhonig zeigt schwärzlich aus, riecht säuerlich, macht die Bienen stechlustig, die Königin legt viel Eier. — Am erfolgreichsten ist die spekulative Fütterung bei warmem Wetter.

Schwärme.

Kunstschwarmbildung. **Alfonsus.**

Woran erkennt man reife Weiselzellen? Krancher's Kal. d. deutsch.

Bienenfr. f. 1902 p. 91.

1. Spitze ders. bräunlich, lederartig, durchscheinend.
2. Lichtprobe (die Spitze gegen die Sonne zeigt die sich bewegende Königin).
3. Gehörprobe (nagt am Zelldeckel).
4. Berührung mit der Fingerspitze verrät Bewegung der Königin.

Bei trübem Wetter lehrt die herausgeschnitt. u. mit der Spitze in den Gehörgang gesteckte Zelle bei anhaltendem Nagen, dass die Zelle noch nicht reif ist.

Das Einfangen der Schwärme. t. c. p. 96 (nach Tobisch im Bienenvater aus Böhmen). — Ruhiges, bedächtiges Handeln, gegen das Durchgehen hilft eine kleine kalte Douche.

Rabes, H. Das Einfangen der Schwärme. Kal. des deutsch. Bienenfr. 1902. p. 111—114. — Viele neue diesbezw. Fangapparate sind nicht Schwarmsicherer, sondern Schwarmverderber, keine Schwarmfänger, sondern Schwarmvertreiber. Verf. benutzt zum Einfangen einen alten, abgesetzten grösseren Emailletopf mit pass. Blechdeckel oder ein einfach. Kasten aus schwachen, leicht. Pappelbrettern, oben breit, unten eng, beiderseits durch Deckel verschliessbar. Art u. Weise der Anwendung siehe im Original. In einer Hecke festgesetzt sind die im Wege stehenden Aeste zu entfernen und der dickste Klumpen (der gewöhnl. die Königin enthält) auszulöffeln.

Schwarmverhinderung (nach Buchholz in der Leipziger Bienenzeitung) Krancher's Bienenk. f. 1902 p. 114.

1. Imkere in genügend grosser Beute (Mobilstock).
2. Bringe mindestens 2 Fluglöcher bei deiner Beute an, eins am Boden, das andere im Honigraume.
3. Arbeite deine Kästen nicht zu dünnwandig.
4. Erweitere im Frühjahr nach und nach den Brutraum.
5. Schränke bei Beginn der Volltracht die Eierlage ein.

6. Schleudere, sobald es nothwendig ist.
7. Lasse wenig Drohnenwachs bauen.
8. Wende fleissig Kunstwaben an.
9. Halte keine schwarmlustigen Rassen.
10. Theile zur Schwarmzeit die untere Etage durch ein senkrechtcs, mit Gitter versehenes Schied, placire die Königin links, so dass sie weder nach oben, noch nach rechts entweichen, also auch nicht ausschwärmen kann, oder bringe um diese Zeit ein etwa 1 qm (?) grosses Absperrgitter vor dem Flugloch an.

Königinnenzucht.

Kuchenmüller, Max. Königinnenzucht u. Schwarmverhinderung. t. c. p. 145—150. Mit verschied. Abb., Zuchtkäfige u. s. w. darstellend.

Methode. Schwarmverhinderung. Hauptbedingungen: Genügend grosse Beuten, Züchtung von nicht schwarmlustigen Völkern. Erweitere, immer Schritt haltend mit der Volksentwicklung. Zuerst durch Einstellen guter Arbeitswaben, dann durch Umlängen der Völker in den Honigraum, wobei die Königin im Brutraum verbleiben muss. Zuletzt durch Beigabe von Mittelwänden u. schliesslich Entziehung von Brutwaben. Das Wann richtet sich nach Tracht- u. Witterungsverhältnissen.

Lehrbücher.

Von den zahlreichen Werken (siehe Litteratur) seien hier wegen der neuen Stockformen erwähnt. **Alberti** (Blätterstock) u. **Schulz** (Meisterstock).

Alberti. Die Bienenzucht im Blätterstock.

Einleitung: Bedeutung der Bienenzucht u. Winke für Anfänger (p. 1—4). Die durch die veränderten Kultur-Bedingungen veränderten Trachtverhältnisse erfordern rationelle Zucht. Sogenannte Verbesserungen bedürfen genauer Prüfung, gereifter Erfahrung und Kenntnis der gesammten umfangreichen bienenwirthschaftlichen Litteratur.

Es kann im Folgenden unmöglich auf die reichhaltigen Details eingegangen werden. Einen Ueberblick über die Fülle des Materials ersehen wir aus der Aufzählung der einzelnen Kapitel.

A. Das Bienenleben (p. 5—57). Die Haus- oder Honigbiene (*Apis mellifica*).

I. Das Bienenvolk als Gesamtwesen oder der Bien (p. 6—10).
 a) Allgemeines. Die zum Fortbestehen des Ganzen nötige Wärme beträgt im Winter mindestens 10° C. und zur Brutzeit ca. 30° C. Bei einer Aussen-temperatur von unter $+10^{\circ}$ C. kann sich die Biene nur auf kurze Zeit vom Stocke entfernen, andernfalls erstarret sie. Zur Tracht ist eine höhere Temperatur erforderlich. — b) Nahrung. — c) Fortpflanzung (Schwarmbildung, Vorschwärmen etc.).

II. Die dreierlei Bienenwesen (p. 11—25). Vorbemerkungen (Fig. 1 ♀, 2 ♂, 3 ♂). Dickel's Theorie: Die Königin legt nur einerlei Eier, in denen die Anlage zu beiden Geschlechtern gleichsam indifferent vorhanden ist. Die Arbeitsbienen „lösen“ erst durch entsprechendes Belegen der Eier das betreffende Geschlecht, je nach Bedarf aus. — 1. Die Königin. Körperbeschreibung und

Geschlecht (Querschnitt durch Abdom. Fig. 4). Erbrütung; Weiselzellen. Befruchtung der Königin. Eierlage. Königinnenwechsel. — 2. Die Drohnen (Abb. Samenstock der Drohne Fig. 5). — 3. Die Arbeitsbienen (Abb. Kopf Fig. 6, Saugvorrichtung Fig. 7 (beides vergrößert)).

III. Thätigkeit der Arbeitsbienen (p. 26—34). 1. Das Wachsbereiten u. Bauen (Abb. Fig. 7 wachsschwitzende Biene). Zur Wachsbildung mindest. 25° C. nöthig (Fig. 8, 9 verschied. Zellformen). — 2. Die Honigbereitung, Honigpflanzen, Honigsorten, Honigtau. Echter Honigtau ist nach zahlr. Beobacht. u. Untersuchungen des Verfassers eine direkte Ausscheidung der Pflanze u. nicht Blattlaussekrement. Er sitzt meistens als krystallhelle Bläschen an der Unterseite der Blätter u. an den Rändern, selten auf die Oberseite der darunt. liegend. Blätter herabtropfend. Blattlausauscheidungen werden auf die Oberseite der Blätter ausgespritzt u. liegen dort in breiter, flacher Form. Honigtau wird von den Bienen gierig geleckt, vor Blattlausauscheidung weichen sie zurück. — 3. Das Polleneintragen. — 4. Pflege der Brut. — 5. Andere Thätigkeiten der Arbeitsbienen: a) das Wasserholen, b) Reinigen u. Verkitten der Wohnung. Italienische Bienen verkitten weit mehr als deutsche, c) Wache halten, d) Luftfächeln.

IV. Verschiedenes aus dem Bienenleben (p. 35—42). 1. Sinne u. Sprache der Biene. Das Studium der Sprache der B. gehört mit zu dem Interessantesten im Bienenleben u. ist zugleich von grossem Nutzen für den Züchter. — 2. Reinigungsausflug u. Vorspiel. — 3. Das Stechen der Bienen. — 4. Das Rauben der Bienen. Unterdrückung der Räuberei.

V. Verschiedene Rassen der Honigbiene (p. 42—44). 1. Die gewöhnliche deutsche Biene. Die Königinnen sind weniger fruchtbar. Sie lassen sich leicht in grossen Schwärmen halten. Für Vorsommertracht sehr gut. — 2. Die Heiderasse, speziell f. die Heide geeignet. Vermehrt sich stark im Vorsommer u. leistet viel durch die stark vermehrte Stockzahl. — 3. Die Krainer Biene. Schwärmt viel, ist ruhig, sanft u. wohl der ital. nabest. Ueberwintert gut. — 4. Die italienische Biene. Ueberwintert weniger gut. Ist für die Ergründung mancher Geheimnisse im Bienenleben sehr wertvoll gewesen. Zucht u. Handel mit ders. hat nachgelassen. — 5. Die cyprische Biene. Aehnelt der italienisch., ist aber noch schöner. Färb. der Ringe mehr hellgelb, Unterleibsringe gelb zum Unterschiede von der italien. Wird in Bezug auf Leistungsfähigkeit der Italienerin vorgezogen. (von Gravenhorst), soll aber nach anderen rasend stechen. — 6. Die ägyptische Biene. Sehr schön, gelb m. weiss. Behaarung, aber and. Rassen in wirtschaftl. Beziehung nachstehend.

VI. Die Krankheiten der Bienen u. deren Heilung (p. 45—53). 1. Die Faulbrut. Verschiedene Arten der Krankheit. Kennzeichen der Krankheit (Abb. Fig. 10 Faulbrutwabe). Ursachen der Faulbrut. Vorbeugungsmittel u. Heilmittel. — 2. Die Ruhr. Behandlung ruhrkranker Völker. — 3. Die Flugunfähigkeit oder Maikrankheit. — 4. Durstnot. — 5. Luftnot.

VII. Bienenfeinde (p. 53—57). Ungünstige Witterung etc. 1. Die Wachsmotte. — 2. Bienenfeindliche Vögel. — 3. Mäuse, Kröten, Eidechsen. Bienenfeinde unter den Insekten a) Wespen, b) Hornissen, c) Bienenwolf, d) Totenkopf, e) Ameisen, f) Bienenlaus. — 5. Die Spinnen.

B. Die Betriebsmittel der Bienen (p. 58—133).

VIII. Leitende Grundsätze bei der Konstruktion der Bienenwohnung und Anlage des Bienenstandes (p. 58—71). Warmhaltigkeit und Material der Bienenwohnung. — 2. Innere Einrichtung der Bienenwohnung, insbesondere der Mobilbeute, a) Form u. Grösse, b) Rähmchen, c) Entfernung der Rähmchen von einander, d) Verhinderung von Wirrbau u. Verkittung, e) Bodenraum, f) Flugloch (Fig. 11 Vogel'sche Kanal, 12 Absperrgitter). h) Ständer od. Lagerform?). — 3. Anlage des Bienenstandes.

IX. Die besten der seither gebräuchlichen Bienenwohnungen. (p. 71—81). 1. Der Strohkorb (Fig. 13). a) Vorzüge u. Nachteile. b) Gemischter Betrieb. c) Form, Grösse u. Einrichtung des Strohkorbcs. — 2. Die älteren Mobilbeuten, Dzierzonstock, Berlepsch- u. Dathebeute. (Abb. Fig. 14 Berlepschbeute). — 3. Die von oben und unten zu behandelnden Mobilstücke. a) Der Cowanstock u. s. w. (Abb. Fig. 15). b) Der Gravenhorst'sche Bogenstülper. (Fig. 16.)

X. Der Blätterstock. (p. 81—105.) (Fig. 17.) 1. Entstehung u. Vorzüge desselben. a) Entstehung. b) Vorzüge. (10 Punkte). c) Vermeintliche Nachteile des Stockes. — 2. Der Blätterstock in Lagerform. (Nähere Beschreib. u. Herstellung. p. 87—98.) a) Rähmchen. b) Klammern u. Schablonen. c) Sonstige Einrichtung des Stockes. (Hierzu zahlr. Detailfig.) (Fig. 18—28.) — 3. Die Ständerbeute. (Fig. 29.) — 4. Die Beute mit 40 Normalrähmchen. (Besonders für Gegenden mit reicher Vorsommertracht.) — 5. Die Ständerbeute mit liegenden Ganzrähmchen. (Fig. 30. Taf.) — 6. Auf- u. Untersatzkasten für Strohkörbe. — 7. Weiselzuchtstöcke. — 8. Die Herstellung des Blätterstockes aus Stroh. (Fig. 31—33.)

XI. Die Aufstellung des Blätterstockes auf dem Bienenstande. (p. 106—117.) 1. Die Stapelaufstellung ohne Bienenhaus. a) Der Stapel aus 6 Lagerbeuten. (Fig. 34 Grundriss, 35, 36—42). — 2. Lagerbeute in geschlossenen Reihen ohne Bienenhaus. (Fig. 43). — 3. Ständerbeuten in geschlossenen Reihen. (Fig. 44.) — 4. Der Pavillon. (Fig. 45.) — 5 Bienenhäuser. a) Das gewöhnliche, weniger warmhaltige Bienenhaus. (Fig. 46.) — b) Das warmhaltige Bienenhaus. c) Eine Bienenhütte für Stapel. (Fig. 47.) d) Das bewegliche Bienenhaus (Wanderwagen). e) Heizbare Bienenhäuser u. Zimmerbienenzucht.) (Fig. 48. Weygandt's Zimmerbienenstand.)

XII. Geräte u. andere Betriebsmittel. (p. 117—133.) 1. Geräte zum Rauchmachen u. Schutz. a) Die Tabacks-Pfeife. b) Der Smoker. (p. 49.) c) Bienenhaube u. Handschuhe. — 2. Geräte zum Hantiren am Stocke. a) Die Wabenzange zum Blätterstocke. (Fig. 50—52) b) Der Waben-Transportkasten. c) Die Bienenflucht. d) Bodenkratze u. Stossmesser. (Fig. 53.) e) Weiselkäfige u. Weiselburg. (Fig. 54.) f) Das Taschenmesser. g) Der Bestäuber. — 3. Geräte zum Einfangen u. Einbringen der Schwärme. a) Der Schwarmkasten mit beweglichem Deckel. b) Der Fangkorb zum Einfassen der Schwärme an hohen Stellen (hohen Bäumen u. s. w.) c) Die Schwarmspritze. — 4. Geräte zur Fütterung. a) Der Wabenfüller. b) Futtergefässe. — 5. Die Kunstwabe u. die Kunstwabenpresse. (Fig. 56). — 6. Geräte zur Honigernte. a) Die Honig-

schleuder. (Fig. 57—59.) b) Das Sieb zum Honigläutern. c) Wabenentdeckelungsgeräthe. d) Honiggefässe. (Fig. 61—64, Gläser, Tonne, Kübel.) — 7. Geräte zum Wachsaulassen. a) Presssäckchen. b) Der Presstopf. c) Die Wachspressen vom Verf. (Fig. 65.) — 8. Der Wabenschrank.

C. Der Betrieb der Bienezucht. (p. 134—211).

XIII. Betriebsplan u. Betriebsweisen. (p. 135—140.) 1. Betriebsplan, Regeln u. Gesichtspunkte bei der Zucht. Zahl der aufzustellenden Stöcke u. s. w. Jährl. Reinertrag per Volk bei regelrecht. guter Pflege in zweckmäss. Mobilbeuten durchschn. 10—20 M. Regeln: Halte auf starke Völker. Thue alles zur rechten Zeit u. halte die Stöcke, wenn möglich, unter beständiger Kontrolle. Wirthschaftsplan. Buchführung. — 2. Verschiedene Betriebsweisen. Je nach den Bienenwohnungen. Stand- u. Wanderzucht. Schwarm-, Zeidel-, Magazin-Bienezucht. — 3. Wanderbienezucht. a) Ohne besond. Wanderwagen. b) Mit dem Wanderwagen oder dem fahrenden Bienenhaus. (Fig. 66. Taf.).

XIV. Ueber den Umgang mit Bienen und die bei der Zucht öfter wiederkehrenden Vorrichtungen. (p. 141—160.) 1. Ueber den Umgang mit den Bienen. 2. Was bei den Hantirungen am Blätterstock besonders zu beachten ist. a) Oeffnen u. Schliessen der inneren Thüren (Fenster). b) Durchblättern u. Zwischenwegziehen der Waben. — 3. Vorbau u. Kunstwaben. Befestigung u. Verwendung derselben. (Fig. 67, 68). 4. Ankauf, Transport und Versendung von Bienen. — 5. Das Abkehren (Abfegen, der Bienen von den Waben), Ausschleudern u. Auslassen des Honigs. — 6. Das Ausfangen und Zusetzen einer Königin. a) Ausfangen der Königin. b) Zusetzen einer Königin. — 7. Heilung weiselloser u. drohenbrütiger Völker. — 8. Einschneiden u. Verwenden von Weiselzellen. — 9. Das Vereinigen der Bienen.

XV. Behandlung der Bienen im Nachwinter u. Frühjahr. (p. 160—176.) 1. Allgemeine Pflege. a) Verfrühter Brutansatz. b) Reinigungsausflüge. c) Das Tränken (hierzu Fig. 69). d) Die Preuss'sche Einsperrungsmethode. — 2. Untersuchung der Stöcke u. Abhilfe der vorhandenen Mängel. — 3. Die Frühjahrsfütterung. a) Ergänzung der Vorräthe u. Spekulationsfütterung. a) Mehlzuckertafeln u. andere Surrogate als Ersatz für Honig und Pollen. — 4. Ausbilden der starken u. Verstärken der schwachen Stöcke. — 5. Die Behandlung der Stöcke während der Frühjahrstracht bis Johanni. a) Allgemeine Behandlung. b) Honigstöcke u. Schwarmverhinderung bei denselben.

XVI. Die Vermehrung der Bienenvölker. (p. 177—196.) 1. Leitende Gesichtspunkte bei der Vermehrung. — 2. Leitung der natürlichen Vermehrung. a) Wie befördert u. wie beschränkt man das Schwärmen? Verfahrungsweisen bei der Leitung der natürlichen Vermehrung. — 3. Das Einfangen der Schwärme u. Einbringen in ihre Wohnung. a) Anlageplätze. b) Einfangen der Schwärme. c) Einbringen der Schwärme in die Wohnung u. Verhinderung des Ausziehens. 4. Kunstschwärme. a) Kunstschwärme zur Aufstellung in einen andern Flugkreis. b) Kunstschwärme, welche auf dem alten Standplatz bleiben. (a) von Mobilstöcken. (b) von Strohkörben). c) Kunstschwärme, welche auf

demselb. Stande einen neuen Platz erhalten. — 5. Brutableger. — 6. Die Weiselzucht u. Fortzucht einer fremden Rasse.

XVII. Die Zeit der Sommer- u. Nachsommertracht. (p. 196—203.)

1. Die Behandlung der jungen Stöcke u. alten Mutterstöcke. a) Fütterung. b) Kontrolle der Stöcke mit Weiselzellen und unfruchtbaren Königinnen. c) Leitung des Wabenbaues der Schwärme. — 2. Weitere Behandlung der Honigstöcke. — 3. Erzielung von Wabenhonig. — 4. Auswahl u. Behandlung der Zuchtstöcke fürs folgende Jahr. — 5. Behandlung der zu vereinigenden Stöcke.

XVIII. Imkergeschäfte im Herbst u. Vorwinter. (p. 203—211.)

1. Beseitigung der überzähligen Völker. — 2. Letzte Ernte, Revision u. Aufzucht, Aufbewahrung der Waben. — 3. Anlassung des Wachses. — 4. Einwinterung, Winterschutz u. Winterruhe der Bienen. — 5. Die Verwertung der Produkte (mit Fig. 70).

Anhang (p. 212—214). 1. Einseitige Wabe, Wabe mit verlängerten Zellen u. andern Vorrichtungen zur Steigerung des Honigertrages. — 1. Bienenrecht. — Inhaltsverzeichniss (p. 215—220). — Alphabetisches Verzeichniss der wichtigsten sachlichen Erörterungen. (p. 221—223.)

Schulz, Otto. (Buckow, Bez. Frankfurt a. O.) *Der Meisterstock.* Seine Geschichte u. Entwicklung nebst biographisch gefärbter Einleitung, auch Ergebnisse u. Erfahrungen aus meiner 50jährigen Imkerthätigkeit. Mit vielen Abb., einer Anzahl prakt. Winke u. einigen Arbeitsaufgaben. Im Selbstverlage des Verfassers. 1902. Druck v. Ed. Freyhoff's Buchdruckerei, Oranienburg. M. 1,60. — Wurde 1905 den Interessenten gratis verabreicht.

Der Stock hat eine äussere Länge von 115 cm, eine lichte Breite von 39 cm u. eine Höhe von 25 cm. In der Mitte findet sich ein Absperrgitter, wodurch vorn am Flugloch 10 Rähmchen (im Frühjahr als Tummelplatz, im Sommer als Brutraum) von den hinteren u. absolut räubersicheren 18 Rähmchen (im Winter am Absperrgitter das Winterlager, im Sommer das Ganze als Honigraum) getrennt werden. — Vortheile des Stockes: Stets fertig zum Wandern. — Absolute Schwarmverhinderung. — Preise des Stockes: 115 cm l. 28 Rähmchen M. 22.—, 100 cm l. 24 Rähmchen M. 21.—. — Kunstwaben dazu à M. 0.65—0.80.

Angaben über Besetzung des Stockes u. s. w.

Als Arbeitsaufgaben werden vom Verf., einem sehr tüchtigen Imker, angegeben:

1. Herbeiführung der Königinnenbefruchtung mit erwählten Drohnen im geschlossenen Raume.
2. Ueberwinterung vieler Königinnen in einem Stock.
3. Auf einfachste Weise bei manchen Honigsorten die dunkle Farbe zu beseitigen.
4. Feststellung des besten Ersatzmittels für den Blumenstaub zum Füttern innerhalb des Stockes.

5. Organisation einer Imkereigenossenschaft zur Ausnutzung einiger für die Bienezucht besonders geeigneter Gegenden.

u. s. w.

Die Honigläuterung (p. 78—79). — Die Wachsgewinnung u. Läuterung (p. 79—81). — Das Ausschleudern des Haidehonigs.

12. Technik.

a) Hilfsmittel. — Winke.

Der Kuntze'sche Königin-Absperrkasten. Von der Redaktion in *Krancher's Kal. d. deutsch. Bienenfr. f. 1902 p. 115—117.*

Aus stark. Absperrgitter mit 6 Halbrähmchen in Kaltbaustellung (s. Abb.). Honigertrag bei Leipzig (Lindenblüthe, — obgleich halb verregnet):

10 Völker ohne Absperrkasten . . . 97 Pfd.

10 „ mit „ . . . 238 „

Auch gut zur Umweiselung zu benutzen.

Schröder, Alex. (Triest). Der Bauvorzeichner (tracciatore). *Kal. d. deutsch. Bienenfr. f. 1902. p. 123—124.* Hierzu 2 Fig.

Krancher, O. Interessante Neuheiten für Bienezucht. *Kal. d. deutsch. Bienenfr. f. 1902. p. 125—133.*

I. Vorhaus „Universal.“ D. R. G. M. (Von Richard Horn in Jahnsdorf im Erzgebirge). Erinnt an Schultz's (Buckow) Veranda. Mit Abb. (Fig. 1 bis 4). (p. 125—128). — Der Apparat dient gleichzeitig 7 verschied. Zwecken: a) als Flugverhinderer, b) als Schwarmverhinderer u. Schwarmfänger, c) zur Fütterung, d) zum Drohnenfang, e) gegen Räuberei, f) als beste Blende, g) als Weiselzuchtstock.

II. Futtertrog. (Von G. Heidenreich in Sonnenburg [Neumark]). (Mit Abb. (p. 128—129). 50 Pf. pro Stück, mit Verdeckkästchen 80 Pf.

Fast dasselbe wie der von Schulz (Buckow) Preisliste unter No. 92 abgebildete Futtertrog (Refer.).

III. Rauchapparat „Vesuv“ (p. 129—130), mit Abb. Zu beziehen von G. Heidenreich in Sonnenburg (Neumark). u. Rich. Horn in Jahnsdorf (Erzgebirge). Preis M. 2.75.

IV. Die Entdeckungsgabel „Reform“ (p. 130—132), mit Abb. Nadeln kräftig, vernickelt, auswechselbar. Gebrauch ders. Preis incl. (3) Reservenadeln M. 1.30.

V. Abnehmbare Abstandsbügel (p. 132—133), mit Abb. 100 Stück M. —.70 (Abstand 10 mm), M. —.75 (Abstand 15 mm).

Knack, Max. Eine Tränke, welche den Bienen fast kostenlos dauernd lauwarmes Wasser liefert. t. c. p. 106—110. — Mit Abb. Preuss hat dieses Problem gut gelöst, doch lässt sich bei allen Stücken dies nicht anbringen.

Kruke mit Pudelmütze als Tropfvorrichtung. Temp. im Freien: Vorm. 9 Uhr + 8° R., Tränkwasser + 24° R., — Nachm. 5 Uhr + 9° R., Tränkwasser + 15° R.

Mittel gegen Räuberei: Lorbeeröl. t. c. p. 91. — Mit Feder ums Flugloch gestrichen.

c) Honig. — Wachs. (cf. auch sub Bau).

Honig als Mittel gegen Influenza nach **Abbé Delaigues**. Der Honig u. seine Verwendung: 1 Liter Weisswein, tüchtig mit Honig versetzt, aufgekocht u. vor dem Schlafengehen so heiss als möglich getrunken. — Ausz. Kal. f. Bienenz. 1902. p. 110.

Schulz (Buckow). Honigläuterung, Wachsläuterung s. oben.

Dennler, J. Der Honig als Nahrung u. Medizin. Oranienburg, Ed. Freyhoff's Verlag. M. — 20, in Parthien billiger. — Nährkraft, Verwendung in der Küche u. als Arznei, Rezepte.

Siehe ferner sub No. 7 d III.

13. Statistik.

Die von **Dedekind** (p. 32) gemachten Angaben betr. der jährlichen Honig- u. Wachsproduktion Anfang der Neunziger Jahre des 19. Jahrh. decken sich fast mit denen von **Krancher**. Es weichen ab die Angaben:

Vereinigte Staaten von Nordamerika 2 Millionen. Durchschnittspreis 25 Cents pro Pfd.: Produktion im Gesamtwert von 8 800 000 Dollars.

Die Bienen Europas geben jährlich 15 000 t (zu 1000 kg) Wachs (Werth 33 000 000 M.) u. 80 000 t Honig (Werth 50 000 000 M.).

14. Bienengesetze etc.

Freudenstein, H. (1). Welche Nachtheile entstehen der Bienenzucht daraus, dass das Bürgerliche Gesetzbuch das offene Aufstellen besetzt gewesener Bienenwohnungen erlaubt u. schützt? **Krancher's** Kal. f. Bienenz. 1902 p. 97—101.

Wiedergabe der diesbezügl. §§ 961—964 d. B. G. B. — Kein einziger stichhaltiger Grund für das Offenstehenlassen. Nachlässigkeit, oft Tücke u. Arglist als Grund hierfür anzuführen. — Schaden: Verbreitung der Faulbrut, Wachsmotten. — Es muss gegen die §§ protestirt werden.

— (2). Wie ich einmal einem Bienenhalter das arglistige Aufstellen leerer Beuten abgewöhnte. t. c. p. 151—154.

Vorheriges unbemerktes Abfangen der Königin auf dem Flugbrett des fremden Stockes. Ein- u. Ausmarschieren auf Kommando. — Das beste bleibt eine gesetzl. Bestimmung. (Die Red. d. Bienenkal.)

15. Temperatureinflüsse etc.

	Aeusserste Grenze				Mittel		
	Aeussere		im Bien		Aeussere	im Bien	
	von	bis	von	bis			
1.	Zur Zeit der Winterruhe:						
	a) Im Mittelpunkte d. Bienenklumpens	— 6	— 10	+ 10	+ 12	— 8	+ 11
	b) Am Umfange des Klumpens . . .	— 6	— 10	+ 7	+ 8	— 8	+ 7,5
	c) In den Ecken des Stockes	— 6	— 15	— 2	— 3	— 10,5	— 2,5
	d) Bienen erklimm. u. sterben . . .	—	—	— 4	— 5	—	— 4,5
2.	Zur Zeit der Thätigkeit:						
	a) Erst. Reinigungsflug schon bei	+ 5	+ 7	+ 20	+ 26	+ 6	+ 23
	b) Fliegen bei gross. Wassermangel .	+ 4	+ 6	+ 20	+ 28	+ 5	+ 24
	c) Flieg. schon nach Tracht bei . . .	+ 10	+ 12	+ 26	+ 28	+ 11	+ 27
	d) Fliegen lebhaft .	+ 17	+ 20	+ 27	+ 28	+ 18,5	+ 27,5
	e) „ noch .	+ 30	+ 31	+ 28	+ 29	+ 30,75	+ 28,5
	f) Die Bienen brüten	+ 10	+ 30	+ 20	+ 28	+ 10	+ 24
	g) „ „ bauen	+ 12	+ 31,5	+ 26	+ 29,5	+ 21,5	+ 27,75
3.	Die Drohnen fliegen bei	+ 16	+ 31,5	+ 26	+ 29,5	+ 23,75	+ 27,75
4.	Die Königin fliegt aus	+ 15	+ 31,5	+ 20	+ 29,5	+ 23,5	+ 24,75
5.	Die Königin begattet sich	+ 18	+ 31,5	+ 20	+ 29,5	+ 24,75	+ 24,75

16. Vermischtes.

Biene im Haushalt der Natur.

Schmiedeknecht, K. H., Oberlehrer. Die Bedeutung der Biene im Haushalt der Natur, in Krancher, O., Kal. d. deutsch. Bienenfr. f. 1902 p. 85—91. — Befruchtung der Blüten. Wie geht die Befruchtung der Blüte vor sich (botan. Kapitel). Einrichtungen für dieselben. Fremdbestäubung. Windbestäubung bei sehr trocken. Blütenstaub (Aehren — kein Honig), Insektenbest. bei klebrig. Blütenst. (Obstb. — Honig). — Die Obsternten hängen von den Bienen ab. — Bedeutung der Biene eine sehr vielseitige.

Blütenbefruchtung.

Zur Blütenbefruchtung. **Lindemann** rät nach Erfahrung, andere gut honigende Bäume u. Sträucher (wie Traubenkirsche), die zu gleicher Zeit mit

den Obstbäumen blühen, zu entfernen, da sie die Befruchtung der Obstbäume beeinträchtigen. t. c. p. 170.

Hufnagel, H. (Kolonist auf Deutsch-Samoa [Südsee]) giebt in d. Deutsch. illustr. Bienez. einen interess. Beweis der Befruchtung der Blüten durch Bienen. Ref. Kal. f. d. Deutsch. Bienenfr. f. 1902 p. 124. — Vor der Einführung der Biene war Handbefruchtung zur Erzielung von Gurken u. Kürbissen nötig, jetzt nicht mehr.

Bienennährpflanzen.

Huck, Friedrich. Die Honigdistel (*Echinops sphaerocephalus* L.). t. c. p. 142—144. Ist eine der anbauwürdigsten Nährpflanzen (blüht Juli bis Mitte [Ende] August u. nach Abschneiden der Blüten bis in den Herbst.

Wüst, Valentin (Rohrbach b. Landau, Pfalz). Interessante Bienennährpflanzen (auf Grund eigener Forschung). Kal. d. deutsch. Bienenfr. 1902 p. 134—141. Zu der Flora Mitteleuropas gehören ungefähr 4000 einheim. Phanerogamen, davon nahe die Hälfte zur Bienenweide. Bemerk. zu *Lamium*, *Dielytra spectabilis* („Fruchtwasser“ b. letzt.), *Chelone barbata*, *Berberis vulgaris* L., *Tropaeolum maius* L., *Lathyrus sativus* L. u. *pratensis* L. (gute Honigpfl., keine Pollenpfl. für Bienen), *Oenothera biennis* L. (zu den best. Honigpfl., keine Pollenpfl. f. Bienen), *Vicia villosa* Roth. (bei letzt. arbeiten d. Hummeln vor).

Holen die Bienen aus dem Mais Honig? **Hall.**

Diverses.

Kuchenmüller, Luise. Die Gattin des Imkers. t. c. p. 158—160. — Thätigkeit ders.: Honigschleudern; Fabrikation des Honiglikör (Essenzen dazu von Th. Gödden in Alpen). Recept dazu. Backwerke. Notfutterbereitung.

Plawina, Oswald. Kampf einer Biene mit einem Dachshunde. Kal. d. deutsch. Bienenfr. f. 1902. p. 169—170.

Emery bringt in der Ill. Zeitschr. f. Entom. 5. Bd. 1900 p. 137 ein ähnlich. Beispiel von Wabenbau, wie Barfod (siehe vor. Bericht p. 294), bei dem Ap. mell. sicher der Urheber war.

Superfamilia II. Sphecoidea.**Fossoria.** (Fam. XV—XXVI.)

Hierher: Oxybelidae, Crabronidae, Pemphredonidae, Bembicidae, Larridae, Philantidae, Trypoxylonidae, Mellinidae, Nyssonidae, Stizidae, Sphecidae u. Ampulicidae.

Verbreitung schwedischer Fossores: Nordenström p. 206.

Biologie zahlreicher europäischer Fossoria. Nahrung, Eiablage. Lage des Eies. Ferton, Ann. Soc. Entom. France vol. 70 p. 98—125.

Gruppierung nach ihrer Beute: Fliegen-, Ameisen-, Wanzen-, Heuschrecken-, Raupen-, Spinnen-Jäger. Ferton, p. 126—128.

Die Wanzenjäger gruppieren sich nach ihrer Beute (Ferton, Ann. Soc. Entom. France, vol. 70 p. 106—107) folgend:

Hemipteren:**Raubwespen:**

1. Heteroptera.

Pentatomiden, Coreiden u. Lygaeiden	Astata.
Lygaeiden (Aphanus = Pachymerus).	Dinetus.
Lygaeiden.	Sylaon compeditus.

2. Homoptera.

Jassiden (Jassini u. Acocephalini).	Mimesa, Gorytes.	
Cercopiden.	Stizus tridens.	
Fulgoriden	Tettigometra.	Gorytes punctuosus.
	Hysteropterum apterum	Alyson Ratzeburgii.

3. Aphiden.

Diodontus, Passaloecus, Pemphredon, Psen, Psenulus, Nitela Spinolae, Crabro (sp.?).

Grabwespen sens. strict.: Rudow p. 370.

Schutz einiger Raupen gegen die Raubwespen. Ferton, Ann. Soc. Entom. France, vol. 70 p. 139—140.

Nester: Rudow.

In den folgenden Familien nicht speziell untergebrachte Formen:
Notoglossa inornata Robertson, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. XXVII p. 203.
 — *americana* p. 204 (beide aus Nordamerika).

Steniola sulfurea Fox, Journ. New York Entom. Soc. vol. IX p. 84 (Californien).
Harpactes in den Wohnungen holzgrabender Crabroniden, wie *Ectemnius*, aber auch bei *Trypoxylon*. Rudow p. 377. — *laevis* Latr. mit klein. Goldwespen zus. aus dem Bau von *Odynerus parietum*.

- Hoplisus u. Gorytes wohnen neben oder bei einander. Gorytes wohl sicher der Schmarotzer. **Rudow** p. 376.
- Hoplopus laevipes Shk. ist vielseitig in Bezug auf den Nestbau. **Rudow** p. 356.
- Nitela, Celia u. Rhopalum. Die niedrigsten aller Sphegiden. Beobachtung der Nistgewohnheit. **Rudow** p. 369—370.
- Pogonius baut Erdzellen ähnlich wie Eumenes, doch mit charakt. Besonderheiten **Rudow** p. 363.
- Stizomorphus in einer halb abgestorbenen Pappel mit Sphegiden und Odynerus-Arten zusammen. **Rudow** p. 377.

Oxybelidae. (Fam. XV.)

- Oxybelus. Beutethiere auf Corsica nach **Ferton**, Ann. Soc. Entom. France, vol. 70 p. 112: melancholicus Chevr. trägt ein: Musca domestica, M. corvina, Melanophora halterata, Sarcophaga cruentata, Sarcophila (sp.?). — O. bipunctatus Oliv.: Homalomyia brevis Rond. — O. latro: Lucilia sericata **Mg.** — O. ambiguus Gerst.: Asilus atricapillus Fall. p. 112. — Kokon von O. melancholicus p. 112. — O. platensis Brèthes lähmt seine Fliege durch mehrmalig. Stich zwisch. dem ersten Fusspaar. p. 111 in Anm. — Die Spp. sind Fliegenjäger. **Ferton**, t. c. p. 126. — melancholicus Chevr. Ei an einer Musca-Larve. Taf. II Fig. 3.
- Für Schottland neu: uniglumis Linn., Dundonald. — mandibularis Dahlb., Irvine. **DalGLISH** p. 7. — mandibularis Dahlb. at Wisley. **MORICE** (12).
- Astata u. Mellinus graben erst senkrechte, dann sich schief nach oben richtende drehrunde Löcher. **Rudow** p. 370—371.
- Neu sind: maculiventris **Tournier**, Bol. soc. espan. vol. I, p. 256. — nigri-ventris p. 257. — opacus p. 258 (alle drei aus Spanien). — floridanus **Robertson**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. XXVII p. 203 (N. America).

Crabronidae. (Fam. XVI.)

- Crabronidae. Diese bilden eine streng gesonderte Gruppe. Ameisen- bis Hornissengrösse in allen Uebergängen. Sie besitzen alle die Fähigkeit, ihre lebend eingetragene Beute durch den Stich zu betäuben, in einen Starrkrampf zu versetzen, in welchem sie mehrere Monate sich frisch erhält. **Rudow** p. 358. — Nahrung.
- Liste der Einmieter u. Schmarotzer, Räuber etc. ders. **Rudow** p. 362.
- Ueber die Nester ausländ. Arten wohl wenig bekannt p. 363.
- Anothyreus. Ueber das Nest ist nichts bekannt. **Rudow** p. 361.
- Blepharipus. Ueber die Nester wenig bekannt. **Rudow** p. 361.
- Brachymerus. Ameisenjäger. Lage des Eies am Beutethier. **Ferton**. — quin-quotatus Jur. Ei an Tapinoma erraticum Latr. Taf. II Fig. 6.

- Ceratoculus alatus* Pz. u. *vexillatus* Pz. Nistgewohnheit. **Rudow** p. 360. — *subterraneus* Fbr. u. *Loewi* Db. leben vorzugsweise unterirdisch an Wurzelstöcken etc. p. 360.
- Ceratophorus morio* Shuck. spinnt als einzige in ihrer Familie einen vollständ. Kokon vor der Verpuppung, der von dem die Zelle abschliessenden „Deckelchen“ unabhängig ist. **Nielsen** (2).
- Coelocrabro cloëvorax* Nielsen, nur im ♀ bekannt, füttert die Larven hauptsächlich mit Cloë diptera (Ephem.). **Nielsen** (2).
- Clytochrysus chrysostomus* Lep. (im Résumé ist *C. lapidarius* Pz. angegeben) tötet die Nahrung für die Larven durch Zerbeißen des Thorax und lähmt sie nicht nur. **Nielsen** (2).
— — Biologie. Gänge. **Nielsen**, *Vidd. Medd.* 1900 p. 255—9. m. Holzschn.
- Crabro*. Die Spp. sind Fliegenjäger. Lage des Eies am Beutethier. **Ferton** p. 126.

Bemerkungen zu bekannten Arten:

- aphidum* Lep. in Scotland. **Carter, E. A. J.**, *Entom. Monthly Mag.* (2) vol. 12 (37) p. 277.
- capitosus* Shuck. Nest in gekappten Zweigen der Traueresche. Nahrung der Larven: Psylliden. **Baer**, hierzu Fig. 1 u. 2 auf p. 162.
— Siehe auch *Salix notatulus*. **Carter**.
— Spp. von Norfolk. **Wainwright**.
- palmipes* häufiger als *cribrarius* auf den hillsides von Dumbartonshire, *varius*, bei *Levenside Moor* u. *Bonhill*. — *dimidiatus* zu *Dumbarton Road*. **Malloch** p. 6.
- distinctus* Smith. *Verbess. Bemerk.* hierzu. **Perkins**, *Entom. Monthly Mag.* (2) vol. 12 (37) p. 264.
- elongatulus* V.-D.-L. sammelt auf Corsica nach **Ferton** p. 113: *Sapromyza* (sp.?) zu *Rognac*, *Agromyza pusilla* Mg., *Tachydromia cothurnata* Macq. u. *Cyrtosia* sp.? zu *Bonifacio*; nach *Schnuse* eine weitere Reihe von (11) Dipt. p. 113 in *Ann.*
- litratus* Panz. auf den Kalkdünen bei *Upper Halling*. **Elgar, H.** p. 17.
- 4-maculatus* sammelt zu *Bonifacio*: *Homalomyia canicularis* L., *H. scalaris* Fabr., *H. incisurata* Zett., *Spilogaster clara* Mg., *Sp. quadrum* F., *Sapromyia fasciata* Fall. u. *Culex* ♂, wahrscheinlich auch *Anopheles*; also beachtenswerth in Sumpffiebergegenden; die von *Bouvier* in „*Les habitudes des Bembex. Anné psychologique 1901*“ wiedergegebene Angabe, dass *quadrimac.* von Tag zu Tag seine Larven mit Nahrung versorgt, ist, wenigstens zu *Bonifacio*, unrichtig.
— — von *Coleshill*. *Entom. Monthly Mag.* (2) vol. 12. (37) p. 21.
- gonager* near *Cobham*. **Morice** (12). — *scutillatus* *Schev. at Wisley*.
- Neu: *impetuosus* (*niger*, abdomine maculis flavis sex; geniculis tibiisque flavolineatis; alis hyalinis, nervis stigmatique nigris). **Cameron, P.**, *Proc. Zool. Soc. London*, 1901 vol. 2 p. 28 ♀ (*Singapore*).
- (*Thyreopus*) *cribrarius* var. *inornatus* **Mocsáry**, *Zool. Ergeb. etc. Zichy* vol. II p. 163. — (*Corynopus*) *heterocerus* **Mantero**, *Bull. Soc. Entom. Ital.* vol. XXXIII p. 201 (*Patagonien*).

- Crossocerus*. Nestbau. **Rudow** p. 361. — *tirolinensis* Kohl Bau in morsch-Zweigstücken des Maulbeerbaumes p. 361. — *vagabundus* Pz. u. *quadrimaculatus* Fbr. Nest ähnl. wie vorige in Buchen- u. Eichenästen p. 361. Nistcolonie versch. Spp. in Himbeerstengeln aus Württemberg p. 361—362. — *palmipes* v. d. L., *congener* Db., *varius* Lep., *anxius* Wsm., *Wesmaeli* v. d. L. Nahrung: Cicaden, *Typhlocyba*, *Idiocerus* etc. — *aphidum* Lep. Nahrung: Blattläuse p. 362. — p. 298 dieses Berichts, Zeile 6 von unten lies *aphidum* stat *ophidum*.
- palmarius* Schb. Nistgewohnheit. **Nielsen** (2).
- Ectemius* nistet in ausgehöhlten Zweigen. Nistgewohnheiten aller Spp. sind gleich. Beschreib. des Nestes. **Rudow** p. 360—361.
- Entomognathus* *Diodontus*, *Mimesa* u. *Psen* zeigen keine bemerkenswerthen Eigenthümlichkeiten im Bau. **Rudow** p. 369.
- Lindenius* *albilabris* F. Nistgewohnheit. **Nielsen** (2).
- armatus* V.-D.-L. fing zu Rognac. ein. *Apantheles* n. sp., u. *Lindenius* n. sp.? hatte in seinem etwa 10 cm tiefen Erdloche nur eine Höhle, in der sich eine Chalcidide u. eine Ophionide n. sp.? fand. **Ferton**, Ann. Soc. Entom. France, vol. 70 p. 114.
- Rhopalum* *clavipes* L. hat keine feste Nestform. Die Nahrung besteht aus Mycetophiliden u. Cecidomyiden, nicht aus Psociden u. Musciden. **Nielsen**. Die Nester bilden bald einfache Röhren, bald haben sie Seitengänge. *tibiale* F. Nistgewohnheit. **Nielsen** (2).
- Bau, siehe *Trypoxylon*. — Ferner **Rudow** p. 370.
- Solenius* *cephalotes* Shuck. mit vielen Abart. Bau. **Rudow** p. 359.
- vagus* L. Nistgewohnheit. **Nielsen** (2).
- Stenocrabro* *cinctitarsis*. **Ashmead**, Psyche, vol. IX p. 185 (New Mexico).
- Thyreopus* *cribriarius* nistet wie *Solenius* *cephalotes*. **Rudow** p. 359—360. — *patellatus* v. d. L. u. *pterotus* Fabr., *crabro*, *Ceratocolus* *alatus* Pz. u. *vexillatus* Pz. nisten besonders in trock. Stengeln von Disteln u. Umbellaten. **Rudow** p. 360.

Pemphredonidae. (Fam. XVII.)

- Cemonus* *unicolor* F. Zweigbewohner, kein Kokon. — *lethifer* Dahlb., Zweigbewohner, kein Kokon. **Nielsen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 308. — *lethifer* Shuck. Nistgewohnheit. **Nielsen**. — siehe ferner *Trypoxylon*.
- Ceratophorus* *morio* v. d. L. nistet im morschen Holz von *Populus*. — Das Nest besteht aus 3 oder mehreren parall. Gängen von 15—80 mm Länge. Untersuchung des Deckelchens. **Nielsen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 307. Holzbewohner. Kokon p. 308.
- Diodontus* **Kohl** (3). — Bis 1898 sind bekannt u. als Sp. anerkannt: *minutus* Fabr., *trist.* v. d. Lind., *luperus* Schuck., *Dahlbomii* A. Moraw., *parvulus* Radoszk., *punicus* E. André, *Handlirschii* Kohl, *ruficornis* F. Moraw., *hyalipennis* Kohl, *crassicornis* Gribodo, *punicus* Gribodo, *brachycerus* Kohl u. *Schmiedeknechtii* Kohl. — Von *crassicornis* Gribodo ist noch keine genügende Diagnose gegeben. Bemerk. dazu p. 120—121. — Es werden beschrieben: *Friesei* (verw. mit *brevicornis* K.) p. 121—122 ♂ ♀ (Aegypten; Tunis; Ivizza). — *temporalis* (steht D. *parvulus* Radoszk. sehr nahe) p. 122—123 ♀ (Palästina, bei Jericho). — *parvulus* Radoszk. (= „*Passalocus* *parvulus*“ Radoszk.)

- (kleinste bekannte Sp.) p. 123—124 ♂ ♀ (im Thale Sarafschan, beim Flusse Jaxartes u. in Ferghana). — *ruficornis* F. Moraw. (sehr ähnl. *D. minutus* Fabr.) p. 124—125 ♂ (Kasandshik). — *major* (Färbung u. Zeichnung wie *minutus*) p. 125 ♀ (Niederösterreich, Bisamberg bei Korneuburg u. Dornbach bei Wien). — *Moricei* (eine dem alpinen *D. Handlirschii* Kohl u. *D. minutus* F. verwandte Art) p. 125—127 ♂ ♀ (Aegypten: Helouan, Luxor, Adelen-Insel). — Wiedergabe der in den *Miscellanea entomologica* (vol. II 1894, No. 10, 11) beschrieb. *crassicornis* Grib. u. *punicus* Grib. p. 127.
- Bestimmungstabelle paläarktischer *Diodontus*-Arten. I. Weibchen (p. 127—131). — II. Männchen (p. 131—133). — Erklär. der Abb. (Taf. II, 24 Fig.) Ueberwiegend Fühlergeißelstücke der obigen Spp. darstellend.
- Bau siehe *Entomognathus* — auch auf der Erde kriechend beobachtet; fängt Blattläuse. **Rudow** p. 375.
- tristis* v. d. Lind. u. *minutus*. Nistgewohnheit. **Nielsen**. — *tristis* Dahlb. Erdbewohner. Kokon. **Nielsen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 308.
- Spp. von Norfolk. **Wainwright**.
- Mimesa equestris* bei West Runton, Norfolk. 31. VIII. **Bradley**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 20. — auch **Wainwright**, t. c. p. 102.
- Bau siehe *Entomognathus* u. *Trypoxylon*.
- Neu sind: *striatus* **Viereck**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. XXVII p. 339. — *johnsoni* p. 340. — *ferruginea* p. 341 (alle drei aus Nord Amerika). —
- Neofoxia* n. g. für *Psen Ashm. nec Latr.* **Viereck**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. XXVII p. 338.
- Passaloecus gracilis* Dahlb., *monilicornis* Dahlb., *turionum* Dahlb., Zweigbewohner. Kein Kokon. **Nielsen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 308. — *monilicornis* Dahlb. Nistgewohnheit. **Nielsen** (2).
- turionum* Dahlb. ist nicht ein Parasit der Gallmotte, *Retinia resinella*, sondern bewohnt nur alte, verlassene Gallen dieser Art. **Nielsen** (2).
- Bau siehe *Trypoxylon*.
- Pemphredon lugubris* F. Holzbewohner. Kein Kokon. **Nielsen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 308.
- (*Cemonus*) *unicolor* (Fabr.) Latr. Nest in geköpften Trieben von *Ailantus glandulosa* Desf. zu Primkenau. Nahrung: Aphiden. **Baer** p. 163.
- Bau siehe *Trypoxylon*.
- Psen atratus* Dahlb. Nest in gekappten Zweigen der Traueresche. **Baer**, hierzu Fig. 3 u. 4 auf p. 162. Nahrung: Dipt. Empid.: *Platypalpus*. — Merkwürdiges Nest. Nahrung der Larven. **Baer**. — Erklärung hierzu **Nielsen**, Allg. Zeitschr. Entom. 6. Bd. p. 308. — Die Lage der Futterreste über dem Kokon erklärt sich aus der Lage der Zweige: herabhängend. — Dahlb. Nistgewohnheit. **Nielsen** (2).
- concolor* Pz. u. *atratus* Dahlb. Zweigbewohner. Kein Kokon. **Nielsen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 308.
- , *Mimesa*, *Rhopalum*, *Cemonus*, *Pemphredon* u. *Passaloecus* nisten übereinstimmend in Rohr- u. Holzstengeln, sofern letz. recht weich u. leicht zu bearbeiten sind. Lage der Puppen, Ruhezustand ders., Larvenfutter selbst in den Zellen eines Baues verschieden, Schmarotzer

dieselben Sp. wie bei Trypoxylon. **Rudow** p. 368. — Psen wie Nitela, Celia, Rhopalum arbeitend. p. 370.

— Bau siehe Entomognathus.

Stigmus pendalus Pz. lebt bei allen Holzbewohnern und entwickelt sich gleichmässig mit ihnen, manchmal in solcher Menge, dass die Wirte unterdrückt werden. In Gängen von Bostrich. u. klein. Ceramb. **Rudow** p. 376.

patagonicus **Mantero**, Bull. Soc. Entom. Ital. vol. XXXIII p. 199 (Patagonien). *Tachytes* siehe *Astata*.

Bembicidae. (Fam. XVIII.)

Bembex. Die Arten sind Fliegenjäger. **Ferton** p. 126 sq.

— Der Nestinstinkt der Grabwespen. Wiedergabe der Bouvier'schen Beobachtungen. Experiment mit einem auf die Oeffnung gelegten Stein; diente ihr als Orientierungspunkt für die Suche nach ihrem Nest. *Prometheus* 12. Bd. p. 669.

— Schnabelwespe. Ueberraschend das Treiben derselb. Aufwirbeln einer Sandwolke mit den Beinen wie die Teckelhunde. So wühlt sich die Wespe in den Sand ein. Untersuchung des Baues. **Rudow** p. 372. — *Schmarotzer*: *Parnopes carnea* Rsi. in *S. Eur.*

— *labiatus*. Beobachtung über den Nestinstinkt. **E. K.**, *Prometheus* 12. Bd. 1901 p. 669.

oculata sammelt auf Corsica nach **Ferton** p. 113 ausser den bereits bekannt. Beutethieren noch ferner *Melithreptus scriptus* L., *Rhinophora* (sp.?), *Anthrax flava* Mg., *Chilosia scutellata* Fall., *Syrphus ribesii* L., *S. luniger* Mg., *Therema marginula* Mg., *Pollenia rudis* Fabr.

rostrata L. in Jersey. **Luff, W. A.**, *Entom. Monthly Mag.* (2) vol. 12 (37) p. 48, desgl. **Evans, Will.**, t. c. p. 17. — Gewohnheiten. **Marchand**, Bull. Soc. Ouest. France, 1901, p. 247—250. — Larve, Tracheensystem. **Seurat**. Titel p. 322 sub No. 5 des vorig. Berichts.

„*Bembex ruficornis* Fab.“ **Handlirsch**, *Verhdlgn. k. k. zool. bot. Ges. Wien*, 51. Bd. p. 506.

lactea (es fehlt das U-förmige gelb. Zeichen auf dem Mesonotum. Sie gehört in Bingham's Sekt. B. neben *B. latitarsis* [Fauna of India, Hym. p. 285].

Cameron, P., *Proc. Zool. Soc. London*, 1901 vol. 2 p. 25—26 ♀ (Khasia).

melancholica Sm. stimmt mit dem Singapore-Stück, abgesehen davon, dass die gelb. Linien auf dem Mesonotum sehr undeutlich und kurz sind) p. 26. — *borneana* (nahe verw. d. vorig., ebenso blass milchweiss, aber letzt. Abd.-Sgm. nicht in der Mitte eingeschnitten) p. 26 ♂ (Borneo).

beutenmülleri **Fox**, *Journ. New York Entom. Soc.* vol. IX p. 83 (Californien).

Monedula durch *Stictia* zu ersetzen. **Fox**, *Entom. News Philad.* vol. XII p. 269. *medea* Handl. bei Pará. Beschr. des noch unbeschr. ♂. Der einzige stichhaltige Unterschied dieser Art gegen *M. heros*. F. wird in der abweich. Sculptur des Scutellum liegen. **Ducke, A.**, *Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt.* 1. Jhg. 5. Hft. p. 242.

punctata. Beobacht. v. Hudson aus Bouvier, *habitudo de Bembex* p. 26. Bau, Ei etc. Wiedergabe in **Ferton**, *Ann. Soc. Entom. France*, vol. 70 1901 p. 125 Anmk.

Desgl. Notiz von **Brèthes**, *Revista del Museo de la Plata*, 1901. Die Lebensweise weicht wenig von der unserer europ. *Bembex* ab.

Larridae. (Fam. XIX.)

Revision der von Wallace im Malayischen Archipel gesammelten u. im Hope-Museum, Oxford aufbewahrt. Hymenopt. sehr wünschenswerth. **Cameron**, Proc. Zool. Soc. London, 1901, p. 22. — Bei den Larridae z. B. herrscht bezügl. der Gattungsbest. grosse Unordnung.

Aulacophilus vespoideus Sm. bei Macapá. **Ducke**, A., Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 5. Hft. p. 242.

Chrysolarra n. g. (Das Vorhandensein einer Falte am inneren Orbitalrand trennt die Gatt. v. *Tachytes* u. *Tachysphex*; von *Notogonia* untersch. sie sich dadurch, dass das *Pigidium* nicht mit einer haarig. (hour frost like) Pubescenz, sondern mit steifen Haaren bedeckt ist, die mit längeren untermischt sind. Charakteristisch ist, dass die nerv. recurrentes mit einander verbunden und nicht getrennt sind. Apical. Abscisse des Radius quer. Im Hflgl. sind die Apikaladern schwach ausser die der unteren etc. Pubescenz d. 4. Sp. goldig). **Cameron**, P., Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 118.

appendiculata p. 118—118 (Khasia Hills). — *aureosericea* (vorig. am nächst.) p. 119—120 (Khasia Hills). — *japonica* (kleiner als die beiden vorigen) p. 120—121 (Japan). — *pruinosa* p. 121—122 ♀ (Matang, Borneo).

Larra in Gemeinschaft mit *Scolia* wie *hortorum*, bei der sie vermuthlich als Schmarotzer lebt. **Rudow** p. 377.

Miscophus. Die M. sind Spinnenjäger. **Ferton**, Ann. Soc. Entom. France, vol. 70 p. 127. — *gallicus* Kohl = *rubriventris* Ferton auf Corsica, ganz roth. p. 65 u. 88.

Pison fuscipalpis (*niger*, *nitidus*, *dense argenteo-pilosus*; *alis hyalinis*; *stigmatibus nervisque nigris*). **Cameron**, P., Proc. Zool. Soc. London, 1901, vol. 2 p. 27 — 28 ♂ (Singapore). — eine von *suspiciosus* Sm. deutlich geschiedene Sp. — haut freie Zellen. Die europ. u. amerikan. Spp. weichen im Nestbau wenig von einander ab. Beschr. **Rudow** p. 363—364.

iridipennis Sm. Verbess. Bemerk. hierzu. **Perkins**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 264.

Pisonopsis anomala. **Mantero**, Bull. Soc. Entom. Ital. vol. XXXIII p. 202 (Patagonien).

Sceliphron javanum Lep. Singora. **Cameron**, P., Proc. Zool. Soc. London, 1901, vol. 2 p. 25. — *madraspatanum* Fab. vom Singora p. 25.

nigripes Westw. (*giganteum* Klug) bei Pará u. auf Marajó. **Ducke**, A., Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 5. Hft. p. 242.

Sylaon. Die S. sind Wanzenjäger. **Ferton**, Ann. Soc. Entom. France, vol. 70 p. 126.

Xambeui Ern. André (*S. compeditus* steht der X. sehr nahe). Der Nestbau von *S. Xambeui* liefert einen Beweis für die geringe Variabilität des Instinkts der Hym. Beschr. der Nester. Ausschlüpfen u. s. w. *compeditus* nistet in Erdlöchern („terriers“), *Xambeui* in trockenen Stämmen (*tiges seches*) p. 101. Lage des Eies p. 125—127.

Philantidae. (Fam. XX.)

Philantus trägt Honigbienen als Larvenfutter ein, in Ermangelung der Bienen auch grosse Schwebfliegen, auch Erdbienen. **Rudow** p. 371.

triangulum Fab. in Folkestone, Kent. **Perey, E. Freke**, Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 11 (36) p. 63. — Sehr wichtiger Fang. F. Smith fing ihn zu Sandown. Wohl seit 30 Jahren noch nicht wieder in Engl. gefangen.

Trypoxylidae. (Fam. XXI.)

Nectanebus Fischeri Spin. bei Kairo. **Morice** (5) p. 166. — Sp. zwischen Marg. u. Matariyeh. p. 168.

Trypoxylon. Die Sp. der Gatt. sind Spinnenjäger. **Ferton** p. 127.

figulus L. Nistgewohnheit. **Nielsen.** — Spp. in Norfolk. **Wainwright. varipilosum** (nigrum, abd. rufo, petiolo nigro; pedibus testaceis, tarsis posticis nigris; facie clypeoque dense aureo-pilosis; alis hyalinis, nervis nigris, stigmatibus fusco). **Cameron, P.**, Proc. Zool. Soc. London, 1901, vol. 2, p. 28—29 ♀ (Singapore). — Steht offenbar coloratum Smith am nächsten. Beine wahrsch. in Färb. variabel etc.

— Töpferwespe wegen der Eigenschaft die Zwischenräume, welche die Zellen trennen, in eigenthümlicher Art durch breite Wände von Erde zu verbauen. Eingang zum Bau durch langen Pfropf verschlossen. Bauelegenheiten ders. **Rudow** p. 366—367. — Schmarotzer ders. p. 367. — Bauelegenheiten p. 368.

— Amerikanische u. exotische Formen weichen im Nestbau von einander ab. **Rudow** p. 364. — *rejector* aus Indien. Nestbau. p. 364. — *albitarse* Db. u. *fuscipenne* Db. (Brasilien). Nester ders. p. 364.

Mellinidae. (Fam. XXII.)

Mellinus sabulosus bei West Runton, Norfolk. 31. VIII. **Bradley**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 20.

— sp. bei West Runton. Norfolk. **Wainwright**, t. c. p. 102.

— Bau siehe *Oxybelus*.

Nyssonidae. (Fam. XXIII.)

Alyson ist ein Wanzenjäger. **Ferton.**

Ratzeburgii Dhlb. Nest. Beutethiere: Hemipt. Lage des Eies an dens. **Ferton**, Ann. Soc. Entom. France vol. 70 p. 104.

Neu: *flavomaculatus* **Cameron**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. XXVII p. 314 (New Mexico).

Astata boops bei West Runton, Norfolk. **Wainwright**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 102. — minor Kohl. Ei auf Hemipt. - Larven. **Ferton**, Taf. III Fig. 4. — stigma. Larven v. *Emblethis griseus* Wolf. — tricolor V. D. L. Larv. von *Aphanus* (Lygeide) **Ferton** p. 104.

— Latr. Beutethiere: Hemipteren. Ueber den Fang ders. u. s. w. **Ferton**, Ann. Soc. Entom. France vol. 70 p. 102—103. — Liste der von *Astata*-Spp. erbeuteten Hemipteren nebst Angabe der Fundorte (nebst Zeit) auf Corsica. Es tragen ein: *A. boops* Schrank: Larven der *Pentatom.*, *Eurydema* u. *Dolychoris baccarum* L. — *A. picea* Costa: verschiedene *Pentatomiden*-Larven, *Stenocephalus agilis* Scop. (*Coreide*), *Dolychoris baccarum* L. (*Pentat.*), Larv. von *Carpocoris* p. 104. — *A. minor* Kohl

- Larven v. *Schirus dubius* Scop. (Pentat.) u. *Sch. sp.* — *A. rufipes* Mocs. Larv. v. *Sch. dubius* Scop. u. *Brachypelta aterrima* Forst. (Pent.). — *A. costae* Picc.: Larven v. *Odontoscelis* u. *Sciocoris* (Pentat.).
- u. Tachytes bauen Höhlen in fester Erde unter Heidekraut u. *Artemisia*. Beutetiere: kleine *Stenobothrus*, *Halictus*, Wanzenlarven. Sonderbare Gewohnheit der Thiere, sich eifrig in Blüten von *Nigella* u. Disteln zu wälzen und dicht mit Blütenstaub bedeckt davon zu fliegen. Ob dieser zur Befestigung der Röhre dienen soll?! Nester wohl sehr tief? **Rudow.**
- Dinetus.** Die D. sind Wanzenjäger. **Ferton.**
pictus Pz. ♀ sammelt Blütenstaub mit d. vord. Tarsen zu kleinen Ballen u. fängt ausserd. Blattläuse. Gewissheit über d. Nestbau nicht zu erlang. **Rudow.**
- Gorytes.** Die G. sind Wanzenjäger. **Ferton.** — *punctuosus* Eversm. Ei an *Tettigometra*.
 — schmarotzt bei *Hoplisis*. **Rudow** p. 376.
 — Die Gewohnheiten der Spp. dieser Gattung scheinen sehr einförmige zu sein und bieten wenigstens in unseren Ländern ein wenig interess. Studium. **Ferton**, Ann. Soc. Entom. France vol. 70 p. 104. — *campestris* Müll. Erbeutung einer Schaumcicadennymph, *Aphrophora spumaria* p. 104 — 105. — *punctuosus* Eversm. Nestbau. Beute: *Tettigometra* (1 Zelle bis 60 Stück). Verschluss des Nestes, während der Abwesenheit des Mutterthieres. — *punctulatus* V.-D.-L. trägt *Solenocephalus obsoletus* Germ. ein, p. 105. — Liste der von *Gorytes* erbeuteten Hemipt.: *G. campestris* Müll. trägt ein Cicadinennymphen; *G. punctuosus* Eversm.: *Tettigometra griseola* Fieb., *sulphurea* Mls. *virescens* Pz., *impresso-punctata* Duf.?, *impressifrons*. — *G. punctulatus* V. D. L.: *Solenocephalus obsoletus* Germ. — *G. concinnus* Rossi: *Sol. obs.* — *G. laevis* Latr.: *Athysanus variegatus* Kb. u. *Goniagnatus brevis* H.-S. — *G. leucurus* Costa: *Sol. obsol.* — *G. elegans* Lep.: *Acocephalus?* (Jassid.-Larve), *Athysanus variegatus* Kb., *Sol. (obsoletus?* Germ.).
- Das äthiopische Gebiet im Verhältniss zum paläarktischen, nearktischen u. neotropischen verhältnismässig arm an *Gorytes*-Arten. Von ungefähr 210 bekannten Arten der Gatt. entfallen auf dieses Gebiet kaum 13, und von den 28 natürlichen Artgruppen konnten bisher nur 5 in Central- u. Südafrika nachgewiesen werden.
- Aus der *Gorytes punctatus*-Gruppe sind bisher folg. äthiopische Arten bekannt:
 1. *Gorytes intricans* Gribodo (1884, 1894) aus Port Elisabeth ♂ ♀
 — 2. *G. Emeryi* Gribodo (1894) aus Mozambique, ♂. — 3. *G. Aglaia* Handl. (1895) vom Cap, ♂. — 4. *Euphrosyne* Handl. (1895) aus „Afrika“, ♀. — 5. *Thalia* Handl. (1895) vom Cap, ♀. — Ergänzung zur Beschr. von *Aglaia* p. 427 - 428. — Ergänzung d. Beschr. d. ♀ u. ♂. Abd. d. Endsegm. *G. Aglaia* Fig. 1, von *Thalia* Fig. 2, *Braunsii* Fig. 3. Fühler: *G. Aglaia* Fig. 4 ♂, Fig. 5 ♀; von *Thalia* Fig. 6 ♂, 7 ♀.
- Neu: *Braunsii* (Habitus ähnlich wie *Aglaia*) p. 429 ♀, Fühler Fig. 8 (Delagoa-Bay).
- niger Costa (♂ u.) ♀. **Morice, F. D.** Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 6. Hft. p. 362. Beschr. der bei *Olympia* erbeuteten Stücke.

Rogenhoferi Handl. bei Jerichow. **Schmiedeknecht.**

imitator (Habitus schlank, auffallend ähnl. einer Polybia u. gehört in die nähere Verwandtschaft von *G. notabilis*, *splendidus* etc.) **Handlirsch**, Verhdlgn. k. k. zool.-bot. Ges. Wien, 51. Bd. p. 351—352 ♀ Fühler Fig. 1 (Rio Grande do Sul). — *mimetes* (schlank wie vorige, stimmt bis in den Details der Zeichn. mit einer ?neuen Polybia Sp. aus der Gruppe *fasciata*. Mimikry?) p. 352—354 ♀, Fühler Fig. 2, Endsegm. Fig. 3 (Rio Grande do Sul). — *Bergii* (auch diese gehört in den Verwandtschaftskreis von *notabilis* oder *splendidus*) p. 354—355 ♀, Fühler Fig. 4 (San Leopoldo in Brasilien). — *Foxii* (vorig. sehr ähnl.) p. 355—356, Fühler Fig. 5 ♀ (San Leopoldo in Brasilien).

Harpactes sanguinans. **Dominique**, Bull. Soc. Ouest France (2) vol. 1 p. 513 pl. VII (S.-Amer.).

Nysson schmarotzen bei erdnistenden Mellinus u. Verw., kleinere Formen sind Bewohner der Nester von *Astata* u. ähnl. Wespen. **Rudow** p. 376.

— Spp. in Norfolk. **Wainwright**.

dimidiatus (auf Corsica). Gewohnheiten, Nest u. s. w. **Ferton**, Ann. Soc. Entom. France vol. 70 p. 107—108.

— — bei West Runton, Norfolk. **Wainwright**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 102.

costae (Gruppe des *N. epeoliformis*, untersch. durch verschiedene Färbung und die Undeutlichkeit d. seitl. Höckerchen d. Clypeusrandes) **Handlirsch**, Verhdlgn. k. k. zool.-bot. Ges. Wien 51. Bd. p. 510 (Oran). — *aureo-balteatus* **Cameron**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. XXVII p. 313 (New Mexico).

Stizidae. (Fam. XXIV.)

Stizus cyanescens Rad. bei Jericho. **Schmiedeknecht.**

fasciatus Fabr. Ei an Acridier-Larve. **Ferton**, Taf. II Fig. 4.

tridens Fabr. ist auf Corsica weiss statt gelb. **Ferton**, Ann. Soc. Entom. France, vol. 70 p. 88.

ruficornis Fab. sensu Handl. ist eine Mischart, welche zwei allerdings sehr ähnl. gefärbte, durch plastische Merkmale aber gut kenntliche Spp. enthält: *pubescens* Klug u. *distinguendus*. Beschr. beider. **Handlirsch**, Verhdlgn. k. k. zool.-bot. Ges. Wien, 51. Bd., p. 507—508. Untersch. beider; Abb. des Stirnschildchens beider für ♀ Fig. 1, 2, ♂ Fig. 3, 4. — *pubesc.* (Andalusien, ganz. Mediterrangebiet); *disting.* (Gallia merid.; Barcelona). — *spectrum* p. 508 ♀ (Gruppe des *St. pubescens* Klug [= *ruficornis olim*], dem *dispar* Mor. am ähnlichsten) p. 508 (Sefir Kuh). — *Baumanni* (Gruppe des *St. pubescens* Klug [= *ruficornis olim*]) p. 508—509 ♀ (Ostafrika: Dar-es-Salaam). — *emir* (Gruppe des *St. fasciatus*. — Steht wohl *Koenigii* am nächsten, der jedoch auf dem Mittelsegm. gröbere Punktirung und etwas dunkle Flgl. besitzt) p. 509 ♀ (Repetek in der Bucharei).

sibiricus **Mocsáry**, Zool. Ergebn. etc. Zichy, vol. II p. 162 (Minusinsk).

— u. *Sphecius* sind wahrsch. Schmarotzer der ihnen ähnl. *Bembex*-Arten. **Rudow** p. 377.

Sphegidae. (Fam. XXV.)

Ammophila u. *Psammophila*. Bau (während des Sonnenscheins von 9 Uhr morg. bis fast zu Sonnenuntergang gearbeitet). Der Bau dauert mehrere Tage Larvenfutter *Syrphus* u. Honigbienen. **Rudow** p. 373—374.

Ammophila ist ein Raupenjäger. **Ferton**.

atripes Smith. ♀ sehr gross (doppelt so gross wie die ♂), mit hellroten Beinen. Beine der ♂ fast ganz schwarz. **Cameron, P.**, Proc. Zool. Soc. London, 1901 vol. 2 p. 25.

hirsuta Scop. var. *mervensis* Rad. (var. ined. — ♂ ders. hat typ. Färb.: Abd. roth u. schwarz; Kampf mit einer (*Agrotis?*)-Raupe etc. **Ferton**, Ann. Soc. Entom. France, vol. 70 p. 139—141.

holosericea Fabr. Zeichen von Intelligenz, die unter den Hym. sonst ausnahmsweise vorhanden ist. Experiment p. 141—142.

hirsuta Scop. ist auf Corsica ganz schwarz. **Ferton** p. 88. — Palma; Bellver, Miramar. **Saunders** (1) p. 208.

sabulosa L. Biologie. Nach Adlerz im Refer. von **Chr. Schröder**, Allgem. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 285. — sp. in Norfolk. **Wainwright**.

— (*Parapsammophila*) *gigantea* (riesenhafte Form [52 mm] gleicht *A. Ludovicus* Lep. in fast allen Stücken, doch scheidet beide der grosse Längenunterschied u. die viel düstere Punktirung u. deutl. Runzelstreifung der Mittelbrustseiten der erst.) **Kohl**, Ann. naturhistor. Hofmus. Wien, XV. Bd. p. 142—143 ♀ (Congo). — (*Paraps.*) *unguicularis* (gleichet ganz dem Männchen der *Ludovicus* Sm. u. könnte für ein zwerghaftes Stück dieser Art betrachtet werden. Unterschiede). p. 143 ♂ (Kopf Taf. I Fig. 22, Stipes Taf. II Fig. 32, Spatha Fig. 35 (Ostafrika. Delagoa-Bay). — (*Paraps.*) *litigiosa* p. 143—144 ♂ Kopf Taf. I Fig. 6 (Afrika?). — *aemulans* (gleichet ganz der *armata* Rossi. Untersch.) p. 144—145 ♂ ♀ Kopfschild Taf. I Fig. 2, Stipes Fig. 18, 9. Ventral-Fig. 23, Vflgl. Taf. II Fig. 39 (Südostsibirien: Korea). — *clypeata* **Mocsáry** (sehr ähnlich der *A. armata* R., doch kleiner etc.) p. 145 ♂ Genitalapparat Taf. II Fig. 33. — *dolichostoma* p. 146—147 ♀ Kopf Taf. I Fig. 9 (Arabien). — *errabunda* p. 147 Kopf Taf. I Fig. 5, Vflgl. Taf. II Fig. 38 (Nordostafrika, am Golf von Aden). — *algira* (lutea sehr nahe) p. 147—148 ♀ Vflgl. Taf. II Fig. 40 (Algier, Biskra). — *caelebs* p. 148—149 ♂ Vflgl. Taf. II Fig. 44 (Aegypten, Fayun). — (*Coloptera*) *judaeorum* (gleichet in der Sculptur u. in den Dimensionsverhältnissen ausserordentlich der *A. barbara* Lep., vielleicht nur eine geograph. Abänderung ders., die Untersch. liegen fast nur in der Färb. und in der Pubescens) p. 149—150 ♀ ♂ Hfuss. Taf. II Fig. 27 (Gebiet des toten Meeres, Jericho). — *assimilis* (gleichet der *A. sabulosa* L., doch Verwechslung nicht möglich) p. 150—151 ♂ ♀ Hfuss. Taf. II Fig. 31 (Syrien, Jerusalem; Brammana). — *Sickmanni* (= *Ammophila* n. sp., **Sickmann**, Spengel's Zool. Jahrb. f. Syst. 8. Bd. 1894 p. 216 ♂ ♀) p. 151—152 Vflgl. Taf. II Fig. 42 (Nordchina: Tientsin, Kalgan). — *adelpa* (*A. striata* Kohl [non] **Mocsáry**, Verhdlgn. zool.-bot. Ges. Wien 33. Bd. p. 382 ♀. — Untersch. von der ähnl. *fallax* Kohl) p. 152—153 ♀ Kopf Taf. I Fig. 1 (Dschungarei. — Turkestan, Samarkand). — *haimatosoma*

Kohl. Beschr. von ♂ u. ♀ p. 153—154 Kopf Taf. I Fig. 13, Scheitel Fig. 25, Vfüss. Taf. II Fig. 34, Vflgl. Fig. 41 (Cypern; Syrien: Jordan-gebiet; Malta; Algier). — *electa* p. 155—156 ♀ ♂ Kopf Taf. I Fig. 4, Vfüss. Fig. 10 (Tripolis; Tunis; Algier). — *erminea* (kleiner als die nahe verwandte propinqua Taschb.) p. 156—157 ♀ ♂ Kopf Taf. I Fig. 11 (For; Aden; Assab; Aegypten; Malta). — *divina* p. 157—158 Hfüss. Taf. I Fig. 7, Fühler Fig. 12 Kopf Fig. 16 Vflgl. Taf. II Fig. 45 Pronot. Fig. 15 (Fundort?: kann aus Aegypten, Kordofan, Kleinasien, Mesopotamien, Südpersien u. Sibirien stammen). — *induta* p. 158—159 ♀ Kopf Fig. 20, Hfüss. Taf. I Fig. 8, Pronot. Fig. 17, Vflgl. Taf. II Fig. 37 (Bucharei) — *dubia* (? 1838 *Ammophila rubripes* Spinola. Kleine rothbeinige Sp. — Vergleich mit *holosericea*, *rubripes*) Kopf Taf. I Fig. 21 p. 159—161 ♀ ♂ (Aegypten; libysche Wüste; Kasr-Dachel; Malta). — *laevicollis* ist eine gute, in Südfrankr., Spanien u. Nordafrika (Algier, Berberei) vorkommende Sp. 161. — (*Psammophila pungens* p. 161—162 ♀ Vflgl.-Stück Taf. I Fig. 26 (Semipalatinsk). — (*Psamm.*) *minax* p. 162—163 ♀ (Aegypten: Kairo; Abbasije bei Kairo). — (*Psamm.*) *flavida* (Erscheinung einer kleinen Tydei Klug) p. 163—164 ♀ (nördl. Mongolei). — *clavus* Fabr. Ansicht des Kopfes Taf. I Fig. 3, Scheitel Fig. 24. — *laevicollis* E. André Kopf Taf. I Fig. 19. — *armata* Rossi. Abb. d. Spatha Taf. II Fig. 28, Genitalapparat Fig. 29, Stipes Fig. 30, Hinterleibsende Fig. 36. — *sabulosa*. Ansicht d. Vflgls. Taf. II Fig. 40b. — *clypeata* Vflgl. Taf. II Fig. 42, Stipes Fig. 43. — *striata* Mocs. (!) Ansicht d. Vflgls. Taf. II Fig. 47. — *nasuta* Lep. Stücke von Oran. p. 144—145 in Anm.

Gynandromorphie:

abbreviata F. Ueber einen Fall von „frontaler“ Gynandromorphie. Kohl, F. F., Verhdlgn. d. k. k. zool.-bot. Ges. Wien, 51. Bd. p. 405—407. — Kopf, Thorax u. Beine ♀, Geschlechtsorgane ♂. Die Beine sind in allen ihren Theilen gedrungener, Behaarung der Tarsen reicher. Abb. der Beine u. Tarsen Fig. 1—4.

Cerceris specularis Costa. Nest. Beutethiere, folg. Coleopt.: *Spermophagus cardui*, *Sitona humeralis*, *Apion pubescens* u. *trifolii*, *Tychius pygmaeus*, *meliloti* u. *junceus*. Ferton, Ann. Soc. Entom. France, vol. 70 p. 109. — Beutethiere einiger C.-Spp. zu Bonifacio: *C. quadricincta* Latr.: *Peritelus foveithorax* Dub., *Dia oblonga*, *Apion tubiferum*, *Bruchus variegatus*, *Br. uniformis*, *Br. seminarius*, *Br. pusillus*, *Phytonomus crinitus*, *Sitones Waterhousei*. — *C. Ferreri* V. D. L.: *Thylacites fritillum* Pz., *Sitones humeralis* Steph., *Cleonus cinereus* Schrank. — *C. rybyensis* L.: *Prosopis clypearis* Schenck ♀, *Andrena vetula* Lep. ♀, *Halictus gemmeus* Drs. ♀ ♂, *H. aureolus* Pérez, *H. malachurus* K., *H. separandus* Schmied. ♀, *H. bifasciatus* Pérez ♀, *Panurgus canescens* Latr. ♀ p. 109.

truncatula Dahlb. u. *labiata* F. Nistgewohnheit. Nielsen (2).

Neu: *borealis* Mocsary, Zool. Ergebn. etc. Zichy, vol. II p. 161. — *frigida* p. 161 (beide aus Sibirien).

- baut nur kunstlose Erdlöcher, bemerkenswerth durch Larvenfutter, das unter Umständen willkommene Käfer enthält. **Rudow** p. 371—372. —
 — *arenaria* L., *variabilis* Pz. u. *hortorum* Pz. tragen vorzugsweise Cassiden, Schildkäfer oder Chrysomeliden ein. — *bupresticida* Lep. trägt nur farbenprächige Buprestiden ein, andere Spp. fangen weiche Bockkäfer, selbst kleine Cetoniden und kleine Cetonien p. 373.
variabilis Pz. ausser in der Erdhöhle auch in leeren Gehäusen von *Helix pomatia*,
Rudow p. 375.

Miscus und Notogonia. Die M. u. N. sind Orthopterenjäger. **Ferton**.

Notogonia pompiliformis Pz. Larvenfutter u. Nest. **Ferton**, Ann. Soc. Entom. France vol. 70 p. 98—99. Futter: *Gryllomorpha dalmatica*? *Ocskay* u. *Platylemmus umbroculatus* Luc. etc.

Psammophila ist ein Raupenjäger. **Ferton**.

— Bau s. *Ammophila*.

Sphex. Die *Spex* sind Orthopterenjäger. **Ferton**.

— im Volksglauben (China u. Indien). Entwickl. betreff. Insektenbörse 17. Jhg. p. 84.

— Höhle geräumig, nicht in Kammern eingetheilt, Beutethiere; bis 15 Puppen in einem Bau. **Rudow** p. 374—375. — *paludosa* Per.

Kohl giebt in seiner Monographie die Angaben F. Smith wieder, dass Bates das Nest von *Sphex Lanieri* Guér. gesehen und als zu dieser Wespe gehörig erkannt haben will. — *Sph. Lanieri* Guér. = *Sphex ichneumoneus* L. — Bate's Angaben beziehen sich wahrscheinlich auf *Sphex (Isodontia) costipennis* Sm. Beobacht. d. Nestes bei Pará. Beschr. — Liste der von Ducke bei Pará beobachteten *Sphex*-Arten nebst Bemerk.: *striatus* Sm., *Thomae* F., *costipennis* Spin., *dolosus* Kohl, *nigrocaeruleus* Taschb., *melanopus* Dahlb., *fuliginosus* Dahlb., *neotropicus* Kohl, *brasilianus* Sauss., *spiniger* Kohl, *ichneumoneus* L. **Ducke, A.**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 5. Hft. p. 241—242.

albisectus Lep. (zu Bonifacio). Beobacht. der Eiablage einer kleinen Dipt. in das Erdloch des *Sphex*. **Ferton** p. 144—145.

maxillosus F. Nest. Beutethiere: *Phaneroptera falcata* Scop. u. *Ph. quadripunctata* Brunn. **Ferton**, Ann. Soc. Entom. France, vol. 70 p. 108—109.

confrater Kohl (leicht erkenntl. am glänzend schwarzen Abdomen, dessen drei Abd.-Sgm. leuchtend roth sind). **Cameron, P.**, Proc. Zool. Soc. London, 1901 p. 240. — (*Isodonta*) *insularis* (*niger*, dense nigro-pilosus; *mandibulis* rufo-piceis; *alis* fusco-violaceis). — Ist nicht mit der and. Sp.: egens Kohl von New Britain zu verwechseln, andere Färb. u. s. w.) p. 240—241 (New Britain).

lobatus Fab. von Patalung, Biserat, Gunong Inas (Perak) u. Bukit Besar, eine weitverbr. indisch. Sp. **Cameron, P.**, Proc. Zool. Soc. London, 1901, vol. 2 p. 24. — *umbrosus* Christ von Bukeit Besar p. 24. — *aurantulus* Fab. füllt sein Nest mit jungen Heuschrecken (Grasshoppers). Beschr. d. Kokons. p. 24—25.

semenowi ♂. **Semenow**, Revue Russe Entom. vol. I p. 55. — (*Priononyx*) *sennae*. **Mantero**, Bull. Soc. Entom. Ital. vol. XXXIII p. 200 (Patagonien).

ichneumonea. Lebensgewohnheiten ders. nach Peckham. **W. Schönichen**, Prometheus 13. Bd. 1902 p. 777—780. Abb. des Nestes. Desgl. Gewohnheiten v. *Sph. flavipennis* (baut in hartem Boden, braucht mehrere Stunden zum Bau) u. *albisetus* (baut in weichem Boden, ca. 15 Min.).

Neu demnach: *insularis* u. *sennae*.

Tachysphex. Eine ungeahnt artenreiche Gatt., namentlich in den Mittelmeerlandern. Beschr. von 6 n. sp., von denen 5 dem paläarkt. Gebiet, 1 der orient. Region angehörig. **Kohl** (4). — *Reiseri* (gehört in die engste Verwandtschaft des *T. lativalvis* Thoms.) p. 777—778 ♀ (Bosnien, auf erdigen besonnten Stellen längs des von Fojnica zu dem Dorfe Tješilo durch Eichenbuschwald emporleitenden Saumpfad. 760 m Höhe). — *spretus* (klein, etwas schlank) p. 778—779 ♀ (Transkaspien, Gr. Balchan). — *hostilis* (gehört wie die Verwandten: *M. speciosissimus* D. Morice u. *luxuriosus* D. Morice zu den Formen mit schlankeren Beinen) p. 779—780 (Transkaspien). — *redivivus* Kopfschildbildung, Punktirung d. Mesonotum, sonstige Skulptur d. Brustkastens, Dünne der Beine, zum Theil auch Färb. stellen ihn dem grösseren *hostilis* nahe) p. 781 ♀ (Cairo). — *abjectus* (Erscheinung wie Var. des *T. Panzeri* mit schwarzem Hinterleibe. — Ob eine Abänderung von *T. micans* Radoszk.?) p. 782 ♂ (Transkaspien, Bala-Ischem). — *brevitarsis* (ähnelte dem *T. nitidus* Spin., doch breiter u. gedrungener) p. 783—784 ♂ ♀ (Ceylon, Badurelia). — Wie weit *T. bengalensis* Cam. mit dem *brevitarsis* verwandt ist, lässt sich bei den mangelhaften Angaben nicht entscheiden. p. 784. — Taf. VII bringt 22 Details der obigen Spp., ferner Fig. 1. Vrdrflg. geäder von *T. speciosissimus* F. Morice u. *T. luxuriosus* F. Morice Fig. 2.

— Die *T.* sind Orthopteren-Jäger. **Ferton**. — *acrobates* Kohl. Ei an *Locusta*-Larve. Taf. II Fig. 2. — *nitidus* auf *Acrid.*-Larve. Taf. III Fig. 3.

mediterraneus Kohl Nest; Larvenfutter: *Oecanthus pellucens* Scop. **Ferton**, Ann. Soc. Entom. France, vol. 70 p. 99—100. — *rufipes* Aichinger. Auf Corsika. Zeit des Erscheinens. Larvenfutter: *Platypleis* p. 99—100. — *Jullianii* Kohl. Futter f. d. Larve: Mantiden p. 100. — *nigripennis* Spin. im Nest eine Nymphe von *Acrotylus insubricus* Scop. ♀ — *acrobatis* Kohl. Beute: Hemipt.-Larven, desgl. v. *Decticus* (*Platypleis tessellatus*). Lage des Eies. p. 100—101. — *europaea* Kohl. Beute: Larven von *Stenobothrus rufipes* Zett. u. *pulvinatus* Fischer de W. — *pectinipes* L. Nistgewohnheit. **Nielsen** (2). — bei West Runton, Norfolk. **Wainwright**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 102.

distinctus u. *elongatus*. Synonymie. **Robertson**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. XXVII p. 203.

Ampulicidae. (Fam. XXVI.)

Dolichurus corniculus S., sowie *Salius* sollen in der Erde nisten. **Rudow** p. 376.

Superfamilia Vespoidea.

(Fam. XXVII — XLII umfassend.)

Pompilidae. (Fam. XXVII.)Die Pompilidae sind Spinnenjäger. **Ferton** p. 127.

Pompilidae. Sie sind neben den Gastrilegiden u. Wespen die interessantesten Insekten. Ihre Geschichte ist im Vergleich mit der der Spinnen analog derj. des Angriffs u. der Vertheidigung einer fortwährend belagerten Veste. Auf jede neue List der Spinne, sich ihres Feindes zu entledigen, antwortet die Pompilide mit einer Modification ihrer anatomischen Charaktere oder des Instinkts, um die neue Kriegslist zu vereiteln. So hat sich der Kopf des *Pompilus crassitarsis* Costa u. des *Planiceps fulviventris* Tourn. abgeplattet u. ihre Vorderbeine verdickt, da die Mygaliden ihre Höhle durch eine solide Klappe mit Charnier u. Fäden verschlossen. Mit ihren kräftig. Werkzeugen gelingt es den Wespen in die Höhlen einzudringen u. den In-sassen zu bewältigen. Beobachtungen hierüber (*Pomp. plicatus* u. *Ctenizia Sauvagei* Rossi). **Ferton** p. 114—115.

Pepsinae.

Cryptocheilus für *Salius* zu setzen, siehe dort.

Pepsis Staudingeri (Flgl. stark rothgelb mit weis. hyalin. Randsaum, äussere Hälfte des Spitzenfleckes einnehmend. — Stimmt mit *formosa* überein. Untersch.: leucht. röthl. Färb. d. Flgl., Copulatoreg. d. ♂, Fühlerbild., Randsaum, tief. Paraps.-Furch., viel schmal. unvollst. Cubitalz. d. Hflgl.). **Enderlein**, Stettin. Entom. Zeit. 62. Jhg. p. 145—147 ♂ (Argentinien). Länge: Körp. 37, Flgl. 35, Spann. 77 mm). — *altitarsus* (stark zusammengedrückte Hinterschienen, wie *P. aurozonata* etc. *P. pertyi* Luc. nahe, versch. durch gleichmässige, dunkl. Flg.-Färb., weiter ausgedehnt. helleren Saum, der sich auch auf die Hflgl. fortsetzt.; lange Behaarung mit verbreitert. schuppenart. Haaren, enorm verbreit. Hinterschienen. u. Tars.) p. 147—149 ♂ (Brasil.: Espiritu Santo. — K. 21, Flgl. 24, Flgl.-Spann. 59 mm); 2. Exempl. ein Hungerexemplar oder n. sp., (weil Länge d. Fläche. des Mittels., die nach Lucas konstant, hier kurz, im Gegensatz zu *latitarsis* 5 mm; Färb. sonst fast gleich). — *fumata* (bläulich-grün, Infrastigmalhöcker stark entw. Medianquerleiste mit pyramidenähnl. Zahn. Flgl. mattschwarz bis braunschwarz speckig glänzend, nach d. Spitze zu lichter. Ober- u. Uflgl. mit schwarzem Saum, doch weniger scharf abges. Subgenitalpl. schwarz, glänz., spatelförmig mit median. Einschnitt, behaart. — Von *Pertyi* Luc. versch. durch breit. Hschien. u. Tars., Subgenitalpl. u. Fühlerfärb.) p. 149—150 ♂ (Brasil.: Espiritu Santo. — Grösse: K. 30—34, Flgl. 30—32, Flgl.-Spann. 65—69 mm). — *diselene* ist, wie schon Lucas angiebt, keine *Pepsis*, sondern ein *Salius*. ♂-Hschien. fast ohne Dorn., bei d. ♀ mit Dorn. u. undeutlich gezähnt. Crista. Typisches *Salius*geäder. Länge d. Körp. ♂ 25—30, ♀ 34—44, d. Flgl. ♂ 26—29, ♀ 30—36 mm; Flgl.-Spann. Länge des ♂ 55—62, ♀ 65—79 mm.

Priocnemis. Bau s. *Pompilus*.

Priocnemis bisdecoratus Costa. Beute: Gewicht der erbeuteten *Lycosa radiata* Latr. 80 centigr. **Ferton**, Ann. Soc. Entom. France vol. 70 p. 122. — *octomaculatus* Rossi u. Vachali p. 123. Beutetiere, Nest u. s. w.

— — Beutetiere auf Corsica: *Lycosa radiata* Latr. **Ferton** p. 125. — *rufipes* Destef. (var. à pattes noires): *Drassus minusculus* C. Koch. — *egregius* Lep.: *Argiope lobata* Pallas. — vachali **Ferton**: *Dysdera crocata* C. Koch, *Drassus macellinus* Thorel, *Euophrys terrestris* E. Sim. p. 125. — *hyalinatus* F. p. 127.

Vachali auf Corsica; biolog. Bemerk. **Ferton** p. 65.

Salius soll in der Erde nisten. **Rudow** p. 376.

— durch *Cryptocheilus* zu ersetzen. **Fox**, Entom. News Philad. vol. XII p. 268. *fuscus* Linn. bei Arrochar; *parvulus* at Levenside Moor mit *Andrena analis*. **Malloch** p. 6.

notatulus Saund. and *Crabro aphidum* Lep. in Scotland. **Carter, E. A. J.**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 277. — at Clandon. **Morice** (12). *obtusiventris* Schiödte auf den Kalkdünen bei Upper Halling. **Elgar, H.** p. 17. *propinquus* siehe *Hedychrum rutilans*. **Morice**.

— — Latr., ein noch nicht für Brittanien aufgeführtes Hymenopteron. **Morice**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 347—349. Beschr.; identisch mit Stücken von Jericho u. Algiers.

Neu: *Salius miserus* (niger, capite, pronot., apice mesonoti scutelloque flavo-testaceis; pedibus rufo-testaceis; coxis posticis nigris, alis fusco flavis, apice fusco-violaceis. — Gehört zu Bingham's Sektion B a [Fauna of India p. 124]). **Cameron, P.**, Proc. Zool. Soc. London, 1901 vol. II p. 22—23 ♂ (Singapore). — *Taprobanae* (niger, antenn., pedib., apice pronoti, mesonoto, scutello postscutelloque rufis; coxis trochanteribusque nigris; alis flavis, apice fumatis. — Gehört zur Sekt. mit 1 Zahn an den Klauen u. steht *S. flavus* nahe) p. 23 ♀ (Trincomali, Holrapputana, Ceylon). — *sycophanta* Grib. von Patalung, das Stück von Kuala Aring hat dunkl. Flgl., der gelbrote (*fulvus*) Schimmer (*tinge*) ist an der Spitze viel dunkler, doch fehlt die Trübung u. s. w. p. 23. — *malayensis* (Körper- u. Flügel-Färbung wie *peregrinus*. 3. Cubitalzelle bei *peregrinus* an der Spitze länger als die 2., bei mal. nicht viel mehr als $\frac{1}{2}$ so lang; 2. Cubitalquerader bei *peregr.* gerade, bei mal. an der unteren Seite zur Flgl.-Basis gebogen, oberes Drittel gekrümmt. Dieser Charakter trennt sie auch von der nahe verw. *Khasia*-Sp. *subfervens* Cam.) p. 23 (Kuala Aring).

insularis (flavus, abdom. nigro; metanoto nigro, fulvo bimaculato; alis flavis). **Cameron, P.**, Proc. Zool. Soc. London 1901 p. 237—8 ♀ (New Britain).

• — *basimacula* (flavus, abdom. nigro, petiolo late flavo balteato, femoribus postic. supra late nigro-lineatis; alis flavo-hyalin.) p. 238—239 ♂ (New Britain). — *Willeyi* (lutens, abdomine nigro; alis violac.; antenn. nigris, basi luteis. — Es ist Cameron bei dieser Form nicht klar, ob es ein *Salius* oder *Pompilus* ist, eine Quersfurche am 2. Ventral-segm. scheint vorhanden zu sein. Sie ähnelt einem *Pompilus* der *peregrinus*-Gruppe) p. 239—240 ♂ (New Britain).

petiolaris Sauss. ♀. Das ♂ dazu ist *Pompilus* (*Homonotus*) *ibex* Sauss. siehe dort. — *radoszkowskyi* Rad. ist ein *Salius*. Originalbeschr. u. Beschr.

der Type. **Enderlein**, Stettin. Entom. Zeit. 62. Jahrg. p. 152—153 (Abyssinien). Länge d. Körp. 42, d. Flgl. 35, Flgl.-Spann. 75 mm.

Eatoni (bicolor F. verw., aber der weniger cylindr. Prothorax d. ♂ ist kürzer, von dem von Costa dazu gestellt. ♀ versch. durch scharf gestreiftes Propodeum u. nach der vom Autor gegeb. Abb. auch durch sehr verschied. Färb. u. anderes Geäder der Flgl. Bei dem ♂ von Le Tarf ist das Abd. dicht mit fein. schein. Pubesc. bedeckt, Pronot. ganz schwarz, sonst aber der typ. Form ähnl.) p. 557—558 ♂♀ (Biskra, auf Ammi visnaga; Le Tarf; Azazga, auf Eryngium tricuspdatum, 1900' Höhe). Die ♀ variiren etwas in der Grösse. — 6-punctatus Fab. ♀ (Koudia auf Daphne gnidium, Constantine). — dito, kleine ungefleckte Var. (Biskra, auf Ammi visnaga) p. 559. — infumatus Palm. (Biskra, auf Ammi visnaga). — barbarus Fab. ♀♂ (Algier: Bône, Koudia Sma, Azazga, La Calle; auf Mentha rotundifolia u. Eryngium tricuspdatum) p. 559. — dimidiatipennis Costa (Le Tarf, auf Foeniculum vulgare). — discolor Fab. ♀ (Biskra). — *Perezi* p. 559—560 ♂♀ (Biskra, auf Ammi visnaga). — *sanguinicollis* (deutl. durch Färb. und Gestalt der Mesopleuren u. des Propodeum charakt. Sp.) p. 560—561 ♂♀ (Biskra, auf Ammi visnaga). — parvulus Dahlb. p. 561—562 (Biskra, auf Ammi visnaga). Die ♂ ähneln den britischen; die ♀ aber tragen ein. deutl. augenähnl. Fleck nahe der Flgl.-Spitze, nicht von der Form wie b. den brit. Sp., auch ist die Punktirung d. Oberfläche grober, deutlicher, Propod. nach der Spitze zu quergestreift. Anfangs glaubte Saunders sie zu Morawitz's punctatissimus stellen zu müssen, doch spricht dieser von ein. „pronoto margine apicali arcuatim emarginato“; hier ist der Hrand deutlich gewinkelt. — Die Spp. der exaltatus-Gruppe sind im ♀ schwer unterscheidbar). — sp. (?) (viel grösseres ♀ als die andern, wahrsch. zu pusillus Schiödtte gehörig, doch ohne ♂ nicht unterscheidbar) p. 562 ♀ (Biskra). — propinquus Beschr. des anschein. dazu gehör. ♂ p. 562 (Algier: Biskra, Bône). — Fischeri Spin. (Biskra, auf Ammi visnaga) p. 562 ♂. — sp. (?) (verw. m. fuscus Fab.) (Biskra) p. 562 ♂.

Pompilinae.

Anoplius für Pompilus zu setzen, s. dort.

Aporus dubius Sp. Beutethier auf Corsica: Callilepis exornata C. Koch. **Ferton** p. 125.

— verfertigt Erd- u. Lehmbauten. **Rudow** p. 363 u. 368. — Larvenfutter: Spinnen, glatte Räuptionen.

Pompilus u. Pricnemis. Beschr. d. Baues. **Rudow** p. 374.

— durch Anoplius zu ersetzen. **Fox**, Entom. News Philad. vol. XII p. 268.

— Spp. von Norfolk. **Wainwright**.

Es sammelt auf Corsica ein: niger Fabr.: Lycosa albofasciata Brullé, L. radiata Latr., L. albovittata Brullé, Drassodes lutescens C. Koch, Drassus severus C. Koch. p. 124. — pulcher Fabr.: Lycosa perita Latr. — sexmaculatus Sp.: Heliophanus lineiventris E. Sim., Thanatus vulgaris E. Sim., Phlegra Bresnieri Cuv. — nubecula Costa: Epeira dalmatica

- Dls., *Larinia Dufourii* E. Sim., *Cyrtarachne ixodoides* E. Sim. — *capiticrassus* Fertou: *Epeira Reddii* Scop., *Drassus dromedarius* Walk. — *effodiens* Fertou: *Nemesia* (juv.). — *holomelas*: *Nemesia arenicola* E. Sim. — *pectinipes* L.: *Epeira dalmatica* Dls. — *plicatus* Costa: *Ctenizia Sauvagei* Rossi. **Ferton**, Ann. Soc. Entom. France, vol. 70 p. 116. — *holomelas* Costa (p. 115). — *effodiens* Fertou (p. 116). — *pectinipes* V. D. L. (p. 116—117). — *argyrolepis* Costa (p. 117—118) vielleicht nur eine Var. v. *rufipes*, von der er sich nur durch die Färbung unterscheidet. Beschr. d. Eies).
- radoszkowskyi* (Erschenow in litt.). *Radoszk.* ist ein *Salius*, s. dort. Originalbeschr. u. Beschr. d. Type. **Enderlein** (3) p. 152—153.
- Für Schottland neu: *unguicularis* Thoms. bei King's Cross, Arran. **DalGLISH** p. 7. Selten: *spissus* Schiödte, Dundonald, Ayrshire.
- analisis* Fab., weit verbreit. östl. Sp. **Cameron**, Proc. Zool. Soc. London, 1901, vol. 2 p. 24.
- (*Evagethes*) *bicolor* Lep. auf den Kalkdünen bei Upper Halling. **Elgar**, H. p. 17.
- approximatus* Sm. in North Wales. **Ralph C. Bradley**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. (12) 37 p. 259.
- spinus* Schiödte u. *fumipennis* Zett. Nistgewohnheit. **Nielsen** (2).
- unguicularis* Thoms. von Golpie. **Evans** p. 48.
- viaticus* L., Castle Bellver; below Castle del Rey, Pollensa; Monte Sentuiri, Pollensa. **Saunders** (1) p. 208.
- bovei* **Mantero**, Bull. Soc. Entom. Ital. vol. XXXIII p. 197. — *silvestrii* p. 197 (beide aus Patagonien).
- illinoensis* **Robertson**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. XXVII p. 202 (Nordamerika).
- csikianus* **Kohl**, Zool. Ergebn. etc. Zichy, vol. II p. 160 (Sibirien).
- capiticrassus* n. sp. (gehört zur Gruppe d. *rufipes* L., untersch. „l'épaisseur des tempes est un peu plus grande que celle du scape vu en dessus; l'intervalle des deux ocelles postérieurs est égal à leur distance au bord des yeux). **Ferton**, Ann. Soc. Entom. France, vol. 70 p. 118—119 ♀ (Corsica, im Frühling, Provence) nebst Var. (von Vitrolles). — *cingulatus* Rossi p. 120. — *nubecula* Costa. — *brachycerus* (charakt. durch seinen kurz., dick. Antennen) p. 121 ♂ (Bonifacio). **Ferton**, Ann. Soc. Entom. France, vol. 70. p. 121. Beute, Nest u. s. w.
- singaporensis* (*niger*, dense argent.-pruinosis; *alis* hyal., *apice* fumato. — Steht pulverosus Sm. am nächsten, diese untersch. sich dadurch, dass die Trübung im Flgl. unterhalb der 1. submarg. Zelle beginnt u. Sporen fast so lang wie der Metatarsus). **Cameron**, P., Proc. Zool. Soc. London, 1901 vol. II p. 21—22 ♀ (Singapore).
- Lage des Eies an den Beutethieren von *viaticus* L., *chalybeatus* Schiödte, *niger* F. — *vagans* p. 127. — *effodiens* Fert., *argyrolepis* Costa, *rufipes* L. — *cinctellus* sp., *nubecola* Costa. — *pulcher* F. **Ferton**, p. 127—128. — *holomelas* Costa. Nymphe. Taf. III Fig. 5. — *vagans* Costa. Ei auf *Nemesia*. — *badia* Auss.
- (*Homonotus*) *ibex* Sauss. ist nach **Enderlein's** Untersuchung von Originalen das ♂ zu *P. (Salius) petiolaris* Sauss. ♀. **Enderlein**, Stettin. Entom.

Zeit. 62. Jhg. p. 151—152. Körperlänge in mm: ♂ 7—10, ♀ 10—14, Flgl. ♂ $6\frac{1}{2}$ —9, ♀ 9—11. — radoszkowskyi zu *Salix* zu ziehen. Beschreib. p. 152.

- *Fab.* ist wohl die schwierigste Gatt. aller Fossoria. Von d. über 400 paläarkt. Spp. sind ungefähr 150 schwarz mit rother Abdominalbasis u. besitzen eine grosse Gleichmässigkeit (im Auss. u. Farb.), dass nur kleine u. feine morphologische Charaktere dazu dienen können die Spp. zu trennen. Die ♂ zeigen gute Unterscheidungsmerkmale, die ♀ nicht, so dass die Bestimmung d. letzt. sehr schwierig ist, zumal zusammengehörige Geschlecht. nur selt. gefund. werden. Weil die Unterschiede nur gering, hat auch Saunders einige rothleibige ♀, die anscheinend deutlich verschied. sind, zurückgestellt für spätere Beschr. **Saunders**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 540—541. — (*Pseudopompilus*) *Antonini* De Stef. = *cyanopterus* Morav. (Biskra, La Calle) p. 541. — (*Ferreola*) *sagax* Kohl (La Calle, Sand Hill's, Medea Wald bei Kef-el-Azeri, auf *Daucus setifolius*, Biskra) p. 541. — (*Planiceps*) *castor* Kohl (Algiers, Constantine) p. 541. — (*Planiceps*) *hirtipennis* p. 541—542 ♀ (Biskra, auf *Ammi visnaga*). — *breviscapus* Mor. (Biskra). — sp. (?) (schöne Sp., d. vor. verw., grösser mit rothen Beinen. Die Form der Antennenbasis u. die milchig. opalisirend. Flgl. machen das Thier (♂) fast identisch mit *breviscapus* Mor. u. *galactopterus* Kohl. p. 542 ♂ (Biskra). — *sexmaculatus* Spin. (Biskra) p. 542. — (*Aporus*) *gracilis* Klug (Biskra). Das von Saunders hierhergestellte ♀ scheint ziemlich genau mit Klug's Abb. in *Symb. Physicae* übereinzustimmen. Beschreib.; *amoenus* Klug scheint nahe verwandt zu sein. Beschr. eines ♂. — (*Aporus*) *Friesei* (*gracilis* Klug nahe) p. 543—544 ♀ (Biskra). — (*Aporus*) *Vachali* (von d. Verw. versch. durch Bau des Thorax) p. 544—545 ♀ (Biskra, auf *Ammi visnaga*). — (*Aporus*) *argyrellus* Klug. Bemerk. zur 2. Cubitalad.; zur Farb. etc.) p. 545 (Biskra). — (*Aporus*) *fumigatus* Klug (Bôna, Biskra). — (*Aporus*) *melanurus* Klug p. 545. — (*Evagethes*) *cinerascens* p. 545—546 ♀ (Biskra, auf *Ammi visnaga*). — (*Evagethes*) *orichalceus* p. 546—547 ♀ (Biskra). — (*Evagethes*) sp. (?) u. (*Ev.*) sp. (?), beide ♀ u. Abd. an Basis roth (Biskra). — *quadripunctatus* Fab. (Biskra, Bône, Fundpflanzen) p. 547. — *ornatus* Klug ♂ (Biskra) p. 547. — *rufipes* L. (Le Tarf, ♂ auf *Foenicul. vulg.* Färb.; ♀ (?) (Bône, auf *Euphorbia paralias*, Färb.). — *cliens* Kohl (Biskra, Bône) p. 547—548. — *coccineipes* p. 548 ♀ (Biskra, La Calle). — *picticus* (vor. ähnl.) p. 548—549 ♀ (Biskra). — *niveus* (wie ein schneeweiss. plumbeus, aber versch. durch das blassgelb. (testaceus) Flgl.-Geäder, das behaarte Propodeum, die breit. Zähne am vord. Metatarsalkamm u. d. weiss. Sporen) p. 549 ♀ (Dunes, Biskra), — plumbeus F. (diverse Fundorte in Algier. — Ein Stück mit Beute, braune Spinne). — *sexspinosus* p. 550—551 ♂ ♀ (Biskra, am Rande der Sandhügel zwischen Hamman es Salahin u. an ein. klein. mit Schilfrohr gesäumt. Sumpf ungefähr 1 Meile W.S.W. von Hamman; Capsid.-Larv. besuchend od. eine Art von Homopt. auf *Thymelaea microphylla*). — sp. (?) (♀, wahrscheinl. notorius nahe). — *dubitabilis* (*teterrimus* Grib. ähnlich, cui forma et colore similis metatarsorum anti-

corum spinis quattuor, brevioribus, capite et thorace minus hirtis, nec non genis inter oculos et mandibulas multo brevioribus satis distinctus. — ab intacto Tourn. differt cellula cubitali tertio subtrapezoidali, propodeique lateribus haud longitudinaliter rugosis) p. 551—552 ♂ (Biskra). — *Fertoni* (gehört zur Gruppe *platycanthus*, *Kizilkumii* etc., versch. durch Zahl d. Dornen am vord. Metatarsus) p. 552—553 ♂ (Biskra). — *excisilabris* p. 553—554 ♂ (Bône, auf *Euphorbia paralias*). — *approximatus* Sm. (charakt. d. Gestalt des 8. Ventralsgm. Ist wahrsch. = *bifidus* Morawitz u. *haereticus* Tournier) p. 554 ♂ (Biskra). — *sp. (?)* ♂ (Le Tarf) p. 554. — *viaticus* L. (Biskra, Le Tarf). — *sp. (?)* (Biskra, Dünen auf d. Wege nach Zibans). — *chalybeatus* Schiödt (Biskra). — *Moricei* (Gestalt wie d. meist. rothleibigen Arten d. Gatt., gehörig zu Kohl's Sekt. I) p. 555—556 ♂ ♀ (Constantine, Biskra). Unter den Arten, die mit weiss. Orbitalzeich. beschrieb. werden, scheint sie am nächst. *P. effodiens* zu stehen. Verglichen mit ein. vom Autor zugestellt. Stück untersch. sich *Moricei* durch das Fehlen des dichten Bartes an der Useite der Mand.; — *montandoni* Tourn. zeigt keine Beborstung am Apikalsgm.; *signaticeps* hat das 3. Antennenglied so lang wie das 4. u. Schaft zusammen. — *vagans* Costa hat die Basis des Pronot. mehr oder weniger bloss. — Die weiss. Orbitalstriche variiren bei den verschiedenen. Individuen in d. Ausdehnung u. zeigen bei einigen die Neigung zu schwinden.

- *sp. (?)* (1). (Dem vorig. ähnl., aber kleiner, mit 3 kurz. schwarz. Dorn. am vord. Metatarsus, Orbitalzeichnung wie dort, vorn u. hint. sichtbar) p. 556 ♀ (Biskra). ♂ von dem der vorig. Sp. deutlich versch., die ♀ nicht. — *Sp. (?)* (2) (vorig. ähnl., aber 4 längere schwarz. Dorn. im Kamme d. vord. Metatarsus. Orbitalzeichn. nur als klein. Fleck hinter d. Auge sichtbar, Pronotum scharf gewinkelt, Propodeum hinten und seitlich behaart, Flgl. sehr dunkel. Abd.: Mitte d. erst. u. Basis d. 2. Sgms. roth, 6. Sgm. dorsalwärts mit einigen „exserted“-Haaren) p. 556 ♀ (Algier). — *Sp. (?)* (3) (rothleib. Sp., variirend bis ganz schwarz, Orbitalzeichn. gerade noch sichtbar. Prothorax hint. gewinkelt. Propod. hint. an d. Seiten behaart. 5. Ventralsgm. in d. Mitte ausgeschn., 6. zusammengedrückt u. kielförmig, Seit. concav, etwa wie bei *fumipennis* Dahlb.) p. 556—557 (Biskra). Vielleicht das ♂ zu 1.

Neu sind also: *bovei*, *brachycerus*, *capiticrassus*, *cinerascens*, *csikianus*, *coccineipes*, *dubitabilis*, *excisilabris*, *fertoni*, *friesei*, *hirtipennis*, *illinoensis*, *moricei*, *niveus*, *orichalceus*, *picticrus*, *sexspinosus*, *silvestrii*, *singaporensis* u. *vachali*.

Ageniinae.

Agenia verfert. Erd- u. Bahnbauten. Rudow p. 363.

- Die Gatt. im Sinne Kohl's bisher nicht von Indien bek. **Cameron, P.**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 5 p. 19. — Die ♀ bekannt durch Haarbüschel an d. Max. v. *Pseudagenia* erkenntl., ob ab. für die ♂ ausreicht. bekannt. Gattungsscharakt. vorh.? — *diana* (nigr., basi mandib. alba, ap. clypei inciso; al. hyal., nervis stigmataeque nigr.) p. 19 ♀ (Khasia).

structor *Ferton* u. *variegata* L. sind auch in ihren Gewohnheiten von einander verschieden. **Ferton** p. 89.

— — *Fert.* (Algier: Bône, hillside in the Plaine des Karézas, Bône, auf *Cynanchum acutum*). **Saunders**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 562.

variegata von Selsley, Glos. u. Nevin, N. Wales; selten. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 11 (36) p. 67. — *variegata* **Ferton** p. 127. Biologisches.

Pseudagenia carbonaria Dahlb. Nistgewohnheit. **Nielsen**.

malayana (ähnelte *arethusa* Cam., doch kleiner etc., nigra femorib. post. rufis; alis hyal.) **Cameron, P.**, Proc. Zool. Soc. London, 1901 vol. II p. 20—21 ♀ (Singapore). — *arethusa* (nigr., femor. tibiisque anter. late rufis, abdom. apice supra albo; alis hyal. — Bingham's Sekt. C Fauna of India Hym. I p. 108) ♂ p. 20—21 in Anmerk. (Khasia).

Planicipinae.

Planiceps fulviventris Costa. Beutethiere auf Corsica: *Nemesia badia* Auss. u. *Nemesia* juv. **Ferton** p. 125.

fulviventris Costa = *helveticus* Tourn., auf Corsica ganz rot. **Ferton**, Ann. Soc. Entom. France vol. 70 p. 88.

— — Costa = *helvet.* Tourn. Gewohnheiten wie *helveticus*, daher hält **Ferton** beide f. identisch. t. c. p. 121—122.

helveticus. Biologisches. **Ferton** p. 127.

Ceropalinae.

Ceropales verfertigt Erd- u. Lehmbauten. **Rudow** p. 363.

albicinctus Ross. (variabel in d. Grösse, ♂ kleiner als ♀. Alle gehören zur Varietät mit sehr breit. gelb. Abdom.-Bändern, die oft das halbe Sgm. einnehmen). **Saunders**, Trans. Entom. Soc. London 1901 p. 563 (Biskra, auf *Ammi visnaga*; Le Tarf, auf *Foeniculum vulgare*). — *variegatus* Fab. (Biskra — auf *Ammi visnaga*).

maculata Fabr. bei Levenside Moor, Bonhill. **Malloch** p. 6.

Vespidae (Fam. XXVIII) ¹⁾.

Autoren: Anglas, Ashmead, Barrington & Moffat, Cameron, Ferton, Oudemans, Perkins, Robertson, Rudow, Walker.

Verbreitung schwedischer Vespidae: Nordenström p. 206.

Biologie europäischer: Ferton p. 128—139.

Nester: Rudow.

Sonderbares Nest: Oudemans.

Vespide in's Wass. gefall., von *Dytiscus*-Larven angegriffen, sticht die letztere, die an den Folg. in wenig. Stunden stirbt. **Bothe, H.**, Illustr. Zeitschr. f. Entom. 5. Bd. p. 202

Vespidae. Die Kunstbauten ders. können nach **Rudow** (teilw. nach Sauss.) p. 346—347 in folg. Gruppen eingeteilt werden:

¹⁾ Verbess. p. 415 des vorig. Berichts: *Vespidae* (Fam. XXVIII).

- I. Hüllenlose Waben, mit meist nur einer Scheibe, Gymnodome: Polystes.
- II. Wabennester mit Papierhüllen, Calyptodome: Die meisten Arten der Gatt. *Vespa* wie *crabro*, *silvestris*, *saxonica*, *media* u. a.
 1. Unterabteil.: Hülle durch natürliche Wände in Baum- oder Erdhöhlen ersetzt: *Vespa vulgaris*, *germanica*.
 2. Unterabteil.: Nester mit geschloss. Hülle, säulenwabige, Stelocytaren, Scheiben durch Säulen an einander hängend, wie z. B. *V. crabro*.
 3. Unterabteil.: Nester mit ungeschloss. Hülle, deckelwabige, Phragmocytaren. Hülle aus dicker, pappenartiger Masse: *Tatua* u. a.
 4. Unterabteil.: Poecilocytaren, ähnlich den vorigen, Hülle aber von dünner Papiermasse: einige *Polybia*- u. *Nectarinia*-Arten.
 5. Unterabteil.: Hülle völlig umschliessend aus dicker fester Masse bestehend: Kartonwespen: *Polybia sericea* u. a. *Chartergus*.
- III. Rectinide, mehrere Waben an langem Stiele freihängend: *Ischnogaster*, *Rhaphigaster*, *Mischocytarus*.
- IV. Einfache, kugelige oder halbkugelförmige Endzellen an Zweigen oder glatter Unterlage: *Eumenes*.
- V. Flaschenförmige Endzellen zu Gruppen vereinigt auf glatter Unterlage: *Odynerus*.
- VI. Erdzellen in Höhlen: *Odynerus*.
- VII. Dicke, feste, unregelmässige, mehrzellige Erdballen um Zweige herum befestigt: exotische *Eumenes*.
- VIII. Gelegenheitsbauten: *Odynerus*.

Uebergänge zwischen den Gruppen finden vielfach statt.

— Feinde: *Raphidia*.

Alastor eriurgus spinnt Kokon. **Peckham, G. W. u. E. G.** (cf. vor. Bericht).

Apoica virginea F. fliegt nur bei Nachts aus. **Ducke** (1) p. 29 in Anmerk.

Chalybion (stahlbl. Spp., von *Pelop.* abgesondert). Diese weicht im Nestbau von *Pelopaeus* ab. **Rudow** p. 365. — *violaceum* Db. mit walzenförm., gekrümmt. Erdzellen an Zweigen, p. 365. — *cyaneum*, Bau. p. 366.

Chartergus chartarius Oliv. Kartonwespe. Beschr. des Nestes. **Rudow** p. 344.

Hoplopus. Nester. **Rudow** p. 353 u. 354.

Icaria leptogaster (*flava*, capite supra, mesonoto medioque pronoti nigris; alis hyalin., nervis stigmatique testaceis. — Grössere Sp. als *sulciscutis* etc.). **Cameron, P.**, Proc. Zool. Soc. London 1901 vol. 2 p. 29 (Patalung, Malay. Peninsula).

sulciscutis (pallide flava, supra late nigro-maculata; pedibus pallide flavis, tarsis nigris; scutello sulcato; alis hyalin., stigmatique nervisque nigro-fuscis). **Cameron, P.**, Proc. Zool. Soc. London, 1901 vol. 2 p. 30 ♂ (Bukit Tomah, Singapore).

Leionotus. Nester. **Rudow** p. 353 u. 354.

Nesodynerus n. g. (Intermediate tibiae without a true calcar, only with short spines at the apex. Propodeum smooth, basal abdom. sgm. evenly curved

backwards from near the petiole) **Perkins**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 267. — 2nd ventral sgm. simply flat beneath behind the costal: *rudolphi* D. T. — 2nd with a shallow but evident triangular depression behind the costae: *optabilis* n. p. 267 (Oahu). — *oblitus* Perk. (an gen. nov. — Intermediate tibiae without a calcar, 2nd ventral sgm. without a depression, its basal portion very large a. tumid much longer than the costae) p. 267.

Odyneridae. Echte Mauerwespen, mit einer Menge verschiedener Bauweisen. **Rudow** p. 350.

Odynerus fragilis Sauss. Nest an ein. Schilfblatt aus Borneo. **Rudow** p. 358. Schmarotzer; ausserdem Arten, die friedlich mit ihnen hausen, p. 355.

paraënsis Sauss. und *brachygaster*. Beschr. der Nester und Bauten. **Rudow** p. 354. — *brevithorax* p. 355.

Odynerus. Uebersicht über die Sp.: *frater* D. T., *pseudochromus* Perk., *leiodemas* Perk., *paludicola* n. sp., *homoeophanes* n. sp., *eucharis* n. sp., *oahuensis* D. T., *xerophilus* n. sp., *nautarum* Sauss. (♀ = *nesotrepes* P.), *waianaeanus* Perk., var. = *flosculus* Perk., *acaelogaster* Perk., *Pseudopterocheilus* n. g. *relictus* Perk. (Type: Odynerus pterocheiloides Perk.), *lithophilus* n. sp., *acyanus* n. sp., *nigripennis* Holmgr., *epipseustis* n. sp., *Nesodynerus* n. g., *rudolphi* D. T., *optabilis* n. sp., *erro* Perk., *montanus* Sm., *illudens* n. sp., *iopteryx* Perk., *unicus* Perk., *Nesodynerus oblitus* Perk. (an gen. n.?), *pterophaennes* Perk., *dubiosus* Sm., *threnodes* Perk. — *paludicola* (Prothorax and mesopleura without red spots. ♂ unbekannt) p. 265 (Oahu). — *homoeophanes* (Face with a red line entering the sinus of the eye, mesothorax with red lines) p. 266 (Oahu). — *eucharis* (Face without such a line, mesothorax entirely black) p. 266 (Oahu). — *xerophilus* (mandibles in ♂♀ entirely or almost entirely red. ♂ with the clypeus extremely deeply emarginate at apex, that of the ♀ distinctly but much less deeply) p. 266 (Oahu). — *lithophilus* (im Gegensatz zu *Pseudopterocheilus*: Maxillary palpi of ♀ normal, head of ♂ closely punctured in front, its maxillary palpi less developed) p. 267 (Oahu). — *acyanus* (wings for the most part fuscous, shining, but without distinct blue iridescence. ♂ clypeus a. thorax entirely black; ♀ unknown) p. 267 (Oahu). — *epipseustes* (im Gegensatz zu *nigripennis* Holmgr., bei der: Costae of 2nd ventral sgm. more or less obsolete, sind hier: Costae long and well-developed) p. 267. — *illudens* (mesothorax very dull, scutellum with sparse and feeble punctures) p. 267 (Oahu).

Die Tabelle lässt leicht die 27 Odyn.-Sp. (siehe oben) von Oahu von einander unterscheiden, vielleicht mit Ausnahme von *O. pseudochromus* von *leiodemas* u. *O. threnodes* von *dubiosus*. — *lithophilus* ist eine variable Sp., vielleicht = Syn. zu *acaelogaster*. Die Type von *nautarum* de Sauss. scheint verloren gegangen zu sein.

— Spp. auf Corsica. **Ferton**, Ann. Soc. Entom. France, vol. 70 p. 129 sq.: *gallicus* Sauss. p. 129, *mauritanicus* Lep. Nester, Ei etc. — *punctuosus* (bord libre de la tête échancré, angles latéraux antérieurs du pronotum obtus; 1er Sgm. avec une ponctuation profonde et grossière au voisinage de la partie arrondie. — Steht *fastidiosissimus* nahe, doch kleiner, auch *O. Rossii* Lep. ähnlich, ♀ untersch. sich davon durch *chaperon échancré*, *ponctuation plus grossière* sur le 1er Sgm. de l'abd.) p. 130

- 131 ♂ ♀. (Corsica). — *fastidiosissimus* Sauss., Rossii Lep., *egregius* H. Sch., p. 131. — *simplex* Fabr. p. 131—132. — *callosus* Thoms., *tripunctatus* Fabr. u. *Blanchardianus* Sauss. p. 132. Nester u. s. w.
- mephitis* (*niger*, *flavo-macul.*; abdominis basi rufa; pedibus flavis, femoribus rufis, tibiis posticis nigris; alis hyalinis, stigmatibus fuscis). — Gehört zur Sektion ohne Naht auf dem Petiolus u. steht bei *O. miniatus* u. *O. diffinis*. **Cameron, P.**, Proc. Zool. Soc. London, 1901, vol. 2 p. 30 —31 ♀ (Ceylon).
- egregius* H.-Sch., *Blanchardianus* Sauss., *minutus* F., *variegatus* F., *reniformis* Gmel. etc., bei Jerichow. **Schmiedeknecht** p. 57.
- Sp. von Norfolk. **Wainwright**.
- Merkwürdig. Nest hinter ein. Bilde in der Stube. Beschr. desselb. **Doncaster, L.**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 228—229.
- Gewohnheit, das Ei am Ende eines Fadens aufzuhäng. **Ferton** p. 133—137. — parietum. Beobachtung. p. 142—143.
- aurantiacus*. Geschlechter. **Mocsáry**, Zool. Ergebn. etc. Zichy vol. II p. 164.
- parietum* L. Nest in einem Stengel v. *Arundo donax*. **Ferton**, Taf. I Fig. 8.
- gracilis* ♀ bei Ran Dan Wood, bisher nicht bei Birmingham beobachtet. **Wainwright**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 102.
- laevipes* Shuck. Zuchtnotiz. **Morice** (9) p. 97.
- spinipes* L. zu Dundonald, Barr, für Schottland neu. **DalGLISH** p. 7. — — in der Perthshire'schen Liste. **Evans, Will.** p. 47.
- trimarginatus* Zett. von Levenside Moor; Bonhill. **Malloch** p. 6.
- u. sp. von Hawaii, darunter 1 hermaphroditisches Stück u. zwar in Färb. u. Morphologie. Tabell. Gegenüberstell. ders. **Perkins**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 139—140.
- Neu sind also: *acyanus*, *apopkensis*, *australis*, *bicornis*, *bifuscus*, *clypeatus*, *epipseustes*, *eucharis*, *floridatus*, *fundatiformis*, *histrionalis*, *homoeophanes*, *illinoensis*, *illudens*, *lithophilus*, *mephitis*, *oculeus*, *paludicola*, *punctuosus*, *xerophilus*, *zendaloides*.
- Polistes gallica* L. auf Minorca u. Majorca. **Saunders** (1) p. 208. — Variation, Zurückziehen des Stachels. **D. E. Rovart**. Lapok vol. VIII p. 180 u. id. Revue p. 21. — *gallica* L. Vereinigung mehr. Kolonien zu ein. Nest. **Ferton** p. 128—129.
- hebraeus* Fab. Verbess. Bemerk. hierzu. **Perkins**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 264.
- sagittarius* Sauss. von Biserat, gemeine östl. Sp. **Cameron, P.**, Proc. Zool. Soc. London, 1901, vol. 2 p. 29.
- aurifer* Sauss. u. *bellicosus* Cress. aus Californ. nach Hamburg eingeschleppt, tot an getrockn. Pfirsichen. **Kraepelin**, p. 193.
- Polybia fasciata* Sauss. u. *sericea* Ol., *oecodoma* Sss., *Picteti* Sauss. (Venez.), *bifasciata* Sss. (Espiritu Santo) [Nest von d. Gröss. eines silb. 5-Markstücks], *pygmaea* Fbr., *pallipes* Oliv., *sericea* Ol., *rejecta* Fbr. Beisp. von Nestern nebst Beschr. **Rudow** p. 340—344. — Desgl. von *cayennensis* Fbr., *urnaria* [Name in kein. Wespenwerk genannt], *scutellaris* Wht. [Nest mit mindest. 60 000 Einwohn.] p. 344.

Pseudopterocheilus n. g. (Type: *Odynerus pterocheilodes* Perk. — Maxillary palpi of ♀ very long and beautifully fringed with long hairs; ♂, front of head rather remotely punctured, maxillary palpi more developed. — Mit *relictus*) **Perkins**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 266.

Rhygchium im Gebiete des Mittelmeers heimisch, nistet in ähnl. Weise wie *Eumenes*. Besch. d. Baues. **Rudow** p. 357.

oculatum Fbr. soll in hohlen Pflanzenstengeln nisten u. s. w. p. 357.

Symmorphus murarius L. Besch. d. Nester. Leicht zerbrechlich, doch widerstandsfähig. **Rudow** p. 352. — *crassicornis* Pz. Nestanlagen, p. 352—353. — *bifasciatus* Fbr. u. *trimarginatus* Sauss. p. 353. — *crassicornis*. Nest in dem hohlen Rücken eines aufgeschlag. geblieben. Buches. p. 355.

Synoeca baut Anfangs nach Art von *Polistes* seine Wohnungen, umschliesst aber später mehrere parallel gelagerte Waben mit ein. Hülle. Beschreibung d. Nests. **Rudow** p. 345.

Tatua morio Fbr. Bau äusserlich ähnlich dem d. Kartonwespe, aber innere Zellen u. Wabenordnung anders. **Rudow** p. 344.

Vespa cuneata Fbr. Bau anfangs nach Art unserer Wespen, doch wird die äussere Hülle später nicht vollendet. Nur die erstere Wabe wird glockenförmig bedeckt, die andern lieg. frei. **Rudow** p. 339. — *vulgaris* L. und *germanica* bis jetzt nur als Erdnister bek. Benutzung von Erdhöhlen, mehr. enge Fluglöcher bis zu $\frac{1}{2}$ m Länge in Verbindung stehend, p. 339. — Viele Einmieter u. Schmarotzer: Hym.: *Tiphia femorata* Fbr., *Chrysis* 3 Sp., *Foenus jaculator* Jur., selten u. wohl mehr im Süden u. Osten: *Tryphon vesparum* Rbg., Col.: *Metoecus paradoxus* L., *Quedius dilatatus* Fbr., *Dermestes lardarius* L., *Nitidula Anthrenus* etc. Acar.: *Gamasus coleopt.*, zahlr. Dipt. u. Lepid.; Pilze p. 339—340.

— Innere Entwicklungsvorgänge bei der Metamorphose. **Anglas**.

— sticht eine *Dytiscus*-Larve, die nach mehreren Stunden stirbt **Bothe** Titel im vorig. Bericht p. 295).

— Wie ergreift u. verzehrt eine Wespe ihre Beute?:

Sie stürzt sich wie ein Raubvogel auf das Beutethier, zwingt es zwischen seine kräftigen Beine, beisst mit ungemein schneller Bewegung Kopf, Beine, Fühler, Flügel ab u. schält die Chitindecke des Kopfes los (wie ein Kanarienvogel seine Hanfkörner). Hierauf schneidet sie mit rundlichem Schnitt das letzte Drittel (die Spitze) des Hinterleibes ab (wird fortgeworfen und nicht genossen) u. schält das übrige heraus. Auch das Verzehren geht, wie die ganze Handlung, schnell vor sich.

— Verhältniszahlen der in Wicklow gefundenen Spp. **Barrington & Moffat**, Irish Naturalist vol. X p. 197—201.

affinis Fab. (wahrsch. eine Var. v. *Vespa cineta* Fab.). Die Königin der New Britain-Form ist nicht von den normalen verschieden, die Arbeiter sind am Thorax u. Abdom. dunkler, die bräunliche Färb. entweder sehr dunkel, viel dunkl. als gewöhl. oder gänzlich obliterirt). **Cameron, P.**, Proc. Zool. Soc. London 1901 p. 241 (New Britain).

austriaca Panz. bei Bonhill u. bei Paisley. **Malloch** p. 6.

— — ♂ **Pack-Beresford**, Irish Naturalist vol. X p. 195.

cineta Fab. von Biserat; gewöhl. indisch. Form, nicht die malayische var. *affinis*. **Cameron, P.**, Proc. Zool. Soc. London 1901 vol. 2 p. 29.

- Crabro. „Hornüsse, Hürnaus oder Horlitze“ in Casp. Schwenckfeld's Entom. **Sign. Schenkling**, Insektenbörse 17. Jhg. p. 123.
- major „grosse Wespe“ u. V. minor „kleine Wespe“ in Casp. Schwenckfeld's Entom. Insektenbörse 17. Jhg. p. 118.
- saxonica u. holsatica (silvestris) u. norvegica. Bemerk. zum Nestbau, Anhänglichkeit an den alten Nistplatz (Ausbessern alter Nester) u. s. w. Insektenbörse 18. Jhg. p. 269 (Briefkasten).
- vulgaris. Besch. u. Abb. (Taf. 2 Fig. 1 u. 2 u. Textfig. 3 p. 99) eines riesigen Nestes mit mehreren daran befindl. Eigentümlichkeiten. Fundort in Arnheim in einem ausser Gebrauch gestellten Nebengebäude zwisch. 2 durch einen Plafond und einen Bretterboden geschieden. Räumen, 2,50 m vom Erdboden. Aeussere Gestalt und Grösse. **Oudemans**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. 1901 p. 97—100. — Zahl der Waben (bemerkenswert dabei noch eine sehr kleine, unabhängig von allen anderen, frei von der Innenseite der Hülle herabhängende Wabe). Grösse und Gestalt der Waben, Anzahl u. Art der Zellen (mit Abb. Fig. I—VIII p. 120).

Eumenidae (Fam. XXIX).

- Abispa splendida spinnt keinen Kokon. **Peckham, G. W. u. E. G.** (cf. vor. Bericht).
- Ancistroceros parietum L. Nest in einer leeren Militärpatronenhülse von Messing. **Rudow**, Insektenbörse 18. Jhg. p. 76. — Desgl. in einem unbrauchbar gewordenen Vorhängeschloss.
- Ancistrocerus parietum. Besch. u. Anlage d. Nestes. **Rudow** p. 351—352. — Scharfsinn bei d. Benutzung aller Arten von Schlupfwinkel. Nest in den Falt. ein. Zeitung, in unbenutzt. Thürschloss, in umgestülpt. Blumentopf, Lücken eines Fensterbrettes, Luftloch über dem Fenster. — Die Nest. d. and. Spp. weichen wenig od. garnicht ab. p. 352.
- Die Spp. nisten mit Vorliebe in hohlen Pflanzenstengeln von abgestorb. Zweigen etc. p. 352. — parietum L., sonstige Bauart p. 356.
- Neu: *sexcingulatus* **Cockerell**, Psyche vol. IX p. 185 (New Mexico).
- Eumenes Latr. Ueber die Nester. **Ferton**, Ann. Soc. Entom. France, vol. 70 1901 p. 132—133. Kuppelbauten etc. — Parasiten p. 133; von Eu. pomiformis ist es auf Corsica eine Chrysis.
- Gewohnheit, das Ei am Ende eines Fadens aufzuhängen. **Ferton** p. 133—137. — Zelle Taf. III Fig. 6, Schnitt Fig. 7.
- circinalis Fabr. 3 sehr dunkle u. unter sich in der Färbung variable Stücke von Patalung, Singora, Malay. Peninsula. **Cameron, P.**, Proc. Zool. Soc. London 1901 vol. 2 p. 30.
- pomiformis R. u. coarctatus L. lieben für die Nestanlage besondere Schlupfwinkel. **Rudow**, 18. Jhg. p. 76. — Sonstige Nistorte.
- Eumenes. In Deutschland nur 2 Spp.: pomiformis Rsi. u. coarctatus L., in S.-Europa u. Tropen zahlr. stattliche Formen. Besch. d. Nester d. 2 deutsch. Spp. **Rudow** p. 347—348. Zähigkeit d. Larv. ist gross. — dimidiatus var. mediterraneus Krb. Sichel Sauss. gleich. den. d. vorig. — coangustata Rsi.

Nest wie das d. unsr., doch grösser. Beobachtung beim Bau. Ei hängt oft an fein. Fad. von d. Decke herab. Nahrung: *Hylotoma berberidis* p. 348—349. — *arbustorum* H. S., *unguiculus* Vill. Charakt d. Nester d. Tropenbewohner: *Eu. canaliculatus* Ol. (Brasil.), *Lepelletieri* Sss. (Senegal), *Smithi* Sss. (Ostafrika), *flavopictus* Bl. (Ostindien), alle aus fest. plastisch. Thon p. 349—350. — *tinctor* Chr. (Afrika). Nest: Grösse ein. Kinderfaust, Gestalt u. Anseh. einer Kartoffel aus fester Erde um mehr. zähe Grasstengel gebaut.

— n. sp. bei Jericho. **Schmiedeknecht** p. 57.

Pelopaesus spirifex L. auf Minorca u. Majorca. **Saunders** (1) p. 208.

— Bauten von *spirifex* Db. u. *destillatorius* Db. **Rudow** p. 364. Mit dieser gleichzeitig: *Larra anathema* Db. (wohl bei ihr schmarotz.), *Stilbum splendidum* Fbr. — *lunatus* Db., *figulus* Db., *fistularius* Db. p. 365. — Die amerikan. Spp. lieben grosse Abwechslung in ihren Bauten, p. 367—368.

Pterochilus n. sp. bei Jericho. **Schmiedeknecht** p. 57.

Rhynchium brunneum Fabr. von New Britain. Die schwarze Färb. auf den 3 Basalsgm. erstreckt sich fast bis zum Apex d. Sgm., die nur ein schmal. rotes Band zeigen. Flügel reichlicher gefärbt als sonst. **Cameron, P.**, Proc. Zool. Soc. London 1901 p. 243.

Synagris calida L. Beschreib. d. interess. Baues. **Rudow** p. 356. — Eine Sp. aus Usambara, Afrika baut eine graue Erdkugel von nur 3½ cm Durchmesser um den Dorn einer Akazie. Inhalt: Spinnenreste. **Rudow** p. 356. — Sonstige Bauten aus Japan u. Nordamerika.

Taprobanae (*nigrum*, abdom. flavo-lineato; femoribus rufis; alis violaceohyalinis, nervis stigmatique nigris). **Cameron, P.**, Proc. Zool. Soc. London 1901 vol. 2 p. 31—32 ♀ (Ceylon). — Sieht auf den ersten Blick einer klein. Rh. flavomarginatum ähnl., aber hinreichend verschied.; Seiten des Mediansgm. nicht winklig vorgezogen.

Masaridae (Fam. XXX).

Ceramius lusitanicus Kl. in d. Umgebung von Montlouis en Cerdagne. Biolog. Bemerk., Nest, Ei u. s. w. Parasit: *Ceramius lusitanicus*. **Ferton**, Ann. Soc. Entom. France vol. 70 p. 137—139, Zelle Taf. I Fig. 9 u. 10.

C(h)elonites abbreviatus Vill. zu Poitou. Nest etc. **Ferton**, Ann. Soc. Entom. France vol. 70 p. 139.

— — Vill. (= *Masaris apiformis* Pz.). Ueber den Bau noch wenig bek. Beschr. eines solchen aus Montpellier u. eines anderen aus S.-Am. **Rudow** p. 350. — Neu: *hieronticus* bei Jericho. **Schmiedeknecht** p. 57.

Masaris vespiformis F. bei Jerichow. **Schmiedeknecht** p. 57.

Paramasaris n. g. **Cameron**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. XXVII p. 311. — *fuscipennis* p. 312 (New Mexico).

Chrysididae (Fam. XXXI).

Autoren: du Buysson, Cameron, Ducke, Mocsáry, Séménow.

Chrysididae sind wahre Schmarotzer, die Kuckuke unter den Insekten. **Rudow** p. 355—356.

- von Pará. 16 Spp. in allen Monaten, ohne irgend eine Regelmässigkeit in der Erscheinungszeit. **Ducke, A.** (3) p. 356.
- von Oesterreich-Schlesien: **Ducke, A.** (3).
- seltenere Arten d. österreichisch. Küstenlandes: **Ducke, A.** (3).
- bei Jericho: **Schmiedeknecht.**
- des Wiener Museums. Fundorte etc. **du Buysson** (1):

Die Aufzählung umfasst Cleptes (6, dar. 1 n. var.), Notozus (4), Ellampus (7, dar. 1 n. sp. u. 1 n. var.), Holophris (1), Holopyga (9, dar. 2 n.), Hedychrom (2), Euchroeus (2), Chrysogona (1), Chrysis (52, dar. 4 n. + 1 n. var.).

Chrysis (integerrimae): hilaris Dahlb., New York. — Osmiae Thoms., Caucase: Araxesthal. **du Buysson** p. 100.

- (unidentata): succincta L. var. Germari Wesm., Rhodes p. 100.
- (bidentatae): hova Sauss. var. minor n. (kleiner als die Type u. s. w.) p. 100 ♀. — hova sehr variabel, Madagascar.
- (tridentatae): sciensis Gribodo, Egypte. — singalensis Mocs., Sind. — aliena Mocs., Brésil, Rio grande do Sul, p. 100.
- (quadridentatae): electa Walk., Egypte, Tourah. — palliditarsis Spin., Egypte, Tourah. — Branickii Rad., Egypte. — episcopalis Spin. var. nomina Buys., Egypte. — chlorochrysa Mocs., Caucase. — maracandrae Mocs. var. simulatrix Rad., Caucase, Araxesthal, p. 100. — fuscipennis Brullé, Korée, Chine centrale. — areata Mocs., Sénégal. — dira Mocs., Sénégal. — longigena Mocs., Caffrerie, p. 101. — 2 n. sp. p. 101. — punctatissima Spin., Brésil, Rio Grande do Sul; Paraguay. — carinulata Mocs., Brésil, Rio Grande do Sul. — brasiliensis Brullé (chlorata Mocs.), Brésil, Rio Grande do Sul. — excavata Brullé, spinigera Spinola u. leucocheila Mocs., alle drei von Rio Grande do Sul. — Pattoni Aaron, Washington territory. — cessata Buys., New York p. 102. — perplexa Buys., Australien. — xanthocera Klug, mutabilis Buys. var. ambigua Rad. u. ignita L. var. comta Först., Caucase, Araxesthal. — analis Spin. var., Thian S. — scutellaris F. var. consobrina Mocs., Thian S., Bucharja. — scutellaris var. Ariadne Mocs., Graecia. — annulata Ab. Buys., Caucase, Araxesthal. — Abeillei Grib.?, Caucase, Araxesthal. — pretexta Buys., Sénégal. — bidentata L. var. gemma Ab., N. Mongolei. — Grohmanni Dahlb., Caucase, Araxesthal, p. 103.

postica Brullé (albomarginata Mocs.). Vergleich mit der Type lehrt die Synonymie von Chrysis postica Brullé u. albomarginata Mocs.

Neu: *mandibularis* (erkenntl. durch: mandibules, joues, clypeus et forme linéaire) p. 101 ♀ (Ostafrika: Waboniland). — *salamensis* (charakt. durch Gestalt des 3. Abd.-Sgmts. u. Postscutellum) p. 101—102 ♀ (Deutsch-Ostafrika: Dar-es-Salaam). — *morosa* p. 102—103 ♀ (Brésil.). — *variana* (erinnert an Chr. Friesei Buys.) p. 103—104 (Transcaspienne: Imanbaba).

- (*sexdentatae*) *heros* Buys., Sénégal. — *lyncea* F., Ostaf.: Waboniland, Ikutha, Aschanti; Deutsch-Ostaf.: Morogoro; Australien. — *lyncea* var. *violacea* Smith, Austral. mérid. — *splendens* Dahlb. Orange: Riddersburg. — *stilboides* Spin. Ostaf.: Dar-es-Salaam; Sénégal. — *principalis* Smith, Ceylon. — *parallela* Brullé, China; Lombok: Sapit; Australie. — *Fabricii* Mocs. — *Genbergi* Dahlb., Brésil, Rio Grande do Sul. — *stenops* Mocs., Mexique: Orizaba p. 104. — *Fabricii* Mocs. (*sexdentata* Fabr. nec Christ; *dromeda* Buys.) *dromeda* Buys. (1897) ist nur eine leichte Var. von *Chrysis Fabricii* Mocs.
- mucronata* Brullé, spec., *inseriata* Mocs., *Dana* Mocs., *leucocheila* Mocs., *imperfodata* Gribodo, *Fabricii* Mocs., *lateralis* Brullé, *Genbergi* Dhlbg., *Klugi* Dhlb. bei Pará. — *albomarginata* Mocs. bei Macapá. **Ducke, A.** (3) p. 361.
- Spp. von Neu-Brittanien: (*Hexachrysis*) *Novo-Britanica* (virid., aureo coeruleoque variegata; flagello antennarum nigris; alis fusco-violaceis) **Cameron, P.**, Proc. Zool. Soc. London 1901 p. 234 ♀ (New Britain). — Dieser nahe verwandt ist: Chr. (*Hexachr.*) *democraticus* p. 235 (New Guinea).
- Spp. bei Jericho. **Schmiedeknecht:** *Kohli* Mocs., *uniformis* Dahlb., *angustifrons* Ab., *varicornis* Spin., *pustulosa* Ab., *Theresae* Buys. n. sp., *mysta* Buys. n. sp., *elegans* Lep., *electa* Walk., *mutabilis* Ab., *rufitarsis* Brullé, *palliditarsis* Spin., *misella* Buys., *facialis* Buys., *Octavii* Buys., *joppensis* Buys. n. sp., *barbata* Buys. n. sp., *appendiculata* Buys. u. a.
- Spp. bei Pará. **Ducke** (3).
- Spp. des Oesterr. Küstenl.: *dichroa* Dhlb., *candens* Klug, *refulgens* Spin., *ignifrons* Brullé, *caeruleiventris* Ab., (?) *Chrysis mixta* Dlb., *versicolor* Spin., *Leachii* Shuck., *iucunda* Mocs., *chryso stigma* Mocs., *aestiva* Dhlb. u. *igniventris* Ab. bei Triest. **Ducke, A.** (3) p. 355. — *ignita* L. im Küstenlande im Vergleich zu Centraleuropa auffallend selten.
- shanghaiensis* Smith. Biolog. Beobachtungen. Beziehungen zu dem Lepidopteron *Monema flavescens* Wlk., die schon den Chinesen nicht unbekannt war, doch nach ihrer Auffassung gedeutet wurde. Sie hielten die *Chrysis* für das ♂, welches das Ei (den Kokon) des ♀ befruchtete durch Einführung des Legebohrers. — Buysson konnte (an gefang. Thieren) feststellen, dass das *Chrysis* - ♀ den Kokon durchbohrt, um seine Eier darin abzulegen. — Beobacht. über das Putzen; Verdrehung der Vorderbeine. **du Buysson**, Bull. Soc. Entom. France, 1901, p. 29—30.
- succincta* L. near Woking. **Morice** (12).
- Ruddii* Shuck. in Schottland. **Evans**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 488.
- Chrysozona armata* Mocs. Brésil, Rio Grande do Sul. **du Buysson** (1) p. 100. — *pumila* Klug. einzeln bei Triest u. Grado. **Ducke, A.** (3) p. 355. — *Saussurei* Mocs. bei Pará. **Ducke, A.** (3) p. 361.
- Cleptes Abeillei* Buys. bei Triest an Ferulago. **Ducke, A.** (3) p. 355. — sp. in Norfolk. **Wainwright**.

- semiaurata L. Fundorte der Exempl. des Mus. Vindob. **du Buysson** (1) p. 97. — pallipes Lep. u. nitidula F., beide von Autriche inférieure.
- nitidula var. *nigricans* n. (versch. von d. Type durch: Abd. ganz schwarz, ausser der Basis d. 1. Sgnts.) **du Buysson**, Annal. naturhist. Hofmus. Wien XV. Bd. p. 97 ♂ (Graecia). — semicyanea Tourn. ♂. Untersch. v. C. consimilis Buys. p. 97 (Niederösterreich: Damianitsch). — americana Prov. ♂ Beschr. p. 97 (Washington territory).
- Neu: *elegans* **Mocsáry**, Zool. Ergebn. etc. Zichy vol. II p. 158 (Kazan).
- Ellampus punctulatus Dahlb. (Attica), pusillus F. Transcaspienne, Gr. Balchan; (N. Mongolei), imbecillus Mocs. (Kuldja Mont. bor.), aeneus Panz. var. Chevrieri Tourn., (Washington territory). **du Buysson** p. 98.
- caeruleus Dhlb. (?) var. bei Chobham. **Morice** (9) p. 97.
- glomeratus* **du Buysson**, Annal. naturhist. Hofmus. Wien XV. Bd. p. 98 ♂ (Washington territory). — Horwathi Mocs. var. *mongolicus* n. (stärker bronzefarbig als die Type, grün etc.) p. 98 ♂ ♀ (N. Mongolei). — plicatus Aaron (Diplorrhous plicatus Aaron). Beschr. p. 98 ♀ (British Columbia, Yale).
- Huberi* (gehört wohl in die Nähe von E. iridescens Nort., doch sofort davon zu unterscheiden durch die durchsichtigen Seitenränder aller drei Dorsalsgm. des Abd.; in der Gestalt ähnl. dem E. aeneus var. Chevrieri) **Ducke, A.** (1) p. 356—357 ♀ (Pará, auf Blüten von Croton chamaedrifolius). — (Holophris) *paraënsis* (bish. von dies. Subgenus nur eine sumatran. Form E. (H.) marginellus Mocs. bek.) p. 358—9 ♀ (Pará, an blühender Hemidiodia ocimifolia K. Sch. [Rubiacee]). — (Notozus) *aequinoctialis* (steht Gayi Spin. aus Chile u. seminudus Aar. aus Nordamerika nahe, auf d. erst. Blick dem europ. E. truncatus sehr ähnl.) p. 359—360 ♀ (Pará, an Croton chamaedrifolius).
- Euchroesus Doursi Buys. bei Jericho. **Schmiedeknecht**.
— purpuratus F., N. Mongolei. **du Buysson** (1) p. 100.
- Hedychridium femoratum Dahlb. bei Jericho. **Schmiedeknecht**.
- Hedrychrum rutilans Dahlb. ein noch nicht für Britannien aufgeführtes Hymenopteron. **Morice**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 247. — Untersch. von verwandten Formen.
- violaceum Brullé, New York. **du Buysson** (1) p. 100. — nigropilosum Mocs., Britisch Columbia.
- Holopyga punctatissima Dahlb. 2 Stücke von Issyk-Kul, Ton Fluss, haben genau die Färb. von H. gloriosa F. var. ignicollis Dahlb. Untersch. von d. übr. verw. Formen. **du Buysson**, Annal. naturhist. Hofmus. Wien XV. Bd. p. 99. — aspera Brullé. Bemerk. zur Behaarung u. Skulptur p. 98. — *Jheringi* p. 98 ♀ (Brésil: Rio Grande do Sul). — *Kohli* p. 100 ♀ (Brésil, Winthem).
- Holophris iridescens Norton (der Ellampus iridesc. ist eine Holophris; nur 2 Sp. bek.: marginellus Mocs. von Sumatra u. H. congoensis Buys. vom Congo). **du Buysson**, Annal. naturhist. Hofmus. Wien XV. Bd. p. 98—99.
- Holopyga gloriosa F. var. ignicollis Dahlb., Thian-S., glor. var. aureomaculata Ab, Issyk-Kul, Ton-Fluss, glor. var. viridis Guér., Caucase, Araxesthal. — Dohrni Dahlb., Amér. sept. — lazulina Dahlb. ♀, Chili. — aspera Brullé, Britisch Columbia. **du Buysson** (1) p. 99.

- curvata Först. zahlr. bei Triest. **Ducke, A.** (3) p. 355.
 lazulina Dlb. bei Pará. **Ducke, A.** (3) p. 361.
 punctatissima Dahlb. bei Jericho. **Schmiedeknecht.**
- Notozus productus* Dahlb. var. *vulgatus* Buyss., N. Mongolei. **du Buysson** (1) p. 97. — *viridicyaneus* Norton p. 98.
seminudus Aaron. Beschr. **du Buysson**, Annal. naturhist. Hofmuseum Wien XV. Bd. p. 97 (Britisch Columbia, Yale). — *viridicyaneus* Norton. Beschr. (Washington territ., Brit. Columb., Yale).
viridiventris Ab. u. *caudatus* Ab. bei Jericho. **Schmiedeknecht.**
- Isadelphus* n. g. (Type: *Parnopes schmiedeknechti* Mocs. — von *Parnopes* unterschieden durch kürzere Ligula u. Maxillen, fünfgliedrige Maxillartaster u. a. Merkmale) **Semenow**, Revue Russe Entom. vol. I p. 27.
Parnopes grandior Pall. bei Grado u. Aquileia. **Ducke, A.** (3) p. 355—356.
fischeri. Volle Charakteristik. **Brauns**, Termesz. Füzetek, vol. XXIV p. 491.
Schmiedeknechti Mocs. n. sp. bei Jericho. **Schmiedeknecht.**
 Ne u: *glasunowi* **Semenow**, Revue Russe Entom. vol. I p. 25 (westl. Turkestan).
Pseudochrysis rusalka **Semenow**, t. c. p. 23 (Transcaspien).
viridula L. von Solihull. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 21.
- Stilbia anomala* in North Wales. **Rollason, Mark A.**, The Entomologist, vol. 33 p. 14.
- Stilbum cyanurum* Först. Stammform bei Triest, var. *nobile* Sulz. auch bei Aquileia. **Ducke, A.** (3) p. 355.
splendidum Fab., New Britain, im indischen u. australischen Gebiete häufig. **Cameron, P.**, Proc. Zool. Soc. London 1901 p. 234.

Bethylidae (Fam. XXXII).

vacant.

Trigonalidae (Fam. XXXIII).

- Trigonalys natalensis* Kriechb. 1894. Beschr. d. ♂. **Enderlein**, Archiv für Naturg. 67. Jhg. I. Bd. 3. Hft. p. 195 (Delagoa-Bai). — Erinert in Form u. Färb. an *Trig. pictifrons* Smith von Celebes.

Sapygidae (Fam. XXXIV).

- Sapyga* im Bau einer grossen Holzhummel angetroffen. **Rudow** p. 375. — *prisma* Fbr., *punctata* Klug u. a. wählen Holzbewohner, von denen *Siriciden* bevorzugt werden p. 375. — Hauptsächlich erhält man sie aus Gängen von *Sirex gigas* L., *Oryssus* u. *Xiphidria*, in alten Kirschbäumen neben dem Bockkäfer *Necydalis major* L. hausend.
clavicornis bish. als selt. betrachtet, in Solihull u. and. Midland Lokalit.; demnach häufiger. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 11 (36) p. 67.
- Sapygus* u. *Alyson* aus Zellen in Holzpfosten oder Wurzelstücken von Erlen u. Birken. **Rudow** p. 369.

Myzinidae (Fam. XXXV).

- Myzine** Latr. Bis jetzt sind bereits 52 paläarkt. Spp. bekannt. Viele sind wohl nur Varr. — Nach Radoszkowski, Hor. Soc. Entom. Ross. T. 20 p. 36 existiren im Mittelmeergebiet nur 2 Spp., die übrigen sind Varr., die aus der Kreuzung beider hervorgegangen sind. Für einige mag dies gelten, für andre aber nicht; sie zeigen sofort erkennbare Strukturverschiedenheiten. Behandeln wir sie also als verschieden, bis sich Uebergänge finden.
- Saunders**, Trans. Entom. Soc. London 1901 p. 531—532. — *tripunctata* Rossi (Bône) p. 532. — *Guerinii* Luc. = *latifasciata* Palm. (Fundorte in Algier) p. 532. — ditto var. *cercerigastra* Grib. (?) (Biskra) p. 532. — *laeta* (die inzwischen beschr. M. Martini Ann. Soc. Entom. France 1899 p. 538 ist möglicherweise mit dieser Form identisch, doch stimmt die Färb. nicht, ferner ist b. Mart. die 2. Submarginalz. des ♀ fehlend, bei *laeta* dageg. vorhanden) p. 532—533 ♂ ♀ (Biskra). — sp. (♂) (Biskra) (nahe verw. mit *tripunctata* Ross., aber kleiner, Punktirung zerstreuter, polita Tourm. und *anceps* Gribodo sind nahe verw.) p. 533 ♂ (Biskra). — *fasciculata* (1 Stücker zeigt abnorm. Geäder) p. 533—534 ♂ (Biskra). — *Rousseli* Guér. Le Tarf; Biskra). — *hispanica* Guér. (Bône). — *lacteipennis* (ähnelt den Formen mit breiteren Abd.-Sgm., wie *hispanica*, *rousseli* etc.) p. 534—535 (Biskra) — sp. (?) (abweich. d. Stücke von Biskra von den ♀ von *Guerinii*) p. 535).
- ceylonica* (nig.; mesonot. laevi; al. fum., nerv. fusc. — M. *fuscipennis* am nächst. charakt. ist das fast unpunkt. Mesonotum, das b. fusc. nach Bingham, ab. nicht nach Smith „more closely a. coarsely punct. than the head in M. *fuscipennis*.“ **Cameron, P.**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 5 p. 18 ♀ (Trincomali, Ceylon).

Scoliidae (Fam. XXXVI).

- Discolia foveifrons* (nigr., capite thoraceque nigro pilosis; alis fusco-violaceis).
- Cameron, P.**, Proc. Zool. Soc. London 1901 p. 236—7 ♂ ♀ (New Britain). — *pulchripennis* (nigro; alis violac., basi late flavo-hyalin.) p. 237 ♂ ♀ (New Britain).
- Elis ciliata* Fab. zahlr. in den Gründen von Castle Bellver, Palma, Majorca.
- Saunders** (1) p. 208.
- (Dielis) *thoracica* Klug von Singora und Kota Bharu in Raman (District of Patani) **Cameron, P.**, Proc. Zool. Soc. London 1901 vol. II p. 19. — (Dielis) *aglaea* (nigra, flavo-maculata; femoribus tibiisque anterioribus femoribusque posticis subtus flavis; alis fusco-violaceis) p. 19—20 ♂ (Biserat in Jalor, Malay Peninsula).
- Scolia flavifrons* Fab., quadripunctata u. unifasciata auf Corsica. **Biguell** p. 8
- Scolia*. Dolchwespe. Erweichung der harten Erde durch Wasser!?! Bau der Wohnung. **Rudow** p. 372—373. — Grosse Ueberlegung beim Bau der Wohnung. Ausbild. einer Art mittelbaren Schmarotzertums und innigen Zusammenhangs zw. Wirt u. Schmarotzer.
- procera* Illig. vom Patalung State; schöne Sp. **Cameron, P.**, Proc. Zool. Soc. London 1901 vol. II p. 18. — *speciosa* Smith. (Beschr. des noch unbekannt. ♂ von Buki Besar, bisher nur von Borneo aufgeführt) p. 18.

— *rubiginosa* Fab. (aus d. östl. malayisch. Halbinsel) p. 18. — *lathona* (nigra, thorace abdominique opalina. — pulcherrime lavatis; alis fusco-violac., opalina Smith von Borneo nahe) p. 18—19 ♂ (Kuala Aring, Malay Peninsula).

Tiphiidae (Fam. XXXVII).

Tiphia. Rollwespen tragen kein Futter ein; sie nisten in den Nestern von *Bombus agrorum* Fbr. u. *italicus* L. **Rudow** p. 377—378.

Beckeri Tourn. (Bône. — Besuchspflanzen). **Saunders**, Trans. Entom. Soc. London 1901 p. 535.

brevipennis (nig.: al. brevis, flav.-hyal., nerv. flav., metanot. rugoso) **Cameron**, P., Ann. Nat. Hist. (7) vol. 5 p. 17 ♀ (Barrackpore).

femorata bei West-Runton, Norfolk. **Bradley**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 20.

minuta, *ibid.* **Wainwright**, t. c. p. 102.

Neu: **Tournier** beschreibt in Bol. Soc. españ. vol. I: *antiquae* p. 252 (Barcelona). — *rudepunctata* p. 253. — *longicornis* p. 254. — *vaucheri* p. 255 (die letzt. drei von Tangier).

Robertson beschreibt aus Nordamerika in den Trans. Amer. Entom. Soc. vol. XXVII: *floridana* u. *vulgaris* p. 195. — *clypeata*, *illinoensis* u. *punctata* p. 196.

Cosilidae (Fam. XXXVIII). *Rhopalosomidae* (Fam. XXXIX).

vacant.

Thynnidae (Fam. XL).

Magrettia n. g. (Type: *Meria nocturna* Mor.). **Ashmead**, Proc. Entom. Soc. Washington vol. IV p. 444.

Methoca Braunsi (haemorrhoidalis Westw. nahe, doch kleiner, Mandibeln, Antennen, Füße rot etc.) **André, E.**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg.) 5. Hft. p. 281—282 ♀ (Bothaville, dans l'Etat libre d'Orange). — *minima* (ähmelt einer kleinen europ. *M. ichneumonides* Latr., doch Kopf länger, hinten stärker verschmälert etc.) p. 282—283 ♀ (Algoa Bay, le Cap).

Myrmosidae (Fam. XLI).

Apterogyna Cybele Pér. (das ♀ ähnelst stark *A. Olivieri* Latr. aus d. paläarkt. Gebiet. — Unterschiede des ♂ von den beiden bekannt. ostafr. *Sp. globularia* Fab. u. *mnemosina* Pér. — Ergänzt. zu Péringuey's Beschr. Die 3 erst. Abd.-Sgm. haben in der Mitte eine sehr deutliche Längsfurche). **André, E.**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 5. Hft. p. 280 (Stücke von Willowmore, Capland). — *Climene* Pér. ♀ ist nach André nur eine Lokalvarietät der vor. Sp. p. 280—281 (Bothaville, Orange Freistaat). — *cybele* ♂, Péringuey, Ann. South Afric. Mus. vol. II p. 128.

Pici André n. sp. **Schmiedeknecht** (Jericho).

Olivieri Klug (Biskra, Hemipt.-Larv. auf *Thymelaea microphylla* besuchend; auch auf *Ammi visnaga*). **Saunders**, Trans. Entom. Soc. London 1901 p. 531. Bemerk. dazu.

Myrmosa u. *Methoca* (langgestreckt, hartleibig). Die gänzl. abweich. gestalt. u. gefärbt. ♀ werden während der Paarung von den geflügelt. schwarz. ♂ herumgetragen. Sie schmarotzen bei holzbewohn. Honigsammlern, bevorzugt werden *Chelostoma* u. kleine Osmien. **Rudow** p. 377.

ephippium Rossi (Le Tarf) **Saunders**, Trans. Entom. Soc. London 1901 p. 531.

— *frater* E. Saund. (Le Tarf, an *Foeniculum*) p. 531.

Brachycistes gaudii **Cockerell**, Canad. Entom. vol. XXXIII p. 340 (Californien).

Mutillidae (Fam. XLII).

Mutillidae von Spanien. von **Heyden**.

— Abweichungen zw. ♂ u. ♀. Sämtlich in Hummelnestern. Lebensweise. Oft mehr Mutillen im Nest als Hummeln. Lebensweise d. zahlreich. bunten amerikan. Spp. in allen Gegenden übereinstimmend. **Rudow** p. 378.

Mutillide mit Giftstachel „Isula“. **Baer**, Bull. Soc. Entom. France, 1901, p. 180—181.

Barymutilla subg. n. siehe *Mutilla*.

Brachymutilla subg. n. siehe *Mutilla*.

Dasylabroides subg. n. siehe *Mutilla*.

Mutilla. Im allgemeinen lassen sich die afrikanischen Formen gut in die für die paläarkt. Formen aufgestellten Gruppen unterbringen, doch giebt es auch noch eine beträchtl. Zahl, die sich dem widersetzen u. die Aufstellung mehrerer Untergattungen nötig machen. **André, E.**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 5. Hft. p. 283—284.

Subg. *Tricholabioides* Rad. *M. (Trich.) semistriata* Klug ♀ von Willowmore, Beschr., Bemerk., p. 284—285. — *M. semele* Pér. ♂. Berichtigung zum Geäder p. 285. — *signatipennis* (der zu dies. Subg. gehörig. *M. aegyptiaca* Rad. sehr ähnl., verschied. durch „couleur beaucoup plus foncée etc.“) p. 285—286 ♂ (Willowmore, Capl.).

Subg. *Brachymutilla* n. subg. (das ♀ ders. unterscheidet sich nur mit Schwierigkeit von dem vor. Subg., ♂ dagegen sehr, so dass die Vermutung nahe liegt, die ♀ gehören gar nicht hierher od. die ♂ v. *Tricholabioides* sind dimorph, wie die von *Myrmilla*) p. 287. — *androgyna* p. 287—288 und 305 ♂♀ (Willowmore, Capland). — *gynandromorpha* (Untersch. v. *androgyna* p. 307) p. 305—307 ♂♀ (Willowmore, Capland).

Subg. *Dasylabroides* subg. n. (Thorax mehr oder weniger birnförmig, hinten verschmälert wie bei *Dasylabris*, aber Abd. „sessile et non petiolé“, Abd. der ♂ deutlich gestielt wie bei *Dasylabris* od. *Stenomutilla*) p. 307—9. Hierher sind zu rechnen: *inconspicua* Sm., *caffra* Kohl, *Alcis* Pér., *Canace* Pér., *Idia* Pér., *Nortia* Pér. u. vielleicht *Taygete* Pér. — *capensis* Sauss. Beschr. v. ♂ u. ♀ p. 309—310 nebst Bem. (Algoa Bay).

Subg. *Dasylabris* Rad. — *M. maura* L. Beschr. p. 310—311. — *affinissima* (*maura* sehr ähnlich) p. 311—312 ♀ (Bothaville). — *Mephitis*

Smith p. 312—313 ♀. — *inflata* (Mephitis Sm. nahe) p. 314—315 ♀ (Pays des Somalis). — *Celinene* Pér. p. 315. — *Bassutorum* André ♀ ♂ p. 315—316. ♂ hat grosse Aehnlichkeit mit der paläarkt. *italica* Fabr. — *Thais* Pér ♀ scheint nur eine Var. von *Bassutorum* zu sein. — *Danaë* Pér. ♀ (Reddersbourg, Orange; Willowmore, Capl.). — *Saga* Pér. p. 317 ♀ (Bothaville). — *Phrygia* Pér. (vorig. beid. sehr nahe) p. 318 (Algoa Bay). — *quinquenotata* (scheint *Terpsichore* von Betchuanaland nahe zu stehen) p. 318—319 ♀ (Salisbury, Mashonaland).

Subg. *Stenomutilla* André. — *M. capicola* Pér. Beschr. d. ♀ u. ♂ p. 320—321 (Algoa Bay). — *acuticollis* (zeigt grosse Analogie mit *capicola* Pér. u. *Beroë* Pér.) p. 321—322 ♀ (Bothaville, Orange; Algoa Bay, Capl.). — *Clelia* Pér. ♂ Beschr. p. 322.

Subg. *Rhopalomutilla* subg. n. (von allen andern unterscheidbar durch „les antennes, la petitesse des yeux et la forme de l'abdomen chez la femelle etc.“, ♂ u. ♀ sehr verschieden, so dass man sie für verschiedene Formen halten könnte, wären sie nicht in Copula gefangen) p. 323. — *clavicornis* (merkwürdige Sp.) p. 323—325 ♀ ♂ (Salisbury, Mashonaland).

Subg. *Nanomutilla* André. Beschr. p. 325—326. — *microsoma* (M. Vaucheri Tourn. sehr ähnl.) p. 326—328 ♀ ♂ (Willowmore, Capland).

Subg. *Myrmilla* (Wesm.) André. — *M. Antiope* Pér. Beschr. ♀ p. 328 (Cradock, le Cap).

Subg. *Odontomutilla* Ashm. ist vom Verf. sehr summarisch aufgestellt mit der neuen Art *Abottii* Ashm. als Type. Das dem Verf. von Ashm. zugegangene ♂ ist nichts anderes als *M. Saussurei* Sich. Rad. Das ♀ gehört zur Gruppe *notata* Lep., *horrida* Sm. Die Gleichmässigkeit, die zwischen den Zeichnungsmustern der ♂ u. ♀ bei den bekannt. Sp. herrscht, gestattet sie bis zu einem gewissen Grade mit einander zu vereinigen, so ist

M. angulata Sm. das ♂ zu *horrida* Sm. ♀.

M. Tomyris Pér. das ♂ zu *Chione* Pér. ♀.

Andromache Pér. Beschr. des ♂ dazu (♀ ♂ von Salisbury, Mashonaland). — *argenteoguttata* p. 331—334 ♀ ♂ (Ikutha, Afrique orient. anglaise).

Subg. *Barymutilla* (bemerkenswerth durch tête particulièrement gonflée de la ♀ u. la stature lourde et massive du ♂) p. 334—335. Hierher sind zu stellen *M. Pythia* Sm. u. *ignava* Sm., ferner *M. Astarte* Sm., *Cepheus* Sm., *comparata* Sm. u. *tridon* Stad., die nach André's Ansicht *Pythia* sehr nahe stehen, wenn nicht gar Varr. ders. sind. Auch *M. stupida* Gerst., *Mnizeck* Rad. u. wahrsch. noch einige andere Sp. mit zu vager Beschreib. sind wohl hierher zu stellen. *Pythia* Sm. (= *Clelia* Pér. 1899 [♀ nec ♂] u. *Cecilia* Pér. 1901) p. 335—336 ♂ ♀ (Deutsch Ostafri.). — *stupida* Gerst. (= *bilunata* Gerst. 1857). ♂ u. ♀ in copula. Beschr. d. ♂ p. 336—337. — *Dasya* Pér. (= *Clytemnestra* Pér. olim unterscheidet sich nach Untersuchung eines Exempl. von Brauns nur durch schwächere Gestalt, hinten etwas stärker eingeschnürten Thorax und das Fehlen des Kieles auf dem 2. Ventralsgm. Sie ist demnach wohl nur eine Var. der genannt. Sp.

Dolichomutilla Ashmead auf das ♀ von *M. guineensis* Fabr. begründet. Wohl berechtigt. Verbesserte Beschr. p. 338—339. Hierher noch *sycorax* Sm., *Livingstonis* Kohl u. *scutellifera* André, auch wohl *M. conigera*

André, welche vielleicht das ♂ zu scutellifera repräsentirt. — *M. scyrorax* Sm.; die von Gerst. als guineensis abgebildeten Formen (♂♀) gehören hierher. Ergänz. der Gerst.'schen Beschr. des ♂ nach einem Exempl. von Salisbury (Mashonaland) p. 339—340.

subg. *Mutilla* L. enthält noch sehr ungleichwertige Formen. Da aber zu einer besseren Gruppierung noch nicht genügend Material und Untersuchungen vorliegen, so behält André noch d. bekannten Gruppen bei und bringt die nicht einzuordnenden Sp. unter die Rubrik Species incertae sedis p. 340.

Groupe de *M. barbara* L. — *idonea* (ähnelt einer Var. v. *barbara*. Unterschiede) p. 341—342 ♀ (Dakar, Sénégal).

Groupe de *M. penicillata* André. — *Tecmessa* Pér. Péringuey hat selbst erkannt, dass sein *M. callisto* nichts anderes ist als *M. penicillata* André. *Tecmessa* Pér. steht dem *penicillata* in der Zeichn. des Abd. etc. sehr nahe. Nach André ist er trotz d. davon verschieden. Vervollständigte Beschr. p. 342—343 ♂♀ aus einem Neste von *Megachile* von der Algoa Bay. — Bei einem Stück von Mashonaland ist der Metathorax wie das Abd. blau u. das Apicalband d. 2. Sgms. breiter, in der Mitte dagegen ganz schmal. André nennt es var. *cyaneidorsis* n. p. 343. — *Metella* (steht *Tecmessa* Pér. sehr nahe, Unterschiede) p. 343—344 ♂ (Algoa Bay, Willowmore, Le Cap). — *Marcella* (vorig. sehr ähnl., vielleicht nur eine Var. ders.) p. 345 (Salisbury, Mashonaland).

Groupe de *M. viduata* Pallas. — *exaltata* Sm. (= *Alcyone* Pér.). Diese Form bildet mit *Cloantha* Pér., *Tyro* Pér., *Hecuba* Pér. u. *Melanippe* Pér., sämtl. ostafrik. Formen, eine homogene Gruppe. Bemerk. hierzu p. 345—347. Bestimmungstabelle für dieselb.:

- ♀ 1. Abd. mit 2 Abdom.-Bändern aus blasser Pubescenz, das 3. u. 4. Sgm. einnehmend 2.
 — Abd.-Sym. mit 1 Abdom.-Band auf d. 3. Sgm. *Cloantha* Pér.
 2. 2. Abd.-Sgm. nur mit einem medianen blass behaarten Fleck
exaltata (Sm.?) Pér.
 — 2. Abd.-Sgm. mit 3 Flecken, deren einer median gelegen u. scharf begrenzt ist u. 2 seitl. auf gleicher Querlinie gelegen, ab. viel weniger scharf begrenzt *Hecuba* Pér.
- ♂ 1. Ein schmales blasses Band am apikalen Rande des 2. Abd.-Sgm. und ein zweites breiteres, das ganze 3. Sgm. einnehmend; Pro- u. Metathorax oben mit blasser Pubescenz dicht bedeckt (nach Péringuey)
Melanippe Pér.
 — Kein apikales Band am 2. Sgm. 2.
 2. 3. u. 4. Abd.-Sgm. m. je einem blassen Bande 3.
 — 3. Abd.-Sgm. allein mit einem blassen Bande 4.
 3. Prothorax allein mit reichlicher blasser Pubescenz besetzt
exaltata (Sim.?) Pér.
 — Prothorax und Scutellum dicht mit blasser Pubesc. bedeckt *Hecuba* Pér.
 4. Prothorax dicht m. blass. Haaren besetzt; Metathorax ohne solche *Cloantha* Pér.

— Prothorax ohne Pubesc.; Oberseite des Metanotum dicht behaart

Tyro Pér.

Melpomene Pér. (steht *M. exaltata* Sm. in d. Abd.-Zeichn. sehr nahe) p. 348 ♀ (Algoa Bay). — *subfasciata* (ähmelt *M. Hecuba* Pér., aber Kopf ein wenig breiter, Thorax länger, die 3 Flecke des 2. Sgms. viel weniger deutlich u. mehr zusammenfließend) p. 349 (Cap: Algoa Bay und Port Elisabeth). — *Enippe* Pér. (ähmelt *Hecuba* Pér.; doch Sculptur viel gröber etc.) p. 350 ♀ (Cap; l'État Orange).

Groupe de *M. rufipes* Fab. — Ceto Pér. unterscheidet sich in Nichts von *rufipes* Fab. von Europa als im Vaterlande, ist also wohl damit zu vereinigen. Stücke von Bothaville mit rothem Kopf gehören zur Var. *opicalis* (von Abyssinien beschr. u. die vielleicht, falls das ♂ näher bekannt ist, zur Sp. zu erheben ist.) — *rufescens* (nähert sich in der Färbung der *ellipsifera* Grib., Untersch.) p. 351–352 ♀ (Bothaville, État libre d'Orange). — *Thyone* Pér. Ergänzt. der unvollständ. Besch. des Autors p. 352–353 ♂♀ (ist zerbrochen). — Forts. folgt.

Mutilla (Myrmilla) capitata Luc. (Biskra, Constantine). **Saunders**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 528. — *dorsata* Fab. (Aine Draham, Tunis) p. 528. — ditto var. *excoriata* Lep. (Biskra, Algier, Constantine). — (*Myrmilla*) *bipunctata* Latr. = *bituberculata* Sm. (Algier: Hussein Dey, Algier Bône p. 528. — *M.* (sens. str.) *barbara* Linn. (Medea, Le Tarf) p. 528. — ditto var. *decoratifrons* Cost. (Algier) p. 528. — *punctata* Latr. (Algier) p. 529. — *marocana* Oliv. = *humeralis* Rad. (Médéa, Koudia Sina auf *Daucus carota*), Biskra, Constantine On M'cid) p. 529. — *continua* Klug (Biskra, Foot of the first part of the ridge beyond Beni Mora) p. 529. — *tunensis* (Azazga) p. 529. — *montana* Panz. = *subcomata* Wesm. (Biskra. — Besucht Hemipt.-Larven auf *Thymelaea microphylla*; Algier, Biskra, Hippone). Die ♂ variiren stark in der Färbung) p. 529. — *uncinata* Luc. (Constantine) p. 529. — (*Dasylabris*) *arenaria* Fab. (diverse Fundorte in Algier) p. 530. — ditto var. *Maura* (Biskra) p. 530. — (*Dasylabris*) *italica* Fab. = *regalis* Fab. (Fundorte in Algier) p. 530. — ditto var. *rubrosignata* Rad. (Biskra. — Besucht Hemipt.-Larv. auf *Thymelaea microphylla*) p. 530. — (*Dasylabris*) *Olivieri* Sich. Rad. (Biskra — auf *Ammi visnaga*, u. *Zizyphus lotus* — das gekielte 2. Ventr.-Sgm. ist sehr charakt.) p. 530. — (*Stenomutilla*) *argentata* Vill. = *hottentotta* Fab. (Fundorte in Algier — 1 Exemplar in einem Gange von *Anthophora fulvitaris*) p. 530.

malayana (nigra, abdomine ferrug., basi apiceque nigris; capite thoraceque dense albo-pilosis; alis violaceis) **Cameron, P.**, Proc. Zool. Soc. London, 1901 vol. II p. 16–17 ♂ (Bukit Besar, Jalor [District of Patani State], Malay Peninsula). — *skeati* (nigra, thorace femoribusque rufis; abdomine pallide aureo piloso) p. 17–18 ♀ (Kuala Aring, State of Kelantan, Malay Peninsula).

Novo-Britannica (nigra, dense albo-pilosa, abdominis basi late rufa; alis violac., basi hyalin). **Cameron, P.**, Proc. Zool. Soc. London, 1901, p. 235–236 ♂ (New Britain).

maura u. *viduata* auf Corsica. **Bignell**, p. 8.

montana. Variation der ♂ siehe oben unter **Saunders**.

- quinquemaculata Cyr. bei Mahon, Minorca. Saunders (1) p. 208.
- autonoe = merope ♂. Péringuey, Ann. South Afric. Mus. vol. II p. 132. — atropos Sm. = (artemisia Pér.) p. 132. — saga nom. nov. für cyllene Pér. p. 132.
- Péringuey beschreibt l. c. als neu aus Süd-Afrika: M. (Dasylabris) *phrygia* p. 128. — *naïs* p. 129. — *camilla* p. 130. — M. (Dasylabris) *mashuna* p. 131. — *zoe* p. 131.
- André beschreibt in Spec. Hym. vol. VIII: *sareptana* p. 246 (Europa). — *curtiventris* p. 269 (Kleinasien).
- Cooki André. André, Mém. Soc. Zool. France. T. 14, 1901 p. 467—468 ♀ (Mackay). — *quadrata* Sm., vervollständigte Beschreibung p. 468—469. — *venusta* Sm. p. 469 ♀. — *bivulnerata* (erinnert durch Gestalt und Lage der rothen Flecken des 2. Sgmts. an *venusta* Sm., doch ist sie kleiner etc.) p. 470—471 ♀ (Mackay, Queensland). — *Gilberti* André ♀, Mackay. Variation in der Lage u. Ausdehnung des schwarz. Querbandes auf d. 2. Segment. — *objecta* (steht Gilberti André nahe, versch. durch abdominale Färbung etc.) p. 471 ♀ (Mackay, Queensland). — *sessilis* (durch Gestalt des Thorax u. Abdom. zur vorig. Gruppe gehörig) p. 473 ♀ (Mackay, Queensland). — *addenda* (ebenfalls vor. Spp. sehr nahe, besonders *sessilis* sich nähernd) p. 474—475 ♀ (Mackay, Queensland). — *difficilis* (vor. nahe, doch Thorax u. Abd. gestreckter etc., versch. durch allgemein. Färb. u. glänz. Pygid.) p. 475—476 ♀ (Mackay, Queensland). — *variipes* André ♀ (Ergänz. zur Beschr. von 1895). p. 476—477. — *sosiana* p. 477—478 ♀ (Mackay, Queensland). — *aenea* (steht *sosiana* sehr nahe) mit var. *purpurascens* n. var. p. 478—479 (Mackay, Queensland). — *variipes*, *sosiana* u. *aenea* sind äusserst verw. Spp., die eine sehr homogene Gruppe bilden, ihre Trennung untereinander aber wohl gerechtfertigt, da keine Zwischenstufen allem Anschein nach existiren. — *ferruginata* Westw. p. 480 ♀ (Mackay). — *lutaria* Am. (ähnelte *ferruginata* Westw., aber versch. durch: 2. sgm. abdom. non sillonné en dessus, par la sculpture moins grossière de son thorax et par la pubescence dorée répandue sur tout les corps) p. 480—481. — *Mackayensis* (näherst sich *ferruginata* Westw., leicht untersch. durch taille généralement plus petite, vestiture de sa tête et de son thorax, 2. Sgm. abdom. pourvue d'une tache basale, qui manque chez *ferruginata* etc.). Diese Sp., sowie *ferruginata* Westw. u. *castaneiventris* André, letzt. vielleicht das ♂ zu *ferrug.*, werden nur im Sande in der Nähe des Meeres gefunden (Mackay, Queensland). — *meranoploides* (zeigt grosse Aehnlichk. mit der Ameise *Meranoplus hirsutus* Mayr aus der Tribus der Cryptocerides) p. 483—484 (Mackay, Queensland). — *pallidiventris* (gut geschiedene Sp., könnte nach Gestalt u. Färbung d. ♂ zu *meranoploides* sein) p. 484—485 (Mackay, Queensland). — *cyaneiceps* (scheint *carinata* Sm. v. Aru, Salomonsinseln etc. sehr nahe zu stehen) p. 485—486 ♀ (Ile de Key). — *Henrici* André, (Mackay), p. 487. — *rectanguliceps* André p. 487 ♀ (Mackay). — *cyaneidorsis* (gehört z. Gruppe M. *Henrici* André u. *rectanguliceps* André) p. 487—488 ♀ (Mackay, Queensland). — *aemula* (von *rectanguliceps* André leicht unterscheidbar durch: taille plus grande, la bande longitudinale

- ferrugineuse, qui orne la seconde moitié de l'abd., etc. Noch mehr nähert sie sich Henrici André, doch bei dieser ist: 2 nd. sgm. abdom. am Hinterrande mit ein. Quersleck geschmückt, zweilappig, die folg. tragen nur ein. klein. medianen Fleck u. s. w.) p. 488—491 ♀ (Mackay, Queensland). — *afflicta* (erinnert an queenslandica André, aber ist kleiner, glänzender etc., auch modesta scheint sehr nahe zu stehen) p. 490—491 ♀ (Mackay, Queensland). — *quadrisignata* (von all. versch. durch: 4 taches nues du 2. sgm. abdom.) p. 491—493 ♀ (Melbourne, Victoria). — *cordata* Sm., vervollständigte Beschr. d. ♀ p. 493—494. — *laetabilis* p. 494—495 ♀ (zeigt weitläufige Aehnlichkeit mit Turneri André, aber der Thorax ist anders gebildet, Skulptur kräftiger, Abdominalzeichn. eine andere). — *rubromaculata* André (Mackay) p. 495. — *semicuprea* André, Beschr. d. ♂ p. 495. — *princeps* André p. 496 (Mackay). — *interjecta* (steht chrysochlora André, besonders auch lauta sehr nahe) p. 496—497 ♀ (Mackay, Queensland). — *lauta* André Bemerk. zu ♀ von Mackay p. 497 ♀. — *confraterna* André p. 497—498 ♀ (Mackay). — *semicyanea* p. 498. Ergänz. Beschr. z. ♂ (Mackay).
- aeruginosa* Sm. Beschr. des ♂ p. 498—499. — *obscuriceps* (steht aerug. nahe, untersch. sich aber durch schwarz. Kopf. Gestalt des Pronot. etc.) p. 499—500 ♂ (Mackay, Queensland). — *cyanescens* André var. *holocyanea* n. var. Beschr. d. ♂ (Mackay, Queensland). — *caliginosa* (scheint *M. carbonaria* Sm. von Tasmanien nahe zu stehen) p. 501—2 ♂ (Mackay, Queensland). — *adjacens* (der vorig. sehr nahe) p. 502—3 ♂ (Mackay, Queensland). — *aurovestita* André. Ein von der Type abweich. Stück, ob besonders zu benennen? p. 504. — *dentifrons* p. 504—505 ♂ (Mackay, Queensland). — Der folg. Text fehlt leider im vorlieg. Exempl. (aus d. Königl. Bibliothek), ebenso der Beginn der Uebersichtstabelle (p. 505—508). Uebersichtstabelle der behandelten Sp. p. 508(?)—513. Es folgt noch *lamellifrons* n. sp.
- consobrina* (moerens André 1899 sehr nahe, versch. durch netzförm. Punktierung des Kopfes u. Thorax, Fehl. der silbernen Behaarung an den Knien, am Epistom u. Mandibelbasis etc.) André, E., Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 3. Hft. p. 137—138 ♂ (Madagascar: Baie d'Antongil). — *cyanogastra* (ähnelte der vor., doch grösser etc.) p. 139—140 ♂ (Madagascar, Baie d'Antongil). — *Sanctae-Mariae* (kleiner als cyanogastra, ist ganz violett-blau etc.) p. 140—142 ♂ (Sainte-Marie de Madagascar). Diese 3 Spp. bilden mit moerens eine Gruppe, sind aber deutlich unter einander geschieden. — *aurolimbata* (sikorae ähnl., doch kleiner, Metanot. rostrot etc.) p. 142—143 ♂ (Madagascar, Fort Dauphin). — (*Stenomutilla*) *eumenoides* (charakt. vor allen: ganz schwarz und Eumenes-ähnlich) p. 143—144 ♂ (Madagascar: Baie d'Antongil).
- (*Traumatotutilla*) *bivittata* Gerst. André, E., Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 5. Hft. p. 257—258. — (*Ephuta*) *alacris* n. sp. (kann in die 5. Gruppe Gerst.'s gestellt werden, doch ist diese sehr heterogen u. in verschiedene Untergruppen zu theilen, sobald ihre Formen besser bekannt sind. — Steht auricoma Kohl nahe, besond. victura Cress. in litt., beide von Brasil.) p. 258—260 ♀ (Paraguay, Porto Casado). —

(Photopsis) *paraguayensis* (gehört zur Gruppe der zahlr. Sp. mit schlichtem einfarb. Habitus u. wenig hervortretenden Charakteren u. nähert sich uro Blake von Texas in der allg. Gestalt, u. *testaceipes* André von Chile in Färbung u. Skulptur) p. 260—261 ♂ (Paraguay, Porto Casado). — (*Scaptodactyla*) *laevissima* p. 261—263 ♂ (Patagonie, Rio Santa Cruz). Bemerk. zur (Sub-) Gatt. *Scaptodactyla*. — (*Scaptodactyla?*) *crinita* (nähert sich *M. silvestris* André von Chili, aber Färb., Skulpt. u. Behaarung verschieden) p. 263—264 ♀ (Patagonie: Rio Santa Cruz).

Demnach sind neu: *abjecta*, *acuticollis*, *addenda*, *adjacens*, *aemula*, *aenea*, *affinissima*, *afflicta*, *alacris*, *androgyna*, *argenteogutta*, *aurolimbata*, *bivulnerata*, *caliginosa*, *camilla*, *clavicornis*, *consobrina*, *crinita*, *curtiventris*, *cyaneiceps*, *cyaneidorsis*, *cyanogastra*, *dentifrons*, *difficilis*, *eumenoides*, *gynandromorpha*, *idonea*, *inflata*, *interjecta*, *laevissima*, *laetabilis*, *mackayensis*, *malayana*, *marcella*, *mashuna*, *meranoploides*, *metella*, *microsoma*, *nais*, *novobritannica*, *obscuriceps*, *pallidiventris*, *paraguayensis*, *phrygia*, *quadrisingnata*, *quinquenotata*, *rufescens*, *sanctae-mariae*, *sareptana*, *sessilis*, *skeati*, *sosiana*, *subfasciata*.

Myrmilla doumerguei, André, Spec. Hym. vol. VIII p. 190 (Algier).

Nanomutilla subg. n. von *Mutilla*. (Type: *M. vaucheri* Tourn.) André, Spec. Hym. vol. VIII p. 190 (Algier).

Platymyrmilla subg. n. von *Myrmilla*. (Type: *M. quinquefasciata* Oliv.) André, Spec. Hym. vol. VIII p. 220.

Rhopalomutilla subg. n. von *Mutilla*, siehe dort.

Superfamilia IV. Formicoidea.

Autoren: André, Brauns, Dahl, Emery, Fielde, Forel, Janet, Landquart, Mayr, Mocsáry, Szépligeti, Morice, Oudemans, Pérez, Saunders, Thomann, Tryon, Ule, Wasmann, Wheeler, Wheeler & Long.

Klassifikation mit besonderer Berücksichtigung der Ponerinae u. Dorylinae (Emery's Ansichten: Forel¹⁰) (p. 136—141), desgl. Emery²) (p. 197—198).

— der Ponerinae u. Dorylinae: Emery²) (p. 32—37).

— der Formiciden des Bismarck-Archipels: Forel³).

Bemerkungen zu kritischen Gattungen: Emery²) (p. 32—37).

Phylogenie: Emery²) (p. 32—37).

Biologie, Ethologie der Formiciden des Bismarck-Archipels: Dahl¹).

— Lebensweise der mexikan. von Forel⁹) beschriebenen Arten: Wheeler⁶).

— Gesellschaftliches Leben: Fielde*) (Stenammas fulvum piceum).

— Symbiosis unter den amerikanischen Ameisen: Wheeler¹), ²), ³).

— Beziehungen von *Polyergus* mit *Formica*: Wasmann**).

*) Proc. Acad. Philad. vol. LIII p. 425—449 u. 521—544.

***) Allgem. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 353 etc.

Macroergatismus (Natur u. Ursprung): Wheeler⁴).

Ameisen-köpfende Fliege in Nord-Amerika: Pergande.

Australische erntende Ameisen: Tryon.

Ameisengärten am Amazonas: Ule.

Ameisennester (zahlr.) in trockenen Zweigen u. Aesten: Forel¹¹) (p. 382).

Durch den Schiffsverkehr in Hamburg eingeschleppte Ameisen: Forel¹¹) (p. 78—82), Kraepelin p. 193—194.

Ameisen. Nochmals *Thorictus Foreli* als Ectoparasit der Ameisenfühler. Zool. Anz. 21. Bd. No. 570.

— Lebensweise der Ameisengrillen (*Myrmecophila*). **Wasmann, E.**, Natur u. Offenbarung. 47. Bd. p. 129—152. 1 Abb. — Refer. Chr. Schröder, Allgem. Zeitschr. Entom. 6. Bd. p. 287.

Zahl der Individuen im Nest (siehe vor. Bericht p. 444). Ref. von E. K. unter dem Titel: Wie gross ist die Bewohnerzahl eines Hügelnestes unserer Wald-Ameise? Prometheus, 12. Bd. 1901 p. 212—214.

Treiber u. Wanderameisen. Wheeler (9).

Norddeutsche Ameisen. Dahl (1) (p. 46) Bestimmungstabelle.

Klassifikation: Uebersicht der norddeutschen Ameisenarten nach der Lebensweise. Dahl p. 46 sq. Dieselbe betrifft: *Anergates atratulus* (Schenk) *Strongylognathus testaceus* (Schenk), *Polyergus rufescens* Latr., *Solenopsis fugax* (Latr.), *Monomorium pharaonis* (L.), *Lasius flavus* F., *Ponera contracta* (Latr.), *Myrmecina latreillei* Curtis, *Stenamma westwoodi* Westw., *Myrmica scabrinodis* Nyl. (+ *M. lobicornis* Nyl.), *M. ruginodis* Nyl., *M. laevinodis* Nyl., *Leptothorax tuberum* (F.), *Tetramorium caespitum* (L.), *Formicoxenus nitidulus* (Nyl.), *Camponotus ligniperdus* (Latr.), *Lasius fuliginosus* Latr. u. *Formica* (8 Sp.: siehe *Formica*) u. *Tapinoma erraticum* (Latr.).

-- Uebersicht über die folg. 34 Gatt. (vom Bismarckarchipel) nach leicht erkennbaren Formmerkmalen. **Dahl, F.** p. 8—11.

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. <i>Strumigenys</i> Smith, | 13. <i>Bothriomyrmex</i> Emery, | 24. <i>Crematogaster</i> Lund, |
| 2. <i>Anochetus</i> Mayr, | 14. <i>Prenolepis</i> Mayr, | 25. <i>Podomyrma</i> Smith, |
| 3. <i>Odontomachus</i> Latr., | 15. <i>Opi-thopsis</i> Emery, | 26. <i>Pheidologeton</i> Mayr, |
| 4. (<i>Dorylus</i>) F., | 16. <i>Polyrhachis</i> Shuck., | 27. <i>Solenopsis</i> Westwood, |
| 5. <i>Oecophylla</i> Smith, | 17. <i>Camponotus</i> Mayr, | 28. <i>Vollenhovia</i> Mayr, |
| 6. <i>Acropyga</i> Roger, | 18. <i>Prionopelta</i> Mayr, | 29. <i>Monomorium</i> Mayr, |
| 7. <i>Plagiopelta</i> Mayr, | 19. <i>Myopopone</i> Roger, | 30. <i>Tetramorium</i> Mayr, |
| 8. <i>Pseudolasius</i> Emery, | 20. <i>Leptogenys</i> Roger, | 31. <i>Xiphomyrmex</i> Forel, |
| 9. <i>Technomyrmex</i> Mayr, | 21. <i>Ectatomma</i> Smith, | 32. <i>Triglyphothrix</i> Forel, |
| 10. <i>Turneria</i> Forel, | 22. <i>Platythyrea</i> Roger, | 33. <i>Cardiocondyla</i> Emery, |
| 11. <i>Tapinoma</i> Foerst., | 23. <i>Ponera</i> Latr., | 34. <i>Pheidole</i> Westw. |
| 12. <i>Iridomyrmex</i> Mayr., | | |

— Zur Klassifikation der Ameisen. **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 136—141. — Zahlr. Details, die im Original nachzulesen sind. — Erwiderung von **Emery**, t. c. p. 197—198. Er betont darin, dass sein Versuch, die Ameisen zu klassifizieren, nicht auf neuen Ideen, Hypothesen u. s. w. beruht, sondern das Produkt sorgfältiger Untersuchungen u. Ueberlegungen ist. Bemerk. u. Detailabb. (Ende der Tibia) zu *Pseudoponera*, *Brachyponera*, sowie Lam. subgenit. zu *Paraponera*.

Biologie etc.: Uebersicht nach der Lebensweise: **Dahl, F. VII.** Feinde **Dahl VIII.** — Nutzen, Schaden, **Dahl IX.** — Vergleich der Ameisenfauna des Bismarck-Archipels mit der Norddeutschlands, **Dahl, X, 1, 2.** — Vergleich des Individuenreichthums nach quantitativen Fängen, **Dahl, X, 3.** — Fundorte für Ameisen. Dahl (Aecker — Astlöcher — Baumkronen — Baumstämme — Baumstümpfe — Blattscheiden — Boden, schwerer, leichter — Dünen — Erdboden, kahler, Erde, in derselben — trockene Früchte — Getreidefeld — Grasland — Häuser — Heidefeld — Holz — Holzmulm — Knollenlabyrinth — Laub, trockenes — Lichtungen — Luftwurzeln von Pandanus — Markröhren — Meeresoberfläche — Meeresstrand — Moore — Moos — Mulm — Pflanzung — Rinde — Sandboden — sonnige Plätze — Steine — Sträucher — Termitennester — Wald — Wohnungen, menschliche — Wurzelwerk).

Uebersicht der Nester der Ameisen des Bismarck-Archipels. **Dahl, F. p. 28**

I. Die Höhlung, welche das Nest einschliesst, wird von der Ameise künstlich hergestellt. Kunstnester.

A. Die Höhlung wird durch Ausnagen oder Ausgraben hergestellt.

a) Die Höhlung wird in die Erde oder in ganz zerfallenen Holzmulm gewissermaassen eingegraben. 1. Erdnester.

Acropyga moluccana, *Pseudolasius amblyops*; die meisten *Iridomyrmex*-, *Prenolepis*- u. *Polyrhachis*-Arten, *Solenopsis dahl*, *Monomorium minutum*, *Tetramorium guineense*, *Cardiocondyla nuda* u. die *Pheidole*-Arten.

b) Die Höhlung wird in härtere Pflanzentheile eingragt.

α) Die Höhlung wird in Holz eingragt. 2. Holznester.

Odontomachus haematodes, *Opisthopsis linnaei*, *Polyrhachis conops*, *Ponera stigma* u. *Tetramorium tonganum*.

β) Die Höhlung wird in das Mark lebender Pflanzen eingragt.

3. Marknester.

Camponotus quadriceps.

B. Der Hohlraum wird durch Mauern oder Zusammenspinnen von Blättern hergestellt (Kartonnester Forels).

a) Die Höhlung wird durch Mauern mit einem Mörtel aus Kitt und kleinen Fremdkörpern hergestellt.

4. Mörtelnester nebst Kammern u. Gängen.

Acropyga bicolor u. *Technomyrmex albigipes*.

b) Die Höhlung wird durch Zusammenspinnen von Laubblättern hergestellt. 5. Blattnester.

Oecophylla smaragdina, *Polyrhachis dahl* u. *P. rastellata*.

II. Das Nest wird in einer vorgefundenen Höhlung angelegt.

Naturnester.

A. Das Nest wird in flachen Spalten angelegt. 6. Spaltnester.

a) Der Spaltraum befindet sich unter Holzwerk am Boden.

Plagiolepis longipes.

b) Der Spaltraum befindet sich über dem Boden.

α) In Blattscheiden u. unter Rinde. *Tetramorium guineense*.

β) In Häusern. *Monomorium pharaonis* u. *M. floricola*.

B. Die für das Nest gewählten Hohlräume sind nicht flach spaltförmig.

a) Die Höhlung für das Nest ist eine enge Röhre in einem hohlen Stengel oder Zweige. 7. Röhrennester.

Tapinoma indicum, *Cremastogaster dahli* u. *Cardiocondyla wroughtoni*.

b) Die Höhlung ist geräumig, oft mit labyrinthartigen Kammern versehen. 8. Kammernester.

Iridomyrmex cordatus, *Camponotus maculatus* u. *C. vitreus*.

Bemerk. hierzu. 1. Erdnester p. 28—29. — 2. Holznester p. 29. — 3. Marknester p. 29—32. — 4. Mörtelnester u. andere Bauten p. 32—33. — 5. Blattnester p. 33—34. — 6. Spaltnester p. 34—35. — 7. Röhrennester p. 35. — 8. Kammernester p. 35—37. — Zusammengesetzte Nester p. 37.

— Ameisen als Genusmittel siehe unter Uebersicht nach dem Stoff, Anmerk. p. 400 dieses Berichts.

Leben der Ameisen. Lampert:

Schon im Altertum erregten sie die Aufmerksamkeit (Horaz, Pythagoras). Forel (A. sind keine Reflexmaschinen). Bethe (A. sind Reflexautomaten). Wasmann, Gegner des letzt. (A. besitzen Instinkt im weitest. Sinne d. Wortes). A. sind Staatenbildner. Tastsprache. Nestgeruch. Die einzelnen Stände. Bei uns bauen sie Nester, in den Tropen die Wanderameisen keine, weil sie Räuber sind. Nester in den Tropen bis zu 15 □ m Fläche, die einzelnen Zellen oft 30—60 cm gross. Bau der Nester. Spinnapparat bei einigen Ameisen (Chun). Chemotropismus (Bethe). Nahrung. Einfluss auf die Vegetation. Myrmekophilien oder Ameisenfreunde (Wasmann). Kriege (bereits Aeneas Sylvius, der spätere Papst Pius II. berichtet davon). Soldaten können nicht arbeiten. Vorliebe der A. für gewisse Pflanzenausscheidungen. Imbaubabau. Bethe's Experiment mit der Drehscheibe. Sein Schluss, die Ameisen können nur eine Richtung, nicht den Weg, erkennen, ist zweifelhaft.

Biologische Beobachtungen. Prowazek:

Im Leben der Ameisen spielt der Geruchssinn eine bedeutende Rolle und viele Verrichtungen u. s. w. werden einfach durch besondere Geruchstropismen ausgelöst u. geleitet. In diesem Sinne wurden folg. Beobachtungen gemacht:

1. Fremde Ameisen der gleichen Art in ein anderes Nest gebracht, werden alsbald angegriffen u. gezerrt, doch scheinen hier individuelle Verschiedenheiten eine Rolle zu spielen.

2. Ameisen einer anderen Art werden fast immer angegriffen.

3. Ameisen des gleichen Nestes, die längere Zeit in der Hand gehalten oder mit Achselschweiss beschmiert wurden, wurden von ihren Genossinnen angefallen u. gezerrt.

4. Ameisen mit Saft zerquetschter Puppen derselben Art, aber aus einem anderen Neste, waren ebenfalls Angriffen ausgesetzt; es verstärkte sich die Erscheinung bei Puppen aus dem Neste ein. and. Art.

5. Puppen (Ameiseneier) aus einem fremden Nest ders. Art in ein anderes Nest gebracht, wurden sofort fortgetragen, was ja bekanntl. fast immer geschieht (doch herrscht hier individuelle Variationsfähigkeit).

6. Entwicklungsstadien von verschied. Inquilinen der Ameisenester in benachbarte Nester ders. Art versetzt, wurden längere Zeit als Freunde betrachtet u. erst ziemlich spät fortgetragen.

7. Ameisen, die mit dem Saft aus zerquetschten Ameisen ders. Art aus einem anderen Neste oder mit dem einer fremden Art bestrichen waren, wurden gleichfalls angegriffen.

Auch die Wege sind mit besonderen orientirenden Duftstoffen behaftet (Bethe) (Beispiele von Prow.). Ein besonderes Angstgefühl scheint den A. zu fehlen. Ameisen in der Hand gehalten, putzen sich nachher sehr eifrig. Der Sitz des Geruchssinns steckt wahrscheinlich in den Fühlern, wo sich hier und da hakige starke Borsten vorhanden sind, die gegen die Basis eine spatelförmige durch eine Membran verschlossene Vertiefung besitzen. Eine getötete Ameise in's Nest geworfen, wird bald von zahlr. Genossinnen umstanden. Ob Mitteilung durch Betasten? Versuche erwünscht. Entstehen des kugelartigen Baues der Nester. In einer zerquetschten Ameise wurden vom Verf. kleine träge parasitische Nematoden gefunden.

Acantholepis carbonaria var. *obtusa* n. **Emery**, Bull. Soc. Entom. Ital. vol. XXXIII p. 63.

Acropyga. Bestimm. der Gatt. **Dahl, F.**, p. 7. — Bestimm. von *moluccana* (Mayr) u. *bicolor* Forel (= *Plagiolepis bicolor*) p. 12.

bicolor. Lebensweise. **Dahl, F.**, p. 42, Nest u. Gänge p. 28, 33. — *moluccana* p. 12; Lebensweise p. 41, 52; hält Wurzelläuse p. 45; Nest p. 28, 29. — *acutiventris* Rog. (Ceylon). **Emery**, Deutsche Entom. Zeitschr. 1901 p. 121).

moluccana Mayr. (steht *acutiventris* aus Indien sehr nahe). Ralum, Ceram, Amboina, Borneo. **Forel**, Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. Bd. 1901 p. 24.

— — Nest. **Dahl, F.**, p. 29. — Ausläufer des Nestes treten wie bei unseren *Lasius flavus* an lebende Pflanzenwurzeln heran, in denen Ställe für Wurzelläuse angelegt werden. *Camponotus quadriceps*. Symbiose mit *Endospermum formicarum* Becc. **Dahl, F.** p. 29—32. Schilderung. — Der Ameisenbaum macht mit seinen zahllosen Bewohnern stets einen äusserst gesunden u. üppigen Eindruck; an Parasitismus ist wohl nicht zu denken. — *bicolor*. Gänge p. 33.

Aenictus. Nicht so empfindlich gegen die Sonne wie *Dorylus*. Beobachtung der Züge. **Brauns** (Willowmore), Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. Hft. 1 p. 16—17. — Siehe auch *Dorylus*.

eugenii Em. Gäste dess. **Wasmann** (9) p. 275.

Neuer Gast aus Süd-Afrika. **Wasmann** (9) IV. — muthmassl. ♀. **Emery**, Monit. Zool. Ital. vol. XI, Suppl. p. 47. — *Alaopone abeillei* ist das ♀ von *Aenictus*. **Emery**, Bull. Soc. Entom. Ital. vol. XXXIII p. 43—47 nebst Holzschnitt.

Neu: *rotundatus* (im allem. kleiner wie *Ae. Eugenie* **Emery**, der die n. sp. sehr nahe steht. Färb. bei d. n. sp. mehr gelb, bei *Eug.* vorherrschend rostrot). **Mayr**, Annal. naturhist. Hofmus. Wien, XVI. Bd. p. 1 ♀ (Port Elizabeth in der Capcolonie). — *Steindachneri* (Untersch. von d. vor.) p. 2 ♂ (Reddersburg im Oranje-Freistaate). — *punctiventris* **Emery**, Bull. Soc. Entom. Ital. vol. XXXIII p. 47 (Borneo). — *ricator* p. 48 (Natal). — *mariae* var. *natalensis* n. p. 49.

- Aenictogiton* n. g. (*Aenictus* nahe), **Emery**, Bull. Soc. Entom. Ital. vol. XXXIII p. 49. — *fossiceps* p. 49 (Congo).
- Alfaria emeryi* **Forel**, Revue Suisse Zool. vol. IX p. 326 (Columbia).
- Anochetus*. Bestimm. der Gatt. **Dahl, F.** p. 7. — *cato* Forel u. *punctiventris* **Mayr**, *oceanicus* **Emery** Bestimm. p. 12.
- agilis* (scheint sich *gladiator* F. Sm. zu nähern). **Emery**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 52—53 ♀ (Borneo, Banguay). — *talpa* **Forel**, Revue Suisse Zool. vol. IX p. 351 (Natal).
- cato* u. *punctiventris*. Lebensweise. **Dahl** (1) p. 41.
- punctiventris* **Mayr**. r. *oceanicus* **Emery** ♀. Bei Ralum, im zerfallenen Holze, am Fusse eines Stammes, wie die meisten *Anoch.*-Sp. Bish. in Friedrich-Wilhelmshafen u. Berlinhafen auf Neu-Guinea, sowie in Neu-Caledonien gefund.; Stamm-Art u. Rassen in Indien (Dekan). **Forel**, Mittheil. zool. Mus. Berlin, II. Bd. p. 6. — *cato* (bei *Turneri* u. *Africanus* zu stellen, jedoch leicht unterscheidbar) p. 6 ♀ (Fundort wie vorige).
- punctatus* **Mayr**, Annal. naturhist. Hofmus. Wien, XVI. Bd. p. 4—5 ♀ (Port Elizabeth).
- Anomma*. Neue Gäste. **Wasmann** (9) II. Afrik. Treiberameisen. — ♀. **André**, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris VI p. 364—368.
- Aphaenogaster barbara* Linn. Palma, Majorca. — *testaceopilosa* Linn. Palma, Majorca. **Saunders** (1) p. 208.
- barbara* L. (Biskra, bei Algier) **Saunders**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 527. — *testaceopilosa* Luc. (Algier) p. 527.
- — Linn. u. *testaceopilosa* Luc. auf Corsica. **Bignell** p. 8.
- Atopomyrmex ceylonicus* (erster Vertreter der sonst afrik. Gatt., von den übrigen bisher bekannt gewordenen Sp. sehr verschieden, besonders in Bezug auf Form des Petiolus, in dieser Beziehung schliesst sie sich der neuen westafr. *nodifer* an). **Emery**, Deutsche Entom. Zeit. 1901 p. 114—115 ♀ nebst Abb. (Negombo). — *nodifer* p. 115 in Anm. ♀♀ (Kamerun).
- Importiert: *fulva* Rog. aus Nordamerika (Vermont) mit Farrenkräutern nach Hamburg importiert. **Kraepelin**, p. 193.
- Atta* (*Acromyrmex*) *moelleri* For. r. *modesta* n. st. ♀ major (etwas dunkl. als die typ. Form) **Forel**, Jahrb. Hamb. wiss. Anst. 18. Bd. 2. Beihft. p. 49—50 (Espiritu-Santo, Brasil.). — (*Acromyrmex*) *moelleri* For. helle Var. (Espiritu Santo, Brasil.) p. 50. — (*Acr.*) *coronata* Fabr. ♀ (Bras.) (Santa Cruz, Rio Grand do Sul) p. 50. — sp.? (Santa Cruz, Rio Grand do Sul)
- (*Trachymyrmex*) *tardigrada* Buckley. Nest in Nordcarolina, Black Mountain. **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 396—397.
- fervens* Say ♀ (Cuerna vaca, Morelos) **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 124; Biologische Notiz von **Wheeler**, t. c. p. 200.
- (*Mycocepurus*) *goldii* var. *schuppi* n. **Forel**, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. 10. Bd. p. 301. — (*Acromyrmex*) *subterranea* ♂. **Forel**, t. c. p. 301. — (*Acromyrmex*) *nigra* Smith r. *muticinoda* n. st. (durch die allgem. Körperform von der Form aus der Provinz Rio verschieden) **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 336 ♀ (Baturité, Ceara, Brésil).
- (*Trachymyrmex*) *tardigrada* Buckley. Entdeckung des Nestes in Nord-Carolina, am Black Mountain. **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 396—397.

Azteca Alfari Emery var. *lucidula* Forel ♂ Olinda, Brésil. **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 367.

aurita Emery ♂ (Tipuani, Bolivien), *velox* Forel ♂♀ (San José de Guatemala), Alfari Em. r. *lucidula* Forel ♀ (Fundort wie vorher). **Forel**, Jahrb. Hamb. wiss. Anst. 18. Bd. 2. Beihft. p. 65.

Belonopelta ist ebenfalls eine kritische Gatt. wie *Ectomomyrmex*. Bemerk. zu den heterogenen Spp. ders. **Emery**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 41. Spp. ders. **Emery**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 41. — Liste p. 44—45. *Darwinii* For. r. *indica* Em. (Sumatra) **Forel**, Jahrb. Hamb. wiss. Anst. 18. Bd. 2. Beihft. p. 46 (Sumatra, Serdang).

Bothriomyrmex Bestimm. d. Gatt. **Dahl**, F. p. 8.

meridionalis Roger auf Corsica. **Bignell** p. 8.

meridionalis Roger. **Bignell**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 128.

meridionalis Rog. race *atlantis* Forel (bei 2—3 Stück. sind die 3 Endglieder auf einer Seite concav; nach Forel ist dies häufig bei dieser Sp. der Fall. — Pointe Pescade) **Saunders**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 527. — Sp.? ♀ bei Ralum im Grasland. **Forel**, Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. Bd. p. 17.

Bothroponera siehe *Pachycondyla*.

Brachymyrmex minutus australis n. st. **Forel**, Mittheil. Schweiz. Entom. Ges. 10. Bd. p. 302.

musculus, eine gute Sp. **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45. p. 135.

— Forel ♀ (Cuernavaca, Morelos) Arbeiter identisch m. dem von Costa Rica. Forel hatte dieselbe als eine Rasse von *Br. tritis* angesehen, der Unterschied ist aber so gross, dass sie als Sp. zu betrachten ist. **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 135.

Brachyponera subg. n. von *Euponera*, siehe dort.

lutea ♀, Ende der Tibia. **Emery**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 198.

Calypptomymex Emery (♂, Flgl. wie bei *Meranoplus*, mit einer Cubital- u. einer Discoidalzelle. Aber das Pterostigma ist gross u. rundlich und die Radialzelle ist offen. Kopf relativ gross u. hinten convex. Clypeus mit Seitenkielen, ohne Zähne. Stirnleisten von gewöhnlicher Form, bilden keine Grube für den Schaft. Thorax zu Expansionen, ähnlich wie bei *Myrmecocrypta*, neigend; es sind aber erst Rudimente davon vorhanden. Fühlerschaft länger als bei *Meranoplus*. ♀ wie d. ♂ in generisch. Beziehung). **Forel**, Abhdlgn. Hamb. wiss. Anst. 18. Bd. 2. Beihft. p. 50. — Schraderi (von C. Beccarii durch die Metanotum-Zähne u. die Skulptur gänzl. versch.) p. 50—51 ♂♂ (Australien). — *Emeryi* (Regelmässigkeit der Löffelhaare) p. 51—53 ♂♂ (Sarawak, Borneo). — Von dieser Gatt. bisher nur C. Beccarii Emery ♀ aus Amboka bek.

Camponotus. **Forel** beschreibt in den Mittheil. des Mus. Hamburg 18. Bd. 2. Beihft. folg. Formen: (*Colobopsis*) *claviscapus* Forel (Porto Cabello, Venezuela) p. 66. — (*Colobopsis*) *Rothneyi* Forel r. *Krafti* n. st. (vielleicht später als eigene Art aufzufassen, wegen der kürzeren Form des Kopfes etc.) p. 66 (Singapore). — *Carin* Emery var. *tenuisquamis* n. (wie Typus, doch die Schuppe, ohne so dünn zu sein wie bei *C. maculatus* r. *mitis*, ist viel dünner als beim Typus u. bei *Dorycus*, bei all. Formen des ♂ u. beim ♀ recht schwierige

Form. Hier ähnliche Schwierigkeiten wie in Amerika mit der Gruppe *maculatus* u. dem *C. Landolti* p. 67 ♀♀ (*Indrapura Estate* u. *Bindjey Estate*, *Sumatra*). — *maculatus* *Fabr. r. Kaschgariensis n. st.* (den Rassen *sylvaticus* *Ol.*, *cognatus* *Sm.*, *erigans* *Forel* sehr ähnlich) p. 68 ♂ maj. et min., ♀ (*Maralbaschi* am *Kaschgar-Darja*). — *mac. F. r. Soulouquei n. st.* (äusserl. *C. ustus* *Forel* ähnl.) ♀ maj., ♀ (*Genaives*, *Haiti*). — *mac. F. r. Solon* *Forel v. Chilon n.* (kleiner als die Stammrasse) p. 69 ♀ (*Senegal*, *Dahomé*). — *mac. r. setitibia n. st.* (der *r. irritans* *Sm.* u. der *r. pallidus* *Sm.* sehr nahest., von gleicher Grösse. Kopfform der *r. pallidus*. Behaarung u. Sculptur so auffallend, dass diese Form eine eigene Sp. bilden dürfte) p. 68—69 ♂ major (*Tandjong*, *S.-O.-Borneo*). — *mac. F. r. impatientis* *Forel* ♀ (*Maracaibo*) p. 69. *mac. Fab. r. Liengmei* *Forel* ♂♀ (*Algoa-Bay*, *S.-Afr.*) p. 69. — *mac. Fab. r. Caffer* *Emery* ♂♀ (*Port Elizabeth*, *Capland*) p. 69. — *mac. Fab. r. Caffer* *Em.*, kleinere schwärzere *Var.* (Fundort wie vorher) p. 69. — *mac. Fab. r. Brutus* *Forel* ♂ (*Ssibange*, *Sette*, *Gaboon*) p. 69. — *mac. Fab. r. congolensis* *Em.* ♀ (*Westafr.*) p. 69. — *mac. Fab. r. picipes* *Oliv.* ♂ (*St. Cruz*, *Rio Grande do Sul*) p. 69. — *mac. Fab. r. simillinus* *Smith* ♂ (*Santos*, *Brasil.*) p. 69. — *tenuiscapus* *Rog. r. hybridus* *nov. st.* (gedrungener als *r. Koseritzi* u. *r. punctulatus*: auch kleiner. Hat ungefähr die Gestalt von *C. fastigatus* *Rog.* — Von der *r. minutior* *Forel*, die auch so klein ist, unterscheidet sich die *r. hybridus* durch ihren viel grösseren, breiteren Kopf u. durch ihre zieml. reiche Pubescenz, sowie durch die Farbe. Diese Rasse bildet einen Uebergang von *C. tenuiscapus* zu *C. fastigatus*, dem Letzteren noch näherstehend als der *r. Koseritzi*) p. 69 ♂ major u. minor, ♀ (*Brasil.*, *Botan. Garten*). — *tenuiscapus r. Koseritzi* *Em.* ♂ (*Tipirani*, *Bolivien*) p. 70. — *nitens* *Mayr* ♂♀ (*Bogota*, *Columbien*) p. 70. — *Kubaryi* *Mayr* ♀♂ (*Samoa*) p. 70. — *Balzani* *Em.* ♂ (*Espirito Santo*, *Brasil.*) p. 70. — *ustus* *Forel* ♀♂ (*St. Thomas*) p. 70. — *abdominalis* *Fab. v. daliensis* *For.* ♂♀ (*Costa Rica*) p. 70. — *abd. Fab. r. esuriens* *Sm.* ♂♀ (*Puerto Cabello*, *Venez.*) p. 70. — *abd. Fab. r. stercorarius* *For.* ♂♀ (*Guatemala*) p. 70. — *abd. Fab. r. mediopallidus* *For.* ♂♀ (*Curaçao*) p. 70. — *abd. Fab. r. opaciceps* *Rog.* ♂♀ (*Curaçao*) p. 70. — *pensylvanicus* *de Geer.* ♂♀ (*Aquadillo*, *Porto Rico*) p. 70. — *ligniperdus* *Latr. v. obscuripes* *Mayr* (*Yesso*, *Japan*). — *marginatus r. Brunni* ♂ min. (von der *gross. r. vitiosus* *Sm.* u. d. *r. quadrinotatus* *For.* mit ihrer scharfrandigen dünnen Schuppe durchaus verschieden. Da jedoch 2 nearkt. Rassen, *r. decipiens* *Em.* u. *r. subbarbatus* *Em.* bereits auch eine dickere, stumpfrandige Schuppe haben, kann *Forel* daraus nur eine Rasse, *v. C. marginatus*, machen) p. 70. — *Siemsseni* (diese Sp. steht zwischen der Gruppe *mistura* u. dem *C. Autrani*. Sie ist viel stämmiger als *C. odiosus*) p. 70 ♂ major, ♀ (*Deli*, *Ost-Sumatra*, *Indrapura Estate*; *Langkat*, *Sumatra*). — *pressipes* *Em.* ♀ (*Tandjong*, *Borneo*) p. 71. — *Sucki* (kurz u. stämmig, so dass die Sp. einem *Pheidole*-Soldat ähnlich sieht. Farbe u. Behaarung ziemlich genau wie bei *C. palpatum* *Em.* — Im Verhältniss zu ihrer Grösse hat diese sonderbare Art einen noch breiteren Kopf als *C. quadrimaculatus* *Forel* aus *Madagasc.*, den breitesten, der bei *Camp.* bekannt ist. Thorax nicht länger als der Kopf) p. 71 (*Tandjong*, *S.-O.-Borneo*). — *Emeryi* (sehr eigenthümliche Form, bildet den Uebergang der Gruppe *depressus* zur Gruppe *senex*). — *pellitus* *Mayr r. scintillans n. st.* p. 72—73 ♂ minor (*Paraguay*). — *Kraepelini* (nahe *C. angulatus* *Mayr*)

- p. 73 ♂ minor (Bolivien; Tipuani). — quadrilatus Mayr r. *Leonhardi* n. st. ♂ min. p. 73—74 (Tipuani, Boliv.) — planatus Roger ♀ (Costa Rica) p. 74. Zoc Forel p. 74 ♀ (Guatemala). — inflatus Lubbock ♀ („Austral.“) p. 74. — Elliotti Forel ♀ (Fort Dauphin, Madag.) p. 74. — Meinerti For. ♂ (Monrovia) p. 74. — Polyrhachioides Em. ♀ (Sette Camma, West-Afr.) p. 74.
- Bestimmung der Gatt. **Dahl, F.**, p. 9. — Bestimm. der Spp.: maculatus (F.) chloroticus Emery, mac. (F.), irritans (Smith), quadriceps (Smith), vitreus Smith p. 17. — weismanni Forel, reticulatus Rogeri, bedoti Emery, doricus (Smith), mutilatus (Smith) var. minuscula Emery p. 18.
- irritans u. maculatus, Lebensweise. — maculatus, Nest p. 28, 35; Schwärmzeit p. 25, 26. — quadriceps, Lebensweise p. 41, 52; Nest p. 29. — reticulatus, Lebensweise p. 40. — vitreus, Lebensweise p. 42; Nest p. 28; Schwärmzeit p. 25. — weismanni, Lebensweise, p. 42.
- ligniperdus*. Baut in Europa (beobachtet durch Blochmann) wie in Amerika seine Nester an nach Osten gerichteten Abhängen. Erklärung nach **Forel** (1). Die Morgensonne weckt die Ameisen zur Arbeit; nachmittags wird es zu heiss. Bei westlicher Lage gingen die Morgenstunden unbenutzt vorüber und nachmittags würden die Thiere unter der Hitze leiden. Nachts gleichen sich die Unterschiede zwisch. der östl. u. westl. Lage schnell aus.
- maculatus Fab. (r. aethiops Latr.), lateralis Oliv. u. pubescens Fab. auf Corsica. **Bignell** p. 8.
- Sicheli Mayr von Monte Sentuiri, bei Pollensa, Majorca. **Saunders** (1) p. 208. — Spp. auf Ceylon. **Emery**, Deutsche Entom. Zeitschr. 1901 p. 121 u. 122. maculatus F. subsp. mitis F. Sm. mit var. variegata F. Sm. u. fuscithorax For. p. 121. — mac. subsp. infuscus For. (etwas kleiner als die continentale Form u. glänzender) (Nuwara Elyia). — mac. subsp. thraso For. (= maculatus subsp. adenensis Emery) (Trincomalee, Anuradhapura, Ceylon). — mac. subsp. compressus F. p. 121. — rufoglaucus Jerd. mit var. paria Emery p. 121. — barbatus Rog. (Bandarawella). — Bemerk. zur Beschr. p. 121. — sericeus F. (Ceylon) p. 122.
- Forel** behandelt ferner in d. Mitth. Schweiz. Entom. Ges. 10. Bd.: cameranoi var. *inlex* n. p. 302. — *reginae* p. 307 (Mossamedes). — *scalaris* p. 308 (Mossamedes). — foraminosus *caitensis* n. st. p. 309. — *mayri* var. *cubangensis* n. p. 309.
- Forel** beschreibt in den Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45: *apostolus* p. 369—370 ♂ major u. minor, ♀ (südl. Costa-Rica). — *zonatus* Emeri ♀ p. 371 (Olinda, Brésil). — *planatus* Roger ♀ (Bahia-Honda, Cuba) p. 371. — *fragilis* Pergande var. ♀ Hayti p. 371. — *Emeryodicatus* nom. nov. (= Camp. Emeryi For. Mitth. Nat. Hist. Mus. Hamburg 1901 Form.) p. 72.
- zoc For. aus Brasil., mit Orchid. nach Hamburg importirt. **Kraepelin** p. 194.
- Forel** beschreibt schliesslich in den Mitteil. Zool. Mus. Berlin II. Bd. 1901: maculatus F. r. chloroticus Emery. Ralum, bisher nur v. Neu-Guinea bekannt. Nester. Auffälliges Vorkommen geflügelt. Formen zu verschiedenen Jahreszeiten. p. 27. — Nach Forel ist pallidus Smith

eine Rasse von *C. maculatus*; *chloroticus* Em. steht *pallidus* äusserst nahe. — *maculatus* F. r. *irritans* Sm. ♀, Ralum p. 27. — *dorycus* Sm., Ralum, bish. Molukk. u. Neu-Guinea p. 27. — *quadriiceps* Smith, Ralum, bish. Aru, Morty u. Neu-Guinea, p. 27. — *vitreus* Sm., Ralum; bish. Fundorte; dimorph.; — *Colobopsis angustata* Mayr ist eine Var. des gross. Arbeiters von *C. vitreus*. = *mutilatus* Sm. var. *minusculus* Emery in litt., Ralum p. 27. — *reticulatus* Roger r. *Bedoti* Emery, Ralum. Stammform auf Ceylon zu Hause, die *R. Bedoti*, die fast nur eine Var. d. *R. Yerburyi* For. ist, wurde gefunden auf den Inseln Sula, Morty, Ternate, Batjan u. Borneo u. Neu-Guinea. — *weismanni* n. sp. (einer klein. ♀ minor von *reticulatus* R. *Bedoti* sehr ähnlich) p. 28 ♀ (Ralum).

Mayr behandelt in den *Annal.* des naturh. Hofmus. zu Wien, XVI. Bd.:

Bertolonii Emery. Die aus Port Elizabeth vorlieg. Arbeiter bilden nach Prof. Emery's briefl. Mitteilung eine unbedeutende Farbenvarietät. Beschr. d. ♂. p. 28 ♂. — *maculatus* F. *subsp. pictiventris* n. p. 28—30. Grosser ♀, klein. ♀ (Port Elizabeth). — *Braunsi*, p. 28, in Anm., grosser ♀, ♀ (Ostafrika, Waboniland).

maculatus r. *picipes* Ol. var. *pilosula* n. **Forel**, *Ann. Soc. Entom. Belg.* T. 45 p. 135 ♀ (Queretaro). — *maculatus* r. *simillimus* Smith var. *flavopubens* n. p. 135 (Cuernavaca, Morelos); der *simillimus* i. sp. bildet bezügl. der Pubescenz u. s. w. den Uebergang zwischen seiner Var. *flavopubens* u. der Rasse *impatibilis* For. — *fragilis* Pergande (Cuernavaca, Morelos). — *abdominalis* Fabr. ♀. Var. zw. der race *esuriens* Smith u. d. Var. *mediopallidus* Forel (Cuernavaca, Morelos) p. 136. — *mina* Forel ♀ minor, *rectangularis* Emery var. *rubroniger* Forel ♀ u. *rubrithorax* Forel ♀ (alle drei von Cuernavaca, Morelos).

— — *Biolog.* Notizen zu: *maculatus* subsp. *picipes* Oliv. var. *pilosula* Forel, *macul.* subsp. *simillimus* Sm. var. *flavopubens* Forel, *fragilis* Pergande, *rubrithorax* Forel, *rectangularis* Emery var. *rubroniger* Forel, *abdominalis* Smith var. u. *mina* Forel. **Wheeler**, t. c. p. 204—205.

— — *Fab.* race *dichrous* Forel ♂ ♀ ♀ maior et minor (Algier: Beni Mora on the hills of the desert; Biskra), *mac. Fab.* race *atlantis* Forel ♀ (Fontaine Chaude, near Biskra. — Die Ameise ist termitenfarbig), *mac. Fab.* race *sylvaticus* Oliv. (Azazga. — 1900'), *rufoglaucus* Jerdon, race *micans* Nyl. (Biskra, Médéa, 3000', Philippeville), *sicheli* Mayr ♂ ♀ (El Biar). **Saunders**, *Trans. Entom. Soc. London* 1901, p. 525—526.

— — var. *ionia* n. **Emery**, *Bull. Soc. Entom. Ital.* vol. XXXIII p. 59.

Cardiocondyla Emery. Bestimm. der Gatt. **Dahl**, *F.* p. 11. — *nuda* Mayr (+ *C. n.* var. *minutior* Forel), *wroughtoni* Forel p. 20.

nuda. Lebensweise. **Dahl** p. 39; Nest p. 28. — *wroughtoni*. Lebensweise, p. 42; Nest p. 28.

Wroughtoni Forel, Ralum, Indien. **Forel**, *Mittheil. Zool. Mus. Berlin*, II. Bd. p. 12. — *nuda* Mayr, Ralum; ganz Oceanien, p. 12—13. — *nuda* var. *minutior* Forel. Ralum, zuerst von Honolulu bekannt, p. 13.

- nuda **Mayr** r. mauritanica **Forel**, Biskra. **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 378.
- sp.? ♂ auf Corsica. **Bignell** p. 8.
- Carebara vidua** **Smith**. Besch. d. ♀, nebst ♀ bei Termes natalensis. **Biolog. Notiz** von Haviland. Hierzu Bemerk. **Forel's**. **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 392—5.
- Cataulacus rugosus** **Forel** *subsp. micans* n. **Mayr**, Annal. naturhist. Hofmus. Wien XVI. Bd. p. 27 ♀ (Port Elizabeth).
- wissmanni otii** n. st. **Forel**, Mitteil. Schweiz. Entom. Ges. 10. Bd. p. 304. — *baumi* p. 304. — *brevisetosus* p. 305 (beide n. sp. von Mossamedes).
- Brookei** (Untersch. von den verw. insularis **Sm**, setosus, hispidus, flagitiosus u. granulatus) **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 378—379 ♀ ♂ ♀ (Borneo, Sarawak).
- taprobanae* **F. Sm.** (Ceylon) **Emery**, Deutsche Entom. Zeitschr. 1901 p. 121.
- Centromyrmex greeni** **Forel**, Revue Suisse Zool. vol. IX p. 325 (Singapore).
- Cerapachys cribrinodis natalensis** n. var. **Forel**, Revue Suisse Zool. vol. IX p. 335.
- Colobopsis angustata** **Mayr** ist eine Var. des grossen Arbeiters von **Camponotus vitreus**. **Forel**, Mittheil. Zool. Mus. Berlin II. Bd. 1901 p. 27.
- truncata* **Spin.** auf Corsica. **Bignell** p. 8.
- Cremastogaster**. Bestimm. d. Gatt. **Dahl, F.** p. 18. — *dahli* **Forel** u. *ralumensis* **Forel**. Bestimm. p. 19.
- Forel** in den Mittheil. Schweiz. Entom. Ges. 10. Bd.: *brevispinosa* var. *schuppi* n. p. 299. — *victima* var. *alegrensis* n. p. 300.
- Forel** in den Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45: *Auberti* **Em.** race *laestrygon* **Em.** (Algier) **Saunders**, Trans. Entom. Soc. London 1801 p. 528. — *sordidula* **Nyl.** (Constantine) p. 528.
- Dahlii** (von *recurva* **Em.** versch. durch die viel längeren Dornen des **Metanotum** u. des **Pronotum**, bedeutende Grösse etc., *tetracantha* hat kürz. u. gerade **Pronotumdornen**, eine tiefe **Metanotalnaht**, geringe Grösse etc.) **Forel**, Mittheil. Zool. Mus. Berlin II. Bd. 1901 p. 15—16 ♀ (b. **Ralum**, auf der stinkenden Blüte von **Amorphophallus** u. in den hohl. weich. Stengeln einer Pflanze). — *ralumensis* (Thorax erinnert an *brevispinosa* etc.) p. 16 ♀ (bei **Ralum** im **Lowon**, im zerfall. Holze am Fusse eines Stammes).
- Emery** behandelt in den Zool. Jahrb. Abth. f. System. 14. Bd.: *deformis* **F. Sm.** emend. von **Tomohon**, ♀ u. ♀ in **Myrmecodia** und in **myrmekophilen** **Farnen** des Genus **Lecanopteris**, p. 574. — *ampullaris* **F. Sm.** weicht davon nur der Beschreibung nach durch geringe **Farbenunterschiede** (die veränderlich sind) ab, ist also wohl **synon.** damit. Auch *edentata* (♀) **Mayr** ist wohl hierherzuziehen. — Bemerk. zu ein. kopflosen Stück (vermutl. *inflata* **F. Sm.**). — *pauli* p. 575 ♀ Abb. vom **Thorax** u. **Petiolus** Fig. A, a, b (**Salabanka**, **SO.-Celebes**, in einem **myrmekophilen** **Polypodium**). — *fritzi* (gehört zur Gruppe d. **C. sordidula**, aber gut kenntlich. Struktur der Antenne beim ♂ sehr merkwürdig) p. 576—577 ♀ ♀ **Thorax** u. **Petiolus**, Antenne Fig. B, a, b (**Tomohon**, in den Blättern einer **Orchidee**). — *fruhstorferi* p. 577—578 ♀ **Thorax**, **Petiol.** Fig. C, a, b (**Süd-Celebes**, **Bua Kraeng**, 1500 m).

- Dohrni Mayr. Kartonnest (ganzes Nest 1' lang, $\frac{1}{2}$ ' dick) (Ceylon). **Emery**, Deutsche Entom. Zeitschr. 1901 p. 120.
- opaciceps* (in der Uebersicht der afrik. Crem.-Arten siehe Annal. Hofmus. Wien X. Bd. 1895, p. 135 zu 13a zu stellen, von den hierzu gehör. Spp. durch Sculptur leicht unterscheidbar). **Mayr**, Annal. naturhist. Hofmus. Wien XVI. Bd. p. 12—14 Arbeiter (Port Elizabeth). — Besch. u. Abb. der Nester p. 13—14 nebst Anm. von *Cr. opaciceps* Mayr. Taf. I Fig. 1 u. Taf. II, Fig. 3, hova For., Taf. I Fig. 2, Peringueyi, Em. Taf. II Fig. 4.
- sordidula* Nyl. var. p. 14 (bei Bothaville im Oranje-Freistaat).
- brevispinosa* Mayr. v. *minutior* For. (Cuernavaca, Morelos). **Emery**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 129. — *opaca* Mayr. var. *dentinodis* n. (kleinere, hellere Var. mit schwächerer Skulptur auf dem Kopfe) p. 130 (Queretaro). — Biolog. Notiz zu beiden. **Wheeler**, t. c. p. 203.
- quadrifornis* Roger, typische Form zu Sao Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brésil. **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 391. — var. *gracilior* n. p. 391—392 ♀ (Sao Paolo, Brésil).
- laboriosa* Smith var. *Matsumurai* n. **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45. p. 372 ♀ (Sapporo, ile de Yesso).
- dahli*, Lebensweise. **Dahl** p. 42; Nest p. 28, 31 u. Tabelle. — *ralumensis*, Lebensweise p. 41.
- inermis kaschgariensis* n. st. **Forel**, Jahrb. Hamb. wissenschaft. Anstalt. 18. Bd. 2. Beiheft p. 63. — *deformis sewardi* n. st. p. 64.
- Yappi* **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 374—375 ♀ (Gunong Inas, Halbinsel Malacca — in einem Farnkraut: *Lecanopteris carnosa*).
- *subg. Oxygyne* n. **Forel** hält es nunmehr für angebracht, die Gruppe der *Cr. Emmae*, *aberrans*, *Ranavalonae* etc. unter diesem Subg.-Namen abzutrennen p. 375. — Neu hierher: *Daisyi* p. 375, 376 ♀ ♀ (Borneo, Sarawack).
- scutellaris* Ol. Der Korkeiche schädlich. **Seurat**. — Sie verfertigt ihr Nest in der Korksicht aus oviden Kammern von 22 u. 6 mm Achsenlänge. Diese sind meist zur Längsachse des Baumes parallel orientirt, übereinander in der ganzen Ausdehnung des Korkes gelegen u. untereinander durch cylindrische Gänge von 2—5 mm Durchmesser verbunden. In den senkrecht darauf stehenden Kammern, die durch (2 mm im Durchmesser haltende) Löcher nach aussen kommunizieren, befinden sich zahlreiche Eier u. Larven. — *scutellaris* Oliv. auf Corsica. **Bignell** p. 8.
- Cryptocerus aztecus* (steht *setulifer* u. *striativentris* Em. nahe) **Emery**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 125—126, ♀ 2 (Cuernavaca, Morelos). — *Wheeleri* p. 126—128 ♀ 2 (Cuernavaca, Morelos). — Der Dimorphismus dieser Art (besonders des Arbeiters) ist so aberrant, dass man an der Zusammengehörigkeit beider Formen zweifeln könnte, wenn nicht Wheeler sie zusammen gesammelt hätte.
- Biolog. Notiz zu beiden. **Wheeler**, t. c. p. 201.
- hamulus* Roger, var. *haytianus* n. **Forel**, t. c. p. 337—338 ♀ Haiti (die Querriefen hinten auf dem Hinterhaupt u. die spitzen Dornen auf dem 1. Knoten des Pediculus differiren von denen der typisch. Form).

- atratus* L. ♀ (Antille St. Thomas). — *spinosus* Mayr ♂ (Tipuani, Bolivien).
Forel, Jahrb. Hamb. wiss. Anst. 18. Bd. 2. Beiheft p. 50.
- Cylindromyrmex brasiliensis* (*striatus* Mayr 1887 ♂ ♀ [non ♀], nec Mayr 1870).
Emery, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 53—54 (Santa Catharina). —
striatus. 2 ♂ von Pérou. Beschr. p. 54.
- Cyphomyrmex rimosus* Spin. *r. dentatus n. st.* (steht *Wheeleri* For. sehr nahe, diese differirt durch Skulptur, Pubescens, Gestalt des Pediculus etc.)
Emery, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 124—125 ♀ (Cuernavaca, Morelos).
 — Ob mit Recht als *r.* zu *rimosus* gehörig? — *rimosus var. major n. var.*
 p. 125 ♀ (Guatemala).
- rimosus* Spin. subsp. *dentatus* Forel. Biolog. Notiz. **Wheeler**, t. c. p. 200.
dentatus Forel *r. olindanus n. st.* (steht zwischen *dentatus* u. *rimosus*). **Forel**,
 Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 337 (Olinda, Brésil).
- Cryptopopone* Emery. Stellung. **Emery**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 41.
- Dacryon Turneri* (diese 2 Sp. beweisen, dass sich die Gatt. D. an *Podomyrma*
 u. nicht an *Tetramorium* anschliesst, trotz der Clypeusbildung. Ob sie auf-
 recht erhalten werden soll, muss die Zukunft zeigen). **Forel**, Jahrb. Hamb.
 wiss. Anst. 18. Bd. 2. Beiheft. p. 60 ♂ ♀ (Mackay, Queensland).
- Diacamma Trischleri* Forel ♀ (Singapore, Java, Sumatra). **Forel**, Mittheil.
 Zool. Mus. Berlin, II. Bd. p. 7.
- rugosum* Guil. ♀ u. *rug. sculptum* Jerd. auf Ceylon. **Emery**, Deutsch. Entom.
 Zeitschr. 1901 p. 113.
- tortuosum* Smith ♂ (Tandjong, Borneo). **Forel**, Jahrb. Hamb. wiss. Anst.
 18. Bd. 2. Beiheft. p. 46.
- Dinoponera grandis* Perty ist sehr variabel. **Emery**, Ann. Soc. Entom. Belg.
 T. 45 p. 47—48 unterscheidet daher *grandis* Perty, Type von Para p. 47
 —48. — *subsp. lucida n. ♀* p. 48 (Etat de Espiritu Santo). — *subsp. mutica*
n. ♀ p. 48 (Matto Grosso). — *subsp. longipes n. p.* 48 (Pérou, Cumbase). —
subsp. australis n. p. 48 (S. Paulo, Missiones, Paraguay).
- Diplomorium n. g.* (hat viel Aehnlichkeit mit *Solenopsis* Westw. u. *Allomerus*
 Mayr. Das ♀ steht dem von *Tranopelta* Mayr sehr nahe). **Mayr**, Annal.
 naturhist. Hofmus. Wien XVI. Bd. p. 16—18. — *longipenne* p. 18 Arbeiter u.
 Weibchen (unter Steinen in der Erde bei Port Elizabeth).
- Discothyrea*. Charakt. d. ♂. **Emery**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 51,
 Bemerk. z. ♀ Max.-Palp. 4., Labial-Palp. 3-gliedr. — *oculata* p. 52 ♀, ♀, ♂,
 (Cameron).
- Dolichoderus bituberculatus* Mayr ♀ von Singapore. Kartonnester auf Baum-
 ästen. **Forel**, Mittheil. Zool. Mus. Berlin II. Bd. p. 17.
- debilis* Emery *var. Siversi n. var.* **Forel**, Jahrb. Hamb. wiss. Anst. 18. Bd.
 2. Beiheft. p. 65 ♀ (Puerto Cabello). — Den Typ. *debilis* fand Forel in
 Columbien in Parabiose mit der klein. *Cremast. brasiliensis* Mayr.
- (*Hypoclinea*) 4 *punctatus* *Colobopsis truncata* u. *Leptothorax affinis* auf dem-
 selben Baume laufend. Nester derselben selten. Die Untersuchung
 eines Baumes zeigte, dass diese Arten in demselb. u. in seinen
 Zweigen ihre Nester hatten; während *Lasius fuliginosus* im Stamme
 hauste. **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 380—382. — S. auch
 p. 326 dieses Berichts.

patens var. *karawaiewi* n. **Forel**, Mittheil. Schweiz. Entom. Ges. 10. Bd. p. 303.

Dorylinae. Begründung Emery's in Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 36—37, warum er dieselben vor die Ponerinae stellt. — S. auch Ponerinae.

— sind in der Sammlung von Dahl nicht vertreten. **Forel**, Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. Bd. p. 10.

Subf. *Dorylinae*.

Emery nimmt nunmehr folg. (auch im „Thierreich“ zur Anwendung kommende) Gruppierung an:

Gruppe I. Dorylinae s. str.

1. Tribus: Dorylii. — 2. Tribus: Aenictii. — 3. Tribus: Ecitii.

Gruppe II. Cerapachinae.

4. Tribus: Acanthostichii. — 5. Tribus: Cerapachyi. — 6. Tribus: *Cylindromyrmii*.

Subf. *Ponerinae*.

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Tribus: Myrmecii. | 2. Tribus: Amblyoponii. |
| 3. „ Paraponerii. | 4. „ Ectatommi. |
| 5. „ Proceratii. | 6. „ Thaumatomyrmii. |
| 7. „ Platythyrei. | 8. „ Ponerii. |
| 9. „ Leptogenyi. | 10. „ Odontomachii. |
| 11. „ Melissotarsii. | |

Dorylinen-Gäste. Verzeichnis der bisher bekannten, nach Faunengebieten u. den Wirthsameisen geordnet. **Wasmann** (9) V. — Vergleich zwischen den Dorylinen-Gästen des neotropischen u. des äthiopischen Faunengebietes. VI.

Dorylus. Beschreibung von Nestern. Die bisher bekannten scheinen meist Wandernester gewesen zu sein. Ist sehr empfindlich gegen die Sonne. **Brauns, J.**, (Willowmore), Zeitschr. f. syst. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. Heft. 1 p. 14—16.

— Bestimm. d. Gatt. **Dahl, F.** p. 7.

helvolus. Neuer Gast aus Süd-Afrika. **Wasmann** (9) III.

juvenculus Shuck. aus dem Mittelmeer-Gebiet. Gast dess. **Wasmann** (9)

p. 274. — *helvolus* L. u. D. (*Anomma*) *wilwerthi* Em. Gäste. p. 274.

orientalis Westw. auf Ceylon. **Emery**, Deutsche Entom. Zeitschr. 1901 p. 113.

(*Dichthadia*) Klugi Emery (Serdang, Sumatra). **Forel**, Jahrb. Hamb. wiss.

Anst. 18. Bd. 2. Beihft. p. 47 (Serdang, Sumatra). — *affinis* Shuck. ♂

(Gaboon). — (*Anomma*) *nigricans* Illiger ♂. Diverse Varr. aus

Kamerun. Es ist schwierig zu sagen, zu welchen der neu auf-

gestellt. *Anomma*-♀ Arten (*A. Wilwerthi*, *Emeryi* etc.) die ♂ gehören.

Das beste ist die Feststellung der Zusammengehörigkeit abzuwarten

und dann den Namen *nigricans* für die der früheren *Anomma* Bur-

meisteri als ♂ zugehörige Form allein zu reserviren. p. 47.

(*Rhogmus*) *fimbriatus* Shuck. ♂ (Ostaf.) p. 47. — (Rh.) *Savagei* Emery

r. *mucronatus* Em. ♂. Beschreibung p. 47 (Wari, Forcados River,

Westaf.).

juvenculus Shuck. (Biskra, Algier). **Saunders**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 527.

Dorymyrmex Pyramicus Roger (Aguas calientes et Queretaro). **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 134. — *Biolog. Notiz* dazu. **Wheeler**, t. c. p. 204.

Ectatotomma. *Mictoponera n. subg.* s. unter *Mictoponera*.

Eciton. Neue Gäste. **Wasmann** (9) I.

Emeryella n. g. (Steht *Ectatotomma* sehr nahe, doch ist der Bau der Mandibeln ein ganz anderer u. erinnert an den von *Mystrium* u. *Myrmecia*).

Forel, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 334. — *Schmitti* p. 334—335 (Haiti).

Eumecopone subg. n. von *Neoponera* siehe dort.

Eponera (*Pseudoponera*) *Sharpi*. **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 379 — 380 ♂ ♀ (Singapore).

Echinopla Tritschleri **Forel**, Jahrb. Hamb. wiss. Anst. 18. Bd. 2. Beihft. p. 74—75

♀ (Indrapura, Sumatra), ♀ (Tandjong, S.-O.-Borneo). — *striata* Sm. ♀ (Celebes). — *Sucki* (mit *E. striata* u. *E. lineata* nahe verw., aber Kopf u.

Thorax längsgerunzelt u. nicht längsgestreift etc.) p. 75 ♂ (Tandjong, S.-O.-Borneo). — *australis* (wie die folg. m. *E. praetexta* Smith verw.) p. 75—76

♀ (Mackay, Queensland). — *Turneri* p. 76 ♀ ♀ (Mackay, Queensland). Hierzu var. *pictipes* u. var. ♂ ♀ (Lokalität wie vorher).

Eciton (*Eciton*) coecum Latr. Syn., Type der Gatt. sens. str. Besch. d. ♂ [Abb. Fig. 1 p. 162]. **Wheeler**, **W. Morton** u. **William Henry Long**, Americ. Naturlist, vol. 35 p. 157—163. — *opacithorax* Emery Besch. d. ♂ p. 163—165 Fig. 2 e. Die Kenntniss der Spp. dieser Gatt., die nördlich von Mexico zu finden sind, gestaltet sich so:

Arbeiter:	Männchen:
1. <i>Eciton caecum</i> Latr.	<i>Labidus sayi</i> Hald.
2. „ <i>sumichrasti</i> Norton.	Unbekannt.
3. „ <i>schmitti</i> Emery	<i>E. schmitti</i> Em.
4. „ <i>californicum</i> Mayr.	Unbekannt.
5. „ <i>opacithorax</i> Em.	<i>E. opacithorax</i> Em.
6. „ <i>carolinense</i>	Unbekannt.
7. Unbekannt	<i>L. harrisi</i> Hald.
8. „	<i>L. mexicanum</i> F. Sm.
9. „	<i>L. nigrescens</i> Cress.
10. „	<i>L. minus</i> Cress.
11. „	<i>L. spoliator</i> Forel.
12. „	<i>L. melshaemeri</i> Hald.
13. <i>E. pilosum</i> F. Sm.	Unbekannt.

Abb. der Köpfe der ♂ von a) *E. harrisi*, b) *E. Schmitti*, c) *E. caecum*, d) *E. harrisi* var.; *E. opacithorax*. — *Biolog. Bemerk.* p. 167—172. — Postscript. Ueber den ersten 1894 von Schmitt entdeckten *Eciton*: *E. opacithorax* Emery Abb. p. 173 Fig. 3 in toto in 2 Stellungen. Gebrauchen ihre sehr grossen Mandibeln (bei ♂-Ameisen sonst sehr klein oder rudimentär) nicht, sie kämpfen nicht; die Thiere fliegen nicht, die Mandibeln funktioniren nicht als Klammerorgane. Verf. betrachtet sie deshalb als secundäre Geschlechtscharaktere. In den

Morgenstunden schlafen die Thiere. Mittags zwischen 1 u. 2 beginnt das Leben der Kolonie, das in den Stunden von 5—7 ihren Höhepunkt erreicht. Sonstige biolog. Bemerk. über das Ergreifen u. Fortschleppen der Puppen anderer Ameisen u. s. w.

- coecum Latr. r. *Kulowi* n. st. ♂ (beim ersten Blick *E. morosum* ähnl. u. doch total versch. Beschr. — Viel dunkler als d. *R. Servillei* Westw.). **Forel**, Jahrb. Hamb. wiss. Anst. 18. Bd. 2. Beihft. p. 47 ♂ (Soconusco, Chiapas, 1120 m Höhe, Mexico). — *Esenbeckii* Westw. ♂ (Estac Mayrink, Sao Paulo, Brasil.) p. 47. — *Hartigii* Westw. ♂ (Fundort wie vorher). — *Halidayi* Shuck. ♂ (Santos, Bras.). — *spoliator* Forel r. *triste* n. st. p. 48 ♂ (Soconusco, Mexico). — *Jerrmanni* (leicht an den Mand., der Grösse, den Flgl., den Klauen, der Behaarung erkennbar) p. 48 ♂ (Paraguay). — *amplipenne* Sm. ♂ Beschr. p. 48—49 (Columbien). — *morosum* Sm. r. *payarum* For. ♂ (Mexico) p. 49. — *rapax* ♀ (Bolivien). — *aztecum* (mit *E. maxillosum* Em. verw., jedoch recht versch.) p. 49 ♂ (St. José de Guatemala). — *Fonscolombei* Westw. ♂ (Brasil.) p. 49.
- coecum var. *biloba* n. **Emery**, Bull. Soc. Entom. Ital. vol. XXXIII p. 51. — *morosum subsp. ursinum* n. p. 52. — *nigrita* p. 52 (Guatemala). — *andrei* p. 53 (Mexico). — *latiscapum* p. 54 (Rio Janeiro). — *wheeleri* p. 55 (Texas).
- **Forel** beschreibt in der Revue Suisse Zool. vol. IX: (*Acamatus*) *goeldii* p. 352 (Bahia).
- crassicornis Smith u. *sumichrasti* Norton. Beide v. Cuernavaca Morelos. **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 124. — Biolog. Notiz zu beiden. **Wheeler**, t. c. p. 199.
- foreli Mayr, quadriglume Haliday, praedator F. Sm., coecum Latr., legionis F. Sm. aus Brasil. Liste der Gäste. **Wasmann** (9) p. 271. — Sp. aus Mittelamerika. Gast. p. 271. — *californicum* subsp. *opacithorax* Em., carolinense Em. aus Nordamer. Liste d. G. p. 273.
- Ectatomma. Bestimm. d. Gatt. **Dahl**, F. p. 9. — *araneoides* (Le Guillou) (+ *E. a. strigosum* Emery) p. 18.
- (Rhytidoponera) *araneoides* Le Guillou ♀ in Walddichtung bei Ralum; sonstige Verbr. **Forel**, Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. Bd. p. 6. — (Rhyt.) *araneoides* Le Guillou, r. *strigosum* Emery ♀ bei Ralum, im schattig. Wald ausgegrab., zuerst in Neu-Guinea gefunden. p. 7.
- araneoides* Lebensweise. **Dahl**, p. 40.
- aztecum* (steht *E. ruidum* Rog. sehr nahe). **Emery**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 50 ♀ (Mexique, Michoagan). — (*Gnamptogenys*) *exaratum* (erinnert an eine kleine *E. Alfaro* Emery) p. 50 ♀ (Pérou, Callanga).
- (Holcoponera) *striatula* Mayr. in Orchideenwurzeln aus (São Francisco, Brasil.). **Forel**, Jahrb. Hamb. wiss. Anst. 18. Bd. 2. Beiheft p. 81 u. **Kraepelin**, t. c. p. 193.
- Ectomomyrmex ist wie *Pachycondyla* eine kritische Gatt. Mehrere *Bothroponera* Spp. zeigen dieselben Charaktere. Ist wohl als Untergatt. von *Pachycondyla* zu betrachten. **Emery**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 41. — siehe *Pachycondyla*.
- Emergyella* n. g. (steht ohne Zweifel den *Ectatomma* nahe, Bau der Mandibel ganz verschieden, an den der Gruppe der *Myrmeica* erinnernd). **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 334. — *Schmitti*, p. 334—335 ♀ (Haiti).

Eumecopone siehe Neoponera.

Euponera fossigera **Mayr**, Annal. naturh. Hofmus. Wien, XVI. Bd. p. 3—4 ♀
(tief in der Erde unter Steinen bei Port Elizabeth gefunden).

(*Brachyponera*) *ambigua* Er. André. Maxill.-Palp. 3 gliedrig. **Emery**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 49.

Liste der Sp. u. Subg. mit Sp. **Emery**, t. c. p. 46—47.

— **Forel**. (Type; *E. Sikorae* For. — Mesonotum hinten deutlich durch eine Furche oder Vertiefung begrenzt, Diskus gewöhnlich stark konvex. Tarsen des 2. Paares am dorsal. Rande nicht mit Stacheln besetzt u. zeigen in Bezug auf diejen. des 3. Paares keine bemerkenswerthen Unterschiede betreffs der Art der Behaarung u. Borsten. Augen stark nach vorn gerückt. Wangen ohne Kiel. — 3 Untergatt. **Emery**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 43.

1. *Euponera* For. sensu str. 1 grosse Sp. mit 2 gliedr. Max.-Palp. Madagascar. — *E. Sikorae*.

2. *Mesoponera* n. subg. (Type: *caffraria* F. Sm.). Mittl. oder sehr grosse Spp., von schmaler Gestalt. Petiolus verschieden geformt. Max.-Palp. überall 4-gliedr. ♂ von gewöhnl. Form mit langen Antennen. Kosmopolitische Gruppe; umfasst einen Theil der *Pachycondyla* Mayr u. andere neuere Spp. wie *Ponera caffraria* F. Sm., *castanea* Mayr, *rubra* F. Sm., *constricta* Mayr etc.

3. *Brachyponera* n. subg. (Type: *E. zennaarensis* Mayr). Untersch. durch: corselet court, le mésonotum bombé comme chez *Mesoponera*, l'épinotum étroit devant et élargi derrière avec la face descendante creusée pour recevoir la face antérieure de l'écaille du pétiole, qui est haute, bombée d'un côté à l'autre et creusée en arc du haut en bas. Palpes de 3 articles. ♂ erkenntl. an der gedrung. Form u. den kurzen Antennen. Sp. aus Afrika, Indien, Malesien u. Australien.

(*Mesoponera*) *arhuaca* For. ♀ u. (*Drachyponera*) *lutea* Mayr. Tibien- u. Tarsenabbildung. **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 397. Fig. a resp. b.

(*Mesoponera*) *atrovirens splendida* n. st. **Forel**, Revue Suisse Zool. vol. IX p. 340. — (*Mesoponera*) *arhuaca* p. 339 (Columbien). — (*Pseudoponera*) *wroughtonii* mit der var. *crudelis* p. 341 (Natal).

Forelius *McCooki* **Forel**. Biolog. Notiz. **Wheeler**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 204.

Formica. Bestimmungstabelle der norddeutschen Spp. **Dahl**, p. 48—49 u. zwar: *rufa* L., *sanguinea* Latr., *rufibarbis* F., *cinerea* Mayr, *fusca* L. (die letzt. drei sind in Farbe u. Grösse sehr variabel, es herrscht noch viel Unklarheit. **Dahl** giebt in der Anmerk. auf p. 48 die Unterschiede der drei Spp., wie sie für ihn stets massgebend waren), *brunneus* Latr., *niger* (L.), *alienus* Forst. u. *erraticum* (Latr.).

rufibarbis Fabr. r. *clara* **Forel** (*Maralbaschi*, Kaschgar). **Forel**, Jahrb. Hamb. wiss. Anst. 18. Bd. 2. Beihft. p. 65. — *fusca* L. var. *nipponensis* **Forel** ♀ (Insel Yesso, Japan). — *rufa* L. r. *truncicola* **Nyl.** var. *Yessensis* n. ♀ (vom Typus untersch. durch spärll. kurze Behaarung etc.) p. 66 ♀ (*Serachi*, Prov. *Ishikari*, Insel Yesso, Japan).

- sanguinea r. aserva n. st.* **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 395—396
 ♂ ♀ (High Park de Toronto, Canada). — Mehr als 12 Nester
 neben einander in freundschaftl. Beziehung. — Keins der Nester enthielt
 einen Sklaven.
- caespitum*. Lebensweise der bei dieser lebenden Erdlaus. **D. von Schlechtendal**,
 Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 245—255. Mit zahlr. Abb. — *Trama*
radicis **Kalt.**, *pubescens* **Koch** u. *flavescens* **Koch**. Stände u. s. w.
- exsectoides* ist die einzige Art des westl. Amerikas, die regelmässig grosse,
 hohe, kuppelförmige Nestbauten aufführt. „Ant Hills“, die sich
 an der Basis u. Peripherie in Löchern öffnen, also keine von den ♀
 angelegt. Wege, wie unsere *rufa* besitzen. **Forel** (1). — *F. fusca* var.
subsericea u. *pallide fulva* baut in Amerika zuweilen kleine Hügel.
- fusca* ♂ u. ♀ in einem Nester von *F. sanguinea*. **Morice** (9) p. 96.
- rubicunda* **Emery** u. *subintegra* **Em.** Normale Hilfsameisen: *F. fusca* **L.** in
 den nordam. Rass., insbesondere *subsericea* **Say.** **Wasmann** (2) p. 354.
 — *Pergandeii*. Hilfsameisen: *F. pallide-fulva*.
- sanguinea* **Latr.** (die blutrothe Raubameise); gewöhnliche Sklaven wie die
 von *Polyergus rufescens* (siehe dort). **Wasmann** (2) p. 353—354.
 — subsp. *rubicunda* **Em.** Sklave: *F. subsericea*. **Wasmann** (2) p. 370.
 — var. *subintegra* **Em.** Hilfsameise: *subsericea*. — *sanguinea* subsp.
puberula **Em.** Hilfsameise: eine kleine Var. *v. fusca* p. 370.
- nasuta* subsp. *mongolica* n. **Emery**, Zool. Ergebn. etc. Zichy, vol. II p. 159.
 — Ameisse oder Omeisse in **Casp. Schwenckfeld's** Entomolog. **Sign.**
Schenkling, Insektenbörse 17. Jhg. p. 124.

Hagensia siehe Megaloponera.

- Hemioptica scissa* **Rog.** (Ceylon). **Emery**, Deutsche Entom. Zeitschr. 1901 p. 122.
- Iridomyrmex anguliceps* **Forel**, Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. Bd. 1901 p. 18
 — 19 ♂♂ (Ralum, zum Licht geflogen). — *angusticeps* (äusserst schmal u.
 schlank, noch schmaler als die nahestehende *Bicknellii* **Emery**; auch *gracilis*
 nahe) p. 19 (Ralum, im Grasland). — *anceps* **Roger r. papuanus** **Emery**
Ralum; *Vlavolo*, *Gunantambu*, Insel *Raluan* p. 19—20 **Bemerk.** zu ♂, ♀, ♂,
 Die geflügelt. Geschlechter liefern den unwiderleglichen Beweis, dass diese
 Form zu *anceps* u. nicht zu *gracilis* zu stellen ist; *anceps* ist indo-malesisch,
gracilis australisch. — *nitidus* **Mayr r. oceanicus** n. st. (♂ kürz., breiter.
 Kopf als die Typen etc.; ♀ total verschieden von *nitidus*) **Beschr.** v.
 ♂, ♀, ♂ p. 20—22 (bei *Ralum* sehr gemein); Nester ders. — *Meinerti* (sehr
 charakt. Sp., so dass es **Forel** wagt sie auf 1 ♀ zu begründen) p. 22 ♀
 (*Ralum*). — rufoniger *Lowne r. pallidus* var. *incertus* p. 22—23 ♂ (bei
Ralum). — Der echte rufoniger stammt aus Neu Süd Wales. — rufoniger
Lowne r. pallidus n. st. p. 22. **Beschr.** in der **Anmerk.** (**Mackay**, **Queensland**).
 — rufoniger *Lowne r. pallidus* var. *septentrionalis* n. var. (näher sich var.
incertus) p. 23. — *cordatus* **Sm.** **Emery's** **Bemerk.** etc. — (Auf dem
Bismarckarchipel kommt der ächte *cordatus* nicht vor, dagegen: *cord.*
r. fuscus n. st., robuster als *Myrmecodia* var. *decipiens* u. stärker pubescent)
 p. 23 ♀ (*Ralum*) nebst Nest. — *myrmecodia* **Emery** typ. Form, ohne
 Dimorphismus p. 23 ♂♂ u. myrm. **Em.** var. *decipiens* p. 23 (*Ralum*, *Kaba-*
kaul) nebst Nestern.

- *Prenolepis*, *Tapinoma* u. *Bothriomyrmex*. Bestimm. der Gatt. **Dahl, F.** p. 8. Bestimm. der Sp. aller drei Gatt.: *nitidus* Mayr *oceanicus* Forel, *anceps* (Roger) *papuanus* Emery, *angusticeps* Forel, *rufoniger* Lowne *pallidus* Forel var. *incerta* Forel, *cordatus* (Smith) = *I. c. fuscus* Forel + *I. myrmecodiae* + *I. m.* var. *decipiens* Emery), *anguliceps* Forel, *meinerti* p. 13.
- anceps*. Lebensweise **Dahl** p. 39, 52; Nest p. 18 u. Tabelle; besucht Pflanzenläuse p. 45. — *angusticeps*. Lebensweise p. 39, 52. — *cordatus*. Lebensweise p. 43; Nest p. 35; Schwärmzeit p. 25, 26; verteidigt *Myrmecodia* p. 45. — *nitidus*. Lebensweise p. 39, 51, 52; Nest p. 28, p. 29 u. Tabelle; besucht Pflanzenläuse p. 45. — *rufoniger*. Lebensweise p. 39, 52; Nest p. 28 u. Tabelle.
- dispertitus* Forel var. *nigellus* Emery (Cuernavaca, Morelos) **Forel**, Ann. Soc. Entom. France, T. 45 p. 134. — Ist eine Var. von *dispertitus* u. nicht von *iniquus*. — Biol. Notiz dazu. **Wheeler**, t. c. p. 204.
- Lasius niger* L. i. sp. (Yesso u. Osaka, Japan), *umbratus* Nyl. i. sp. (Osaka, Japan), *brunneus* Latr. (Yokohama, Japan). **Forel**, Jahrb. Hamb. wiss. Anst. 18. Bd. 2. Beihft. p. 66. — *humilis* Mayr mit Kakteen aus Valparaiso nach Hamb. importiert. **Forel**, t. c. p. 81. — *niger* von den Azoren mit Pflanzen nach Hamburg importiert p. 82. — *humilis* Mayr von Valparaiso mit Kakteen nach Hamburg eingeschleppt. **Kraepelin**, t. c. p. 194.
- emarginatus* Oliv. u. *flavus* De Geer auf Corsica. **Bignell**, p. 8.
- flavus*. Nest mit Wurzelläusen. **Dahl** p. 29, 45. — *niger*, baut Ställe für Blattläuse p. 45.
- fuliginosus* Latr. Nest aus Torf gebaut. Abb. p. 179. Aussehen eines riesigen Schwammes. **Oudemans** (2) p. 179—180.
- Pilzzucht. Titel p. 309 des vorig. Berichts sub Lagerheim. Ref. von W. Schoenichen, *Prometheus* 12. Bd. 1901 p. 467.
- niger* Linn. bei Pollensa. **Saunders** (1) p. 208. — nach Hamburg von den Azoren eingeschleppt. **Kraepelin** p. 194. — *niger americanus* aus Nordamerika mit Äpfeln nach Hamburg eingeschleppt p. 194. — desgl. *niger neoniger*, tot zwisch. trockenen Aprikosen aus Californien p. 194.
- (*Acanthomyops*) *Murphii* **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 367—9 ♂♀♂ u. Nest (Morganton, Nord-Carolina).
- fuliginosus* Latr. Nest mit Abb. des Querschnittes (Baum), diverse andere Spp. in d. trockenen Zweigen. **Forel** (11) p. 380—382.
- Leptanilla Havilandi* (allgem. Aussehen einer *Revelieri* Emery. Untersch.) **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 374—375 ♀ (Singapore).
- Leptogenys*. Bestimm. d. Gatt. **Dahl, F.** p. 9. — *diminuta* (Smith) var. *bismarckiensis* Forel p. 18. — *emeryi* Forel p. 18.
- elongata* Buckt. **Meisenheimer**. Fig. 1 a) ♂, b) ♀, c) Arbeiter Fig. 3 Larve. *maxillosa* Sm. (typ. Form) (auf der Antille St. Thomas). — Ist nach Forel nicht von der Form aus Madagascar u. d. Seychellen unterscheidbar. Er vermuthet, dass *Lob. falcata* = *Lep. maxillosa*. **Forel**, Jahrb. Hamb. wiss. Anst. 18. Bd. 2. Beihft. p. 46. — (*Lobopelta*) *occlifera* Roger r. *distinguenda* Em. (Tandjong, Borneo). — (*Lobopelta*) *diminuta* Sm. *vera* Sm. Untersch. von der indisch. Form (1900 als

- L. diminuta* i. sp. beschr. — Skulptur noch stärker als bei der Rasse (Hodgsoni). Verf. nennt daher *r. deceptrix* n. st. die indische Form, welche der *L. laeviceps* näher steht u. auch ein viel kürzeres u. gewölbteres *Metanotum* besitzt. p. 46. — Die echte *dim.* wurde auf Tandjong, S.-O.-Borneo gesammelt p. 46. — *pruinosa* For. im Holz von *Sahlbergia melanoxylo* aus Ostafrika p. 81. — id. **Kraepelin**, t. c. p. 193.
- bismarckensis*. Lebensweise. **Dahl** p. 18. — *emeryi* desgl. p. 40. — Neu ist: **Wheeleri Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 123–4 ♀ (Cuernavaca, Morelos); biol. Notiz dazu. **Wheeler**, t. c. p. 200. — *ocellifera* Rog. ♀ (Nalanda), *chinensis* Mayr ♀ (Anurradhapura) u. **Peuqueti** Er. André (Bandarawella). **Emery**, Deutsche Entom. Zeitschr. 1901 p. 113.
- **Forel** beschr. in der Revue Suisse Zool. vol. IX: *pubiceps vincentensis* n. st. p. 328. — *mucronata var. columbica* n. p. 328. — *unistimulosa var. trinidensis* n. p. 328. — *iridescens currens* n. st. p. 329. — (*Lobopelta*) *parva* p. 330 (Natal). — *hemiopica* p. 331 (Sumatra). — *havilandi* p. 332 (Natal).
- **Emery** beschreibt im: Bull. Soc. Entom. Ital. vol. XXXIII: *bellii* p. 59 (Erythraea).
- Unterg. *Leptogenys*. **Emeryi Forel**, Mittheil. zool. Mus. Berlin, 2. Bd. p. 7 ♀ (Ralum, Bismarck-Arch., im schattig. Wald (Lowon) ausgegraben).
- Unterg. *Lobopelta*, *diminuta* Sm. *var. bismarckiensis* n. (*var. opacinodis* Em. nahe, aber ohne Querrunzeln auf dem Knoten etc.) p. 7–8 ♀ (am Strand von Muarlin).
- Leptothorax angustula* Nyl. (Algier) **Saunders**, Trans. Entom. Soc. London 1901 p. 527. — *angustulus* Nyl. gezogene Stücke von Corsica. **Bignell**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 127.
- congruus* Smith *var. spinosior* n. **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 371 (Sapporo).
- denticulatus* **Mayr**, Annal. naturh. Hofmus. Wien, XVI. Bd. p. 5–7 ♀♀ (in hohlen Stengeln bei Port Elizabeth).
- emersoni* **Wheeler**, Wm. M., American Naturalist, vol. 35 p. 431 sq. Beschr. d. Arbeiter Fig. 2, des ♀, des ♂-Fig. 3. Biolog. Notizen. Grundrisse p. 441 Fig. 4–9 von Nestern von *L. emers.* inmitten von Nestern v. *Myrmica scabrinodis* Nyl. Notizen zu Beobachtungen hierüber (nebst Daten).
- petiolatus* (sehr selts. Form, aberrant durch Gestalt des *Pediculus*, die „pattes et antennes pruinenses etc.“ Der *Petiolus* nähert sich dem v. *Macromischa*) **Emery**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 129 (Cuernavaca, Morelos), biol. Notiz dazu. **Wheeler**, t. c. p. 201.
- tuberum* Fab. (*r. Nylanderi* Foerst.) u. *angustulus* auf Corsica. **Bignell** p. 8.
- — F. Nest unter Rinde; *L. unifasciatus* ebendort oder zwischen Steinen; Kolonie v. *unifasc.* zwischen 2 äusserlich scheinbar solid verbundenen Platten des Virgloriakalkes bei Bludenz im Branderthal (Vorarlberg); ein anderes in einer Krystalldrüse von Mariachein (Böhmen). Kolon. der Rasse *nigriceps* Mayr bei Prag auf den Abhängen des Moldauthales unter Steinen. **Wasmann** (1) p. 42 Anm.

- Macromischa lucayensis** (steht *pastinifera* Emery aus ders. Lokalität nahe. Ein Theil der Unterschiede beruht wahrscheinlich auf Polymorphismus, da Em. nur den Arbeiter beschreibt) **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 340—342 ♀ (Iles Bahamas). — *wasmanni* **Forel**, Mittheil. Schweiz. Entom. Ges. 10. Bd. p. 300 (Congo).
- Megalomyrmex leoninus** **Forel** ♂ (Puerto Cabello, Venezuela) **Forel**, Jahrb. Hamb. wiss. Anst. 18. Bd. 2. Beihft. p. 61.
- Megaloponera** (*Hagensia* subg. n.) *havilandi* **Forel**, Revue Suisse Zool. vol. IX p. 333 (Natal).
- Meranoplus bicolor** Guér. (Ceylon). **Emery**, Deutsche Entom. Zeitschr. 1901 p. 120. *Simoni* **Emery** subsp. *nitidiventris* n. **Mayr**, Annal. naturh. Hofmus. Wien, XVI. Bd. p. 26 ♀ (Bothaville im Oranje-Freistaat).
- Mesoponera** n. subg. siehe *Euponera*.
- Messor barbarus** var. *lobulifera* n. **Emery**, Zool. Ergebn. Zichy vol. II p. 159.
- Mictoponera** n. subg. von *Ectatomma* Sm. (steht *Acanthoponera* **Mayr** sehr nahe, aber die Schuppe zeigt die gewöhnl. Form u. hat hinten keine mediane Verlängerung etc.) **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 372. — *Diehlii* p. 372—373 ♀ (Borneo, Sarawack).
- Monomorium**. Bestimm. d. Gatt. **Dahl**, F. p. 10. — *pharaonis* (L.), *floricola* **Jerdon**, *minutum* (Smith) var. *liliukalau* **Forel** p. 19.
gracillimum Sm. bei Jericho. **Schmiedeknecht**.
floricola **Jerdon** mit Cacteen aus Valparaiso, Chile. **Forel**, Abhdlgn. Hamb. wiss. Anst. 18. Bd. 2. Beihft. p. 81. — *pharaonis* ♀ in einer Messerscheide auf einem Dampfer aus Westafr. — Schiffsameise par excellence p. 81. — *pharaonis* (Kosmopolit). Mit Aepfeln aus Nordamerika nach Hamburg eingebürgert, ausserdem überall in den Häusern. **Kraepelin**, p. 193. — *floricola* aus Valparaiso, Venezuela (La Guayra) mit Cacteen und Orchideen eingebürgert p. 193.
floricola u. *minutum* Lebensweise. **Dahl**, p. 39; Nest p. 28. — *pharaonis* Lebensweise p. 39, 46, 51; Nest p. 28.
rugosa Sm., *subcarinata* Sm., *carinata* Sm. u. *arachnoides* Sm. var. von Tandjong, Borneo. **Forel**, Jahrb. Hamb. wiss. Anst. 18. Bd. 2. Beihft. p. 62. — *rubra* L. r. *neolaevinodis* ♂ p. 80 (aus New York, mit Iriswurzeln nach Hamburg import.). — [*M. rubr. L. r. Champlaini* n. st.] p. 80—81 (Canada: Quebec. — Beide Formen mit r. *laevinodis* nahe verw., aber amerik. Eigenthümlichkeiten. Während bei r. *neolaevinodis* die Dornen mindestens so stark sind wie bei r. *laevinodis*, sind sie bei r. *Champlaini* ungemein verkümmert.
Pharaonis L., *floricola* **Jerdon**, *minutum* **Mayr** var. *liliukalau* **Forel**. Auf dem Bismarck-Archipel gefangen nebst Bemerk. **Forel**, Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. Bd. p. 12.
destructor **Jerd.** ♂ (Ceylon) **Emery**, Deutsch. Entom. Zeitschr. 1901 p. 117. — *decamerum* (von allen bekannt. Sp. durch die 10-gliedr. Antenne ausgezeichnet) p. 117—118 ♀ (Anuradhapura, in Termitennestern).
salomonis L. (Biskra-Nester in sandigen Boden u. unter Steinen. — Algier). **Saunders**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 527. — *subopacum* Sm. p. 527.

- antipodum*, **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 377 ♀ (Auckland, Nouvelle Zélande).
- Heyeri* (dimorphe Sp., dess. grosser Arbeiter einer Pheidole gleicht, aber Uebergänge zum kleinen aufweist. — amblyops nahe; Kopf grösser u. kürzer). **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 389—390 ♀ major u. minor (St. Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brésil), nur bei Termiten lebend).
- bicolor **Emery** bei Bothaville im Oranje Freistaat Beschr. d. ♀. **Mayr**, Annal. naturhist. Hofmus. Wien XVI. Bd. p. 7. — *Braunsi* (dispar sehr nahest.) p. 7—8 ♀ (in hohlen Stengeln bei Port Elizabeth).
- Myopopone*. Bestimm. d. Gatt. **Dahl**, F. p. 9. — *castanea* (Smith) p. 18. — *castanea* Smith ♀. **Ralum**, **Forel**, Mitth. zool. Mus. Berlin II. Bd. p. 5. *castanea*. Lebensweise. **Dahl** p. 40.
- Myrmecina*. Die Gatt. hat 12- statt 11-gliedr. Antennen, wie im Schlüssel von 1896 p. 183, Ann. Soc. Ent. Belg. T. 40 steht. Berichtigung. **Emery**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 54.
- Myrmecocystus viaticus* Fab. (Fundorte in Algier. — Am Boden laufend, halten sie die Flgl. fast senkrecht). **Saunders**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 526. — *albicans* Rog., race *viaticoides* André (Biskra), *bombycinus* ♂♀ major et minor (Biskra. — Biol. Bemerk. hierzu) p. 526—527.
- melliger **Forel** (Llave?) *var. depilis* n. ♀ minor. **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 135 (Zacatecas). — Biolog. Notiz. **Wheeler**, t. c. p. 205.
- Myrmica gracilescens* F. Sm. siehe Pheidole. — *lobicornis* Nyl. ♀ (Kukuner Gebirge, Kaschgar) **Forel**, Jahrb. Hamb. wiss. Anst. 18. Bd. 2. Beiht. p. 61. — *rubra neolaevinodis* For. aus New York nach Hamburg an Iriswurzeln importirt. **Kraepelin**, t. c. p. 193.
- brevinodis* **Emery**. Abb. **Wheeler**, Wm. M. American Naturalist, vol. 35 p. 433 Fig. 1. — *scabrinodis* Hyl. Grundriss von Nestern, in deren Mitte sich *Leptothorax emersoni* befindet.
- rubra* Linn. (r. *scabrinodis* Nyl.) auf Corsica. **Bignell** p. 8. — *laevinodis* Nyl. ♀ (Sapporo) **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 371. — *lobicornis* Nyl. ♀ v. *jessensis* n. p. 371 (Sapporo, île de Jesso).
- Myrmicaria fodiens* Jerd. (Ceylon). **Emery**, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1901, p. 121.
- cursor* Fonsc. r. *Tancrei* n. st. **Forel**, Jahrb. Hamb. wiss. Anst. 18. Bd. 2. Beiht. p. 66 ♀ (Maralbaschi am Kaschgar Darja). — In Südfrankreich kommen grosse Varr. des *M. cursor* vor, bis über 8 mm l., deren Kopf u. Fühlerschaft stärker u. kurz abstehend behaart sind (*var. piliscapa* n.) p. 66 (z. B. bei Nimes).
- Neoponera* **Emery**. *Eumecopone* n. subg. **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 335—6. — *agilis* p. 336, Arbeiter (Californie).
- Neoponera* (typ. Sp. *N. villosa* F.). *Mesonotum* u. *Palpen* wie bei *Mesoponera*, aber *Augen* mehr an die Seiten des Kopfes gerückt; *Wangen* mit Längskiel. — *N. luteola* Rog. bildet einen schwachen Uebergang zu *Euponera*. **Emery** befürchtet, dass bis jetzt noch unbekannte Sp. die Grenze zwischen *Euponera* u. *Pachycondyla* verwischen werden. Falls sie dann zusammengezogen werden sollten, so werden sie doch gute Untergruppen bilden.
- Emery**, t. c. p. 43.

Neoponera n. g. siehe *Euponera* u. *Pachycondyla*.

stipitum **Forel**, Revue Suisse Zool. vol. IX p. 348. — *emiliae* p. 349 (beide aus S. America).

Ocymermes laticeps **Forel**, Mittheil. Schweiz. Entom. Ges., 10. Bd., p. 306 (Mossamedes).

Odontomachus. Bestimm. der Gatt. **Dahl, F.** p. 7. — *haematodes* (L.), *tyrannicus* Smith u. *imperator* **Emery**, Bestimm. p. 12.

clarus Roger ♂ stimmt mit Roger's Beschr., geringe Abweichungen. **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 124 (Cuernavaca, Morelos).

— Biol. Notiz. **Wheeler**, t. c. p. 119.

chelifer subsp. *Theresiae* For. (*O. haematoda* race *Theresiae* **Forel**). **Emery**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 53 ♀, ♀. Bemerk. z. Färb. etc.

haematodes L. in Orchideen aus Westindien nach Hamburg importirt. **Forel**, Jahrb. Hamb. wiss. Anst. 18. Bd. 2. Beiheft p. 81.

— — Waldthal bei Ralum. Nistorte. Zurückschnellen der Thiere mit rasch zusammengeklappten Kiefern. fälschl. als „Springen“ bezeichnet. „Tak“-Ameise in Centralamerika. Sticht empfindlich. **Forel**, Mittheil. Zool. Mus. Berlin. II. Bd. p. 5. — *imperator* **Emery**, Wuna kohur (Varzin) 600 m hoch, bisher nur aus Neu-Guinea bek. p. 5. — *tyrannicus* Smith ♀ bei Ralum, bisher aus Aru u. Neu-Guinea bek.

haematodes. Nest. **Dahl** p. 28; Lebensweise p. 40. — *imperator* u. *tyrannicus*, Lebensweise p. 40.

— — **Meisenheimer**. Fig. 2 Kopf des ♂.

haematoda L. ♀ auf Ceylon. **Emery**, Deutsche Entom. Zeitschr. 1901 p. 113.

— *haematodes* L. r. *opaciventris* For. (Soconusco, Mexico).

Oecophylla. Bestimm. der Gatt. **Dahl, F.** p. 7. — *smaragdina* (F.) p. 12.

smaragdina F., Ralum, Indien, Sundainseln etc. Streitfrage, ob sie ihr Gewebe selbst (Aitken) oder mittels ihrer als Spinninstrument benutzt Larven (Ridley, Holland, Green) spinnt. Ridley's Ansicht gewinnt immer mehr an Boden. — Lebensweise. **Dahl** p. 41, 51, 52; Nest p. 28, 33, 34, baut Ställe p. 45; Schwarmzeit p. 26; auf dem Meere treibend p. 27; lästig b. Sammeln p. 45.

— — F. (auf Ceylon). **Emery**, Deutsche Entom. Zeitschr. 1901 p. 121.

Ophthalmopone F. **Emery** stellt: Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 40 die afrik. Sp. *Pachycondyla hottentotta* hierher.

Opisthopsis. Bestimm. d. Gatt. **Dahl, F.** p. 9. — *linnaei* **Forel** p. 14.

linnaei n. sp. (am nächst. *Haddoni* **Emery** verw.) **Forel**, Mittheil. Zool. Mus. Berlin II. Bd. 1901 p. 26—27 ♂ (Ralum). — Diese Gatt. bisher nur in Austral. u. Neu-Guinea gefunden. — Lebensweise. **Dahl** p. 42, Nest p. 28.

Pachycondyla. Kritische Gattung. Smith's Missbehagen über die Einziehung seines „well defined genus.“ **Emery**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 38. — Smith hat 1858 die Gatt. errichtet für die folg. Spp.:

1. *P. crassinoda* Latr., Amerika.
2. *P. simillima* F. Sm. Afrika = *Paltothyreus tarsatus* F.
3. *P. striata* F. Sm. Amerika.

- | | |
|--|----------------------------------|
| 4. <i>P. rufipes</i> Jerd., Indien. | } Gatt. Bothroponera, nach Mayr. |
| 5. <i>P. tridentata</i> F. Sm., Borneo. | |
| 6. <i>P. piliventris</i> F. Sm., Austr. | |
| 7. <i>P. bispinosa</i> F. Sm., Indien. | |
| 8. <i>P. punctata</i> F. Sm., Amerika. | |
| 9. <i>P. montezumia</i> F. Sm., Amerika. | Platythyrea. |

Mayr u. Roger haben diese heterogene Gruppe umgearbeitet. Von den Sm.'schen Spp. sind drei geblieben, die anderen sind in die genannt. Gatt. übergegangen. Doch haben dieselben Autoren der Smith'schen Gatt. einige n. spp. einverleibt, ausserdem noch eine ganze Reihe amerikanischer Spp. mit gekielten Wangen u. andere Spp., die der englische Autor unter der Gatt. *Ponera* gelassen hatte. So ging's eine Zeitlang. Für die gross. amerik. Spp. mit fein skulpturirten Körper bildete Mayr die Gatt. *Pachycondyla*, für die gross. Spp. der alt. Welt: *Bothroponera*, u. für gewisse indische Formen seine Gattung *Ectomomyrmex*; den kosmopolit. Rest brachte er unter *Ponera* unter. Da aber die Grenze zwischen *Ponera* u. *Bothroponera* schwierig war, reformirte Forel von Neuem. *Bothroponera* umfasst nach seiner Ansicht alle grossen od. mittleren Spp., deren Mesonotum „est fondu avec le sgm. suivant du corselet“ ohne merkliche Trennungsglinie, *Bothroponera* bildet schliesslich nur ein Subg. von *Ponera*. Von *Pachycondyla* spricht Forel kein Wort. *Pachycondyla* wurde erst von Mayr in klassischer Weise beschrieben. Pach. hatte nach der Angabe 4gliedr. Maxillar- und Labialpalp., die *Ponera* 1--2gliedr. Maxill.-Palp. u. 2gliedr. Labialpalpen. Die Achtung vor der „chose jugée“ liess Niemand sehen, wohin dies führte. Auch Emery beging anfangs den Fehler. Neue Untersuchungen über die Zahl der Palpenglieder zeigen folg.:

Maxill.- u. Labial-Palp. 4-gliedrig: *Bothroponera tridentata* F. Sm. u. *isor* Emery. — *Ponera caffraria* F. Sm., *castanea* Mayr, *stigma* F., *Leveilléi* Emery u. *melanaria* Emery. — 3-gliedrig: *Ponera sennaarensis* Mayr, *luteipes* Mayr u. *lutea* Mayr.

Die Zahl der Palp.-Glieder bietet also kein Characteristicum zur sicheren Abgrenzung der Gatt. *Pachycondyla* von *Ponera* u. *Bothroponera*. Ebenso sind auch andere Abgrenzungsmerkmale nicht durchschlagend. Eine Reform ist unter den Pach. im jetzigen Sinne sehr nöthig. Die Pach. mit ungekielten Wangen lassen sich von den *Bothroponera* trennen. Andreerseits bilden die amerikan. Spp. eine wohlumgrenzte Gruppe. Ausser dem Kiel an den Wangen unterscheiden sie sich von allen anderen, wie auch von den *Bothroponera* durch die Stellung der Augen mehr nach der Mitte der Seiten des Kopfes [*Ponera* u. *Bothroponera* einschliessl. *Pachycondyla* haben die Wangen ohne Kiel, Augen mehr nach vorn]. Emery nennt sie *Neoponera* n. g., ein ausschliessl. neotropisches Genus. — *hottentota* Emery ist eine schwierig zu klassifizirende Sp. (Augen ein wenig hinter der Mitte der Seiten des Kopfes, Wangen nicht gekielt. Um Verwechslung zu vermeiden, stellt sie Verf. zu *Ophthalmopone*. — Bemerk. zu verschiedenen *Bothroponera*-Spp.

Liste der hierhergehörigen 32 Spp. nebst Varr. u. s. w. p. 44.

— (Mesoeipinatale Naht im allgemeinen verloschen, selten deutlich, nur bei kleinen Sp., deren Tarsen des 2. Beinpaars viel kürzer als die der hinteren u. dorsalwärts mit stark. u. zahlr. Stacheln besetzt sind.

Gleiche Bewaffnung zeigt auch eine Zahl grösserer Sp. Augen vorn gelegen. Wangen ohne Kiel. 4 Unterg.:

1. *Pachycondyla* (Type: *P. crassinoda* Latr. — Pronotum jederseits durch ein. oft abgestutzten, doch deutl. Wulst begrenzt. Schuppe des Petiolus dick) Umfasst die meist. amerik. Pach. von Smith, sowie andere Sp. **Emery**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 42.

2. *Bothroponera* (Type: *P. pumicosa* Rog. (Afrika, Asien, Malesien, Australien). Pronotum nicht abgegrenzt. Petiolus mit dicker Schuppe. Kopf hinten nicht abgestutzt; Episternum des Mesothorax nicht deutlich vom Sternum gesondert (ausser *P. Wasmanni* Forel). Umfasst die meisten jetzigen *Bothroponera* u. einige andere.

3. *Ectomyrmex* Mayr. (Type: *P. javana* Mayr, Indien, Malesien u. Papua). Kopf hinten abgestutzt u. mehr oder weniger seitlich komprimirt. Episternum des Mesothorax eine deutlich von tiefen Furchen begrenzte Platte bildend. Umfasst ausser den *Ectomyrmex* Mayr, die *Bothroponera* *Leeuwenhoecki* For., *glabripes* Emery u. *vermiculata* Emery etc. p. 42.

4. *Pseudoponera subg. n.* (meist kleine Sp., von denen ein Theil zu *Belonopelta* gezählt wurde. Palp. im Allgem. 4-gliedr. (nur ochracea 2-) mit grossen, nicht zahlr. Zähnen bewaffnet. Epistom in der Mitte bei einigen Sp. mit schwach sichtbar. Vorsprung. Mesepinotal-Naht deutlich: die mittl. Tibien auf der Dorsalseite mit Stacheln besetzt. 1. Glied der Tars. dieses Paares kurz u. ebenfalls dorsal mit zahlr. Stacheln besetzt; dieses Characteristicum findet sich bei *Euponera* nicht, bei dieser ist die Mesepinotal-Naht gleichmässig, wenn nicht stärker markirt, p. 42—43.

Liste der Sp. u. Subg. mit Sp.-Liste p. 45.

fuscoatra Roger var. *cearensis* n. **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 336

♂ ♀ (Baturité, Ceará, Brésil).

tesserinoda Emery ♂ u. *P.* (*Pseudoponera*) *Darwini* For. ♀. **Emery**, Deutsche Entom. Zeitschr. 1901 p. 113.

villosa Fab. var. *curvinodis* Forel ♂ (Espiritu Santo, Brasil.) u. *pallipes* Sm. ♀ (Vera Cruz, Rio Grande do Sul, Bras.). **Forel**, Jahrb. Hamb. wiss. Anst. 18. Bd. 2. Beihft. p. 45.

leeuwenhoecki var. *sumatrensis* n. **Forel**, Revue Suisse Zool. vol. IX p. 347. — (*Bothroponera*) *berthoudi* p. 344 (Transvaal). — *haviglandi* p. 345 (Singapore). — (*Bothroponera*) *picardi*. **Forel**, Mittheil. Schweiz. Entom. Ges. 10. Bd. p. 304 (Mossamedes).

fuscoatra Rog. Emery hat unter der Subsp. *transversa* 2 Formen von Costa Rica mit einander vereinigt, von denen Forel später eine als *purpurascens* beschrieben hat. Nach **Emery**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 48 bildet sie keine Sp.; sondern eine Subsp. genannter Art. *subsp. inca* n. p. 48 ♂ ♀ (Pérou, Ocobamba; Bolivie).

(*Bothroponera*) *pachyderma* (vereinigt die Skulptur der südafr. Gruppe *P. pumicosa* etc., mit dem kurzen abgestutzt. oder schwachbogig ausgeschnittenen der Arten von Madagascar *P. Perroti* u. s. w.) p. 49 ♂, ♀ (Cameroon). — (*Ectomyrmex*) *annamita* Er. André. Die Untersuchung der Typen bestätigt die Zugehörigkeit ders. zur Subg. *Ectom.* — (*Pseudoponera*) *succedanea* Rog. zur Synonymie, Typen u. s. w. p. 49

- Paraponera clavata ♂. Abb. d. Lamina subgen. **Emery**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 198. Eine eigene Tribus mit Subtribus, id. p. 35.
- Pheidole. Bestimm. d. Gatt. **Dahl**, F. p. 11. — sexspinosa Mayr (+ P. s. biroi Emery var. ralumensis Forel) p. 20. — impressiceps Mayr, commista Forel, umbonata Mayr, sp. indeterminat. p. 21.
- Hyatti Emery 2 ♀ (Cuernavaca, Morelos). **Emery**, Ann. Soc. Entom. Belg., T. 45 p. 130. — Kingi André var. instabilis Em. i. litt. 2 ♀ (Cuernavaca, Morelos), — Vasilitii Pergande var. hirtula Forel, Queretaro, Mexique ♀ 2 ♀. — obtusospinosa Perg. = Vasilitii Perg. p. 130. — carbonaria Perg. r. calens nov. st. p. 130 2 ♀ (Aguas calientes. — Grösser als die Type). — laevivertex (steht Ph. Susannae For., r. obscurior sehr nahe) p. 131 — 132 2 ♀ (Aguas calientes); Arbeiter opaker als d. 2 ♀, bei obscurior gerade das Gegentheil. — optiva (Gruppe Radoszkowskii, nahe bei plebecula) p. 132—133 2 ♀ (Cuernavaca). — tolteca (Beschr. einer neuen Pheidole ♀ ohne 2 sonst riskant, hier ist eine Verwechslung nicht möglich) p. 133 ♀ (Cuernavaca, Morelos). — Radoszkowskii r. Lallemandi nov. st. (verdient fast als Art aufgefasst zu werden, doch ist die Gruppe sehr variabel) p. 133 — 134 2 ♀ (Sierra Nevada de Santa Marta, Columbia).
- Biolog. Notiz zu tolteca Forel, carbonaria Perg. var. calens Forel, optiva Forel, laevivertex Forel, Hyatti Emery, Vasilitii Perg. var. hirtula Forel u. Kingii André var. instabilis Emery. **Wheeler**, t. c. p. 203.
- longicornis Emery. Beschr. der 3 noch nicht bek. Geschlechtsformen 2 ♀, ♂, **Emery**, Zool. Jahrb. Abth. f. System. 14. Bd. p. 573—574 (Nias, Celebes, Kema). — Hat im Gesamtbau Aehnlichkeit mit Ph. javana Mayr., ist aber schlanker. Myrmica gracilescens F. Sm. ist vielleicht davon nicht verschieden.
- megacephala Fab. (Fontaine Chaude on the Dunes). **Saunders**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 528.
- ampla Forel (= Ph. variabilis r. ampla For., Ann. Soc. Entom. Belg., 1893 p. 462) **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 377—378, Beschr. von 2 ♀, ♀ (Yarra, prov. Victoria, Australie).
- umbonata Mayr von Ralum, bisher Tonga-Inseln u. Neu-Guinea; in klein. minirten Erdnestern. **Forel**, Mittheil. zool. Mus. Berlin, II. Bd. p. 13. — impressiceps Mayr r. commista n. st. (kleiner als typ. Form, bildet den Uebergang zu oceanica Mayr p. 13 2 ♀, ♀, ♂ (Kabakaul im Wald, bei Ralum in der Pflanzung). — Bemerk. zur typ. Form. — sexspinosa Mayr 2 ♀, Ralum, Samoa u. Ellice-Inseln p. 13. — sexspinosa, r. Biroi Emery ♀, bei Ralum u. Kabakaul, sonst aus Neu-Guinea bek. — sexspinosa u. Biroi zeigen eine gewisse Verwandtschaft mit Ph. distorta Forel aus Columbien.
- impressiceps. Lebensweise. **Dahl** p. 39, 52; Nest p. 28 u. Tabelle. — sexspinosa. Lebensweise p. 42, Nest p. 37. — sp. Lebensweise p. 41, 52. — umbonata. Lebensweise p. 39, 52; Nest p. 28 u. Tabelle.
- Forel** bespricht in den Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45:
- vinelandica Forel ♀, ♀, 2 ♀, ♂ von Morganton, Faisons, Goldsboro, Ferme Tyson in mehr als 1000 m Höhe, in Nordcarolina p. 348. — *Tysoni* p. 348—349 2 ♀ ♂ (In der Nähe der Farm des M. Tyson, am Fusse

des Mitchell-Berges in N.-Carolina). Die von Emery beschrieb. vine-landica r. laeviuscula von Missouri scheint ihr nahe zu stehen. — crassicornis Emery, Beschr. von ♀ u. ♂ (Faisons, Morganton, in N. Carolina. — F. fand zweimal ♀ m. ♂ zus. Trotz des enorm. Untersch. in der Behaarung gehören beide sicher zusammen). — Morrisii Forel (Goldsboro, Faisons, Morganton) Beschr. v. ♀, ♂. — Morrisii For. var. Vanceae n. var. p. 351 ♀, ♀, ♂. (Black Mountain. Nord-Carolina, bei der Villa der Mme. Vance). — dentata Mayr; Mayr hat als Ph. Morrisii var dentata eine Form beschr., die von Morrisii sehr verschieden ist, Morrisii steht spinosa näher als dentata. Beschr. d. ♀ (Faisons u. Goldsboro, Nord-Carolina in allen Geschlechtsformen) p. 351—352. — pilifera Roger (pennsylvanica Roger) (Washington) p. 352. — fallax Mayr r. Emiliae n. st. p. 352—353 ♂, ♀, ♀, (Baturité, Cêara, Bresil). — pubiventris Mayr var. neoadensis n. var. p. 353 ♀ ♂ (San-Antonio, mehr als 1000 m Höhe, auf der Sierra Nevada de Santa-Martha, Columbien, ♂ von Santa-Catharina). — pubiventris Mayr. r. cearensis n. st. 353 ♂ ♀ (Baturité, Cêara, Bresil). — Steinheili p. 353—355 ♂ ♀ ♂ (Dibulla, Rio-Frio, Barranquilla, province de Santa Martha, Columbie). — fallax Mayr (ähnelt etwas der Ph. Vaslitii Perg.). Die Untersuchung dieser Form, sowie der Ph. Jelski ergibt folg.:

1. Sp. Pheidole fallax Mayr (= Ph. columbica var. rubens Forel).
Cuba, Colombie, Jamaïque.

R. Ph. columbica Forel. Colombie, Venezuela.

R. Ph. Emiliae Forel. Brésil.

2. Sp. Pheidole Jelskii Mayr. Cayenne.

Var. Ph. antillensis Forel. Petites-Antilles, Trinidad.

Var. Ph. fallaciosus Forel. Venezuela.

— Susannae Forel r. obscurior Forel. Die Type von Rio-de-Janeiro weicht von der Susanna i. sp. (Nacken wie beim Arbeiter viel weniger eingeschnürt, weniger oder kaum halsartig) p. 356 (à la savanne de l'Antille Trinidad. — Stücke identisch mit denen von St. Vincent). — susannae r. atricolor n. st. p. 356 ♂ (San Antonio, Sierra Nevada u. am Fusse der Sierra). — distorta Forel r. Reclusii Forel. Beschr. d. ♀ (San Antonio, Sierra Nevada de Santa Martha, Columbie) (eine der seltsamsten Sp. der Gatt.). — vallifica p. 357—358 ♂ ♀ (San Antonio, sur la Sierra Nevada de Santa Martha en Colombie). — Baut kleine Nester mit wenig Volk, 1—2 ♂ mit einem halbkraterförm. Eingang, der nur an einer Seite einen Sandwall trägt. Thiere sehr versteckt u. scheu. — longiscapa (ähnelt beim ersten Anblick den Ph. pubiventris, Morrisii u. Verw., aber von all. bek. amerik. Sp., ausser longipes Perg., versch. durch: la longueur de ses scapes et la petitesse relative de la tête du ♂ etc.) p. 358—360 ♂ ♀ ♂ (Porto Cabello, Venezuela). — stulta Forel (Hacienda de l'Esperanza, près de Dibulla, dans la forêt vierge du pied de la Sierra-Nevada de Santa-Martha, Columbie). — amata p. 360—361 ♂ ♀ (Ouriheka, forêt vierge, près de Rio-Frio, au pied de la Sierra Nevada de Santa Martha, Colombie). — praeusta Roger ♀ (bisher nur ♂ beschr. — Beobacht. dies. Sp. bei Barranquilla,

Dibulla etc. Beschr. des Nestes nebst Abb. des Eingangs in Aufsicht u. Durchschnitt Fig. 1 A, B. — transversostriata Mayr var. nigridens n. var. Beschr. v. 2 ♀ p. 362 (Santa Martha, Columbie). — biconstricta Mayr r. Lallemandi (= Ph. Radoszkowskii r. Lallemandi Forel) Beschr. d. 2 u. des Nestes (auch zu San Antonio, über 1000 m). — Berichtigung zu Ann. Soc. Entom. Belg. 1901 p. 133 u. in den Fourmis de l'Amérique centrale p. 67, woselbst delecta als Rasse zu Ph. Radoszkowskii gezogen ist. Sie ist zu biconstricta zu ziehen. Uebrigens ändert dies nichts an dem, was dort gesagt ist. — Die r. pugnax D. T. von Radoszkowskii steht ziemlich zw. biconstr. u. Radoszk. — Radoszkowskii Mayr (Jardin de l'Hotel Suisse à Barranquilla, Columbie). p. 363; hierzu: var. *inversa* n. p. 363 2 ♀ (Barranquilla). — var. *semilaevis* n. p. 363 2 (Baturité, Céara, Brésil). — var. *opacissima* n. p. 364 2 ♀ (Kingston, Jamaïque). — floridana Em. var. *Antoniensis* n. p. 364 2 ♀ (San Antonio, Sierra Nevada de Santa Martha, Colombie). — *arhuaca* p. 364—365 2 ♀ (San Antonio, village arhuaque de la Sierra Nevada de Santa Martha, Colombie). — subarmata Mayr (San Antonio, à Zig-Zag, Venezuela, à l'Antille de Sainte Lucie et partout en Colombie). — var. *elongatula* ist nicht den Antillen eigen. Forel fand sie zu Santa Martha, in Columbien, wie auf Barbados). — *megacephala* F. (Kingston, Jamaïque). — *cornutula* Em. p. 365—366 ♀ (Burithaca, au pied de la Sierra Nevada de Santa Martha, en Colombie, mit ein. 2 genau der Beschr. Em.'s entsprechend) p. 365—366. — *flavens* Roger r. *sculptior* Forel p. 366 2 ♀ (Martinique). — *flavens* Roger r. *gracilor* Forel (Trinidad, Savanne). — *decem* (parente de *perpusilla* Em. durch seine 10-gliedr. Antennen, versch. durch robuste Statur u. Gestalt des Metanotum etc.) p. 366—367 (Savanne de Trinidad). — *ursus* Mayr r. *Gauthieri* n. st. p. 367 ♀ (Colombie, dans la forêt, sur le sentier de Dibulla à San Antonio, sur la Sierra Nevada de Santa Martha: lieu nommé: La Cueva).

tepicana = *rugifrons* = *carbonaria*. Emery, Bull. Soc. Entom. France, 1901 p. 119. — *kingi* = *townsendi* p. 119. — *kingi subsp. instabilis* n. p. 119.

Anastasii Em. aus Guatemala mit Orchideen nach Hamburg importirt. Forel, Jahrb. Hamb. wiss. Anst. 18. Bd. 2. Beiheft p. 78 ♀; auch Kraepelin, t. c. p. 193. — *flavens* Roger r. *gracilior* n. st. p. 78 2 ♀ aus Westindien mit Orchid. nach Hamburg importirt. Forel t. c. p. 78 und Kraepelin, t. c. p. 193. — *flavens* Roger r. *navigans* n. st. p. 79 2 ♀ (Die Kopfform des Soldaten steht der *P. dimidiata* näher als d. *P. flavens*. Ebenso Farbe u. ganze Gestalt, hat aber die Hauptmerkmale der *P. flavens*) p. 79 2 ♀ (aus Vera Cruz, mit Orchideen lebend importirt nach Hamburg). — *Kraepelini* (schlank, mit relativ nicht gross. Kopf, der Gruppe *Susannae* *biconstricta* sich nähernd und doch ganz anders ausgezeichnet durch ihre Skulptur, der ♀ hat ebenso grobe Skulpt. wie der 2) p. 79—80 2 ♀ (Brasil.: Sao Paulo, mit Orchid. lebend nach Hamb.), dito Kraepelin, t. c. p. 193. — *flavens* r. *sculptior* Forel in Orchideen aus Westindien Forel, p. 82. — *fervida* aus Japan mit Bambuspfl. importirt nach Hamburg. Kraepelin, t. c. p. 193. —

flavens sculptior For. u. flavens gracilior For. aus Westind. m. Orchid. nach Hamburg importirt. **Kraepelin**, t. c. p. 193. — flav. navigans (Heimat: Mexico) aus Vera Cruz mit Orchid. nach Hamburg eingeschleppt p. 193. — rehi For. aus Venezuela mit Orchid. nach Hamb. eingeschleppt, p. 193.

Forel beschreibt in den Mittheil. Schweiz. Entom. Ges. 10. Bd.: crassinoda var. *cubangensis* n. p. 306.

Emery in dem Bull. Soc. Entom. Ital. vol. XXXIII: aeberlii var. *erythraea* n. p. 61 und *speculifera* var. *ascarus* n. p. 62.

megacephala Fab. auf Corsica. **Bignell** p. 8.

termitobia nebst kleinerer Var. **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 390

— 391 2 ♀♀ (Sao Leopoldo, Rio Grande do Sul, bei Termiten).

pubiventris Mayr r. *Timmii* n. st. (dem Typus der Sp. recht nahestehend. —

Untersch.) **Forel**, Jahrb. Hamb. wiss. Anst. 18. Bd. 2. Beiheft p. 62

2 ♀ (N. Orleans, mit der Bemerk. „wohl mexikan. Herkunft“). —

Foreli Mayr r. *Bothae* n. st. (Skulptur ziemlich wie bei P. **Foreli**, die

schlanke Form, der schmälere Kopf, die langen Dornen, die Thorax-

höcker nahezu die gleichen wie bei P. *Aurivillei* Mayr. — Sowohl 2

als auch ♀ bilden den Uebergang) p. 62 (Bothaville, Orange-Freistaat).

— Gertrudae **Forel** var. *Leonhardi* n. var. (stämmiger als d. Stammart)

p. 62—63 2 ♀♀ (Tipuani, Bolivien. — An der Zusammengehörigkeit

von ♀ u. 2 ist nicht zu zweifeln, da die Artmerkmale genau stimmen,

besonders die sonderbare, eigenartige Gestalt des Metanotum. Daraus

folgert, dass der von Mayr als 2, der Pheidole Gertrudae beschrieb.

♀ gar nicht zu P. Gertr. gehört, sondern neu ist u. umgetauft werden

muss. **Forel** nennt ihn Ph. *Rosae* (= Pheid. Gertrudae Mayr 2, nec

Forel) p. 63. — fimbriata Roger ♀ (Bahia). — megacephala F. mit

Orchideen aus Nicaragua, Singapore [u. Süd-Brasil.] nach Hamburg

importirt p. 81, auch **Kraepelin**, t. c. p. 193.

Foreli (nach der Uebersicht der Soldaten der afrik. Pheidole-Arten in Beiträge

z. Kenntniss etc. Entom. Tidskr. 1896 p. 241 zu 6a zu stellen, wohin

P. *Aeberli* For., rotundata For. u. megacephala Fabr. gehören) **Mayr**,

Annal. naturh. Hofmus. Wien XVI. Bd. p. 8—9 Soldat, Arbeiter (unter

einem Baumknorren in den Sundayriver Mountains, 2400 engl. Fuss,

bei Port Elizabeth, Bothaville u. Reddersburg im Orange-Freistaat).

— *tenuinodis* (Farbe wie bei den dunkler gefärbten Soldaten der P.

megacephala Fab., ebenso die Behaarung, nur sind die Tibien weniger

abstehend behaart) p. 10—11 Soldat, Arbeiter (bei Bothaville im

Orange-Freistaat). Stellung des Arbeiters. — *kohli* p. 11—12 in

Anmerk. Beschr. von Soldat u. Arbeiter (Ostafrika, Waboniland).

latinoda Rog. 2 (Weligama, Ceylon) **Emery**, Deutsch. Entom. Zeitschr. 1901

p. 118. — spathifera For. var. Yerburgi For. in litt. (Bandarawella).

— rotschana **Forel** in litt. (Anuradhapura) p. 118. — *Horni* (rhombi-

noda Mayr sehr ähnl., besonders in Bezug auf Form d. Kopfes etc.)

p. 118 2 (Bentota). — *Nietneri* p. 118—119 2 ♀♀ (Bandarawella).

Pheidologeton. Bestimm. d. Gatt. **Dahl, F.**, p. 10. — affinis Jerdon p. 10, 19.

— affinis Jerdon ♀, im oberen Lowon bei Ralum; aus Indien, Sunda-Inseln

u. Neu-Guinea bereits bek. **Forel**, Mittheil. zool. Mus. Berlin, II. Bd. p. 14.

- (*Aneleus*) *sarasinorum* **Emery**, Zool. Jahrb. Abth. f. System. 14. Bd. p. 578—9 ♂, ♀, ♀ Fig. D Umriss des ♂ (Tomohon, in einem Farn).
diversus Jerd. var. *taprobanae* F. Sm. **Emery**, Deutsche Entom. Zeitschr. 1901 p. 119—120. Eigentümlichkeiten des ♀ aus Ceylon. Horn's biolog. Bemerk. in Anm. — *nanus* Rog. ♂ ♀ (Nalanda) p. 120.
- Plagiolepis*. Bestimm. der Gatt. **Dahl, F.**, p. 7. — *longipes* (Smith) p. 12.
longipes Smith, Ralum, sehr verbreitet; beginnt kosmopolitisch zu werden.
Forel, Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. Bd. 1901 p. 24. — *bicolor* (recht charakt. Sp.) p. 24 ♀ (Ralum). — *longipes* Jerd. (Ceylon). **Emery**, Deutsche Entom. Zeitschr. 1901 p. 121.
 — — Lebensweise. **Dahl, F.** p. 42, 50, 52; Nest p. 28; besucht Pflanzenläuse p. 45.
- pygmaea* Latr. (Biskra, Algier). **Saunders**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 527. — *vanderkelleni* **Forel**, Mittheil. Schweiz. Entom. Ges. 10. Bd. p. 310 (Mossamedes). — *pygmaea* Latr. auf Corsica. **Bignell** p. 8.
- Platythyrea* Bestimm. der Gatt. **Dahl, F.**, p. 9. — *melancholica* (Smith) p. 18.
 — *coxalis* var. *tritschleri* n. **Forel**, Revue Suisse Zool. vol. IX p. 338. — *augusta* p. 336 (Trinidad).
- basalis*. Lebensweise. **Dahl, F.** p. 42.
- basalis* Sm. Ralum. **Forel**, Mittheil. zool. Mus. Berlin, II. Bd. p. 14. —
 Sonstige Fundorte: Aru, Mysol, Dory, Amboina u. Neu Guinea.
- melancholica* Smith ♀, Ralum, bisher aus Neu-Guinea u. der Morty-Insel bek.
Forel, Mittheil. zool. Mus. Berlin, II. Bd. p. 10. — *Conradti* **Emery**
Forel, Jahrb. Hamb. wiss. Anst. 18. Bd. 2. Beihft. (Gaboon) p. 45.
- Podomyrma*. Bestimm. d. Gatt. **Dahl, F.**, p. 10. — *basalis* Smith p. 19.
- abdominalis* Em. r. *pulchra* n. st. (Untersch. von der typ. Form). **Forel**, Jahrb. Hamb. wiss. Anst. 18. Bd. 2. Beihft. p. 54 (Cairns, Queensland). —
gracilis Em. var. *Nugenti* n. var. (entspricht ziemlich genau der Em.'schen Besch., jener aus Neu-Guinea stammenden Sp. Doch schreibt **Emery**: „Caput subtiliter striatum“ u. „Thorax rudissime longitudinaliter rugosus“, das ist bei der n. var. nicht der Fall) p. 54 ♀ (Cairns, Queensland). — *octodentata* (Skulptur wie bei *P. bispinosa*, aber noch schwächer, Stirne nur mit zerstreut. schwach. Längsrünzeln; Pro-, Mesonotum schwach genetzt., Abd. ganz glatt u. glänzend) p. 54—55 ♀ (Mackay, Queensland). — *novementata* (Untersch. v. *Kraepelini* durch: schlankere Gestalt, den vorne nicht verengten Kopf, das ganz anders geformte 2. Stielchenglied, die geglättete Fühlerrinne u. d. feinere Skulptur) p. 55—56 ♀ ♀ (Mackay, Queensland). — *bispinosa* p. 56—57 ♀ (Mackay, Queensland). — *bimaculata* (sehr nahe verw. mit *P. micans* r. *maculiventris* **Emery**, aber viel kleiner, Kopf hinten viel schmaler, Farbe heller, Skulptur d. Abd. anders. Auch Skulptur des übr. Körpers weniger grob) p. 57—58 ♀ ♀ (Kalgoorlie, Westaustralien). — *Delbrücki* (jedenfalls mit *E. nitida* Sm. verw.) p. 58 ♀ (Mackay, Queensland). — *Chasei* (nahe verw. m. *bimaculata*, aber ohne Zähnchen am Mesonotum, dafür mit einem Nagel am ersten Stielchenglied) p. 58—59 ♀ ♂ (Perth, West-Australien). — *Kraepelini* p. 59—60 ♀ (Australien).
- Pogonomyrma barbatus* Smith ♀ desgl. barb. Sm. r. *molefaciens* Buckley (beide von Aguas calientes). **Emery**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 128. —

- Biolog. Notiz zu beiden **Wheeler**, t. c. p. 202. — *Schmitti* n. sp. (steht naegeli For. u. imberbiculus Wheeler in litt. nahe). **Forel**, t. c. p. 339—340 ♀ (Harti); kleiner als alle Verwandten, nähert sich dem subg. *Janetia*.
- Polyergus breviceps* Bemerk. hierzu. **Wasmann** (2) p. 371. — *bicolor* var. *Foreli* Wheeler (scheint die Verbindung zwischen den Rassen *breviceps* Em. u. *bicolor* Wsm. herzustellen). **Wasmann** (2) p. 371.
- lucidus* Mayr normale Sklaven: versch. Rassen der *Formica pallidefulva* Ltr. **Wasmann** (2) p. 354.
- rufescens* Latr. (die rote Amazonenameise) normale Sklaven ders.: *Formica fusca* L., auch *F. rufibarbis* F., oft beide zugleich. **Wasmann** (2) p. 353—354. — Kriegszüge ders. p. 353 in Anm.
- rufescens* subsp. *bicolor* (der *Formica sanguinea* in Färb. u. Behaarung gleichend. — *Untersch.* von subsp. *breviceps* Em. — Scheint durch ihren breiter u. etwas deutlicher gezähnten Kiefer einen Uebergang zwischen *Polyergus rufescens* u. *Formica sanguinea* anzudeuten). **Wasmann**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 369—370 Besch. v. ♀, ♀ u. ♂ (Wisconsin). Relatives Zahlenverhältniss der Herren u. Sklaven 80:20 also 80% Sklaven. Das relat. Zahlenverhältniss der Herren u. Sklaven in den gemischt. Kolon. von *Polyergus bicolor* m. *Formica subaenescens* scheint ein ganz ähnliches zu sein wie bei uns. europäischen Amazonenameise.
- Polyrhachis* Shuckard. Bestimm. d. Gatt. **Dahl, F.**, p. 9. — Bestimm. d. Spp.: *cyrus* Forel, *argenteo-signata* Emery, *atropos* Emery p. 14. — *mentor* Forel, *costulata* Emery var. *radicicola* Forel (= *P. aurea costulata* var. *radicicola* Forel), *arcuata* Le Guillou var. *acutinota* Forel, *acasta* Smith, *mucronata* Smith var. *bismarckensis* Forel, *aurea* Mayr var. *obtusa* Emery p. 15. — *penelope* Forel, *dahli* Forel, *bellicosa* Smith, *ralumensis* Forel, *rastellata* (Latr.), *conops* Forel p. 16. — *relucens* (Latr.), *litigiosa* Emery, *creusa* Emery var. *chlorizans* Forel, *inconspicua* Emery var. *subnitens* Emery u. *Dohrni* Forel p. 17.
- acasta*. Lebensweise. **Dahl, F.**, p. 40. — *arcuata*. Lebensweise p. 40; Nest p. 28 u. Tabelle. — *atropos*. Lebensweise p. 42. — *aurea*. Lebensweise p. 40; Nest p. 28 u. Tab. — *bellicosa*. Lebensweise p. 42. — *conops*. Lebensweise p. 40; Nest p. 28. — *costulata*. Lebensweise p. 40; Nest p. 28 u. Tab. — *creusa*. Lebensweise p. 40; Nest p. 28 u. Tab. — *cyrus*. Lebensweise p. 40; Nest p. 29. — *dahli*. Lebensweise p. 41; Nest p. 28, 33. — *inconspicua*. Lebensweise p. 40; Nest p. 28 u. Tab. — *litigiosa*. Lebensweise p. 42; Nest p. 37. — *mentor* u. *mucronata*. Lebensweise p. 42. — *penelope*. Lebensweise p. 40; Nest p. 28 u. Tab. — *ralumensis*. Lebensweise p. 42. — *rastellata*. Lebensweise p. 42; Nest p. 28, 33. — *relucens*. Lebensweise p. 42.
- decemdentata* André var. *fernandensis* Forel n. st. **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 377 ♀ (Auckland, Nouvelle-Zélande).
- Wallacei Emery r. *Wartburgi* n. (dafür nach Verbes. auf Rücks. des Titelblattes *Wartburgi* zu lesen). **Forel**, Jahrb. Hamb. wiss. Anst. 18. Bd. 2. Beihft. p. 76—78 ♀ (Buitenzorg, Java; typ. Art von Celebes). — *militarsis* F. r. *cupropubescentis* Forel ♀ Bemerk. zu Stück. v. Gabon u. Alt Calabar p. 77. — var. *transversaria* n. var. ♀ p. 77 (Liberia). — *bicolor* Sm. var. *aurinasis* n. var. (der *P. bicolor* Sm. sehr ähnlich,

aber der Kopf hat keinen Hinterrand) p. 77 ♀ (Sarawak, Birmanien, Barrakpore). — Bemerk. zum Typus von *bicolor* aus Manilla. — Typus der n. var. aus Sarawak. — *bicolor* i. sp. (Tandjong, Borneo) p. 78. — *lamellidens* Smith, ♀♀ (Tuyetategawa, Shikoku Sanuki, Japan) p. 78. — *vestitus* Sm. ♂ (Patuhuang, S. Celebes) p. 78. — *schistacea* Gerst. r. *medusa* For. (Lewa Mambaa) p. 78.

clypeata Mayr ♀ (Ceylon). **Emery**, Deutsche Entom. Zeitschr. 1901 p. 122. — *thrinax* Rog. ♀ u. *Mayri* Rog. ♀ (Ceylon). — *Horni* (durch glänz. nackten Kopf u. Hleib bei dicht pelzartig. pubescenten Thorax, sowie durch die Form des Petiolus unter allen *Polyrhachides carinatae* sehr ausgezeichnet) p. 122 ♀♀ nebst Abb. (Nalanda, Ceylon). — *rastellata* Latr. var. *fornicata* Emery ♀, *simplex* Mayr ♀, *rupicapra* Rog. ♀ (Bandarawella). — *Jeroni* For. ♂ (Anuradhapura, Ceylon). Dazu sackartiges Nest, bereits 1892 beschr.) p. 122.

Polyrhachis Shuckard. Spp. vom Bismarck-Archipel. **Forel**, Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. Bd. p. 28 sq. — *relucens* i. sp. (*typica*) Latr. ♀ Ralum, bish. Neu-Guinea u. Molukken p. 28. — *relucens* Latr. r. *Andromache* Roger ♀ Ralum?, bereits von Aru, N. Austral. u. Neu-Guinea bek. p. 28. — *relucens* Latr. r. *litigiosa* Emery, Ralum u. auf dem Wunakokur; Nest in Wurzelfasern. Bek. von Molukken u. Neu-Guinea. Untersch. d. Exemplare aus d. Bismarck-Archipel: grössere Breite des Thorax hinten, mit weniger erhab. Rändern, dichtere, mehr gelbl. (blass goldige) Pubescenz: var. *aloseana* n. ♀♀. — [*sericata* Guér. ♀ von Neu-Guinea u. Molukken bek., auf dem Schiff gef. p. 28. — *proxima* Roger ♀ beide von Singapore od. Buitenzorg, sonstige Fundorte ders.]. — *conops* n. sp. (zur Gruppe „*relucens*“ gehörig) p. 28—29 ♀♀♂ (in ein. Baumstumpf im Waldthal vor Herbertshöhe). — [*Orsyllus* Smith r. *musculus* n. st. (kleiner als die aus Celebes u. Ceram stammende typ. Form) p. 29—30 ♀ (Java oder Singapore)]. — *Creusa* Emery var. *chlorizans* n. var. (grösser als die typische, nur aus Neu-Guinea bek. Sp.) p. 30 ♀♀ (Ralum). — *inconspicua* Emery var. *subnitens* Emery, Ralum; bisher südl. Neu-Guinea, Type aus Queensland. — *Dahlia* (*thrinax* Roger sehr nahest., schlanker, längere Beine) p. 30 (Ralum; Nest ähnlich dem der *Polyrhachis arachne* Emery). — *Penelope* Forel p. 31 ♀♀♂ (Ralum). — *Atropos* Smith, Ralum, bisher Neu-Guinea u. Molukken. — *mentor* n. sp. (zur Gruppe *eurynota*, *lacinata* etc.) p. 31—32 ♀ (auf dem bewald. Gipfel des Wunakokur). — *arcuata* Le Guillou (= *latifrons* Rog. = *Modiglianii* Emery var. *acutinota* n. var. — schwierige Var., da sie den Uebergang zu *Guerini* u. besonders zu *aurea* [var. *costulata*] bildet) p. 32 (bei Ralum ausgegraben). Sonstige Fundorte von *arcuata*. — *aurea* Mayr var. *obtusa* Emery, Ralum, sonst nur Neu Guinea p. 32. — *aurea* Mayr, r. *costulata* Emery var. *radicicola* n. var. (von der typ. *costulata* versch., durch düstere Runzelung am Thorax, gleichmässiger Pubescenz etc.) p. 32 ♀♀♂ (Ralum; Nest unter Kokospalmenwurzeln). Die Rasse *costulata* bildet den nahen Uebergang zur Pol. *arcuata* u. dürfte als Rasse eher zu jener Art als zu *aurea* gehören. — *Cyrus* n. sp. (eigenthüml. u. charakt. Art) p. 32—33 ♀♀♂ (bei Ralum).

argenteo-signata Emery in litt., ein einz. ♂, wahrscheinl. aus dem Bismarck-Arch., sonst von Neu-Guinea bek. p. 33. — bellicosa Smith ♂, bei Ralum u. auf dem Gipfel des Wunakokurs, sonst aus den Sunda-inseln, den Molukk. u. Singapore bek. — acasta Smith ♀ von Kabakaul. Die von Forel irrthümlich in Indian Ants of Indian Mus. Calcutta für acasta angesehene Sp., scheint tibialis zu sein. — mucronata Sm. var. bismarckensis n. var. p. 33 ♀ (Gipfel des Wunakokurs. — Type von d. Insel Aru). — Leonidas (nahe verw. u. sehr ähnl. der rastellata u. besonders der r. laevior Rog. aber grösser etc.) p. 34 ♂♀ (Mioko). — rastellata Latr. ♀ (Ralum). — ralumensis (untersch. v. rastellata u. ihrer var. goramensis nicht nur durch ihre bedeutende Grösse, sond. vor allen durch viel grösseren Kopf, dem ein ungemein breites u. kurzes Pronot. entspricht etc.) p. 34 ♀ (Ralum). — Dohrni (Ritsemæ Mayr nahest.) p. 34—35 ♀ (Bismarck Archipel, Credner Insel im Magen von Pachycephala melanura). — Noch eine zweite P. sp. (Schenki Forel [vielleicht eine Var. ders.] nahest.) wurde im Magen des genannten Vogels gefunden, doch spezif. Bestimm. aus den Resten nicht möglich. Zweck der Dornen von Polyrh.-Arten. Schutz gegen Vögel.

smithi (durch die stark erweiterten Stirnleisten d. P. cleophanes F. Sm. nahest., versch. durch Sculptur des Thorax u. Petiolus). Emery, Zool. Jahrb. Abth. f. System. 14. Bd. p. 579—580 ♀ (Nord-Celebes, 1 Stück vom Gipfel des Sudara). — *gibba* (zur Gruppe P. rastellata gehörig, durch die Zähne am Pronotum, die Sculptur u. die Form des Petiolus erkennbar) p. 580 ♀ Abb. des Thorax u. Petiolus Fig. Ea, b (Süd Celebes). — mülleri Forel, Mittheil. Schweiz. Entom. Ges. 10. Bd. p. 302 ♀.

— Berichtigung: p. 445 des vor. Berichts Zeile 14 von oben lies 12 statt 22 + . . .

Ponera, *Bothroponera*, *Pachycondyla*, *Ectomomyrmex* u. *Belonopelta*. Gruppierung ders. Emery, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 41—43.

I. Les tibias des deux paires postérieurs n'ont qu'un seul épéron, l'épéron medial ou postérieur qui est toujours péctiné; l'épéron latéral ou antérieur fait défaut (es ist damit nicht eine lange Borste zu verwechseln, die vom Rande der Tibia, ein wenig höher als die übliche Lage des hier fehlenden Dornes, ausgeht).

Hierzu 2 Gatt.:

1. *Ponera* Latr. beschränkt auf seine kleinen Spp.: P. coarctata Latr. (Type), truncata F. Sm., opaciceps Mayr, punctatissima Rog. etc.

2. *Belonopelta* Mayr mit 2 primitiv. amerik. Spp.: B. attenuata Mayr (Type der Gatt.) u. B. curvata Mayr.

Hieran schliesst sich noch *Cryptopone* Emery mit 3 Spp.

II. Les tibias ont deux épérons: le postérieur, comme d'habitude, plus long et péctiné, l'antérieur plus court et simple.

1. *Pachycondyla* F. Sm. (Type: P. crassinoda). Eintheilung in 4 Untergatt. 1. *Pachycondyla* sens. strict. (Type der Gatt. P. crassinoda Latr.) alles Amerikaner. — 2. *Bothroponera* Mayr (Type der Gatt. P. pumicosa Rog.) —

3. *Ectomomyrmex* Mayr (Type der Gatt.: *P. javana* Mayr). 4. *Pseudoponera* n. subg. (Type: amblyops).

2. *Euponera* (Type: *E. sikorae* Forel: 3 Unterg.):

1. *Euponera* Forel sens. str. 1 gr. Sp.: *Max.-Palp.* 2-gliedr. mit *sikorae*.

2. *Mesoponera* n. subg. (typ. *E. caffrariae* F. Sm.), hierzu kleine Gruppe *Brachyponera* n. subg. (Type: *E. sennaarensis* Mayr).

3. *Neoponera* (Type: *N. villosa* F.).

— (*Bothroponera*) *insularis* Emery var. *brevior* n. var. (Kopf hinten nicht breiter als vorne, breiter bei *insularis*). **Forel**, Jahrb. Hamb. wiss. Anst. 18. Bd. 2. Beiht. p. 45 (Tandjong, S. O.-Borneo. — Type von Java und Sumatra, ist viel grösser). — *tridentata* Sm. r. *debilior* ♂ (Tandjong, S. O.-Borneo) p. 46.

Ponera. Bestimm. der Gatt. **Dahl**, F. p. 10. *dahli* Forel, *confinis* Roger, *siremps* Forel, *pia* Forel u. *stigma* Roger var. *quadridentata* Smith p. 18—19. Bestimm. ders.

confinis. Lebensweise **Dahl** p. 41, 52. — *dahli*. Lebensweise p. 40. — *pia* Lebensweise p. 43. — *siremps* p. 41. — *stigma*, Nest p. 28.

— Latr. Unterg. *Ponera* sens. str. *stigma* Roger var. *quadridentata* Sm. ♀, bei Ralum. Forel schliesst sich Emery's Ansicht an, der diese Form als Varr. der central- u. südamerikanischen Art *P. stigma* Fab. betrachtet. Fund- u. Nistorte. **Forel**, Mittheil. zool. Mus. Berlin, II. Bd. p. 8. — *confinis* Roger p. 8 ♀♀ (Kabakaul, im Wald, Ralum, auch in Ceylon u. Indien). — *siremps* (der *ceylonensis* Mayr, ergatandria For. u. der *indigens* For., var. *bellicosa* For. nahest., doch kleiner als die letzt. u. besonders schmaler) p. 8 ♀♀ (Ralum, im Waldthal, aus Laub gesiebt). — *pia* (vergl. mit *siremps*) p. 9 ♀ (Ralum. — Auf Hibiscus). — Unterg. *Ectomomyrmex* Mayr durch das Hinzukommen von neuen Arten u. die Thatsache, dass *Ponera annamita* André zu *Ectomomyrmex* gehört, verwischen sich nach Emery's u. Forel's Ansicht die Grenzen beider Gatt. so, dass *Ectomomyrmex* nur noch Untergatt. ist). p. 9. — *Dahlia* (der *P. [Ectom.] annamita* André var. *arcuata* For. sehr nahest.) p. 9—10 ♀♀ (Kabakaul, im Hochwald).

— Mexikanische Spp. **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 123 sq.: *foeda* Forel p. 123 ♀ (Cuernavaca, Morelos). — *opaciceps* Mayr p. 123 ♀ (Cuernavaca, Morelos).

— Spp. ders. **Emery**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 41.

— *opaciceps*. Biolog. Notiz. **Wheeler**, t. c. p. 199. — *foeda* Forel idem p. 199.

— *coarctata boerorum* n. st. **Forel**, Revue Suisse Zool. vol. IX p. 339.

Ponerinae u. *Dorylinae*. Erwiderung auf Forel's Ansicht über die Auffassung der Umgrenzung beider Gruppen. **Emery**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 32 sq. Er fasst unter die Subfam. der *Dorylinae* zus. die Gatt. *Dorylus*, *Aenictus*, *Eciton*, *Cheliomyrmex* und eine Zahl kleiner Gatt. die die Tribus der *Cerapachyi* bilden, welche letztere Forel unter die *Ponerinae* stellt. Emery betrachtet als Klassifikationskriterium eine Reihe von Merkmalen: *Cerci* fehl. bei d. *Dorylin.*, vorhanden b. den *Ponerin.* (ausser *Mystrium*); *lamina subgenit.* gegabelt b. d. *Dorylin.*, einfach bei den *Ponerin.*

(auss. Paraponera). Ausserdem zeichnen sich die meisten Doryl. ♂ durch ein besonderes Aussehen aus: Antennen relativ kurz u. dick, Mandibeln u. Abd. (ventre) massig, an Aenictus erinnernd, unstreitbare Doryl. — Begründung seiner Ansicht u. s. w. Berichtigungen auf Grund neuester Beobacht. ♂ von Discothyrea u. Cylindromyrmex. — Auf Grund der Thatfachen theilt Verf. die Subfam. der Cerapachinae in folg. Tribus:

1. *Acanthostichii*: 1 Gatt.: *Acanthostichus*, amerikanisch.
2. *Cerapachyi*: *Cerapachys*, *Ooceraea* etc., eine der alt. Welt eigenthüml. Gruppe, ausser *Sphinctomyrmex*, die auch in Amerika vorkommt.
3. *Cylindromyrmii*: *Cylindromyrmex* von Amerika u. *Simopone* von Afrika.

Das morphologische Gefühl des Verf. leitet ihn dazu, die Gruppe *Cerapachys* etc. als ursprünglichste dieser drei zu betrachten, während die beiden anderen specialisirte Derivate derselb. sind. Sie ist wahrscheinlich auch der Stamm der Dorylinae, im beschränkt. Sinne Forel's, mit den 3 Subdivisionen: *Dorylus*, *Aenictus*, *Eciton* + *Cheliomyrmex*.

Ponerinae. Auch bei diesen sind nach Emery verschiedene Aenderungen in der Stellung, Auffassung u. s. w. der verschied. Gatt. nöthig, siehe bei den einzeln. Gatt.: *Cylindromyrmex*, *Simopone*, *Myopias*, *Melissotarsus*, *Amblyoponii*, *Myrmecii*, *Prionopelta*, *Centromyrmex*, *Paraponera*, *Leptogenys*, *Prionogenys*, *Platythyrea*, *Harpegnathus* etc., *Plectrona* etc., *Ponera*, *Odontomachii* u. *Thaumatomyrmex*.

Ponerinen s. Meisenheimer.

Prenolepis. Bestimm. der Gatt. **Dahl, F.** p. 8. Bestimm. von *minutula* Forel, *atomus* Forel, *longicornis* (Latr.), *obscura* Mayr *vaga* Forel, *obscur.* Mayr *bismarckensis* Forel p. 14. — *longicornis* Latr., *Yerburyi* For., *indica* For. von Ceylon n. sp. ? (♀ mit sehr dunklen Flügeln) (S. W.-Ceylon). **Emery**, Deutsche Entom. Zeitschr. 1901 p. 121.

bismarckensis, Lebensweise. **Dahl** p. 39, 52; — Nest p. 28, 37 u. Tabelle. — *longicornis*, Lebensweise p. 43. — *minutula*, Lebensweise p. 39. — *vaga* Lebensweise, p. 42, 52; Nest p. 28 u. Tab.

longicornis Latr. *var. Hagemanni* n. (♀, es wäre denkbar, dass dies der ♀ der *P. Walbraecki* Em. ist, deren ♀ u. ♂ allein bek. sind. Allein Emery erwähnt nichts von der eigenthüml. Farbe der Haare. Ferner giebt er an, dieselb. seien spitz. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es Polymorphismus - Unterschiede sind). **Forel**, Jahrb. Hamb. wiss. Anst. 18. Bd. 2. Beihft. p. 65. — *solitaria* Sm. aus Japan, an *Prunus*, nach Hamburg, importirt. **Kraepelin**, p. 193.

flavipes Sm. aus Japan, im Humus lebende Pflanzen, nach Hamburg eingeschleppt. **Kraepelin** p. 194. — *longicornis* Latr. (Kosmopolit) aus Ostafrika an Holz von *Dahlbergia melanorylon* eingeschleppt p. 194. — *guatemalensis itinerans* For., aus Brasilien mit Orchideen p. 194. — *imparis*, aus N.-Amer. eingeschleppt, p. 194. — *steinheili* For. *var.* aus Brasil., mit Orchid. eingeschleppt, p. 194.

flavipes Smith (Sapporo). **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 371.

- guatemalensis Forel var. *itinerans* n. var. ♀ (Untersch. v. der Stammart) **Forel**, Jahrb. Hamb. wiss. Anst. 18. Bd. 2. Beihft. p. 81 (aus Brasil. m. Orchid. nach Hamburg importirt).
- longicornis* Latr. Ralum, Kosmopolit aller Tropen u. der Treibhäuser. **Forel**, Mittheil. zool. Mus. Berlin, II. Bd. 1901 p. 25. — *minutula* r. *atomus* n. st. p. 25–26 ♀ (Ralum). — *minutula* n. sp. p. 25 in Anmerk. ♀ (New South Wales, Australien). — *obscura* Mayr, r. *bismarckensis* n. st. (ob als Art zu bezeichnen, ist fraglich) p. 26 ♀ ♂ ♀ (Ralum, in Pflanzung u. Grasland häufig). — *vaga* n. st. p. 26 ♀ (Ralum, im Walde). — *obscura* var. oder r. *papuana* (ob n.?) p. 26 in Anm. (Neu-Guinea).
- longicornis* Latr. (Cuernavaca, Morelos). **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 135. — Biol. Notiz. **Wheeler**, t. c. p. 205.
- Prionopelta*. Bestimm. d. Gatt. **Dahl**, F. p. 9. — *majuscula* Emery p. 18.
majuscula Em. ♀ Ralum. **Forel**, Mittheil. Zool. Mus. Berlin II. Bd. p. 5. — sp. indescr. in der Erde, in versteckten Gängen, in Venezuela, zwischen Laguyara u. Caracas p. 5.
- Pristomyrmex japonicus* Forel (Sapporo). **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 371.
- Probolomyrmex* n. g. (in Emery's Clef anal. des genres de la Famille des Formicoides. Ann. Soc. Entom. Belg. 1896) gelangt man beim Versuch, die Gatt. zu bestimm., auf die Doryliden zu Nr. 7, wo die Gatt. unmittelbar nach Ooceraea eingefügt werden kann und zwar: „Pédicule d'un seul segm. pas des yeux et des ocelles; la partie antérieure de la tête avec l'articulation des antennes fortement avancée comme un avant-toit“). **Mayr**, Annal. naturhist. Hofmus. Wien, XVI. Bd. p. 2–3. — *filiformis* p. 3 ♀ (Port Elizabeth in der Capkolonie).
- Procryptocerus striatus* Sm. r. *regularis* Em. var. *concentricus* Em. ♀ (Santa Cruz, Rio Grande do Sul). **Forel**, Jahrb. Hamb. wiss. Anst. 18. Bd. 2. Beihft. p. 50.
- Pseudomyrma Belti* Em. r. *fulvescens* Em. (Guatemala) **Forel**, Jahrb. Hamb. wiss. Anst. 18. Bd. 2. Beihft. p. 54. — *schuppi* **Forel**, Mittheil. Schweiz. Entom. Ges. 10. Bd. p. 298 (Brasilien).
- Sima Mayri* (durch den Lappen des 1. Stielchengliedes recht charakt.) **Forel**, Jahrb. Hamb. wiss. Anst. 18. Bd. 2. Beihft. p. 53–54 ♀ (Kamerun).
attenuata Smith ♀ p. 54 (Tandjong, Borneo).
- Solenopsis orbula* Em. (Biskra). **Saunders**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 528. — Neu: *Schmalzi* **Forel**, Mittheil. Schweiz. Entom. Ges. 10. Bd. p. 297 (Brasilien).
 — Westwood mit *geminata* Fabr. r. *rufa* Jerdon ♀ in Celebes gefangen. Kosmopol. Tropenart. — Die r. *rufa* ist die indo-malesische Form ders. **Forel**, Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. Bd. p. 14. — *Dahlîi* (fugax, papuana, molesta, Pollux, orbula, Castor, latro u. *corticalis* nahe, doch gut unterscheidbar, viel gröss. als *papuana* von *similis* var. *crassiuscula* u. *maxillosa* ganz verschieden) p. 14–15 ♀ ♂ (Ralum, in der Pflanzung ausgegraben).
- Stenamma* (Messor) *aciculatum* Sm. var. *brunneicorne* n. var. (d. *barbarum* var. *rugosum* sehr ähnlich. — Ist dies wirklich die *Aphaenogaster aciculata* Sm.?

Nach der Beschr. könnte diese Sp. auch einer anderen Gatt. angehören. Doch spricht Smith nicht von Dornen und sein „aculate“ kann zu der Skulptur passen. Jedenfalls ist es aber eine Farbenv. **Forel**, Jahrb. Hamb. wiss. Anst. 18. Bd. 2. Beihft. p. 61 (Hozuyama, Kuwadagori, Tamba, Japan). — (Ischnomyrmex) famelicus Sm. ♀ (Hozuyama, am Majori Tamba, Japan). — (Messor) barbarum L. r. cephalotes Em. ♀ (Massai, Afrika) p. 61. — (Messor) barb. L. r. himalayanum Forel in litt. ♀ (Issyk kul, Kaschgar) p. 61. — Diecki Em. in hohlen Stengeln aus Vermont, **Forel** p. 82, auch **Kraepelin**, t. c. p. 193 u. (Aphaenogaster fulva) Rog. aus Vermont nach Hamburg mit Pflanzen importirt p. 82.

sangiorgii **Emery**, Bull. Soc. Entom. Ital. vol. XXXIII p. 57 (Cephalonia).

Stictoponera costata var. *micolor* n. **Forel**, Rev. Suisse Zool. vol. IX p. 335.

Tapinoma sessile Say aus Nordamerika mit Aepfeln u. Galax-Blättern nach Hamburg eingeschleppt. **Kraepelin**, t. c. p. 194.

Technomyrmex pilipes Emery ♀ (Gaboon). **Forel**, Jahrb. Hamb. wiss. Anst. 18. Bd. 2. Beihft. p. 65.

Tetramorium Mayr. Unterg. Tetramorium sens. strict.: tonganum Mayr ♂♀ (Ralum, sonst nur Tonga-Inseln). **Forel**, Mittheil. zool. Mus. Berlin, II. Bd. p. 11. — pacificum Mayr r. validiusculum **Emery** p. 11 ♀ Ralum, bisher Neu Guinea, Moroka, 1300 m p. 11. — simillimum Nyl. ♀ Ralum; Kosmopolit. p. 11. — guineense Fab. ♀, Ralum, Kosmopolit. p. 11. — ornatum Emery p. 11 ♀ Ralum, bisher Neu Guinea, grösser als die Stammart (var. obscurior). — Unterg. Xiphomyrmex: (X.) *Bismarckii* p. 11—12 ♀ (Wald bei Kabakaul, bei Ralum im Lowon).

pygmaeum ♂ **Emery**, Bull. Soc. Entom. Ital. vol. XXXIII p. 62. — caespitum var. *mossamedensis* n. **Forel**, Mittheil. Schweiz. Entom. Ges. 10. Bd. p. 306.

(sensu stricto) *setigerum* (von den and. afrik. Spp. gut geschieden, durch die sehr gut ausgeprägten langen Fühlerinnen, die gestreckteren Fühlerglieder, grobe Skulptur der Oberseite des Thorax, Knoten des 1. Stielchengliedes, der etwas breiter als lang ist). **Mayr**, Annal. naturhist. Hofmus. Wien, XVI. Bd. p. 22—23 ♀ (Bothaville). — (s. str.) **Emery** p. 23—25 ♂♂ (Port Elizabeth). — *Grassii* Em. Das von **Emery** zu dieser Art gezogene ♀ gehört nicht hierher. Charakt. des unzweifelhaft dazugez. ♀ von Port Elizabeth p. 25. — *Grassii* Em. var. *laevigatum* n. (♂ von dem der Stammform versch. durch den vom Vorderrand des Pronotum bis zu den Dornen des Mittelsgms. glatten Thoraxrücken) p. 25 (Port Elizabeth).

caespitum L. (Biskra). **Saunders**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 527.

guineense. Nest. **Dahl**, F. p. 29.

(Xiphomyrmex) *Wheeleri* (untersch. von spinosum durch seine Dornen, Gestalt, Färb., Behaarung, sowie durch den hinten stärker bogig ausgeschnitt. Kopf). **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 128 ♀ (Pacheco, Zacatecas). — Biolog. Notiz dazu. **Wheeler**, t. c. p. 201.

pacificum Mayr ♀ (Tandjong, Borneo). **Forel**, Jahrb. Hamb. wiss. Anst. 18. Bd. 2. Beihft. p. 53.

- Tranopelta mayri* (viel grösser als *T. gilva*, sonst nahest.) **Forel**, Jahrb. Hamb. wiss. Anst. 18. Bd. 2. Beihft. p. 61 ♂ (Paraguay). Vielleicht nur eine grosse Rasse von *T. gilva*, doch Form des Kopfes u. Fühler recht verschieden.
- Trapeziopelta hollandi* **Forel**, Revue Suisse Zool. vol. IX p. 325 (Sumatra).
- Triglyphothrix* Bestimm. d. Gatt. **Dahl, F.** p. 11. — *obesus* André, *striatidens* Emery p. 20.
- gabonensis* André r. *Soyauxi* n. st. (b. gab. Fühlerrinne sehr flach, hinten u. unt. schlecht abgegrenzt, bei der neuen Rasse ist sie überall scharf begrenzt, obwohl nicht sehr tief etc.) **Forel**, Jahrb. Hamb. wiss. Anst. 18. Bd. 2. Beihft. p. 53 (Ssibange, Gabon). — *striatidens* Em. (Heimat: Indien, Bism. Archipel). Aus Mexico mit Orchideen nach Hamburg importirt. **Kraepelin** p. 193. — *striatidens laevidens* For. desgl. p. 194.
- Triglyphothrix obesus* André, r. *striatidens* Emery ♀ Ralum. — Scheint ziemlich Kosmopolit zu sein. **Forel**, Mittheil. zool. Mus. Berlin, II. Bd. p. 10.
- microps* (Arbeiter mit auffallend kleinen Augen) **Mayr**, Annal. naturhist. Hofmus. Wien, XVI. Bd. p. 25—26 ♀♀ (Port Elizabeth).
- Turneria*. Bestimm. der Gatt. **Dahl, F.** p. 8. — *dahli* **Forel** p. 12; Lebensweise. **Dahl** p. 43.
- Dahlia* (höchst interess. 2. Sp. der Gatt., sehr versch. von d. *T. bidentata* aus Queensland) **Forel**, Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. Bd. 1901 p. 96 ♀ (Ralum).
- Xiphomyrmex*, Bestimm. der Gatt. **Dahl, F.** p. 11. — *bismarcki* Lebensweise **Forel**, p. 20.
- pilosus* Emery ♀ (Ceylon). **Emery**, Deutsch. Entom. Zeitschr. 1901 p. 120.
- Vollenhovia*. Bestimm. d. Gatt. **Dahl, F.** p. 10. — *pedestris* (Smith) p. 19, Lebensweise p. 40.
- pedestris* Smith. Neu Lauenburg, Rand einer Süswasserquelle, sonst noch auf Celebes u. der Morty Insel. **Forel**, Mittheil. zool. Mus. Berlin, II. Bd. p. 12.
- rufiventris* **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 374 ♀ (Borneo, Sarawack).
- Wasmannia auropunctata* Roger v. *rugosa* **Forel** ♀ (Cuernavaca, Morelos) **Forel**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 128. — Biolog. Notiz dazu. **Wheeler**, t. c. p. 201.

Superfamilia V: Proctotrypoidea.

(Hierher die Familien L—LVII Ashm.'s: Pelecinidae, Heloridae, Proctotrypidae, Belytidae, Diapriidae, Ceraphronidae, Scelionidae und Platygasteridae).

Proctotrupidae. Bemerk. **Enderlein** p 211.

Allotropa loundsburyi **Ashmead**, Canad. Entom. vol. 33 p. 138 (S. Afrika).

Amitus longicornis Först. (Heimat: Deutschland) aus Nordamerika nach Hamburg eingeschl. Aus Aleurodes an Galaxblättern gezüchtet. **Kraepelin**.

Anteris nigricornis **Ashmead**, Fauna Hawaiiensis vol. I p. 297. — *tarsalis* p. 298. — *hawaiiensis* p. 298. — *perkinsi* p. 298 (sämmtlich von den Sandwich Inseln).

- Baeus niger*. Bemerk. zur Biologie u. zu den Geschlechtern. **Harrington**, Canad. Entom. vol. 33 p. 331.
- Calyzoa Ashmeadi* **Enderlein**, Archiv f. Naturg. 67. Jbg. I. Bd. 3. Hft. p. 214 Abb. d. Oberkiefer Fig. 5, 6 (Nord-Kamerun, Johann Albrechtshöhe). — Untersch. d. C. staphylinoides Westw.
- Epyris hawaiiensis* **Ashmead**, Fauna Hawaiiensis vol. I p. 286 (Hawaii).
nigra Westw. (Heimat: England). Nach Hamburg eingeschleppt. **Kraepelin**.
- Gonatopus perkinsi* **Ashmead**, Fauna Hawaiiensis vol. I p. 293 Abb. Taf. VIII Fig. 2. — *haeakalae* p. 293 (beide von d. Insel Hawaii).
- Isocybus rossicus* **Szépligeti**, Zichy Ergebn. 2. Bd. p. 157 (Kazan).
- Labeo pusillus* **Szépligeti**, t. c. p. 156 (Hawaii). — *hawaiiensis* **Ashmead**, Fauna Hawaiiensis vol. I p. 294 (Hawaii).
- Pantoclis rufipes* **Szépligeti**, Zichy Ergebn. 2. Bd. p. 157 (Sibirien).
- Perisenus 3-aerolatus* Först. = *fuscicornis* Walk. Ueber die Gewohnheiten der Betbylinae (Familie der Proctotrypidae) sehr wenig bekannt. 5. Juli als Larven an grünen Raupen, am 17. Oktober als ♂ u. ♀ in Papier gefunden. — Lebt also von Raupen. **Ferton**, Ann. Soc. Entom. France vol. 70 p. 144—145.
- Phaenopria hawaiiensis* **Ashmead**, Fauna Hawaiiensis vol. I p. 296 (Molokai).
- Platymischoides* n. g. Diapriinarum. **Ashmead**, t. c. p. 296. — *molokaiensis* p. 296 Taf. VIII Fig. 4 (beide von den Sandwich-Inseln).
- Prestwichia aquatica* aus Eiern von Ranatra. **Enock**, Proc. Entom. Soc. London 1900 p. XII. — Auch: The Entomologist vol. 33 p. 253.
Lubb. ? spec. Beschreib. **Meunier** (2 des vorig. Berichts) p. 367 (im Copal). — 1/8 mm.
Lubb. hat Recht, wenn er die Charakt. d. Hflgl. (linear und an d. Bas. gestielt) nicht als Kriter. für eine Spalt. dies. Fam. in mehrere Gatt. ansehen will, denn b. *Anagrus*, *Anaphes* u. *Ooctonus* Hal. sind sie nach dems. Plan gebaut.
- Pristocera subviolacea* **Enderlein**, Archiv f. Naturg. 67. Jahrg. 1. Bd. 3. Hft. p. 211—212 ♂ Profil d. Oberkiefer Fig. 2 (Nord- u. Südost-Kamerun). — *rugosa* p. 212—213 ♂ Oberk. Fig. 3 (Togo, Bismarckburg). — *decendentata* p. 213 ♂ (Nord-Kamerun, Johann Albrechtshöhe).
- Proctotrupes ater* Nees und *niger* Panz. nach Hamburg eingeschleppt, woher? **Kraepelin** p. 194.
Neu sind: *collaris* **Szépligeti** in Zichy Ergebn. 2. Bd. p. 156 (Kazan). — *hawaiiensis* **Ashmead**, Fauna Hawaiiensis vol. I p. 294 (Hawaii).
- Prosacantha spinosa* **Szépligeti** in Zichy Ergebn. 2. Bd. p. 157 (Kazan).
- Scleroderma perkinsi* **Ashmead**, Fauna Hawaiiensis vol. I p. 284. — *kaalae* p. 285. — *lanaiense* p. 285. — *nigriventre* p. 285. — *breviventre* p. 286 (sämtl. von den Hawaiischen Inseln).
- Sierola molokaiensis* **Ashmead**, t. c. p. 290 Taf. VIII Fig. 1. — *oahuensis* p. 290. — *flavocollaris* p. 291. — *collaris* p. 292. — *kauaiensis* p. 292 (sämtl. von d. Hawaiischen Inseln).
- Telenomus longicornis* **Ashmead**, Bull. N. York Mus. No. 47 p. 586 (Adirondacks).
- Zacraniium* n. g. Diapriinarum. **Ashmead**, Fauna Hawaiiensis vol. I p. 295. — *oahuense* p. 295 (Sandwich Inseln).

Superfamilia VI. Cynipoidea.

Uebersicht über die Familien siehe vorig. Bericht p. 464.

Figitidae (Fam. LVIII) u. **Cynipidae** (Fam. LIX).

Cynipiden-Gallen. **Kieffer**. (Erzeuger nicht genau bestimmt):

- Galle auf *Crépis biennis* L. **Kieffer** p. 300. Je 1 Sp. auf *Onobris sativa* Lk. u. *arenaria* D. C. p. 368. — sp. auf *Phegopteris Robertianum* A. Br. p. 373. — auf *Picidium vulgare* L. p. 377 — auf *Potentilla recta* L. p. 394. — auf *Pteris aquilina* L. p. 399. — auf *Quercus ilex* p. 402. — desgl. auf *Qu. lusitana* Lam. var. *faginea* = *Q. valentina* Cav. p. 403. — 2 Sp. auf divers. *Querc.*-Sp. p. 405. — 1 Sp. p. 406. — auf *Qu. ilex* u. *suber* 408. — auf *Quercus lusitana* var. *faginea*. **Kieffer** p. 416. — Sp. auf *Qu. pubescens* (vielleicht die Galle servant à l'éclairage). — Sp. auf *Qu. lusitana* var. *faginea* p. 421. — (wahrsch. *Cynips coriaria*) auf *Qu. sessiliflora* p. 427. — Desgl. auch *Qu. lusit.* var. *faginea* p. 427—428. — auf *Qu. lusitana* var. *faginea* p. 432. — auf *Qu. macedonica* u. *pseudosuber* p. 433. — auf *Qu. avellanaeformis* Colm. u. *petiolaris* Boiss. p. 437. — auf *Qu. suber* p. 437—438. — auf *Qu. cerris* p. 439. — auf *Qu. cerris* (ähnlich der von *coriaceus* Mayr). — auf *Qu. toza* p. 440—441. — auf *Qu. suber* p. 441. — 2 Sp. an der Unters. d. Blätter von *lusitana* var. *faginea* p. 442. — auf *Qu. suber* p. 452. — auf divers. *Quercus*-Sp. p. 455. — auf *Taraxacum officinale* Wigg. p. 524.
- Aglaotoma rufiventris* **Ashmead**, Fauna Hawaiiensis vol. I p. 301. — *molokaiensis* p. 301 (beide von den Hawaiischen Inseln).
- Amblynotus ruficeps* **Szepliget**, Zichy Ergebn. 2. Bd. p. 137 (Omsk).
- Amblicrus serotinus* **Gir.** Gallen auf *Q. pubescens* u. *sessiliflora* (**Gir.**) **Kieffer** p. 411. — *Kirchsbergi* **Wachtl.** p. 412. — *fecundator* **H.** auf div. *Querc.* p. 413 nebst. Var. auf *Qu. toza* p. 413 in **Ann.** — *cryptobius* **Wachtl.** p. 415. — *circulans* **Mayr** p. 415. — *solitarius* **Fonse.** auf div. *Querc.*-Arten p. 415—416. — *callidoma* **Gir.**, *Giraudi* **Wachtl.**, *Malpighii* **Adl.** p. 416. — *Trotteri* **Kieff.**, *Mayetti* **Kieff.** p. 417. — *luteicornis* **Kieff.** p. 417—418. — *Clementinae* **Gir.** p. 418. — *Bocagei* **Tav.** p. 418. — *globuli* **H.** p. 418. — *gemmicola* n. sp. (noir, à peu près glabre. — Antennes du ♂ filiformes, compos. de 15 artic. 1,5 mm) p. 418—419 (auf *Querc. pedunculata*). — *glandulae* **Schenck**, *albo-punctatus* **Schlecht.**, *collaris* **H.** auf *Quercus* p. 419. — *antunnalis* **H.** auf *Qu. pubescens* u. *sessiliflora* p. 419—420. — *radicis* **Fabr.** Galle auf divers. *Quercus*-Sp. p. 402—403 u. 403, desgl. *corticis* **L.** p. 404. — *Krajuovici* **Tav.** auf *Quercus lusitana* var. *Broteri* u. var. *faginea* p. 404. — *Sieboldi* **H.** u. div. *Quercus*-Sp. p. 404. — *rhizomae* **H.** desgl. p. 404—405. — *fidensis* **Tav.** *Quercus suber* p. 405. — *trilineatus* **H.** auf divers. *Quercus*-Sp. p. 407. — *gemmatas* **Adl.** p. 407. — *furunculus* (**Bey.**) **Kieff.** p. 407. — *singulus* **Mayr** auf *Qu. cerris* p. 408. — *inflator* **H.** auf div. *Querc.*-Sp., *pseudo-inflator* **Tav.** desgl. p. 408. — *multiplicatus* **Gir.** auf div. *Querc.*-Sp. p. 408—409. — *cydoniae* **Gir.** p. 409. — *Malpighii* p. 426. — *Lambertoni* **Kieff.** p. 426. — *lucidus* **H.** nebst var. *erinaceus* **Trott.**, *Panteli* **Kieff.** p. 427. — *hystrix* **Trott.** p. 428. — *trilineatus* **H.** u. *testaceipes* **H.**, *testaceipes* var. *nodifex* **Kieff.** p. 432. — *ostreus* **Gir.** p. 433. — *Schrückingeri* **Wachtl.** auf *Qu. cerris* p. 434

— *marginalis* Adl. auf Qu. sessifl. p. 434. — *seminationis* Adl. p. 433. — *curvator* H., *curv.* var. *lusitanica* Kieff. p. 436. — *Buyssoni* Kieff., *Adleri* Mayr, *crispator* Tsch. p. 438. — *pseudococcus* Kieff., *coriaceus* Mayr. et var. *barrensis* Tav., *sufflator* Mayr p. 439. — *urnaeformis* Mayr p. 444. — *Giardinus* Stef. p. 445. — *Zappellai* n. sp. p. 447—448, *Beschr. d. Galle* (p. 448 in Anm.) des Thieres ♀ (an Qu. macedonica). — *cirratus* Adl. auf Qu. sessiflora p. 448. — *ramuli* L., nebst var. *trifasciatus* Kieff. p. 449. — *Panteli* Kieff., *Mayri* Wachtl. p. 449.

Cecconii n. sp. *Beschr. d. Galle* p. 450, des Thieres p. 450 in Anm. (von A. aestivalis, versch. durch „mésonotum mat et grossièrement chagriné, mais non ponctué, et par les ailes non ciliées) (Italie). — *aestivalis* Gir. auf Qu. cerrris u. suber p. 450. — *grossulariae* Gir., *vindobonensis* Müller p. 451. — *seminationis* Adl. *quadrilineatus* H. et *flavicornis* Schenck., (*verrucosus* Sch.), *cerifloralis* Müller, *Beyerincki* Trott, *cerris* Bey., *luteicornis* Kieff. et var. *niger* Gir., *Kiefferi* Fig. 453. — *amenti* Gr., *xanthopsis* Schlecht., *occultus* Tschek, *pilosus* Adl., *nudus* Adl., sp.? p. 455. — *Nobrei* Tav., *superfetationis* Pasz. p. 456. — *Panteli* var. *fructuum* Trott., *lucidus* H., *Seckendorffi* Wachtl. p. 457.

Neu: *gemmicola* u. *Zappellai* (siehe oben), ferner *vindobonensis* (sieht Andr. *grossulariae* Gir. sehr ähnl., Unterschiede nur in der dunkleren Färbung der Hinterbeine u. in den etwas dünneren Fühlern bei den ♂). Müller, *Verhdlgen. k. k. zool.-bot. Ges. Wien*, 51. Bd. p. 529 ♂ *Beschr. u. Abb. der Gallen* Taf. IV Fig. 7—13 (Ober St. Veit in Wien).

Aphelonix cervicola Gir.? *Galle auf Quercus ilex, suber u. pseudosuber.* Kieffer p. 404. — *cervicola* Gir. p. 407.

Arhoptra subg. n. von *Cleidotoma*, für *melanopoda* u. *picipes* Cam. Kieffer, *Feuille jeun. Naturaliste* T. XXXI p. 161 u. 162.

Aspicera Dahlb. Kieffer, *Bull. Soc. Entom. France*, 1901, p. 158. Umfasst folg. europ. Sp.: *rugosa* (Hart.), *Hartigi* D. T. (*spinosa* Hart. nec Fonsc.), *spinosa* (Fonsc.), *bicolor* Dahlb., *Dahlbomi* nom. nov. für *ediogaster* Dahlb. nec Ross.), *scutellata* Gir. (*ediogaster* Ross.) u. die folg. amerik. Sp.: *albihirta*, *flavipes*, *similis* u. *utahensis* Ashm., *bifoveolata* u. *rufipes* Cress., *quinquelineata* (Say) Prov. u. *nigricornis* Kirb. — Dazu neu: *sibirica* p. 158 ♀ (Sibirien). — *Chlapowskii* p. 158 ♀ (Russland). — *longispina* p. 158—159 (Spanien; aus einer Galle von *Cynips* Mayri Kieff.). — *brevispina* p. 159 ♂ ♀ (Spanien). — *coriacea* p. 159 ♀ (Corsica).

Aulax sp.? *Galle auf Campanula trachelium* L. Kieffer p. 279. — *scabiosae* Gir. *Galle auf Centaurea scabiosa* u. *nigra* L. p. 288. — *Fichi* Kieff. *Galle auf C. scabiosa* (A. Fitch) p. 288. — *jaceae* Schenck. *Galle auf C. jacea* Schenck. u. *rhenana* Boc. d. 288. — *Rogenhofferi* Wachtl. *Galle auf C. scabiosa* p. 288. — 2 sp.? auf *Cichorium intybus* L. p. 292. — *hieracii* Béhé. *Galle auf Cytisus capitatus* Jacq. p. 302. — ? an *Echium*, p. 309. — *Latreillei* Kieff. auf *hederacea* L. u. *glechomae* L. nec Latr. p. 331. — *hieracii* Bouché auf divers. *Hieracium*-Sp. p. 336. — *pilosellae* u. sp. (von A. *hieracii* versch. durch „antennes noires, à articles 3 et 4 d'un brun rougeâtre, l'abd. noir avec le dessus de la base d'un brun marron, le mésonot. glabre et plus finement chagriné que l'écusson, enfin par la taille plus petite.

- ♀ 1—5,6 mm — Ardenne). — auf *Hierac. cymosum* L. u. *pilosella* L. — sp. auf *Hieracium pilos.* p. 337. — *hypochaeridis* Kieff. auf *Hypochaeris radicata* L. u. *glabra* L. p. 341. — Andrei Kieff. auf *H. maculata* L. p. 342 — sp.? auf *Lathyrus montanus* Bern. p. 350. — sp.? auf *Linaria vulgaris* u. ähnl. auf *L. Tourneforti* p. 357. — *Kermeri* Wachtl auf *Nepeta* p. 367. — *scorzoneuræ* Gir. Galle auf *Scorzonera austriaca* Wild. u. *humilis* L. Kieffer p. 506. — sp. auf *Sc. humilis* p. 506. — *serratulae* Mayr. Galle auf *Serratula heteropylla* Desf. p. 510. — *souchi* Stef. auf *Sonchus asper* Wild. p. 516. — sp. auf *Sonchus* p. 516. — *tragopogonis* Thoms. auf *Tragopogon* spp. p. 524. — *Pigeoti* Kieff. auf *Tr. porrifolius* p. 524. — *graminis* Cam. auf *Triticum repens* p. 536—537. — *urospermi* Besch. der Galle, Thier (corps noir, tibias, tarses et abdomen brun marron, cellule radiale fermée: antennes de 14 articles). Kieffer p. 542. — sp.? Galle auf *Verbascum nigrum* p. 545. — sp.? Galle auf *Verbascum nigrum* p. 545. — *Lichtensteini* Mayr an *Centaurea salamantica* L. p. 559.
- papaveris*, Galle. **Molliard.** — *scabiosæ*, Galle. **Thomas.**
 Neu demnach: *pilosellæ* u. *urospermi*.
- Balna* Cam. mit *nigriceps* Cam. **Kieffer**, Bull. Soc. Entom. France, 1901 p. 159.
- Biorrhiza aptera* Bosc. Galle auf *Quercus pedunculata, pubescens, sessiliflora* u. *toza*. **Kieffer** p. 402. — Ol. auf div. *Querc. Spp.* p. 414.
- Blastophaga grossorium* L. Galle an *Ficus carica* L. **Kieffer** p. 321.
- Callirhytes Marianii* Kieff. Larve m. Galle in der Rinde des Stammes von *Quercus suber*. **Kieffer** p. 403 in Anm. — *glandium* Gir. auf div. *Quercus Spp.* p. 455.
- Chilaspis nitida* Gir. auf *Quercus*. **Kieffer** p. 444—445.
- Cecconia valerianellæ* Thoms. Galle an *Valerianella olitoria* Mach. **Kieffer** p. 544.
- Cleidotoma* siehe *Arhoptra: C. (Heptameris) inermis* **Kieffer**, Feuille jeun. Naturalist., vol. XXXI p. 162 (Europa).
- Coptereucoila rufitarsis* Ashm. ist zu *Schizosema* zu stellen. **Kieffer**, Bull. Soc. Entom. France, 1901 p. 344.
- Cothonaspis* siehe *Pentarthoptra*. — *howardi* nom. nov. für *rufipes* How. nec Hart. **Kieffer**, Feuille jeun. Naturaliste vol. XXXI p. 173. — *subaperta* nom. nov. für *melanocera* Ashm. nec Foerst. p. 176.
- Neu: *C. (Adieris) szepligetii* **Kieffer**, t. c. p. 173. — *C. brevicornis* p. 173. — *punctata* p. 173. — *grandicornis* p. 173. — *conjungens* p. 173 (sämtlich aus Europa).
- erythropum* Ashm. ist eine *Psilodora*. **Kieffer**, Bull. Soc. Entom. France, 1901, p. 344.
- Cynips Stefani* Kieff. Gallen auf divers. *Quercus Spp.* **Kieffer**, p. 410—411. — *polycera* Gir. var. *subterranea* Gir. p. 411. — *conifica* H. et var. *longispinis* Kieff., *conifica* H. auf div. *Querc.-Spp.* p. 411.
- Hartigi* Koll. p. 412. — *mediterranea* Trott. p. 412. — *truncicola* Gir. p. 412. — *tomentosa* Trott. auf *Qu. cerris* p. 415. — *tomentosa* Trott. auf *Qu. pubescens* u. *cerris* p. 420—421. — *Stefanii* Kieff. p. 421. — *polycera* var. *transversa* Kieff. p. 421.
- Kollari* auf div. *Querc. Sp.* p. 421—422. — *Koll.* var. *minor* Kieff. p. 422 (auf *Qu. lusitanica* var. *faginea*. — *lignicola* H. auf *Qu. pedunc.*, *pubesc.*

u. sessiliflora p. 422. — conglomerata Gir., mitrata Mayr., glutinosa Gir. p. 423. — tozae Bosc. (argentea H.), insana Mayr. p. 424. — caliceiformis Gir., Kollari H. et var. minor Kieff., hungarica H., tinctoria Oliv., nebst var. nostra Stef., mitrata Mayr p. 425. — tomentosa Trott., galeata Mayr, aries Mayr. — coriaria Haimh. p. 428. — cor. var. lusitanica Kieff. p. 428. — mitrata Mayr, Panteli Tav., coronaria De Stef. u. tozae Bosc. p. 429. — picta H. wahrscheinl. auf Qu. cerris v. der Sierra de Ronda nebst Anm. hierzu p. 430. — polycera Gir., pol. var. transversa Kieff., corruptrix Schlecht., amblycera Gir. p. 431. — ambigua Trott. p. 432. — Mayri Kieff. p. 457 auf div. Spp. p. 457. — Kiefferi Cabr. p. 458. — calicis Bgd, sp. n. (Galle) p. 458 (auf Qu. pedunculata. — caput medusae H. auf div. Spp. p. 458—459. — n. sp. auf Qu. sessiliflora p. 459. — sp. ? auf Qu. lusitanica var. faginea, sp. ? auf Qu. suber p. 460. — Panteli Tav. p. 460. — **Kieffer** p. 560 (an Prunus spinosa).

insana Westw. (irrhüml. Elliot) Bibliogr. hierzu. Ob wirklich der Sodomsapfel der Alten? — Litteratur u. Abb. Olivier's Voyage (1801—1807), Lambert (1837), Westwood & Elliot, Loudon (1844), Figdor (1900: Bassorahgallen: Sodomsäpfel). Beschr. eines ♀ von *Cynips insana* aus Sodomsäpfeln auf *Quercus conferta* Kit. aus der Umgegend von Cassiopea nächst Kamarina im District Preveza in Türkisch-Epirus im südlichsten Albanien. — Körper mit reichlich seidiger, weisser, kurzer Pubescenz bedeckt. Streckrand der Vordertibien mit längeren, ziemlich feinen Haaren besetzt. Fühler 15-gliedr., alle Glieder länger als dick u. nicht gerieft. — Steht *C. argentea* Hart., *C. hungarica* Hart., *C. caput-medusae* Hart. u. *C. calicis* Burgsd. nahe.
Mayr.

mediterranea Trotter, Bull. Soc. Entom. France, 1901, p. 175. Beschr. von Ei, Galle u. ♀ (Mont Olympe, bei Brussa u. zwischen Isnik u. Mekkedsche Kleinasien). — *tomentosa* p. 175—6 Beschr. von Ei, Galle u. ♀ (weit verbreitet. Ost-Europa: Bunardschik-Tepé bei Philippopolis [Ost-Rumänien]; Böjükdere in d. Türkei; Olympia, Insel Corfu gegenüber von Gasturi in Griechenland; Cattaro in Dalmatien. — Kleinasien: Umgebung von Brussa auf dem Olymp u. bei Mudania, zu Gemlek, Isnik, Mekkedsche, Sabandscha).

Diastrophus aphidivorus ist von d. *Cynip. gallicol.* zu *Trischiza* Först. (*Figitin.*) zu stellen. **Kieffer**, Bull. Soc. Entom. France, 1901, p. 49.

Mayri Reinh. Galle auf *Potentilla argentea* u. *P. canescens* Bess. **Kieffer**, p. 394.

rubi Bouché. Galle auf *Rubus* spp. **Kieffer** p. 481—482.

Diglyphosema punctata **Kieffer**, Feuille jeun. Naturaliste vol. XXXI p. 159. — *centaureae* p. 159 (beide aus Europa).

Diranchis monticola **Ashmead**, Fauna Hawaiiensis vol. I p. 302. — *rufipes* p. 302 (Hawaii'sche Inseln).

Dryocosmus (?) *Fouscombei* bei Kieff. Galle auf *Quercus suber*. **Kieffer** p. 405. — (?) *ramulorum* Fousc. p. 406. — *cerriphilus* Gir. p. 406. — **Mayri** Müllh. auf *Querc. cerris* p. 414.

- australis Mayr auf *Quercus coccifera*, *ilex u. suber*. **Kieffer** p. 436. — *nervosus* Gir. auf *Qu. cerris* p. 436. — ? (sp.) (wahrsch. agame Form v. *Mayri*) p. 445.
- Mayri* (steht *D. nervosus* Gir. sehr nahe, versch. durch 3. Fühlerglied des ♂ u. Skulptur der Quersfurche zw. Mesonotum u. Scutellum). **Müllner**, Verhdlgn. k. k. zool.-bot. Ges. Wien, 51. Bd. p. 525—526 ♀ ♂ Abb. Gallen Taf. III Fig. 1—6 (Waldrand bei Rekawinkel in Niederösterreich, auf der Zerr-Eiche).
- cabrerac* **Kieffer** in **André**, Spec. Hym. vol. VII p. 611 (Spanien). — *fonscolombei* p. 612 (S. Europa).
- Dryophanta. Gallen auf verschied. *Quercus*-Arten von *flosculi*. **Kieffer** p. 409—410. — *Taschenbergi* Schl. p. 410. — *Cecconiana* (galle brunâtre, glabre, 4 mm hoch, 2 mm breit. — Thier: von benachb. Spp. versch. durch röthl. braune, Färb. „écusson réticulé; 2e sgm. abdom. non prolongé) p. 410 (auf *Querc. pedunculata*). — ? *similis* Adl. p. 410. — *verrucosa* Schlecht. Galle auf *Qu. pedunculata*. **Kieffer** p. 435. — *Schlechtendati* (von vor. nach Schlechtendal versch. durch die dunkelgelb. Beine) p. 435 (auf *Quercus pedunculata*). — *cornifex* H. auf *Qu. pubescens u. pedunculata* p. 443. — *folii* p. 444. — *agama* H. p. 445. — *longiventris* H., *pubescentis* Mayr, *disticha* H. p. 446. — *divisa* H. p. 447.
- Ectolyta siehe Pentaplasta u. Triplasta.
- Euchalcis Duf. (*Allocera* Sich.) Bemerk. **Kieffer** (vor. Ber. p. 389 sub No. 3).
- Eucoelinae. Revision ders. **Kieffer**, Feuille jeun. Naturaliste, vol. 31 p. 158 sq.
- Eucoela siehe Hexamerocera.
- **Kieffer** schlägt folgende Nomina nova vor:
- thomsoni* für *ciliaris* Th. p. 175. — *aequalis* für *clavipes* Th. p. 175. — *areolata* für *longicornis* Ashm. p. 176. — *luteipes* für *basalis* Asm. p. 176. — *punctata* für *gracilicornis* p. 176. — *rufescens* für *atripes* Ashm. p. 176. — *quadripunctata* für *mexicana* Ashm. p. 176. — *varians* für *variabilis* p. 176. — *tenuis* für *tenuicornis* p. 176.
- Neue Species aus Europa sind: *anomala* p. 174. — *bispinosa* p. 174. — *facialis* p. 174. — *brachytricha* p. 175. — *fimbriata* p. 175. — *ventralis* p. 175. — *rufomaculata* p. 175. — *punctatissima* p. 175. — *circularis* p. 175. — *floricola* p. 175. — *subovalis* p. 175. — *fuscipennis* p. 175. — *evanescens* p. 175. — *magnicornis* p. 176. — *albocincta* p. 176. — *hungarica* p. 176. — *vicina* p. 176.
- Figites corsica* (ähnelt *scutellaris* Ross.) **Kieffer**, Bull. Soc. Entom. France, 1901 p. 49—50 (Corse). — *Reinhardi* für die von Reinhard beschr. *Figites nitens* Hart., von der sie sich unterscheidet durch Farb. u. Skulpt. des écusson.
- Glauraspidia carpentieri* **Kieffer**, Feuille jeun. Naturaliste vol. 31 p. 162 (Europa).
- Gronotoma nigricornis* **Kieffer**, t. c. p. 159 (Europa).
- Hexamerocera* subg. n. von *Eucoela* (für *E. rufiventris* u. Antillen-Sp.). **Kieffer**, t. c. p. 174—175. — *foveata* nom. nov. für *unifoveata* Ashm. p. 175.
- Hexaplasta konensis* **Ashmead**, Fauna Hawaiiensis vol. I p. 304 (Hawaii).
- Homalaspis* Gir. non Reinh. mit 1 europ. Sp.: *noricus* Gir. **Kieffer**, Bull. Soc. Entom. France 1901 p. 159.
- Hypodiranchis* n. g. *Eucoelinarum* **Ashmead**, t. c. p. 303. — *hawaiiensis* p. 303 Taf. VIII Fig. 5. — *lanaiensis* p. 304 (Hawaiische Inseln).

- Kleidotoma* (Pentacrita) *subtruncata* **Kieffer**, Bull. Soc. Entom. France, 1901 p. 344 (Hongries). — (*Heptameris striata* (steht *C. inermis* am nächsten, verschieden durch „occiput renflé et densément strié transversalement, et les ailes antérieures hyalines“) **Kieffer**, Bull. Soc. Entom. France, 1901, p. 344 (Bitche. — Parasit von *Clinodiplosis crassinervis* Kieff.).
- Kleidotona americana* Ashm. zu *Pilosema* subg. *Trirhoptrasema* (massue antennaire de 3 articles). **Kieffer**, Bull. Soc. Entom. France, 1901, p. 344.
- Lambertonia* n. g. Charakt. siehe oben. **Kieffer**, Bull. Soc. Entom. France, 1901, p. 159 ♂ (Ungarn). — Hierher ist wohl auch *ruficornis* (Thoms.) und wahrscheinlich auch *nigra* (Thoms. nec Hart.) zu stellen.
- Lytosema* n. g. **Kieffer**, Feuille jeun. Naturaliste, vol. 31 p. 158, hierher *guerini* Dahlb. u. *effluens* Voll. — Neu: *bimaculatum* p. 162 (Europa).
- Microstilba ruficornis* **Kieffer**, t. c. p. 160. — *excavata* p. 160 (beide aus Europa).
- Neralsia* Cam. mit *Cameroni* nom. nov. (*rufipes* Cam. 1883 nec Cress. 1865) von Guatemala, *rufipes* (Cress.) u. *bifoveolata* (Cress.) von Cuba. **Kieffer**, Bull. Soc. Entom. France 1901 p. 159.
- Neuroterus cerrifloralis* (*N. obtectus* Wachtl zunächst stehend, durch stark glänzende, viel weniger gerunzelte Stirn u. durch die sehr kurzen Wangen [kürzer als *Clipeus*] unterschieden. Von *N. saltans* Gir. dadurch, dass diese agam, *N. cerrifl.* aber zweigeschlechtig ist). **Müllner**, Verhandlgn. zool.-bot. Ges. Wien 51. Bd. p. 527—528 ♀ ♂ Abb. d. Gallen Taf. IV Fig. 1—6, 17—8 (Schoenbrunner Weg bei Wien, an *Quercus Cerris*).
- macropterus*. Galle auf *Q. cerris* Htg. u. *pseudosuber* Sauti. **Kieffer** p. 406. — *saltans* Gir. p. 406. — *aggregatus* Wachtl auf *Qu. cerris* p. 409. — *saltans* auf div. *Qu. Spp.* p. 433. — *obtectus* Wachtl p. 415. — sp. ? auf div. *Quercus* p. 417—418. — *albipes* Schenk auf *Qu. sessiliflora* p. 434. — *baccarum* L. p. 449. — *cerrifloralis* Mülln. p. 452—453. — *schlechtendali* Mayr p. 454. — *glandiformis* Gir. p. 455.
- Onychiinae* D. T. Revision derselben. **Kieffer** (2). Charakt. dieser Gruppe: 2. Abdominalsegment zungenförmig u. kürzer als das 3.

Uebersicht der Gatt.:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Schild am Ende gestutzt | 2. |
| Schild am Ende mit dornartig. Fortsatz | 4. |
| 2. Radialzelle am Rande ganz offen | 1. Gatt. <i>Aspicera</i> Dahlb. |
| Radialzelle am Rande ganz oder wenigstens teilweise geschlossen | 3. |
| 3. Schild an der Basis m. ein. Grube | 2. Gatt. <i>Balna</i> Cam. |
| Schild an der Basis m. 2 Gruben | 3. Gatt. <i>Neralsia</i> Cam. |
| 4. Mesonotum ohne erhabene Linien. Schild in der Mitte ohne Längskante. | |
| Radialzelle geschlossen. Hintertibien nicht gerieft. Abdominal-Petiolus glatt | 4. Gatt. <i>Homalaspis</i> Gir. |
| Mesonotum von 1—3 Längskielen durchzogen; Schild mit einem medianen Längskiel. Radialzellen am Rande wenigstens teilweise offen; Abdominal-Petiolus gefurcht oder gekielt | 5. |
| 5. Radialzellen an der Basis wenigstens teilweise offen; Hintertibien gerieft | 6. |
| Radialzelle an der Basis geschlossen; Hintertibien nicht gerieft; Schild nicht in Form einer doppelten Dachrinne ausgehöhlt | |
| | 5. Gatt. <i>Lambertonia</i> n. g. |

6. Radialzelle an der Basis ganz offen. Der Subcostalnerv am Ursprung des Radius vollständig aufhörend; Schild jederseits dachrinnenförmig ausgehöhlt und von Kielen oder Falten durchquert

7. Gatt. *Onychia* Hal.

Radialzelle an der Basis nur theilweise offen; Schild nicht zu einer doppelten Rinne ausgehöhlt, ohne Furchen u. Querkiel

6. Gatt. *Tavaresia* n. g.

Onychia Hal. Hierher die folg. europäischen Sp.: *ligurica* Gir., *Latreillei* Hart., *Fonscolombei* Dahlb. und *Dufouri* Gir., sowie die amerikanisch. Sp.: *Provancheri* Ashm. **Kieffer**, Bull. Soc. Entom. France 1901, p. 160. — Hierzu neu: *aberrans* p. 160 ♂ (Russland). — *brevifurca* p. 160 ♂♀ (Süd-Frankreich, Corsica u. Spanien). — *areolata* n. sp. (Italien). — *dufouri* Gir. *var. vitripennis* n. p. 160.

Marshalli n. sp. **Kieffer**, Bull. Soc. Entom. France 1901 p. 343. 4 ♂ (Corse). — *Fonscolombei var. minima* n. p. 344 ♂ (Espagne).

Panteliella Fedtschenkoi (Rbs.) **Kieff.** auf *Phlomis tuberosa* L. **Kieffer** p. 374. *Pediaspis sorbi* Tischb. Wurzelcecidie an *Acer pseudoplatanus*. **Kieffer** p. 238.

— *aceris* Först. (*pseudoplatani* J. Mayr?) p. 238. — Bestimm.

Phanacis centureae Först. Galle auf diversen *Centaurea*-Spp. **Kieffer** p. 288.

Pentaplasta subg. n. von *Ectolyta* (für *Pentacrita coxalis* Ashm.). **Kieffer**, Feuille jeun. Natural. vol. 31 p. 160.

Pentarthoptra subg. n. von *Cothonaspis* für *tomentosa* Gir. etc. **Kieffer**, t. c. p. 172–173.

Pilinothrix bicolor **Ashmead**, Fauna Hawaiensis vol. I p. 299 (Hawaii).

Plagiotrochus Kiefferianus Taf. Gallen auf *Quercus ilex*, *coccifera* var. *vera* D. C. u. var. *imbricata* D. C. **Kieffer** p. 405–406. — 6 verschied. Varr. auf verschied. *Quercus*-Arten, p. 439. — *amenti* Tav. und *fusifex* Mayr auf *Quercus* p. 447. — *Burnayi* Taf. auf *Qu. ilex* p. 456.

Platygasteridae p. 463 des vor. Berichts lies Fam. LVII statt LXVII.

Pristaulacus. Angehörige d. Gatt. **Ashmead**, Entom. News Philad. vol. 12 p. 278.

Psilodora boienii var. intermedia n. **Kieffer**, Feuille jeun. Naturaliste, vol. 31 p. 162. — *hyalinipennis Szépligetii* in *Zichy Ergebn.* 2. Bd. p. 137 (Sibirien).

Psilosema nom. nov. für *Cothonaspis* Thoms. nec *Hartig*. **Kieffer**, Feuille jeun. Naturaliste vol. 31 p. 160. — *P. (Erisphagia) luteipes* u. *carpentieri* p. 160 (beide aus Europa).

Rhodites. Gallen auf div. *Rosen*-Spp. **Kieffer**, *rosae* L. p. 477. — *spinosissimae* Gir., *eglanteriae* H. p. 478. — *centifoliae* H., *rosarum* Gir., *Mayri* Schlecht. p. 479. — Bemerk. zu *fructuum* Rbs. p. 479 in *Anm.* — *rosae* L., n. sp., p. 480.

Rhoptromeris insularis Ashm. zur Gatt. *Cothonaspis* subg. *Heptaplasta*, wahrscheinlich auch *Trybliographa australiensis* Ashm. hierher zu stellen. **Kieffer**, Bull. Soc. Entom. France 1901 p. 344.

Rhynchacis nitida **Kieffer**, Feuille jeun. Naturaliste vol. 31 p. 161 (Europa).

Schizosema n. g. *Eucoelinarum*. **Kieffer**, t. c. p. 158.

Solenaspis Ashm. **Ashmead** stellt sie zwischen die *Figites* u. die *Aspicera* in die Subfam. der *Figitinae*. Der Autor hat nun unglücklicherweise das so charakt. Kennzeichen die zungenförm. Bildung des 2. Abd.-Sgmts. vergessen,

nach dem Förster die 3 Gatt. *Onychia*, *Aspicera* u. *Homalaspis* die Unterfam. der *Onychiidae* begründet hat. Möglicherweise zeigt *Solenaspis* dieselben Charakt., dann würde sie synonym mit *Neralsia* Cam. sein. **Kieffer**, Bull. Soc. Entom. France 1901 p. 160—161.

- Synophrus politus* H. Galle auf *Quercus*. **Kieffer** p. 415. — *olivieri* Kieff. Galle auf *Quercus suber*. **Kieffer** p. 423. — *politus* H. auf *Qu. cerris*, *ilex* u. *suber*, p. 423.
- Timaspis phoenixopedis* Mayr. auf *Lactuca viminalis* Presl. **Kieffer** p. 348. — *lampsanae* (Karsch) auf *Lampsana communis* p. 349.
- Trigonaspis megaptera* Panz. u. *megapteropsis* Vriese. Galle auf *Quercus pedunculata*, *pubescens* u. *sessiliflora* **Kieffer** p. 409. — *megaptera* Panz. p. 413. — *brunneicornis* Tav. auf *Qu. toza* a. 433. — *renum* Gir. auf versch. *Qu.*-*Spp.* p. 440. — *Mendesi* p. 443—444. — *synaspis* H. p. 456—447.
- Triplasta* subg. n. von *Ectolyta* für die zentralamerik. Sp. **Kieffer**, Feuille jeun. Naturaliste vol. 31 p. 160.
- Trybliographa hawaiiensis* **Ashmead**, Fauna Hawaiiensis vol. I p. 300 (Hawaii).
- Xestophanes potentillae* Vill. auf *Potentilla reptans* L. u. *X. brevitarsis* Thom. auf *P. silvestris* Neck. **Kieffer** p. 395.
- Xyalaspis* Hart. Bemerk. hierzu. Typus der Gatt: *X. laevigatus* Hart. — Ferner hierher: *spiniger* (Reinh.), *subulifer* (Thoms.), *petiolatus* nom. nov. (für *subulifer* Cam. nec Thoms.), *abietinus* (Thoms.), *scoticus* (Cam.), *armatus* (Gir.) mit den Var. *fuscicornis* m. (*armatus* Reinh.). **Kieffer**, Bull. Soc. Entom. France, 1901, p. 161.
- Xyalophora* n. g. (Scutellum avec 2 fossettes et terminé en un pointe plus ou moins longue. Yeux velus. Cellule radiale fermée. Premier segment abdominal en anneau strié longitudinalement; le second non velu à sa base). — Type: *Figites clavatus* Gir. (wozu *armata* Say zu stellen ist), *impatiens* Say u. wahrscheinlich noch *picea* Spin. **Kieffer**, Bull. Soc. Entom. France, 1901, p. 344.

Superfamilia VII. Chalcidoidea

für 1900 u. 1901.

Diese Superfam. wurde im vorig. Bericht nicht aufgenommen [Stell. daselbst auf p. 469]. Der Bericht über die Gruppe behandelt hier also die Jahre 1900 u. 1901.

Autoren: **Ashmead** (1). Report upon the Aculeate Hymenoptera of St. Vincent and Grenada etc. Trans. Entom. Soc. London, 1900, P. II p. 207—367. — Im folg. kurz als **Ashmead** aufgeführt (vollständ. Titel siehe p. 291 des vor. Berichts).

— (2). Insects of New Jersey (Titel p. 343 des vor. Ber.).

Marchal, P. Notes biologiques sur les Chalcidiens et Proctotrupides etc. Ann. Soc. Entom. France, vol. 69 p. 102—112. — cf. vor. Bericht p. 311. Im Folgenden kurz als **Marchal**:

Tetrastichinae: *Tetrastichus* (8), *Aphiloglyptus* (1). — Entedoninae: *Entedon* (1), *Closteroceros* (1). — Eulophinae: *Sympiesis* (1), *Eulophus* (1). — Pteromalinae: *Meroporus* (1), *Eutelus* (1), *Amblymerus* (1), *Pteromalus* (4), *Dibrachys* (1). — Miscogasterinae: *Stictomischus* (1). — Tridyminae: *Systasis* (1), — Aphelinae: *Coccophagus* (1), *Aspidio-*

tiphagus (1), Archenomus (1), Azotus (1). — Bothriothoracinae: Phae-nodiscus (1). — Encyrtinae: Cerapterocerus (1), Ageniaspis (2), Blastothrix (1), Encyrtus (1). — Eupelminae: Eupelmus (2). — Ormyrinae: Ormyrus (1). — Toryminae: Monodontomerus (1), Diomorus (1), Torymus (8). — Eurytominae: Decatoma (1), Systole (1), Eurytoma (4), Bruchophagus (1).

Anatomie von Eupelmus mozonus. Wirth etc. **Vayssière**, Ann. Fac. Marseille T. XI p. 77—92.

Entwicklung einer Pteromalide = Aspeditotiphagus citrinus in Cocciden.

Prowazek, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 289—291, Taf. IV.

Ashmead bringt in d. Proc. U. S. Nat. Mus. vol. XXIII No. 1206 p. 200—203 noch einmal, die bereits im Bericht für 1899 (p. 480—483) wiedergegebene Uebersicht über die hierher gehör. Fam.:

Fam. LX. Agaonidae.	Fam. LXVII. Cleonymidae.
„ LXI. Torymidae.	„ LXVIII. Encyrtidae.
„ LXII. Chalcididae.	„ LXIX. Pteromalidae.
„ LXIII. Eurytomidae.	„ LXX. Elasmidae.
„ LXIV. Perilampidae.	„ LXXII. Eulophidae.
„ LXV. Eucharidae.	„ LXXII. Trichogrammidae.
„ LXVI. Miscogasteridae.	„ LXXIII. Mymaridae.

Australische Feigeninsekten. **Frogatt** (1). — cf. Bericht für 1900.

Chalcidoidea. Kurze Charakt. u. biolog. Bemerk. **Ashmead** in Smith's Ins. p. 552.

Chalcidoidea. Liste der westind. Spec. **Ashmead** p. 334—349. — 261 No.

Liste der gezog. Sp. mit Angabe der Wirthsthiere: **Marchal**.

Zucht. Chalcididae. Bestimm. des Materials von **Ashmead**.

Nachstehende Zusammenstellung umfasst sämtliche, oben genannte Familien, ausser Fam. XLVIII: Encyrtidae subf. Encyrtinae u. Signiphorinae, u. Mymaridae (Fam. LXXIII), die am Schluss dieses Kapitels besonders behandelt werden.

Alerus puncticeps **Zehntner**, Pflanzenluizen VIII p. 10 Abb. Taf. II Fig. 15—17 (Java).

Acrocormus megastigmus Ashm. Besch. d. ♀. **Ashmead**, p. 256 ♀ (Grenada, Grand Etang 1900').

Agamerion coeruleiventris **Ashmead**, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900 p. 340 ♂ (Austral.).

Amblymerus ruralis Walk. aus Gall. v. Cec. (*Dryomia*) *Lichtensteini* (Majorque château de Belver gezog.). **Marchal** p. 105.

Anastatus. 2 n. sp. v. St. Vincent: **Ashmead**. — *alboclavus* (Statur v. *albo-maculatus*) p. 261 ♀. — *aurifrons* p. 262 ♀. — Untersch.:

'Thorax piceous brown w. metall. reflections etc. head metall. a. gold.-green, abd. aeneous; white w. a large white spot at base beneath

alboclavus.

Scape, pedic., 2 last funicle joints a. club yellow.-white; wings fulig. exc. at base a. 2 oblique white spots on disk one of which reaches the marg. edge, the other the h.-marg.

alboclavus.

Thor. a. legs brown.-yellow., head gold.-green; abd.-cyan. w. a band at base a. extreme tip white, the band above w. 2 brown spots at base, wings fulig., w. the basal $\frac{1}{3}$ a. a curv. band below the apex of marg. vein white. aurifrons.

- Aphelinus *simplex* **Zehntner**, Pflanzenluzen suikerriet Java II, 1897 p. 19, Taf. I Fig. 18, 19. — *howardii* **Ashmead** p. 264 ♂ (Grenada).
- Aphytis* n. g. Aphelininarum **Howard**, Canad. Entom. vol. XXXII p. 168. — *chilensis* p. 168 (Chili).
- Aphyloglyptus asphondyliae Ashm. (n. g. et n. sp. in litt.) aus Gall. v. Asphondylia punica Marchal auf Atriplex halimus gezogen, von Kairouan, Tunisie. **Marchal** p. 104.
- Apterolelaps* n. g. **Ashmead**, Fauna Hawaiiensis vol. I p. 312. — *nigriceps* (n. sp. indescrpta) p. 312.
- Archenomus bicolor How. aus Aspidiotus ostreaeformis Curtis auf Apfelbaum. **Marchal** p. 106. — How.'s Type.
- Asemanus *cecidomyiae* **Ashmead**, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 338 — 339 ♂ ♀ (Sydney, N. S. W. — Wirth: Cecidomyia frauenfeldi [Dipt.]).
- Aspidiotiphagus citrinus Craw. aus Aspidiotus nerii gezogen. **Marchal** p. 106. — Bemerk. **Zimmermann**, Med. Plantentuin Java, XLIV, 2, p. 39.
- Aulacus apicalis Westw. aus d. Larve Piesarthrius marginellus Hope (Longic. Col. auf Acacia longifolia). **Ashmead**, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900 p. 348.
- Azotus Marchali How. aus Aspid. astreaeform. gezog. **Marchal** p. 107. — How.'s Type.
- Bassus laetatorius Fabr. auf New Zealand, North America, Europa, Chatham Islands. **Ashmead**, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900 p. 352.
- Blastophaga grossorum. Einführung in Nord-Amerika zur Caprification. **Howard**. — Blast. u. Caprification in Californien. — **Schwarz**, Proc. Entom. Soc. Washington vol. IV p. 502—507. — *piceipes* (schwarzii von S.-Florida nahest., ab. grösser, Thor., Beine Abd. dunkler, dick. Antenn. u. senkr. Rad.). **Ashmead** p. 250—251 ♀ (St.-Vincent). — *insularis* p. 251 ♀ (St. Vincent).
- Brachista *pallida* **Ashmead**, Entom. News Philad. vol. IX p. 616 (N.-America — aus Odonaten-Eiern).
- Brachyscelidiphaga* n. g. *flava* **Ashmead**, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 342 ♀ (Austral.). — Aus *Brachyscelis pileata*.
- Bruchophagus (nach Dalla Torre's Katalog bisher nur amerik. Sp.) sativae Ashm. (n. sp. in litt.), gezog. aus „graines v. Sainfoin“ (*Onobrychis sativa*). **Marchal** p. 111—112.
- Calosoter *chrysideus* **Ashmead** p. 257 ♂ (St. Vincent).
- Centrobia *odonatae* **Ashmead**, Entom. News Philad. vol. IX p. 616 (N. America).
- Chalcididae in New Jersey nach **Ashmead** in Smith's Ins. (p. 553—554) vertreten durch: Leucospis (1), Phasgonophora (1), Chalcis (2), Smiera (8).
- Chalcis spec. de **Schulthess-Schindler**, in Faune entom. du Delagoa (cf. vor. Ber. p. 400) p. 253 ♀ (Delagoa). — **Zehntner** (Titel s. Ber. f. 1898 p. 553 sub 1).
- Chromocryptus *antipodialis* **Ashmead**, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900 p. 349 ♀ (Austral.).
- Cleonymidae. Nach **Ashmead** in Smith's Ins. etc. p. 556 durch folg. Gatt. vertr.: Epistenia (1), Ptinolius (1), Chiropachys (1).

- Closterocerus* West. Hierher nach **Ashmead**, p. 263, *Entedon pulcher* How. von Grenada gehörig. — *trifasciatus* Westw. aus *Minirraupe Lithocoll. quercifolia* gezogen, von Fontenay. **Marchal** p. 104.
- Coccidencyrus flavus* **Ashmead**, *Canad. Entom.* vol. 33 p. 139 (Süd Africa).
- Coccophagus pulchellus* Westw. gezog. aus 1. *Lecanium rosarum* (Fontenay), 2. *Lec. hemisphaericum*, Pfirsich, (Cette) im VI. **Marchal** p. 106. — Sp. auf *Aspidiotus*. **Sasaki**, *Annot. Zool. Japan.* III p. 171, 172 Taf. IV Fig. 8 (Japan).
- Coelocyba* n. g. *nigrocincta* **Ashmead**, *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, 1900, p. 344 — 345 ♀ (Sydney, N. S. Wales. — Aus ein. *Agromyz.-Galle* auf *Eucalypt. corymbosa*).
- Decatoma biguttata* Swed. (Curtis) gezog. aus 1. *Cynips polycera*, auf *Querc. Mirbecki*, Algier, forêt d'Iacouren, im IV; 2. *Biorhiza terminalis* var. *Mirbecki* *ibid.* **Marchal** p. 111.
- Derostenus albipes* **Zehntner**, (De Mineerlarven van het Suikerriet op Java. IV. *Cosmopteryx pallifasciella* Snell. n. sp. Mededeel. Proefstat. Oost-Java, Series 3, No. 4, 1898, 15 pp., 1 pl.) p. 8
- Dialuomorpha* n. g. *australiensis* **Ashmead**, *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, 1900, p. 347 ♀ (Austral.).
- Dibrachys boucheanus* (Ratzb.) Thoms. gezog. aus 1. *Raup. v. Gall. melonella*. 2. *Raup. v. Sitotroga cerealella* (Alucite) im IV. **Marchal** p. 106.
- Dinoura auriventris* **Ashmead**, *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*. 1900. p. 341 ♀ ♂ (Sydney, N. S. Wales). — Auf *Gall. v. Brachyscelis pileata*. — *cyanea* p. 342 ♀ (Wellington, aus *Gall. v. Brachysc. ovicola* Schr.).
- Diomorus calcaratus* (Nees) gezog. aus *Gall. v. Cynips argentea* v. Algier (forêt d'Iacouren) im IV. **Marchal** p. 108—109. — *Gall.* waren bewohnt von *Pemphredon lugubris* u. *Omalium auratus*.
- Elasmidae. Nach **Ashmead** in *Smith's Ins.* p. 559 in New Jersey durch folg. Sp. vertr.: *Elasmus nigripes* How.
- Elasmus* sp. **Zehntner** (Titel siehe unter *Derostenus*) p. 1—4 Abb. auf Taf. Fig. 1—4 (Java).
- Encarsia* sp., Schädling des Zuckerrohrs auf Java. **Zehntner**, *Plantenluizen*, VIII p. 18 pl. II Fig. 18, 19.
- Encyrtoccephalus simplicipes* (Thorax d. v. *Decatoma* ähnl. etc.) **Ashmead**, *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales* 1900 p. 334—5 ♂ (Austral.).
- Entedon metallicus* (Nees) Walk. (= *E. epigonus* Wlk.) aus *Cecidomyia poae* gezogen. **Marchal** p. 104. — Wird von Ashm. = *Semiotellus nigripes* Lindm. gehalten. — *pulcher* How. zu *Closterocercus* gezogen. **Ashmead**, *Trans. Entom. Soc. London* 1900 p. 263.
- Eucharidae. Nach **Ashmead** in *Smith's Ins.* etc. p. 555 durch *Pseudometagea schwarzii* Ashm. vertreten.
- Euchrysis Busckii* **Ashmead** p. 256 ♀ (Porto Rico).
- Eulophidae. Nach **Ashmead** in *Smith's Ins.* p. 560 in New Jersey durch folg. Gatt. vertreten: *Omphale* (1), *Closterocerus* (1), *Holcopelte* (2), *Entedon* (1), *Asecodes* (1), *Coccophagus* (5), *Eretmocerus* (1), *Syntomosphyrum* Först., *Trichoporus* (1), *Melittobia* (1), *Tetrastichus* (3 darunter 1 n. inominat.), *Euplectrus* (4), *Elachistus* (1), *Miotropis* (1), *Sympiesis* (1), *Cratotrechus* (1).

Eulophus albitarsus zahlr. aus Gall. v. *Plagiotrochus cocciferae* (Cynip.) auf *Quercus coccifera*, gezog. im IV., von Sidi-Ferruch (Algérie). **Marchal** p. 105; auch aus Cecyd.-Larv. „sous des galles de *Neuroterus lenticularis*, à Fontenay⁴, in VII, gezogen. Ob auf Kost. d. Cynip. leb. vermag Verf. nicht mehr zu entscheiden.

Neu: *albitarsis* **Ashmead**, Entom. News Philad. vol. XI p. 623 (Europa und Nord-Amerika). — *citripes* **Ashmead**, Fauna Hawaiiensis vol. I p. 332 (Hawaii).

Eupelminae. Untersch. d. Gatt. in Proc. Entom. Soc. Washington IV 1886 p. 4—20.

Eupelminus subapterus **Ashmead**, Fauna Hawaiiensis vol. I p. 315 (Oahu).

Eupelmus. Abb. einer Eupelmide. Insekt., Eier u. s. w. **Ashmead**, in Smith's Ins. p. 557 Fig. 266. — *ceris* Först. (aus Gallen v. *Cynips polycera*, auf *Quercus Mirbeckii*, Algier, forêt d'Iacouren im IV. gezogen. **Marchal** p. 108. — *spongipartus* Först. gezog. aus 1) Gallen von *Biorhiza terminalis* var. *mirbecki*, Algérie: forêt d'Iacouren und 2) Gallen von *Plagiotrochus fusifex* auf *Quercus suber*, *ibid.*, in IV, p. 108.

Ashmead beschreibt in Fauna Hawaiiensis vol. I folg. n. sp. von d. Hawaii-schen Inseln: *niger* p. 316. — *konae* p. 317. — *splendidissimus* p. 317. — *vulgaris* p. 318. — *molokaiensis* p. 318. — *xanthopus* p. 319. — *hawaiiensis* p. 319. — Ferner *antipoda* **Ashmead**, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900 p. 342 ♀ (Sydney, N. S. Wales. — Aus Eiern einer Mantis). — *Xambeui* **Giard**, Bull. Soc. Entom. France 1900 p. 81—2 ♀ (Umgeg. v. Ria, Pyrénées-Orientales). — Parasit d. Larve v. *Gynandrophthalma nigratarsis* Lac. — *annulatus* Nees, Paras. v. *Cryptocephalus 12-punctatus*, ist im ♀-Geschlecht geflügelt.

— Untersch. d. 6 westind. Sp. **Ashmead** p. 258—9.

Wings hyaline.

2.

Wings marked w. fuscous or banded.

Cupreous, upp. part of head sometimes bluish; w. fusc., pale at base, w. 2 ov., oblique, white spots on disk just behind the stigm.-v.; basal $\frac{2}{3}$ of ovipos. yellow; legs pale yellow, cox. a. femor metall. or embrowned.

albomaculatus.

Head a. thor. blue, but above aeneous-black to green; h.-marg. of mesopleur., metapl. a. abd. cupr.; legs exc. cox., pale ferrug., the h.-fem. tow. tips bronzed, the tip of h.-tib. a. their tars., exc. bas. joint, fusc. ♀

reticulatus.

Bronz. green; pron. blue; legs exc. h.-cox., pale brown.-yell.; ovipos. w. a broad yell. band at the middle ♀.

cyaneicollis.

Dark. cupr., head behind a. mesopl. blue-black; abd. piceous, the dors. blackish, paler at base, at apex a. along the venter; legs exc. h.-cox. at base, a. the scape of the antenn. wholly pale brown.-yellow

pallidipes.

Head, coll. a. abd. cupr.; thor. aen.-black, the mesopleur. blue-black; legs brown.-yellow, the fem. exc. tips, black or fusc., ant. a. middle tib. narrowly annulated w. fuscous

cupreicollis.

Aen.-black or submetall., the templ. a. mesopl. w. a bluish tinge, legs yellow.-white, the fem. a. tib. w. a brown. spot; antenn. black, scap.

- aeneus; abd. elong., pointed at apex, much long. than the head a. thor. united, ovipos. subexs. ♀ sulcatus.
albomaculatus p. 259 ♀ (St. Vinc.). — *cyaneicollis* p. 259—260 ♀ (St. Vinc.).
 — *pallidipes* p. 260 (St. Vinc.). — *eupreicollis* p. 260 (St. Vinc.). —
sulcatus p. 260 (St. Vinc.). — *reticulatus* How. Bestimm. p. 258.
- Enplectrus australiensis* **Ashmead**, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900 p. 347 ♀ (Austral.).
- Euryischia lestophoni* Riley & How. aus *Icerya rosae* (auf *Grevillea* sp.) gezogen. **Ashmead**, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900 p. 346.
- Eurytomidae in New Jersey nach **Ashmead** in Smith's Ins. p. 554 sq. vertreten durch *Decatoma* (2 Sp.), *Eudecatoma* (2), *Eurytoma* (8), *Euoxysoma* (1), *Isosoma* (2).
- Eurytoma kabyliensis* Ashm. (n. sp. in litt.) aus Gall. v. *Cynips polycera* (Algier: forêt d'Jacouren) in IV. **Marchal** p. 111. — *nodularis* Boh. aus Gall. von *Urophora cardui* St. Leu (S.-et-O.) Ende VI p. 111. — *rosae* Nees aus Gall. v. *Biorhiza terminalis* var. *Mirbecki*, Algérie, forêt d'Jacouren, in IV p. 111. — *rufipes* Walk. aus Gall. v. *Xestophanes potentillae*, Chaville (Seine), im VI. p. 111. — *australiensis* (schwarz u. im Bau ähnl. *studiosa* Say). **Ashmead**, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 335—336 ♀ (Austral.). — *eucalypti* p. 335—336 ♀ ♂ (Uralla, N. S. Wales. — Aus *Eucalypt*-Gall.) — *vinotata* p. 337 ♀ (Sydney, N. S. W. — aus Gallen v. „turpentine tree“). — *Howardi* Dalla Torre (E. mayri How.) v. Grenada. **Ashmead** p. 255.
- Eutelus amoenus* Walk. aus Gall. v. *Hormomyia capreae* v. Fontenay gezogen. Nach Möller auch Parasit v. *Spathogaster baccarum*. **Marchal** p. 105.
- Halticella* Spin. (subg. *Stomatocerus* Kirby) *Mimosae* (liberator Wlk. v. Port Natal nabe). Vielleicht nur eine Var. ders. m. roth. Antennen, Knieen und Abd.-Spitze. — *Magrettii* Kirby, v. Nord-Ost-Afr., ähnelt ihr in Färbung **de Schulthess-Schindler**, Faune entom. du Delagoa (cf. vor. Ber. p. 400) p. 251—252 ♀ ♂ Abb. d. Fühl. Fig. 1 (Delagoa, aus Puppen v. *Tropaea Mimosae*). — *spec. n.* p. 252 ♀ (Howick Pinetown, Natal). — *bicolor* **Ashmead**, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 333—334 ♀ (Austral.). — sp. **Zehntner**, Pflanzenluizen, X, p. 28 pl. II Fig. 24, 25 (Java).
- Hemiptarsenus hawaiiensis* **Ashmead**, Fauna Hawaiianensis I p. 330 (Kona).
- Herbertia lucens* How. v. Grenada. **Ashmead** p. 255.
- Hyperteles polynemae* **Ashmead**, Entom. News Philad. vol. XI p. 615 (Illinois, aus Odonaten-Eiern).
- Idarnes* (= *Tetragonaspis* Mayr. Walk.'s Beschr. d. Antenn. falsch) — *carnea* Wlk. v. St. Vincent. **Ashmead**, p. 252. — Von Schwarz aus Feigeninsekt. aus S. Florida gezog.
- Idarnis australis* **Froggatt**, Agric. Gaz. New South Wales vol. XI p. 452, pl., Fig. 10 (Sydney).
- Idoleupelmus annulicornis* Ashm. v. St. Vincent. **Ashmead** p. 258.
- Ischnopsis ophthalmica* Ashm. v. St. Vincent. **Ashmead** p. 258.
- Isocratus vulgaris* Walk. nach Hamburg eingeschleppt. **Kraepelin** p. 194.
- Isosoma*. Abbild. ein. ♀ *Isosoma* Eier legend. **Ashmead** in Smith's Insects Fig. 264. — *tritici* Riley p. 265. (Insekt in toto, Larve, Vflgl. — ? Galle an *Agrostis canina* L.) **Kieffer**, p. 247. — *airae* Schl. Galle an *Aira caespitosa*

L. p. 248. — *hyalipenne* Walk. auf *Ammophila arenaria* Lk. p. 252. — *brachypodii* Schl. auf *Brachypodium* T. B. p. 273. — *calamagrostidis* Schl. auf *Calamagrostis epigeios* Rth. p. 277. — sp.? Galle an *Diplacne serotina* Lk. p. 306. — *Brischkei* Schlecht. Galle an *Elymus arenarius* L. p. 309. — sp.? auf *Festuca duriuscula* L., *Giraudi* Schlecht., auf *F. gigantea* Vill., *Hieronymi* Schl. auf *F. glauca* Schrad. u. *depressum* Walk. auf *F. ovina* L. p. 320. — *poae* Schlecht. auf *Poa nemoralis* L. p. 384. — *orchidearum*. De *Cattleya*-Wesp. Tijdschr. ov. Plantenziekten, 2. Jaarg. 1896 4. Afl. p. 103—106. — Nach P. Sorauer, Zeitschr. f. Pflanzenkrankh. 6. Bd. — Neu: *ovatá Szépligeti* in Zichy's Ergebn. 2. Bd. p. 156 (Kazan). — Bestimm. der Gallen folg. auf *Stipa* lebend. Sp.: *aciculatum* Schlecht. auf *St. capillata*, *Scheppigi* Schlecht. auf *St. pennata* p. 521. — *cylindrica* Schlecht. auf *St. capill.* — sp. auf *St. tortilis* p. 521. — *graminicola* Gir. auf *Triticum repens* L. p. 536. — *agropyri* Schlecht. auf *Tr. repens* p. 537. — sp.? auf *Tr. repens* p. 537.

Kapala furcata Fabr. von Grenada. **Ashmead** p. 255.

Lelaps pulchricornis Halid. u. *fulvescens* Ashm. v. Grenada Balth. **Ashmead** p. 256.

Leucospis insularis Kirby, Bull. Liverpool Mus. vol. III p. 13 (Sokotra). — *Schlettereri* (zur *biguetina* Jur.-Gruppe gehör. [ähnl. Gestalt des Abd.] untersch. d. Länge d. Oviscap., der nicht b. zur Mitte des 3. Abd.-Sgmts. reicht, ferner durch Bewaffn. d. Hschenk. Diese sowie d. Färbung hat sie mit der ebenfalls südafr. *frenata* Klug gemeinsam) **de Schulthess-Schindler**, Fauna entom. du Delagoa (cf. vor. Ber. p. 400) p. 250—251 ♀ (Delagoa). — *Kriegeri* (von der verw. völlig schwarz. L. *funerea* Schlett. von Amboina versch., abgesehen v. der gelb. Zeichnung, durch die viel längere Legeröhre u. einige Skulpturunterschiede. Die 3 Querkiele des Pronotums hat die Sp. gemeinsam mit *L. procera* Schlett. u. *malaica* Schlett.). **Enderlein**, Archiv f. Naturgesch. 67. Jhg. 1. Bd. 3. Hft. p. 215 ♀ Profil des Hinterschenkels Fig. 7 (Südspitze von Neu Guinea, Milne Bay). — *mysolica* Kirby. Beschr. p. 216—217 ♀ Hinterschenkel Fig. 8 (Fundort wie vorige). — *macrodon* Schlett. ♂ Neu-Britannien: Kakatra-Dorf. — *similis* (steht L. *amauroptera* Schlett. v. Celebes sehr nahe. Beide weichen durch den polirt glatten Wulst des Mittelsgmts. von allen übrigen L.-Sp. ab) p. 217—219 ♂ (Südspitze von Neu-Guinea, Milne-Bay). — *nyassica* (Legestachel kürzer als bei den verw. L. *brevicauda* Fabr. u. *micrura* Schlett. — Sehr schlanker Habitus, ähnelt durch Körperform, Zeichn. u. Färbung einer kleinen Pompilide) p. 220 ♀ (Deutsch-Ost-Afrika, Nyassa-See, Langenburg).

Litus maculipennis (*Litus* ♂ bish. nicht beschr., also ?; ob wirkl. hierher gehör. Zahl d. Antenn.-Gl. wie bei *Gonatoceros* Nees; ab. hier Randad. kurz, bei der n. sp. lang) **Ashmead** p. 265 ♂ (St. Vincent). — Einz. bish. bek. Sp. d. Gatt. v. W. Ind., wohl mehrere vorh., ab. weg. Kleinh. nicht beachtet.

Megastigmus iamenus Wlk., gezog. aus Gallen v. *Brachyscelis pileata* u. ein. kugl. Galle v. *Eucalyptus*, letzt. beträchtl. grösser als d. Walk.'sch. Stücke. **Ashmead**, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 332. — *asteri* p. 332—333 ♀ ♂ (aus ein. Dipt.-Galle v. *Aster ramulosus*). — *brachyscelidis* p. 333 ♀ ♂ (Sydney, N. S. Wales. — Wirth: Rhynch.: *Brachyscelis crispa* Olliff.)

- Meroporus brevicornis* (Ratz.) Ashm (= *Habritys brevicornis* (Ratz.) Thoms aus Larv. v. *Anobium paniceum*) **Marchal** p. 105.
- Mesolaelaps* n. g. **Ashmead**, Fauna Hawaiiensis vol. I p. 313. — *cyaneiventris* p. 313 Taf. VIII Fig. 8 (Hawaii).
- Metagea Kirbyi* **Ashmead**, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 337—338 ♀ (Austral., Gosford). — *rufiventris* p. 338 (Austral.).
- Metapelma cubensis* **Ashmead** p. 257 ♀ (Cuba).
- Micromelus pyrrhogaster* bei Ipswich. **Morley** (sub 3 des vor. Berichts) p. 42.
- Microterys molokaiensis* **Ashmead**, Fauna Hawaiiensis vol. I p. 322 (Hawaii'sche Inseln).
- Miscogasteridae. Nach **Ashmead** in Smith's Ins. etc. p. 556 in New Jersey durch folg. Gatt. vertreten: *Eunotus* (1), *Tridymus* (1) u. *Habritus* (1).
- Monodontomerus aereus* Walk., gezog. aus Kokon ein. Tachine, die in *Bombyx neustria* parasitirt (Fontenay). — Bereits aus versch. Lep. bek., interess., ob nur als secund. Parasit. **Marchal** p. 103.
- Necremnus maculatipennis* **Ashmead**, Fauna Hawaiiensis vol. I p. 331 (Maui).
- Neolelaps* n. g. **Ashmead**, Fauna Hawaiiensis vol. I p. 312. — *hawaiiensis* p. 313 Abb. Taf. VIII fig. 7. — *flavipes* p. 313 (beide von Kauai).
- Ophelinus maviensis* **Ashmead**, Fauna Hawaiiensis v. I p. 329. — *hawaiiensis* p. 330 (beide von den Hawaii'schen Inseln).
- Ophelosia crawfordi* Riley, gezog. aus *Icerya purchasi*. **Ashmead**, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 345.
- Ormyrus cosmozonus* Först., gezog. aus Gall. v. *Cynips polycera* (Algér.; forêt d'Jacouren), in IV. **Marchal** p. 108.
- Pachyneuron laticeps* **Ashmead** p. 263 ♀ (Grenada — Mirabeau, Estate).
- Paracentrobia punctata* How. v. Grenada. **Ashmead** p. 264.
- Pediobius* Wlk. (= *Ganahlia* D.-T.) **Ashmead** p. 263. — Hierher gehörig *Sympiesis grenadensis* How. u. *S. politus* How., v. Grenada.
- Perilampidae*. Nach **Ashmead** in Smith's Ins. etc. p. 555 durch 4 sp. der Gatt. *Perilampus* vertreten.
- Phaenodiscus aeneus* (Dalm.) Thoms aus *Lecan. hemisph.* auf Pflrsich, in VI gezogen. **Marchal** p. 107.
- Physcus flavidus* 1898. **Zehntner**, Pflanzenluzen suikerriet vol. V 1898 p. 5 pl. Fig. 11 (Java).
- Physothorax*. Aus d. Zucht von paras. Hym. aus wild. Feigen in Florida u. a. Orten ergibt sich, dass Dr. Mayr die ♀ dieser Gatt. mit *Dimorus* Walk. verwechs. hat. Die Sp., die zu d. echt. *Dimorus* Wlk. gehör., sind Paras. in d. Nest. der Apid. u. generell ganz versch. von ähnlichen Ins., die in Gesellsch. m. Feig.-Ins. leb. **Ashmead** p. 254. — *pallidus* p. 254 (St. Vinc., W. I. u. Coconut Grove, S. Florida. — Aus Fic. pedunc.).
- Pleistodontes imperialis*. **Froggatt**, Agric. Gaz. New S. Wales vol. XI, pl., Fig. 2—9 ♂♂.
- Pleurotropis thoracica* **Zehntner** (Titel siehe oben unter *Derostenus*) p. 11, pl., Fig. 14—18.
- Polynema* Hal. (= *Cosmocoma* Först.) *howardii* u. *oecanthi*, beide nach Ashm. in New Jersey, erstere fragl. **Ashmead** in Smith's Ins. etc. p. 562.
- hawaiiensis* **Ashmead**, Fauna Hawaiiensis vol. I p. 332 (Molokai).

- magniceps* Ashmead p. 265–266 ♂ (St. Vincent). — *grenadensis* p. 266 ♀ (Grenada — Mirabeau Est., Windw. side). — *albicoxa* (Färb. d. Ant. u. Beine, kürz. Ovipositor trenn. d. Sp. leicht v. *grenad.*). — Bis jetzt die einz. 3 bek. Sp. v. W.-Ind., wohl zahlr., ab. weg. Kleinheit wenig beachtet.
- needhami* Ashmead, Entom. News Philad. vol. XI p. 617 (N. Amerika. — Aus Eiern von Odonaten).
- Probolus cinctus* Ashm., *basilaris* Ashm., *apicalis* Ashm. von Koebele auf New Zealand gesammelt. Ursprüngl. v. Wisconsin und zu (?) *Eristicus* gestellt. — Gehören aber nicht in d. amerikan. Fauna. Ashmead, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900 p. 348.
- Prospalta tristis* 1896. Zehntner, Pflanzenluizen suikerriet Java I p. 11, pl., Fig. 17—21 (Java).
- Pteromalidae. Nach Ashmead in Smith's Ins. p. 558—9 in New Jersey d. folg. Gatt. vertr.: *Micromelus* (1), *Homoporus* (1), *Rhaphitelus* (1), *Eutelus* (1), *Meraporus* (1), *Pteromalus* (4), *Hypopteromalus* (1), *Catolaccus* (1), *Diglochis* (1), *Dibrachys* (1), *Coelopisthus* (1), *Carotomus* (1), *Metapon* (1), *Pachyneuron* (2), *Isocratus* (1), *Spalangia* (3).
- Pteromalus*. Zucht von *gallicus* Ratzb. aus Gallen von *Biorhiza terminalis* var. *mirbecki* (Algérie, forêt d'Iacouren) im IV. Marchal p. 105. — *leguminum* Ratzb. aus Kaps. v. *Linaria vulgaris*, deform. v. *Mecinus antirrhini* (Verrières) im IX. Nach Ratz. auch *Bruchus spartii* als Wirtstier, p. 105. — *planiusculus* Först. aus Gallen v. *Xestophanes potentillae* v. Chaville im VI u. VII p. 106. — *ariomedes* Walk. aus Gallen von *Trypeta proboscidea* an Wurz. v. *Chrysanthemum leucanthemum* (v. Saint-Leu (S.- et O.) im VI. p. 106. — *puparum* L. gezog. aus *Pap. erectheus*. Ashmead, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900 p. 345. — Neu: *fuscitarsis* Ashmead, Fauna Hawaiiensis vol. I p. 323 (Lanai).
- Pteropteryx maskellii* Ashmead, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900 p. 346 ♂ ♀ (Wellington, New Zealand. — Wirt: Rhynch. Psyll. auf Eucalyptus).
- Spalangia lanaiensis* Ashmead, Fauna Hawaiiensis vol. I p. 325 (Hawaii'sche Inseln).
- Spilochalcis fulvescens* Walk. v. Grenada. Ashmead p. 255.
- Stictomischus phytomyzae* Ashm. (n. sp. in litt.), gezog. aus Raup. von *Phytomyza Xylostei*, minierend in d. Blätt. v. *Lonicera xylostea* (Fontenay-aux-Roses). Marchal p. 106.
- haleakalae* Ashmead, Fauna Hawaiiensis vol. I p. 311 (Maui).
- Stilbula Kunthii*, eine neue jav. Eucharide (Chalcidide). Alfken, Entom. Nachr. (Karsch) 26. Jhg. p. 191—2. (Buitenzorg, auf Java in d. Blüten von *Alamanda Hendersonii* Bull.).
- Sycophila bicolor* Ashmead, p. 252 ♂ ♀ (St. Vincent, W.-Ind. u. Cocoanut Grove, S-Florida. — Von Schwarz aus *Ficus pedunculata* gezog.). — *incerta* p. 253 ♀ ♂ (Fundorte wie vorher, ebenf. aus *Fic. ped.* gezogen).
- Sympiesis canaliculatus* Först. (= *Enthedon methion* Wlk.) aus Raupen von *Gracilaria juglandella*, VII gezog. nach Ratz., auch *Lophyrus similis* als Wirt. Marchal p. 105.
- konae* Ashmead, Fauna Hawaiiensis vol. I p. 331 (Hawaii).

- Syntomaspis* sp. aus Nordamerika nach Hamburg an frischen Aepfeln eingeschleppt. **Kraepelin**. — *punctifrons* Ashm. v. Grenada. **Ashmead** p. 253.
- Systasis encyrtoides* Walk. gezogen aus 1) v. *Cecid. lychnidis* - Larven deform. Blüten v. *Lychnis dioica* (Fontenay) im Sommer; 2) Gall. v. *Dasyneura ericae scopariae* v. Ain-Draham (Tunisie) im IV. **Marchal** p. 106.
- — Biologie der Larve. **Ghigi**, Bull. Soc. Entom. Ital. vol. XXXIII p. 192—196.
- Systole geniculata* Först. aus Aniskörnern v. Cordes, bildet wohl eine Ausnahme ähnlich wie *Isosoma* und nährt sich direkt von Vegetab. **Marchal** p. 111.
- koebeleri* **Ashmead**, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900 p. 335 ♀ (Austral.).
- Systolomorpha* n. g. **Ashmead**, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900 p. 339. — *thyridopterygis* p. 339—340 ♀ (Adelaide, S.-Austral. — Wirt: *Thyridopteryx* sp. (Lep.) auf *Eucalyptus* sp. gezogen).
- Tanaostigmodes mayri* **Ashmead** p. 262 ♂ (Grenada — Mount Gay Estate).
- Terobiella* n. g. *flavifrons* **Ashmead**, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 343 ♀ (Sydney. — Aus ein. Klump. Galle auf ein. Eucalypt.-Zweig).
- Tetrapus antillarum* (americanus) Mayr am nächst., ab. ist schlank., and. gefärbt, Zahn. in d. Mandibularnh. wenig zahlreich). **Ashmead** p. 251 ♀ (St. Vincent).
- Tetrastichodes frogatti* **Ashmead**, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 346 ♀ ♂ (Hornsby, near Sydney, N. S. W. — aus a small shot gall on *Eucalyptus*).
- Tetrastrichus brevicornis* (Panz.) Thoms., gezogen aus Gallen v. *Cecidomyia* (*Perrisia*) *oenophila* [v. Fontenay — aux Roses u. Corbeil] im VIII. Biol. Notiz. **Marchal** p. 102—103. — *crinicornis* Perris aus Gall. v. *Cecidomyia persicariae* [Font. — aux Roses] im V. u. VI., ferner aus *ulmariae* u. *urticae* p. 103. — *inconspicuus* Nees aus *Cecid. persicariae*, — *micantulus* Thoms. aus *Cec. taxi* aus *Taxus baccata* im V. p. 104. — *minus* (Ratz.) D. T. aus *Cecid. nervorum* auf *Salix capreae* im VI, bereits v. *C. salicina* bek. p. 104. — *strobilanae* Ratz. aus Gall. v. *Cec. lychnidis*, bereits v. *strobilana* bek. p. 104. — *algeriae* Ashm. (n. sp. in litt.), aus Gall. v. *Cec. ericae scopariae* auf *Erica scoparia*, Algérie, à Sidi-Ferruch im IV. p. 104. — *flavus* **Ashmead** p. 264 ♀ (Grenada — Balth., Windw. side). — *prospaltae* **Ashmead**, *Canad. Entomologist*, vol. XXXIII p. 139 (S.-Africa). — sp. **Zehntner**, *Plantenluizen*, vol. X, p. 26 pl. II fig. 26, 27 (Java). — *polynemae* **Ashmead**, *Entom. News Philad.* vol. XI p. 616 (N.-America. — Aus Eiern von Odonaten).
- Thaumasura terebrator* Westw., selten in S. Austral. **Ashmead**, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 341. — *rubrofemorals* p. 341 ♀ (Sydney, N. S. W.).
- Tomocera californica* How. (= *Moranila testaceiceps* Cam.) **Ashmead**, Proc. Linn. Soc. N. S. W., 1900, p. 345. Parasit v. *Lecanium oleae* (Hawaiische Inseln, Californ., Austral.).
- Torymidae in New Jersey nach **Ashmead** in Smith's Ins. p. 552 vertreten durch: *Syntomaspis* (2 Sp.), *Torymus* (7), *Monodontomerus* (1), *Diomorus* (1: *zabriskii* Cress.), *Megastigmus* (1) u. *Ormyrus* (4).
- Torymina. Revision der britischen Formen. **Cameron**, *The Entomologist*, vol. XXXIV p. 269—276.

- Torymus urticae* Perris, gezog., zahlr. aus Gall. v. Cecidom. (*Perrisia*) *oenophila* v. Fontenay im VII. gesammelt, im VIII. ausgeschlüpft. Entw. u. Biologie. **Marchal** p. 109. — *abbreviatus* Boh. gezog. aus 1. Gall. v. *Cec. persicariae* auf *Polygonum amphibium*, 2. Larve v. *Cec.* (*Perrisia*) *piri*, rollt d. Blätter des Birnbaums; Paris, im VI. p. 110. — *erucarum* (Schrank.) Mayr aus Gall. v. *Andricus radices*, Fontenay, V. p. 110. — *flavipes* (Walk.) Mayr aus *Cecid. urticae* u. *oenophila*, Fontenay, im VI. p. 110. — *lasiopterae* (Giraud) Mayr aus *Cecid. inclusa*, auf *Phragmites communis*, gesamm. in X. 1897, ausgek. in V. u. VI. 1898. — *lini* Mayr aus Gall. v. *Cecid. persic. u. urticae*, Fontenay im VI. p. 110. — *Marchali* Ashm. (nom. nov. i. l.) aus *Cecid. ulmariae*, Fontenay, Bemerk. zu Ei u. Larve, p. 110. — *viatus* Boh. aus Gall. v. *Biorhiza terminalis* var. *Mirbecki*, gezog. (Algérie, forêt d'Iacouren) gezog., im IV. p. 110. — *eucalypti* **Ashmead**, Proc. Linn. Soc. N. S. W., 1900, p. 331—332 ♂ ♀ (aus a soft redgall on *Eucalyptus*. — Sydney, N. S. W.) — *vallisnerii* **Cameron**, The Entomologist, vol. XXXIV p. 273 (Scotland).
- Toxeuma*. **Ashmead** beschreibt in Fauna Hawaiiensis vol. I folg. n. sp. von d. Hawaiischen Inseln: *hawaiiensis* p. 308. — *ferugineipes* p. 309. — *affinis* p. 309. — *tarsata* p. 309 Abb. Taf. VIII fig. 6. — *nubilipennis* p. 310. — *nigrocyanea* p. 311.
- Trichogrammidae. Nach **Ashmead** in Smith's Ins. etc. p. 562 in New Jersey durch die beiden Sp.: *Trichogramma odontotae* How. u. *pretiosa* Riley vertr.

Encyrtidae (Fam. XLVIII).

Hauptsächl. Parasiten d. Coccid., Aleyrod., Aphid. u. Psylliden.

- Encyrtidae*. Nach **Ashmead**, Proc. Un. States Nat. Mus. vol. XXII p. 325 (1900) hinreichend charakt. durch „large, non-impressed mesopleurae, the large triang. mesepistern., which does not extend to the front coxae, a the large saltatorial spur of the middle tib., which is most frequently long a. stout, or dilated at base, a. usually armed w. a double row of black teeth or stiff bristles.“
- Einleitende Bemerk. p. 323—326.

Uebersicht über die Subfam.:

- Meson.* not entire, most freq. depressed or concave on disk, rarely convex, the parapsidal furrows distinct, or at least more or less pres.; marg. vein usually long
Subf. I. *Eupelminae*.
- Meson.* entire, convex or subconv., the paraps. furrows always entirely wanting.
- Marg. vein* rarely very long. oft. punctif., a. always very much shorter than the subcost. v.; *stigm.* v. usually short but distinct, rarely very long, *scutell. norm.*, the axillae never closely united to form a transv. linear sclerite at base of *scutell.*; middle tib. without later. spurs
Subf. II.: *Encyrtinae*.
- Marg. vein* long, as l. or nearly as long as the subc. v.; *scutell. abnorm.*, the axillae closely united without suture between, forming a transv. lin. sclerite at base of *scutell. proper*; middl. tib. with later. spurs, the later. apic. spur lobed
Subfam. III.: *Signiphorinae*.
- Encyrtidae*. Nach **Ashmead** in Smith's Ins. p. 556 in New Jersey durch folg. Gatt. vertr.: *Arachnophaga* (1), *Anastatus* (1), *Metapelma* (1), *Eupelmus* (2), *Meromyzobia* (1), *Comys* (2), *Copidosoma* (3), *Bothriothorax* (2), *Homalotylus* (1), *Aphycus* (1), *Chiloneurus* (1), *Encyrtus* (2), *Metallon* Walk. (= *Rhopus* Först.) (1 sp.).

Subfam. I. Eupelminae.

(Diese wurden schon im vorigen Kapitel aufgeführt).

Subfam. II. Encyrtinae.

Nach Ashmead's Fass. identisch m. Först.'s Fam. Encyrtoidae. Ashmead, l. c. p. 324—226. Bibliogr. d. Gatt. (1809—1889. Typen etc.).

Uebersicht über die Tribus:

- Mandibles edentata, acute at apex** 4.
 Mand. 2-or 3-dent., or broadly truncate at apex, never acute; tars. always 5-joint.
 2. Mand. stout, 3-dent. at apex, although the teeth are sometimes very minute, the labr. usually conspicuous. 3.

Mand. stout or only moderately so rather long a. always bident. at apex, the labr. free; abd. in ♀ w. the hypopyg. large, lanceol. or plowshare shaped, inclosing the ovip. a. extend. beyond the anus; 2d abd. sgm. most freq. large; antenn. usually insert. just above the clyp., rarely just below the middle of the face

Tribe I. Ectromini.

Mand. stout, but short a. polish., the apex broadly trunc., unarmed or nearly so; labr. conspicuous; abd. w. the hypopyg. less evidently prom., not projecting; body usally stout, not metallic; antenn. insert. below the middle of the face; h.-tib. w. 2 spurs

Tribe II. Encyrtini.

3. Hypopyg. not promin.; h.-tib. w. only 1 spur; body most freq., but not always metallic; antenn. variable Tribe III. Mirini.
 4. Tarsi 4-or 5-joint.; marg. vein punctif. or subobsolete

Tribe IV. Arrhenophagini.

Tribe I. Ectromini.

Uebersicht über die folg. 22 Gatt. Ashmead ♀: p. 327—330. — ♂: 330—332.

- | | |
|--|--|
| 10. Anagyrus How. p. 329, 330. | 3. Meromyzobia Ashm. n. g. p. 328, 329, 330. |
| 11. Anusia Först. p. 329, 330. | |
| 13. Baeocharis Mayr p. 329, 331. | 21. Pentacnemus How. p. 330, 332. |
| 1. Calocerinus How. p. 327, 330. | 14. Stenoterys Thoms. p. 329, 331, |
| 4. Chrysopophagus Ashm. p. 328, 334. | 19. Tetraccladia How. p. 330, 332, 333. |
| 8. Dinocarsis Först. p. 328, 329; ♂ = | 15. Tetracnemoidea Howard p. 329, 331. |
| Euscapus Dahlb. p. 330. | |
| 9. Ectroma Westw. p. 328, 330. = | 20. Tetracnemopsis n. g. Ashm. p. 330, 332. |
| Sphenolepis Nees. | |
| 6. Erycndus Wlk. p. 328, 329 u. 330, 331. | 16. Tetracnemus West. p. 329, 332. |
| 17. Habrolepoidea How. p. 329, 332. | 2. Tetralophidea n. g. Ashm. p. 327, 330. |
| 22. Habrolepopteryx n. g. Ashm. p. 330, 332. | 18. Tetralophiellus n. g. Ashm. p. 330, 332. |
| 12. Henicopygus n. g. Ashm. | |
| 7. Leptomastix Först. p. 328, 330. | 5. Tineophoctonus n. g. Ashm p. 328. |

- Anagyrus* How. Hierher sind **Ashmead**, Trans. Entom. Soc. London, 1900, p. 262 zwei als *Cerchysius* beschr. Sp.: *pulchricornis* u. *terebrator* zu stell., beide ähnl. echt. *Cerch.*, ab. bei dies. sind Mand. 3-zähnl., bei *Anag.* 2-zähnl. — Howard **Ashmead** p. 354: *Greenii* How. Wirthsthier p. 354. — *pallidipes* p. 354 ♂ (District of Columbia). *pulcher* Ashm. p. 354. — *pulchricornis* How. u. *terebratus* How. p. 355.
- Anusia* Först. **Ashmead** p. 355. — *fulvescens* Westw., *Heydenii* Mayr p. 355. — *neomexicana* p. 355 ♀ (New Mexico, Las Cruces).
- Baeocharis* Mayr **Ashmead** p. 356. — *pascuorum* Mayr p. 356. — *marlatti* Ashm. ist eine *Aphelinine* u. gehört nicht hierher.
- Calocerinus floridanus* Ashm. (Florida). **Ashmead** p. 348.
- Chrysopophagus* Ash. **Ashmead** p. 350. — *Banksi* How. p. 350 (New Mexico). — *compressicornis* Ashm. p. 351 (Mississippi, Utica — Parasit in Neuropt.: *Chrysopa attenuata* Walker).
- Dinocarsis* Först. (Type: *Encyrtus hemipterus* Dahlb.) **Ashmead** p. 353. — *thyridopterygis* Ashm. p. 353 (Florida, Jacksonville). — Wirth: *Lepid.*: *Thyridopteryx ephemeraeformis* Haworth. — Biologie. **Howard**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 11 (36) p. 248.
- Ectroma* Westw. (Type: *Eupelmus rufus* Dalman) **Ashmead** p. 353. — *americanum* How., *dunense* Six, *maderense* Walk. p. 353. — *pygmaeum* Nees, *reate* Walk., *rufum* Dalm. p. 354.
- Ericydnus* Walker. (Type: *Encyrtus longicornis* Dalman) **Ashmead** p. 351 (Europa). — *aeneiventris* Walker p. 351. — *chryseus* Walker p. 352 (Australien). — *latusculus* Thomson p. 352 (Europa, Schweden). — *longicornis* Dalman p. 352 (Europa). — *megalasterus* Walker p. 352 (Australien). — *Reinhardii* Mayr p. 352 (Europa, Oesterreich). — *ventralis* Dalman p. 352 (Europa; Wirth: *Pulvinaria vitis* L.).
- Habrolepoidea glauca* Howard. **Ashmead** p. 357.
- Habrolepopteryx* n. g. (Type: *Psilophrys pulchripennis* Ashm. ♂), **Ashmead** p. 330. — Marg. v. about twice as l. as thick, not long. than the stigmat. postmarg. v. hardly so long etc. (Zeichnungsmuster d. Vorderflügel wie bei *Habrolepis* Först., sonst keine Verwandtschaft). **Ashmead** p. 359. — *pulchripennis* Ashm. p. 359.
- Henicopygus* n. g. **Ashmead** p. 329 — ferner p. 355—356. — *subapterus* p. 356 (Colorado).
 Flagell. filiform., subclav., not compressed etc.
 Meromyzobia u. *Ericydnus*.
 Flag. compress.; axill. separ. not touching each other at base of scutell.; lat. ocelli not close to eye margin; ovipositor exserted, the hypopyg. very prominent lanceolate.
Henicopygus.
- Leptomastix* Först. mit *histrion* Mayr **Ashmead** p. 353 (Europa). — *dactylopii* How. p. 353 (District of Columbia; West Indies: Grenada). — Wirth: *Rhynch.*: *Dactylopius destructor* Comstock.
- Meromyzobia* n. g. (Frons minutely shagreened, w. minute punct. scattered over the surface; scape slender, cylindr., the flagell. at the most subclavate; stigmal v. very oblique, subclavate) **Ashmead** p. 328 ♀, 330 ♂ (Antenn. 9-point., w. a 4-joint. funicle). — (Type: *Ericydnus maculipennis* Ashm.) **Ashmead** p. 349 (vernichtet Dipt.-Larven der Gatt. *Meromyza*). — *americana*

- Ashm. (1888) p. 349 (Florida). — bifasciata Ashm. (1890) p. 349–350 (Colorado). — flavicincta Ashm. p. 350 (Florida). — maculipennis Ashm. p. 350 (Ohio). — flava p. 350 ♂ (District of Columbia). — unifasciata p. 350 ♀ (Mississippi: Utica).
- Pentacnemus Howard **Ashmead** p. 358. — bucculatricis Howard p. 358–359 (Missouri). — Wirth: Bucculatrix thuiella Packard.
- Stenoterys Thomson. **Ashmead** p. 356. — orbitalis Thomson p. 356.
- Tetracladia Howard mit gracilis Howard u. texana Howard **Ashmead** p. 358.
- Tetracnemoidea How. **Ashmead** p. 357. — australiensis How. p. 357 (Australien: Sydney. — Wirth: Dactylopius sp. auf Pittsporum).
- Tetracnempsis n. g. (Type: Tetracnemus westwoodi Cockerell) **Ashmead** Bestimm. ♀ p. 330, ♂ p. 332; p. 358. — westwoodi Cockerell p. 358 (Colorado).
- Tetracnemus diversicornis Westw. **Ashmead** p. 357.
- Tineophoctonus n. g. **Ashmead** p. 328. — (Type; Phoenodiscus armatus Ashm.) **Ashmead** p. 351. — armatus Ashm. p. 351 (Florida). — tineaevara Ashm. p. 351 (Florida, Jacksonville).
- Frons very minutely shagr., w. minute punct. scattered over the surface, or almost smooth.
- Head view. from in front long. than wide, scutell. w. a tuft of long hairs; abd. scarcely long. than the head etc. **Chrysopophagus.**
- Head view. from in front not long. than wide, if anything a little wider than long, scutell. without a tuft of long hairs etc. **Tineophoctonus.**
- Tetralophidea* n. g. **Ashmead** p. 327 ♀, 330 ♂ u. p. 348. — *Bakeri* p. 348–349 ♂ (Colorado).
- Front-wings w. the marg. v. rather long, at least twice as l. as the stigm. vein or even longer, the stigm. a postmarg. veins short, scape slender, cylindr.
- Wings fusc. mark. w. white bands or rays; frons broad, the lateral ocelli nearer to the eye margin than to the front ocellus **Calocerinus.**
- Wings hyal., frons not so broad, the lat. oc. not near. to the eye marg. than to the front ocell. **Tetralophidea.**
- Tetralophiellus* n. g. (Type: T. brevicollis Ashm.) **Ashmead** p. 330 ♀, 332 ♂ — p. 357. — *brevicollis* p. 357 ♂ (Florida, Jacksonville).
- Wings hyal.
- ♀: Margin. vein about 3 times as long as the stigma, postmarg. v. not long. than the shaft of the stigmal etc. **Tetralophiellus.**
- Marg. vein only a little long. than the stigmal, postm. v. very short, hardly develop. etc. **Tetracladia.**
- Marg. vein fully twice as long as thick, or about half the length of the stigm., postm., only slightly develop. etc. **Tetracnempsis.**
- Marg. v. punctif., not long. than thick, postm. not develop. **Pentacnemus.**

Tribe II. Encyrtini.

- Charakt. **Ashmead** p. 332. — Bestimmungstabelle der 3 Gatt. (p. 332–333):
 23. Encyrtus Latr. = Comys Förster = Eucoms Förster. (Type: Chrysis infidus Rossi = Comys scutellata Swederus).

24. *Howardiella Dalla Torre* = *Howardia Dalla Torre*.

25. *Prionomastix Mayr* = *Liocarus Thoms.* (Type: *Encyrtus morio* Dalman).

Encyrtinae sens. strict. sind Parasiten v. Rhyngchoten; *E. scaurus* allein P. v. Lepid. **Marchal** p. 108.

Encyrtus Latr. **Ashmead** p. 359 sq.: *albicoxa* Ashm., *albitarsis* Zetterstedt p. 359. — *bicolor* Howard, *fusca* Howard, *infidus* Rossi, *lecaniorum* Mayr p. 360. — *obscura* Dalman, *swederi* Dalman p. 361. — Bibliogr. ders.; Wirthe. — *scaurus* Walk., aus *Physokermes abietis* auf *Epicea*, Fontenay 1. VII. **Marchal** p. 108.

Neu: *bogoriensis* **Zimmermann**, Med. Plantentuin, Java, XLIV 2 p. 27. Biologie. 1897. I Fig. 16. — Nach Record.

Howardiella Dalla Torre (Type: *Bothriothorax peckhami* Ashm.). **Ashmead** p. 361. — *Peckhami* Ashm. p. 361 (Wisconsin).

Prionomastix morio Dalman **Ashmead** p. 262.

Tribus III. Mirini.

Hierher die Mehrzahl der bekannt. Encyrt. Charakt. **Ashmead** p. 333. — A. giebt eine Tab., nach der sich die folg. 59 Gatt. leicht unterscheiden lassen (p. 334—342 nach ♀, p. 342—7 nach ♂):

- | | |
|---|---|
| 74. <i>Adelencyrtus</i> n. g. p. 341. | 81. <i>Chrysoplatycerus</i> Ashm. p. 341 ♀, 347 ♂. |
| 38. <i>Aenasius</i> Walk. p. 336 ♀, 343 ♂. | |
| 60. <i>Ageniaspis</i> Dahlb. (part.) p. 338 ♀, 345 ♂. | 59. <i>Coccidencyrtus</i> n. g. p. 339 ♀, 345 ♂. |
| 66. <i>Ageniaspis</i> Dahlb. p. 339 ♀, 346 ♂. | 87. <i>Coccobius</i> Ratzeb. p. 342 ♀, 347 ♂. |
| 83. <i>Anicetus</i> How. p. 341 ♀, 347 ♂. | 47. <i>Coccophoctonus</i> n. g. p. 337 ♀, 344 ♂. |
| 70. <i>Aphidencyrtus</i> n. g. p. 340 ♀, 347 ♂. | 31. <i>Copidosoma</i> Ratzeb. p. 335 ♀, 342 ♂. |
| 60. <i>Aphycus</i> Mayr p. 345 ♂. | 56. <i>Echthroplexis</i> Först. p. 338 ♀, 345 ♂. |
| 41. <i>Aratus</i> How. p. 336 ♀, 343 ♂. | 68. <i>Epiencyrtus</i> n. g. p. 340. |
| 33. <i>Archinus</i> How. p. 335 ♀. | 45. <i>Euryrhopalus</i> How. p. 336 ♀, 343 ♂. |
| 82. <i>Asteropaeus</i> How. p. 341 ♀, p. 342 ♂. | 79. <i>Eusemion</i> Dahlb. p. 341 ♀, 347 ♂. |
| 62. <i>Astymachus</i> How. p. 339 ♀, 346 ♂. | 77. <i>Habrolepis</i> Först. p. 341 ♀, 347 ♂. |
| 80. <i>Atropates</i> How. p. 341 ♀. | 44. <i>Hemaenasius</i> n. g. Ashm. p. 336 ♀. |
| 30. <i>Berecynthus</i> How. p. 335 ♀. | 46. <i>Hemencyrtus</i> n. g. p. 337 ♀, 344 ♂. |
| 63. <i>Blastothrix</i> Mayr p. 339 ♀, 346 ♂. | 61. <i>Heterarthrellus</i> How. p. 339 ♀, 345 ♂. |
| 43. <i>Blepyrus</i> How. p. 336 ♀, 343 ♂. | 51. <i>Hexacladia</i> Ashm. p. 337 ♀, 344 ♂. |
| 40. <i>Bothriothorax</i> Ratzeb. p. 336 ♀, 343 ♂. | 65. <i>Holcencyrtus</i> n. g. p. 339 ♀, 346 ♂. |
| 75. <i>Callipteroma</i> Motsch. p. 341. | 78. <i>Homalopoda</i> How. p. 341 ♀, 344 ♂. |
| 53. <i>Cerchysius</i> Westw. (part.) p. 335 ♀. | 52. <i>Homalotylus</i> Mayr p. 337. |
| 54. <i>Cerchysius</i> Westw. p. 338 ♀, 345 ♂. | 53. <i>Isodromus</i> How. p. 338 ♀, 344 ♂. |
| 86. <i>Cercobelus</i> Walk. p. 342 ♀, 347 ♂. | 28. <i>Liothorax</i> Mayr p. 334 ♀, 342 ♂. |
| 76. <i>Cerapterocerus</i> Westw. p. 341 ♀, 347 ♂. | 29. <i>Litomastix</i> Thoms. p. 334 ♀. |
| 39. <i>Chalcaspis</i> How. p. 336 ♀, 343 ♂. | 85. <i>Metallon</i> Walk. p. 342 ♀, 347 ♂. |
| 72. <i>Cheiloneurus</i> Westw. p. 340 ♀, 347 ♂. | 64. <i>Microterys</i> Thoms. p. 339 ♀, 346 ♂. |
| 37. <i>Chestomorpha</i> n. g. Ashm. p. 335 ♀, 343 ♂. | — <i>Micr.</i> part. p. 346 ♂. |
| 71. <i>Choreia</i> Westw. p. 340 ♀, 347 ♂. | 35. <i>Mira</i> Schellenberg = <i>Encyrtus</i> Latr. (part.) = <i>Lonchocerus</i> Dahlb. = <i>Euryscapus</i> Först. = <i>Dicellocerus</i> Mengel p. 335 ♀, 342 ♂. |

57. *Ooencyrtus* n. g. p. 338 ♀, 345 ♂. 55. *Sceptrophorus* Först. p. 338 ♀, 345 ♂
 27. *Parapsilophrys* How. p. 334 ♀, 342 ♂. 36. *Sphaeropisthus* Thms. p. 335 ♀,
 34. *Parencyrtus* Ashm. n. g. p. 335 ♀, 342 ♂.
 42. *Pentelicus* How. p. 336 ♀, 343 ♂. *Sterrhocoma* Först. = *Cheiloneurus*
 48. *Phaenodiscus* Först. p. 337 ♀, 343 ♂. Westw. p. 347.
 32. *Prionomitus* Mayr p. 335 ♀, 342 ♂. 69. *Syrphophagus* n. g. p. 340 ♀, 346 ♂.
 67. *Pseudencyrtus* n. g. p. 340 ♀, 346 ♂. 50. *Tanaoneura* How. p. 337 ♀, 344 ♂.
 26. *Psilophrys* Mayr p. 334 ♀, 342 ♂. *Trichomasthus* Thomson = *Sceptro-*
 58. *Psyllaephagus* n. g. p. 339 ♀, 345 ♂. 73. *Zaomma* n. g. p. 340 ♀.
 49. *Rhytidothorax* n. g. p. 337 ♀, 343 ♂. 84. *Zarhopalus* n. g. p. 342 ♀, 347 ♂.
- Adelencyrtus* n. g. (Type: *Encyrtus chionaspidis* How.) **Ashmead** p. 401—402. —
chionaspidis How., *planchoniae* How., *solidus* How. p. 402. — siehe *Zaomma*.
kaalae **Ashmead**, *Fauna Hawaiiensis* vol. I p. 323 (Oahu).
- Aenasius hyettus* Walker. **Ashmead** p. 370. — *chapadae* p. 371 ♀ (Brazil:
 Chapada).
- Agéniaspis testaceipes* Ratzb. Parasit. aus d. Raup. von *Lithoc. quercifoliella*.
 Biolog. Bem. **Marchal** p. 107.
fuscicollis Dalman aus Raupen von *Hyponomeuta cagnatella*, *H. malinella*, *H.*
padella u. *mahalebella*. Biol. Bem. Ausführl. Beschr. d. Entw. sollen
 folgen. **Marchal** p. 107—8.
 Dahlb. **Ashmead** p. 394. — *atricollis* Dalman p. 394—395. — *fuscicollis* Dal-
 man, *nepticulae* Mayr, *testaceipes* Ratzb., *buculatricis* How. p. 395.
- Anicetus* How. **Ashmead** p. 405. — *ceylonensis* How. p. 406.
- Aphidencyrtus* n. g. (Type: *Encyrtus aphidiphagus* Ashm.) **Ashmead** p. 398. —
aphidiphagus Ashm., *lachni* Ashm., *megourae* Ashm. p. 399. — *rosae* Ashm.,
rosae var. *floridae* Ashm., *schizoneurae* Ashm., *siphonophorae* Ashm. p. 399.
 — *websteri* How. p. 400. — siehe *Epiencyrtus*.
- Aphycus* Mayr **Ashmead** p. 383. Howard's Tab. (1899). Wirte: Blattläuse. —
 Bis jetzt bek. folg. Spp.: *amoenus* How., *annulipes* Ashm., *apicalis* Dalman,
angelicus How., *australiensis* How., *alberti* How. p. 384. — *brunneus* How.,
californicus How., *ceroplastis* How., *cockerelli* How., *coquilletti* How., *dacty-*
lopii How., *eruptor* How. p. 385. — *flaviceps* How., *flavus* How., *fuscip-*
pennis How., *hederaceus* Westw., *immaculatus* How., *Johnsoni* How., *lecanii*
 How. p. 386. — *lichtensiae* How., *lounsburyi* How., *maculipes* How., *mexi-*
canus How., *nigritus* How., *oaxacae* How., *oregonensis* How. p. 387. —
pulchellus How., *punctipes* Dalman, *pulvinariae* How., *texanus* How.,
townsendi How. p. 388. — siehe *Ooencyrtus*.
- Aratus scutellatus* Howard **Ashmead** p. 373 (W.-Ind.: Grenada).
- Archinus occupatus* Howard **Ashmead** p. 368.
- Asteropaeus primus* How. **Ashmead** p. 405.
- Astymachus japonicus* How. **Ashmead** p. 389.
- Atropates* How. **Ashmead** p. 404. — *collinsi* How. p. 405.
- Berecynthus* Howard **Ashmead** p. 365. — *Bakeri* Howard p. 365. — *floridanus*
 p. 365 (Florida, Biscayne Bay).
- Blastothrix adjutabilis* How., *incerta* How., *insolita* How. **Ashmead** p. 389. —
sericea Dalman. p. 389—390. — *yuccae* Coquillett p. 390. — *sericea* (Dalm.)
Mayr aus *Lecanium rosarum* (v. Fontenay) gezog. **Marchal** p. 108.

- Blepyrus Howard. **Ashmead** p. 373: mexicanus Howard, marsdeni Howard, texanus Howard p. 373.
- Bothriothorax Ratzeburg **Ashmead** p. 371. — californicus Howard, insularis Howard p. 371. — macrolenes Ashm., nigripes Howard, noveboracensis Howard, peculiaris Howard, planifrons Howard, rotundiformis Howard, virginienensis Howard p. 372.
- howardii* nom. nov. für *B. insularis* How. nec Cam. **Ashmead**, Fauna Hawaiiensis I p. 322.
- Callipteroma Motsch. **Ashmead** p. 402. — quinqueguttata Motsch., sexguttata Motsch. p. 402. — testacea Motsch. p. 403.
- Cerapterocerus Westw. **Ashmead** p. 403. — floridanus Ashm., latevittatus Costa, mirabilis Westw., pilicornis Thoms. p. 403.
- pilicornis Thoms. aus Lecan. hemisph., auf Pfirsich, im VI, gezog.; Cette. **Marchal** p. 107.
- Cerchysius pulchricornis u. terebrator How. zu Anagyrus gezogen. **Ashmead**, Trans. Entom. Soc. London, 1900 p. 262. — caudata Cameron **Ashmead** p. 379. — *elasmoceri* p. 379—380 ♀ (Virginia a. District of Columbia. — Wirt: Coleopt. Elasmocerus terminatus Say). — flaccus Walker p. 380. — *Hubbardii* p. 380 ♀ (California, Salton — aus Coleopt. Vrelleta hubbardii Schwarz). — ? iceryae Howard, pallidipes Provancher p. 380. — *australiensis* **Ashmead**, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900 p. 342 ♀ (Austral.).
- Cercobelus Walker **Ashmead** p. 408. — jugaeus Walker p. 408.
- Chalcaspis Pergandei Howard **Ashmead** p. 371.
- Cheiloneurus Westw. **Ashmead** p. 400. — albicornis How., cupreicollis Ashm., dactylopii How., diaspidarum How., dubius How., funiculus How., nigrescens How. p. 401.
- Chestomorpha* n. g. (Sphaeropistus nahe, doch Kopf nicht länger als breit, Stirn breit, Antenn. nicht lang etc., Abd. kürzer als der Thorax, komprimiert) **Ashmead** p. 335; Bespr. p. 370. — *biformis* p. 370 ♀ (New Mexico: Las Cruces).
- Chorea Westw. Nach Dalla Torre (Cat. Hym. V p. 428) dazu Syn. Crantor Haliday. Type: Encyrtus ineptus Dalman. **Ashmead** p. 400.
- Chrysoplatycerus splendens How. **Ashmead** p. 405. — *Howardii* p. 405 ♀ (Mexico).
- Coccidencyrtes n. g. **Ashmead** p. 383. — Type: Encyrtus ensifer How.
- Coccobius Ratzeb. (Type?) **Ashmead** p. 408. — *diaspidis* n. sp. p. 408 (Washington. — Wirth: Diaspis rosae Bouché).
- Coccophoctonus n. g. **Ashmead** p. 375. — *dactylopii* p. 375—376 ♀ (Australien. — Wirth: Rhynch.: Dactylopius sp.).
- Copidosoma. Ratzeb. **Ashmead** p. 366—367: celaenae Howard, gelechia Howard, intermedium Howard, pyralidis Ashm. p. 366. — truncatellum Dalman p. 366—367. — turni Packard p. 367. — vagum Howard p. 367.
- Echthroplexis puncticollis Thomson u. hirtus Howard. **Ashmead** p. 381.
- Epiencyrtus* n. g. (Type: Encyrtus thyreodontis Ashm.). **Ashmead** p. 396—397. — artaceae How., thyreodontis Ashm., melanacis Dalman, sordidus How. p. 397. — Bestimm. p. 340:

Stigmal vein very short, not or scarcely so long as the marginal and the postmarginal veins united; axillae meet at their inner basal angles or are separate.

Epiencyrtus n. g., *Syrphophagus* n. g. u. *Aphidencyrtus* n. g.

Stigmal vein much longer than the marginal, as long or longer than the marg. a. postmarg. veins united etc. *Pseudencyrtus*.

Euryrhopalus schwarzi Howard. *Ashmead* p. 374 (Florida, Biscayne Bay).

Eusemion longipennis Ashm. *Ashmead* p. 404 (Florida. — Wirth: *Lecanium* sp.).

Habrolepis dalmani Westw. *Ashmead* p. 403—404. — *cyanea* Ashm., *zetterstedii* Westw. p. 404.

Hemaenasius n. g. (Aussehen v. *Aenasius* Walter u. *Euryrhopalus* Howard) *Ashmead* p. 336, 374. — *confusus* p. 374 ♀ (District of Columbia; Washington).

Hemencyrtus n. g. (Statur u. Aussehen von *Encyrtus cecidomyiae* How. etc.) *Ashmead* p. 374—375. — *Herbertii* p. 375 ♀ (Brazil: Chapada).

Bestimm. p. 337:

Marginal vein short, rarely much more than twice longer than thick.

Head with some sparse thimble-like, or umbilicate punctures, scutellum a little longer than the mesonot.; eyes pubesc.

Club of antenn. not long. than joints 1 a. 2 of funicle united, the funicle joints all longer than wide; marg. vein scarcely so long as the stigmal, the postmarg. longer than the stigmal; abd. conic-ovate, a little longer than the head a. thorax united, with the ovipositor subexserted, dorsum subconcave; mandibles with the two outer teeth longer and more acute than the inner *Hemencyrtus*.

Club of antennae very large a. distinctly longer than the funicle, the funicle joints all very short, wider than long; abd. depressed, oval, shorter than the thorax; mandibles with small, subequal teeth *Coccophoctonus*.

Heterarthrellus australiensis How. *Ashmead* p. 389:

Hexacladia smithii Ashm. *Ashmead* p. 377.

Holcencyrtus n. g. (ähnelt *Aphycus* u. *Blastothrix*) *Ashmead* p. 394. — Type: *Aphycus niger* Ashm. p. 394. — Bestimm. p. 339.

Thorax smooth, impunctate, or at the most microscopically reticulate, or with fine longitudinal striae on the mesonotum

Ageniusaspis Dahlb. u. *Pseudencyrtus* n. g.

Thorax finely coriaceous, subopaque, without punctures scattered over the surface; frons punctured; postmarginal vein longer than the stigmal etc.

Holcencyrtus.

Homalopoda cristata Howard. *Ashmead* p. 404 (Westind. — Wirth: *Aspidiot*. secret. Cock.

Homalotylus Mayr *Ashmead* p. 377. — *lachni* Ashm., *similis* Ashm. u. *terminalis* Say p. 378. Litt. u. Wirth.

sodromus chrysopeae Ashm. *Ashmead* p. 378. — *iceryae* Howard p. 378. — *niger* p. 379 ♀ (District of Columbia. — Fang bei Eiablage in ein. unreifen *Chrysope*-Larve). — *atriventris* p. 379 ♀ (Canada, Ottawa). — *puncticeps* How. p. 379.

Liothorax glaphyra Walker *Ashmead* p. 363. — *melanocera* p. 363 ♀ (District of Columbia).

Litomastrix Thomson **Ashmead** p. 363. — *annellus* Thomson **Ashmead** p. 363. — *auricollis* Thomson p. 363. — *chalconotus* Dalman p. 363—364. — *diversicornis* Howard, *filicornis* Dalman p. 364. — *flagellaris* Dalman, *fucisquama* Thomson, *genalis* Thoms. p. 364, *latifrons* Thoms. p. 364. — *phalaenarum* Thomson, *stylata* Thomson, *triangularis* Thoms., *truncatula* Thoms., *ungularis* Thomson p. 365.

Metallon Walker. **Litt. Ashmead** p. 407. — *acacallis* Walk., *atriceps* Walk., *coccois* Smith (Emily), *debilis* Först., *fuscitarsis* Thoms., *infuscatus* Först., *testaceus* Ratzeb. p. 407. **Litt. Fundorte.** Wirth.

Microterys Thoms. **Ashmead** p. 390. — *chalcostomus* Dalman p. 390. — *cincticornis* p. 390 (New Hampshire: Mount Washington). — *cyancephalus* Dalm., *fascipennis* Dalm., *flavus* Howard, *gastron* Walker, *interpunctus* Dalm., *imbrabus* Walker p. 391. — *lichtensiae* How., *lunatus* Dalm. p. 392. — *marginatus* p. 392 ♀ (New Mexico). — *montinus* Packard, *subcupratus* Dalm., p. 392. — *sublestus* How., *sylvius* Dalm., *tachardiae* How., *tesselatus* Dalman, (?) *bolus* Walker p. 393. — *dubius* How., *fuscicornis* How. p. 394. **Litt.,** Wirth.

Mira Schellenberg. **Syn. Ashmead** p. 368. — *macrocera* Schellenberg p. 368—369. — *saltator* Lindemann p. 369.

Ooencyrtus n. g. (für eine Reihe v. *Encyrtus*-spp., aus Eiern verschiedener Insekten gezogen). **Ashmead** p. 381—382: *anasae* **Ashmead** (Florida). — (Wirth: Rhynch.: Eier v. *Anasa tristis* De Geer) p. 382. — *clisiocampae* Ashm. (Ohio). (Wirth: Lep.: aus Eiern von *Clisiocampa disstria* Hübner) p. 382. — *gargaris* Walker (West-Indien). — *Johnsoni* Howard (Maryland. — Wirth: Rhynch. Eier von *Murgantia histrionica* Hahn p. 382). — **Bestimm.** p. 338:

Pedicelel obconical, much stouter a. longer than the 1st joint of funicle; sometimes as long as 1—2 united; frons rather narrow; the eyes as seen from in front somewhat convergent above; club of antennae not especially large, shorter than the funicle.

Lateral ocelli close to or touching the eye margin; postmarginal vein not or only slightly developed.

Eyes bare; postmarginal vein not developed *Ooencyrtus*.

Eyes pubescent; postmarg. v. as long as marginal.

Agencies Dahlb. (part.)

Lateral ocelli not close to the eye margin, from one and a half to twice their width from it: postmarginal vein some what developed

Psyllocephagus n. g.

Pedicelel short, scarcely longer than thick; frons moderate; the ocelli about their width from the eye margin; club of antenn. large, the length of funicle or nearly; funicle joint short, submoniliform, the 3—4 term. joints wider than long.

Coccidencyrtus.

Parapsilophrys Gelechia Howard **Ashmead** p. 362.

Parencyrtus n. g. (*Cerchysius* Westw. nahe. „Mesonot. smooth, impunctate, blue or metallic; pedicelel about thrice as long as thick, flagell. long, the joints of funicle much longer than thick, the club somewhat stouter than the funicle; eyes pubescent; scutellum, but not the axillae shagreened). **Ashmead** p. 335, 368. — *brasiliensis* p. 368 ♀. (Brazil: Chapada).

Pentelicus aldrichii Howard **Ashmead** p. 373 (Dakota).

Phaenodiscus Först. **Ashmead** p. 376: *arizonensis* How., *conformis* How., unicolor Ashm. Besch. d. ♀ (die Sp. ist kleiner als *P. arizonensis*, blasser, u. untersch. durch die Farbe der Coxen u. die verkürzten Flgl.) p. 376.

Prionomitus mitratus Dalman u. *tiliaris* **Ashmead** p. 367.

Pseudencyrtus n. g. (Type: *Encyrtus cecidomyiae* How. — die hierher gehör. Spp. sind stark metallisch glänzend u. leben in Cecidomyiden). **Ashmead** p. 396. — *cecidomyiae* Howard, *nitidus* How., *rotundiformis* How. p. 396. — siehe *Holcencyrtus*.

Psilophrys longicornis Walker, *armata* Ashm. u. *pallidipes* Ashm. **Ashmead** p. 362.

Psyllaephagus n. g. **Ashmead** p. 382. — *pachypsyllae* How. u. *trioziphagus* How. p. 383 — siehe *Ooencyrtus*.

Rhytidothorax n. g. (*Phaenodiscus* Först. nahe, doch Flgl. hyalin, Costalzelle der Hflgl. lang u. schmal; Mesonotum viel kürzer als das Skutellum etc.) **Ashmead** p. 337. — *marlatti* p. 377 ♀ (Kansas, Riley County).

Sceptrophorus hyalinipennis Howard, *convexus* Howard u. *solus* Howard. **Ashmead** p. 381.

Syrphophagus n. g. (Type: *Encyrtus mesograptae* Ashm.). **Ashmead** p. 397. — (?) *flaviclavus* How., *mesograptae* Ashm., *quadrinaculatae* Ashm., *moderatus* How., *submetallicus* How., *vectius* Walker p. 398 — siehe *Epiencyrtus*.

Sphaeropisthus pascuorum **Ashmead** p. 369. — *annulicornis* p. 369 ♂ (Florida Jacksonville). — *auriceps* p. 369–370 ♀ (Florida, Fort George Island).

Tanaoneura ashmeadii Howard. **Ashmead** p. 377.

Zaomma n. g. **Ashmead** p. 401. — *argentipes* How. p. 401. — Bestimm. p. 340: Wings hyaline, or at most with a discal cloud; antennae short.

Eyes large, rounded, strongly converging above, and leaving a very narrow or linear vertex; antennae very short, the club enormously enlarged, longer than the funicle and several times thicker, the joints of the funicle transverse *Zaomma*

Eyes not unusually large, only slightly converging above, the vertex not especially narrow; club of antenn. not unusually enlarged and about the length of the funicle, the joints of the funicle transverse, the first 2 or 3 submonilif. *Adelencyrtus*

Zarhopalus n. g. **Ashmead** p. 342, 406.

Facial impression a. scrobes deep, bounded by a distinct arched carina superiorly: *Chrysoplatycerus* Ashm., *Asteropaes* How. u. *Anicetus* How.

Facial impression not bounded by an arched carina etc.: *Zarhopalus* n. g. *sheldoni* p. 406 ♀ (Lake Placid, New York; Bladensburg, Maryland). — *inquisitor* How., *crassus* How. *quadricolor* How. p. 406.

Tribe IV. Arrhenophagini.

Für die beiden Gatt. 88. *Rhypoideus* Howard u. *Arrhenophagus* Auriv. **Ashmead** p. 408. — Sie unterscheiden sich von den anderen Tribus durch den Bau der Mandibeln u. durch andere Züge. — Die Mandibeln sind zugespitzt oder konisch u. ungezähnt; Tars. 4- oder 5-gliedrig; Randader fehlend oder punktförmig, Postmarginalader fehl., Stigmalader zuweilen vorhanden.

88. *Rhypoideus citrinus* How. **Ashmead** p. 408.

89. *Arrhenophagus aurivillius*. **Ashmead** p. 408 mit *chionaspidis* Aur. p. 409.

Subfam. III. Signiphorinae.

Mit der Gatt.:

90. Signiphora Ashmead p. 409.

Bestimmungstabelle über die hier unten aufgeführten Spp. (p. 409—410):
nigra p. 410 ♀ (District of Columbia, Washington). — *australiensis* p. 410 ♀ (Australia. — Wirth: Rhynch. sp.). — *dactylopii* p. 410 ♀ (District of Columbia. — Wirth: Dactylopius ephedrae Coquillett). — *noacki* p. 410 ♀ (Brazil: San Paulo. — Wirth: Rhynch.: Psylla sp.). — *unifasciata* p. 410—411 ♀ (Florida, Georgiana. — Wirth: Rhynch. Ceropsylla sideroxyli Riley). — *bifasciata* p. 411 ♀ (Westind.: San Vincent). — *flavopalliata* Ashm. p. 411 (Florida. — Wirth: Aspidiot. citricola Pack., A. cydoniae Comst., Mytilaspis gloverii Pack., Aleyrodes sp.). — *occidentalis* How. p. 411 (California: San Gabriel. — Wirth: Aspidiot. aurantii var. citrinus Coquillett). — *mexicana* p. 411 ♀ (Mexico, San Luis. — Wirth: Rhynch.: Aspidiotus nerii Bouché). — *rhizococci* A. p. 411 ♀ (Brazil, Minas Geras. — Wirth: Rhizococcus sp.). — *aleyrodis* p. 412 ♀ (Westindien. — Wirth: Aleyrodes sp.). — *coquillettii* p. 412 ♀ (woher? — Wirth: Aleyrodes sp. auf Quercus agrifolia). — *aspidioti* p. 412 ♀ (Mexico, San Louis. — Wirth: Aspidiotus nerii Bouché). — *townsendi* p. 412 ♀ (Mexico, Tabasco. — Wirth: Rhynch.: Aleyrodes sp.).

Mymaridae. (Fam. LXXIII.)

Mymaridae. Nach Ashmead in Smith's Ins. etc. p. 562 in New Jersey durch die Gatt. Polynema Halid. vertr.

Mymaridae des Bernstein u. Kopal. Meunier (siehe vorigen Bericht p. 312 u. dies. Bericht p. 343) 2 neue Mymariden mit Abb. d. Fühl., V.- u. Hflgl. Bibliographie: 7 Publik.

- Abb. einer Mym. aus dem sicil. Bernstein (Simetit). Details d. Morphol. unklar. Titel d. Publ. cf. Meunier (sub 2 des vorig. Berichts) p. 365.
 — Dieses Stück von Scudder mit Unrecht zur Gatt. Mymar (nicht Myrmar) gezogen.

Litus Halid. spec. Beschr. Meunier (sub 2 des vorig. Berichts) p. 365. Abb. der Antenne Fig. 1 p. 366 (hierher, weil 9-gl. Ant. u. 5-gl. Tars.). (Im Bernstein d. Ostsee). — $\frac{1}{7}$ mm.

Limacis Först. spec. Meunier (sub 2 des vorig. Berichts) p. 366. — Mit kein. recent. Lim.-sp. zu vergleichen. (Im Kopal.) Abb. d. Ant. Fig. 2. — $\frac{1}{16}$ mm.

Mymar *crinisacri* Quail p. 154 Taf. VIII Fig. 1—3 (New Zealand — aus dem Ei von Vanessa Gonerilla).

Superfamilia VIII: Ichneumonoidea.

Umfasst die Fam. LXXIV — LXXIX.

Evaniidae, Agriotypidae, Ichneumonidae, Alysiidae, Braconidae u. Stephanidae.

Evaniidae (Fam. LXXIV).

Ashmead (siehe vor. Bericht p. 470) untersch. folg. 3 Subfam.: Evaniinae — Gasteruptioninae — Aulacinae.

Monographie der nordamerikanischen Formen: **Bradley**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. XXVII p. 319—330 pl. XI.

Deraidontus n. g. **Bradley**, t. c. p. 321. Type *Aulacus montanus* p. 321. — *fuscalatus* p. 322. — *flavicurvus* p. 322 (beide aus Nordamerika).

Evania sp. aus Guatemala nach Hamburg mit lebenden Pflanzen eingeschleppt. **Kraepelin**.

Neu: *Shelfordi* (nigra, basi flagelli antennarum, trochant. anterior., basi tibiarum postic. basique tarsorum posticorum late, albis; alis fusco-viol.) **Cameron, P.**, Proc. Zool. Soc. London, 1901, vol. 2 p. 43—44 ♀ (Borneo. — Steht von allen bek. Sp. d. austral. E. princeps Westw. am nächst.).

neomexicana **Bradley**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. XXVII p. 304. — *californica* p. 304 (beide aus Nordamerika).

Müggengeri (Flügel wie bei *Evania appendigaster* L., etwas dichter pubescirt, Geäder wie bei *E. villosa* n. sp.) **Enderlein**, Archiv f. Naturg. 67. Jhg. I. Bd. 3. Hft. p. 188—189 ♂ (Nord-Kamerun, Johann-Albrechtshöhe). — *villosa* (Flügelgeäder wie bei *E. appendigaster* L. — Abweich. von allen anderen Spp. durch die lange u. dichte Behaarung der Beine) p. 189 ♂ (Süd-Kamerun, Lolodorf). — *fumipennis* (Flügelgeäder wie bei *Evania appendigaster* L. Membran braun angehaucht, dicht pubescirt, zwischen Costal- u. Radialader dunkler) p. 190 ♂ (Nord-Kamerun, Johann-Albrechtshöhe). — *mediana* Schlett. (Stücke von N. S. Wales u. aus Neu-Britanien). Ergänzt. zur Besch. p. 190 (Hat eine weite Verbreit. über die austral. Region). — *impressa* Schlett. Ergänzt. z. Besch. p. 191. Stücke aus Neu-Guinea. — *argenteocaudata* (Flgl. hylalin farblos, Geäder wie bei *Evania impressa* Schlett. Die Radialader trifft nahezu rechtwinklig auf den Vorderrand) p. 191—2 ♂ (Südspitze von Neu-Guinea, Milne-Bay). — *Haenschi* p. 192 ♂ (Ecuador, Santa Inéz). — *chalcidides* p. 192—193 ♂ (Marcapata, 1000 m hoch). — *parva* p. 193 ♂ (Bogotá). — *Taschenbergi* nom. nov. für *Gasteruption Schlettereri* Taschenb. 1891.

Gasteruption Sowae (steht pedemontanum am nächsten u. zu verwechseln, doch bedeutend grösser: sonstige Unterschiede. — Eine der grösst. europ. Art.).

Schletterer, Verhdlg. k. k. zool.-bot. Ges. Wien 51. Bd. p. 219—220 ♂ ♀ (Süd-Istrien, auf *Paliurus australis* u. *Dorycnium herbaceum*, Ende V—VII).

Kriegeri **Enderlein**, Archiv f. Naturg. 67. Jhg. I. Bd. 3. Hft. p. 194 ♀ Abb. des Flgls. m. Geäder (Südspitze von Neu-Guinea, Milne Bay). — Das Geäder v. *Gast. Kriegeri* erinnert an *G. latigenale* Schlett., nur ist b. *Kriegeri* die Verschmälerung u. Reduction der 1. Discoidalzelle noch weiter fortgeschritten. — *virescens* (Flgl. hylalin farblos, an d. Spitze schwach braun angehaucht. Im Geäder fehlt die kleine (1.) Discoidalzelle völlig, wie nur noch bei *Gast. pedunculatum* Schlett.) p. 195 ♀ (Südspitze von Neu-Guinea, Milne Bay).

- Hyptia fuchi* Ashmead, Canad. Entom. vol. XXXIII p. 302 (Californien). — *weithi* p. 302 (Hayti). — *trinidadensis* p. 303. — *floridana* p. 303 (Florida). — *johnsoni* p. 303 (Philadelphia).
- Megischus violaceipennis* Cameron, Proc. Zool. Soc. London 1901 I p. 225 (New Britain).
- Oleisoprister* n. g. (Type: *Aulacus firmus*) Bradley, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. XXVII. p. 325. — *subfirmus* Viereck n. sp. p. 325 (New Jersey).
- Pammegischia. Ashmead beschreibt im Canad. Entom. vol. XXXIII folg. neue Spp. aus Nordamerika: *xiphydriæ* p. 300. — *lovei* p. 301. — *weedi* p. 301. — Derselbe in den Entom. News Philad. vol. XII: *xiphydriæ* p. 278 (New York) u. Bradley in Trans. Amer. Entom. Soc. vol. XXVII aus Canada: *ouelletii* p. 329.

Agriotypidae. (Fam. LXXV.)

Agriotypus p. 344 dieses Berichts sub Morton lies Agriotypus statt Agriotypus.

Ichneumonidae. (Fam. LXXVI.)

Katalog: de Dalla Torre, vol. III, Part. 1.

Synonyme und orthographische Verbesserungen zu Ashmead (p. 290 des vorig. Berichts: System der Ichneum.: Dalla Torre, K. W. (p. 307 dieses Berichts).

Verbreitung schwedischer Ichneumonidae. Nordenström p. 201—202. — Ichneumones Amblypygi p. 202—203. — Cryptidae p. 203. — Ophionidae p. 203—204. — Pimplariae p. 204. — Tryphonidae p. 204. — Ichneumones Nachtr. p. 207—208.

Athimus (Titel p. 293 dieses Berichts) behandelt: p. 197—199: Hoplismenus (1), Chasmodes (2), Ichneumon (50) Bemerk. dazu. — Forts. p. 220—223: Ichneumon (72), Amblyteles (37) Bemerk. dazu., Automalus (?).

— Abb. des Legebohrers. Prometheus 12. Bd. p. 99 Fig. 58.

Schlupfwespen. Fehler in Cameron's Bearbeitung in der Biol. Centr.-Amer. Kriechbaumer (2) p. 21.

Gattungen, die nach Dalla Torre, K. W., p. 49 im Ashmead'schen Systeme fehlen:

Aethalodes Kriechb. (1890). — Aithris (Cam.) (1900). — Anelpistus Brauns (1898) nec Horn, daher Braunsianus Berg (1898). — Anisopygus Kriechb. (1888). — Arthula Cam. (1900). — Baliæna Cam. (1900). — Banchopsis Rudow (1886), weshalb Banchopsis Kriechb. 1886 in Banchoides D. T. (1888) umgetauft wurde. — Barycephalus Brauns (1895). — Blaptocampus Thoms. (1892). — Bremia Kriechb. (1890). — Caenopimpla Cam. (1900). — Catomicrus Thoms. (1888). — Closterocerus Htg. (1847). — Cryptocentrum W. Kby. (1837). — Eucerberanchus Costa (1887). — Glyptorhaestus Thoms. (1894). — Iseura Spin. (1851). — Kriechbaumeria D. T. (1895) [für Holmgrenia Kriechb. (1897)]. — Liaba Cam. (1899). — Neastus Holmgr. (1884). — Odontopimpla Cam. (1886). — Paracremastus Szepl. (1900). — Paraptesis Mayr (1884). — Pseudocryptus Kriechb. (1893). — Scallaena Cam. (1899). — Smicrobius

Thoms. (1894). — *Stauropoctonus* Brauns (1889). — *Stictopisthus* Thoms. (1885). — *Strongylopsis* Brauns (1896). — *Syene* Voll. (1878). — *Theraemon* Holmgr. (1872). — *Tilgida* Cam. (1900). — *Tryphonopsis* Brauns (1898). — *Xaniopelma* Tschek (1868). — *Xylophylax* Kriechb. (1878).

Verbesserungen zur Ashmead'schen Arbeit (cf. p. 290 des vorig. Berichts). Nach **Dalla Dorre, K. W.** p. 50 muss es darin heissen:

Algina recte *Alegina*. — *Anoplectes*, nicht *Anoplectis*. — *Antipygus*, nicht *Antipyzus*. — *Apechoneura*, nicht *Apechneura*. — *Apterophygus* Först. (nicht -us). — *Asinamora* Först., nicht *Asinamara*. — *Anderis* Davis, nicht *Auderis*. — *Brachycyrtus*, nicht *Brachycystus*. — *Calliphurus*, nicht *Calliphurus*. — *Cyrophion*, nicht *Cyrophys*. — *Dyseidopus* Kriechb., nicht *Discidopus*. — *Eepaglus*, nicht *Eeplagus*. — *Epiphobus*, nicht *Epiphorbus*. — *Euxorides*, nicht *Euxoides*. — *Gonophonus*, nicht *Gonophorus*. — *Helcostizus*, nicht *Holcostizus*. — *Helictes*, nicht *Helectes*. — *Idemum* Först., nicht *Idemun*. — *Idiogramma*, nicht *Idiogamma*. — *Neliopisthus*, nicht *Neleopisthus*. — *Neuratales*, nicht *Neurotales*. — *Oetophorus*, nicht *Oethophorus*. — *Olesicampe* Först., nicht *Olesicampa*. — *Ophiopterus*, nicht *Ophionopterus*. — *Opidnus*, nicht *Ophidnus*. — *Opisthostenus* Först., nicht *Opisthosthenus*. — *Orthopelma* Taschenberg, nicht *Tischb.* — *Phaeogenes* Wesm., nicht *Phaenogerus*. — *Phaenosemus*, nicht *Phaenosema*. — *Phobocampe*, nicht *Phobocampa*. — *Psilosage*, nicht *Psilosarge*. — *Sobas* Först., nicht *Sorbas*. — *Sychnoportus*, nicht *Sychnoporthus*. — *Therion* Curt., nicht *Theridium*. — *Tricholinum*, nicht *Tricholium*. — *Troctocerus* Woldstedt, nicht *Wolstedt*. — *Zaglyptus* (nicht -a). — *Zaplethis* Först. (nicht -phlethis).

Arten, deren Stellung im System Ashmead's ohne nähere Angaben nicht ersichtlich ist:

Apilasta nigrifemur **Syépligeti**, in Zichy's Ergebn. 2. Bd. p. 140 (Kazan).

Facydes n. g. **Cameron, P.**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 278—279. — *purpureo-maculatus* p. 279 ♀ (Indien).

Fileanta n. g. (Untersch. von Myermo) **Cameron, P.**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 525—526. — *balteata* p. 526—527 ♀ (Simla).

Gyrodonta n. g. (Passt in keine der Tribus von Förster u. Ashmead. Die zahnlosen Mandibeln würden sie in die Heresiarchini verweisen, aber hier sind sie spitz, nicht breit u. stumpf. Die Mandibeln sind sehr verschieden u. so charakteristisch, dass auf Grund ders. eine neue Gruppe begründet werden könnte.) **Cameron, P.**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 485—486. — *flavomaculata* p. 486—487 ♀ (Indien).

Labium Brullé. Bemerk. dazu. **Cameron, P.**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 529.

Von Brullé neben *Tryphon* gestellt, gehört aber nicht dahin, sondern in eine Gruppe der *Ichneumoninae* entweder als besond. Tribus, oder als aberrantes Glied der *Joppini*. Es unterscheidet sich von den *Joppini* u. den *Ichneumonini*, dass die Antennen der ♂ nicht lang sind, schlank, mehr oder minder gesägt, sondern kurz, dick, keulenförmig u. s. w. u. nicht wie gewöhl. ♂-Antennen. Bemerkenswerth das stark vorragende Labium. **Cameron, P.**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 529. Ausführl. Beschr. des ♂. — *ferrugineum* p. 530 (Neu Guinea).

- Lagenesta* n. g. (passt in keine der Kriechb.'schen Gruppen) **Cameron, P.**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 376—377. — *ferruginea* p. 377 ♀ (Indien).
- Leptojooppa* n. g. (gehört zu den Oxygygi, worauf das Vorhandensein d. Ventralfalte u. das zugespitzte Ende des Abd. deutet. Von jeder bek. Joppine versch., durch kurze, erweiterte Ant., u. das sehr lange u. schmale, fast cylindr. Abd. Höckr. Pronot. u. gekielte Scutellum). **Cameron, P.**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 279—280. — *erythrothorax* p. 280—281 ♀ (Indien).
- Liogaster* Kriechb. Ashm. p. 152. Dafür *Liotryphon* zu setzen, ist unnötig u. überflüssig. Bemerk. dazu. **Dalla Torre** p. 52. — Auch das Citat p. 152 ist unrichtig.
- Liotryphon* nom. nov. für *Liogaster* Kriechb. 1890. **Ashmead**, Canad. Entom. vol. XXXII p. 368. — Ist überflüssig, siehe *Liogaster*.
- Magrettia* n. g. (Petiolus wie bei den *Platyuri*). **Cameron, P.**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 489—481. — *crassispina* p. 481—482 ♀ (Indien).
- Myermo* n. g. (steht in gewisser Beziehung zwischen den *Amblypygi* und den *Oxygygi*, Abd.-Spitze nicht ganz so stumpf wie bei typisch. *Amblyteles*, aber ebenso entwickelt. Antennen zierlicher als bei den *Joppina*. Nächste Verwandte vielleicht *Setanta*. Unterschiede von dieser und von den vier nearkt. u. paläarkt. Gatt. der *Heresiarchini*: *Plagiotrypes* Ashm., *Heresiarches*, *Rhexidermus* u. *Stenodontus*). **Cameron, P.**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 523—524. — *rufipes* p. 524—525 ♀ (Indien).
- Ophiodes* Htg. Citat in Ashm. p. 152 ist unrichtig. **Dalla Torre** p. 52. — Ashm. schlägt dafür den nom. nov. *Ophiogastra* Ashm. vor.
- Ophiogastra* nom. nov. für *Ophiodes* Hartig. 1840. **Ashmead**, Canad. Entom. vol. XXXII p. 368.
- Oresbius* Marsh. (einfarb. Antenn.) **Elliott, Ernest**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 11 (36) p. 147.
- Paracremastus* n. g. **Szépligeti**, Termesz. Füzetek, vol. XXIII p. 28. — *genalis* p. 28 (Ungarn).
- Poeciloscirpus* n. g. (etwas isolirt, vorläufig unter die *Phygadeuonini* gestellt, doch mit kein. bekannt. Gatt. verw. Aussehen einer *Zanthopimpla*). **Cameron, P.**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 527—528. — *nigromaculatus* p. 528—529 ♀ (Australien).
- Setanta* n. g. (gehört zu den *Platyuri*. Sie hat das stumpf zugespitzte Abd. von *Amblyteles*, mit der sie auch in: „apical ventral segments not being retracted“ übereinst. Charakt. ist die Gestalt der Mandibeln, die nur ein. sehr klein., fast obsolet. Zahn an der Oberseite haben). **Cameron, P.**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 484—485. — *rufipes* p. 485—486 ♀ (Indien).
- Sphogophaga vesparum* Curt. **Morley, Claude**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 11 (36) p. 117—124. — Geschichte p. 117—118. — Besch. p. 118—119. — Entw.: Ei, Larven, Kokon, Ausschlüpfen, sowie die sehr interess. Biologie p. 119—124. — Chronolog. Liste der hierüb. handelnden Autoren.
- Bemerk. zu **Morley's** Artikel **Chapman, T. A.** p. 135. — gezogen (doch ohne Beobacht. der Verwandl. u. s. w.) **Eaton, A. E.**, t. c. p. 160.
- Spinaria trimaculata* **Cameron**, Mem. Manchester Soc. vol. XLIV No. 15 p. 81 (Indien). — *beccarii* **Mantero**, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova vol. 20 (40) p. 543 nebst Holzschnitt (Celebes).

Zanthojoppa n. g. **Cameron, P.**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 378. — *trilineata* p. 378—379 ♀ (Indien).

Xestojoppa n. g. (steht *Zanthojoppa* sehr nahe). **Cameron, P.**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 379—380. — *olivacea* p. 380—381 ♀ (Indien).

Die einzelnen Subfamilien.

Subfam. I: Ichneumoninae.

Umfasst die Gattungen No. 1—103 des Ashmead'schen Systems.

(Vergleiche hierzu den vorigen Bericht p. 474—480).

Aethecerus Wsm. Spp. in Steiermark. **Strobl** (2) p. 183 sq.: *dispar* Wsm. mit *var. 3-rufipes* n. p. 183—184 ♂ (bei Steinbrück). — *nitidus* Wsm., *discolor* Wsm. *var. styriacus* n. p. 184 (am Schwarzen See in den Sölker Alpen). — *frontatus* Wsm., *placidus* Wsm. mit *var. nigrocoxatus* n. p. 184 ♀ (bei Steinbrück). — *longulus* Wsm. p. 184.

Aglaojoppa n. g. **Cameron, P.**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 381—382. — *flavo-maculata* p. 382—383 (Indien).

Alomyia Pz. mit *ovator* Fbr. in Steiermark. **Strobl** (2) p. 187—188.

Amblyteles egregius ♀. **Athimus** p. 222.

Neu: **Cameron**, Trans. New Zealand Instit. vol. XXXIII: *zealandicus* p. 108. — *hudsoni* p. 109 (beide aus New Zealand). — *atratus* n. sp. (Gruppe *palliatorius*) **Berthommieu**, Bull. Soc. Entom. France, 1901 p. 321 ♀ (Environs de Digoin).

Amblyteles Wsm. Spp. in Steiermark. **Strobl** p. 161 sq.

A. *Microsticti* Wsm.: *palliatorius* Gr. mit var. 1 u. 3 u. *var. 8* n. (alle Hüften u. Schenkelringe reichlichst gelbgefleckt; Vbeine fast ganz gelb; bisw. auch 2.—4. Sgm. fast ganz gelb) p. 161 (im Gesäuse bei Admont bis 1000 m, auf der Koralpe u. bei Melk). — *spoliator* Wsm., *monitorius* Pz., *armatorius* Frst., *infractorius* Pz. p. 161. — *amatorius* Müll., *atratorius* Fbr., *natatorius* Fbr. nebst Varr., *subsericans* Gr., m. var. 1, *equitatorius* Pz., *glaucatorius* Fbr. mit *var. 4* n. (die Flecke des 4.—7. Ringes bilden vollständige, nur in der Mitte etwas verschmälerte Binden), p. 162 (auf Erlen bei Admont im Sept.). — *vadatorius* Ill., *nonagriae* Hlg., *occisorius* Gr. p. 162. — *negatorius* Fbr. p. 163. — *jugorum* (negat. sehr ähnlich, für eine sehr dunkle Var. dess. zu halten, wenn nicht der Kopf hinter den Augen stark verschmälert wäre) p. 163 ♂ (auf Hochalpenwiesen des Natterriegels). — *uniguttatus* nebst Varr. p. 163.

B. *Macrosticti*. *sputator* Gr. p. 163—164. — *haereticus* Wsm., *camelinus* Wsm., *castigator* Gr., *inspector* Wsm. nebst var., *fossorius* Gr. nebst Bem. zu d. Varr., *divisorius* Gr., *messorius* Gr. p. 164. — *mesocastaneus* Gr., *melanocastaneus* Gr. nebst Varr., *funereus* Gr., *laminatorius* Fbr., *fusorius* L., *gigantorius* Hlg., *strigatorius* Gr. p. 165.

Atractodes. Diverse Spp. aus Steiermark. **Strobl** (2) p. 252 sq., darunter bemerkenswert oder neu: *rufiventris* (durch Grösse, Färb. u. offene Spiegelzelle von *bicolor*, durch Grösse u. deutlich behaarte Augen von *gravidus* versch.) p. 252—253 ♀♂ (auf Scheiterholz im Komatenwalde, auf Schilfwiesen bei Admont). — *exilis* Curt. Bemerk. zu Thms's. Zerlegung in mehrere Spp. etc. p. 253—254; neu: *var. alpicola* (Hinterleib ganz schwarz

- oder nur am Vrande des 3. Ringes rot, alle Hüften, Schenkelringe und die 4 hint. Schenkel theilweise schwarz. — Untersch. von *picipes*) p. 254 ♂♀ (auf Hochalpen um Admont u. Hohentauern, sogar bei Sebenico in Dalmatien). — Bemerk. zu *picipes* Hlg., hierzu *var. nigripes* (Beine durchaus schwarz) p. 254. — *foveolatus* Gr. nebst *var. n.* ♀ (9 mm gross, Fühler ganz schwarz) p. 254. — *rufipes* Thms. (Spiegelzelle bald offen, bald geschlossen, bei 1 Exempl. rechts offen, links geschlossen) p. 255. — *alpinus* (*picipes* u. *tenebricosus* nahe, untersch. durch geringe Grösse, das 1. Sgm., den Quernerv der Hflgl., von *picip.* auch durch kahle Augen, den kurzen oval. Hleib, von *tenebr.* durch sehr kleine Klauen) p. 255 ♂ (auf Hochalpenwiesen des Kreuzkogel bei Admont). — *tenebricosus* Gr. variiert mit nur in der Mitte röthl. Schienen u. fast ganz schwarz. Beinen. Ist eine Uebergangsart zu *Stilpnus* und lässt sich schwer davon unterscheiden p. 255—256.
- Anisobas cingulatorius* Gr. Fundort. **Strobl** (2) p. 166.
- Apaeleticus* Wsm. noch nicht aus Steiermark bekannt. **Strobl** (2) p. 169.
- Atanytoppa* n. g. (in Ashmead's Classification der Joppini, Proc U. S. Nat. Mus. v. XXIII p. 13, der amerik. Gatt. *Lindigia* Kriechbaumer nahe, d. jedoch sehr verschieden in der Form ist. Charakt. sind die sehr kurzen, stark erweiterten Antennen, das sehr lange Abdomen, dess. mittl. Segmente am Rande stark verbreitert sind, das vorstehende Labrum, das flache, stark gekielte Scutellum) **Cameron, P.**, Proc. Zool. Soc. London 1901 vol. 2 p. 37. — *flavomaculata* (*nigra*, pro-mesothoraceque albo-maculatis; metathorace rufo; abdomine late albo-lineato; pedibus anterioribus albis, posticis nigris, basi tibiarium late alba; alis hyalinis, stigmatate testaceo) p. 37—38 ♀ (Borneo). — *rufomaculata* (vorig. sehr ähnlich, doch Mediansgm. an der Basis und in der Mitte breit schwarz, desgl. auch die Metapleuren an der Basis) p. 38—39 ♀ (Khasia).
- Automalus alboguttatus* Gr. Fundort. **Strobl** (2) p. 166.
- Centeterus opprimator* Gr. in Steiermark. **Strobl** (2) p. 177.
- Charitojoppa* n. g. (*Magrettia* nahest., versch. durch: „scutum flat, not pyramidal, a. incised at the apex; the hind coxae bear teeth and the 2nd a. 3rd abd. sgms. not longitudinally striated“) **Cameron, Ann. Nat. Hist.** (7) vol. 7 p. 383—384. — *coerulea* p. 384—385 ♀ (Indien).
- Chasmodes lugens* Gr. u. *motatorius* Gr. in Steiermark. **Strobl**, Mittheil. naturw. Ver. Steiermark. Jahrg. 1900 (37. Hft.) p. 135.
- Cillimus* Tosq. ist in Ashmead für *Callimus* zu setzen (p. 477 des vor. Ber.) **Dalla Torre** p. 51.
- Colobacis* n. g. (*Amblyteles* nahe) **Cameron, Trans. New Zealand Instit.** p. 110. — *forticornis* p. 110 (New Zealand).
- Colpognathus celerator* Gr. nebst 2 Varr. in Steiermark. **Strobl**, p. 176.
- Cratojoppa* n. g. (zu den Joppina, wohl zu d. *Hemijopp.* *Doryphorae* Kriechb. gehörig. Die unterscheid. Charaktere sind: short, stout, dilated antennae, quite flat large scutellum, not keeled laterally, 3 central narrow areae, not clearly separated, on the median sgm. Median sgm. large, w. gradually rounded slope; spiracular area bounded by two keels) **Cameron, P., Ann. Nat. Hist.** (7) vol. 7 p. 281—282. — *robusta* p. 282—284 ♀ (Indien).

- Degithina* n. g. (Ichneumon nahe) **Cameron**, Trans. New Zealand Inst. vol. XXXIII p. 111. — *buchanani* p. 112. — *caroli* p. 113. — *dauidi* p. 114. — *hectori* p. 114 (sämmtl. von New Zealand).
- Diadromus* Wsw. Spp. in Steiermark. **Strobl** (2) p 184 sq.: troglodytes Gr. p. 184—185, nebst var. 1 Wsm. u. var. 2 n. (normal, aber 10. u. 11. Fühlerglied nicht weiss, sondern ebenso roth, wie die übr.) p. 185 ♀ (an Bachrändern bei Admont) — *collaris* Gr. m. var. *nigrithorax* (fast wie var. 2) p. 185 ♀ (bei Steinbrück). — varicolor Wsm. p. 185. — intermedius Wsm. var. *nigripes* n. p. 185 ♂ (im Gehäuse; auf Alpenwiesen des Gr.-Glockners) u. var. *nigerrima* n. p. 185 (auf Krummholzwiesen des Kalbling bei Admont). — *rufiventris* (steht varicolor am nächst.) p. 185—186 ♀ (Murauen bei Radkersburg). — *guttulatus* Gr. p. 186. — *albiceps* (mit *collaris*, noch mehr aber mit *caudatus* Gr. verw., untersch. durch reichl. weisse Zeichn. etc. p. 186—187 ♂ (im Waldgras des Gesäuses).
- Diadromus capitosus* **Berthoumieu**, Bull. Soc. Entom. France, 1901, 321 ♀ (Évian [Savoie]).
- Dicelotus*. Spp. in Steiermark. **Strobl** (2): *pumilus* Gr. mit var. 1. Hlg. u. var. 3 n. ♀ (Beine roth, nur Hinterhüften u. Spitze der Hinterschenkel schwarz) p. 176. — *alpigenus* n. (Färb. d. Gesichts u. Hleibs. wie Ichn. pusillator Gr., Färb. d. Beine wie Ichn. rufilimbatus Gr.) p. 176 ♂ (auf der Scheibleggerhochalpe, 8. VIII.).
pumilus Wesm. Varr. ders. **Berthoumieu**, Bull. Soc. Entom. France, 1901, p. 321: 1. var. *punicus* ♀ (differt basi tibiaram albida et corpore forsan angustiore. An nova species?) p. 321 (Ain Draham, Tunisie). — 2. var. *anal* ♀ (Differt postpetiolo medio laevi, segmentis 6—7 rufis, coxis rufis aut nigris) p. 321 (Évian [Savoie]).
- Dinotomus* Först. Besch. d. Gatt. Steht in der britischen Liste vor *Trogus* Panz. **Morley**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 249. — *lapidator* Fab. Besch., wohlbek. Parasit v. *Papilio machaon*. p. 249—250. — *pictus* Kriechb. Besch., aus *Apatura Iris* p. 250—251.
- Dimaetha?* n. g. (gehört zu dee Hemijoppini, passt aber in keine der Untersektionen Kriechbanmer's. Untersch. von vorig. Gatt. **Cameron**, P., Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 277. — *tibialis* p. 278 ♀ (Indien).
- Eurylabus*. Sp. in Steiermark: *larvatus* Gr., *torvus* Wsm. p. 166. — *bimaculatus* (kleinste Sp. der Gatt., habituell Plat. pedat., sehr ähnl.). **Strobl** p. 166—168 ♀ (auf Laub in einem Holzschlage bei Admont).
- Exephanes occupator* Gr. var. *unipunctatus* n. **Strobl**, Mittheil. naturw. Ver. Steiermark, Jahrg. 1900 (37. Hft.) p. 135 (Steiermark, Admont).
leucaniae **Tryon**, Queens. Agric. Journ. 1900 p. 141 Taf. CLXXIV Fig. 3.
- Exolytus laevigatus* Gr. Normalform u. Varr. **Strobl** (2) p. 251—252. Bemerk. dazu.
- Gatethus* n. g. (in Kriechbaumer's Eintheilung der Joppinen gehört sie zu den Holojoppinen u steht der amerikanischen Microjoppa am nächsten. Sie unterscheidet sich von ihr in: areolet being four-sided, the nervures being united at the top, in the scutellum, not being quite flat and not incised at the apex, and in the ventral fold being distinct.; antennae shorter etc. Charakteristisch der stark längsgestreifte Rücken des Abd.). **Cameron**, P.,

Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7. p. 275—276. — *melanocerus* p. 276—277 ♂ ♀ (Indien).

Gnathonyx marginellus Gr. in Steiermark. **Strobl** (2) p. 169.

Heliopelmus leucostigmus in Steiermark. **Strobl** (2) p. 165. Ashm. schreibt in der Klassifikation *Hepiopelmus*.

Herpestomus pinetorum n. sp. (affinis *H. erythrogastro*). **Berthoumien**, Bull. Soc. Entom. France, 1901 p. 321 ♀ (Environ de Digoin)

— Wsm. Spp. in Steiermark. **Strobl** (2): *brunnicornis* Gr. p. 169. — *flavoclypeatus* (möglicherweise, doch nicht wahrscheinlich das ♂ zu *intermedius* Wsm. ♀) p. 169—170 ♂ (auf Waldlichtungen des Schafferweges bei Admont, VII). — *furunculus* Wsm. p. 170. — *phaeocerus* Wsm. var. *alpicola* n. p. 170—171 ♀ (auf Alpenwiesen des Pyrgas bei 1800 m), ferner var. *rufomarginatus* n. (vielleicht eine eigene Art) p. 170 ♂ (am Lichtmessberge), sowie Beschr. eines weiteren ♂ von Sumpfwiesen bei Admont). — *laevifrons* (diese ♂ sind d. normal *phaeoc.* so ähnl. dass als plast. Untersch. nur die äusserst glänz., sehr sparsam punkt. Stirn nebst Wangen angegeben werden kann) p. 171—172 ♂ (es lässt sich eine *forma alpina* u. *form. montana* unterscheiden). — *jugicola* (steht dem *phaeoc.* sehr nahe, doch reichlicheres Gelb am Kopf, schmal rothgesäumt. Hleib. etc.) p. 172—173 ♂ (auf Hochalpenwiesen des Natterriegel). — *cordiger* (auch m. *phaeog.* verw.) p. 173 ♂ (auf Reinen bei Melk). — *albomaculatus* (sehr auffallend durch den weiten Kiefern-Augenabstand u. den Bau des Metathorax) p. 174—175 ♂ (auf Alpenwiesen des Scheiblstein u. Bösenstein). — *facialis* Gr. p. 175. — *filiiformis* (sehr zart u. schlank von der Tracht eines *Hemiteles*) p. 175—176 ♂ (auf Sumpfwiesen der Kaiserau bei Admont).

Hoplismenus terrificus Wsm., *perniciosus* Gr., *uniguttatus* Gr., *pica* Wsm. u. *luteus* Gr. in Steiermark. **Strobl** (2) p. 160—161.

Hypomecus albitarsis Wsm. nebst var. 2 in Steiermark. **Strobl** (2) p. 166.

Ichneumon. Spp. aus Steiermark u. angrenz. Gebieten. **Strobl**, Mittheilgn. naturw. Ver. Steiermark, Jahrg. 1900 (37. Hft.) p. 136 sq.:

I. Sekt. Hlg.: *pisorius* L. Gr., *simulatorius* F. Hlg. *sugillatorius* L., *cyani-ventris* Wsm., *sinister* Wsm., *leucocerus* Gr., *lineator* Gr., *Helleri* Hlg. mit var. *rufipes* n. (dem *rufinus* Wsm. noch ähnl. als die norm. *Helleri*) p. 136 (Steiermark). — *comitator* L. (Melk, Innsbruck, im oben genannt. Gebiete noch nicht beobachtet), *derasus* Wsm., *bilineatus* Gr. nebst var. *vexator* Wsm. Beschr. d. ♀, *castaneiventris* Gr., *albuguttatus* Gr., *fuscipes* Gmel. p. 137.

II. Sekt. Hlg.: *pistorius* Gr., *culpator* Schrk., *trilineatus* Gr., p. 137.

III. Sekt. Hlg.: *multiannulatus* Gr. m. *forma alpina* n. p. 138 ♂ (auf Krummholzwiesen des Kalbling bei Admont). — *computatorius* Müll. p. 138. — *sarcitorius*, *xanthorius* Gr., *confusorius* Gr., *stramentarius* Gr., *croceipes* Wsm., *fulvicornis* Gr., *suspiciosus* Wsm., p. 139. — *gracilentus* Wsm., p. 139—140. — *pseudogracilentus* p. 140 ♀ (auf Hochalpenwiesen des Pyrgas). — *vicinus* Hlg., *vivacior* Tischb. p. 140. — *terminatorius* Gr. p. 141. — *xanthocnemis* (Taschb.'s Tab. führt auf *stram.* u. *term.*, denen er verw., doch versch. durch gelb. Schienen, gelb. Gesicht, gelbgefleckt. Thorax) p. 141—142 ♀ (auf Fichten bei

Seitenstetten). — *tempestivus* Hg., *luctatorius* L., *Thomsoni* Hlg., *memorator* Wsm., *latrator* Fbr. p. 142. — *incomptus* Hlg. (♂ variieren: 1. Gesicht ganz schwarz. 2. Gesichtslleisten gelb. 3. Gesicht gelb m. schwarz. Mittelstrieme. 4. Gesicht ganz gelb) p. 142—143. — *grossorius* Fbr., *divergens* Hlg. p. 143. — *gracilicornis* Gr. m. verschied. Varr., darunter *var. admontensis* n. p. 143 ♂ (im Veitlgraben bei Admont). — *emancipatus* Wsm. mit versch. Varr., dar. *var. alpina* n. (Gesicht fast ganz schwarz, entw. nur die Augentränder oder auch 2 Kopfschildpunkte gelb; Schildch. gelb oder schwarz) p. 144 ♂ (im Gesäuse, um Admont u. Hohentauern bis 1900 m. VII—VIII). — *indiscretus* Wsm., *caloscelis* Wsm. in versch. Varr., *raptorius* L. in versch. Varr., *caedator* Gr., p. 144. — *insidiosus* Wsm., *balteatus* Wsm., *stigmatorius* Zett. m. 2 Varr., *versutus* Hlg., *variolosus* Hlg., p. 145. — *variegatorius* Hlg. *var. annulatus* n. p. 145—146 (auf Blättern im Johnsbachgraben). — *quaesitorius* L., *cessator* Müll., *melanosomus* Wsm., *luteipes* Wsm. p. 146. — *brunneosparsus* (scheint mäklini Hlg. am nächst. verw.) p. 146—147 ♂ (auf Donaugesträuch bei Melk, im Mai). — *punctus* Gr. nebst *var.* p. 147.

IV. Sekt. Hlg.: *gemellus* Gr. p. 147.

V. Sekt. Hlg.: *saturatorius* L. mit mehr. Varr., *faunus* Gr. mit 1 Var., *bimaculatus* Wsm. p. 148.

VI. Sekt. Hlg.: *luteiventris* Gr. mit 1 Var., *nigritatorius* Gr. mit versch. Varr., *dissimilis* Gr. p. 148. — *fabricator* Fbr. normal, Varr. u. 1 Abnorm.? p. 148—149. — *curvinervis* Hlg. p. 149. — *angusteanmulatus* (*curvinervis* sehr ähnl.) p. 149—150 ♀ (in ein. Bergschlucht bei Hohentauern, 1300 m, Juli). — *pallifrons* Gr., *varipes* Gr., *corruscator* Gr. m. *var. lucidus* (als Art), *clericus* m. *var. 1 n.* (auf Birkenlaub bei Seitenstetten).

VII. Sekt.: *sicarius* Gr. m. *var. alboannulatus* n. (Fühler m. weiss. Sattel, sonst normal, also nicht = *tenebrosus* Wesm., am Lichtmessberge) p. 150. — *rufifrons* Gr. p. 150. — *lanius* Gr. p. 150—151. — *vacillatorius* Gr., *Eupitheciae* Br., *lacteator* Gr., *monostagon* Gr., p. 151. — *bicristatus* (in Tracht, Struktur u. Färb. verw. m. *monost.*, versch. durch bedeut. Grösse, Bau des Hinterrückens u. d. 1. Ring. u. Färb. d. Hinterleibes) p. 151—152 (in Bergwäldern bei Admont). — *leucomelas* Gm. normal u. 1 abweich. ♀ p. 152. — *leucomelanoides* (*leucomelas* nahest.) p. 152—154 ♂ (auf Eichen- u. Kirschenlaub bei Admont u. Seitenstetten). — *melanarius* Wsm., *oscillator* Wsm., *flaviger* Br. Beschr. des dazugestellt. ♂, *albipictus* Gr., p. 154. — *albocingulatus* (*albopictus* am nächst., durch viel reichere weissl. Zeichn. u. den meist einfach punktierten Hinterrückstiel versch.) p. 154—156 ♂, hierzu *var. 1 n.* ♂ (Hinterrücken ohne weiss. Fleck, Binde des 3. Ringes auf 2 Seitenflecke reduziert) p. 156 (Normalf. im Gesäuse am 1. Aug., *var.* in Waldschlucht bei Seitensteten). — *disparis* Poda, *vestigator* Wsm., *lepidus* Gr., *sedulus* Gr., *chionomus* Wsm., *tergenus* Gr., *anator* Fbr., *albosignatus* Gr., *callicerus* Gr., *angustatus* Wsm. p. 156. — *bilunulatus* Gr., *derivator* Wsm., *discrepator* Wsm., *haesitator* Wsm. mit *var. 1 n.* ♂ (2.—5. Ring rothbraun, ± schwarz gefleckt oder gewölkt) p. 157 (im Gesäuse). — *var. alpina*

n. (Grösse, Skulptur, Färb. des Thorax u. Hleibs normal, sonstige Färb. sehr versch.) p. 157 ♂ (an Bachrändern der Scheibleggerhochalpe bei Admont). — *rufipes* (etwa neben deriv. u. haesit., aber durch Hleibsskulpt. u. Färb. leicht zu unterscheiden) p. 158 ♂ (in Waldlichtungen bei Admont).

VIII. Sekt. Hlg.: *ruficeps* Gr. p. 158. — *ochropis* Gmel. mit var. 1. n. ♂ (nur die inneren Augenränder breit weiss; Hschenkel. u. Hschienen. m. schwarzer Spitze) p. 158–159 (in einer Waldschlucht bei Admont). — *alterator* Wsm. mit var. 1 n. ♀ (auch das 3. Sgm. theilweise roth) p. 159 (bei Seitenstetten, Juni), var. 2 *nigriventris* n. (Hinterleib ganz schwarz) p. 159 ♂ ♀ (im Stiftsgarten u. Waldschluchten um Admont u. bei Melk). Beschr. des noch nicht beschr. ♂. — var. 3 n. ♂ (wie var. 2, auch Vordertheil des Schildchens u. das Hinterschildch. schwarz: Vorderhüften weiss gefleckt, ausserdem Stirnleisten, auch die äusseren Augenränder weiss) p. 159 (um Admont u. im Gesäuse). — *castaneus* Gr. mit verschied. Varr., *defraudator* Wsm. p. 159. — *pictus* Gr. p. 159–160. — *semirufus* Gr. nebst var. *obscuripes* p. 160 ♂ (im Kematenwalde bei Admont). — *rudibundus* Gr., *albicinctus* Gr., *albilavatus* Gr. p. 160.

aureipes ♀ (I. *aureipes* ♂ Berth. 1er suppl. aux Ichneumonides. No. 2). (Groupe *Lineator*) **Berthoumieu**, Bull. Soc. Entom. France, 1901, p. 320 ♀ (Barcelone). — *strenuus* n. (Groupe *castaneus*) p. 320 ♀ (Environs de Digoïn). — *operosus* (Groupe *castaneus*) n. sp. p. 320 (Environs de Digoïn).

semirufus auct. Bemerk., Beschr. u. s. w. **Kriechbaumer**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 5 Hft. p. 243–246. — *quaesitorius* ♂ var. *subfasciatus* n., eine vermuthliche Varietät dess. p. 246–248. — *leucomelas* Gm. Wsm. Ueber . . . p. 248–250. — *albicollis*, ein ♂ dess. m. weissem Fühlersattel p. 250–251. — *subannulatus*. Ueber . . . p. 251.

quittardi Pic, Echange T. XVII p. 24 (Frankreich).

annulicornis **Szépligeti** in Zichy's Ergebn. 2. Bd. p. 148 (Sibirien).

— Aus New Zealand beschreibt **Cameron** in Trans. New Zealand Inst.: *pyrastis* p. 115. — *frederici* p. 116. — *richardi* p. 117. — *wellingtoni* p. 117.

solicitorius in New Zealand, auf *Ricinus communis*, den ölig. Saft aus den Drüsen in den Blattachseln saugend. **Smith, W. W.**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 11 (36) p. 161.

Ichnogaster fuscibucca n. sp. **Berthoumieu**, Bull. Soc. Entom. France, 1901, p. 323 ♀ (Évian, Savoie).

Ichnus nigricollis Wsm. in Steiermark. **Strobl** (2) p. 187, sowie einige nicht von Strobl gesammelte Arten.

Ktenostilpnus n. g. Stilpnin. (differt a Stilpno antenn. 19 artic., articulis flagelli aequalongis, unguiculis pectinatis, abdomine ♀ clavato). **Strobl** (2) p. 256. — *aequearticulatus* p. 256–257 ♂ ♀ (auf Voralpenwiesen des Natterriegels; am Götzenberg in Siebenbürgen).

Lamprojoppa n. g. **Cameron, P.**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 482–483. — *coerulea* p. 483 ♀ (Indien).

Limerodes arciventris Boie. Fundort. **Strobl** (2) p. 166.

Misetus oculatus Wsm. in Steiermark. **Strobl** (2) p. 187.

Neotypus lapidator Fbr. Fundort. **Strobl** (2) p. 166.

Obba Tosquinet ist durch *Tosquinetia Ashm.* nom. nov. zu ersetzen in *Ashmead* p. 14 (p. 476 des vor. Berichts). **Dalla Torre, K. W.** p. 51.

Pachyjoppa n. g. (Färbung wie *Gathetus*, *Facydes* u. *Dimaetha*. Unterschiede). **Cameron, P.**, *Ann. Nat. Hist.* (7) vol. 7 p. 374—375. — *tibialis* p. 375—376 ♀ (Indien).

Phaeogenes Wsm. Spp. in Steiermark. **Strobl** (2) p. 177. — *semivulpinus* Gr. nebst *var. 3* n. (auch die vord. Schenkel grösstenteils schwarz) p. 177 (am Lichtmessberge, 5. VIII). — *planifrons* Wsm., *melanogonus* Gr. mit *forma alpina* n. ♂ p. 178 (am Hochschwung, 1900 m). — *scutellaris* Wsm., *stimulator* Gr., *callopus* Wsm., *fulvitaris* Wsm., *versutus* Wsm., *bellicornis* Wsm. p. 178. — *rusticatus* Wsm. p. 179. **Strobl** zieht ein ♂, gefang. im Sunk bei Hohentauern, hierher; falls die Zucht aber noch ein besser zu rust. passend. ♂ ergibt, so schlägt Verf. für das Stück aus Sunk den Namen *flavoclypeatus* vor p. 179. — *fuscicornis* Wsm. *Beschr. d. ♂*, *trepidus* Wsm. p. 179. *Beschr. d. ♂ u. var. 1* n. (von Bachrändern bei Admont. — ♂, Stirn nur zerstreut punktiert, stark glänzend, vielleicht eigene Sp.). — *nanus* Wsm. nebst *divers.* Varr., *infimus* Wsm., *minutus* Wsm. p. 180, *Beschr. d. ♂* p. 180—181 (an ein. Waldbach bei Seitenstetten) — *nigridentis* Wsm., *ischiomelinus* Gr., *eques* Wsm., *flavidus* Wsm., *amoenus* Wsm. (von *bellicornis* nur durch die ganz einfachen Hinterbüften unterscheidbar). *Beschr. d. von Wsm.'s* Angab. abweich. ♀ p. 181—182, falls dieses spezifisch versch., so *alpinus* n. zu nennen. — *impiger* Wsm., *vafer* Wsm. nebst *var. 1* n. ♀ (Fühler ganz rot. — Auf Krummholzwiesen des Natterriegel) u. *var. 2* n. ♀ (ausser Sgm. 2 u. 3 auch 1 ganz rot, sonst normal. — Auf dem Hofmoore bei Admont) p. 182. — *macilentus* Wsm., *suspica* Wsm. mit *var. 1* Wsm. (aber Fühler ganz schwarz, Schenkelringe gelb. — Am Schafferwege bei Admont) u. *var. 4* n. ♂ (2 gelb. Linien an der Flgl.-Basis, sonst normal. — Auf der Hofwiese bei Admont) p. 182. — *argutus* Wsm., *socialis* Rtz. p. 182. — *alpicola* p. 182—183 (auf Hochalpenwiesen des Pyrgas u. Kreuzkogels bei Admont).

corcyriensis **Berthoumieu**, *Bull. Soc. Entom. France* 1901 p. 321—322 ♀ (Ile de Corfu). — *major* p. 322 (Savoie). — *inanis* p. 322 (Savoie). — *tenuidentis* p. 322—323 ♀ (Évian, Savoie). — *atratus* p. 323 ♀ (Évian, Savoie). — *nigrinus* p. 323 ♀ (Environs de Digoïn).

Platylabus. Spp. aus Steiermark. **Strobl** p. 168—169: *rufus* Wsm., *leucogrammus* Wsm., *pedatorius* Fbr. nebst Varr., *pumilio* Hlg., *orbitalis* Gr., *rufiventris* Wsm., *decepiens* Wsm., *Thedenii* Klg. *var. 1*, *cothurnatus* Gr. p. 168. — *dimidiatus* Gr. m. *var. discedens* Gr. p. 169.

tibialis **Ashmead**, *Psyche* vol. IX p. 147 (New Mexico).

Probolus alticola Gr. u. *concinus* Wsm. in Steiermark. **Strobl** (2) p. 166.

Pseudamblyteles neomexicanus **Ashmead**, *Psyche* vol. IX p. 147 (Nord-Amerika).

Stenodontus theresae **Pic**, *Exchange T.* XVII p. 93 (Frankreich).

Stilpnus. Spp. aus Steiermark. **Strobl** (2) p. 256: *gagates* Gr., *Pavoniae* Scop. (Normalf.: Hüften u. Schenkel nebst Fühlerbasis ganz rot. — Hinterbüften schwarzgefleckt: *var. 1* Br. — auch die vord. ± schwarz u. die Hschenkel

schwarzgefleckt: *var. 2 maculipes* n. ♂, bisw. bei dieser auch die Fühlerbasis fast ganz schwarz) p. 256. — *tenuipes* Thms. u. *blandus* Gr. p. 256.

Trogus Gr. mit *lutorius* Gr. nebst *var. u. exaltatorius* Pz. in Steiermark. Fundorte von *Automalus alboguttatus* Gr., *Anisobas cingulatorius* Gr., *Neotypus lapidator* Fbr. u. *Limerodes arctiventris* Boie. **Strobl** (2) p. 165–166.

Zestocormus n. g. (*Eurylabus* nahest.). **Cameron**, Trans. New Zealand Inst. vol. XXXIII p. 118. — *melanopus* p. 119 (beide aus New Zealand).

Subfam. II: Cryptinae.

Umfasst die Gattungen No. 104–286 des Ashmead'schen Systems.

(Vergleiche hierzu den vorigen Bericht p. 480–489).

Acanthocryptus. Spp. aus Steiermark. **Strobl** (2) p. 216 sq.: *flagitator* Gr. *var. tyrannus* (Gr., Tasch. ♀ als Sp.) ist nur eine *Var.* mit ganz schwarzen Hüften u. Schenkeln p. 216. — *quadriscipinus* Gr., *nigriceps* Thms. m. *var. 1* n. (Taster weiss, Basalhälfte d. Kopfschildes gelb) p. 216 (auf Waldblättern im Gesäuse). — *nigrita* Gr. u. Tasch. Charakter eines ♂ v. *Piesting* p. 216. — *rugiventris* p. 216 ♂ (auffallend durch die offene Spiegelzelle eines Hemiteles, den Metathorax eines *Acanthocr.*, die etwas spitze Diskoidalzelle eines *Stylocr.* u. die mit 4 Leistenpaaren versehene Schildchengrube; passt eigentlich in keine der Thms.'schen Gatt., am besten hierher) p. 216–217 ♂ (Murauen bei Radkersburg).

Agrothereutes abbreviator Gr. in Steiermark. **Strobl** (2) p. 246.

Aritranis. Spp. in Steiermark. **Strobl** (2) p. 197–198: *explorator* Tschek p. 197. — *fuscicornis* Tschek p. 198 nebst *var. 1* (*Scutello nigro*) p. 198 (bei Steinbrück).

Atractodes sepedontis **Ashmead**, Bull. New York Mus. No. 47 p. 588 (Adinrocks).

Brachycephalus Först. (1868) ist durch *Brachycranium* Ashm. nom. nov. zu ersetzen. **Dalla Torre**, K. W. p. 51. — cf. vor. Bericht p. 483.

Caenocryptus rufiventris Gr. in Steiermark. **Strobl** (2) p. 196.

Callicryptus. Als Typus ist in **Ashmead** p. 43 statt *Cryptus fasciatus* Brullé [den es nicht giebt] Cr. „fusco“-*fasciatus* anzuführen. **Dalla Torre**, K. W. p. 51.

Calocryptus congruens Gr. in Steiermark. Varr. d. ♂ ♀ a) Hleib theilweise blutrot (Normalform), b) ganz schwarz. **Strobl** (2) p. 204.

Chaerethymma Frst. Spp. in Steiermark. **Strobl** (2) p. 192: *stomatica* Gr. p. 192. — *lateannulata* n. (opaca ähnl.) p. 192–193 ♂ (auf *Salvia glut.*, Erlen, Fichten im Gesäuse; um Admont, auf der Koralpe). — *anatoria* Gr. p. 194. — *bipunctata* p. 194 ♂ (auf Alpenwiesen des Kalblings u. Pyrgas, auch am Bucecs in Siebenbürgen. — Scheint nur Kalkgebirge zu bewohnen, möglicherweise nur alpine Race der *anatoria*) nebst *var. schistacea* n. p. 194 (auf Alpenwiesen des Bösensteins; scheint Urgebirgsform von *bipunctata* zu sein). — *leucopsis* Gr. p. 194, *forma alpina* n. p. 194 (Vor-alpen des Scheiblssteins). — *quadriannulatus* (stimmt fast mit *leucopsis* überein) p. 195 ♂ (in der Donau bei Melk). — *parvulus* Gr. nebst *var. 1* p. 195. — *exareolatus* (auffallend durch unvollständige Spiegelzelle eines Hemiteles, steht am besten neben *parvulus*) p. 195–6 ♂ (unter Fichten, im Gesäuse).

- Gatt. No. 272 (p. 486 des vorigen Berichts) lies *Chaeretymma* statt *Chaeretymna*.
- Coelocryptus rufinus* Gr. in Steiermark. **Strobl** (2) p. 204—205.
- Cryptus 4-guttatus* Gr. **Kriechbaumer** (siehe vorig. Bericht sub No. 5). Bisher nur das einz. bei Niesky in d. Lausitz gefang. ♀ Grav.'s. Durch Kriechbaumer's Sohn 4 weit. ♀ u. 1 ♂ erbeutet bei Leoben bei Meran zw. 29. u. 31. VIII. — Nahe über dem Bod. flieg. — Vielleicht die Larve der klein. schwarz. Pompil. als Wirt. Pomp. tripunctatus grosse Aehnlichk. m. dies. Crypt. Wo nistet dieser und wie ist es den Parasiten möglich, sein Ei an oder in Larv. oder Puppe des Pomp. zu legen?
- Diverse Spp. aus Steiermark. **Strobl** (2) p. 189—190, dar. die etwas abweichende Beschr. eines ♂ von Steinbrück.
- myrmecoleontis* **Rudow**, Iusektenbörse, 18. Jhg. p. 325 (aus Puppenkugeln von *Myrmeleon* gezogen).
- murorum* var. n. **Szépligeti** in Zichy's Ergebn. 2. Bd. p. 147.
- Eurycryptus* n. g. Cryptinorum (leicht erkenntl. am grossen breiten Kopf, der hinten nur schwach entwickelt ist etc.). **Cameron, P.**, Proc. Zool. Soc. London. 1901, p. 231—232. — *laticeps* (niger, flavo-maculatus; alis hyal., stigmatate nervisque nigris) p. 232 ♀ (New Britain).
- Habrocryptus assertorius* Gr. in Steiermark. **Strobl** (2) p. 196 ♀ (variirt: a) Nur 1.—5. Sgm. roth, b) Hinterleib ganz roth). — *brachyurus* Gr. a) Normalform von Admont etc., Bergwiesen bis 1900 m Höhe. — var. *b* n. ♂ (Metathorax ungefleckt, die weiss. Zeichn. des Kopfes u. des Thorax sparsam. — Mit der Normalform vereinzelt). — var. *c* n. ♂ p. 196 (wie a oder b, aber Hintertarsen ohne weiss. Ring). — var. *d. alpina* n. ♂ p. 196 (auf Hochalpenwiesen bei Admont). — var. *e* n. ♂ (wie d, aber Fühler u. Htars. ganz schwarz) p. 196 (auf Hochalpen bei Admont). — *alternator* Gr. nebst var. 1 (2. u. 3. Sgm. schwarzgefleckt) p. 196 (bei Steinbrück, Lemberg etc.).
- Hemiteles Gr. Zahlreiche Spp. aus Steiermark. **Strobl** (2) p. 230—245. Als bemerkenswerth o. neu seien aufgeführt: *bicolorinus* Gr. mit var. 1 u. 5, sowie var. 6 n. (die 2 Flg.-Binden ebenso deutlich wie beim ♀) p. 230 (auf der Scheiblegger Hochalpe). — *bifasciatus* n. (fasciipenni simill.; differt antenn. tricolor., metathor. glabro, nitido, thorace pr. max. p. rufo, abdom. rufo, segm. 4. et 5. nigro fasciato; areola completa) p. 230—231 ♀ (Cilli). — *flavocinctus* (pictipes u. varicoxis am nächsten, aber durch Färbung ausgezeichnet) p. 232—233 ♂ (Gesäuse). — *varicoxis* Tasch. Beschr. d. ♂. — *castaneus* var. *atricornis* n. p. 233—234 ♀ (wie normale, doch ganz schwarze Fühler, u. Legeröhre nicht halb so lang wie Abd.) p. 233 (auf Ennsgeräuch bei Admont). — *bispinosus* (Schmd.'s. Tab. führt auf rugifer Thoms., wovon Thms. kein ♂ beschr. u. nach Schmd. das ♀ noch unbekannt ist) p. 234—235 (auf Wiesen u. Waldlicht. bei Admont). — Beschr. von *sordipes* ♂ p. 235. — *cynipinus* Thms. (von *minutus* fast nur durch den antefurcalen, gebrochenen Quernerv der Hflgl. unterscheidbar u. wohl nicht specif. versch.) p. 236. — *vicinus* var. *rufipes* n. (Fühlerwurzel, Schenkel u. Schienen roth) p. 236 (auf Laub bei Melk). — *alpivagus* (von *scabriculus* oder *vicinus* versch. durch den glänzenden, sehr zerstreut, nur in den beiden Eindrücken vor dem Schildchen etwas düster punkt. Thoraxrücken) p. 236—237 ♂ (auf Alpen-

wiesen des Kalbling, Kreuzkogel u. Scheiblstein). — *pseudorubiginosus* (rubig. am nächsten, aber versch. durch Färb., vollständig. Felderung des Metathorax u. starke Punktierung des Abd.) p. 237—238 ♂ (auf Wiesen bei Admont). — *pluricinctus* n. (Färb. wie *fragilis* u. *imbecillus* Gr., doch Kopf u. Thorax glänzend, Felderung vollständig) p. 238—239 ♂ (auf Hochalpenwiesen des Pyrgas). — *Taschenbergi* Schm. (das ♂ variiert bedeutend, Beschr. des ♀) p. 239—240. — *dubius* Gr. (Besch. d. ♂ von den Autoren mangelhaft). Strobl giebt p. 240—241 eine Beschr. d. wahrsch. ♂. — *var.* 1 p. 241 sammelte er in Jativa in Südspanien (2. Ring nur an der Basis roth, Hschenkel oberseits, Hschienen gegen die Basis braunschwarz, Hinterhüften u. Fühler schwarz, nur der Schaft roth). — *infumatus* Thms. ♂ p. 241. — *macurus* Thoms. nebst *var.* 1 (1. u. 2. Sgm. ganz glatt). — *decipiens* Gr. *var.* 3 n. (wie *var.* 1 Br., doch Vorderhüften u. Schenkelringe weiss; 2. Sgm. vorn m. schwarz. Binde, 3. u. 4. seidl. schwarz gefleckt, oberes Mittelfeld länger als breit, nach vorn verbreitert) p. 241 ♂ (auf Gesträuch im Wolfgraben bei Trieben). — *oxyphymus* Gr. (Besch. d. alpin. Form. u. der aus tiefer geleg. Gebieten) p. 241—242. — *floriculator* Gr. *var. melampus* n. (Kopf, Fühler, Beine, Hleib schwarz. nur Endsaum des 2. u. Basis d. 3. Sgmts. schmal roth, ebenso alle Knie u. die ganz. Schienen) p. 242 ♂ (auf Alpenwiesen des Kreuzkogels bei Admont). — *imbecillus* Gr. mit *var.* 3 n. (1.—3. Ring ganz roth, sonst wie Normalf.) p. 242 ♂ (im Waldgras bei Melk). — *luteiventris* Gr. ♂ ist sicher ein *Pezomachus*, höchstwahrsch. = *terebrator* Rtz. Desgl. *palpator* Gr. ♂ u. zwar eine Form des ♂ von *cursitans* Gr. p. 242. — *aestivalis* Gr. mit *var.* 1—4. — *pseudominutus* (Fast wie *minutus*, nur versch. durch die kleine, kaum in der Anlage vorhandene Spiegelzelle, das minder schlanke 1. Sgm. mit stark vorspring. Luftlöchern u. das bis zum glatt. Endrande sehr dicht längsrisrige oder gerunzelte 2. Sgm. etc.) p. 243—244 ♂ ♀ (auf Wiesen bei Admont) nebst *var. jugorum* (von norm. ♂ nur versch. durch ganz schwarzbraune Hüften, Schenkelringe u. Schenkel) p. 244 (auf Kalbling bei 2000 m). — *gracilis* Thoms. nebst. *var. solutus* (Thms. u. Schm. als Art, sicher nur Var.; einziger Untersch. nur im Geäder u. ist nicht constant). — *anticecinctus* (auffall. Thier, verbindet die Tracht eines *Phygadeuon* m. d. Punktierung u. off. Spiegelzelle eines *Hemiteles*. Lässt sich nach keiner Tab. annähernd bestimmen) p. 244—245 ♂ (im Mühlauerwalde bei Admont).

— *rufipleuris Szépligeti* in Zichy's Ergebn. 2. Bd. p. 144 (Sibirien).

Hoplocryptus Spp. aus Steiermark. Strobl (2) p. 202—203: *fugitivus* Gr. nebst *var.* 6 n. = *var.* 5 *Tasch.* = *gracil.* *var.* 1 Gr., aber Augenränder und Schildchenspitze weiss p. 202. (auf Fichten bei Admont). — *gracilis* Gr., *confector* Gr., *insectator* Tschk. Beschr. des ♂ p. 202—203. — *nigripes* Gr. nebst *var.* m. weiss. Ring der Htarsen u. *subcinctus* Gr. mit *var.* 1 n. (auch das 2. u. 4. Sgm. mit rother Binde) p. 203 (in Waldgras bei Melk).

Idiolispa analis Gr. nebst *var. obovata* in Steiermark. Strobl (2) p. 192. — *jugorum* n. (Unterschiede von der ähnl. *analis*) p. 192 ♀ (Stilfserjoch in Südtirol).

Leptocryptus Thms. 9 Spp. aus Steiermark. Strobl (2) p. 228—230, dar. neu: *prominens* n. (Grösse u. Färb. wie *aereus*, unterschieden durch das bedeutend kürzere u. breitere 1. Sgm. m. stark vorspringenden Knötchen u. d. deutlich

gebrochenen Quernerven der Hflgl.) p. 228—229 ♀ (Waldhohlweg bei Admont).

Leptodemas Först. in Ashm. p. 28 für Leptodermas zu setzen (p. 482 des vor. Ber.) **Dalla Torre, K. W.** p. 51.

Macrogaster arundinis in Norfolk. **Wheeler, F. D.**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 14.

Mecocryptus caliginosus Gr. in Steiermark. **Strobl** (2) p. 208.

Mesostenus. **Strobl** (2) führt auf diverse Spp. aus Steiermark, dar. notatus Gr. var. 1 n. (3. Ring ganz, alle Schenkel grösstentheils roth) p. 203 (in Waldgras bei Admont). — Bemerk. zu obnoxius Gr. u. furax Tschek. p. 203.

albovinctus (dem *pygostolus* Gr. [von Thomson wohl versehentlich *pygoleucus* genannt?] in Körperform u. Grösse äusserst ähnl., in Färbung bestimmt verschieden). **Kriechbaumer**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jahrg. 5. Hft. p. 254—265 ♀ ♂ (Aegypten).

Microcryptus. Spp. aus Steiermark. **Strobl** (2): *improbus* Gr. (Beschr. des richtig. ♂, das ♂ Gr. u. Tasch. gehört nicht hierher) p. 208 — *graminicola* Gr. p. 208 nebst var. *infuscata* (abweich. Färb.) p. 209 ♀ (am Lichtmessberg bei Admont). — *rubricollis* Thoms. p. 209. — *rufithorax* n. (*rubricollis* sehr ähnlich) p. 209—210 ♀ (in Wäldern um Admont). — *rufidorsum* p. 210 ♀ (in einer Bergschlucht bei Hohentauern). — *jejunator* Gr. p. 210—211. — *abdominator* Gr., *orbitalis* Thms., *cretatus* Gr., *gilvipes* Gr., *juvencus* Gr. mit versch. Varr., subvarr. von var. 1: a) auch die Vorderhüften grösstentheils gelb, ♂; b) Augentränder schwarz, ♂; c) Augentränder u. Hinterschildchen schwarz, ♂. — var. 5 n. ♂ (Kopf, Schildchen, Hinterschildchen u. bisw. d. grösste Theil der Schenkel schwarz) p. 212 ♂ (Admont, bis 1700 m, Seitenstetten). — var. *hostilis* p. 212. — *triannulatus* Gr., *areolaris* Thms. (Thms. Beschr. ist konfus). var. p. 212, nebst Beschr. p. 212. — *arridens* Gr., *lactear* mit var. ♀ (das 1. Sgm. fein punktiert, nicht längsrisig) p. 212 (auf der Kребenze). — *galactinus* Gr. (es finden sich alle Uebergänge zu sperat. var. 3 Gr., daher hat Strobl galact. nicht für spezifisch verschieden gehalten). — *sperator* Gr. var. 1 Gr. u. Tasch. variirt wieder. — var. 2 Tasch. p. 213 (vom Ennsthal bis 2000 m, var. 3 Tasch. stellt Strobl zu galact. p. 213. — var. 5 (Gesicht ganz weiss, Vorderseite des 1. Fühlergl., der grösste Theil der vord. Schenkelringe u. Vorderhüften weiss etc.) p. 213 ♂. — var. 6 *albitarsis* n. (oder n. sp. — Gesicht, Hüften u. Schenkelringe wie bei 5, aber Hinterleib schwarz etc.) p. 213—214 (unter Fichten bei Ost-Gattersboden). — *basizonius* Gr., *distans* Thms., *assimilis* Gr. nebst *forma alpina* (ganz schwarze Schenkelringe, fast ganz schwarze Hbeine etc.) p. 214 (auf Voralpen und Hochalpenwiesen bei Admont). — *brachypterus* Gr. Variation p. 214. — *micropterus* Gr. Variation p. 214—215. — *puncticollis* Thoms. (Var. 1: ♂. Kopfschild u. Hhüften, schwarz., Vhüften röthl. weiss, nicht reinweiss). — var. 2 ♂ (Kopfschild roth, 1. Fühlerglied u. Hhüften schwarz) p. 215 (bei Admont etc.) — *gravipes* Gr., *halensis* Tasch. nebst var. *exannulata* p. 215 ♀ (auf Alpenwiesen des Pyrgas). — *procerus* Gr. ♂, ♀ noch unbekannt.

xanthostigma Szépligeti, Zichy's Ergebn. 2. Bd. p. 145 (Kazan).

Osphrynchotus macrobatus Gr. u. melanoleucus Gr. aus Steiermark. **Strobl** (2) p. 189.

Pezomachus Gr. Diverse Spp. aus Steiermark. **Strobl** (2) p. 246 sq., dar. neu: *terebrator* Ratz. var. *latecinctus* n. p. 247 ♂ (Segm. 2 ganz, 3 fast ganz roth) p. 247 ♂ (auf Sumpfpflanzen des Hofmoores u. der Kaiserau bei Admont; auch bei Seitenstetten). — *fasciatus* F. var. *obscuratus* n. (dunkler gefärbt) p. 248 ♂ (in der Krummholzregion des Pyrgas). — *cursitans forma alpina* n. (Hschenkel ganz, die übrigen theilweise u. alle Hüften grösstentheils schwarz, Hleib schwarz, nur der 2. Ring m. rothem Hsaum) p. 248 (auf Alpenwiesen bei Admont u. Turrach). — *instabilis* Frst. var. *alpigena* n. (ganz schwarz, m. schwarz. Fühlern, Hüften, Schenkeln u. theilweise schwarzen Schienen) p. 248 ♀ (auf Alpenwiesen des Scheiblstein bei Admont, auch am Dobratsch in Kärnten). — *transfuga* var. 1 n. (Metathorax u. 2. Ring verdunkelt) p. 249 ♀ (unter Fichtenrinde am Lichtmessberge). — *vigil* Frst. var. 1 n. (innere Augenlider roth) p. 249 ♀ (auf einem Holzblocke im Triebenthal bei Hohentauern). — *anguinus* Frst. var. *macroptera* (stimmt genau nach Frst., hat aber vollständig entwickelte Flgl.) p. 249 ♂ (an Sümpfen bei Admont u. Seitenstetten). — *noricus* (auffallend durch d. zwei Quermakeln des 2. Ringes) p. 249—250 ♀ (am Heiligenbluter Tauern, gewiss auch im steirischen Urgebirge). — *claviventris* (ausgezeichnet durch d. eigenthüml. Färb. u. durch den gegen die Spitze hin stark gewölbt. u. verbreitert. Hleib von allen Arten Thoms. u. Frst. versch.) p. 250—251 ♂ (auf Alpenwiesen des Rothkofel bei Turrach).

Phygadeuon. Spp. aus Steiermark. **Strobl** (3) p. 220—228: *bitinctus* Gmel., *afflictor* Gr., Beschr. d. ♀. Diese Art steht wohl besser bei *Acanthocryptus*, da der Hwinkel der Diskoidalzelle beinahe ein rechter ist u. auch der Metathorax dorthin verweist. p. 220. — *pseudovulnerator* n. (stimmt fast mit *vulnerator* Gr. u. Thoms., ab. kleiner u. andere Färbung) p. 220—222 ♂ (Wiesen bei Krumau u. Kaiserau; bei Admont). — *nyctemerus* Gr., *varicornis* Thms., *speculator* Gr., *Heinemanni* Frst. ♀ (bei St. Michael, ausgezeichnet durch verkürzte Flügel), *vagans* Fr. mit var. 2 n. ♂ (nur die Hinterschenkel schwarz), nicht so selten var. 3 n. ♂ (nur 2. u. 3. Sgm. roth, schwarz gefleckt, 4. u. 5. schwarz mit rothem Endsäume) p. 222. — *semipolitus* Tasch., *leucostigmus* Gr., *nanus* Gr. p. 222 nebst var. 1 n. p. 222—223 (Fühler u. Schenkelringe ganz schwarz) (im Kematenwalde bei Admont). — *cephalotes* Gr. (die Felderung des Metathorax ist häufig eine vollständige, so dass man nach Tasch.'s Tab. auf *afflictor* ♀ geräth, der sich aber durch nicht 2-zähn. Kopfschild und den vollkommen polirten Hleib unterscheidet) p. 223. — *clypearis* Tschek. i. litt. (in Grösse, Färb., Punktirung, Skulpt. u. Geäder *cephalotes* gleich) p. 223 ♀ (Piesting, Seitenstetten). — *variabilis* Gr. nebst var. 1, 2 u. var. 3 n. (Beine u. Hüften ganz roth, nur Basis der Hhüften braun) p. 223 (bei Melk). — var. 4 *alpina* (kleiner, Hleib schwarz 2. u. 3. Ring roth gerändert etc.) p. 224 ♂ (auf Alpen am Admont u. Hohentauern — 1 ♂ mit offener Spiegelzelle) — *dumetorum* Gr., *exiguus* Gr., *hercinicus* Gr. nebst var. 1 n. ♀ (der 4. Ring u. der grösste Theil d. Hinterschenkel schwarz). — *ovatus* Gr., *fumator* Gr. nebst var. 1 u. 2 Gr., p. 224. — var. 3 u. 4 Gr. = *flavicans* Thoms. u. *inflatus* Thoms. p. 224—225. — var. 5, 6, 8 Gr., var. *oppositus* (Thms., 960 als Art), var. *trichops* Thms. 962 als Art) p. 223. — var. *troglydites* p. 223—224. — var. *laeviventris*, var. *rugulosus* (Gr. u. Tasch. als Sp., sicher nur eine Var. des *fum.* p. 226,

eine Subvar. dess. (Hschenkel ganz, Mittelschenkel theilweise schwarz) p. 226. — *ambiguus* Gr. (scheint von *fum.* kaum spezif. versch. zu sein) p. 226—227. — *diaphanus* Gr. (ebenfalls sehr nahe mit *fumator* verw.) p. 227. — *testaceus* Tasch. nebst *var. 1 n.* (Hschenkel u. Fühlerende schwarz) p. 227 (in Wäldern u. Voralpenwiesen um Admont, Sirbitzkogel, Cilli, Seitenstetten). — *rufulus* Gr., *tenuipes* Gr. Beschr. der nach Gr. u. Tasch. als hierher gehörig bestimmt. ♀; sie nähern sich *Leptocryptus*, gehören aber sicher zu *Phyg.*) p. 227—228.

Plectocryptus, Spp. von Steiermark. **Strobl** (2): *curvus* Gr. p. 205. — *perpillator* Gr. variiert *b) n.* (Thorace, scutell. u. postscut. totis nigris) p. 205 ♂. — *c) rufofemoratus* n. (femoribus totis rufis) p. 205 ♂ (bei Volosea). — *albolineatus* n. (*curvus* sehr ähnlich) p. 205 ♀ (Waldlichtung b. Admont). — *arrogans* Gr. mit *var. effeminatus* Gr. nebst ♂ *subvar. n.* (Fühler ganz schwarz, innere Augenränder weiss, sonst genau nach Tasch.) p. 206 ♂ (im Gehäuse etc.). — *digitatus* Gr. Varr. d. ♂ u. ♀, bei den letzt. findet Strobl ausser der Normalform noch *var. ruficoxata* n. (alle Hüften roth, innere Augenränder gelb u. *var. nigrofemorata* n. (alle Schenkel mit Ausnahme der Spitze braun oder schwarz, vorletzte Glied, d. Htarsen weiss oder — gleich den übrigen — schwarz) p. 206 (auf Voralpen). — *grisescens* Gr. mit *var. 1* (das 3. u. 4. oder auf die Endhälfte des 2. Gliedes der Htarsen weiss) p. 206 ♂ (Admont, Melk, Bregenz, Piesting). — Diese Art gehört nach Schmiedeknecht, *Crypt.* 1890 p. 40 zu den Tryphoniden u. bildet eine neue Gattung, ob schon publicirt?

Plesignathus Först. in Ashmead's System p. 28 statt *Plesiognathus* zu setzen. **Dalla Torre, K. W.** p. 51.

Pocilocryptus n. g. *Cryptidarum*. (Die auffallende, vorherrschend gelb mit schwarzen Flecken, von allen paläarkt. *Cryptiden* abweichende, an ähnl. gefärbte *Mesostenus*, sowie an gewisse *Pimpliden* erinnernde Färbung etc. scheint die Aufstellung eines n. g. zu rechtfertigen) **Kriechbaumer**, *Zeitschrift f. system. Hym. u. Dipt.* 1. Jhg. 5. Hft. p. 252—253. — *nigrosignatus* p. 253—254 ♀ (Brasil, Pará, F. Marajó, Juni).

Pycnocryptus peregrinator Gr. Varr. in Steiermark. **Strobl** (2) p. 198.

Schenkia in Ashmead's Syst. p. 30 ist wohl *Schenckia* (p. 483 d. vor. Ber.) zu schreiben. **Dalla Torre, K. W.** p. 51.

Skeatia n. g. *Mesosteninorum*. **Cameron, P.**, *Proc. Zool. Soc. London*, 1901, vol. 2 p. 39—40. — *albispina* (nigra facie clypeo, mandib. tarsisque albis; coxis trochanteribusque anterioribus pallide flavis; alis fere hyalin., nervis stigmatateque nigris) p. 40—41 ♂ (Bukit Besar, Malay Peninsula). — *nigrispina* (Beschr. fast wie vorher, nur fällt hier „facie, clypeo, mandibulis tarsisque albis“ fort, alles ist nigris) p. 41 ♀ (Bukit Besar, Malay. Peninsula).

Sobas Frst. = *Trichocryptus* Thms. Spp. aus Steiermark. **Strobl** (2) p. 191, dar. neu: *plebeja* Tschek. *var. 1 b. n.* ♀ (wie 1 a, aber Htarsen weiss geringelt) u. *var. 3* ♀ (Fühler schwarz, Htarsen weiss geringelt) p. 191

Spilocryptus. Diverse Spp. aus Steiermark. **Strobl** (2) p. 198 sq., dar. *migrator* G. diverse Varr., dar. neu: *var. 11 n.* (= *var. 7* Gr., aber Schildchen schwarz, dafür das 1. Fühlerglied vorn weiss) p. 199. — *pygoleucus* Gr. *var. 3 n.* (wie 2 Tasch., mit ganz weiss. Gesicht, aber Hrücken u. Hüften ganz schwarz, vord. Schenkelringe weissgefleckt, Hleib schwarz, nur 2. u. 3. Ringhälfte)

p. 199 ♂ (Holzschlag bei Seitenstetten). — *var. 4 n.* ♂ (Kopf, Thorax, Hüften ganz schwarz, sonst normal) p. 199 (im Hofmoore bei Admont; Südbayern). — *var. 5 n.* ♂ (Kopf, Schildchen, Schenkel u. Hleib schwarz; nur d. 2. u. 3. Ring mit rothem Endsaum) p. 199 (auf Voralpenwiesen bei Admont). — *var. 6 n.* (Kopf, Thorax, Hleib, Hüften u. Schenkelringe schwarz, nur die orbitae frontales schmal weiss, das 2.—4. Sgm. mit breit. rothem Endsaum) p. 199 ♂ (bei Melk). — *quadricinctus n.* p. 200 ♀ (nach der Best. von Thoms. u. Schmd. gelangt man auf *nasutus*; nach Tasch. auf *peregrinator*, dem er äusserst ähnl. ist, aber schlankere Schenkel, schlankere Fühler u. kürzere Legeröhre hat) p. 200—201 ♀ (auf Alpenwiesen des Kreuzkogel bei Admont, 1900 m). — *aterrimus Gr.* Bemerk. hierzu. p. 201—202. Ergänzt. z. Beschr. d. ♀. p. 201—202.

Stenocryptus. **Strobl** (2) führt auf eine Reihe von Spp. aus Steiermark, darunter: *nigripes* (oviventer sehr ähnlich) p. 207—208 ♂♀ (auf Hochalpenwiesen des Kreuzkogel bei Admont; auf dem Stilsferjoch in Südtirol).

Stylocryptus. Spp. aus Steiermark. **Strobl** (2) p. 218—220: *vagabundus Gr.*, *profligator Gr.*, *clypealis Thms. m.* *var. 1 n.* (Oberkiefer, Kopfschild, Taster, Vorderseite des 1. Fühlergl., die 4 vord. Hüften und alle Schenkelringe weiss; Hinterbeine schwarz, nur Schienenbasis etwas rötl., sonst normal) p. 218 ♂ (auf Blättern im Gesäuse; Südbaiern). — *parviventris Gr.*, *varipes Gr.*, *brevis Gr. m.* *var.*, dar. 1 Form: alle Hüften gelbrot, Basis der Fühler ganz rot, Sattel aber rein weiss) p. 218 (bei Admont u. Seitenstetten). — *senilis Gr.* p. 218 nebst *var. alpina n.* p. 219 (Fühler und Schenkel ganz schwarz) p. 219 (auf Hochalpenwiesen des Pyrgas). — *analisis Thms.*, *erythrogaster Gr.*, *obscuripes Tasch.* p. 219. — *atratus n.* (verwandt mit *minutulus Thms.*) p. 219 ♂ (auf Hochalpenwiesen des Kalbling und Kreuzkogel bei Admont). — *transverse-areolatus n.* (vor. sehr nahe) p. 219—220 ♂ (auf Ennsgesträuch bei Admont; Hochalpenwiesen des Natterriegels).

Theroscopus. 3 Sp. aus Steiermark. **Strobl** (2) p. 245—246.

Vagenatha n. g. *Mesosteninorum* (in Ashmead's System, Bull. U. S. Nat. Mus. v. XXIII p. 44, steht die Gatt. *Mesostenoides* u. *Christolia* nahe. Charakt. sind die deutl. getrennt. mittl. Abdominalsegm., die an den Enden bedornt sind, ebenf. die Dornen am basal. Ventralsgm.) **Cameron, P.**, Proc. Zool. Soc. London 1901 vol. 2 p. 42—3. — *spinosa* (nigra, flavo-macul., spinis flavis; coxis postic., apice femorum posticor. apiceque tibiarum posticarum nigris; alis hyal., nerv. stigmatique nigr.) p. 42—43 ♂ (Borneo).

Xanthocryptus n. g. *Cryptinorum* (könnte zu den *Mesostenini* gestellt werden, hat aber wohl schwerlich den Habitus der Gruppe oder den der *Cryptini*. Die Vordertibien erinnern an die *Xoridini* (*Xylonomus*), aber ihr sonstiger Habitus erinnert an die *Mesostenini*. Die kleine Areola, die an der Basis zusammengezogenen Vordertibien, das quergestreifte Mediansegment, die niedergedrückte (depressed) Spitze des Clypeus u. das vorragende Labrum machen sie leicht kenntlich) **Cameron, P.**, Proc. Zool. Soc. London, 1901 p. 233. — *robustus* (luteus etc., antenn. nigris, albo annulatis, alis fulvohyalinis nervis stigmatique nigris) p. 233—234 ♀ (New Britain).

Subfam. III: Pimplinae.

Umfasst die Gattungen No. 287—417 des Ashmead'schen Systems.
(Vergleiche hierzu den vorigen Bericht p. 489—506).

Clepticus Hal. (1839) dafür setze *Mischoxorides* Ashm. nom. nov. **Dalle Torre**, **K. W.** p. 51. — cf. vor. Ber. p. 506.

Anarthronota Schmiedekn. Besch. d. ♂ v. An. Manca Brauns. Wirt: *Lasiocampa Quercus*. **Brauns**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 3. Hft. p. 158.

Brachycentrus brachycentrus Gr. in Steiermark. **Strobl** (2) p. 204.

Certonotus Kriechb. Ueber die Ichneumoniden-Gattung *C. Krieger*, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 3. Hft. p. 113 sq. mit Taf. II. Besch. der Gatt. nebst Abb. dazu. Erinert durch die Bildung des Mittelrückens an *Rhyssa*, ist aber nicht nur durch das gefelderte Mittelsgm., sondern auch durch vieles andere, besonders durch die ganz andere Bildung des Kopfes u. des Flügelgeäders zu unterscheiden, so dass kaum eine nähere Verwandtschaft zw. beiden anzunehmen ist. — Scheint auf die austral. Region beschränkt zu sein. Tabelle für die meist neuen Arten:

- | | | | |
|--|----------------------|----------------|---------------------------------|
| 1. Fühler an der Spitze in grösserer Ausdehnung weiss. | ♀ 12 mm. | Neu-Süd-Wales. | 4. <i>C. hinnuleus</i> n. sp. |
| — Dieselb. schwarz oder nur an den letzt. Gliedern heller. | | | 2. |
| 2. Bruststück rot oder gelb. | | | 3. |
| — Bruststück schwarz mit hellen Flecken. | | | 4. |
| 3. Körper gelb mit wenigen schwarzen Zeichnungen. | ♀ 13—15 mm. | Neu-Süd-Wales. | 3. <i>C. humeralifer</i> n. sp. |
| — Körper rot mit schwarz. Hinterleibe. | ♂ 17 mm; ♀ 13—15 mm. | Neu-Guinea. | 2. <i>C. seminiger</i> n. sp. |
| 4. Mittelhüften ganz schwarz. | ♀ 14 mm. | Neu-Guinea. | 1. <i>C. similis</i> n. sp. |
| — „ weiss oder gelb gezeichnet. | | | 5. |
| 5. Schildchen schwarz. | ♀ 13½ mm. | Australien. | <i>C. varius</i> Kriechb. |
| — „ gelb. | ♀ 20 mm. | Aru. | <i>C. flaviceps</i> Voll. |

Verf. unterscheidet folg. Sekt.:

Sectio I. *Clipeus maior*. Maxillae et labium longa. Pronoti anguli posteriores simplices. Notauli et metauli minus conspicui. Mesolcus clausus. Area basalis segmenti mediani nulla. Membrana petioli brevis. Tibiae posticae extrinsecus prope basin scrobiculo instructae: *similis* (in Färb. d. *varius* Kriechb. u. *C. flaviceps* Voll. sehr ähnlich) p. 116—119 ♀ Fig. 4, 11, 13, 16 (Milne Bay, Neu-Guinea). — *seminiger* p. 119—121 ♀♂ Fig. 1 (Milne Bay, Neu-Guinea).

Sectio II. *Clip. minor*. Pron. ang. posteriores tuberculo instructi. Notauli et metauli distincti. Mesolcus apertus. Area basalis segm. med. distincta. Membr. petioli spiracula superans. Tibiae post. extrinsecus scrobiculo nullo, sed infra medium spinula crassa instructae: *humeralifer* p. 121—123 ♀ Fig. 2, 5—10, 12, 14, 15, 17 (Neu-Süd-Wales). — *hinnuleus* p. 123—126 Fig. 3 ♀ (Neu-Süd-Wales). — Tafelerkl. p. 126.

Crypturus Grav., dafür *Endurus* Rond. 1876 zu setzen in Ashm. p. 47. **Dalla Torre**, **K. W.** p. 51. — cf. vor. Ber. p. 490.

Echthrodoca. Schmiedekn. Bemerk. **Brauns**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 3. Hft. p. 157—158. Der Satz: *Metathorax* an den Seiten n. deutl.

- Längsleiste ist auf das ♀ zu beschränken. Färb. d. ♂ (Ungarn: Budapest; Carlsbad; Schlesien: Siegersdorf; Göttingen).
- Echthrus Grav., als Syn. dazu in Ashm. p. 60 ist Sphaetes Bremi zu setzen.
- Dalla Torre, K. W.** p. 51.
- Gr. gehört besser zu den Pimplariae. **Strobl** (2) p. 188.
- Ephialtes sanguinicornis Brauns**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 4. Hft. p. 183—184 ♀ (Thüringen).
- Euctenopus**. Besch. **Ashmead** p. 50.
- Glypta paleanae Kriechbaumer** in Reuter, Acta Soc. Fauna Flora Fenn. vol. XIX No. 1 p. 121 (Finland).
- Glyptogastra hawaiiensis Ashmead**, Fauna Hawaiiensis vol. I p. 338 (Kilauea).
- Hadropimpla** statt **Habropimpla** p. 504 des vorig. Berichts.
- Itopectis exareolata Ashmead**, Psyche vol. IX p. 147 (New Mexico).
- Ishnocerus rusticus** Fourc. aus Steiermark mit den Varr.: α) *seticornis* Kr., β) *flicornis* Kr. u. γ) *nigricornis* n. p. 204 ♂ ♀ (in Bergwäldern bei Admont u. Trieben, im Gesäuse) **Strobl** (2) p. 203—204.
- Lissonota rubriplagiata Cameron**, Trans. New Zealand Inst. vol. XXXIII p. 106 (New Zealand).
- Lissonotinen**. Nachträge. **Brauns**, . . .
- Lissopimpla** Kr. = (**Xenopimpla** Cam.). **Cameron**, Trans. New Zealand Inst. vol. XXXII p. 18.
- Meniscus varipes** fällt mit **murinus** zusammen. Siehe **Phytodietus**, — desgl. **M. plantarius** Gr. für **Phytodietus plantarius** Gr. — **Alloplasta** Först. wird am besten bei **Meniscus** belassen. **Brauns**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 3. Hft. p. 160.
- Notopimpla** Krieger nicht **Kriechb.** **Dalla Torre, K. W.** p. 51. — cf. vor. Ber. p. 502.
- Nyxeophilus** Först. Besch. **Marshall**, Entom. Monthl. Mag. (2) vol. 12 (37) p. 290. Die Besch. wurde vor Durchsicht des Ashm.'schen Werkes niedergeschr. Angabe der Differenzen. — *corsicus* n. sp. p. 291—292 ♀ (Forest of Monte d'Oro, Corsica).
- Pezomachus rossicus Szépligeti** in Zichy's Ergebn. 2. Bd. p. 143 (Kazan).
- Phygadeuon csikii Szépligeti** in Zichy's Ergebn. 2. Bd. p. 146. — *lucidus* p. 147 (Kazan).
- Phytodietus** Gr. Bemerk. dazu. **Brauns**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 3. Hft. p. 160. — a) ist m. **Brischke** u. and. der Ansicht, dass **Ph. segmentator** Gr. u. **coryphaeus** Gr. nicht zu trennen, Br. will auch **geniculatus** m. segm. vereinigt sehen, da Untersch. zu gering p. 160. — b) **plantarius** Gr. ist kein **Phytodietus**, sondern ein **Meniscus**, u. zwar zur Gruppe des **murinus** Gr. gehörig (hat ebenf. weisse Zeichn.). **Meniscus varipes** Szepl. fällt m. **murinus** zusammen. — **plantarius** Gr. muss von nun an **Meniscus plantarius** Gr. heißen. p. 160. Besch. d. ♂ p. 177.
- Procinctus** Först. in Ashm. p. 47 ist nach **Dalla Torre, K. W.** p. 51 zu den **Lissonotinen** zu stellen. — cf. vor. Ber. p. 491 u. 499. — **Ashmead** schreibt **Procinetus**. — **Kriechb.** u. **Dalla Torre** **Procinctus**.
- Rhyssa fulva** (lutea, capite pleurisque flavis; flagello antennarum, mandib. verticeque nigris; tarsis posticis fuscis; alis hyalinis, macula substigmatali fusca) **Cameron, P.**, Proc. Zool. Soc. London, 1901, p. 229—230 ♂ (New

Britain). — *tridentata* (nigra, late flavo-macul.; segm. med. flavo; alis hyal., macul. substigm. nigro-coerulea; pedibus rufis, tarsis fuscis) p. 230—231 ♀ (New Britain).

persuasoria, Parasit v. *Sirex gigas* in Blandford u. Scotland. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 11 (36) p. 291.

Syzeuctus Först. Die von Schmiedeknecht hierunter vereinigt. Sp. gehören streng genommen nicht alle hierher, denn das von Först. der Namenbildung zu Grunde gelegte Merkmal, passt eigentl. nur für maculatorius Gr., tenuifasciatus Schmied., irrisorius Rossi, heluanensis Schmied. u. elegans Szepl., nur bei dies. 5 ist keine Spur einer Längsleiste an den Seiten des Metathorax aufzufinden. Bei den echt. S. herrscht gelb u. roth am Hleibe vor. Brauns, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 3. Hft. p. 177. Die von Schmiedeknecht (cf. vor. Bericht, p. 500 gegeb. Bestimmungstabelle wird von Brauns nach neueren Gesichtspunkten umgearbeitet) Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 4. Hft. p. 178—179:

1. Seitenleisten des Metathorax fehl., Zeichn. des Körpers gelb oder röthl., aber nie ganze Hleibssgme. einnehmend (Syzeuctus s. str.) 2.
- Seitenleiste meist sehr deutl., Zeichnung des Hleibs vorherrschend roth oft ganze Sgm. von dieser Farbe.
2. Querleiste des Hinterrückens fehlend . . . 3, vorhanden . . . 5.
3. Endrand der Vflgl. ohne merkliche Trübung, Mitte des Gesichts bei ♂ u. ♀ schwarz; Beine mit Ausschluss der Hüften u. Trochanteren rothgelb; Zeichnungen gelb irrisorius P. Rossi.
- Endrand der Flgl. mit deutl. Trübung oder mit Endfleck 4.
4. Körper mit vorherrschend gelber Zeichnung; Endrand der Flgl. mit scharf begrenzt. braunen Endfleck; Gesicht gelb, Hschenkel schwarz. heluanensis Schmied.
- Kopf u. Thorax fast ganz schwarz, Hleib mit rother Zeichnung; Endrand der Flgl. mit stark rauchiger Trübung; Hschenkel roth elegans Szepl.
5. Zeichnung des Körpers gelb maculatorius Gr.
- Zeichn. des Kopf u. Thorax gelb, des Hleibs röthlich var. tenuifasciatus Schmiedekn.
6. Beine fast ganz schwarz, Hleib grösstentheils roth Stecki Brauns.
- Beine vorwiegend roth 7.
7. Vorderkörper meist mit reicher gelber Zeichnung { ♀ 8.
♂ 10.
8. Flgl. mit dunkler zieml. scharf begrenzt. Makel vor der Spitze; diese selbst hell; die 3 erst. Hleibssgm. roth ♀ luniger Brauns.
- Ebenso aber die rothen Sgm. u. auch das 4. u. 5. mit gelb. Endrändern var. Brausii Szepl.
- Wie luniger, aber Basis des 1. Sgms. schwarz var. multipictus Kriechb.
- Ebenso ab. Hleib roth, nur letztes Sgm. schwarz var. maculipennis Costa.
- Flgl. vor der Spitze mit schwach dunkl. Querbinde, die nicht scharf begrenzt ist, Kopf u. Thorax fast ohne Zeichn. schwarz, die 3 erst. Sgm. des Hleibs roth Schmiedeknechtii Brauns.
- Flgl. hyalin 9.

- Post. tibiae with 1 or 2 apic. spurs 2.
 Post. tib. without apic. spurs.
 2^d a. 3^d abd. sgms. without lunulae Tribe II Cteniscini.
 2. Post. tib. w. only 1 apic. spur 4.
 Post. tib. w. 2 apic. spurs.
 Abd. sess. or subsess., nev. distinctly petiolate 3.
 Abd. distinctly petiolate.
 Claws simply, not pectinate Tribe I Mesoleptini.
 Claws pectinate Tribe III Ctenopelmini.
 3. Claws pectinate.
 Claws simple, not pectinate Tribe III Ctenopelmini.
 Mand. bidentate Tribe IV Tryphonini.
 Mand. tridentate Tribe V Bassini.
 4. Middle tib. w. only 1 apic. spur 6.
 Middle tib. w. 2 apic. spurs
 Face norm. not swollen 5.
 Face abnorm., greatly swell., h-femor. usually short a. much swell.
 Scape lengthened, not short, globose
 Tribe VI Orthocentrini.
 Scape short, globose Tribe VII Exochini.
 5. Abd. sess.; dors. of 1st a. 2^d sgms. w. 2 parall. carinae
 Tribe VIII Tylecomnini.
 Abd. petiol., the petiole long; dorsum of 2^d sgm. without carinae;
 scutell. margined; areolet in front wings not large, subsess. rhomboid
 Tribe IX Sphinctini.
 6. Face a. scutell. norm. Tribe II Cteniscini.
 Face scutatif.; scutell. quadrang., margined laterally; abd. long, sess.,
 the sides parallel or nearly, coarsely punctate; areolet in front-
 wings usually large, lozengoidal, or diamond-shaped
 Tribe X Metopiini.

Tribus I. Mesoleptini.

(= Tryphonides homalopi Holmgr. (part.) 1855 = Mesoleptoidae Fam. 35 Först.
 = Mesoleptina Trib. 1883 = Mesoleptini Tribe I Ashm. 1894 u. 1900
 dito Davis 1897) p. 64).

Im deutl. gestielt. Abd. übereinstimm. m. Ichneum. u. Crypt. u. einig. Ophion.,
 von allen (ausser einig. Form. d. letzt. Trib.) sofort unterscheidb. durch gerad.,
 nicht ellenbogenf. Petiol., Lage d. Spirac. in od. vor d. Mitte. Von d. wenig.
 Ophion.-Gatt. m. gleich. Spirac.-Lage versch. d. nicht komprim. Abd. Letzt.
 endet auch nicht b. d. ♂ in 2 lang. Dorn. Von der einz. noch zu verwechs.
 Gruppe d. Ctenopelm. versch. d. einfache, nicht gekämmte Klauen.

Uebersicht über die im Folgend. mit No. 418—453 bezeichn. 36 Gatt.
 (p. 64—67):

442. Alexeter p. 66. — 451. Asymmetictus p. 66. — 438. Callidiotes p. 65.
 — 429. Catoglyptus p. 65. — 452. Clepsiporthus p. 66. — 449. Diëdrus p. 66.
 — 437. Dizemon p. 65. — 419. Eclytus Holmgr. p. 64. — 453. Euryproctus
 Holmgr. p. 67. — 430. Gausocentrus p. 65. — 448. Genarches p. 66. —
 441. Hadrodactylus p. 66. — 447. Himerta p. 66 — 433. Homalomma p. 65.

- 426. Homaspis p. 65. — 434. Hypocryptus p. 65. — 420. Ichnaeops p. 64
 — 439. Ipoctonus p. 66. — 423. Laphyrosopus p. 65. — 431. Lathiponus
 p. 65. — 440. Mesoleptus Grav. p. 66. — 450. Neleotlymus p. 66. —
 427. Notopygus Holmgr. p. 65. — 443. Oxytorus p. 66. — 424. Perilissus
 p. 65. — 432. Phobetres p. 65. — 425. Polycinetis p. 65. — 421. Polyoncus
 p. 64. — 428. Prosmorus p. 65. — 435. Rhaestes p. 65. — 418. Spanotectus
 p. 64. — 436. Stiphrosomus p. 65. — 422. Sychnoleter p. 65. — 444. Sym-
 phobus p. 66. — 446. Terozoa p. 66. — 445. Zemiodes p. 66.

Sämmtlich, wo nicht anders bemerkt, Förster'sche Gattungen.

Catoglyptus (Stiphrosomus) *superbus* **Schmiedeknecht**, Termesz. Füzetek,
 vol. XXIII p. 237 (Carthago).

Diaborus *crassiceps* **Szépligeti** in Zichy's Ergebn. 2. Bd. p. 148 (Kazan).

Euryproctus (Syndipnus) *numidicus* **Schmiedeknecht**, Termesz. Füzetek,
 vol. XXIII p. 234 (Tunis).

Mesoleptus *annulipes* (nig., flav.-mac.; antenn. pedibusque ruf., cox. trochanteri-
 busque anter. flavis, tib. tarsisque post. fusco-nigr., basi alb.; alis hyal.)

Cameron. P., Mem. Manchester Soc. vol. XLIV No. 15 p. 103 ♂ (Khasia
 Hills). — *khasianus* (nig.; abd. rufo, petiolo nigr., ped. ant. flav.-test., post.
 rufis; cox. apice tib. post. tarsisque post. nigr.; al. hyal., nervis stigmatique
 nigr.) p. 104—106 ♂ (Khasias).

— (*Hadrodactylus*) *barbatus* **Szépligeti** in Zichy's Ergebn. 2. Bd. p. 150
 (Kazan).

Tribus II. Cteniscini.

(= Tryphonides homalopi Holmgr. (part.) 1855 = Exenteroidae Först. 1868

= Cteniscina Trib. Thoms. 1883 = Exenterini Tribe Davis 1897 = dito Tr. I
 Ashm. 1894 = Cteniscini Tribe II Ashm. 1900) p. 67).

Hinreich. unterscheidb. d. Hintertib. vollst. ohne Apicalsporen (1 Fall aus-
 genommen). — 5 Trib. hab. nur 1 Ap.-Sporn (cf. Tribus-Uebers.). Von dies. nur
 die Metopiini 2 Ap.-Sporen an d. Mitteltib., die Ctenisc. u. Metop. nur 1. Die
 merkwürd. Eigenthüml. des Gesichts u. d. Skutell. der letzt. Gruppe unter-
 scheid. diese hinreichend. p. 67.

Uebersicht üb. die im Folg. m. No. 454—466 bezeichn. 12 Gatt. (p. 67—68):

454. Acrotomus Först. = Delotomus Holmgr. p. 67. — 466. Actenonyx
 Först. p. 68. — 464. Anecphysis Först. p. 68. — 455. Anisocention Först.
 p. 67. — 463. Anderis Davis p. 68. — 459. Cteniscus Halid. = Exenterus
 Hart. p. 67. — Delotomus siehe Acrotomus. — 461. Diaborus Först. p. 68.
 457. Eridolius Först. p. 67. — 462. Excavarus Davis p. 68. — Exenterus
 siehe Cteniscus. — 465. Exyston Schiödt p. 68. — 458. Microplectron Först.
 = Smicroplectrus Thoms. p. 67. — 460. Picroscopus Först. p. 67. — Smicro-
 plectrus siehe Microplectron. — 456. Tricamptus Först. p. 67.

Tribus III. Ctenopelmini.

(= Tryphonides homalopi Holmgr. 1855 = Ctenopelmoidae fam. 34 1868

= Ctenopelmini Tribe III Ashm. 1894 u. 1900 p. 68—69).

Den Mesolept. nahe verw. Einzig. trennend. Char.: gekämmte Klauen.

Uebersicht über die im Folg. m. No. 467—483 bezeichn. 16 Gatt.:

480. Ctenacme p. 69. — 469. Ctenopelma Holmgr. p. 68. — 473. Eczetesius
 p. 68. — 477. Erromenus Holmgr. p. 69. — Euceros siehe Eumesius. —

476. Eumesius Westw. = Euceros Grav. p. 69. — 468. Labroctonus p. 68. — 481. Lathrolestes p. 69. — 479. Monoblastus Hart. p. 69. — 470. Oethophorus p. 68. — 472. Phrudus p. 68. — 482. Polyblastus Hart. p. 69. — 474. Prionopoda p. 69. — 467. Rhorus p. 68. — 475. Scolobates Grav. p. 69. — 483. Scorpiorus p. 69. — 471. Sympherta p. 68. — 478. Trichocalymma p. 69.

Sämmtl., wo nicht anders bemerkt., Först.'sche Gatt.

Eumesius tunetanus **Schmiedeknecht**, Termesz. Füzetek, vol. XXIII p. 242 (Tunis).

Polyblastus elegans **Szépliget** in Zichy's Ergebn. 2. Bd. p. 149 (Sibirien).

Scolobates italicus Gr. Weitere Bemerkungen über denselb. Untersuchung des Förster'sch. Exempl. etc. **Kriechbaumer**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 2. Hft. p. 93—96. — Wirth: *Macrophya diversipes* Schrank.

Tribus IV. Tryphonini.

(= Tryphonides homalopi part. Holmgr. 1855 = Tryphonoidae fam. 36 Först. 1868 = Tryphonina Trib. Thoms. 1883 = Euryproctides Subtrib. 1889 Thoms. = Tryphonini Tribe Davis 1897 = dito Trib. IV Ashm. 1893 u. 1900).

Grösste u. umfangreichste Gruppe. — Uebersicht über die im Folg. mit No. 484—595 bezeichn. 111 Gatt. (p. 69—77):

Acrogonia siehe Ecclinops. — 529. Adexioma p. 72. — 527. Adranes p. 72. — 544. Aeolometis p. 73. — 520. Alcochera p. 72. — 578. Allocritus p. 76. — 504. Amorphognathon p. 71. — 521. Apimeles p. 72. — 589. Apystus p. 77. — 562. Aselasma p. 75. — 548. Asthenara p. 74. — 570. Atithasus p. 75. — 560. Atrestes p. 75. — 526. Azelus p. 72. — 499. Baryceros Grav. p. 71. — 591. Barytarbes p. 77. — 567. Boëthus p. 75. — 552. Cacotropa p. 74. — 566. Calliphururus p. 75. — 594. Campodorus p. 77. — 561. Campogenes p. 75. — 583. Camponastes p. 76. — 564. Campoporus p. 75. — 549. Camporychus p. 74. — 506. Cosmoconus p. 71. — 505. Coeloconus p. 71. — 536. Dialges p. 73. — 590. Doliocotus p. 77. — 539. Dysantes p. 73. — 525. Daspletis p. 72. — 485. Ecclinops Först. ? = Acrogonia Kriechb. p. 70. — 579. Enaectis p. 76. — 523. Epacithes p. 72. — 491. Erigloea p. 70. — Eryma siehe Neocryma. — 572. Exacrodus p. 75. — 533. Gastroporus p. 73. — 577. Gemophaga p. 76. — 494. Gnesia p. 70. — 497. Hodostates p. 70. — 592. Holmgrenia p. 77. — 501. Homobia p. 71. — 571. Hybristes p. 75. — 585. Hypamblys p. 76. — 574. Hyperallus p. 75. — 575. Hyperbatus p. 76. — 515. Isodiaeta p. 72. — 492. Labrossyta p. 70. — 522. Laepserus p. 72. — 524. Lagarotis p. 72. — 530. Lamachus p. 72. — 593. Lathrophagus p. 77. — 557. Listrota p. 74. — 595. Mesoleius Holmgr. p. 77. — 514. Narcopoea p. 71. — 516. Neales p. 72. — 511. Neleges p. 71. — Neocryma Ashm. = Eryma Först. p. 70. — 540. Noëmon p. 73. — 543. Nythophona p. 73. — 538. Oneista p. 73. — 496. Otlophorus p. 70. — 509. Otitochilus p. 71. — 486. Otoblastus p. 70. — 484. Pammicra p. 69. — 563. Pantoporthus p. 75. — 534. Pantorhaestes p. 73. — 541. Paraplesius p. 73. — 518. Perispuda p. 72. — 586. Phaestus p. 76. — 587. Phagesorus p. 76. — 553. Philotymma p. 74. — 545. Polypystis p. 73. — 513. Polyrhysia p. 71. — 559. Polyterus p. 74. — 493. Polyrtera p. 70. — 487. Protarchus p. 70. — 484. Psammicra p. 69. — 507. Psilo-

sarge p. 71. — 508. Quadrigana Davis p. 71. — 551. Rhigelus p. 74. — 488. Rhimphalea p. 70. — 582. Rhinotorus p. 76. — 568. Saotis p. 75. — 588. Sarcorychus p. 77. — 576. Scoparches p. 76. — 554. Scopesis p. 74. — 581. Spudaea p. 76. — 547. Synchnoportus p. 74. — 510. Symboëthus p. 71. — 500. Synagrypnus p. 71. — 555. Syndipnus p. 74. — 503. Synocoetes p. 71. — 580. Synodites p. 76. — 532. Synomelix p. 73. — 565. Syntactus p. 75. — 573. Tachyporthus p. 75. — 584. Tautozelus p. 76. — 558. Tlemon p. 74. — 550. Trapezocora p. 74. — 498. Trematopygus Holmgr. p. 71. — 569. Tromopoea p. 75. — 531. Trophoctonus p. 73. — 512. Tryphon Grav. p. 71. — 542. Trysicampe p. 73. — 495. Udenia p. 70. — 552. Volueris Davis p. 74. — 489. Westwoodia Brullé p. 70. — 546. Xenonastes p. 74. — 517. Zacalles p. 72. — 528. Zaphthora p. 72. — 519. Zaplethis p. 72. — 535. Zapedias p. 73. — 502. Zemiophora p. 71. — 537. Zemiophron p. 73.

Sämmtl., wo nicht anders bemerkt, Först.'sche Gatt.

Aeolometis ist mit Tachyporthus identisch. **Kriechbaumer**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 2. Hft. p. 95.

552. Cacotropa Först. in Ashm. p. 74. Hierfür ist Sphecephaga Westw. zu substituieren. **Dalla Torre, K. W.** p. 51.

545. Mesoleius (Scopesis) *bipunctatus Szépligeti* in Zichy's Ergebn. 2. Bd. p. 150 (Kazan).

490. Neocryma Ashm. (= Eryma Först.) in Ashm. p. 76 ist durch Xaniopelma Tschek (1868) zu ersetzen. **Dalla Torre, K. W.** p. 51.

406. Otlophorus *affinis* **Ashmead**, Psyche vol. IX p. 148 (New Mexico).

530. Tryphon 4 (?) sp. in Westind. **Ashmead**, Trans. Entom. Soc. London, 1900 p. 353. — *punicus* **Schmiedeknecht**, Termesz. Füzetek, vol. XXIII p. 236. — *tunetanus* p. 235 (beide aus Tunis).

Tribus V. Bassini.

(= Tryphonides schizodonti Holmgr. 1855 = Bassoidae Fam. 14 Först. 1868 = Bassina Trib. Thoms. 1890 = dito Davis 1895 = dito Trib. V Ashm. 1894 u. 1900). Wohl ausnahmslos Paras. d. Syrphiden-Fam. — Wenige Gatt., aber einzelne, so Bassus, weit verbreitet (B. laetatorius Fabr. kosmop.) p. 77.

Uebersicht über die im Folg. m. No. 596—605 aufgeführt. 10 Gatt. (p. 78):

603. Aniarophron p. 78. — 596. Bassus Grav. p. 78. — 598. Bioblapsis = Trichomastix Vollenh. p. 78. — 604. Enizemum p. 78. — 605. Homotropus p. 78. — 599. Liopsis p. 78. — 602. Phthorima p. 78. — 597. Promethes p. 78. — 601. Syrphoctonus p. 78. — Trichomastix siehe Bioblapsis p. 78. — 600 Zoothrephes p. 78.

Sämmtlich, wo nicht anders bemerkt, Förster'sche Gatt.

Aniarophron *niger Szépligeti* in Zichy's Ergebn. 2. Bd. p. 141 (Russland).

Bassus laetatorius in Westindien. **Ashmead**, Trans. Amer. Entom. Soc., 1900, p. 353.

Phthorima *rossica Szépligeti* in Zichy's Ergebn. 2. Bd. p. 142 (Kazan).

Zoothrephes *fasciatus Szépligeti*, Termesz. Füzetek vol. XXIII p. 29 (Ungarn).

Tribus VI. Orthocentrini.

(= Tryphonides prosopi Holmgr. part. 1856 = Orthocentroidae Fam. 11 Först. 1868 = Orthocentrini Trib. VII Ashm. 1894 = dito Tribe Davis 1897) p. 79. — Diese u. folg. Gruppe oft verwechs., sehr nahe verw.; meist minutiöse Form. Kopf fast kuglig, m. stark geschwoll. Gesicht unterh. d. Insert. d. Antenn. oder stark u. convex erhaben etc.

Uebersicht über die im Folg. mit No. 606 — 618 bezeichn. 12 Gatt. (p. 79 — 80. Nach Förster):

614. *Atmetus* p. 80. — 609. *Brephoctonus* p. 79. — 618. *Camarotops* p. 80. — 612. *Deleter* p. 79. — 610. *Hypoleptus* p. 79. — 607. *Mnesidacus* *Ratzeb.* p. 79. — 611. *Neuroteles* p. 79. — 615. *Orthocentrus* *Grav.* p. 80. — 616. *Phaenosemus* p. 80. — 608. *Picrostigeus* p. 79. — 617. *Stenomacrus* p. 80. — 606. *Synoplus* p. 79. — 613. *Tapinops* p. 80.

Wo nicht anders bemerkt, Förster'sche Gatt.

Neurateles (*Orthocentrus*) *variabilis* Ashm. v. St. Vincent. **Ashmead**, *Trans. Entom. Soc. London* 1900 p. 269, 353. — *meridionalis* p. 269 ♀ (Grenada, Grand Etang), dito 353. — Schwirrt in den verschiedensten Schreibweisen: „*Neurateles*, *Neuratelus*, *Neurotales*, *Neuroteles*“ in Ashm.'s Publik.

Orthocentrus insularis Ashm. in *Westind.* **Ashmead** p. 353.

Tribus VII. Exochini.

(= *Tryph. prosopi* Holmgr. 1855 = *Exochoidae* Fam. 12 1868 = *Exochini* Trib. Davis 1897 = dito Tribe VI Ashm. 1894 u. 1900).

Uebersicht über die im Folg. mit No. 619—631 bezeichnet. 13 Gattung. (p. 80—81):

622. *Alcocerus* Först. = *Exochoides* *Cress.* p. 81. — 628. *Amesolytus* Först. p. 81. — 626. *Chorinaeus* Holmgr. p. 81. — 623. *Colpotrochia* Holmgr. p. 81. — *Exochoides* siehe *Alcocerus*. — 631. *Exochus* *Grav.* p. 81. — 625. *Hyperacrus* Holmgr. p. 81. — 620. *Ischyrocnemis* Holmgr. p. 81. Type: *I. goësi* Holmgr. — 621. *Ischyrocnemopsis* n. g. p. 81. — 629. *Metacaelus* Först. p. 81. — *Mima* siehe *Polyclistus*. — *Monoplectron* siehe *Periope*. — *Oligoplectron* siehe *Periope*. — *Polyclistus* Först. = *Mima* *Davis* p. 81. — 624. *Strongyloopsis* *Brauns* p. 81. — 627. *Triclistus* Först. p. 81.

Exochus pictus var. **Szépligeti**, *Termesz. Füzetek* vol. XXIII p. 29.

regularis Ashm. u. *validus* *Cress.* in *Westind.* **Ashmead** p. 354.

albomarginatus **Szépligeti** in *Zichy's* *Ergebn.* 2. Bd. p. 141 (Kazan).

Ischyrocnemopsis n. g. (Type: *Exochoides texan.* *Cress.*) **Ashmead** p. 81. — *Untersch.* v. No. 620:

Wings w. an areolet.

Transv. med. nerv. in h.-wings; *metathor. punctate, areolated a. with lateral carinae* *Ischyrocnemis.*

Transv. med. nerv. in h.-w. angularly broken a little above the middle; *metathor. smooth, exareolated, without lat. car.*

Ischyrocnemopsis.

Periope *Curtis* = *Monoplectron* *Holmgr.* = *Oligoplectron* *Först.* p. 81.

Triclistus discretus **Szépligeti**, *Termesz. Füzetek* vol. XXIII p. 29 (Ungarn).

Tribus VIII. Tylecomnini.

(= Trachydermatoidea Fam. 13 Först. 1868 = Trachydermatini Tribe VI Ashm. 1894 = Metopiini Tribe (part.) 1897).

Davis hat versch. Fehler in der Uebersetz. v. Först. gemacht, seine Tab. z. Teil falsch. Seine Trachydermat. hat nichts m. dies. Trib. zu thun, sondern bezieht sich auf Först.'s Fam. Trachynotoidea v. Ashm. als Nototrychini Subf. Ophion. behandelt. — Steht zw. Exoch. u. Sphinctini.

Uebersicht über die im Folgend. m. No. 632—6 bezeichn. 5 Gatt. (4 nordam. 1 europ.) p. 82:

636. Catocentrus Walsh. p. 82. — 635. Lethades Davis p. 82. — 632. Pseudometopius Davis p. 82. — 634. Thibetoides Davis p. 82. — Trachyderma p. 82. — 633. Tylecomnus Holmgr. = Trachyderma Grav. p. 82.

Tribus IX. Sphinctini.

(= Sphinctoidea Fam. 19 Först. 1868 = Sphinctini Tribe IX Ashm. 1894).

Hierher die Gatt.: 637. Sphinctus Grav. p. 82.

Tribus X. Metopiini.

(= Tryph. aspidopi Holmgr. 1856 = Metopioidea Fam. 10 Först. 1868. — Metopiini Tribe X Ashm. 1894 u. 1900 = Metop. Trib. Davis (part.) 1897. — Charakt. Tib.-Sporne 1, 1, 1, Abd. langgestr. Seit. fast od. ganz parallel, Sgm. punktiert Areol. gross, rautenf. od. halmondf., Skut. quadrang., seitl. gerandet, Gesicht flach, schildf., zuw. m. Kiel) p. 83.

Hierher die beiden Gatt.: 638. Cultrarius Davis u. 639. Metopius Panz.

Subfam. V. Ophioninae.

Ashmead unterscheidet p. 83—85 12 Tribus nämlich:

- 2d rec. nerv. joining the cub. behind the transv. cub. or interstitial with it; middle tibiae always w. 2 apic. spurs 3.
- 2d rec. n. join. the cub. before the transv. cub., or it is entirely wanting (Pharsalia Cress.); if it joins the cub. behind the transv. cub. then the middle tib. have but a single apic. spur 2.
2. Middle tib. w. 2 apic. spurs; 2nd rec. u. join. the cub. before the transv. med. nerv.
- Antenn. short, clav.; mesostern. beneath flat; meson. without parapsid. furrows; metath. areolated Tribe I Hellwigiini.
- Antenn. long, subsetac.; mesostern. beneath not flat, declivous before the middle coxae; mesonot. usually w. distinct paraps. furrows; metathorax rarely distinctly areolated, usually without areas or at most with 1 or more transv. carin. Tribe II Ophionini.
- Middle tib. only w. one apic. spur., 2d rec. u. join. the cub. behind the transv. cub. or entirely wanting Tribe Nototrachini.
3. Front wings w. the stigma large, broadly triang. or broadly ovate; metathor. not produced into a neck at apex 6.
- Front wings w. the stigm. long a. narrow, most frequently lanceol., rarely broad or broadly triangular, although frequently subovate 4.

4. Metathor. at apex trunc. or rounded, but never produced into a neck which extends beyond the insertion of the h.-coxae 5.

Metathor. at apex produced into a more or less distinct neck which extends beyond the insert. of the h.-cox.; abd. frequently strongly compress. or compress. towards apex, petiolate, the petiole long, the spiracles placed much behind the middle.

Mesonot. most frequently with distinct paraps. furrows although some times without, or only delicately impress., wanting anteriorly; areol. most frequ. wanting; abd. always long, strongly compress. w. the petiole only slightly a. gradually thickened posteriorly, nev. abruptly swoll. at apex; h.-tars. usually more or less distinctly thick., especially in ♂

Tribe IV Anomalini.

Meson. without paraps. furr.; areol. oft. pres., sometimes wanting; abd. as a rule shorter a. less strongly compress., more fusiformly compressed; the petiole somewhat abruptly, convexly swoll. at apex, or at least not gradually thick. posteriorly; h.-tars. norm. very rarely thick.

Tribe V Campoplegini.

5. Spiracle of 1st abd. sgm. placed before the middle; transv. med. n. in h.-wings broken above the middle, rarely at or below the middle; abd. in ♂ not ending in 2 spines, the claspers often large, broad.

Abd. petiol., rarely subsess.; areol. in fr.-wings triang., or obliquely rhomboid., the 2d absce. of the rad. most frequently strongly curv. at its orig. a. form. w. the 1st absce. an acute angle; transv. med. n. in h.-wings brok. most freq. above the middle, rar. at or below the middle; thorax shining, most freq. impunct.; paraps. furr. pres., but delicate; ovipos. exsert.

Tribe VI Paniscini.

Abd. sess. or subsess. areol. in fr.-w., when pres., rath. large, rhomboid.; the 2d absce. of rad. straight, rarely slightly curv. at its orig., a. form. with the 1st a. obtuse angle; transv. med. nerv. in h.-w. brok. for above the middle, very near the apex; thor. usually opaque or punct. rarely smooth a. shining; paraps. furr. wanting or only slightly a. vaguely defined anteriorly; ovipos. usually short, or not at all exsert.

Tribe VII Banchini.

Spir. of 1st abd. sgm. plac. at or a little beyond the middle; transv. med. nerv. in h.-w. straight, or brok. below the middle; abd. in ♂ ending in 2 long spines; abd. petiol., polish., the ovip. distinctly exsert. but nev. very long; areol. in fr.-w. rath. large, rhomboidal

Tribe VIII Mesochorini.

6. Middle vein in h.-wings wanting or obliterated towards base; bas. nerv. distinctly thick. at apex or where it unites w. the costa or parastigma.

Tribe IX Porizonini.

Middle v. in h.-w. distinct, not obliterated towards the base.

H.-fem. beneath armed w. a strong tooth beyond the middle

Tribe X Pristomerini.

H.-fem. beneath simple a. unarmed.

Head not small, clypeus neither convex nor compress. from the sides; h.-tib. norm., not constricted at the base

Tribe XI Cremastini.

Head usually small, clyp. convex a. usually compress. from the sides; h.-tib. thick. a. usually more or less constricted at base

Tribe XII Plectiscini.

Schwierigkeiten für den Anfänger, sich in dem eigenthümlichen Verlauf im Vorderflgl. der Ophionen zurecht zu finden. **Kriechbaumer** (2) p. 20. Anmerkung.

Tribus I. Hellwigiini.

(= Hellwigioidae Fam. 6 Först. 1868 = Helwigiina Trib. Thoms. 1887 = Hellwigiini Ashm. 1894) p. 85—86.

Hierher die Gatt.: 640. *Hellwigia* Grav. p. 86.

Hellwigia obscura u. *elegans*. Deutung, Vorkommen. **Kriechbaumer** (2) p. 18—19.

Tribus II. Ophionini.

(= Ophionoidae Fam. 7 Först. 1868 = Ophionina Trib. Thoms. 1887 = Ophionini Trib. VII Ashm. 1894 = dito Trib. II Ashm. 1900) p. 86.

Hierher die echt. Ophion. nebst Verw. — Untersch. von and. Tribus siehe Uebersicht.

Uebersicht üb. die im Folg. m. No. 641—652 bezeichn. 12 Gatt. (p. 86—87):

641. *Gravenhorstia* Boie = *Odontopsis* Först. p. 86. — *Odontopsis* siehe *Gravenhorstia*. — 642. *Ophion* Grav. p. 86. cf. *Pleuroneurophion*. — 644. *Thyreodon* Brullé p. 87. — 650. *Ophionopterus* Brullé p. 87. — 651. *Retanisia* Cam. p. 87. — 652. *Agathophiona* Westw. p. 87. — 646. *Banchogastra* n. g. p. 87. — 647. *Pycnophion* n. g. p. 87. — 648. *Eremotylus* Först. — 649. *Enicospilus* Curt. — 643. *Pleuroneurophion* n. g. p. 86. — 645. *Athyreodon* n. g. p. 87.

Ophioniden. Auffassung. **Kriechbaumer** (2).

Ophionen. Thomson's Eintheilung. **Kriechbaumer** (2) p. 21.

Athyreodon n. g. (Type: *A. thoracicus* Ashm. manuscr.). **Ashmead** p. 87. — Untersch. v. *Thyreodon*: Transv. med. nerv. in h.-wings broken above the middle.

Clyp. anteriorly subangularly pointed; med. a. submed. cells in front-w. equal; ocelli not large, separ. from each other a. the eyes; eyes not extend. clearly to the base of the mand.; alw. w. a space betw.

Thyreodon.

Clyp. ant. not subang. point.; med. cell. long. than the submed.; ocell. large touching each oth. or very close a. also close to the eye margin; eyes very large, extend. clear to the mand. a. emarg. within, oppos. the antenn.

Athyreodon.

Athyreodon hawaiiensis **Ashmead**, Fauna Hawaiiensis vol. I p. 343 Taf. IX Fig. 2 (Hawaii).

Banchogastra n. g. (Type: *B. nigra* Ashm. manuscr. — Hawaii). **Ashmead** p. 87. — Untersch. v. *Pycnophion* n. g.: Abd. long. than the head. a. thor. united, but never twice as long.

Disc.-cub. nerv. originat. from, or interstit. w., the disc. nerv.; transv. med. nerv. in h.-w. brok. at a right angle much below the middle;

abd. subcompr., fusif., the ovipos. very short, not projecting beyond the tip of the abd.; post. face of metathor. rugose *Banchogastra*.
 Disc.-cub. nerv. orig. a little before the disc. nerv., nev. interst. w. it;
 transv. med. nerv. in h.-w. obtusely angular brok. at or near the middle; abd. strongly compress., the ovipos. as long or nearly as long as the abd.; post. face of metathor. smooth or nearly *Pycnophion*.

Banchogastra nigra **Ashmead**, Fauna Hawaiiensis vol. I. 343 Abb. Taf. IX Fig. 3 (Hawaii).

Camptoneura u. *Stauropoctonus*. **Kriechbaumer** (2) p. 22. — Untersch. beider:
 Kopf hinter den Augen flach gerundet u. verschmälert, der hintere Theil des Hrückens durch eine starke bogenförmige Querleiste vom oberen getrennt, in d. Mitte flach od. etwas eingedrückt, schildförmig, grob gerunzelt *Stauropoctonus* Brauns.
 Kopf hinter den Augen gerundet, nicht verschmälert; Hrückens verschied., ziemlich kubisch, unregelmässig höckerig erhaben, nie mit schildförmig abgegrenzt. hinterem Mittelfelde. *Camptoneura* m.

Camptoneura n. siehe Ophion.

Celor n. g. Ophionidarum. (Generi *Cremasto* Grav. (Thoms.) affinis, sed differt: metanoto brevi, postice magis declivi, area supero-media fere quadrata, tarsorum posteriorum articulo ultimo longiore, unguibus tenuibus, longis et pectinatis; a genere *Porizone* Fall. segmenti 2 i lateribus depressis et acutis nec non terebra longa discendens) **Kokoujew**, Horae Soc. Entom. Ross. T. 35 p. 210—213. — *semenowi* p. 213—216 ♀ (Prov. Transcaspia: Repetek).

Cymatoneura n. siehe Ophion. — *Algoensis* (an *C. undulata* Gr. anschliess., aber versch. durch grosse, undeutl. getrennte Nebenaugen, weissgelbe Backen, leicht geschlängelte u. kaum verdickte Basis der Radialader u. viel läng. Zwischenader zwisch. d. 1. Brachial- u. der Kubitalzelle). **Kriechbaumer**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 2. Hft. p. 77—78 ♀ (Algoabay im Capland). — *Ikuthana* (dem deutschen *marginatus* in Grösse, Färb. u. robust. Körperaussehen am nächst., ausgezeichnet. durch bräunlich gefärbte Flgl. mit theilweise glashell., theilweise dunkler braun. Fleck u. Wischen. — Vielleicht Typus einer besond. Gatt.) p. 78—79 ♀ ♂ (*Ikutha* in Brit.-Ost-Afr.).

Dispilus n. siehe Ophion. — *Braunsii* (unseren 3 deutschen Arten: *merdarius*, *ramidulus* u. *combustus* sehr nahe) **Kriechbaumer**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 3. Hft. p. 154—155 ♀ (Kapland: Algoabay). — Wohl abnormes Stück.

Enicospilus nigrinervis (luteus, flagello antennarum abdominisque apice late nigro-fuscis; alis hyalinis nervis stigmatique nigris). **Cameron, P.**, Proc. Zool. Soc. London, 1901, p. 229 ♀ (New Britain). — rubens Tosq. **Schmiedeknecht** in de Schulthess-Schindler, Faune entomolog. du Delagoa (cf. vor. Ber. p. 400) p. 250. — *cubensis* Norton, flavus Fabr. u. concolor Cress. von Grenada, Balthasar. **Ashmead**, Trans. Entom. Soc. London, 1900, p. 270—271. — Hierher zu stellen auch *Ophion thoracicus* Cress. — *purgatum* Say **Ashmead** in Smith's Ins. p. 580 Fig. 274. — 4 Sp. in Westind. **Ashmead** p. 354. — **Ashmead** beschreibt in der Fauna Hawaiiensis vol. I folg. neuen Spp. von den Hawaii'schen Inseln: *mauicola* p. 347. — *kaalae* p. 347.

weimeae p. 348. — *variegatus* p. 348. — *nigrolineatus* p. 348. — *castaneus* p. 349. — *henshawii* p. 349. — *molokaiensis* p. 349. — *longicornis* p. 350.

Eremotylus tenuigena (unserem *undulatus* sehr ähnlich; Untersch. von dems. — *tenuigena* nach Anm. der Red. eine sprachl. Unmöglichkeit, muss *tenuigenis* heissen). **Kriechbaumer**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 3. Hft. p. 153—154 ♀ (Santos, Brasilien). In der sich daran schliess. Anmerk. wird bei dieser wie bei *undulatus* u. vielleicht auch noch anderen auf das Vorhandensein von Scheinadern hingewiesen. Beschr. ders. Ob diese bisher ganz unbeachteten Gebilde noch grössere Wichtigkeit für die Systematik haben, ist weiteren Untersuchungen vorbehalten. — **Kriechbaumer** bestreitet die sprachl. unmögl. Bildung durch Hinweis auf ähnl. p. 224. — Konow bleibt in der Fussnote daselbst bei seiner Ansicht. Dadurch, dass viele etwas Unrichtiges thun, wird es nicht richtig etc.; p. 256. Jeder beharrt bei seiner Meinung. — *Druryi* (für den von Christ, allerdings sehr schlecht abgebildeten (1791) S. 358, von ihm mit Drury's Abb. Illustr. Tom. I, tab. 43 Fig. 5 sehr genau wiedergegebenen als synonym. cit. „amerik. Gelbschnabel“ *Ichn. americanus luteus*) **Kriechbaumer**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 3. Hft. p. 152—153. — (New York, aufgezogen aus *Telea polyphemus*, *Platysamia Prometheus* und *Samia Cynthia*.)

Henicospilus (für *Enicospilus*) siehe *Ophion*.

Leptophion n. g. *Ophioninarum* (zeigt nähere Verwandtschaft mit *Enicospilus* als mit *Ophion*. Von ersterer versch. durch Fehlen der hornigen Punkte auf d. Vflgl., ferner die Medianquerader der Hflgl. nicht gebrochen weit unter der Mitte; von *Ophion*: Diskokubitalader ohne Aderanhang, breit gerundet, apicale Abcisse des Radius breit aufwärts gebogen. Basis des Radius geschwollen). **Cameron, P.**, Proc. Zool. Soc. London, 1901, p. 227—228. — *longiventris* (luteus, segmento mediali reticulato, alis hyalinis, nervis stigmatique nigris) p. 228 ♀ (New Britain). — Vergleich mit *Pleuro-neurophion* Ashm.

Ophion u. Verw. Unterschiede. **Kriechbaumer** (2) p. 22.

1. Diskokubitalader deutl. winkelig gebrochen mit Aderanhang, innerer Theil nach vorn deutlich zur Basalader geneigt, fast oder ganz gerade; erster Theil der Radialader kurz, gerade, nicht verdickte Flügel ohne Hornflecke 2.
Ophion Frst. (Gr. e. p.)

Diskokubitalader nicht oder undeutlich gebrochen, ohne Aderanhang; innerer Theil nach vorne nie stark zur Basalader geneigt, mit ihr parallel oder von ihr divergirend, meist mehr oder weniger geschlängelt, erster Theil der Radialader einfach gekrümmt oder geschlängelt (wellenförmig) 2.

2. Diskokubitalzelle ohne Hornflecke (*Eremotylus* Frst.) 3.
— Diskokubitalzelle mit 1 oder mehreren Hornflecken (*Enicospilus* Steph., *Allocaampus* Frst.) 4.

Radialader an der Basis verdickt u. dann einfach gebogen

Camptoneura m.
— Radialader an oder nahe der Basis verdickt, geschlängelt oder wellenförmig Clymatoneura m.

4. Diskokubitalzelle mit 1 Hornfleck

Henicospilus (*Enicospilus* Steph. e. p.)

— Diskubitalzelle mit 2 Hornflecken

Dispilus m. (Enicospilus Steph. e. p.

inflexus Rtzb. Bemerk. zu dieeer Art. **Kriechbaumer**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 2. Hft. p. 73—75. — Kr.'s Ansicht: 1. Die Flgl. dieser Art sind im normal. Zustande glashell, ungefleckt u. allenfallsige einzelne hornfleckenartige Stell. zufällige, zuweilen vom Schmutz verursachte Trübungen. 2. Ist kein Henicospilus, sondern eine Cymatoneura u. m. undulata Gr. zunächst verwandt. Unterschiede.

amoenus **Tosquinet**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 44 p. 167—169 ♂ (Russie mérid.; Sarepta).

flavocephalus **Kirby**, Monograph of Christmas Isl. p. 82 (Christmas Isl.).

macrurum **Ashmead** in Smith's Ins. p. 580 Fig. 273.

leucocotis Tosq. Schmiedeknecht in **de Schulthess-Schindler**, Faune entom. in Delagoa (cf. vor. Ber. p. 400) p. 250.

undulatus. Thomson vermengt darunter 2 spezifisch verschiedene Arten. (O. undul. u. curvinervis m.) **Kriechbaumer** (2) p. 21.

thoracicus ist wohl zu *Enicospilus* zu stellen. **Ashmead**, p. 271.

Pycnophion n. g. (Type: P. molokaiensis Ashm. manuscr. — Hawaii). **Ashmead**, p. 87. — cf. *Banchogastra*.

Pleuroneurophion n. g. (Type: P. hawaiiensis Ashm. — Hawaii). **Ashmead** p. 86. — Untersch. v. *Ophion* etc.

Labium abnormally lengthened

Agatophiona

Labium norm., not lengthened

Transv. med. nerv. in fr.-wings interstit., or nearly, with the bas. nerv., in the h.-wings obtusely angularly brok. at or near the middle, 1st absc. of rad. norm., not swoll. at base *Ophion*

Transv. med. n. in fr.-wings not interstit. w. the bas. nerv., originat. a. little before it, in h.-w. brok. below the middle at the basal third, or at least far below the middle; 1st absc. of rad. thick. or swoll. towards the base *Pleuroneurophion*

Pycnophion kauaiensis **Ashmead**, Fauna Hawaiiensis vol. I p. 344. — *molokaiensis* p. 344 (beide von den Hawaiiischen Inseln).

Pleuroneurophion hawaiiensis **Ashmead**, Fauna Hawaiiensis, vol. I p. 342 (Hawaii).

Stauropoctonus Brauns. Bemerk. zur Bestimm., Beschr. Unterscheidung dieser Gatt. von *Camptoneura*. **Kriechbaumer** (2).

Tipulophion n. g. Ophionidarum (wohl *Thyreodon* Brullé am nächsten verwandt. Bei beiden die Mundtheile gleich, desgl. Analquerader d. Hflgl. gebrochen. Unterschiede beruhen in der Beschaffenheit des Hbruststückes u. d. Flügelgäders). **Kriechbaumer**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 2. Hft. p. 75. — *gigas* p. 76—77 ♀ (Brasil., Rio de Janeiro). — Aehnelt einer grossen *Tipula gigantea*.

Thyreodon. 5 Sp. in Westind. **Ashmead** p. 354. — *grenadensis* **Ashmead**, Trans. Entom. Soc. London, 1900, p. 270 ♀ (Grenada, Balthasar).

Tribus III. Nototrachini.

(= Trachynotoidea Fam. 2 Först. 1868 = Trachynotina Trib. Thoms. 1887
= Trachynotini Trib. II Ashm. 1894, dito Trib. III 1900 = Trachydermatini
Davis 1897).

Unter allen Ophioninae nur 1 Apik.-Sporn an d. Mitteltib. — 1 Gatt. m.
nur 1 nerv. rec.: Pharsalia Cress. (wie bei Braconidae), sehr selt., wahrscheinl.
= Ophionellus Westw. v. Mexico u. zu d. Evaniiden gestellt) p. 87–88.

Übersicht über die 3 Gatt. (p. 88): 653. Pharsalia Cress. = Ophionellus
Westw.; 654. Nototrachys Marsh. = Trachynotus Grav. u. 655. Eugnomus Först.
Nototrachys. 5 Sp. in Westind. **Ashmead** p. 358. — minimus Ashm. u. niger
Ashm. **Ashmead**, Trans. Entom. Soc. London, 1900, p. 271 (von Grenada,
Grand Etang).

Trachynotus *fuscipennis* **Tosquinet**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 44 p. 169–171 ♂
(Sampedor, Catalogne, Espagne, auf Blüth. v. Campanula).

Tribus IV. Anomalini.

(= Anomaloidae Fam. I 1868 = Anomalina Thoms. 1887 = Anomalini Trib. I
Ashm. 1894 = Anomalini Trib. IV Ashm. 1900). p. 88. — Untersch. v. d. and.
Trib. siehe in der Tribus Tab.

Übersicht über die im Folg. m. No. 656–672 bezeichn. 16 Gatt. (p. 89–90):

666. Acanthostoma Kriechb. p. 89. — 657. Agrypon Först. p. 89. —
662. Anomalon Grav. p. 89. — 670. Aphanistes Först. p. 90. — 658. Atro-
metus Först. p. 89. — 664. Barylypa Först. p. 89. — 671. Camposcopus Först.
p. 90. — 656. Eiphosoma Cress. p. 89. — 667. Erigorgus Först. p. 90. —
668. Exochilum Wesm. p. 90. — 672. Habronyx Först. p. 90. — 669. Hetero-
pelma Wesm. p. 90. — 660. Labronychus Först. p. 89. — 663. Laphyctes
Först. p. 89. — 661. Schizoloma Wesm. = Schizopoma Först. p. 89. —
Schizopoma siehe Schizoloma. — 665. Sympratis Först. p. 89. — 659. Therium
Curtis = Trichomma Wesm. p. 89. — Trichomma siehe Therium.
Agrypon flavopictus Ashmead, Trans. Entom. Soc. London, 1900, p. 271–272 ♂
(Grenada, Mount Gay Estate, leeward side).

Anomalon amabile Tosquinet, Ann. Soc. Ent. Belg. T. 44 p. 171–173 ♀ (Russie
mérid., Sarepta). — tenuicorne, Parasit der Puppe v. *Thais polyxena* W. V.
Im mäss. warm. Zimmer am 11. Jan. ausgeschlüpft, ♂ zuerst auch in
Thais rumina L. var. *medesicaste* Ill. **du Buysson** (sub No: 3 des vorigen
Berichts) p. 343. — Bemerkg. hierzu. — **Schmiedeknecht** beschreibt in
d. Termesz. Füzetek, vol. XXIII folg. n. Sp. aus Nordafrika: (*Laphyctes*)
formosum p. 239. — *elegantulum* p. 240. — (*Labronychus*) *laevicoxe* p. 241.
— *paradoxum* p. 241.

Atrometus. **Ashmead** beschreibt in der Fauna Hawaiiensis vol. I folg. n. Sp.
von den Hawaii'schen Inseln: *flavifrons* p. 352. — *tarsatus* p. 352. — *citri-
cinctus* p. 353. — *molokaiensis* p. 353. — *haleakalae* p. 353. — *hawaiiensis*
p. 354 Taf. IX Fig. 5. — *delicatus* p. 354.

Barylypa coarctata Ashmead, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 352 ♀
(Austral.).

Eiphosoma. 4 Sp. in Westind. **Ashmead**, Trans. Entom. Soc. London, 1900 p. 35.
— *annulata* Cress. **Ashmead**, t. c. p. 271 (auf Grenada).

Erigorgus purpuratae **Kriechbaumer**, Entom. Nachr. (Karsch) 26. Jhg. p. 172—174 ♂ ♀ (in Wardamm bei Bremen, aus überwinterten Puppen v. *Arctia purpurata* gezogen). — *Apollinis* p. 174 ♂ ♀ (zw. 15 u. 26. III (also wohl durch Zimmerwärme) aus Puppen v. *Parnassius Apollo* von d. Alpe Sallet zw. d. Königs- u. Obersee bei Berchtesgaden, z. Th. auch wohl um Reichenhall). — Bemerk. hierzu. **Kriechbaumer**, Insektenbörse, 17. Jhg. p. 132—133.

Tribus V. Campoplegini.

(= Campoplegoidae Fam. 8 Först. 1868 = Campoplegina Trib. Thoms. 1887 = Campoplegini Trib. VIII Ashm. 1894, dito Trib. V Ashm. 1900).

Viele m. *Anomalini* zu verwechs., da kein scharf. Unterscheidungsmerk. Viele der hierher gehör. Gatt. sind unter *Limneria* u. Verw. beschr. Die meist. Gatt. in N.-Am. vertreten.

Uebersicht über die im Folg. m. No. 673—736 bezeichn. 65 Gatt. (p. 90—95):

690. *Alcima* p. 92. — 736. *Ameloctonus* p. 95. — 678. *Amorphota* p. 91. — 710. *Anepheres* p. 93. — 684. *Angitia* Holmgr. p. 91, 95. — 735. *Anilastus* p. 95. — 716. *Anisamora* p. 94. — 727. *Bathyplectes* p. 94. — 677. *Bosmina* Cam. p. 91. — 733. *Callidora* p. 95. — 731. *Campoletis* p. 95. — 674. *Campoplex* Grav. p. 90. — 688. *Campotrephus* p. 92. — 728. *Canidia* Holmgr. p. 94. — 687. *Casinaria* Holmgr. p. 92. — 673. *Charops* Holmgr. p. 90. — 681. *Cymodusa* Holmgr. p. 91. — 706. *Diadegma* p. 93. — 721. *Dimophora* p. 94. — 700. *Diocetes* p. 92. — 698. *Dioratica* p. 92. — 720. *Dolophron* p. 94. — 675. *Echthronomas* p. 91. — 709. *Ecephora* p. 93. — 701. *Erioborus* p. 92. — 694. *Eripternus* p. 92. — 693. *Gnathochorisis* p. 92. — 697. *Gonotypus* p. 92. — 734. *Holococremnus* p. 95. — 689. *Horogenes* p. 92. — 691. *Hyposoter* p. 92. — 723. *Hypothereutes* p. 94. — 711. *Idechthis* p. 93. — 725. *Ichnoscopus* p. 94. — 732. *Limneria* Holmgr. p. 93. — 712. *Lathrostizus* p. 93. — 713. *Lathroplex* p. 93. — 729. *Meloboris* Holmgr. p. 95. — 717. *Nemeritis* Holmgr. p. 94. — 722. *Nepiera* p. 94. — 695. *Nepiesta* p. 92. — 702. *Nythobia* p. 92. — 703. *Olesicampa* p. 93. — 682. *Olethrodotis* p. 91. — 708. *Omoborus* p. 93. — 714. *Omorgus* p. 93. — 715. *Pantropa* p. 93. — 699. *Phaedroctonus* p. 92. — 724. *Phobocampa* p. 94. — 692. *Podogaster* Brullé p. 92. — 705. *Pyracmon* Holmgr. p. 93. — 726. *Rhexineura* p. 94. — 704. *Rhympoctona* p. 93. — 685. *Rhytmonotus* p. 91. — 683. *Sagarites* Holmgr. p. 91. — 707. *Sinophorus* p. 93. — 719. *Spudastica* p. 94. — 680. *Symplecis* p. 91. — 718. *Synetaeris* p. 94. — 730. *Tranosema* p. 95. — 686. *Trathala* Cam. p. 91. — 679. *Thymaris* p. 91. — 676. *Zachresta* p. 91. — 696. *Zaporus* p. 92.

(Wenn nichts anderes bemerkt, Först.'sche Gatt.).

Angitia insularis Asm. in Westind. **Ashmead**, Trans. Entom. Soc. London. 1900 p. 355.

Bosmina Cam. 1890. Hierfür ist in Ashm. p. 91 *Hymenobosmina* nom. nov. zu setzen. **Dalla Torre, K. W.** p. 52.

Campoplex. 5 Sp. (2?) in Westind. **Ashmead**, p. 355.

Canidiella nom. nov. für *Canidia* Holmgr. 1858 **Ashmead**, Canad. Entom. vol. XXXII — auch **Dalla Torre, K. W.** p. 52.

- Canidia* Holmgr. (1858). Hierfür ist *Canidiella* nom. nov. in Ashm. p. 52 zu setzen. **Dalla Torre, K. W.** p. 52.
- Charops uncinatus* (a im Anhang) (verw. m. *bimacula* Ashm., viell. ♀ dazu) **Ashmead**, Trans. Entom. Soc. London, 1900 p. 272 ♀ (Grenada — Mount Gay Estate, Leeward side). — *bimaculata* in Westind. p. 355.
- Cymodusa pulchricornis Szépliget* in Zichy's Ergebn. 2. Bd. p. 138 (Sibirien). — *elegans* p. 138 (Kazan).
- Dusona* n. g. (Campoplex nahest.) **Cameron**, Trans. New Zealand Instit. vol. XXXIII p. 107. — *stramineipes* p. 117 (New Zealand).
- Ephora* Först. (1869). Hierfür ist in Ashm. p. 93 *Ecphoropsis* nom. nov. zu setzen. **Dalla Torre, K. W.** p. 52.
- Ecphoropsis* nom. nov. für *Ephora* Först. 1868. **Ashmead**, Canad. Entom. vol. XXXII p. 368.
- Hymenobosmina* nom. nov. für *Bosmina* zu setzen, siehe dort.
- Idechthis oahuensis Ashmead*, Fauna Hawaiiensis vol. I p. 355 (Hawaii'sche Inseln).
- Laphyctes* Först. (nec Stål). Hierfür ist Ashm. p. 89 *Sarntheinia* nom. nov. zu setzen. **Dalla Torre, K. W.** p. 52.
- Lathrostizus insularis Ashmead*, Fauna Hawaiiensis, vol. I p. 355 (Molokai).
- Limneria striatipes Ashmead*, Psyche, vol. IX, p. 148 (New Mexico). — *hudsoni Ashmead*, Trans. New Zealand Inst. vol. XXXIII p. 105 (New Zealand).
- Limnerium* nom. nov. für *Limneria* Holmgr. 1858. **Ashmead**, Canad. Entom. vol. XXXII p. 368. — auch **Dalla Torre, K. W.** p. 52.
- Nepiesta nigra Szépliget* in Zichy's Ergebn. 2. Bd. p. 139 (Kazan).
- Omorg(a)(us) uncinata Szépliget* in Zichy's Ergebn. 2. Bd. p. 139 (Kazan).
- Sarntheinia* nom. nov. für *Laphyctes*, siehe dort.

Tribus VI. Paniscini.

(= 1900 Paniscini Ashmead, Smith's Insects of New Jersey p. 582)
Ashmead p. 95.

Zum ersten Male charakterisirt. Steht d. Mesochorini u. Banchini am nächsten. Först. stellte die meisten hierher gehörenden Gatt. zu d. Ophionoidae; unhaltbar, da d. 2. nerv. rec. hinter, nicht vor der Mitte der transv. cub. mündet, etc. Charakt. ferner versch. Gestalt. d. Kopfes, gröss. Aug. (innen submarg. od. sinuate), gröss. od. stärk. hervortret. Ocell.

Uebersicht üb. die im Folg. m. No. 737—747 bezeichn. 6 Gatt. (p. 95—96):

742. *Absyrtus* Holmgr. p. 96. — 739. *Cidaphus* Först. p. 96. — 738. *Opheltes* p. 96. — 737. *Opheltoideus* n. g. p. 95. — 740. *Paniscus* Grav. p. 96. — 741. *Parabates* Först. = *Parabatus* Thoms. p. 96.

Opheltoideus n. g. (Type: *O. johnsoni* Ashm. manuscr. — Front wings without an areolet. Scutell. convex, not margined laterally except at sides anteriorly or basally) p. 95.

Paniscus rufus Brullé auf Grenada. **Ashmead** p. 272. — *subfuscus* Ashm. in Westind. p. 355. — *minor Szépliget*, Termesz. Füzetek, vol. XXXII p. 29 (Budapest). — *productus* Brullé auf New Zealand. **Ashmead**, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 353.

Parabates. Schwierigkeiten der Gatt. **Kriechbaumer**.

Tribus VII. Banchini.

(= Banchoidae Fam. 9 Först. 1868 = Banchini Trib. IX Ashm. 1894, dito Tribe VII 1900).

Charaktere siehe in Tabelle. — 13 Gatt.:

754. *Agathilla* Westw. p. 97. — cf. unt. — 753. *Agathobanchus* n. g. p. 97. — 751. *Banchus* Grav. p. 97. — 752. *Ceratosoma* Cress. p. 97. — 750. *Cidaphurus* Först. p. 97. — 749. *Corynephanes* Wesm. p. 97. — 747. *Exetastes* p. 97. — 744. *Ithagenes* p. 96. — 745. *Lapton* Nees p. 97. — 746. *Semnophrys* Först. ? = *Rhynchobanchus* Kriechb. p. 97. — 743. *Tropistes* Grav. p. 96. — 748. *Xenochesis* Först. p. 97.

Agathobanchus n. g. (Type: *Banchus aequatus* Say) p. 97. — Untersch. von *Agathilla*:

Meson. without parapsid. furrows; transv. med. nerv. in front wings not interstit., the submed. cell slightly longer than the med.

Agathobanchus.

Meson. with paraps. furr.; transv. med. nerv. in front. w. interstit. with the basal nerv.

Agathilla

Baliens n. g. Banch. (steht *Banchus* u. *Exetastes* nahe, erst. v. ihr versch. durch „pectin. claws“, letzte durch versch. Gestalt d. Gesichts u. Clyp., „metathor. „spiracl.“ hint. d. Mitte geleg., kurz. Beine) **Cameron**, Mem. Manchester Soc. vol. XLIV No. 15 p. 101—102. — *leptopus* (nigra, ped. fulvis, cox. nigr., tibiis post. albis, medio late nigr., apice nigr.; alis hyal., nerv. stigmatique nigr.) p. 102 ♀ (Khasia Hills).

Ceratogastra nom. nov. für *Ceratosoma* Cress. 1865 **Ashmead**, Canad. Entom. vol. XXXII p. 368 — auch **Dalla Torre, K. W.** p. 51.

Ceratosoma Cress. (1865). Hierfür ist *Ceratogastra* Ashm. nom. nov. in Ashm. p. 97 zu setzen. **Dalla Torre, K. W.** p. 52.

Cremastus melanarius Szépligeti in *Zichy's* Ergebn. 2. Bd. p. 137 (Sibirien).

Tribus VIII. Mesochorini.

(= Mesochoroidae Fam. 20 1868 — Mesochorini Tribe Ashm. 1892, dito Tribe X, 1894, dito Tribe VIII, 1900).

Stellung etwas ungewiss (den Paniscini am nächsten stehend) p. 97.

Hierher die Gatt.:

755. *Plesiophthalmus* Först. p. 98. — 756. *Astiphronma* Först. p. 98. — 757. *Mesochorus* Grav. p. 98.

Mesochorus pectinatus Szépligeti in *Zichy's* Ergebn. 2. Bd. p. 143 (Kazan). — *grenadensis* **Ashmead**, Trans. Entom. Soc. London, 1900, p. 273 ♂ (Grenada, Balthas., Windw.-Side). — annulitarsis in Westind. p. 355.

Tribe IX. Porizonini.

(= Porizonoidae Fam. 3 Först. 1868. — Porizonini Tribe III Ashm. 1894.

— Porizonini Tribe IX, **Ashmead**, Smith's Insects of New Jersey, p. 583).

Dieser u. folg. Tribus leicht von den anderen zu untersch., d. grosse Stigm. (gross u. breit, dreieckig oder oval, niemals schmal). Först. nannte diese Trib.

Fam. u. theilte sie auf sehr oberflächl. Charakt. hin ein. — Einige Spp. der nordam. Fauna sind unter dem Namen *Cremastus* beschr. u. gehören offenbar zu Först.'s *Temelucha*.

Uebersicht über die im Folg. mit No. 758—777 bezeichn. 19 Gatt. (p. 98—100):

762. *Allophrys* Först. p. 99. — 764. *Aneuclis* Först. p. 99. — 777. *Astrenis* Först. p. 100. — 760. *Barycnemis* Först. p. 99. — 770. *Diaparsis* Först. p. 99. — 767. *Dolichopselephus* Ashm. p. 99. — 769. *Epistathmus* Först. p. 99. — 775. *Eutomus* Först. p. 99. — 766. *Gonolochus* Först. p. 99. — 772. *Heterocola* Först. p. 99. — 773. *Ischnobatis* Först. p. 99. — 776. *Isurgus* Först. p. 99. — 765. *Leptopygus* Först. p. 99. — 759. *Orthopelma* Taschb. = *Proedrus* Först. p. 99. — 774. *Phradis* Först. p. 99. — 761. *Porizon* Grav. p. 99. — 758. *Probles* Först. p. 98. — 763. *Sathropterus* Först. p. 99. — 768. *Temelucha* Först. p. 99. — 771. *Thersilochus* Holmgr.

Isurgus rufipes var. n. 2 **Szépliget** in Zichy's Ergebn. 2. Bd. p. 137.

nigriceps **Ashmead**, Trans. Entom. Soc. London, 1900 p. 273 ♀ (St. Vincent);
dito p. 356.

Porizon fulvescens Cress. in Westind. **Ashmead**, t. c. p. 356.

Thersilochus. 2 Sp. in Westind. **Ashmead**, t. c. p. 356.

conotracheli Riley. **Ashmead** in Smith's Ins. etc. p. 584 Fig. 275 ♀♂, Larve,
Kokon. — *dorsalis* **Ashmead** p. 273 ♀ (St. Vincent).

Tilgida n. g. (In Gestalt d. Abd. nicht sehr von *Mesoleptus* versch., aber sonst sehr davon u. all. bek. Tryph. abweich. Unzweifelh. *Baliena* nahe verw. in Kopf, Thor., Beine, aber *Areola* fehlt). **Cameron**, Mem. Manchester Soc. vol. XLIV No. 15 p. 108—109. — *albitarsis* (nigr., facie, flav.; ped. flav., cox. femoribusque post. fulv., dimidio apicali tibiaram post. nigr.; al. hyal.) p. 109 ♂ (Khasias).

Tribus X. *Pristomerini*.

(= *Pristomeroidae* Fam. 4 Först. 1868 = *Pristomerini* Trib. IV Ashm. 1894, dito Tr. X Ashm., Smith's Insects of New Jersey p. 584) p. 100.

Hierher 2 Gatt., die Ashm. p. 100 folg. untersch.:

Metanotum completely areolated, the med. a. the petiolar areas always separated; stigm. large, wide; areolet wanting.

H.-fem. considerably swollen, w. a large tooth beneath a little beyond the middle, followed by some small or minute teeth; metanot. with the areola hexag.; transv. med. nerv. in h.-w. slightly angularly broken below the middle

778. *Pristomerus* Holmgr.

H.-fem. scarcely swollen, w. a tooth beneath near the apex; metanot. w. the areola pentagonal; transv. med. nerv. in h.-w. straight, not broken.

779. *Pristomeridia* Ashm. n. sp. (Type: *Porizon agilis* Cress.).

Tribus XI. *Cremastini*.

(= *Cremastoidae* Fam. 5 Först. 1868 = *Cremastina* Trib. Thoms. 1887 = *Cremastini* Trib. V Ashm. 1894 = *Cremastina* 1900 Tribe XI Ashmead, Smith's Ins. of New Jersey p. 584) p. 100. — Viele der zu *Cremastus* gestellt. Sp. gehören wohl zu *Temelucha*.

Untersch. der beiden Gatt. (p. 100): No. 780. *Cremastus* Grav. und 781 *Demophorus* Thoms.

Cremastus. Aus Ungarn beschreibt **Szépligeti**, Termesz. Füzetek vol. XXIII folg. n. sp.: *annulatus* p. 25. — *arenosus* p. 21. — *caudatus* p. 22. — *discoidalis* p. 25. — *hungaricus* p. 27. — *lucidus* p. 23. — *oculatus* p. 21. — *ornatus* p. 22. — *partitus* p. 22. — *pictus* p. 24. — *puberulus* p. 24. — *variatus* p. 24. — *variipes* p. 26.

luctuosus in Westind. **Ashmead**, Trans. Entom. Soc. London 1900 p. 356.

Paracremastus n. g. **Szépligeti**, Termesz. Füzetek vol. XXIII p. 28 (Ungarn).

Tribus XII. Plectiscini.

(= *Plectiscoidae* Fam. 22 Först. 1868 = dito Först. 1871 = *Plectiscina* Trib. Thoms. 1888 = *Plectiscini* Trib. Davis 1897 = dito Tr. XI Ashm. 1894 = dito

Tr. XII Ashm.'s, Smith's Insects of New Jersey p. 585) p. 101.

Kaum eine natürl. Gruppe, da sie Gatt. enthält, die zu den Crypt., Tryph. u. Pimpl. Verwandtschaft zeigen. In gegenwärtiger Fassung den Porizonini am nächsten.

Übersicht über die im Folg. mit No. 782—813 bezeichneten 31 Gattung. (p. 101—103):

782. *Adelognathus* Holmgr. p. 103. — 799. *Aniseres* p. 102. — 791. *Aperileptus* p. 101. — 802. *Apoclima* p. 102. — 803. *Ateleute* p. 102. — 794. *Blapticus* p. 102. — 787. *Campothreptus* p. 101. — 789. *Catastenus* p. 101. — 785. *Cnemichys* p. 101. — 797. *Cyrtocentrus* Prov. p. 102. — 795. *Dialipsis* p. 102. — 801. *Dicolus* p. 102. — 811. *Entelechia* p. 103. — 793. *Entypoma* p. 102. — 809. *Eusterinx* p. 102. — 812. *Gnathochorisis* p. 103. — 786. *Gryptocentrus* Ruthe p. 101. — 800. *Helectes* = *Idioxenus* Först. p. 102. — 805. *Hemiphanes* p. 102. — 792. *Holomeristus* p. 102. — *Idioxenus* siehe *Helectes*. — 788. *Macrochasmus* Thoms. p. 101. — 807. *Megastylus* Schiöde p. 101. — 798. *Miomeris* p. 102. — 806. *Myriarthus* p. 102. — 784. *Notomeris* p. 101. — 810. *Panthisarthrus* p. 102. — 796. *Plectiscus* Grav. p. 102. — 804. *Polyaulon* p. 102. — 813. *Proclitus* p. 103. — 808. *Symphylus* p. 102. — 790. *Symplecis* p. 101. — 783. *Synaema* p. 101.

Adelognathus. 3 Spp. aus Steiermark. **Strobl** (2) p. 246. — Beschr. eines ♂ v. *aciculatus* Thms. aus einer Bachschlucht bei Admont.

Braconidae (Fam. LXXVIII).

Ashmead (siehe vor. Bericht p. 509 sq.) teilt sie in folg. 17 Subf. ein (nicht 15, p. 509 Zeile 5 von unten).

Subf.	Trib.
I. Aphidiinae:	Aphidiini, Trioxini.
II. Paxylomminae.	
III. Euphorinae.	
IV. Meteorinae.	
V. Macrocentrinae:	Macrocentrini, Zelini.
VI. Helconinae:	Helconini, Diospilini.
VII. Blacinae:	Blacini, Orgilini, Calyptini.

Subf.	Trib.
VIII. Sigalphinae.	
IX. Chiloninae.	
X. Agathidinae:	Agathidini, Microdini.
XI. Cardiochilinae.	
XII. Microgasterinae.	
XIII. Ichneutinae.	
XIV. Opiinae.	
XV. Braconinae:	Aphrastobraconini, Braconini, Eurobraconini.
XVI. Rhogadinae:	Exothecini, Rhyssalini, Rhogadini, Doryctini, Hecabolini.
XVII. Spathiini:	Pambolini, Hormiini, Spathiini.

Bemerkungen zur Anatomie einer Larve, die an einer Psychide von Timbuctoo schmarotzt. **Vaissière & Bordas** (Bericht für 1900).

Szépligeti giebt in Potfuz. Termes Kozl. T. XXXIII p. 175 sq. eine Tabelle der paläarkt., Bracon. verw., Gatt. u. Spp.

Braconidae von S. Devon u. ihre Wirtstiere. **Bignell**.

Acoelius australiensis **Ashmead**, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900 p. 355 ♀ (Australien).

Apanteles sp. aus Nordamerika nach Hamburg eingeschleppt, aus Apfelschalen gezüchtet. **Kraepelin**.

Neu: *similis Szépligeti* in Zichy's Ergebn. 2. Bd. p. 151 (Kazan). — *xanthocarpus* p. 152 (Sibirien). — *gladiator* p. 152 (Sibirien).

Aphidius nigripes **Ashmead**, Bull. N. York Mus. No. 47 p. 588 (Adirondacks).

Aspilota konaë **Ashmead**, Fauna Hawaiiensis vol. I p. 359 (Hawaii).

Atanycolus nova-guinensis Szépligeti, Termesz. Füzetek vol. XXIII p. 52. — *major* p. 53. — *tricolor* p. 53 (sämmtl. aus Neu-Guinea).

signatus Szépligeti, Potfuz. Termesz. Kozl. vol. XXXIII p. 176 (Ungarn). —

luteus Szépligeti, Termesz. Füzetek vol. XXIV p. 362 (Molukken).

Baryproctus hungaricus Szépligeti, Potfuz. Termesz. Kozl. vol. XXXIII p. 180 (Budapest).

Biosteres palaearticus Szépligeti in Zichy's Ergebn. 2. Bd. p. 153 (Tomsk).

Blacus armatulus Ruthe near Ipswich. **Morley**.

trivialis Hal. nach Hamburg eingeschleppt. **Kraepelin**.

Brachystropha quadriceps **Ashmead**, Bull. N. York Mus. No. 47 p. 587 (Adirondacks).

Bracon. Bemerk. zu bekannten Spp.:

pempelia Ashm. Aus Chile nach Hamburg eingeschleppt an getrockneten Pfirschen. **Kraepelin** p. 194. — *brevicornis* aus Californ. dito an getrockn. Pfirschen, wohl aus *Ephestia*-Raupen p. 194. — *stabilis* Wsm. (Heimat: Europa) eingeschleppt aus N.-Amer., gezüchtet an frischen Aepfeln.

Neue Spp.: A. Aus Frankreich: *melanothrix* **Marshall**, Bull. Mus. Paris T. VI p. 363 (Frankreich).

B. Aus Syrien: *palaestinensis Szépligeti*, Termesz. Füzetek, vol. XXIV p. 152.

C. Aus Ungarn beschreibt **Szépligeti**, in Potfuz. Termesz. Kosl. vol. XXXIII eine grosse Reihe neuer Arten, nämlich: *rufipalpis* p. 270. — *rufipedator* p. 271. — *pygidialis* p. 271. — *pilosulus* p. 271. — *centaureae* p. 271. — *hypopygialis* p. 271. — *mirus* p. 271. — *intermedius* p. 272. — *subrugosus* p. 272. — *subglaber* p. 272. — *longiventris* p. 272. — *carinatus* p. 272. — *alutaceus* p. 272. — *gracilis* p. 272. — *subtilis* p. 272. — *suspectus* p. 273. — *semirugosus* p. 273. — *elegans* p. 273. — *mixtus* p. 273. — *bisinuatus* p. 273. — *fumigatus* p. 273. — *mundus* p. 274. — *corruptor* p. 274. — *adjectus* p. 274. — *duplicatus* p. 274. — *fallaciosus* p. 274. — *dubiosus* p. 274. — *hemirugosus* p. 275. — *rufiscapus* p. 275. — *nigropictus* p. 275. — *nitidiusculus* p. 275. — *aestivalis* p. 275. — *ventricosus* p. 276. — *similis* p. 276. — *confinis* p. 276. — *congruus* p. 276. — *nanulus* p. 276. — *melanosoma* p. 276. — *rugulosus* p. 277. — *minutus* p. 277. — *curiosus* p. 277. — *subornatus* p. 277. — *versicolor* p. 278. — *novus* p. 278. — *subsINUatus* p. 278. — *fumatus* p. 278. — *indubius* p. 278. — *lautus* p. 278. — *rufigaster* p. 279. — *maculifer* p. 279. — *5-maculatus* p. 279. — *curticaudis* p. 279. — *terebiator* p. 279. — *crassiusculus* p. 279. — *fumigidus* p. 280. — *melanogaster* p. 280. — *cingulator* p. 280. — *sphaerocephalus* p. 280. — *globoiceps* p. 281. — *hemiflavus* p. 281. — *fallax* p. 281. — *discretus* p. 281. — *coloratus* p. 281. — *brunneipennis* p. 282. — *fumarius* p. 282. — *breviventris* p. 282. — *rotundatus* p. 282. — *hyalinipennis* p. 282. — *csikii* p. 282. — *micros* p. 283. — *carbonarius* p. 283.

D. Aus Bengalen:

2 n. Sp. aus Indien gezogen aus Scirpophaga auriflua Zell. (Crambide) **Bingham**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8: *Nicéwillii* p. 555—556 ♂ ♀ (verw. mit *B. agraeensis* Cam., versch.: „Färbung der Flügel, Skulptur des Thorax und des Abd.“) — *famulus* (vor. ähnl.) p. 556—557 ♂ ♀.

E. Aus Neu-Brittanien:

Bracon diores (niger, ore, mandibulis, thorace pedibusque anterioribus rufis; alis nigro-violaceis) **Cameron, P.**, Proc. Zool. Soc. London, 1901, I p. 226 ♀.

F. Fundort?:

Bracon ficicola (Br. nigri-ventris Wasm. nahest.) **Rudow**, Insektenbörse, 18. Jhg. p. 324 (Parasit der Honigmotte, aus Kisten mit Feigen). Beschreibung soll folgen.

Cardiochiles fumipennis **Szépligeti** in Zichy's Ergebn. 2. Bd. p. 151 (Sibirien).

Cenocoelius fasciipennis **Szépligeti**, Termesz. Füzetek, vol. XXIV p. 355. — *ornaticornis* p. 355. — *ruficeps* p. 355. — *hyalinipennis* p. 356. — *testaceus* p. 356. — *brasiliensis* p. 356 (sämmtlich aus Brasilien).

Chelonus inanitus Nees. Parasit aus Lozopera francillonana. The Entomologist, vol. 33 p. 253.

Cratobracon n. g. (Das Vorhandensein nur einer — der nahtartigen — transversalen Furche am Abdomen u. keiner schrägen, trennt diese Gatt. von *Iphiaulax*, *Odontoscopus*, *Chaolta* u. *Zaglyptogastra*, mit der sie am nächst. verw. zu sein scheint) **Cameron, P.**, Proc. Zool. Soc. London, 1901, I p. 226—227. — *ruficeps* p. 227 ♀ (New Britain).

Dacnusa erythrogastra **Szépligeti** in Zichy's Ergebn. 2. Bd. p. 154. — *D. (? Epimicta) caudata* p. 155 (beide aus Kazan).

- Ephylopsis nigra* Ashmead, Fauna Hawaiiensis vol. I p. 363 Taf. IX Fig. 6 (Kauai).
- Evanioides* n. g. Cenocoelionidarum Szépligeti, Termesz. Füzetek vol. XXIV p. 353. — *spathiiformis* p. 353. — *areolatus* p. 354 (beide aus S. Amerika).
- Evaniomorpha* n. g. Cenocoelionidarum Szépligeti, Termesz. Füzetek, vol. XXIV p. 356. — *munda* p. 356 (Brasilien).
- Ehogra* n. g. (Meteoros nahest.) Cameron, Trans. New Zealand Instit. vol. XXXIII p. 104. — *rubromaculata* p. 105 (New Zealand).
- Gyroneuron* n. g. Rhogadidarum Kokujew, Rev. Russe Ent. vol. I p. 231. — *mirum* p. 232 (Assam).
- Habrobracon brunnea* Szépligeti, Potfuz. Termesz. Kosl. vol. XXXIII p. 181. — *vernalis* p. 182. — *nigricans* p. 182 (sämmt. von Budapest).
- Helcon australianus* Kokujew, Rev. Russe Entom. vol. I p. 15. — *inornatus* p. 17 (beide aus N. S. Wales).
- Iphiaulax*. Szépligeti beschreibt in Termesz. Füzetek, vol. XXIV eine grosse Zahl neuer Arten und zwar:
- granulatus* p. 363. — *cyanogaster* p. 363. — *speciosus* p. 364. — *aschantianus* p. 364. — *neger* p. 365 (alle 5 aus Afrika). — *concolor* p. 367 (Celebes). — *haemiflavus* p. 368 (Borneo). — *melas* p. 368 (Molukken). — *australiensis* p. 369 (Cooktown). — *rugosus* p. 369 (N. Guinea). — *sublobatus* p. 370 (Celebes). — *elegans* p. 370 (Neu Guinea). — *biroi* p. 370 (N. Guinea). — *marginatus* p. 370 (Neu Guinea). — *nitidulus* p. 371 (Neu Guinea). — *lombokiensis* p. 372 (Lombok). — *rostratus* p. 373 (Neu Guinea). — *medianus* p. 374 (Neu Guinea). — *tricostatus* p. 373 (Neu Guinea). — *celebesiensis* p. 374. (Celebes). — *insularis* p. 375 (Amboina). — *caudatus* p. 375 (Borneo). — *gracilicornis* p. 375 (Neu Guinea). — *gracilis* p. 376 (Fundort?). — *impressus* p. 376 (Celebes oder Ceram). — *seminiger* p. 377 (Borneo).
- Ferner *similis* p. 393 (Panama). — *nataliensis* p. 395 (S. Afrika). — *pilosus* p. 396 (Molukken). — *novus* p. 396 (Congo). — *festivus* p. 397 (Neu-Guinea). — *crassicaudus* p. 397 (Fundort?). — *rufus* p. 397 (Fundort?). — *gibberosus* p. 401 (Amboina).
- Aus Südamerika beschreibt Sz. folg. Formen: *declaratus* p. 380. — *grandiceps* p. 380. — *arcuatus* p. 381. — *elongatus* p. 381. — *excisus* p. 381. — *flavipalpis* p. 382. — *punctulatus* p. 382. — *carinatus* p. 383. — *peruensis* p. 383. — *pebasianus* p. 384. — *rufidorsum* p. 384. — *nigripleuris* p. 384. — *similatus* p. 385. — *similaris* p. 385. — *pilosulus* p. 386. — *brasilienis* p. 386. — *nigripalpis* p. 386. — *tristis* p. 387. — *semialbus* p. 387. — *piauchyanus* p. 387. — *variicolor* p. 388. — *amazonicus* p. 388. — *rufiscapus* p. 388. — *nigriscapus* p. 389. — *meridensis* p. 389. — *pubescens* p. 389. — *glabrescens* p. 390. — *puberulus* p. 390. — *aterrimus* p. 390. — *variipennis* p. 391. — *ferus* p. 391. — *xanthostigma* p. 392. — *seminiger* p. 392. — *albopilosus* p. 392. — *brevicaudis* p. 393. — *curticaudis* p. 393. — *hirtulus* p. 394. — *semiflavus* p. 394. — *magnus* p. 398. — *longipes* p. 398. — *consobrinus* p. 399. — *constellatus* p. 400. — *flaviventris* p. 400. — *conformis* p. 400. — *mirus* p. 400. — *mirabilis* p. 401.

Von Singapore:

- malayanus* (luteus, capite antennis tarsisque posticis nigris; facie clypeoque pallide flavis; alis fusco-violac., ad basin late flavis) **Cameron, P.**, Proc. Zool. Soc. London, 1901, vol. 2 p. 43 (Singora, Malay Peninsula).
- Leptobracon* n. g. **Szépligeti**, Termesz. Füzetek, vol. XXIV p. 360. — *mocsáryi* p. 361 (Brasilien).
- Liobracon* n. g. **Szépligeti**, Termesz. Füzetek, vol. XXIV p. 361. — *singularis* p. 361 (Brasilien).
- Megischus violaceipennis* (niger, pedibus rufis, alis fusco-violaceis, nervis nigris) **Cameron, P.**, Proc. Zool. Soc. London 1901, I p. 225—226 ♀ (New Britain).
- Meteorus fragilis* Wesm. Parasit von *Phalera bucephala*. **Bignell, G. C.**
- Microbracon thalpocharis*, p. 526 des vorig. Berichts ist kursiv zu setzen.
- Microdus hawaiiicola* **Ashmead**, Fauna Hawaiiensis vol. I p. 361 (Hawaiische Inseln).
- Microplitis tunetensis* **Marshall**, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, vol. VI p. 363 (Tunis).
- Opius obscurus* **Szépligeti** in Zichy's Ergebn. 2. Bd. p. 152. — *rossicus* p. 153 (beide von Kazan). — Zeile 8 von oben auf p. 524 des vorig. Berichts ist dieses Wort vorzusetzen.
- Parahelcon* n. g. Helconid. **Kokujew**, Revue Russe Entom. vol. I p. 14. — *konowi* p. 15 (beide von N. S. Wales).
- Phanerotoma planifrons* Nees aus den Mittelmeerländern nach Hamburg eingeschleppt, gezüchtet von Feigen. **Kraepelin**. — Neu: *hawaiiensis* **Ashmead**, Fauna Hawaiiensis, vol. I p. 361 (Hawii).
- Poecilobracon* n. g. (zu den Braconini gehörig in Ashmead's Tabelle (P. Un. Stat. Mus. vol. XXIII p. 136), neben das amerikanische Genus *Megaproctus* zu stellen). **Cameron**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 122. — *flaviceps* p. 122—123 ♀ (Australien).
- Protapanteles *hawaiiensis* **Ashmead**, Fauna Hawaiiensis, vol. I p. 362 (Hawaii).
- Pseudovipio intermedius* **Szépligeti**, Potfuz. Termesz. Kozl. T. XXXIII p. 180. — *gracilis* p. 180 (beide aus Ungarn).
- Rhizarcha astigma* **Ashmead**, Bull. N. York Mus. No. 47 p. 587 (Adirondacks).
- Rhogas csikii* **Szépligeti** in Zichy's Ergebn. 2. Bd. p. 150 (Sibirien).
- Rhytimorpha* n. g. **Szépligeti**, Termesz. Füzetek, vol. XXIV p. 359. — *coccinea* p. 359 (Congo).
- Sigalphoinae. Tabelle der paläarkt. Formen. **Szépligeti**, Potfuz. Termesz. Kozl. vol. XXXIII p. 285—288.
- Sigalphus. **Szépligeti** beschreibt in Potfuz. Termesz. Kozl. vol. XXXIII folg. Spp. aus Ungarn als neu: *rugosus* p. 287. — *sulcatus* p. 288. — *similis* p. 288. — *gibberosus* p. 288. — *simulator* p. 288. — *australis* p. 288. — *bidentulus* p. 288. — *edentulus* p. 288.
- Spathius exaratus*. Parasit von *Anobium domesticum* Fourer. **Johnson, W. F.** — *minutus* **Szépligeti**, Termesz. Füzetek, vol. XXIII p. 55. — *tricolor* p. 55 (beide aus Neu Guinea).
- Stenobracon* n. g. **Szépligeti**, Termesz. Füzetek, vol. XXXIV p. 359. — *oculatus* p. 360 (Borneo).
- Vipio persica* **Szépligeti**, Termesz. Füzetek, vol. XXIV p. 359 (Schacku).

Stephanidae. (Fam. LXXIX.)

Stenophasmus Smith. Bestimmungstabelle der afrikan. Vertreter. **Enderlein**,
Archiv f. Naturg. 67. Jhg. I. Bd. 3. Hft.

- I. Vorderflgl. ohne Discoidalzell. 1. *oncophorus* Schlett.
 II. Vorderflgl. mit Discoidalzelle.
 A. Hinterkopf polirt glatt. 2. *Büttneri* Stdlm.
 B. Hinterkopf mehr oder weniger quer gefurcht.
 a. 2. Abdominaltergit vorn in der Mitte dicht unregelmässig
 runzlig, der übrige Teil fein u. seicht längs gefurcht
 3. *Fülleborni* n. sp.
 b. 2. Abdominaltergit polirt glatt, nur am Vorderrand eine sehr
 schwache Runzlung angedeutet 4. *ingens* n. sp.
 c. 2. Abdominaltergit vorn in der Mitte fein punktiert gerunzelt,
 der übrige Teil mit halbkreisf. bogigen Furchen.
 5. *camerunus* n. sp.

Fülleborni p. 206–207 ♀ (Langenburg am Nyassa See, Deutsch Ost-Afrika).
 — *ingens* p. 207–209 ♀ (Togo, Bismarckburg). — *camerunus* p. 209
 —210 ♀ (Südost-Kamerun, Lolodorf).

Stephanus. **Enderlein**, Archiv f. Naturg. 67. Jhg. I. Bd. 3. Heft: Bestimmungstabelle der afrikan. Vertreter der Gatt.:

- I. Geäder vollständig. Hierher *Anteriori* Grib. u. *pachylomerus* Schlett.
 II. Nur die Medianzelle, Submedianzelle und Radialzelle vollständig.
 A. Auch die 2. Diskoidalzelle vorhanden, doch hinten offen. Radialzelle geschlossen. Das übrige Geäder angedeutet. Metanotum mit Längsfurchen.

Hierher *insignis* Schlett. u. *globiceps* n. sp.

- B. Das übrige Geäder nicht angedeutet.
 a) Diskoidalader vorhanden (von der ganzen Länge der 2. Diskoidalzelle).
 Hierher *natalicus* Westw., *Schlettereri* n. sp., *brevicollis* n. sp. und *Conradi* n. sp.
 b) Diskoidalader nicht vorhanden oder nur an der Basis angedeutet. Flügel hyalin farblos.
 Hierher *togoensis* Stdlm., *terebrellus* n. sp., *flavomaculatus* n. sp. und *brevipetiolatus* n. sp.

Die weitere Untereintheilung siehe im Original.

damellius Westw. Beschr. p. 196–197 ♂ ♀ (Neu Guinea, Milne Bay; Bismarckarchipel, Neu Lauenburg; Borneo). — *pygmaeus* p. 197–198 ♂ ♀ (Südspitze von Neu Guinea, Milne Bay). — *globiceps* p. 200–201 ♀ (Nord-Kamerun, Johann Albrechtshöhe). — *schlettereri* p. 201 ♀ (Fundort wie vorher). — *brevicollis* p. 201–202 ♀ (Togo, Bismarckburg). — *conradi* p. 202–203 ♀ (Togo, Bismarckburg). — *togoensis* Stdlm. p. 203–204 ♂ ♀ (Fundort wie vorher). — *togoensis* var. *fasciatus* n. p. 204 ♀ (Nord-Kamerun, Johann Albrechtshöhe). — *terebrellus* p. 204–205 ♀ (Südost-Kamerun, Lolodorf). — *flavomaculatus* p. 205 ♀ (Nord-Kamerun, Johann Albrechtshöhe). — *brevipetiolatus* p. 205–206 ♀ (Fundort wie vorher).

Suborder Phythophaga (Sessiliventres).

Autoren: Bradley, Cameron, Chittenden, Cholodkowsky, Cockerell, Froggatt, Konow, Macgillivray, Niezabitowski, van Rossum, Schlechtendal.

Superfamilia IX. Siricoidea.

Hierher die Fam. LXXX—LXXXIII: Oryssidae, Siricidae, Xiphydriidae und Cephidae. — Eintheilung, siehe vor. Bericht p. 536.

Oryssidae. (Fam. LXXX.)

Beschreibung der nordamerikanischen Formen: **Bradley.**
Oryssus vespertilio zusammen mit dem Coleopt. Necydalis major, siehe Xiphidria.

Siricidae. (Fam. LXXXI.)

Paururus juvenus L., *noctilio* F. und *cyaneus* F. **Konow**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. p. 45 [13]. — *noctilio* F.? (Heimath Europa. Nordasien) aus Bahia an Kakaosäcken in Hamburg eingeschleppt. **Kraepelin** p. 194. — Sp. aus Westafr. am Quai p. 194.

Sirex gigas L. Bestimm. der Larve. **Konow**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 1. Heft p. 45 [13]. — *gigas* L. in Rotherhithe. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 11 (36) p. 270. — in Ireland. **Bonaparte-Wyse**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 259. — bei West-Runton, Norfolk. **Bradley**, t. c. p. 102. — *juvenus* bei Bournemouth. **Bradley**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 102. — *gigas* L. u. *juvenus* L. Bohren sich öfters durch die Parkettböden von Neubauten und durchlöchern sie. Stuttgart, Jahreshefte des Vereins für vaterl. Naturkunde in Württemb., 57. Jhg., 1901, p. XIX.

Teredonia cubensis Cress. aus Westindien in Pockholz nach Hamburg eingeschleppt. **Kraepelin** p. 194.

Tremex magus F., *fuscicornis* F. und *columba* B. **Konow**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 1. Heft p. 45 [13]. — *columba* L. aus Canada, an Hickoryholz nach Hamburg eingeschleppt. **Kraepelin** p. 194.

Xiphydriidae. (Fam. LXXXII.)

Xiphidria camelus L., *longicollis* L. Geoffr. und *abdominalis* Say. Bestimmung der Larven. **Konow**, Zeitschr. f. syst. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 1. Heft p. 45 [13]. — *annulata* zusammen mit *Gasterocercus depressirostris* F. im Eichenholz. **Rudow**, Insektenbörse, 18. Jhg. p. 324. — *dromedarius* und *Oryssus vespertilio* zusammen mit den Coleopt. *Necydalis major* bei Zerbst in einem alten Kirschbaum. **Rudow**, Insektenbörse, 18. Jhg. p. 324—325. — *camelus* in New Forest, 23. Juni 1840, wahrsch. noch dort zu finden — auf der Insel Man, bei Newcastle. **Dale, C. W.**, The Entomologist, vol. 34 p. 54. — *potanini*. Bemerk. **Semenow**, Revue Russe Entom. vol. I p. 186.

Cephidæ. (Fam. LXXXIII.)

Sie umfassen die Gatt. (Konow, 1896): *Astatus*, *Ateuchopus*, *Caenocephus*, *Calamenta*, *Cephus*, *Janus*, *Macrocephus*, *Monophopus*, *Pachycephus*, *Syrista* und *Trachelus*.

Calamenta statt *Calamenta*, Bericht für 1900, p. 538, Zeile 4 und 5 von oben zu lesen. — *filiformis* Eversm. Bestimm. der Larve. **Konow**, Zeitschr. für system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 1. Heft, p. 44 [12].

Cephus nigrinus C. G. Thoms., *pygmaeus* L. und *cinctus* Nort. Bestimmung der Larven. **Konow**, Zeitschr. für system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 1. Heft p. 44 [12]. — *lunulatus* Strobl (1895) von **Konow** in seiner Monogr. nicht berücksichtigt. Er gehört zu *Caenocephus* Kon. und steht dem *jakowleffi* Kon. aus Ostsibirien in der Hleibsz. äusserst nahe. **Strobl**, Verhdlg. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. für Naturw. 50. Bd. p. 74. — *runcinator* Kon., *pygmaeus* L. in Siebenbürgen. **Strobl**, t. c. p. 73. — *gracilis* (Costa?) Kon. var. *laterimaculatus* n. p. 73—74 (in Eichenhainen bei Fiume).

Janus luteipes Lep., *cynosbati* L., *compressus* F., *abbreviatus* Say, *integer* Nort. **Konow**, Zeitschr. für system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 1. Heft, p. 44 [12].

Macrocephus linearis Schrank und *satyrus* Panz. Bestimm. der Larv. **Konow**, t. c. p. 44 [12].

Syrista Parreyssi Spin. Bestimm. der Larve. **Konow**, t. c. p. 44 [12].

Superfamilia X. Tenthredinoidea Ashm.
(*Chalastrogastra* **Konow**.)

Hierher die Fam. LXXXIV—XCIV: *Xyelidae*, *Lydidae*, *Hylotomidae*, *Lophyridae*, *Perreyiidae*, *Pterygophoridae*, *Selandriidae*, *Nematidae*, *Dineuridae*, *Tenthredinidae* und *Cimbicidae*.

Spinn-Apparat von Lyda: Filippi'sche Drüsen: *Cholodkowsky*.

Uebersicht über die bekannten Larven: siehe unten: **Konow**.

Bemerkungen zu verschiedenen Larven, Zucht (von Cimex), Parthenogenese: van Rossum.

Abb. des Legebohrers einer Blattwespe (roh). *Prometheus* 12. Bd. p. 99 Fig. 59.

Chalastrogastra. **Konow** (7) Kurze morphol. u. biolog. Charakt. Einleitung p. 35—36 [3]—[4]. — **Konow** theilt die Hymenopteren ein in: *Monotrocha*, *Tristega* und *Chalastrogastra*.

Trochanteren eingliedrig: }	I. <i>Monotrocha</i> (<i>Vespoidea</i>)	—	} Metathorax geschlossen, Hinterleib anhangend (<i>Clistogastra</i>)
	—		
	II. <i>Tristega</i> (<i>Ichneumonidea</i>)		
Trochanteren zweigliedrig: (<i>Ditrocha</i>) }	III. <i>Chalastrogastra</i> (<i>Tenthredonidea</i>)	—	} Metath. offen, mit dem Hleib verwachsen.
	4 Cubitalzellen in der Anlage vor- handen. (<i>Tetrastega</i> .)	nur 3 Cubitalzellen in der Anlage vor- handen.	

Uebersicht der zur Unterscheidung der Formen wichtigen Körpertheile (p. 36 [4]—39 [7]. Morphologie: Kopf, Thorax, Hinterleib, Flügel. Nomenklatur des Geäders und sonstige Eigenthümlichkeiten der Flügel (Vfgl. Abb. I, Vfgl. Abb. II). Entwicklung, Biologie, Verbreitung (p. 39 [7]—41 [9]). — Bestimmung der bisher bekannten Larven (p. 41 [9]. — Analytische Uebersicht der Larven p. 42 [10] sq., p. 42 [10]—48 [16] sq. No. 1—71. — Die in Nordamerika im Laufe des Jahres 1900 beschriebenen Larven haben in der Uebersicht nicht mehr aufgenommen werden können. Uebersicht über die Fam. [Larven betreff.].

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Larve ohne Abdominalbeine | 2. |
| — mit solchen; Fühler unter den Augen | 37. |
| 2. mit ziemlich langen, bis 8-gliedrigen Fühlern, die über oder neben den Augen stehen; letztes Bauchsegment mit 2 borstenförmigen Anhängseln (die vielleicht bei den Xyelinen fehlen) | (Fam. Lydidae) 3. |
| — mit kurzen undeutlich gegliederten Fühlern u. mit einer hornigen Afterspitze | Siricidae |
| 3. After abgerundet, Afterborsten gegliedert. | Subf. Lydini. |
| — After mit weicher, am Ende chitinöser Spitze; Afterborsten ungegliedert. | Subf. Cephini. |
| — ohne Afterborsten | Subf. Xyelini. |
| 4. An krautigen Pflanzen | 2 Sp. |
| — An Bäumen u. Sträuchern | Trib. Lydides. |
| 38. Mit 20 Beinen; Kokon einfach | Trib. Nematides. |
| — 18 Beine; selten ein entwickeltes 10. Beinpaar; Kokon doppelt | Trib. Argides. |

Es werden behandelt:

1. Heft p. 42 [10] — 48 [16]. Sp. 1—71: Megalodontes (1), Lyda (4), Cephaleia (4), Neurotoma (2), Pamphilius (6), Macrocephus (2), Syrista (1), Janus (5), Calamenta (1), Cephus (3), Odontophyes (1), Xiphidria (4), Sirex (1), Paururus (3), Tremex (3), Cladius (3), Priophorus (2), Trichiocampus (3), Camponiscus [dafür Leptocercus gesetzt] (4), Dineura (3), Henichroa (2), Cryptocampus (13).

2. Heft p. 97 [17] — 112 [32]. Sp. 72—192: Pontania (23, dar. 1 n.: Kriechbaumeri), Pteronus (42) [1 Sp. ist zu Amauronematus zu stell.], Amauronematus (9 + [1 v. Pteronus] [10], Croesus (5), Holcocneme (5), Nematus (5), Pachynematus (12, dar. 1 n.), Lygaeonematus (11, dar. 1 n.), Pristiphora (9).

3. Heft p. 161 [33] — 176 [48]. Sp. 193—294: Pristiphora (9), Micronematus (3), Aprosthema (1), Schizoceros (1), Dicloceros (1), Arge (12), Monoctenus (2), Lophyrus (16), Acorduleceros (1), Perga (6), Cimbex (9), Trichiosoma (6), Clavellaria (1), Abia (5), Phyllotoma (5), Eriocampoides (8), Hoplocampa (11), Mesoneura (1), Periclista (3), Phreophora (1).

4. Heft p. 225 [49] — 240 [64]. Sp. 295—392: Ardis (3), Rhadinoceraea (3), Phymatoceros (1), Tomostethus (3), Blennocampa (5), Monophadnus (7), Scolioneura (3), Ectodecta (2), Pseudodineura (12), Kalyosysphinga (3), Fenusa (2 + 1 ?), Fenella (1), Harpiphorus (1), Athalia (5), Selandria (5), Stromboceros (1), Strongylogaster (5), Eriocampa (2), Poecilosoma (10), Emphytus (13), Taxonus (6), Dolerus (7 + 2 ?), Sciapteryx (1), Rhogogastera (2), Tenthredopsis (2).

5. Heft p. 289 [65] — 304 [80]. p. 289—293. Sp. 393—418: Pachyprotasis (3), Macrophyta (4), Encarsioneura (1), Allantus (6), Tenthredo (12).

Übersicht der Larven nach ihren Nährpflanzen, Pflanzennamen (alphabetisch geordnet) und zwar p. 294 [70] — 304 [80]. *Abies excelsa* D. C. — *Cydonia vulgaris* Pers. — Fortsetzung folgt.

Sonstige Formen, die unter den unten benannten Familien nicht aufgeführt sind:

- Acidiophora*. Charakt. **Konow**, Termesz. Füzetek vol. XXIV p. 61.
- Aprosthemata bifida* Kl. Bestimm. der Larve. **Konow**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 3. Hft. p. 162(34).
- Atocus fossil* n. g. siehe p. 408 dieses Berichts.
- Chalinus*. Charakt. **Konow**, Termesz. Füzetek vol. XXIV p. 57.
- Cibdela scita* **Konow**, Termesz. Füzetek vol. XXIV p. 59 (Celebes).
- Dieloceros formosus* Kl. Bestimm. der Larve. **Konow**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 3. Hft. p. 162(34).
- Emphytoides scurrilis* **Konow**, Termesz. Füzetek vol. XXIV p. 66 (Java).
- Ericampoides limacina* Retz. u. *varipes* Kl. Bestimm. der Larve. **Konow**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 3. Hft. p. 173[45]. — *cinxia* Kl. *annulipes* Kl., *aethiops* F., *cerasi* Peck., „*quercus alba*“ (sic!) Nort., Rosae W. Harr. p. 174[46]
- Haplostegus* n. g. *Lobocerotides* **Konow**, Termesz. Füzetek vol. XXIV p. 70. — *epimelas* p. 70. — *cataphractus* p. 71. — *clitellarius* p. 71 (alle drei aus Südamerika).
- Hemichroa crocea* Geoffr. (Hatfjelddalen) **Strand**, Arch. for Math. og Naturv. 22. Bd. No. 3 p. 13.
- — Bestimm. der Larve. **Konow**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 1. Hft. p. 47[15]—48[16]. — *Alni* L.
- Labidarge braunsi* ♂ **Konow**, Termesz. Füzetek vol. XXIV p. 57.
- Loboceros retusicornis* **Konow**, Termesz. Füzetek vol. XXIV p. 69. — *gibbifrons* p. 69 (beide aus Südamerika)
- Lobocerotides*. Übersicht über die Gatt. **Konow**, Termesz. Füzetek vol. XXIV p. 67.
- Mesoneura opaca* F. Bestimm. d. Larve. **Konow**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 3. Hft. p. 175[47].
- Monoctenus Juniperi* L. und *obscuratus* Htg. Bestimm. der Larven. **Konow**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 3. Hft. p. 165(37).
- obscuratus* Htg. (Ødemark). **Strand**, Arch. for Mathem. og Naturv. 22. Bd. No. 3 p. 13. — *juniperi* L. (Ødemark) p. 13.
- Neuroterus baccarum* L. auf div. Spp. **Kieffer** p. 436—437. — *tricolor* H., desgl. p. 437. — *vesicator* Schlecht. p. 440. — *laeviusculus* var. *reflexus* Kieff. p. 440. — *numismalis* Ol. u. *lanuginosus* Gir. p. 441. — *laeviusculus* Schenck. p. 442. — *fumipennis* L. p. 442—443. — *lenticularis* Ol. u. var. *histrion* Kieff., *laeviusculus* Schenck. mit var. *reflexus* Kieff. p. 443. — *minutus* Gir. auf *Qu. cerris* u. *pseudosuber* p. 445.
- Parnophora nigripes* Kl. Bestimm. d. Larve. **Konow**, Zeitschr. f. syst. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 3. Hft. p. 176[48].

Periclista melanocephala F., *pubescens* Zadd. und *lineolata* Kl. Bestimm. der Larven. **Konow**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jahrg. 3. Hft. p. 176[48].

Pterygophorus. Bemerk. über die Larven u. s. w. **Froggatt**, Agric. Gaz. N. S. Wales vol. XII p. 1069, 1070.

Rhadinoceraea ventralis Panz., *micans* Kl. u. *Reitteri* Knw. Bestimm. der Larven. **Konow** Zeitschr. f. syst. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 4. Hft. p. 225[49].

Xyelidae. (Fam. LXXXIV.)

Odontophyes avingrata Dyar. Bestimmung der Larve. **Konow**, Zeitschr. für system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 1. Heft p. 44 [12].

Lydidae. (Fam. LXXXV.)

Cephalia alpina Kl. var. *annulicornis* Htg. Botne, für die norwegische Fauna neu. **Strand**, Arch. for Mathem. og Naturv. 22. Bd. No. 3 p. 14. — *alpina* Kl. Bestimmung der Larve. **Konow**, Zeitschr. für system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 1. Heft p. 42 [10]. — *Abietis* L., *signata* F., *reticulata* L., desgl. p. 43 [11].

Lyda. Kalamität siehe **Lüke** (nicht **Lücke**) p. 341 dieses Berichts.

In Hauptflugjahren sollte bei 15 Stück auf 1 qm gefundenen Larven, sonst bei 20 Stück, zu Vertilgungsmitteln gegriffen werden. Die in der Regel 3jährige Generation kann mindestens 2-, sogar wohl 1-jährig werden. Licht und Wärme scheinen, wie auch Zimmerexperimente lehren, die Entwicklung im höchsten Grade zu beeinflussen. Eigenthümlich ist das allmählich zunehmende Flugvermögen der Imagines. Sie kriechen erst im Moose, befliegen dann das Unterholz und dann erst die untersten Zweige der Kiefer. Regelmässigkeit des Erscheinens der ersten Wespen vom 26—28. V. Beziehen des Winterlagers von Seiten der gehäuteten larvenreifen Raupen ziemlich gleichzeitig Mitte August. Gegenmittel.

erythrocephala L., p. 540 des vorigen Berichts, gehört zu den *Lydidae* und ist versichtlich unter die *Hylotomidae* geraten. — *stellata* Christ, *hieroglyphica* Christ, *erythrocephala* L., *Laricis*. Bestimmung der Larven. **Konow**, t. c., p. 42 [10]. — 8 Spp. von Siebenbürgen. **Strobl**, Verhdlgn. u. Mittheil. des Siebenb. Ver. f. Naturw. 50. Bd. p. 73.

Megalodontes spissicornis Kl. Bestimmung der Larve. **Konow**, t. c. 1. Heft p. 42 [10].

Neurotoma flaviventris Retz. und *nemoralis* L. Bestimmung der Larven. **Konow**, t. c., p. 43 [11].

Pamphilus depressus Schrank, *silvaticus* L., *Betulae* L., *inanimatus* Vill., *balteatus* Fall. Bestimmung der Larven. **Konow**, p. 43 [11]. — *lucorum* F., desgleichen p. 44 [12].

Hylotomidae. (Fam. LXXXVI.)

Arge. Bestimmung der Larve. **Konow**, Zeitschr. für system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 3. Heft p. 163 [35] sq. und zwar: *coeruleipennis* Retz., *enodis* L., *Berberidis* Schrank, *pullata* Zadd. p. 163 [35]. — *coerulescens* L., Geoffr.,

- ustulata L., atrata Först., pagana Parz., Rosae L. p. 164 [36]. — Mac Layi Leach [Dyar will die Larven gezogen haben], pectoralis Leach, scapularis Kl. p. 165 [37]. — Schrk. 9 Spp. in Siebenbürgen. **Strobl**, Verhdlgn. u. Mittheil. Siebenbürg. Verw. für Naturk. 50. Bd. p. 75. — Neu: *compar* **Konow**, Termesz. Füzetek, vol. XXIV p. 59 (Japan).
- Arge fuscipes* Fall. var. (Dønna, Hatfjelddalen) **Strand**, Arch. for Math. og Naturv. 22. Bd. No. 3 p. 12.
- Cyphona furcata* Vill. in Eichenhainen bei Fiume, Siebenbürgen. **Strobl**, Verhdlgn. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturw. 50. Bd. p. 75.
- Eriglenum* n. g. (*Arge* nahestehend) **Konow**, Termesz. Füzetek, vol. XXIV p. 60. — *crudum* p. 60 (Brasilien).
- Ptilia albipes* **Konow**, Termesz. Füzetek vol. XXIV p. 61 (Brasilien).
- Schizoceros geminatus* Gmel. Bestimm. d. Larve. **Konow**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 3. Hft. p. 162(34).
- Stelidarge* n. g. (bei *Arge*) **Konow**, Termesz. Füzetek, vol. XXIV p. 58. — *diptycha* p. 58 (Brasil.).

Lophyridae. (Fam. LXXXVII.)

- Lophyrus*. Bestimmung der Larven. **Konow**, Zeitschr. für system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 3. Heft p. 165 [37] sq. — *nemorum* F. p. 165 [37]. — *abieticola* D. T., *Hercyniae* Htg., *polytomus* Htg., *pallidus* Kl. p. 166 [38]. — *virans* Kl., *Laricis* Jur., *Thomsoni* Knw., *frutetorum* F., *dorsatus* F. p. 167 [39]. — *socius* Kl., *rufus* Latr., *Pini* L., *Abietis* W. Harr., *Lecontei* Fitch, *pinetum* (sic!) Nort. p. 168 [40]. — *pini* L. Larve der grossen Kiefernblattwespe, 1901 in einigen Revieren des Spreewaldes; Vernichtung durch Austreiben der Schweine in die Wälder vortheilhaft; vorher 283 Stück pro qm, nachher nur 30; Rest soll durch Hühner beseitigt werden. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 237. — Ltr. 4 Spp. in Siebenbürgen. **Strobl**, Verhdlgn. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturk., 50. Bd. p. 75.

Perreyidae. (Fam. LXXXVIII.)

Vacant.

Pterygophoridae. (Fam. LXXXIX.)

- Acorduleceros dorsalis* Say. Bestimmung der Larve. **Konow**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 3. Heft p. 168 [40].
- Athalia* **Konow**, t. c. 4. Heft p. 231 [55]. Bestimmung der Larven folgender Formen: *colibri* Christ, *glabricollis* C. G. Thoms., *lineolata* Lep., nebst var. *cordata* Lep. u. var. *liberta* Kl., *Scutellariae* P. Cam. und *annulata* F. — *rufoscutellata* Mocs. (am Götzenberg), *spinarum* Fbr. (auf *Ferula* bei Fiume), *rosae* L. Ad. mit 2 Varr. (bei Fiume im Rečinathal etc.) **Strobl**, Verhdlgn. u. Mittheil. Naturw. 50. Bd. p. 76. — *abdominalis* Lep. Galle auf *Clematis recta* L. **Kieffer**, p. 295. — *spinarum* F., gegenwärtig seltenes Vorkommen in England. **Morice** (9) p. 98. — **Mc Lachlan**, t. c. p. 128. — desgl. **Morley**, t. c. p. 142.

Selandriidae. (Fam. XC.)

- Blennocampa affinis* Fall., *pusilla* Kl., *pygmaea* Say, *alternipes* Kl. und *tenuicornis* Kl. Bestimmung der Larven. **Konow**, Zeitschr. für system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 4. Heft p. 226—227 [50—51]. — *pusilla* Klug. Gallen auf diversen Rosen. **Kieffer** p. 477.
- Canonaias* n. g. (bei *Selandrium*) **Konow**, Termesz. Füzetek vol. XXIV p. 65. — *inopinus* p. 65 (Java).
- Emphytus canadensis*. Biologie, Parthenogenesis. **Chittenden**, Bull. U. S. Dep. Agric. ent. vol. XXVII p. 26—34.
- Entodecta pumilus* Kl. und Gei Brischke. Bestimmung der Larven. **Konow**, t. c. 4. Heft p. 229 [53].
- Eriocampa ovata* L. u. *atripennis* F. Bestimmung der Larven. **Konow**, t. c., 4. Heft p. 233 [57].
- Fenella intercus* Vill. **Konow**, t. c. 4. Heft p. 230 [54].
- Fenusa hortulana* Kl., *pygmaea* Kl. u. (?) Rubi S. Fort. **Konow**, t. c. 4. Heft p. 230 [54].
- Harpiphorus lepidus* Kl. Bestimmung der Larve. **Konow**, t. c. 4. Heft p. 230 [54].
- Hoplocampa*. Bestimmung der Larven. **Konow**, t. c. 3. Heft: *halcyon* Nort., *testudinea* Kl. p. 174 [46]. — *brevis* Kl., *Crataegi* Kl., *plagiata* Kl., *alpina* Zett., *flava* L., *minuta* Christ, *rutilicornis* Kl., *chrysorrhoea* Kl. und *Xylostei* Giraud p. 175 [47].
- Hoplocampa xylostei* Gir. auf divers. *Lonicera* Spp. **Kieffer** p. 358.
- Hoplocampa fulvicornis* Klug. Plommonsägstekeln. **Andersson, Josef**, Entom. Tidskr. 22. Arg. p. 57—60.
- Kalyosysphinga Ulmi* Sund., *pumila* Kl., Dohrni Tischb. Bestimmung der Larven **Konow**, t. c. 4. Heft p. 229 [53].
- Monophadnus*. Bestimmung der Larven folg. Sp.: *geniculatus* Htg., *Spinolae* Kl., *elongatulus* Kl., *monticola* Htg., *albipes* Gm., Rubi W. Harr. und *cordiger* Pal. **Konow**, t. c., 4. Heft p. 227 [51]. — *elongatulus* (Klug) **Konow** als Rosenschädling. **von Schlechtendahl**. Beobachtung des Eierlegens. Der Entwicklungsgang der Wespe liegt jetzt fast lückenlos vor uns und der aufwärts steigende Rosenbohrer hat seinen wissenschaftlichen Namen gefunden. Darstellung des Entwicklungsganges. — *spinolae* Kl. Kn. (in Eichenhainen bei Fiume). **Strobl**, Verhdlgn. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturw. 50. Bd. p. 76. — *monticola* Hartig legt ihre Eier in die Unterseite der Blätter von *Heleborus foetidus* L., wodurch kleine Warzen entstehen. In diesen Warzen kriechen auch die Larven aus und verharren dort einige Zeit, wie die dort befindlichen Experimente beweisen. Sie nagen dann noch ein kleines Loch von innen heraus, drücken den Kopf durch diese Oeffnung, klammern sich mit den freien Beinen fest und arbeiten sich in ungefähr 30 Sekunden aus der Oeffnung heraus. Nun ruhen sie sich etwa 10 Min. aus. **Pierre, J.**, Les premiers états de *Monophadnus monticola*. Revue scientif. du Bourbonnais No. 157, 1900. Nach Ref. von R. Tümpel, Illustr. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 350.
- Monophadnus monticola* Hart. Galle auf *Heleborus foetidus* L., *niger* u. *viridis* **Kieffer** p. 335.

- Phylacteophaga eucalypti* und Larve. **Froggatt**, Agric. Gaz. N. S. Wales vol. XII p. 1071 Abb. Taf. Fig. 1 u. 2.
- Phyllotoma*. Bestimm. d. Larven. **Konow**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 3. Hft.: *nemorata* Fall., *ochropus* Kl., *Aceris* Klth., *microcephala* Kl. u. *vagans* Fall p. 173[45].
- Phymatoceros aterrimus* Kl. Bestimmung der Larve. **Konow**, Zeitschr. für system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 4. Heft p. 225 [49].
- Poecilosoma*. **Konow**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 4. Heft. Bestimm. der Larven folg. Spp.: *abdominalis* F., *pulverata* Retz., *multicolor* Nort. p. 233 [57]. — *candidate* Fall., *immersa* Kl., *excisa* C. G. Thoms., *litrata* Gm., *maculata* Nort., *longicornis* C. G. Thoms. p. 234 [58]. — *pulverata* Retz. Das Vorkommen des Kokons steht in Uebereinstimmung mit der Feuchtigkeit des Zweiges. In trockenen Zweigen kein Kokon, in feuchten ein solcher vorhanden. **Nielsen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 308. — *abdominalis* Fall. (Klovimoen), Klugi Stph. (= *carbonaria* Knw.), Klovimoen, Ødemark, letzt. f. Norweg. Fauna neu; *litrata* Gmel. (= *guttata* Fall.) Klovimoen. **Strand**, Arch. for Mathem. og Naturv. 22. Bd. p. 13 No. 3.
- Pseudodineura Hepaticae* Brischke u. *fuscula* Kl. Bestimmung der Larve. **Konow**, t. c. 4. Heft p. 229 [53].
- Scolioneura betuleti* Kl., *vicina* Knw. u. *tenella* Kl. Bestimmung der Larven. **Konow**, t. c., 4. Heft p. 228 [52].
- Selandria*. **Konow**, t. c., 4. Heft, p. 231–232. Bestimmung der Larven folg. Formen: *Sixii* Voll. u. *Serva* F. p. 231 [55]. — *cinereipes* Kl., *stramineipes* Kl. und *coronata* Kl. p. 232 [56]. — *analis* Thoms. Galle auf *Polystichum filix-mas*. **Kieffer** p. 386. — *coronata* Klug. sp. Ein grosser Schädling der Farne. von **Schlechtendahl**. — *serva* Fabr. und *morio* Fbr. (Fundorte in Siebenbürgen) **Strobl**, Verhdlgn. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturw. 50. Bd. p. 76. — *temporalis* Thoms. Galle auf *Pteris aquilina* L. **Kieffer** p. 399. — Neu: *mica* **Konow**, Termesz. Füzetek, vol. XXIV p. 62 (Singapore).
- Stromboceros delicatulus* Fall. Bestimmung der Larve. **Konow**, t. c., 4. Heft, p. 232 [56].
- **Konow** beschreibt in Termesz. Füzetek vol. XXIV folg. n. spp.: *mocsaryi* p. 62. — *nobilis* p. 63. — *normatus* p. 63. — *trigemnis* p. 63. — *farctus* p. 64 (sämmtl. aus Süd-Amerika). — *congener* p. 64 (Lombok). — *albicomus* p. 65 (Malacca).
- Strongylogaster cingulatus* Fabr. auf *Pteris aquilina*. **Kieffer** p. 399 in d. Anm. *Sunoxa* (Bericht für 1899 p. 502). Ironische Besprechung der Gattung durch **Konow**, t. c., 1. Heft, p. 17. — Die geglied. Hintertibien sollen wahrscheinlich die Wiedererkennung der Art verhindern. Fühler und Hinterleib fehlen! Mesonot. dreilappig. — Wohl ein *Stromboceros*. Auffindung des Heibs nicht wünschenswerth, da schliesslich dafür ein neues n. g., n. sp. zu befürchten wäre; namentl. wenn dieser After „*coeruleus*“ wäre, würde ein „*purpureianus*“ sehr nahe liegen.
- Tarpa*. 3 Spp. von Siebenbürgen. **Strobl**, Verhdlgn. u. Mittheil. d. Siebenb. Ver. f. Naturw. 50. Bd. p. 73.
- Thrinax mixta* Klg. (bei Hermannstadt) **Strobl**, Verhdlgn. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. 50. Bd. p. 76.

- Tomostethus fuliginosus* Schrank, *nigritus* F., *melanopygus* A. Costa. **Konow**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 4. Hft. p. 226[50].
 — Zu den 5 bek. britisch. Sp. fügt **Morice**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 5, 2 weitere hinzu: *gagathinus* Klg. ♂ von Thornley b. Lincoln u. *funereus* Klg. ♂ bei Appledore Kent. — Hauptunterschied d. Gatt. Beschreib. der beiden Species.
gagathinus Klg. (Orlater Bergwiesen) u. *ephippium* Pz. var. *nigrans* Kon. Cat. = *aethiops* Kon. Rotenturmpass, Siebenbürgen. **Strobl**, Verh. u. Mittheil. Siebenb. Ver. f. Naturw. 50. Bd. p. 76.

Nematidae (Fam. XCI).

- Nematide*. Galle auf *Sanguisorba officinalis* L. **Kieffer** p. 499.
Amauronematus. Bestimm. der Larven folg. Sp.: *luteitergis* Nort. **Konow**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 2. Hft. p. 105[25]. — *histrion* Lep., *fallax* Lep., *vittatus* Lep., *nigratus* Retz., *Fähraei* C. G. Thoms., spec., *leucolenus* Zadd., *viduatus* Zett. p. 106[26]. — *humeralis* Zett. Larve, Kokon Nährpflanze, u. *amplus* Knw. Larve, Nährpflanze. **Carpentier**, L., t. c. 4. Hft. p. 223.
Cladius *Comari* R. v. Stein. Bestimm. d. Larve. **Konow**, Zeitschr. f. Hym. u. Dipt. 1. Jahrg. 1. Hft. p. 45[13]. — *pectinicornis* Geoffr., *difformis* Panz. p. 46[14].
Croesus. Bestimm. der Larven. **Konow**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 2. Hft. p. 107[27]: *latipes* Vilaret, *septentrionalis* L., *Brischkei* Zadd., *varus* Villaret u. *latitarsis* Nort.
Cryptocampus. Bestimm. der Larven folg. Sp.: *Populi* Htg., *medullarius* Htg., *ovum* Walsh., *nodus* Walsh., *salicicola* E. A. Sm., *orbitalis* Nort., *laetus* Zadd., *ater* Jur., *nigritarsis* P. Cam., *saliceti* Fall., *pygmaeus* Brischke, *venustus* Zadd. u. *testaceipes* Brischke. **Konow**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 1. Hft. p. 48[16].
 — Bestimm. der Gallen auf *Salix* von: *laetus* Zadd. auf *S. viminalis* L., *saliceti* Fall. non Zett. auf *S. aurita* u. *cinerea*, *nigritarsis* Cam. auf *S. caprea*, *ater* Jur. auf *S. fragilis* L., *amerinae* L. auf div. *S.*-*Spp.*, *angustus* Hart. auf div. *S.* p. 486. — *sp. n.* auf *S. viminalis*, *venustus* Zadd. auf *S. aurita* u. *caprea*, *testaceipes* Brischke auf *S. fragilis*, *sp.?* auf *S. viridis* Fr. p. 487.
Euura Cooperae **Cockerell**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 335 (Umgebung von Las Vegas, N. M. — Galle ähnlich der folg.). — *salicis-nodus* Walsh. p. 336 (Umgebung von Las Vegas, N. M.).
populi Hart. (non *pentandrae* Retz.) auf *Populus tremula* (Hartig) und *nigra* (Kieffer) **Kieffer** p. 387.
Holococneme. Bestimm. der Larven. **Konow**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 2. Hft.: *Erichsoni* Htg., *crassa* Fall., *coeruleicarpa* Htg. u. *insignis* Zadd. p. 107[27]. — *lucida* Panz. p. 108[28].
Lygaeonematus Strandi (*pallipes* Fall. u. *alpinus* Thoms. am nächsten, untersch. durch das kurze dritte Fühlerglied u. die schmale Sägescheide. Bei beiden 3. Fühlerglied mindest. so lang wie 4. Sägescheide bei *pallipes* zwar auch

schmal, aber gegen das Ende stark verschmälert, bei alp. ist sie dreimal so dick als die Cerci u. am Ende breit gerundet) **Konow**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 2. Hft. p. 92 ♀ (Norwegen).

Micronematus. Bestimm. d. Larven von abbreviatus Htg., californicus Marl., Monogyniae Htg. **Konow**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 3. Hft. p. 162[34].

Nematus. Bestimm. der Larven. **Konow**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 2. Hft. p. 108 [28]: unicolor Marl., acuminatus C. G. Thoms., abdominalis Panz., bilineatus Kl., luteus Panz.

Ribesii Scop. (Krusbärstekeln). Entom. Tidskr. 21. Årg. p. 91.

suavis Ruthe ist, wie die Untersuchung des Originals ergibt, ein Amauronematus (u. eine durch die Form der Sägescheide ganz singulär dastehende Sp.) u. gehört zur 2. Abth. der Gatt. Brachycolus (am besten als 1. Sp.). Thomson beschreibt das Thier als N. Dahlbomi. **Konow**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jahrg. 6. Hft. p. 366 (Island, Schweden).

nigricornis Zadd. ist sicher nicht zu deuten. **Konow** stellt das Thier in der Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jahrg. 5. Hft. p. 278 zu Lygaeonematus ambiguus Fall. — klugi Gimmerthal ist nicht zu deuten p. 278. — viridissimus Möll. ist zu Pteronurus curtispinis Thoms. oder zu microcercus Thoms. zu ziehen. Entscheidung nicht möglich p. 278.

luteus Pz. (Waldregion d. Bucsecs) **Strobl**, Verhdlgn. u. Mitteil. Siebenb. Ver. f. Naturw. 50. Bd. p. 75.

?fuscus Lep. Galle auf Stachys recta L. **Kieffer** p. 519.

Pachynematus. Bestimm. d. Larven von trisignatus Först., obductus Htg., conductus Ruthe, clitellatus Lep., brachyotus Först. (dafür turgidus Zadd. zu setzen), extensicornis Nort., albipennis Htg. **Konow**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 2. Hft. p. 109[29]. — Romicis Fall., scutellatus Htg., nigriceps Htg., ocreatus Harrington, Zaddachi n. sp. (an Pappeln bes. Pop. tremula; nach hinten etwas verschmälert, grün u. schwarz. Augen) p. 110[30].

Pachynematus leucogaster Hrt. (in Eichenhainen bei Fiume) **Strobl**, Verhdlg. u. Mittheil. Siebenb. Ver. f. Naturw. 50. Bd. p. 75.

corticosis **Macgillivray**, Bull. N. York Mus. vol. 47 p. 584 (Adirondacks).

Pontania. Bestimm. der Larven. **Konow**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 2. Hft. p. 97[17]—98[19] u. zwar leucosticta Htg., viminalis Htg., puella Thoms., xanthogastra Först. (handschriftl. im K.'schen Buche geändert in piliserris Thoms.), scotaspis Först., vesicator Bremi, proxima Lep. femoralis P. Cam., Salicis Christ. p. 97. — pedunculi Htg., bella Zadd., *Kriechbaumeri* p. 98 (Gallen erbsengross, dicht filzig, behaart; an Salix incana Schreck.), collactanea Först., vacciniella P. Cam., pisum Marl., pomum Marl., resinicolor Marl., Bruneri Marl., hyalina Nort., desmodioides Walsh., californica Marl., gracilis Marl. und parva Cress. p. 98[18]. — **Pontania** Costa. 1. Analytische Uebersicht der Arten. **Konow**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 2. Hft. p. 81—84. — 2. Bemerk. zu den einzelnen Spezies p. 84—91 u. 127—134. — 3. Systematische Tabelle der P.-Sp. p. 134—136. 1. bipartita Lep. Bestimm. p. 81. — Bemerk. p. 84—85. —

2. *xanthogastra* Först. (im von Konow geliehenen Bande der Zeitschr. gestrichen, dafür *piliserris* Thoms. gesetzt), Bestimm. p. 81, Bemerk. p. 85. — 3. *scotaspis* Först. Bestimm. p. 81, Bemerk. p. 85. — 4. *leucosticta* Htg. Bestimm. p. 81, Bemerk. p. 85. — 5. *viminalis* Htg., Bestimm. p. 82 nebst var. *nigrifrons* Knw., Bemerk. p. 85—88, Deutung etc. — 6. *puella* Thoms. Bestimm. p. 82, Bemerk. p. 88—89. — 7. *ancilla* (von *puella* durch die Form der Legescheide und Bildung der Stirn verschieden) Bestimm. p. 82, Beschr. p. 89—90 ♀ (Deutschl., Erzgebirge). — 8. *vesicator* Bremi Bestimm. p. 82, Bemerk. p. 90. — 9. *collactanea* Först. Bestimm. p. 82, Bemerk. p. 90. — 10. *Kriechbaumeri* (erzeugt kleine erbsengrosse, dicht filzig behaarte Gallen auf *Salix*).
- Priophorus Padi* L. u. *tristis* Zadd. Bestimmung der Larve. **Konow**, t. c., 1. Heft p. 46 [14]. — *tristis* Zadd. (am Götzenberg, Siebenbürgen) **Strobl**, Verhdlgn. u. Mittheil. Siebenb. Ver. f. Naturk. 50. Bd. p. 75.
- Pristiphora*. Bestimmung der Larven. **Konow**, l. c., 2. Heft: *geniculata* Htg., *Aquilegiae* Voll. [dafür zu setzen: *alnivora* Htg.], p. 111 [31]. — *pallidiventris* Fall., spec., *pallipes* Lep., *puncticeps* C. G. Thoms. [dafür zu setzen *Staudingeri* Ruthe, *Wüstneii* R. v. Stein [dafür zu setzen *melanocarpa* Htg.], *fulvipes* Fall. u. *crassicornis* Htg., *ruficornis* Oliv., *tetrica* Zadd. [dafür *Thalictri* Zadd. zu setzen], *punctifrons* C. G. Thoms., *Betulae* Retz., *conjugata* Dahlb., *Quercus* Htg. p. 161 [33]. — *idiota* Nort., *sycophanta* Nort., *Murtefeldtae* Marl. p. 162 [34]. — *pallidiventris* Fall. (Hatfeldalen) **Strand**, Arch. for Mathem. og Naturv. 22. Bd. No. 3 p. 13. — *subfida* Thoms. Beschreibung der Larve, des Kokons; Nährpflanze. **Carpentier**, L., Zeitschr. für system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 4. Heft, p. 223. Nach Konow's Notiz ad 71 seines Katalogs. — Larv.-Best. — *conjugata* Dlb. (Karpathen) **Strobl**, Verhdlgn. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturv. 50. Bd. p. 75.
- Pteronus*. Bestimmung der Larven. **Konow**, Zeitschr. für system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 2. Heft p. 97 [19] sq. und zwar: *pavidus* L., *melanaspis* Htg., *miliaris* Panz., *Salicis* L., *fagi* Zadd., *dimidiatus* Lep., *ferrugineus* Först. (im Konow'schen Buche handschriftlich gestrichen), *leucotrochus* Htg., *ribesii* Scop., *oligospilus* Först. [dafür *polyspilus* Först. zu setzen], *brevivalvis* C. G. Thoms. p. 100 [20]. — *trilineatus* Nort., *Capreae* L., *hypoxanthus* Först., *microcerus* C. G. Thoms. [dafür *oligospilus* Först. zu setzen], *virescens* Htg. p. 101 [21]. — *dispar* u. *bergmanni*, Synon. u. Parthenogenesis. **van Rossum**, Tijdschr. v. Entom. vol. XLIV, Verslag, p. 22—26. — *Bergmanni* Dahlb. [dafür *dispar* Brischke zu setzen], *curtispinis* C. G. Thoms., *testaceus* C. G. Thoms., *dilutus* Brischke, *nigricornis* Lep. p. 102 [22]. — *jugicola* C. G. Thoms. [dafür *simulator* Först. zu setzen], *laevis* Brischke [dafür *Amauronematus tunicatus* Zadd. zu setzen], *Spiraeae* Zadd., *Myosotidis* F., *incompletus* Först. [dafür *segmentarius* Först. zu setzen], *togatus* Zadd., *hortensis* Htg., *trilineatus* Nort. p. 103 [23]. — *Quercus* Marl., *Marlatti* Dyar, *Coryli* Cress., *hyalinus* Mart., *latifasciatus* Cress., *pinguidorsis* Dyar p. 104 [24]. — *thoracicus* Harrington, *Hudsoni* Marl., *vertebratus* Say, *Populi* Marl., *mendicus* Wash., *ventralis* Say, *odoratus* Dyar p. 105 [25]. — *salicis* L. (bei Hermannstadt) **Strobl**, Verhdlgn. u. Mittheil. Ver. f. Naturw. 50. Bd. p. 75.
- Trichiocampus Ulmi* L., *viminalis* Fall. und *aeneus* Zadd. Bestimm. d. Larven. **Konow**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 1. Heft. p. 46 [14].

Dineuridae. (Fam. XCII).

Dineura nigricans Christ, *stilata* Kl. und *testaceipes* Kl. Bestimmung der Larve. **Konow**, Zeitschr. etc. 1. Heft p. 47 [15]. — (= Geeri Kl.) **Strand**, Arch. for Math. og Naturv. 22. Bd. No. 3 p. 13.

*Tenthredinidae.*¹⁾ (Fam. XCIII).

- Tenthredinidae.* Verbreitung schwedischer. **Nordenström** p. 205—206. — Galle auf *Fraxinus angustifolia* Vahl. **Kieffer** p. 321. — Galle auf *Genista tinctoria* L. p. 327, auf *G. pilosa* p. 328. — Galle auf *Prunus spinosa* L. p. 396. — Galle auf *Rubus villosus* p. 481—482. — Galle an *Viburnum lantana* u. *opulus*. **Kieffer** p. 549.
- Allantus* Jur. 8 Spp. von Siebenbürgen. **Strobl**, Verhdlgn. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturw. 50. Bd. p. 78. — Bestimmung der Larven. **Konow**, Zeitschr. etc. 5. Heft, und zwar: *flavipes* L. *Geoffr.*, *Dominiquei* Knw., *Scropulariae* L. p. 290. — *vespa* Retz., *arcuatus* Först. u. *marginellus* F. — Neu: *galiciensis* **Niezabitowsky**, Sprawozd. Kom. Krajo, vol. XXXIV p. 7 (Bukowina). — *largifasciatus* **Konow**, Termesz. Füzetek, vol. XXIV p. 67 (Sikkim).
- Camponiscus* [dafür *Leptocercus* zu setzen]. Bestimmung der Larven von *luridiventris* Fall., *pectoralis* Lep., *Auritae* Zadd. und *ovatus* Zadd. **Konow**, Zeitschr. f. syst. Hym. etc. 1. Jhg. 1. Heft p. 47 [15].
- Dolerinae* statt *Dolarinae* zu lesen p. 544 des vorigen Ber., Zeile 6 von oben.
- Dolerus*. **Konow**, Zeitschr. etc. 4. Heft. Bestimmung der Larven von *pratensis* L. p. 237 [61]. — *paluster* Kl., *madidus* Kl., *haematodes* Schrank, *gonager* F., *nigratus* Müll., (?) *coruscans* Knw., p. 238 [62]. — (?) *gibbosus* Htg. und *unicolor* Palis. p. 239 [63]. — *pratensis* Fall. (Orlater Bergwiesen, Siebenbürgen) **Strobl**, Verhdlgn. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturw. 50. Bd. p. 76. — *aeneus* Htg. (Ødemark, Røsvand, Hatfjelddalen) **Strand**, Arch. for Mathem. og Naturv. 22. Bd. p. 14. — *pratensis* L. v. *nigripes* Knw, Røsvand Varieteten er ny for faunaen p. 14. — *dubius* Klug. (Røsvand) No. 3 p. 14.
- Emphytus* **Konow**, Zeitschr. etc., Bestimmung der Larven folgender Formen: *tener* Fall., *calceatus* Kl., *rufocinctus* Retz., *cinctus* L., *viennensis* Schrank., *cingillum* Kl., *togatus* Panz. p. 235 [59]. — *braccatus* Gm., *serotinus* Müll., *Grossulariae* Kl., *Carpini* Htg., *perla* Kl. und *varianus* Nort. p. 236 [60]. — *carpini* Htg. (Klovimoen) **Strand**, Arch. for Mathem. og Naturv. 22. Bd. No. 3 p. 14.
- Encarsioneura* *Sturmi* Kl. Bestimmung der Larve. **Konow**, t. c., 5. Heft, p. 290 [66].
- Leptocercus* siehe *Camponiscus*.
- Macrophya*. Bestimmung der Larven. **Konow**, t. c., 5. Heft: *punctum-album* L., p. 289 [65]. — *albicincta* Schrank, *Ribis* Schrank u. *12-punctata* L. p. 290 [66]. — Neu: *rustica* L. (Fiume) **Strobl**, Verhdlgn. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver.

¹⁾ Im Bericht für 1900 steht versehentlich *Tenthredinae*, p. 544 u. 545 (Ueberschrift).

- f. Naturw. 51. Bd. p. 77. ♂ *var. fluminensis* n. p. 77—78 (in Eichenbainen bei Fiume). — *chrysur* Kl. *var. cognata* Mocs. (Fiume). — *var. erythrocnema* (Costa) als Sp., doch sicher nur *Var. der gen. Sp.* p. 78. — *punctum album* (am Götzenberg), *neglecta* Kl. (Fiume) p. 78.
- Pachyprotasis.** Bestimmung der Larven. **Konow**, l. c., 5. Heft: *Rapae* L., *simulans* Kl. und *nigronotata* Krehbr. p. 289 [65]. — *rapae* L. (Ødemark Hatfjelddalen) **Strand**, Arch. for Mathem. og Naturv. 22. Bd. No. 3 p. 14. — *rapae* L. (bei Kronstadt) **Strobl**, Verhdlgn. u. Mitth. Siebenbürg. Ver. f. Naturw. 50. Bd. p. 77.
- Rhogogastera.** Bestimmung der Larven und zwar: *punctulata* Kl. **Konow**, l. c. p. 239 [63] und *viridis* L. p. 240 [64]. — *picta* Kl. (Fiume), *idriensis* Gir. (Siebenbürgen) **Strobl** p. 77. — *fulvipes* Scop. = *lateralis* Fall. (Ødemark), *viridis* L. (Dønna, Hatfjelddalen, Klovinoen), *punctulata* Kl. (Røsvard, Dønna) **Strand**, Arch. for Mathem. og Naturv. 22. Bd. No. 3 p. 14.
- Sciopteryx costalis.** Bestimmung der Larve. **Konow**, l. c., 4. Heft, p. 239 [63].
- Sinoclia violaceipennis** (*coerulea*, *nitida*; *alis viol.*) **Cameron**, P., Proc. Zool. Soc. London 1901, I p. 225 ♀ (New Britain).
- Strongylogaster.** Bestimm. der Larven. **Konow**, t. c., 4. Heft und zwar: *cin-gulatus* F., *xanthoceros* Steph., *soriculatipes* Prov., *annulosus* Nort. p. 232 [56]. — *luctuosus* Prov. p. 233 [57].
- Taxonus.** **Konow**, t. c., 4. Heft. Bestimmung der Larven folg. Formen: *Equiseti* Fall., *glabratus* Fall. p. 236 [60]. — *agrorum* Fall., *apicalis* Say, *pinguis* Nort. und *abnormis* Prov. p. 237 [61]. — Neu: *alboscuteclatus* **Nieza-bitowski**, Sprawozd. Kom. Krajo vol. XXXIV p. 9 (Bukowina). — *innominatus* **Macgillivray**, Bull. N. York Mus. 47 p. 585 (Adirondacks).
- Tenthredo** L. 3 Spp. von Siebenbürgen. **Strobl**, Verhdlgn. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturw. 50. Bd. p. 79. — *limbata* Kl. (Hatfjelddalen), *colon* Kl. (Hatfjelddalen, Røsvand), *mesomelaena* L. (Klovinoen, Hatfjelddalen), *balteata* Kl. (Røsvand) **Strand**, Archiv. for Mathem. og Naturv. 22. Bd. No. 3 p. 13. — Bestimmung der Larven. **Konow**, l. c., 5. Heft und zwar: *mandibularis* Panz., *procera* Kl. p. 291. — *rufipes* Kl., *atra* L., *mesomelaena* L., *Fagi* Panz. p. 292. — *colon* Kl. [dafür *obscura* Pz. zu setzen]; *livida* L., *balteata* Kl., *ferruginea* Schrank, *flava* Poda und *Cressoni* W. Kirby.
- Tenthredopsis.** **Konow**, t. c., 4. Heft p. 240 [64]. Bestimmung der Larven von *campestris* L. und *pavida* F. p. 240 [64]. — 4 Spp. in Siebenbürgen. **Strobl**, Verhdlgn. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturw. 50. Bd. p. 77.

Cimbicidae. (Fam. XCIV.)

- Abia.** Bestimmung der Larven. **Konow**, Zeitschr. f. system. Hym. u. Dipt. 1. Jhg. 3. Heft: *sericea* L. p. 171 [43]. — *fasciata* L., *Lonicerae* L., *mutica* C. G. Thoms. und *Caprifolii* Nort. p. 172 [44]. — 4 Spp. in Siebenbürgen. **Strobl**, Verhdlgn. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturw. 50. Bd. p. 74.
- Amasis** Leach mit *obscura* Fbr. in Siebenbürgen. **Strobl**, Verhdlgn. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturw. 50. Bd. p. 74.

- Clavellaria amerinae* L. (Josephsthal in Kroatien). **Strobl**, Verhdlgn. u. Mitth. Siebenbürg. Ver. f. Naturw. 50. Bd. p. 74. — Bestimmung der Larve **Konow**, t. c., 3. Heft p. 171 [43].
- Cimbex*. Bestimmung der Larven. **Konow**, t. c., 3. Heft: 4-maculata Müll., connata Schrank, p. 169 [41]. — *Capreae* Knw. [verbessert in lutea L.], lutea L. [verb. in *Capreae* Knw.], Fagi Zadd., femorata L., Americana Leach., Laportei Lep. und violacea Lep. p. 170 [42]. — humeralis Fr. (Ofen, Siebenbürgen) **Strobl**, Verhdlgn. u. Mitth. des Siebenb. Ver. für Naturw. 50. Bd. p. 74. — Charakt. der europäischen Formen. **van Rossum & van Tuinen**, Tijdschr. v. Entom. vol. XIV Verslag p. 16—22.
- Incalia hirticornis* ♂ **Konow**, Termesz. Füzetek vol. XXIV p. 71.
- Perga*. Bemerkungen zu den Larven. **Froggatt**, Agric. Gaz. N. S. Wales vol. XII p. 1067—1069, nebst Tafel. — Bestimmung der Larven. **Konow**, l. c., 3. Heft p. 169 [41]: Försteri Westw., polita Leach, dorsalis L., chalybea **Froggatt**, Lewisi Westw., Latreillei Leach.
- Thulea nigriceps* **Konow**, Termesz. Füzetek vol. XXIV p. 68 (Brasilien).
- Trichiosoma*. Bestimmung der Larven. **Konow**, l. c., 3. Heft: lucorum F., tibialis Steph. p. 170 [52]. — Sorbi Htg., Latreilli Leach, silvatica Leach und Vitellinae L. p. 171 [43].
-

Nachtrag.

(Sämmtliche Familien betreffend).

- Arachnospila septentrionalis* **Kincaid**, Proc. Washington Ac. II p. 509 (Alaska).
— *Fossoria*.
- Dasytirion wheeleri*. Insekten in Erdgängen der Vertebraten. **Hubbard**, Proc. Entom. Soc. Washington vol. IV p. 381.
- Eremiasphecium Schmiedeknechtii* Kohl auf der Adelen-Insel. **Morice** (5) p. 167.
- Haematopota pluvialis* von Coleshill. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 21.
- Lagynodes pallidus* Boh. in Ipswich und and. Fundort. **Morley** (3) p. 43.
- Megaspilus halteratus* Boh. in Ipswich. **Morley** (3) p. 42.
- Pachygaster Leachi* etc. at Cambridge. **Jenkinson, F.**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 299. — *meromelas* at Lyndhurst.
- Perrisia* erzeugt Entfärb. an *Aira flexuosa*, keine Cecidie. **Kieffer** p. 248.
- Platycnemis pennipes* von Bridgnorth. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 21.
- Pterochilus* n. sp. **Schmiedeknecht** p. 57.

Lepidoptera.

Bearbeitet von **Dr. Robert Lucas** in Rixdorf bei Berlin.

A. Publikationen (Autoren, alphabetisch).

von **Abafi-Aigner**, siehe von **Aigner-Abafi**.

Adams, C. C. Geographical Distribution of Variations in *Jo. Science*, N. S. vol. 13. No. 316. p. 113.

Adams, Fred. C. (1). *Papilio machaon* L. taken in Hampshire. *Entom. Monthly Mag.* (2.) vol. 12 (37) July, p. 172.

— (2). *Papilio Machaon* L. taken in Hampshire. t. c. Dec. p. 297.

Adkin, Rob. (1). On the Pupation of *Cossus ligniperda*. *Proc. South. London Entom. Nat. Hist. Soc.* 1900. p. 1—5.

— (2). (Note on the Pupa Cases of *Sesias*). t. c. p. 79.

— (3). (Remarks on *Acidalia aversata*). t. c. p. 92—93.

— (4). (Varieties of *Argynnis aglaia*). t. c. p. 95.

— (5). (Varieties of *Melanippe goliata*). t. c. p. 95—96.

— (6). Abundance of *Cyaniris argiolus* (*Lycaena*) in the Metropolitan Area. *The Entomologist*, vol. 34. Sept. p. 251—252.

— (7). *Leucania vitellina*. *The Entomologist*, vol. 34. Jan. p. 16.

— (8). Abundance of *Lycaena argiolus* near Eastbourne. *The t. c.* p. 16—17.

— (9). The *Vanessids* in 1900. t. c. p. 17.

— (10). Second brood of *Epinephele janira*. t. c. Nov. p. 310.

— (11). Autumnal emergence of *Lophopteryx cucullia* and *Acronycta menyanthidis*. *The Entomologist*, vol. 34. Dec. p. 352 bis 353.

Adkin, B. W. (1). *Lepidoptera* in the New Forest. *Entom. Record*, vol. 13. No. 10. p. 303.

— (2). *Lepidoptera* in the Scilly Isles, t. c. No. 12. p. 370.

Abafi-Aigner, L. (1). *Saturnia caecigena* Kup. *Rovart Lapok*, 8. köt. 1. füz. p. 7—9.

— (2). Az új lepke-katalogus. t. c. 8. köt. 2. füz. p. 23—26.
Ueber den neuen Katalog von Staudinger u. Rebel.

— (3). Három új *Colias*-fajváltozat. t. c. 2. füz. p. 30—31.
Drei neue *Colias*-Aberrationen.

— (4). A Noctuák biológiájához. II. t. c. 2. füz. p. 38—40.
Zur Biologie der Noctuen.

- (5). Az arktikus tájak lepkéi. t. c. 3. füz. p. 50—52. — Die Lepidopteren der arktischen Gegenden. p. 68.
 - (6). A lepkék biológiá jához. t. c. 3. füz. p. 62—64.
 - (7). Lepke-faunánk gyaradodása 1900-ban. (Die ungarische Lepidopteren-Fauna im Jahre 1900). t. c. 8. köt. 4. füz. p. 75—77. (Ausz. p. 9.)
 - (8). *Deilephila nerii*. t. c. 4. füz. p. 85. — Nachtrag. *ibid.* 5. füz. Ausz. p. 12.
 - (9). Új lepkék a magyar faunábód. (Neue Lepidopteren aus der Fauna Ungarns). t. c. 5. füz. p. 96—99. Ausz. No. 5. p. 11.
 - (10). A *Deilephila nerii*-ről. III. A. D. n. honosságáról. t. c. 6. füz. p. 112—116. — Ausz. Ist D. n. in Ungarn heimisch. Hft. 6. p. 13—14.
 - (11). *Parnassius Mnemosyne* L. t. c. 7. füz. p. 141—145. — Ausz. Hft. 7. p. 18.
 - (12). *Thalpochares panonica* Frr. Mit 2 Figg. t. c. 8. füz. Okt. p. 153—155. — Ausz. Hft. 8. p. 19.
 - (13). A hőmérséklet befolyása a lepkékre. t. c. 8. füz. Okt. p. 166—168. — Ausz.: Einfluss der Temperatur auf die Schmetterlinge. Hft. 8. p. 20.
 - (14). A Magyar lepke-fauna bővülése. t. c. 9. füz. Nov. p. 175 bis 180. — Erweiterung der ungarischen Lepidopteren-Fauna. Ausz. Hft. 9. p. 21.
 - (15). Zur Lepidopteren-Fauna Rumäniens. Bull. Soc. Sc. Bucarest. An. 11. No. 5. p. 543—561.
 - (16). Zur Biologie der Agrotiden. Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. No. 5. p. 72—74.
 - (17). Lepidopteren-Wanderungen in Ungarn. t. c. No. 7. p. 102 bis 103.
 - (18). *Smerinthus quercus* Schiff. t. c. No. 9. p. 137—138.
 - (19). *Nemeophila Metelkana* Ld. t. c. No. 10. p. 153—154.
 - (20). Ueber *Deilephila nerii* L. t. c. No. 14—15. p. 236—228.
 - (21). *Episema glaucina* Esp. Briefliche Mittheilung (an Chr. Schröder). t. c. No. 14—15. p. 233.
 - (22). Drei neue *Colias*-Varietäten. Insekten-Börse, 18. Jhg. No. 25. p. 196.
- Allen, J. E. R.** *Oporabia autumnata* at home. The Entomologist, vol. 34. Febr. p. 43—45.
- Alté, Max.** Ein Beitrag zur Frage: „Wie ist dem augenfälligen Abnehmen der Lepidopteren zu steuern?“ Insekten-Börse. 18. Jhg. No. 9. p. 67—68.
- (2). Lepidopterologisch-systematische Bemerkungen. Entom. Jahrb. Krancher, 11. Jhg. p. 166—169.
- Alté klagt über die ungeheure Zunahme von Formen, Varietäten u. Aberrationen, von denen wohl manche nur infolge ungenauer Beschreibung nicht mit bereits bekannten identifiziert werden können u. nun in den Büchern herumschwirren, um überhaupt nicht wieder *in vivo* aufgefunden zu werden. Er wünscht darin eine Besserung

u. Einigung. Er möge aber dabei an das Sprichwort denken: Viele Köpfe, viele Sinne, zumal da er von „dem Geschrei u. Gezeter irgendwelcher Autoritäten auf diesem Gebiete“ nichts wissen will. Er macht Vorschläge: 1. Einigung auf einen Namen u. Wegfall des Autors, 2. genaue und exakte Regelung der Begriffsabgrenzungen für Spp., Varr. u. Aberr., u. 3. Einrichtung einer Rubrik Nomenklatur in allen Fachblättern, worunter die ausführlichen Diagnosen u. Beschreib. wiedergegeben werden sollen. (Ref. erlaubt sich hierbei an die Nov. Zool. Tring zu erinnern, die jährl. allein durchschnittlich 500 neue Formen bringen). Die von ihm gewünschte Uebersicht über die enorme Zahl von neuen Formen, die in den verschiedensten in- u. ausländischen entomol. Literaturen zerstreut sind, existiert bereits — er lese nur diese Berichthefte.

A. M. siehe **M. A.**

Anderson, Jos. (1). *Hadena genistae* at Chichester. The Entomologist, vol. 34. Nov. p. 317.

— (2). Notes on the Lepidoptera observed at Chichester and Neighbourhood in 1901. t. c. Dec. p. 356—357.

— (3). Aberration of *Anthrocera filipendulae*. Entom. Record, vol. 13. No. 12. p. 359.

André, E. 1900. 1901. Tableaux analytiques illustrés pour la détermination de Lépidoptères de France, de Suisse et de Belgique (Suite. — Forts. zu Titel p. 550 des vorigen Berichts). Avec figs. 87—106. Miscellan. Entom. vol. 8. No. 10/12. p. 145—159, vol. 9. No. 3/4. p. 55—63 (avec figs. 107—113), No. 5/6. p. 90—95 (avec figs. 114—117). No. 7/8. p. 117—126 (avec figs. 118—132), No. 9. p. 136 bis 141 (avec fig. 133).

Andrews, Edw. (1.) Curious experience with *Lasiocampa quercus*. Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 12 (37). May, p. 124—126.

— (2). Curious experience with *Lasiocampa quercus*: Sequel. t. c. p. 268—269.

Andrews, T. B. A few Notes on rearing *Cossus ligniperda*. The Entomologist, vol. 34. Oct. p. 292.

Annuario della R. Stazione Bacologica di Padova vol. XXIX. Con. 1 tav. Padova, Soc. tip. cooper. 1901. 8°. (129 p., 1 p. ind.)

Arkle, J. (1). *Hecatera serena* larvae not on Goat's beard. The Entomologist, vol. 34. April, p. 126—127.

— (2). Notes from the North-West. t. c. March, p. 103—107.

— (3). Notes from the Chester District. t. c. Sept. p. 256—257.

— (4). Lepidoptera at Llandrindod (Radnorshire). t. c. Sept. p. 257.

— (5). Odonata and Lepidoptera at Watford, Herts. t. c. Dec. p. 354.

Aro, J. E. (1). 1900. För Finland nya eller sällsynta fjärilar. Meddel. Soc. Fauna Flora Fenn. 24. Hft. p. 24—25. 180.

- (2). Ueber *Hadena Maillardi* var. *Kuusamoënsis* Staud. Mit 3 Fig. op. cit. 27. Hft. p. 46—49.
- Artaut, de Vavay, S.** Trois observations de *Stomatile érucique* provoquée par les chenilles de *Liparis chrysoorrhoea* L. Compt. rend. Soc. Biol. Paris, T. 53. No. 5. p. 103—104.
- Ash, C. D.** (1). Dark Aberration of *Abraxas sylvata*. Entom. Record, vol. 13. No. 10. p. 297.
- (2). Dwarf Lepidoptera. t. c. No. 10. p. 297.
- (3). Lepidoptera in Yorkshire. t. c. No. 10. p. 302—303.
- (4). Autumnal Lepidoptera at Skipwith. t. c. No. 12. p. 370.
- (5). *Acidalia virgularia* male, attracted by dead female. t. c. No. 12. p. 373.
- (6). Abnormal Length of Pupal Life of *Agrophila trabealis*. t. c. No. 12. p. 373.
- Atmore, E. A.** (1). Lepidoptera at King's Lynn. Entom. Record, vol. 13. No. 10. p. 303—304.
- (2). Rearing *Hylophila bicolorana*. Entom. Record, vol. 13. No. 12, p. 373. — Notes by E. F. C. Studd and J. C. Moberly. *ibid.* p. 373.
- Aurivillius, Chr.** „*Rhopalocera aethiopica*.“ Ausz. von J. Röber. Entom. Tidskr. 21. Årg. 3./4. Hft. p. 257—263.
- Bachmetjew, P.** (1). Klimatische, floristische und lepidoptero-logische Verhältnisse in Bulgarien. Entom. Jahrb. (Krancher). 11. Jhrg. p. 119—131.

Aufzählung derjenigen Forscher, die bis dato in Bulgarien gesammelt haben. Zusammenstellung der wichtigsten lepidoptero-logischen Beiträge. Ueber Schädlinge berichten die offiziellen Rapporte der Förster an das Handels- u. Ackerbauministerium in Sofia. Gründung der ersten bulg. entom. Gesellschaft in Slivno (1899). Handbücher für Insektensammler in bulgarischer Sprache. — Klimatische Verhältnisse. Tabellen über Temperaturschwankungen, atmosphärische Niederschläge. Flora. Arten u. Varr. von Lepid., die Bulgarien eigen sind.

- (2). Warum fliegen die Tagschmetterlinge nur am Tage und die meisten Nachtschmetterlinge in der Nacht? (Schluss). Societ. Entom. 15. Jhg. No. 23. p. 179—181. — Siehe p. 553 sub No. 8 des vor. Berichts.

Nicht Licht, Nahrungsverhältnisse, Färbung u. sonstige Schutzmittel sind die Ursache, sondern die Ursache ist darin zu suchen, dass die Flügelmuskel der Lepidopt. in Folge erhöhter Temperatur eine vorübergehende Lähmung erleiden. Bei Nachtschmetterlingen ist nun diese Lähmungs-Temperatur bedeutend niedriger (bei einigen 33°) als bei Tagschmetterlingen, bei denen sie 45° erreichen kann. Hierzu kommt noch, dass die Flugart der ersteren (Summen) viel mehr Wärme erzeugt als die der letzter. (Flattern, Segeln). Beim Summen Zahl der Flügelschläge 8—20 pro Sek., beim Flattern selten mehr als 4. — Die Nachtschmetterlinge gebrauchen zum

Fliegen eine viel niedrigere Temperatur als die Tagschmetterlinge. Es liegt der Gedanke nahe, dass die Nachtschmetterl. zur Nachtzeit der Kältestarre verfallen können. Es schützt sie dagegen ihre grössere Körpermasse, die starke Behaarung u. die Art des Flügelhaltens. Während nun abends die Tagschmetterl. sich bedeutend abgekühlt haben u. nicht mehr flattern können, ist für die Nachtschmetterl. in Folge langsamer Abkühlung ein Temperaturoptimum gekommen und sie beginnen zu summen. Trotz der nun weiter eintretenden Abkühlung der Luft wird dieses Optimum durch die Flugart des Summens beibehalten, wozu auch die oben erwähnten Schutzmittel beitragen. — Tagschmetterlinge besitzen keine Behaarung, damit sie gehörig ausstrahlen können u. in Folge zu hoher Temperatur nicht etwa eine Flügellähmung eintreten kann.

Diese Arbeit eröffnet uns auf diesem Gebiete ganz neue Perspective. — Im übrigen vergleiche das Original.

Bacot, Arthur, W. Larvae of *Lasiocampa quercus* and its vars. *callunae* Palm., *viburni* Gn., *meridionalis* Tutt and *sicula* Staud. and of Cross-pairings between these races. Entom. Record, vol. 13. No. 4. p. 114—117 (Concl.). t. c. No. 5. p. 142—144.

Bacot, A. (1). Eggs of *Lasiocampa fasciatella* var. *excellens*. Entom. Record, vol. 13. No. 10. p. 307.

— (2). Cross-pairings between *Lasiocampa quercus* and its vars. *callunae* Palm., *viburni* Gn., *meridionalis* Tutt and *sicula* Staud. t. c. No. 11. p. 328.

Banks, Eust. R. (1). Albinic aberration of *Bactra lanceolana* Hb. Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 12 (37). Aug. p. 199—200.

— (2). *Argyresthia Atmoriella* Bnks. in the Isle of Purbeck. t. c. Aug. p. 200.

Barrett, C. G. (1). *Hadena lateritia* Hufn., a *Noctua* new to Britain, taken in South Wales. Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 12 (37). May, p. 115—116.

— (2). Further Notes on South African Lepidoptera (Contin. — Titel p. 556 sub. No. 1 des vorig. Berichts). t. c. p. 191—195. Contin. Nov. p. 284—288, Dec. p. 289.

Barrett, J. B. Butterflies in Thanet. The Entomologist, vol. 34, Nov. p. 318—319.

Bathke, Frdr. *Papilio podalirius* ab. Schultzi. Deutsch. Entom. Zeitschr. 1900. 2. lepid. Hft. (Iris. Bd. 13. 2. Hft.) p. 332—333.

Bell-Marley, H. W. *Pieris daplidice* migrating. The Entomologist, vol. 34. March. p. 98.

Berättelse om nunnehärijpingen i Södermanland och Oestergötland under år 1899 samt om åtgärderna för insektens bekämpande. Entom. Tidskr. 21. Årg. 2. Hft. p. 97—118. — *Lym. monacha*.

Berg, C. Namensänderung zweier Lepidopteren-Gattungen. *Comun. Mus. Nat. Buenos Aires*, T. 1. No. 9. p. 311.

Pteroma, pro *Pterotes* Staud., *Diphacelophora* pro *Phacelophora*.

Ball, Fr. Notes sur l'effet de la température sur les chrysalides. *Ann. Soc. Entom. Belg.* T. 45. XII. p. 385—388.

Ball behandelt die Frage, ob eine bestimmte abnorme Temperatur immer eine u. dieselbe bestimmte Wirkung auf die Puppe eines Schmetterlings ausübt. Diesbezügliche Experimente scheinen zu zeigen, dass „les chenilles soumises à une température élevée deviennent de moins en moins susceptibles à l'état de chrysalide.“ Die „coups de froid et de chaleur“ Fischers sind zwar sehr erfolgreich, machen aber die Feststellung schwierig, ob die erzeugten Wirkungen das Resultat der Temperatur-Zu- oder Abnahme sind, die dadurch entsteht, dass der Organismus wieder seine normale Temperatur annimmt. B. stimmt daher für lange Zeiträume.

Die sich daranschliessenden Tabellen beziehen sich auf die Winter- u. Sommergeneration. Es wird aufgeführt: Zahl, Wärmertage bei 39%. (Raupen u. Puppen) Ruhezeit der Nymphe (zwischen 235—250 Tg., bei der Sommergeneration 7—256 Tg.) Bemerk. über Behandl., Aussehen etc.

Banks, Eust. R. (1). Dark aberration of *Eupithecia nanata* at Shirley Surrey. *Entom. Monthly Mag.* (2.) vol. 12 (37) p. 99—100.

— (2). *Lophopteryx carmelita* Esp. in the New Forest. t. c. p. 99.

— (3). Dark aberration of *Heliothis peltigera* Schiff. t. c. May, p. 127.

— (4). Notes on *Metzneria littorella* Dgl. t. c. May, p. 121—124.

— (5). Note on *Metzneria littorella* Dgl. t. c. Aug. p. 200—201.

Barnes, Will. (1). *Ennomos autumnaria* at Reading. *Entom. Record*, vol. 13. No. 9. p. 278.

— (2). *Ennomos autumnaria* at Reading. t. c. No. 12. p. 376.

— (3). Descriptions of some new Species of North American Lepidoptera. *Canad. Entom.* vol. 33. No. 2. p. 53—57. 6 neue Spec,

Barraud, Phil. J. (1). Notes from North Kent. *The Entomologist*, vol. 34. Jan. p. 28.

— (2). *Lycaena minima* (alsus) double-brooded. t. c. Oct. p. 294.

— (3). Lepidoptera at Light in Herfordshire. t. c. Dec. p. 357—360.

Bell, S. J. *Leucania L-album* at Sandown. *Entom. Record*, vol. 13. No. 11. p. 332—333.

Berlese, A. (1). Un mezzo di lotta rationale contro la *Cochylis ambignella*. *Boll. Entom. Agrar. Patol. Veget.* Ann. 8. No. 7. p. 162—165.

— (2). Metodo di lotta rationale contro la *Cochylis ambignella* ed altri insetti. Con. 1 fig. t. c. No. 9. p. 205—210.

- Bethune-Baker, Geo. T.** On the oviposition of *Lycaena Icarus*. Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 12 (37) Sept. p. 227.
- Beutenmüller, Wm.** (1). 1891. Titel f. 414 des Berichts für 1896 sub behandelt *Ottolengua n. g. reticulina n. sp.*
- (2). 1897. Note on *Catocala elda* Behr. Journ. New York Entom. Soc. vol. 5. No. 1. p. 17.
- (3). Note on *Melittia satyriniformis* Hübn. t. c. No. 1. p. 34—35.
- (4). On the two Species of *Eudaemonia*. With 2 pls. t. c. No. 4. p. 166.
- (5). 1900. On *Sesia arctica* Beutenm. Canad. Entom. vol. 32. No. 12. p. 377.
- (6). The earlier Stages of *Sphinx gordius*. op. cit. vol. 9. No. 2. p. 87.
- (7). The earlier Stages of *Ceratonia amyntor*. op. cit. vol. 9. No. 2. p. 88—89.
- (8). The earlier Stages of *Smerinthus geminatus*. op. cit. vol. 9. No. 2. p. 89—90.
- (9). Descriptive Catalogue of the Noctuidae from within Fifty Miles of New York City. With 4 pls. Bull. Amer. Mus. Nat. vol. 14. Art. XX. p. 229—312.
4. Part of the Lepidoptera, 1. Part of the Noctuidae.
- (10). Descriptions of three Lepidopterous Larvae. Journ. New York Entom. Soc. vol. 9. No. 2. p. 90.
- (11). Catalogue of the described Transformations of Australian Lepidoptera. t. c. No. 4. p. 147—177.
- (12). The Larva of *Catocala illecta*. t. c. No. 4. p. 189.
- (13). The Larva of *Homoptera edusa*. t. c. No. 4. p. 192.
- (14). Notes on the earlier Stages of *Lobobunaea phaedusa*. With 1 pl. and 5 textfigs. t. c. No. 4. p. 193—194.
- (15). Habits of *Eudaemonia brachyura*. t. c. No. 4. p. 194—195.
- Bird, Henry.** New Histories in *Hydroecia*. (Contin. zu Titel p. 559 des vorig. Berichts). Canad. Entom. vol. 33. No. 3. p. 61—68.
- Bird, J. F.** (1). Seasonal Dimorphism in *Cilix glaucata*. Entom. Record, vol. 13. No. 10. p. 296—297.
- (2). Aberration of *Diloba caeruleocephala*. t. c. No. 12. p. 358.
- Blair, K. G.** On rearing *Lasiocampa (Bombyx) quercus*. The Entomologist, vol. 34. Sept. p. 250—251.
- Bloomfield, E. N.** *Clostera anachoreta* at Walmer, Kent. Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 12 (37). Nov. p. 276.
- Bolam, Geo.** *Sphinx convolvuli* at Berwick-on-Tweed. Ann. Scott. Nat. Hist. 1901. Apr. p. 118.
- von Bönninghausen, Vict.** Beitrag zur Kenntnis der Lepidopteren-Fauna von Rio de Janeiro mit Einschluss einiger angrenzender südbrasilianischer Staaten und Länder. Bericht III. Rhopalocera. Fam.: Libytheidae, Erycinidae und Lycaenidae. Deutsch. Entom. Zeitschr. 1901. 1. lep. Hft. p. 65—87.

- Bower, B. A.** (1). Re-appearance of *Gelechia malvella* in the London District. Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 12 (37). p. 45.
 — (2). *Spilodes sticticalis* in North-west Kent. t. c. Febr. p. 45.
 — (3). *Macroglossa stellatarum* feeding at Flowers of Fuchsia. Entom. Record, vol. 13. No. 3. p. 111.
 — (4). Larvae of *Plusia moneta*. t. c. No. 7. p. 220.
 — (5). *Catocala fraxini* in Suffolk. t. c. No. 10. p. 306.
 — (6). Lepidoptera at Chislehurst etc. t. c. No. 12. p. 371—372.
- Bowles, E. A.** Habits of *Lithosia muscerda*. Entom. Record, vol. 13. No. 9. p. 277.
- Boxer, C. R. L.** *Limnitis sibylla* etc. in Shropshire. The Entomologist, vol. 34, March, p. 99.
- Breit, Jul.** Die Zucht der Sommergeneration von *Notodonta tritophus*. Societ. Entom. 16. Jahrg. No. 13. p. 99—100.
- Brown, H. Rowland** (1). Vitality of Alpine *Rhopalocera*. The Entomologist, vol. 34. May, p. 157—158.
 — (2). Over three Passes, the Splügen, the Stelvio and the Brenner, with Some Notes on the Butterflies by the Way. Entom. Record, vol. 12. p. 309—312. — Concl. op. cit. vol. 13. No. 3. p. 95—97.
 — (3). A Butterfly Hunt in the Cevennes. t. c. No. 11. p. 309—313.
 — (4). *Cyaniris argiolus* and *Plusia moneta* in Middlesex. t. c. No. 11. p. 333.
- Brown, R.** (1). Communication sur des Lépidoptères. Proc.-verb. Soc. Linn. Bordeaux, vol. 56. p. CXVI—CXVII.
 — (2). (Sur le genre *Nola*). t. c. p. CXLIX—CLI.
- Browning, G. Wesley.** Collecting in the Vicinity of Salt Lake City. With 1 pl. Entom. News, vol. 12. No. 10. p. 297—304.
- Bruce, Dav.** A new Variety of *Lepisesia*. Entom. News, vol. 12. Jan. p. 19.
- Buckler, Will.** The Larvae of the British Butterflies and Moths: ed. by Geo. T. Porritt vol. IX.; Pyrales, Crambites, Tortrices, Pterophori etc. London, Ray Society, 1901. 8°. (419 p., pl. CXLVIII—CLXIV). Schluss des Werkes.
- Burrison, H. K.** Butterflies from Yellowstone National Park. Entom. News, vol. 12. Oct. p. 244.
- Burrows, C. R. N.** (1). The Food plants of *Phorodesma smaragdaria* Fab. Entom. Record, vol. 13. No. 7. p. 197—198.
 — (2). *Sesia myopaeformis* on Pear. t. c. No. 7. p. 222.
 — (3). Notes on *Acherontia atropos*. Entom. News. t. c. No. 5. p. 155—156.
 — (4). *Macroglossa stellatarum* in March. t. c. No. 5. p. 166.
 — (5). *Trochilium bembeciforme* at Mucking. t. c. No. 9. p. 278.
 — (6). *Papilio Machaon* at Mucking. t. c. No. 9. p. 278.
 — (7). *Sphinx convolvuli* in Essex. t. c. No. 10. p. 305—306.
 — (8). *Mellinia ocellaris* at Mucking. t. c. No. 10. p. 307.

Burstert, Herm. Eine eigenthümliche einseitige Aberration von *Sphinx pinastri*. Mit 12 Fig. Allgem. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. No. 11. p. 164—165.

Rusck, Aug. (1). A new Canadian Tineid. Canad. Entom. vol. 33. No. 1. p. 14—16. — *Anacamptis lupinella* n. sp.

— (2). *Nepticula pomivorella* Pack., alias *Micropteryx pomivorella* Pack. t. c. No. 2. p. 52.

Butler, Arthur G. On two Consignements of Butterflies collected by Mr. Richard Crawshay in the Kikuyu Country of British East Africa in 1899 and 1900. With 1 pl. Proc. Zool. Soc. London, 1900. IV. p. 911—956. — cf. vor. Bericht. 117 (6 n.) Spp., n. g.: *Syntarucus*.

— (2). On a small Collection of Butterflies from the Kikuyu Country and Mombasa made by K. St. Aubyn Rogers. Ann. Nat. Hist. (7.) vol. 8. Aug. p. 111—113. — Nominelle Liste von 56 Arten.

— (3). On some Butterflies from the White Nile collected by Capt. H. N. Duan. Proc. Zool. Soc. London, 1901, vol. I. P. 1. p. 25—26. — Liste von 34 Spp.

— (4). An Account on the Collection of Butterflies made by the Rev. K. St. Aubyn Rogers between Mombasa and the Forests of Taveta. Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7. Jan. p. 22—35.

Nymphalidae (41 No.), Lycaenidae (25 No.), Papilionidae (28 No.), Hesperidae (9 No.) — Bemerk. zu verschied. ders.; neu: *Stugeta Bowkeri* Trimen, Localform *mombasae*.

— (5). An account on the collection of Butterflies obtained by Lord Delamere, chiefly at Munisu, near Mount Kenya. Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7. Febr. p. 197—203.

Die meisten Formen wurden zu Munisu (4150' Höhe) erbeutet, einige im östlich. Centralafrika am Athi River. — 79 Sp. (keine neuen) u. zwar Nymphalidae (39 No.), Lycaenidae (4 No.), Papilionidae (29 No.), Hesperidae (7 No.) — Von besonderem Interesse sind: *Precis guruana*, *P. Gregorii*, *Planema montana*, *Acraea uvui*, *Uranothauma nubifer*, *Mylothris rubricosta*, *Terias hapale* ♂ ♀, *Synchlloe distorta*, *Papilio echerioides*, *Pyrgus machacosa* u. *Cyclopides quadrisignata*.

— (6). Descriptions of new Species of Lycaenidae in the Collection of the British Museum. Ann. Nat. Hist. (7.) vol. 7. March., p. 288—291.

7 n. spp., nämlich: *Epitola* (1), *Virachola* (1), *Spindasis* (1), *Catochrysops* (2), *Chilades* (1). *Iraota* (1).

— (7). On a Collection of Butterflies from the Uganda Protectorate, forwarded by C. Steuart Betton Esq. in 1900. Ann. Nat. Hist. (7.) vol. 7. p. 562.

Nominelle Liste von 40 Spp., die zu Eb Urru im April u. Mai gesammelt waren.

Interessant ist dabei, dass die ganze Variationsreihe von *Limnas chrysippus* durch die Formen *chrysippus*, *alcippoides*, *alcippus*,

dorippus u. Klugii vertreten ist. Unter den seltenen Sp. befinden sich *Chrysophanus abbotii* in ♂ u. ♀, der ♂ der südl. *Uranothauma nubifer* Stücke von *Catochrysops negus*, *Mylothris rubricosta*, *Phrisura phoebe*, die arabische *Synchlloe glaucanome* u. ein schönes Stück von *Papilio nobilis*. Eine sehr interessante, anscheinend neue *Spindasis* ist leider zu defekt, um beschrieben zu werden.

— (8). On a Collection of Butterflies made by Geo. Migeod Esq., in Northern Nigeria between September 1899 and January 1900. *Ann. Nat. Hist.* (7.) vol. 8. July, p. 57—60.

39 Spp., dar. 2 neue Hesper. *Abantis nigeriana* u. *Kedestes protersa*. Interessant durch den starken nordöstl. Charakter der Arten, die die Annahme einer völligen Verbindung zwischen westl. u. östl. Typen über dem Aequator zu bestätigen scheinen. Gesammelt wurde am Yelva Lake, Borgu.

— (9). A. Revision of the Butterflies of the Genus *Precis*, with Notes on the Seasonal Phases of the Species. *op. cit.* vol. 8. Sept. p. 196—216. cf. *syst. Theil.* 70 Spp.

— (10). On certain seasonal phases of Butterflies of the Genus *Precis*. *The Entomologist*, vol. 34. Jan. p. 7.

— (11). On names applied to certain species of the Pierid genus *Catasticta*. t. c. Nov. p. 301—303.

— (12). 1900. List of the Butterflies collected by Capt. Wingate at Hunan in Kirby, Notes on some Insects from the Yang-tse-Kiang. *Ann. Nat. Hist.* (7) v. 6 p. 380—2.

Genannte Liste (p. 382) bringt Nymph.: *Euploeinae* (3), *Nymphalinae* (9), *Satyrinae* (3), *Lycaenidae* (2); *Papil.*: *Pierinae* (4), *Papilioninae* (5).

Butler, W. E. (*Larentia viridaria* double-brooded.) *Entom. Record*, vol. 13. No. 3. p. 110—111.

— (2). *Acidalia imitaria* at Reading. t. c. No. 3. p. 110.

— (3). *Helotropha leucostigma* at Reading. t. c. No. 3. p. 110.

— (4). *Anticlea sinuata* at Reading. t. c. No. 3. p. 111.

— (5). Pairing of *Dimorpha versicolora*. *Entom. Record*, vol. 13. No. 11. p. 328.

— (6). *Ennomos autumnaria* at Reading. *op. cit.* vol. 13. No. 11. p. 334.

Buxton, C. S. *Vanessa polychloros* in December. *The Zoologist*, (4.) vol. 5. Jan. p. 32.

Caland, M. *Macrolepidoptera* waargenomen in de omstreken van 's Hertogenbosch en Alkmaar. *Entom. Tijdschr. Nederl. Entom. Vereen.* 44. D. 1. Afl. p. 46—53.

Cambridge, O. Pickard. On rearing *Acherontia atropos*. *The Entomologist*, vol. 34, Aug. p. 227.

Campbell-Taylor, J. E. *Vanessidae* in 1900. *The Entomologist*, vol. 34. May, p. 159—160.

Canuaviella, E. 1900. Breve Note sui Lepidotteri dell'Italia meridionale. *Riv. Ital. Sci. Nat.* (Siena.) An. 20. No. 7/8. p. 83

- 87, No. 9/10. p. 101—108. — Forts. zum Titel auf p. 563 des vor. Berichts.
- (2). Contributo ad una monografia sul genere *Macroglossa* Och. op. cit. An. 21. No. 1. p. 10—17.
- (3). Sui Lepidopteri del gen. *Thais* Fabr. t. c. No. 3./4. p. 28—39.
- (4). Le Tineinae delle provincie meridionali d'Italia. t. c. An. 21. No. 11/12. p. 143—149. — Cont.
- (5). Sur les Noctuae de la région du Vésuve. *Miscell. entom.* vol. 9. No. 5/6. p. 81—89.
- (6). 1900. Contribution à une Monographie du genre *Vanessa* Fabr. Note sur le sous-genre *Grapta* Doubl. *Miscell. Entom.* vol. 8. No. 10/12. p. 121—128.
- (7). Observations faites sur quelques Papilionidae recueillis dans les provinces méridionales de l'Italie. t. c. No. 9. p. 131—137.
- De Caradja, Arist.** (1). Microlepidoptères recoltées par M. Jaquet en 1900. *Bull. Soc. Sci. Bucarest*, T. 9. No. 6. p. 763.
- (2). Die Microlepidopteren Rumäniens. *Bul. Soc. Scient. Bucarest*. An. X. No. 1/2. p. 110—168.
- Carpenter, G. H.** *Oenistis quadra* on Carlingford Mountain. *The Irish Naturalist*, vol. 10. No. 8. p. 164.
- Carpenter, Sidney C.** Protection of *Chinobas semidea* (by law). *Entom. News*, vol. 12. June, p. 161—162.
- Carr, F. M. B.** (1). Notes on the Season. *The Entomologist*, vol. 34. March, p. 108—112.
- (2). Easter (1901) in the New Forest. t. c. June, p. 181. *Lepidopterologische Sammelnotizen*.
- (3). Abundance of *Lycaena argiolus* at Lee. t. c. Sept. p. 254.
- (4). Late Brood of *Pachycnemia hippocastanaria*. t. c. Oct. p. 288. — Note by R. South, *ibid.*
- (5). (Lepidopterological) Notes from Devon and North Somerset. t. c. Nov. p. 319—320.
- (6). Siehe Miller, J.
- Cary, Merritt.** Notes on the Butterflies of Sioux County, Nebraska. *Canad. Entom.* vol. 33. No. 11. p. 305—311.
- Phyciodes ismeria* n. aberr. nigra.
- Caspari II, W.** Einige Bemerkungen zu dem Thema: „Verfolgung der Schmetterlinge durch Vögel“. *Societ. Entom.* 16. Jhg. No. 5. p. 33—35.
- Catalogue of the Lepidoptera-Phalaenae in the British Museum. vol. III. Catalogue of the Arctiadae (Arctianae) and Agastidae in the Collection of the British Museum. By Sir Geo. F. Hampson. With pls. XXXVI—LIV. London. print. by order of the Trustees, 1901. 8°. XIX, 690 p. 16 s.
- Caterpillars attended by Ants. *Canad. Entom.* vol. 33. 1901. No. 10. p. 279—280.

- Cecconi, Giacom.** Forte invasione in Italia di *Grapholitha tedella* Cl. Bull. Soc. Entom. Ital. An. 33. 2. Trim. p. 67—74.
- Cerva, Frigyes** (1). 1898. A *Cossus* mint méztolvaj. Rovart. Lapok, 5. köz. 8. füz. p. 168—169. — Ausz. *Cossus* als Honigdieb. Ausz. Hft. 8. p. 22. — Ausz. von L. Aigner-Abafi. Allgem. Zeitschr. f. Entom. 7. Bd. No. 2/3. p. 59.
- (2). *A Simplicia rectalis* Ev. tomeges fellépése. t. c. 8. füz. Oct. p. 156—159. — Massenhaftes Auftreten von *Simplicia rectalis*. Ausz. Hft. 8. p. 19—20.
- Chapman, Thom. Alg.** (1). 1899. Some Points in the Evolution of the Lepidopterous Antenna. With 1 pl. London, E. Knight, 1899. 8°. (19 p.). — Ausz. von Chr. Schröder, Allgem. Zeitschr. f. Entom. 7. Bd. No. 7/8. p. 158—159.
- (2). *Acanthopsyche opacella*: instinct altered when parasitised. Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 12 (37) March, p. 62—64.
- (3). Notes on the Lepidoptera observed on a visit to the Engadine in 1900. t. c. p. 130 (132). — (concl.) t. c. June, p. 133—136.
- (4). Rediscovery of *Loxopera deaurana* Peyr., with a note on its Life-History. With Notes by J. Hartley Durrant. t. c. July, p. 169—170.
- (5). Pyrales, Tortrices and Tineina observed on a visit to the Engadine in 1900. t. c. Aug. p. 195.
- (6). On some Wing Structures in Lepidoptera with 2 pls. Proc. South London. Entom. Nat. Hist. Soc. 1900. p. 31—45.
- (7). (Structures in the Imago of *Cnethocampa pityocampa*, by means of which it manages to escape from the Cocoon). With 1 pl. Proc. South London. Entom. Nat. Hist. Soc. 1900. p. 90—92.
- (8). (On some *Erebias*). t. c. p. 99—100.
- (9). *Erebia glacialis* a Correction. The Entomologist, vol. 34. Jan. p. 17.
- (10). Names and Definitions of Hybrids. t. c. July, p. 189—190.
- Schlägt kürzere Schreibweise für die Hybriden von *Standfuss* u. für die Bezeichn. von Hybriden überhaupt (wegen leichter Schreibweise im Text u. leicht. Uebersicht der Componenten) vor, so für die komplizirte *Saturnia*-Hybr. No. 18

$$\frac{\left(\frac{\text{pavonia } \delta}{\text{spini } \text{♀}}\right) \delta}{\left(\frac{\text{pavonia } \text{♀}}{\text{spini } \delta}\right) \text{♀}} = \text{Sat. Pa S. Pa Pa} - \text{Pa S. Pa Pa}$$

oder = Sat. Pa S Pa Pa Pa S Pa Pa

u. ähnlich No. 30 von *Pygaera*

$$\text{Pyg. } \frac{\left(\frac{\text{curtula } \text{♀}}{\text{anachoreta } \text{♀}}\right) \delta}{\left(\frac{\text{anachoreta } \delta}{\text{anachoreta } \text{♀}}\right) \text{♀}} = \text{Pygaera CA} - \text{AA} - \text{AA} - \text{AA}$$

A = anastomosis, sobald *anachoreta* zutrifft da-
für = Ac u. für anastomosis dann As.

- (11). Sidelights on the Lepidopterological Work of the Nineteenth Century. Entom. Record, vol. 13. No. 1. p. 31—36.
 - (13). *Luffia maggiella*. t. c. No. 2. p. 80—81.
 - (14). Note on *Luffias*, with incidental Remarks on the Phenomenon of Parthenogenesis. t. c. No. 3. p. 91—95, No. 5. p. 149—153. — (Conclud.) *ibid.* No. 6. p. 178—180.
 - (15). The Cry of *Acherontia Atropos*. t. c. No. 4. p. 127—128.
 - (16). Eggs of Lepidoptera. — *Agrotis agathina*. t. c. No. 5. p. 160.
 - (17). Notes on *Bankesia conspurcatella* etc. t. c. No. 6. p. 173—174.
 - (18). Butterflies at Cannes. t. c. No. 6. p. 189—190.
 - (19). Ovum of *Lachneis lanestris*. t. c. No. 7. p. 225—226.
 - (20). Eggs of Lepidoptera. — *Trochilium apiforme*. t. c. No. 7. p. 226.
 - (21). Cocoon of *Lachneis lanestris*. t. c. No. 8. p. 244.
 - (22). The Development of the Imago in the Pupa of *Lachneis lanestris*. t. c. No. 8. p. 243—244.
 - (23). Condition of *Lachneis lanestris* during the Pupal State. t. c. No. 10. p. 284—286.
 - (24). 1900. The Lid of the Cocoon of *Lachneis lanestris*. t. c. No. 10. p. 299.
 - (25). *Luffia lapidella* Larvae in September. t. c. No. 10. p. 299—300.
 - (26). The Cocoon-Cutter of *Arctias luna*. t. c. No. 10. p. 300.
 - (27). 1897. Notes on the Pupa of *Oeta floridana*. With 1 pl. Journ. New York Entom. Soc. vol. 5. No. 3. p. 127—129. — Note by H. G. Dyar *ibid.* p. 129.
 - (28). A few Days at Fusio (with notes on the Geometrids by L. B. Prout) in Trans. of the City of London Entomol. a. Natural History Society for the year. 1900. (Pp. 74). London Institution, E. C. 1901.
- Chittenden, F. H.** (1.) The Fall Army Worm (*Laphygma frugiperda* S. u. A.) and variegated Cutworm (*Peridroma saucia* Hübn.) U. S. Dept. Agric. Bull. N. S. No. 29. Washington, Govt. Print. Off., 1901. 8°. (64 p. 11 cuts).
- (2). The Green Clover Worm (*Plathypena scabra* Fabr.) With 1 cut. U. S. Dep. Agr. Bull. N. S. No. 30. (Some Miscell. Res.) p. 45—50.
- Chittenden, G.** *Vanessa polychloros* etc. in London. The Entomologist, vol. 34, Nov. p. 316.
- Chrétien, Pierre.** Description d'une nouvelle espèce de *Teleia*. Bull. Soc. Entom. France, 1901. No. 1. p. 10—12.
- T. thomeriella.*
- (2). Note complémentaire sur *Teleia scriptella* Hb. t. c. No. 2. p. 27.
 - (3). Note sur *Ancylolomia palpella* Schill. t. c. No. 17. p. 300—301.

- (4). Description d'une nouvelle espèce de Microlépidoptère de France. t. c. No. 18. p. 333—334. — *Scythris* (*Butalis*) *orbidella* n. sp.
- (5). Die auf *Silene nutans* lebenden Kleinschmetterlinge. Insekten-Börse, 18. Jhg. No. 7. p. 52—53.
Aus Le Naturaliste.
- Churchill, J.** (1). **Aylward.** Early Spring in West Sussex. The Entomologist, vol. 34, May, p. 160—161.
- (6). Variety of *Euchloris* (*Phorodesma*) *pustulata*. The Entomologist, vol. 34, Aug. p. 231.
- Clark, Freder. Noad.** On the Ova of Lepidoptera. With 1 pl. Proc. South London Entom. Nat. Hist. Soc. 1900. p. 46—50.
- (2). Eggs of Lycaenids. — Erratum. Entom. Record, vol. 13. No. 3. p. 109.
- Clark, J. A.** (1). *Peronea cristana* Fab. and its Aberrations. With 1 pl. t. c. No. 8. p. 227—229. — With 1 pl. No. 9. p. 261—265, No. 10. p. 287—293, (concl.) No. 11. p. 327.
- (2). Aberrations of *Melanagria Galathea*. t. c. No. 12. p. 358.
- Clarke, H. Shortridge.** (1). Notes on Collecting in the Isle of Man. Entom. Record, vol. 13. No. 11. p. 333—334.
- (2). Early Emergences in the Isle of Man. t. c. No. 5. p. 165.
- Clarke, W. T.** The Potato worm in California (*Gelechia operculella*). Californ. Agr. Stat. Bull. 135 (30 p. 15 figgs.). — Abstr. Exper. Stat. Rec. vol. 13. No. 8. p. 765—766.
- Claxton, W.** *Mamestra abjecta* and *Spilodes palealis* at Romford. The Entomologist, vol. 34. Dec. p. 353.
- Clutton, W. G.** (1). Larvae of *Aciptilia galactodactyla* in late June. Entom. Record, vol. 13. No. 6. p. 195.
- (2). Lepidoptera from Burnley etc. in 1901. t. c. No. 12. p. 370—371.
- Cockayne, E. A.** (1). Larvae of *Nyssia lapponaria*. The Entomologist, vol. 34. Sept. p. 255—256.
- (2). *Orthosia rufina* flying by Day. The Entomologist, vol. 34. No. p. 312.
- (3). *Nyssia lapponaria* in Pertshire. Entom. Record, vol. 13. No. 10. p. 304.
- Cockerell, T. D. A.** (1). *Clisiocampa fragilis*. Entom. News vol. 12. Jan. p. 25—26.
Verwüstungen u. Parasiten.
- (2). *Heterochroa californica*. t. c. vol. 12. March, p. 90.
Verbreitung derselben.
- (3). Some Insects of the Hudsonian Zone in New Mexico. IV. Lepidoptera, Rhopalocera. Psyche, vol. 9. No. 300. p. 186.
- Cockerell, Wilmatte Porter.** Eggs of *Arachnis Zuni*. Entom. News, vol. 12. Sept. p. 209.
- Colthrup, C. W.** (1). (Note on *Bryophila muralis*). Proc. South London Entom. Nat. Hist. Soc. 1900. p. 98—99.

- (2). *Lasicampa quercus* Larva hibernating. Entom. Record, vol. 13. No. 5. p. 158.
- (3). On the Pupal Condition of *Hemerophila abruptaria* during winter. t. c. No. 5. p. 165.
- (4). Aberration of *Smerinthus tiliae*. t. c. No. 10. p. 297.
- (5). *Sphinx convolvuli* in East Dulwich. t. c. No. 10. p. 306.
- (6). Occurrence of *Eutricha quercifolia*. t. c. No. 10. p. 306. — At Margate.
- (7). Habits of certain Butterflies when disturbed during Copulation. Entom. Record, vol. 13. No. 11. p. 328.
- Constant, A.** Gestorben am 13. Mai im Alter von 72 Jahren. — Nekrolog. A. von Lafaury, Ann. Soc. Entom. France, vol. 70. p. 8—14 nebst Abb. auf Taf. Liste der 44 Publik. (p. 14—17, einschliesslich der Arbeit über Hampson's Phycidées de Ragonot. 1901). — Kurzer Abriss in: The Entomologist, vol. 34 p. 212.
- Coquillett, D. W.** Descriptions of three Lepidopterous Larvae. Journ. New York Entom. Soc. vol. 9. No. 2. p. 85—86.
- Corbett, H. H.** (1). *Actebia praecox* and *Crambus pinetellus* near Frodingham. Entom. Record, vol. 13. No. 9. p. 278.
- (2). *Argynnis adippe* and *Dryas paphia* near Doncaster. t. c. No. 9. p. 278.
- Cottam, Arth.** Early appearance of *Pieris rapae* in London. The Entomologist, vol. 34. Apr. p. 131.
- Cotton, John.** Lepidoptera at Minehead. Entom. Record, vol. 13. No. 11. p. 333.
- Cowl, Mrs. M. E.** (1). *Plusia moneta* at Wandsworth. Entom. Record, vol. 13. No. 3. p. 111.
- (2). Notes on the Emergence of *Acherontia atropos* in 1900. t. c. No. 5. p. 155.
- (3). *Pachythelia villosella* in April. t. c. No. 5. p. 166.
- (4). Stridulation of *Smerinthus populi*. t. c. No. 5. p. 164.
- (5). Length of the Larval Life of *Pachythelia villosella*. Erratum as to Emergence of Imago. t. c. No. 7. p. 221.
- Crallan, G. E. J.** (1). *Nemeophila (Chelonia) plantaginis* in Autumn. The Entomologist, vol. 34. Nov. p. 312.
- (2). Notes on *Spilosoma (Arctia) fuliginosa*. t. c. Dec. p. 353.
- Crampton, H. E.** Elimination in Lepidoptera. Science, N. S. vol. 13. No. 315. p. 71.
- Crisp, E.** (1). Searching for night feeding Larvae. Entom. Record, vol. 13. No. 7. p. 221.
- (2). *Deilephila livornica* at Cambridge. t. c. No. 12. p. 376.
- Croft, W. B.** Colours of Butterflies not due to Diffraction. Nature, vol. 65. No. 1679. p. 198.
- Croker, A. J.** Lepidoptera at Chingford. Entom. Record, vol. 13. No. 10. p. 302.
- Crocker, M.** *Leucanea extranea* and *Dasycampa rubiginea* at Torquay. The Entomologist, vol. 34. May, p. 160.

De Crombrugghe de Piquendaele, le baron. Note sur quelques Microlépidoptères de la faune Belge. Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45. III. p. 100—104.

Die Bemerkungen betreffen folg. 20 Spp.:

Scoparia basistrigalis Knaggs, *Hydrocampa rivulalis* Dup., *Penthina bifasciana* Hw. u. *Grapholitha conferana* Rtz., *Nemophora Schwarzii* Z., *Cerostoma alpella* Schiff., *Orthotaelia sparganella* Thnb., *Coleophora bilineatella* Z., *Coleophora argentula* Z., *Lithocolletis messaniella* Z., *Bucculatrix crataegi* Z., *Trifurcula immundella* Z., *Oxyptilus Heterodactyla* Haworth, *Lita Strelitzii* H. S., *Butalis parvella* H. S., *Elachista paludum* Frey., *Cochylis purpuratana* H. S., *Grapholitha incarnatana* Hb., *Phthoroblastis spiniana* Dup. u. *Phth. populana* F.

Cuthbert, H. G. Abundance of *Vanessa io* in 1901. The Irish Naturalist, vol. 10. No. 10. p. 203.

Czekelius, D. Beiträge zur Schmetterlingsfauna Siebenbürgens. III. Verhdlgn. u. Mitth. Siebenb. Ver. f. Naturw. Hermannstadt. 30. Bd. 1900. p. 80—88.

— (2). Titel p. 622 sub. No. 1 des Berichts f. 1899.

Sorgfältige Kritik der bisher über die siebenbürgische Lep.-Fauna handelnden 16 Publik. nebst Beiträgen aus eigener Erfahrung; 919 Macros, 212 Micros, wozu Titel l. c. sub. No. 3 ca. 90 für die Fauna neue Micros bringt.

Daecke, E. Notes on the Habits of *Thecla damon*. Journ. New York Entom. Soc. vol. 9. No. 1. p. 26—27.

Dadd, E. M. (1). Finding Cocoons of *Hypocampa Milhauseri* and *Cerura bicuspis*. Entom. Record, vol. 13. No. 5. p. 158—159.

— (2). Winter Habitat of *Senta maritima*, with some Notes on the Larval Habits. t. c. No. 5. p. 159—160.

Dahlström, Gyula, (Jul.) (1). Eperjes környékének svövä lepkéi. II. Rovart. Lapok, 8 köt. 2 füz. p. 36—38. — (Die Bombyciden von Eperjes II.)

— (2). Eperjes környékének Noctuidai. (Die Noctuen der Umgebung von Eperjes). t. c. 3. füz. p. 60—62.

— (3). Eperjes környékének Noctuidai. (Die Noctuen der Umgebung von Eperjes.) t. c. 4. füz. p. 81—83, 5. füz. p. 103—105.

— (4). Eperjes környékének araszló pilléi. (Die Geometriden der Umgebung von Eperjes). t. c. 6. füz. p. 116—120.

— (5). Eperjes környékének araszló pilléi. t. c. 8. füz. Oct. p. 169—171. — Ausz. Die Geometriden der Umgebung von Eperjes (Forts.). Hft. 8. p. 20.

— (6). Az időjárás befolyása a lepkék színére. Rovart. Lapok, 8. köt. 9. füz. Nov. p. 187—188. — Einfluss der Witterung auf die Färbung der Lepidopteren. Ausz. Hft. 9. p. 11—22.

— (7). (Einfluss der Temperatur auf Varietätenbildung). Insekten-Börse, 18. Jhg. No. 30. p. 237.

- Dale, C. W.** (1). An unrecorded example of *Cloantha perspicillaris* from the New Forest. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37). Jan. p. 13.
 — (2). Additions to the Lepidoptera of Glanvilles Wootton since 1900. t. c. Nov. p. 276.
- DalGLISH, AND. ADIE.** (1). *Chaerocampa nerii* L. near Barrhead. Ann. Scott. Nat. Hist. 1901. Jan. p. 52.
 — (2). Lepidoptera from South-West-Scotland. Entom. Record, vol. 13. No. 4. p. 133—135.
- Dannatt, W.** (1). *Cyaniris (Lycaena) argiolus* at Blackheath. t. c. No. 12. p. 373.
 — (2). *Leucania vitellina* at St. Margaret's Bay. t. c. No. 12. p. 373.
- Davis, Wm. T.** (1). Intelligence shown by Caterpillars in placing their Cocoons. Journ. N. York. Entom. Soc. vol. 5. No. 1. p. 42—44.
 — (2). *Cecropia* cocoons. Entom. News, vol. 12. March, p. 76—77.
 — (3). 1896. The Dog's Head Butterfly on Staten Island. Journ. New York. Entom. Soc. vol. 4. No. 4. p. 200.
- Day, A.** *Sterrhia sacrarica* in Worcestershire. The Entomologist, vol. 34. Oct. p. 296.
- Day, G. O.** (1). Lepidoptera at Knutsford. Entom. Record, vol. 13. No. 7. p. 220.
 — (2). Extended Duration of Pupal Stage of *Petasia nubeculosa*. t. c. No. 7. p. 220.
 — (3). Habits of *Lithosia complana* var. *sericea*. t. c. No. 9. p. 276.
 — (4). Food Plants of *Neuronia saponariae*. t. c. No. 9. p. 277.
 — (5). *Pharetra menyanthidis* at Sugar. t. c. No. 9. p. 277.
- Dickerson, Mary C.** Moths and Butterflies. With 244 illustrs. Boston, Ginn & Co. 1901. 8°. (XVIII, 344 p.)
- Dietze, Karl** (1). Beiträge zur Kenntnis der Eupitheciën (Titel p. 570 des vorig. Berichts). Ausz. von Chr. Schröder, Allgem. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. No. 16/17. p. 261.
 — (2). Beiträge zur Kenntniss der Eupitheciën. Mit 1 Taf. Deutsch. Entom. Zeitschr. 1900. 2. lep. Hft. (Iris, Bd. 13. 2. Hft.) p. 306—227.
- Dietz, Wm. G.** On *Pigritia Clem.* With 2 pls. Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27. No. 2. p. 100—119—120.
 26 neue Species; n. g.: *Ploiphora*, *Epigritia*, *Pseudopigritia*.
- Distant, W. L.** Descriptions of four new species of Noctuidæ from the Transvaal. The Entomologist., vol. 34. Oct. p. 284—285.
- Doane, R. W. and D. A. Brodie.** The variegated cutworm (*Peridroma saucia*). With 5 figs. Washington. Agr. Stat. Bull. 47 (16 p.). — Abstr. Exper. Stat. Record, vol. 13. No. 5. p. 470.
- Dobrée, E. C.** Lepidoptera at Castle Moreton. Entom. Record, vol. 13. No. 7. p. 221.

- Dodge, G. M. and E. A.** Notes of the early Stages of *Catocala*.
 Canad. Entom. vol. 33. No. 8. p. 221—226. Forts. No. 11.
 p. 298—300.
- Doidge, Harris** (1). *Xylomiges conspicillaris* in Somersetshire.
 The Entomologist, vol. 34. April, p. 130.
 — (2). Some Notes on *Xylomiges conspicillaris*. t. c. Dec. p. 332.
- Dognin, Paul** (1). Hétérocères nouveaux de l'Amérique du Sud.
 Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45. V. p. 173—189.
 Bringt 40 neue Sp., die sich folgendermassen verteilen:
 Anaxita (1), Phaegoptera (1), Amastus (2), Idalus (1), Opharus
 (1), Callidota (1), Perophora (1), Hemicerus (1), Anisodes (1), Cras-
 pedia (5), Acidalia (1), Eois (1), Larentia (2), Eupithecia (?) (1),
 Phibalapteryx (1), Eucosmia (1), Scotosia (2), Hammaptera (1),
 Rhopalista (1), Cidaria, Psaliodes (1), Ochyria (?) (1), Cyclomia (1),
 Calospila (?) (1), Oenoptila (1), Cirsodes (1), Mucronodes (1), Oxydia
 (2), Phyllodonta (2), Polla (1), Urepione (1).
 — (2). Hétérocères nouveaux de l'Amérique du Sud. Ann. Soc.
 Entom. Belg. T. 45. X. p. 304—311. — 17 neue Arten.
- Dollmann, J. C.** Notes on an unsuccessful attempt to breed *Colias*
edusa. Entom. Record, vol. 13. No. 7. p. 213—215.
- Dönitz, W.** (Ueber *Psyche helix*). Insekten-Börse, 18. Jhg. No. 39.
 p. 309.
- Donovan, C.** A List of the Lepidoptera of County Cork. The
 Entomologist, vol. 34. Dec. p. 333—336.
- Draudt, M.** Die Raupe von *Eupithecia conterminata* Z. Deutsch.
 Entom. Zeitschr. 1900. 2. lepid. Hft. (Iris, Bd. 13. 2. Hft.)
 p. 328—331.
- Druce, Herb.** (1). Descriptions of some new Species of Heterocera.
 Ann. of Nat. Hist. (7.) vol. 7. Jan. p. 74—79.
 Syntomidae: *Eucereon* (1). — Arctiidae: *Rhodogastria* (1),
Ecpantheria (1). — Cyllopodidae: *Menis* (1). — Notodontidae:
Symmerista (1), *Heterocampa* (2 + 2?), *Edema* (1), *Rosema* (1),
Cerura (1), *Notodonta* (?) (1), *Ichthyura* (1), *Hyleora* (1), *Blera* (1),
Cleapa (1). — Noctuidae: *Gadirtha* (2).
 — (2). Descriptions of some new Species of Lepidoptera from
 East Africa and Tropical America. Ann. Nat. Hist. (7.)
 vol. 7. May, p. 432—444.
 40 neue Species u. zwar: Hesperiiidae: *Parosmodes* (1). —
 Agaristidae: *Xanthospilopteryx* (1). — Arctiidae: *Eucyane* (1),
Eucyrta (1), *Neritos* (1), *Elysus* (1). — Limacodidae: *Dalcera* (1),
Euclea (?) (1). — Cossidae: *Duomitus* (2), *Langsdorfia* (2), *Zeuzera*
 (1). — Hepialidae: *Hepialus* (1), *Dolaca* (1). — Notodontidae:
Rifargia (1), *Heterocampa* (1). Subfam. Stictopterinae: *Stictoptera*
 (1). — Deltoidae: *Hypena* (5). — Tortricidae: *Atteria* (4). —
 Tineidae: Anophorinae: *Ankistrophorus* (1), *Thysanosedes* (1),
Acrolophus (2 + 1?), *Anaphora* (6), *Felderia* (2).

- Dumont, C.** Sur *Hemerophila nycthemeraria*, espèce nouvelle pour les environs de Paris. Bull. Soc. Entom. France, 1901. No. 20. p. 362—363.
- Dziurzyński, Clemens.** *Zygaena angelicae* O. ab. *confluens* mihi. Mit 1 Fig. 11. Jahresber. Wien. Entom. Var. 1900. p. 117.
- Dyar, Harr. G.** (1). 1896. Note on the Head Setae of Lepidopterous Larvae, with Special Reference to the Appendages of *Perophora Melsheimeri*. With 2 figs. Journ. New York Entom. Soc. vol. 4. No. 2. p. 92—93.
- (2). 1896. A new *Anisota*. Journ. New York Entom. Soc. vol. 4. No. 4. p. 166. — *A consularis*.
- (3). Life History of some North American Moths. Proc. U. S. Nat. Mus. vol. XXIII. p. 255—284.
- Beschreibung der Entwicklungsstadien u. Biologie von: *Cauthetia Grotei* H. Edw., *Amphonyx antaeus* Drury, *Eupseudosoma involutum* Sepp. var. *floridum* Grote, *Eucereon confine* H. S. var. *carolina* Edw., *Scepsis fulvicollis* Hb., *Cisthene subjecta* Wlk., *Calidota strigosa* Wlk., *Ingura burserae* Dyar, *Gonodonta unica* Neumög., *Peridroma incivis* Guen., *Capnodes punctivena* Smith, *Remigia latipes* Guen., *Chytolita morbidalis* Guen., *Renia sobrialis* Wlk., *Tephroclystis nebulosa* Hulst, *Stericta incrustalis* Hulst.
- (4, 5). 1897. The Life Histories of the New York Slug Caterpillars. I—VI. cf. Bericht f. 1896. p. 421. — VII—IX. Journ. New York Entom. Soc. vol. 5. No. 1. p. 1—14. With 2 pls. — X—XI *ibid.* No. 2. p. 57—66. With 2 pls. — XII. *ibid.* No. 4 p. 167—170. With 1 pl. — XIII—XVII. siehe p. 477 sub. No. 67 des Berichts f. 1898.
- (6). 1896. A Description of the Larva found by Mrs. Slosson. *op. cit.* vol. 4. No. 2. p. 87—88. — *Enaemia crassinervella*. Zell.
- (7). The Life History of the Florida Form of *Euclea delphinii*. With 1 pl. *op. cit.* vol. 4. No. 3. p. 125—129.
- (8). Descriptions of two Noctuid Larvae. *op. cit.* vol. 4. No. 3. p. 145.
- Spargaloma sexpunctata* Grote, *Deva purpurigera* Walk.
- (9). 1896. The Larva of *Syntomeida epilais* Walk. With 1 fig. on pl. *op. cit.* vol. 4. No. 2. p. 72—73.
- (10). 1897. *Oeta floridana* Neumoegen. *op. cit.* vol. 5. No. 1. p. 48.
- (11). Note on Mr. Grote's Remarks on the Saturnians. *op. cit.* vol. 5. No. 2. p. 66.
- (12). *Gluphisia severa* in New Jersey. *op. cit.* vol. 5. No. 2. p. 96.
- (13). On the white *Eucleidae* and the Larva of *Calybia Slossoniae* (Packard). With 1 pl. *op. cit.* vol. 5. No. 3. p. 121—126. — n. g.: *Leucophobetron*.
- (14). A comparative Study of seven young Arctians. With 2 pls. *op. cit.* vol. 5. No. 3. p. 130—133.
- (15). Notes on the Larva *Lagoa pyxidifera*. *op. cit.* vol. 4. p. 160.

- (16). On the fluctuations of the post-spiracular tubercule in Noctuid larvae. Proc. Entom. Soc. Washington, vol. 4. No. 4. p. 370—374.
- (17). A new Species of *Bertholdia*. t. c. No. 4. p. 391. — (Discuss.) p. 391. — *B. soror* n. sp.
- (18). A parallel evolution in a certain larval character between the Syntomidae and the Pericopidae. t. c. No. 4. p. 407—409.
- (19). Life History of *Callidapteryx dryopterata* Grt. With diagr. t. c. No. 4. p. 414—418.
- (20). Larva of *Eucheira socialis* Westw. t. c. No. 4. p. 420.
- (21). On a distinction of Species in the Cochilidian genus *Sibine*. With 5 figs. t. c. No. 4. p. 422—427.
- (22). A division of the Genus *Sphingicampa* Walsh. With remarks on the larvae. t. c. No. 4. p. 427—430.
- (23). A remarkable *Sphinx* larva (*Lophostethus Dumolinii* Latr.) t. c. No. 4. p. 440—442.
- (24). Notes on the Winter Lepidoptera of the Lake Worth, Florida. t. c. No. 4. p. 446—485.
- (25). On the specific differences between *Alypia octomaculata* Fab. and *A. Langtonii* Coup. t. c. No. 4. p. 495—496.
- (26). Notes on the Genitalia of *Halisidota Harrisii* Walsh. With 2 figs. Canad. Entom. vol. 33. No. 2. p. 30.
- (27). On certain Identifications in the Genus *Acronycta*. t. c. No. 4. p. 122.
- (28). Further about the Types of *Acronycta*. t. c. No. 7. p. 191—192.
- (29). Life Histories of North American Geometridae. — XVIII. *Haematopsis grataria*. Psyche, vol. 9. No. 297. p. 155—156.
- (30). XIX. *Senelys ennucleata* Guen. t. c. No. 298. p. 165—166.
- (31). XX. *Heliomanta cycladata* Grt. t. c. No. 299. p. 177—179.
- (32). XXI. *Eudule mendica*. Psyche. vol. 9. No. 300. p. 189—191.
- (33). XXII. *Sciagraphia heliothidata* Guenée. t. c. No. 301. p. 203—204.
- (34). XXIII. *Xanthotype crocataria*. t. c. No. 303. p. 226—227.
- (35). XXIV. *Eois inductata* Guen. No. 304. p. 239—240.
- (36). XXV. *Cingilia catenaria* Cram. t. c. No. 305. p. 250—251.
- (37). XXVI. *Alsophila pometaria*. t. c. No. 306. p. 262—263.
- (38). XXVII. *Sabulodes transversata* Drury. t. c. No. 307. Nov. p. 273—274.
- (39). XXVIII. *Eucrostis viridipennata* Hulst. t. c. No. 308. p. 287—295.
- (40). (1900). An new Zygaenid from Arizona. Journ. New York Entom. Soc. vol. 8. No. 1. p. 32.
Gingla laterculae n. sp.
- (41). Preliminary Notes on the Larvae of the Genus *Arctia* op. cit. vol. 8. No. 1. p. 34—47.

- (42). 1901. Descriptions of some Pyralid Larvae from Southern Florida. op. cit. vol. 9. No. 1. p. 19—24.
Thyridopyralis n. g. gallacrandialis n. sp.
- (43). An apparently new Tortricid from Florida. op. cit. vol. 9. No. 1. p. 24—25.
Lophoderus amatana n. sp.
- (44). Note on the Larva of Arctia intermedia. op. cit. vol. 9. No. 1. p. 25—26.
- (45). Note on the Larva of Psaphidia thaxterianus. op. cit. vol. 9. No. 2. p. 84—85.
- (46). Diagnosis of a new Arctian. op. cit. vol. 9. No. 2. p. 85.
Dodia albertae n. sp.
- (47). A Century of Larval Descriptions. Entom. Record. vol. 13. No. 1. p. 37—41.
- (48). Lepidoptera Heterocera (Part). Some Insects of the Hudsonian Zone in New Mexico. — III. Psyche, vol. 9. No. 298. p. 164. — 7 Spp.
- (49). (Ant. Schmid's and O. Hoffmann's Collections of Microlepidoptera). Entom. News, vol. 12. March, p. 120.
- (50). Concerning Larval Descriptions. Canad. Entom. vol. 33. No. 11. p. 315—316. — Die übrigen Arbeiten im Canad. Entom. siehe unter No. 26—28.
- Early Spring Lepidoptera. (Notes by A. J. Croker, E. F. C. Studd etc.) Entom. Record, vol. 13. No. 8. p. 247—249.
- Eaton, A. E.** Autumnal Notes from Seaton, Devon. Entom. Monthly Mag. (2). vol. 12 (37). Jan. p. 13.
- Eaton, E. H.** Colias edusa at Seaton, Devon in 1901. Entom. Monthly Mag. (2). vol. 12 (37). Nov. p. 275.
- Eckstein, Karl** (1). Zur Biologie des Kiefernspanners. Allg. Forst- u. Jagdzeit. 1901. Jan. (4 p.). — Ausz. v. L. Reh. Allgem. Zeitschr. f. Entom. 7. Bd. No. 1. p. 27—28. Fidonia piniaria.
- (2). Die Nonne. Zeitschr. f. Forst- u. Jagdwesen, Danckelmann, 33. Jhg. Dez. p. 711—719.
- Embleton, Alice, L.** Larvae of Sphinx convolvuli on Holy Island, Northumberland. Entom. Monthly Mag. (2). vol. 12 (37). Dec. p. 297—298.
- Enderlein, Günther.** Argynnis aglaja L. ab. Wimani Holmgr. bei Berlin. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. 2./3. Hft. p. 320.
- Etiquettenliste (Sammlungsverzeichniss) der Grossschmetterlinge von Europa etc. Zusammengestellt von Wilh. Neuburger nach dem Katalog von O. Staudinger und H. Rebel. Berlin. W. Neuburger, R. Friedländer & Sohn in Comm., 1901. 8°. (26 einseitig bedruckte Blätter). M. 2,—.
- Evans, Will.** (1). Selenia bilunaria Esp. (= illunaria Hb. apparently not double brooded in Scotland). Entom. Monthly Mag. (2). vol. 12 (37), May, p. 126—127.

- (2). *Sphinx convolvuli* in East Lothian etc. Ann. Scott. Nat. Hist. 1901. Oct. p. 239.
- (3). Larvae of *Sphinx convolvuli* in Scotland. Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 12 (37). Dec. p. 298.
- Evans, W. Edg.** *Acherontia atropos* in Dumbartonshire. Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 12 (37). Nov. p. 276.
- Fassl, A. H., jr.** (1). Ein Beitrag zur Lepidopteren-Fauna von Josephstadt i. B. Insekten-Börse, 18. Jhg. No. 20. p. 156—157.
- (2). (Lepidopteren an Aas saugend). Insekten-Börse, 18. Jhg. No. 33. p. 260.
- Favre, E.** Nouvelle étude sur les Eupithécies du Valois. Mittheil. Schweiz. Entom. Ges. 10. Bd. 8. Hft. p. 360—364.
- Fawcett, J. Malcolm.** Notes on the Transformations of South-African Lepidoptera. With 4 pls. Trans. Zool. Soc. London, vol. 15. P. 6. p. 291—319—322.
- Federley, H.** (1). 1900. *Ansilis plagiata*. Meddel. Soc. Fauna Flora, Fenn. 25. Hft. p. 8. — Für Finland neu.
- (2). Tre för faunan nyan Microlepidoptera. t. c. 27. Hft. p. 41.
- Fernald, C. H.** (1). Marginal Wing-Bristles in Lepidoptera. The Entomologist, vol. 34. May, p. 146.
- (2). New Pyralidae and Tortricidae from Palm Beach, Florida. Journ. New York Entom. Soc. vol. 9. No. 2. p. 49—52. — 8 neue Arten.
- (3). An Century of Lepidopterology in North America. Entom. Record, vol. 13. No. 2. p. 76—79.
- (4). Verf. weist nach, dass er die von Quail erwähnten Borsten bereits 1896 beschrieben habe, nämlich in „The Crambidae of North America“ p. 10, plate A Fig. 11 u. in „The Gypsy Moth“ p. 341 pl. 52 figs. 8 u. 9.
- Sie sind nicht immer gekrümmt, vielfach auch gerade, sogar auf demselben Flügel. Er hat sie bei allen Lepidopteren gefunden und nach seiner Vermuthung stehen sie mit Duftdrüsen in Verbindung, u. sind als Sinnesorgane besonderer Art anzusprechen. Ueber das bedornte Feld an der Basis der Unterseite des Hrandes der Vflgl. vieler (nicht aller) Lepidoptera siehe: Psyche, vol. VII p. 395 pl. 9 (1896).
- Fischer, E.** (1). Experimentelle Untersuchungen über Entstehung und Wesen der Schmetterlings-Varietäten und Aberrationen. Ber. Senckenb. Nat. Ges. Frankfurt. 1901. Ber. p. 97—100.
- (2). Lepidopterologische Experimental-Forschungen. Kritische Abhandlung über Ursache und Wesen der Kälte-Varietäten der Vanessen. II. Experiment. Mit 3 Fig. Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. No. 20. p. 305—307. (Schluss) No. 21. p. 325—327.
- Ist die Forts. zum gleichnamigen Titel p. 576 - 577 des vorig. Berichts. II. Experimente. Mit 3 Fig. auf p. 305. Fig. 1. *Van. antiopa* L. (normal), Fig. 2 var. *artemis* Fschr. (Kälte + 1° C.),

Fig. 3 var. *artemis* Fschr. (Wärme -40°). — Die Kälte-Variationen werden auch durch hohe Wärme erzeugt. Weitere Wärmeexperimente mit $+38^{\circ}$ C bis $+40^{\circ}$ C. in den Jahren 1898—1900. Betreffen *V. io*, *urticae*. — p. 325 sq. *V. polychloris* L. *Pyrameis atalanta* L. u. *cardui* L. — Alle bestätigen Fischer's Hemmungstheorie. — Theil III mit der Taf. soll folgen.

— (3). Experimentelle Untersuchungen über die Vererbung erworbener Eigenschaften. Allgem. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 49—51, 363—365, 377—380. — Auszug von H. Fuchs, Biol. Centralbl. 21. Jhg. p. 591—592.

Der 1899 vom Verf. gemachte Vorschlag, die Frage der Vererbung erworbener Eigenschaften experimentell an *Arctia caja* L. Puppen zu studieren, ist 1899 vom Verf. zur Ausführung gebracht u. hat ein positives Resultat ergeben. 2 Versuchsreihen, die eine zur Kontrolle. Ergebnis: Die in Folge der Einwirkung eines äusseren Faktors entstandenen neuen Eigenschaften wurden auf die Nachkommen vererbt, oder anders gesagt: Es mussten sich in den Geschlechtszellen (Ei- u. Samenzelle) ebenfalls Veränderungen (neue Eigenschaften) eingestellt haben, die alsdann vom kleinen befruchteten Ei aus durch das Raupen- u. Puppen-Stadium hindurch bis auf den fertigen Falter (den Nachkommen) sich übertrugen und auf den Flügeln desselben in einer aberrativen Färbung u. Zeichnung zum Austrag gelangten, wie wir sie ähnlich u. gleichsinnig bereits auf den Flügeln der Eltern künstlich erzeugt hatten. Wie dies geschieht, davon können wir uns noch keine Vorstellung machen. Unzweifelhaft ist dadurch aber eine wichtige Aufklärung gegeben über die Umwandlung der Arten in Folge Einwirkung äusserer Faktoren. Der experimentelle Beweis hat gezeigt, dass 1. die Art durch die Faktoren der Aussenwelt Veränderungen erfährt u. 2. dass diese Veränderungen sich auf die Nachkommen übertragen. — Nur arbeitet die Natur äusserst langsam. — So wird es uns verständlich, dass viele unserer mitteleuropäischen Falter in anderen Gegenden stark variiren u. s. w. Eine veränderte Temperatur verändert nicht nur die Farbe und die Zeichnung, sondern auch die Form (Flügelumriss, Füsse, Behaarung). Auch diese durch Temperatur oder Feuchtigkeit veränderte Form ist vererblich.

Damit ist aber noch nichts gesagt über die letzte u. auch allerschwierigste Frage des Vererbungsproblems, die auf unseren Fall angewendet lautet: Was für ein Vorgang mochte sich wohl vollzogen haben, dass die Geschlechtszellen analog abänderten wie die Flügel der Eltern. 2 Erklärungsweisen: Lamarck (Uebertragung auf die Geschlechtszellen nach Art einer Telegraphie) u. Weismann (der Vorgang trifft Flügel u. Fortpflanzungszellen direkt u. verändert beides in entsprech. Weise). Veranschaulichung beider Theorien an der Zeichn. Fig. 9 u. 10. Nach der Darstellung sind beide praktisch gleich. Wir müssen bei den Einflüssen unterscheiden:

1. Gruppe: Temperatur, Nahrung, Infektions- u. Stoffwechselkrankheiten (resp. ihre Toxine), auch Feuchtigkeitsgrade. Sie beeinflussen den gesammten Körper (Inneres u. Aeusseres).

2. Gruppe: Gebrauch, Nichtgebrauch, Licht (d. h. alle Farbenstrahlen), Schall, Gerüche, Geschmäcke, lokale Krankheiten, ohne Allgemeinsymptome wie vor allen Verletzungen. Sie treffen nur den Körper u. zwar meist die Oberfläche.

Verhalten der beiden Theorien dazu. Selektion.

p. 377—381. Die Temperaturexperimente. Eimer u. G. Wolff. Ein Entscheid, ob die Lamarck'sche oder die Weismann'sche Theorie die richtige ist, konnte noch nicht erbracht werden. — Standfuss.

Verf. gelangt zu der Ueberzeugung, dass ein wirklich einwandfreier Beweis bezügl. der Theorie der Strahlenwirkung nur durch solche Beispiele geleistet werde, die folg. Forderungen genügen:

1. Die als Beweise heranzuziehenden Färbungen müssen wirklich nur durch Licht- (Farben-) Strahlen erzeugt werden u. dürfen — 2. nur im Falter-Stadium während der phyletischen Entwicklung entstanden sein. — 3. Sie müssen mithin auch so geartet sein, dass ihre Entstehung nicht etwa auf die Lage der Flügel in der Puppe zurückgeführt werden kann. — 4. Die Entstehung irgend welcher dieser Färbung durch Fortleitung, Ausstrahlung (Irradiation) von einem anderen, bereits vorher so gefärbten Theil der gleichen Flgl.-Fläche aus, oder dadurch, dass eine Farbe von der einen Flügelfläche her auf die andere „durchschlag“, muss gänzlich ausgeschlossen sein. — 5. Diese Färbungen müssen bei den Nachkommen jeweilen, also in jeder Generation auftreten, ohne dass diese wieder der Lichteinwirkung, die sie erzeugte, ausgesetzt zu sein braucht. Der Falter muss also diese Färbung fix u. fertig schon beim Ausschlüpfen aus der Puppe aufweisen. — 6. Sie dürfen vor allem mit der Nützlichkeit (also indirekt auch mit Selektion, oder primärer Zweckmässigkeit oder dergl.) in keinerlei Zusammenhang stehen; sie dürfen somit weder Schutz- noch Schreckfärbungen sein.

Derartige Färbungsverhältnisse aufzufinden dürfte schwierig sein u. in der Natur selten zu finden sein. Fischer hat nun solche gefunden, bei paläarkt sehr vereinzelt, bei exotischen mehrfach.

Dabei ist vorauszuschicken, dass sich bei diesen eigenart. Färbungsverhältnissen vier Gesetze bekunden, deren eins zwar noch nicht erwiesen, doch bereits angenommen ist, wenngleich es bisher nur flüchtig berührt wurde. Die drei anderen, weit wichtigeren hochinteressanten u. für unsere Frage vollkommen entscheidenden, sind bisher merkwürdiger Weise gänzlich unentdeckt geblieben.

— (4), Weitere Untersuchungen über das procentuale Auftreten der Vanessen-Aberrationen. Societ. Entom. 16. Jhg: No. 7. p. 49—51, No. 8. p. 58—59.

— (5). Die Beseitigung der „Wasserflecken“ aufgeweichter Schmetterlinge. Referat von O. Schultze, t. c. No. 12. p. 91—92. Aus Entom. Zeitschr. Guben. 15. Jhg. No. 3 u. 4.

Fitch, Edw. A. Purple Larva of *Sphinx ligustri*. The Entomologist, vol. 34. Sept. p. 254.

- Fleck, A.** Macrolépidoptères récoltés par M. Jaquet en 1900. Bull. Soc. Sci. Bucarest, T. 9. No. 6. p. 762—763.
- Fauna Rumäniens.
- Fleck, Ed.** Eine neue Sammelmethode. Insekten-Börse, 18. Jhg. No. 35. p. 276—277.
- Fleet, Havry.** Papilio Machaon and other Lepidoptera in the Esher District. Entom. Record, vol. 13. No. 10. p. 304—305.
- Fleischmann, Friedr.** 1900. Zur Kenntniss von *Psodos noricana* Wagner und *coracina* Esp. Mit 6 Fig. auf Taf 1 u. 2. 10. Jahresber. Wien. Entom. Ver. 1899. p. 83—88.
- a) Vorbemerkung p. 83. — b) Beschreibung der Genitalorgane, von Leop. Poljanec p. 83—85. — c) Die ersten Stände, von Hugo May u. Fr. Fleischmann p. 85—88.
- Fletcher, J.** 1901. The Codling Moth. Canad. Entom. vol. 33 p. 212. — *Carpocapsa pomonella*.
- Fletcher, Thom. Bainbridge.** (1). *Thecla betulae* et *pruni*. Feuille jeun. Natural. (4). An. 31. No. 363. p. 97.
- (2). Evening Flight of Butterflies. The Entomologist, vol. 34. Febr. p. 54.
- (3). A Preliminary List of Wei-Hai-Wei. t. c. May, p. 154—156, June, p. 173—174, July, p. 197—200.
- Bringt Bemerk. zu *Rhopalocera*: *Nymphalidae* (9), *Lycaenidae* (9), *Pieridae* (5), *Papilionidae* (3), *Hesperiidae* (5). — *Heterocera*: *Zygaenidae* (2), *Liparidae* (3), *Psychidae* (1), *Limacodidae* (1), *Notodontidae* (4). — *Sphingidae* (7), *Saturniidae* (2), *Lasiocampidae* (1), *Zeuzeridae* (1). — *Noctuae trifidae*: *Agrotidae* (6), *Heliothidae* (3), *Acontiidae* (1). — *Noctuae quadrifidae*: *Plusiidae* (2), *Calpidae* (1), *Hypopyridae* (1), *Ophideridae* (1), *Lagopteridae* (1). — *Geometrae*: *Idaeidae* (1), *Acidaliidae* (1). — *Pyrales*: *Pyalididae* (3), *Hydrocampidae* (1).
- (4). Notes on Lepidoptera from the Mediterranean. t. c. Aug., p. 220—223, Sept., p. 244—245.
- (5). Aberration of *Dilina* (*Smerinthus*) *tiliae*. Entom. Record, vol. 13. No. 8. p. 254.
- Fletcher, James and Arth. Gibson.** The Life - History of the Greenhouse Leaf-Tyer (*Phlyctaenia ferrugalis* Hbn. = *Botis Harveyana* Grt.). Canad. Entom. vol. 33. No. 5. p. 140—144.
- Forsyth, C. H.** *Argynnis paphia* at Witherstack. The Entomologist, vol. 34. Sept. p. 253.
- Foster, Frk. H.** Some Results of Breeding Moths of the Genus *Haploa* Hübner. Entom. News, vol. 12 March, p. 79—83; Apr. p. 97—106. 1 pl.
- Fowler, J. H.** (1). Sounds produced by Pupae. The Entomologist, vol. 34. Jan., p. 17—18.
- (2). *Caradrina ambigua* in Hampshire. t. c. Febr., p. 45—46.
- (3). *Caradrina ambigua* at Ringwood. t. c. Nov., p. 317.
- (4). *Sphingidae* at Ringwood. t. c. Nov., p. 320—321.

- Fox, C. W.** *Sphinx convolvuli* in the Isle of Wight. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 298.
- Fox, C. E. Dobrée.** (1). *Lepidoptera* at Castle Moreton. Entom. Record. vol. 13. No. 12. p. 371.
- (2). *Xylomiges conspicillaris* at Castle Moreton. Entom. Record. vol. 13. No. 9. p. 277.
- Freer, Rich.** (1). Notes on *Lepidoptera* from Staffordshire. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) Jan. p. 10.
- (2). *Lepidoptera* in Anglesea. t. c. p. 12—13.
- Freke, Percy, E.** *Colias hyale*, *C. edusa* etc. at Folkestone. The Entomologist, vol. 34, Dec. p. 351.
- French, G. H.** (1). Revision of the Genus *Catocala*. Canad. Entom. vol. 33. No. 1. p. 12—14.
- (2). More about the red-winged *Catocalae*. t. c. No. 7. p. 205—207.
- Frings, Carl.** (1). Werden die Schmetterlinge wirklich in bedeutender Anzahl von Vögeln gefangen? Societ. Entom. 16. Jhg. No. 9. p. 65—67.
- (2). Temperatur-Versuche im Jahre 1900. t. c. No. 3. p. 17—19, No. 4. p. 26—27, No. 5. p. 35—37, No. 6. p. 42—45.
- Friquet, C.** Faune Entomologique de la Haute-Marne. Tableaux analytiques illustrés pour la détermination des principales chenilles de Macrolépidoptères. Avec 2 pls. Feuille jaun. Natural. (4.) 31. Ann. No. 366. p. 152—157. No. 367. p. 177—181. — (Suite) No. 368 p. 198—201. No. 369. p. 223—224. No. 370. p. 246—249. No. 371 p. 266—270. 32. Ann. No. 373 p. 21. No. 374. p. 34—40.
- Froggatt, Walt. W.** (1). Caterpillar Plagues, with an account of the Potato-pests at Windsor. With 2 pls. and 2 textfig. Agric. Gaz. N. S. Wales, vol. 12. P. 2. p. 237—243.
- (2). Codling Moth (*Carpocapsa pomonella* L.) with 1 pl. t. c. P. 11. p. 1354—1363.
- Frohawke, F. W.** (1). On the occurrence of *Colias edusa* and *C. hyale* in 1900, and the results of rearing the var. *Helice* from *Helice ova*. The Entomologist, vol. 34. Jan. p. 4—5.
- (2). The Oldest existing Moth. With 1 cut. t. c. Febr. p. 42—43. Aelteste vorhandene Tineide, zusammengepresst in einem Dokument, das in Mexico um 1650 geschrieben u. seit 250 J nicht angerührt worden war. Das Stück ist eine Acontide *Rhododipsa miniana* Grote.
- (3). Life history of *Colias hyale* (Contin.). t. c. June, p. 167—171. — Correction. *ibid.*, July, p. 204. Forts. aus The Entomologist, vol. 25 (1892).
- (4). Life-History of *Hesperia comma*. t. c. Dec., p. 325—328.
- (5). Aberrations of *Colias hyale* and *Gonopteryx rhamni*. t. c. Dec., p. 352.
- (6). *Catocala fraxini* in Suffolk. t. c. Dec., p. 352.
- Fruhs'orfer, H.** (1). Ein neuer *Papilio* von der malayischen Halbinsel. Societ. Entom. 16. Jhg. No. 7. p. 21. — *P. mahadeva selangoranus* n. subsp.

- (2). Drei neue *Papilio* Formen aus Nias. t. c. No. 12. p. 89.
- (3). Zwei neue *Papilio* aus Indochina. t. c. No. 12. p. 89—90.
- (4). Eine neue Nymphalide aus Annam. t. c. No. 12. p. 89.
— *Penthema annamitica* n. sp.
- (5). Neue Schmetterlinge aus Tonkin. Societ. Entom. 16. Jhg. No. 13. p. 97—99, No. 14. p. 105—107.
10 neue Subspecies.
- (6). Eine neue *Terinos*. t. c. No. 13. p. 99. — *T. robertsia niasica* n. sp.
- (7). *Tenaris kubaryi aruana* n. subsp. Insekten-Börse, 18. Jhg. No. 47. p. 373. — Aus Berlin. Entom. Verein.
- Fuchs, Aug.** Neue Geometriden der Genera *Acidalia* u. *Eupithecia* aus Sicilien. Stettin. Entom. Zeitung, 62. Jhg. No. 1—6. p. 119—126.
7 Spp., dar. 4 neue: *Acidalia* (3 n. sp. + 1 n. var. + 1 n. aberr.), *Eupithecia* (1 n. sp. + 1 n. var.).
- (2). Neue Formen deutscher Lepidopteren. t. c. No. 1—6. p. 127—137.
(*Arctia* (1 n. var. + 1 n. ab.), *Aporophyla* (1 n. var.), *Orrhodia* (1 n. ab.), *Acidalia* (2 n. ab.), *Ematurga* (1 n. ab.), *Cidaria* (1 n. var.), *Zonosoma* (1 n. ab.))
- (3). Sechs neue Geometriden-Formen. t. c. No. 7/12. p. 373—387. Aberrationen. *Acidalia* (1 ab.), *Gnophos* (2 ab.), *Lythria* (1 ab.), *Cidaria* (1 var.), *Eupithecia* (1 ab.).
- (4). Vier neue Kleinfalter der europäischen Fauna. t. c. No. 7/12. p. 382—387.
2 neue Arten, 2 neue Varr. *Grapholitha* (1 n. var.), *Lita* (1 n. var.), *Butalis* (1 n. sp.), *Ornix* (1 n. sp.).
- (5). Ueber *Pleurota schlaegeriella* Z. Jahrb. Nassau. Ver. f. Naturk. 54. Jhg. p. (65) 67—68. — Apart: J. F. Bergmann, 1901. 8°. M. —, 40.
- (6). Fünf neue Formen europäischer Macrolepidopteren. Jahrb. Nassau. Ver. f. Naturk. 54. Jhg. p. (51) 53—58. — Apart: Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1901. M. —, 60.
Epichnopteryx (1 n. sp.), *Macaria* (1 n. aberr.), *Crocallis* (1 n. aberr.), *Cidaria* (1 var. n.?) u. *Eupithecia* (1 n. var.?).
- (7). Ueber die spezifischen Unterschiede von *Botis* (*Pyrausta*) *flavalis* S. V. und *B. citralis* H. S. (*lutealis* Dup.) Jahrb. Nassau Ver. f. Naturk. 54. Jhg. p. 59 (61—63). — Apart: Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1901. 8°. M. —, 40.
- Fryer, Herb. Fortescue.** Note on the weight of pupae of *Ache-ronia atropos*. Entom. Monthly Mag. (2.) vol. (12) 37. April p. 100.
- Gabrielli, G.** *Leucanitis stolidus* F. a budapesti faunahan. Rovart. Lapok, 8. köt. 9. fiz. Nov. p. 189. — L. st. (u. a.) in Budapest. — Ausz. Hft. 9. p. 22.
- Gadeau de Kerville, H.** L'accouplement des Lépidoptères. Avec 5 figs. Bull. Soc. Entom. France, 1901. No. 4. p. 76—81.

- Garratt, Rich.** Three generations of *Selene illustraria* in one year. *The Entomologist*, vol. 34, Oct. p. 288—289.
- Garrett, D. T.** *Lycaena minima* in Warwickshire. *The Entomologist*, vol. 34, Aug. p. 229—230.
- Gastine, G. et V. Vermorel.** Sur les ravages de la Pyrale dans le Beaujolais et sur la destruction des papillons nocturnes au moyen de pièges lumineux alimentés par le gaz acétylène. *Compt. rend. Acad. Sci. Paris*, T. 133. p. 488—491. — *Extr. Revue Scientif. (4.) T. 16. No. 14.* p. 438—439.
- Gauckler, H. (1).** Die Resultate nächtlicher Raupen-Excursionen im Frühjahr 1901. *Insekten-Börse*, 18. Jhg. No. 46. p. 364.
- (2). Zahlreiches Auftreten einiger Schmetterlingsarten im Jahre 1901 bei Karlsruhe. *Insekten-Börse*, 18. Jhg. No. 49, p. 389.
- (3). Lepidopterologische Ergebnisse des Jahres 1900 für einige Gegenden des Grossherzogthums Badens. t. c. No. 2. p. 12—13, No. 3. p. 20—21, No. 4. p. 27—28.
- (4). *Agrotis comes* und Aberrationen. *Entom. Jahrb. (Krancher)*, 11. Jhg. p. 193—196.
- (5). Ein Beitrag zur Lebensweise von *Chesias spartiata* Füssli. t. c. p. 199—200.
- Gebhardt, W.** Referat über Standfuss's Temperatur und Hybridisationsversuche. *Arch. f. Entwicklungsmech.* 13. Bd. 3. Hft. p. 476—479.
- Giard, Alfred.** Remarques critiques à propos de la détermination du sexe chez les Lépidoptères. *Compt. rend. Acad. Sci. Paris*, T. 133. No. 9. p. 407—410. — *Extr. Revue Scient. (4.) T. 16. No. 10.* p. 309—310. *Abstr.: Determination of Sex in Lepidoptera. Journ. R. Micr. Soc. London*, 1902 P. 1. p. 41.
- Gibson, Arth. (1).** The Breeding of Lepidoptera with Notes on the Inflation of Larvae. 31. *Ann. Rep. Entom. Soc. Ontario*, 1900. p. 79—81.
- (2). The Life-History of *Arctia virguncula* Kirby. *Canad. Entom. vol. 33. No. 12.* p. 325—329.
- (3). 1900. The Life-History of *Euprepia caja* L. var. *americana* Harr. *Canad. Entom. vol. 32. No. 11.* p. 321—325.
- (4). 1900. The Life-History of *Arctia phalerata* Harr. *op. cit.* vol. 32. No. 12. p. 369—376.
- Gill, Theod.** Note on the Genus *Hollandia* of Karsch. *Science*, N. S. vol. 13. No. 337. p. 949—950.
Wird in *Hollandella* umgeändert.
- Gilles, W. S.** Note on a Third Brood of *Selenia illunaria*. *The Entomologist*, vol. 34, May, p. 157.
- Girault, A.** Eggs of *Thyridopteryx ephemeraeformis*. *Entom. News*, vol. 12. No. 10. p. 304—305.
- Glenny, Freder.** *Acherontia atropos* in the Wisbech District in 1900. *Entom. Record*, vol. 13. No. 5. p. 156—158.

- Glüsing, J.** *Aporia crataegi*. Insekten-Börse, 18. Jhg. No. 27. p. 213.
- Godman, Fr. Du C. and Osb. Salvin.** *Biologia Centrali-Americana, Insecta, Lepidoptera-Rhopalocera*. Vol. I. Text, XVI, 487 p. vol. II. Text, 782 p., vol. III. Plates, I—CXII and XXIV a. London, 1879—1901. 8°.
- Göldi, Em. A.** Grossartige Schmetterlingszüge am Amazonenstrom. Mit 2 (7) Abbildgn. „Die Schweiz“ (Zürich), 4. Jhg. Hft. 19. p. 441—444.
- Good, A. J.** Some Observations on the Development of *Feniseca Tarquinius* Fab. *Canad. Entomologist*, vol. 33. No. 8. p. 228.
- Goss, Herb.** (1). Notes on the Lepidoptera of Northamptonshire. P. I. *Rhopalocera*. *Entom. Monthly Mag.* (2.) vol. 12 (37) March, p. 58—62.
- (2). *Vanessa Antiopa* etc. in the Isle of Wight. t. c. July, p. 171.
- (3). Notes on the Lepidoptera of the Breadalbane district of Perthshire. *Entom. Monthly Mag.* (2) vol. 12. (37). Sept., p. 227—228.
- Green, Ern.** (1). Moth catching by electric light at the Boer camp, Diyatalawa, Ceylon. *Entom. Monthly Mag.* (2.) vol. 12 (37.) Apr. p. 87—90.
- (2). Some Caterpillar Pests of the Tea-Plant. Sept. 1900, *Circular, Botan. Gardens, Ceylon* (1), 19 p.: 239—165.
Besch. von 11 Spp., nebst Abwehrmittel. — Vernichtung der Brut, ehe sie sich ausbreitet.
- Greer, T.** (1). Lepidoptera in County Dublin. *Entom. Record*, vol. 13. No. 11. p. 333.
- (2). Noctuid Aberrations in Co. Dublin. *Entom. Record*, vol. 13. No. 12. p. 360.
- (3). *Agrotis cinerea*. — A new Irish Moth. *The Irish Naturalist*, vol. 10. No. 10. p. 202.
- Grierson, P. H.** *Vanessa io* in the west. *The Irish Naturalist*, vol. 10, No. 3. p. 72.
- Grinnell, Fordyce.** *Lasiocampa medusa* Strecker. *Entom. News* vol. 12. Jan. p. 26.
- Grinnell, Fordyce, jr.** A new Variety *amyntula* with other Notes. *Canad. Entom.* vol. 33. No. 7. p. 192. — *Lyc. amyntula* var. *Herii* n. var.
- Gross, Heinr.** Beitrag zur Macrolepidopterenfauna von Oberösterreich und dem angrenzenden Theile von Steiermark. 11. Jahresber. Wien, *Entom. Ver.* 1900. p. 25—83.
Umfasst 919 Arten.
- Grote, A. Radcliffe.** (1). 1896. Correction of the Type of *Agronoma* and Note of *Laspeyria*. *Journ New York Entom. Soc* vol. 4. No. 2. p. 85—86.

- (2). 1896. Note on *Samia californica*. t. c. No. 4. p. 201.
 - (3). 1897. An Attempt to classify the Holarctic Lepidoptera by Means of the Specialisation of the Wings. Part I. The Day Butterflies. With 1 Diagram. op. cit. vol. 5. No. 4. p. 151—160. — Part II. The Hawk and Emperor Moths wurde schon im Bericht für 1898 p. 492 sub No. 50 aufgeführt.
 - (4). 1897. The correct Title: *Noropsis elegans* Hübn. t. c. No. 1. p. 31—32.
 - (5). The Classification of the Butterflies. *Canad. Entom.* vol. 32. No. 12. p. 359.
 - (6). Systematic Arrangement of the North American Lepidoptera. *Canad. Entom.* vol. 33. No. 4. p. 116—118.
 - (7). On Types of *Acronycta* etc. t. c. No. 9. p. 242—245.
 - (8). Note on the Generic Title *Burtia*. t. c. No. 12. p. 339.
 - (9). Some Original Descriptions by Guenée. *Canad. Entom.* vol. 33. No. 6. p. 177—179.
 - (10). List of North American *Apatela*. *Proc. Entom. Soc. Washington*, vol. 4. No. 4. p. 365—368.
 - (11). The Century and the Lepidopterologist. *Entom. Record*, vol. 13. No. 1. p. 41—43.
 - (12). Fossile Schmetterlinge und der Schmetterlingsflügel. Mit 1 Abb. im Text. *Verhdlgn. k. k. zool.-bot. Ges. Wiss.* 51. Bd. 9. Hft. p. 655.
 - (13). Titel p. 585 sub No. 4 des vor. Berichts. — Ref. von Schröder, *Chr. Allg. Zeitschr. f. Entom.* 6. Bd. p. 27.
- Grützner, . . .** Ueber die Eiablage von *Endromis versicolora*. *Zeitschr. f. Entom. Breslau*, N. F. 26. Hft. p. 29—30.
- Guenther, Konr.** Ueber Nervendigungen auf dem Schmetterlingsflügel. Mit 1 Taf. *Zool. Jahrb. Abth. f. Anat.* 14. Bd. 4. Hft. p. 550—570—572. — Nerve-Endings in Butterflies, Wings. *Abstr. Journ. Roy. Micr. Soc. London*, 1901. P. 5. p. 524—525.
- Gynandromorphism in Lepidoptera. *The Entomologist*, vol. 34. Dec. p. 348—349.
- Ter Haar, D.** Twei variëteiten van *Polyommatus dorilis* Hufn. Met 4 fig. (pl.). *Tijdschr. v. Entom. Nederl. Entom. Vereen.* 43. D. 3/4. Afl. p. 235—238. — Ausz. von Chr. Schröder *Allgem. Zeitschr. f. Entom.* 6. Bd. No. 10. p. 284.
- (2). Eenige merkwaardige Aberratiën en een nieuwe Varieteit afkomstig van een dankbaar vangterrein. Met 8 Fig. (pl.) *Tijdschr. v. Entomol. Nederl. Entom. Vereen.* 43. D. 3/4. Afl. p. 239—246.
- Hampson, Sir Geo. F.** (1). A Classification of a new Family of the Lepidoptera. With 4 illustr. *Trans. Entom. Soc. London*, 1901. P. II. p. 187. — *Sabaliadae* fam. n; n. g. *Spiramiopsis*; 2 n. spp.

- (2). The Lepidoptera Phalaenae of the Bahamas. Ann. Nat. Hist. (7.) vol. 7. March, p. 246—261.

Ueber die Lepidopteren der Bahamas existierte bis 1900 keine Zusammenstellung. Erst Miss Sharpe veröffentlichte 1900 (cf. vor. Bericht) eine Liste der von Bonhote erbeuteten Tagfalter. Als Ergänzung dazu gibt nun Hampson die Liste der Lep.-Phalaenae. Sorgfältige Sammlungen dürfte dieselbe noch sehr erweitern. — *Composita fidelissima* ist auf eine kleine Insel bei Nassau u. auf die grosse Insel Andros beschränkt. Die Vertheilung ist folg.: *Syntomidae* (4) dar. neu: *Bombiliodes carminata*. — *Arctiadae* (2), *Noctuidae* (26) u. zwar *Agrotinae* (2), *Mamestrinae* (1), *Caradrinae* (4), *Noctuinae* (14, dar. neu: *Parachabora triangulifera*), *Hypeninae* (5, dar. 2 neue *Nodaria*). — *Hypsidae* (1). — *Sphingidae* (6) u. zwar *Chaerocampinae* (3), *Sphinginae* (2), *Macroglossinae* (1). — *Notodontidae* (1 neue, näml. *Heterocampa bichorda*). — *Geometridae*: *Boarmianae* (10 dar. neu: *Merocausta vinosaria*) *Larentianae* (2), *Geometrinae* (2), *Acidalianae* (8, dar. neu: *Somatina fusaria*). — *Uraniadae* (1). — *Limacodidae* (1 neue: *Altha rufipuncta*). — *Psychidae* (1). — *Zygaenidae* (1). — *Thyrididae* (1). — *Pyralidae*: *Crambinae* (4, dar. neu: *Chilo funerellus*), *Phycitinae* (18, dar. neu: n. g.: *Encystia* [1 n. sp.] u. *Stylopalpia* [1 n. sp.], u. neue Sp. von *Unadilla* [2], *Ephestia* [1], *Ephestiodes* [2], *Nephoptyx* [1]). *Epipaschianae* (3), *Chrysauginae* (1), *Pyralinae* (1). *Hydrocampinae* (2). *Pyraustinae* (29, dar. neu: *Entephria callidalis*).

Es befinden sich also darunter 17 n. spp.; n. g.: *Encystia*, *Stylopalpia*.

- (3). New Species of *Syntomidae* et *Arctiadae*. Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8. Sept. p. 165—186.

72 neue Arten, 2 n. g.: *Microtane* u. *Cyclosodes*.

Diese Formen bilden das 1. Supplem. zu den 3 ersten Bänden des Hampson'schen Katalogs der „Lepid. Phalaen. of the Brit. Mus.“ (Die beigefügten Zahlen geben die Stellung u. d. Eintheilung an). Die neuen Spp. (resp. Gatt.) vertheilen sich folgenderm.:

Syntomidae: *Ceryx* (2), *Syntomis* (9), *Tritonaclia* (1), *Metarctia* (5), *Pseudosphex* (1), *Sarosa* (2), *Chrysocale* (1), *Hypocladia* (1), *Ceramidia* (1), *Napata* (4), *Corcura* (1), *Uraga* (1), *Micraga* (1), *Delphyre* (3), *Scepsis* (2), *Lycomorpha* (1), *Ctenucha* (1), *Philoros* (2).

Arctiadae: *Nolinae*: *Celama* (5), *Nola* (1), *Poecilnola* (2). — *Lithosianae*: *Pelosia* (1), *Phryganopsis* (3), *Macrosia* (2), *Ctenosia* (1), *Ilema* (7), *Agylla* (2), *Stictane* (1), *Microtane* n. g. (1), *Cyclosodes* n. g. (1), *Metuegoa* (1), *Odozana* (1), *Gymnasura* (1), *Eugoa* (1). — *Arctianae*:: *Hyphantria* (1), *Estigmene* (1).

- (4). On some teratological Specimens of Lepidoptera. Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 12 (37) May, p. 117—120.

— (5). Siehe Catalogue.

- Hanham, A. W.** (1). Additions to the List of Manitoba Butterflies, with Notes on other Species. *Canad. Entom.* vol. 32. no. 12. p. 365—367.
- (2). A List of Manitoba Moths. Part V. *Canad. Entom.* vol. 33. No. 8. p. 213—220.
- Hardy, J. Ray.** The Macro-Lepidoptera of Sherwood Forest. *Mem. Proc. Manchester Lit. Phil. Soc.* vol. 45. P. IV. No. 12. (5 p.).
- Harris, W. T.** Notes from Norfolk. *The Entomologist*, vol. 34. Jan. p. 25.
- Hart, W. E.** Peacock Butterfly (*Vanessa io*) near Derry. *The Irish Naturalist*, vol. 10. No. 7. p. 145.
- Harrison, A. and H. Main.** Gynandrous Specimens of *Amphidasis betularia*. *The Entomologist*, vol. 34, July, p. 203.
- Hauchecorne, O.** Einige abnorm gefärbte einheimische Schmetterlinge. *Tagebl. V. Internat. Zool.-Congr.* No. 8. p. 23.
- Hauder, Frz.** Beitrag zur Lepidopteren-Fauna von Oesterreich ob. der Enns. 30. Jahresber. Ver. f. Nat. Linz, p. ([1], 3—120).
- Heath, E. Firmstone.** Notes on the Occurrence of Lepidoptera etc. in Southern Manitoba. *Canad. Entom.* vol. 33. No. 4. p. 98—100.
- (2). Another Protest [regarding Changes in Nomenclature of Lepidoptera]. *Canad. Entom.* vol. 33. No. 9. p. 263—264.
- Heath, G. H.** Lepidoptera in August in South Devon. *The Entomologist*, vol. 34. Oct. p. 267—269.
- Heckel, .** (Ueber die Zucht der Psychiden). *Insekten-Börse*, 18. Jhg. No. 33. p. 261.
- Henderson, J.** Aberrations of *Bryophila muralis* *Entom. Record.* vol. 13. No. 12. p. 360.
- (2). Note on Keeping Cocoons of *Miselia oxyacanthae*. *Entom. Record*, vol. 13. No. 12. p. 374.
- Hering, Ed.** Uebersicht der Sumatra-Pyraliden. *Stettin. Entom. Zeitung*, 62. Jhg. No. 1—6. p. 13—118. — p. 13—118: 128 (22 n.) Spp. — idem II. (Forts.) t. c. No. 7/12. p. 229—388. n. g.: *Teratauxta* (Hamps. in litt.)
I. Spp. No. 1—128. — II. Spp. 129—290.
- Die Heterocereren-Raupen (und Puppen) des H. T. Peterschen Manuscript-Werkes: Biologische Beiträge zur brasilianischen Schmetterlingsfauna. Mit 10 Taf. Neudamm, J. Neumann, (1898—) 1901. Gr. 8°. M. 5,—.
- Aus *Allgem. Zeitschr. f. Entom.* Text von Victor v. Donninghausen. Vorrede von Chr. Schröder.
- Heyche, E.** Zur Biologie von *Cnethocampa pinivora* Tr. Briefl. Mittheilung. *Allgem. Zeitschr. f. Entom.* 6. Bd. No. 22. p. 648.

- Haylaerts, F. J. H.** Description d'une Psychide inédite de la République argentine, *Chalia Künckelii*. Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45. II. p. 97.
- Hill, H. Ainslie.** (1). Early Appearance of *Zonosoma porata* in confinement. Entom. Record, vol. 13. No. 5 p. 165.
 — (2). Early appearance of *Zonosoma porata* in confinement. Entom. Record, vol. 13. No. 5. p. 165.
 — (3). The Buff Variety of *Amphidasis betularia*. The Entomologist, vol. 34. June, p. 180.
- Hill, A. Ainslie.** Buff coloured *Amphydasis betularia*. The Entomologist, vol. 33. Sept. p. 252.
- Hills, Stuart S.** (1). *Spilodes palealis* at Folkestone. Entom. Record, vol. 13. No. 11. p. 334.
 — (2). Aberration of *Thymelicus thaumas*. Entom. Record, vol. 13. No. 12. p. 359.
- Hilse, C.** Nochmals der Schmetterlingsfang der Vögel. Insekten-Börse, 18. Jhg. No. 45. p. 355—356.
- Himsl, Ferd.** Prodrum einer Macrolepidopteren-Fauna des Traun- und Mühlkreises in Oberösterreich. (Forts.—cf. vor. Bericht p. 588 sub. No. 2). Societ. Entom. 16. Jhg. No. 1. p. 2—3, No. 2. p. 12, No. 4. p. 27—28, No. 6. p. 45, No. 8. p. 61, No. 9. p. 67—68, No. 10. p. 76—77, No. 11. p. 84, No. 12. p. 92—93, No. 14. p. 108, No. 16. p. 124—125, No. 17. p. 132, No. 18. p. 139—140.
- Hinds, W. E.** Notes on the Life-History of *Alsophila pometaria* Peck (Fall Cankerworm). With 1 pl. and 1 fig. in the text. Canad. Entom. vol. 33. No. 7. p. 185—191.
- Hinkins, Ralph C.** Insects in the Brighton District. Entom. Record, vol. 13. No. 5. p. 164—165.
- Hinneberg, Karl.** A *Phtheochroa amandana* életmodja. (Biologie). Rovart. Lapok, 8. köt. 1. füz. p. 1—3.
- Hinneberg, C.** Biologie von *Phtheochroa amandana* H.-S. Allgem. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. No. 6. p. 83—85.
- Hippert, .** (Captures des Lépidoptères). Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45. XII. p. 383—384.
- Hirschke, Hans.** 1900. Zwei neue Geometriden-Formen. Mit 2 Fig. auf Taf. 10. Jahresber. Wien. Entom. Ver. 1899. p. 61.
- Höfner, Gabr.** Die Schmetterlinge des Lavantthales und der beiden Alpen, Kor- und Saualpe. XI. Nachtrag. Jahrb. naturhist. Landes-Mus. Kärnten, 26. Hft. 47. Jahrg. p. 247—253.
 Vergleiche hierzu den Ber. für 1897.
- Hopson, Montagu F.** (1). *Sphingides* at Hampstead. Entom. Record, vol. 13. No. 12. p. 373—374.
 — (2). *Apatura Iris* on the Hants Borders. Entom. Record, vol. 13. No. 12. p. 374.

- Howe, T. L.** (1). Vitality of *Hybernia ruficapraria*. The Entomologist, vol. 34. Apr. p. 131.
- (2). *Hybernia ruficapraria* embedded in Ice. Entom. Record, vol. 13. No. 4. p. 137.
- (3). Lepidoptera from the Penarth District. Entom. Record, vol. 13. No. 5. p. 164.
- von Hoyningen-Huene, Friedr. Freiherr.** (1). Nachträge zu C. A. Teich's baltischer Lepidopteren-Fauna und dessen vervollständigtem Verzeichnisse. Sitz.-Ber. Naturf. Ges. Jurjeff (Dorpat), 12. Bd. 3. Hft. p. 460—475.
- (2). Aberrationen einiger (15) estländischer Eulen und Spanner. Mit 1 Taf. Entom. Zeitschr. 46. Bd. 2./3. Hft. p. 309—319.
- von Huene, Friedr. Freiherr.** Einige neue und verkannte Formen estländischer Lepidopteren. Stettin. Entom. Zeitung, 62. Jhg. No. 1—6. p. 154—159.
- 5 Spp.
Polyommatus (1 ab.), *Argynnis* (1), *Tapinostola* (1 ab.), *Scopelosoma* (1 ab.), *Abraxas* (1 ab.).
- Huggins, H.** *Sesia andreniformis* in Kent. The Entomologist, vol. 34. Sept. p. 255.
- Huggins, H. jun.** (1). *Colias hyale* at Gravesend. Entom. Record, vol. 13. No. 10. p. 305.
- (2). *Sphinx ligustri* full fed in July. t. c. No. 10. p. 305.
- (3). *Sesia andreniformis* in Kent. t. c. No. 10. p. 305.
- Húsevö** *Lycaena herynýó*. Rovart. Lapok, 8. köt. 7. füz. p. 147. — Ausz. (Ueber die Raupe von *Lycaena epius*.) Hft. 7. p. 18.
- Hyams, H.** (1). *Pieris daplidice* in Sussex. The Entomologist, vol. 34. Dec. p. 351.
- (2). *Argynnis aglaia* var. *Charlotta*. t. c. Dec. p. 351.
- Hyde, John, T.** (1). Notes from Portland, 1900. The Entomologist, vol. 34, March p. 100—101.
- (2). Notes on the Lepidoptera from Portland. t. c. Dec. p. 357.
- Imms, A. D.** Note on and from of *Vanessa urticae*. Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 12 (37) June, p. 148—149.
- Jackson, F. W. J.** *Oenistis quadra* in Ireland. The Entomologist, vol. 34. Nov. p. 317.
- Jäger, J.** Lepidoptera in Central Germany. The Entomologist, vol. 34. Nov. p. 303—304.
- Bezieht sich auf lepid. Sammelnotizen aus Biedenkopf an der Lahn in Hessen-Nassau. Sammelbemerkungen aus diesem Orte wurden schon im Entomologist, 1892, Jan. veröffentlicht.
- James, Russel E.** Lepidopterological Notes from Cornwall. Entom. Record, vol. 13. No. 12. p. 366—369.
- Jander,** (1). *Pleretes matronula* L. Zeitschr. f. Entom. Breslau, N. F. 26. Hft. p. 24—25.

- (2). *Thais polyxena* Schiff. t. c. p. 26—27.
- Jefferys, T. B.** (1). The Season of 1900 (Bath). The Entomologist, vol. 34. Jan. p. 24—25.
- (2). Notes on *Vanessa io* and *V. cardui*. t. c. Oct. p. 290—291.
- de Joannis, J.** (1). Notes sur deux espèces de *Delias*. Bull. Soc. Entom. France, 1901. No. 11. p. 206—208.
- (2). Observation sur un Lépidoptère du Ngan-Noei (Chine). t. c. No. 13. p. 228—229.
- Badet sich, um sich zu erfrischen.
- (3). Note sur les variations du *Monema flavescens*. t. c. No. 251—253.
- (4). Notes sur la faune du Haut-Tonkin. VI. Lépidoptères de la région du Cav-Baag. Revue Scient. France et Belg. T. 35. p. 313—364.
- N. sp. v. *Plectopylis*.
- Johnson, W. F.** (1). *Vanessa C.-album* in Ireland. The Irish Naturalist, vol. 11. Jan. p. 23. — The Entomologist, vol. 34. p. 18—19.
- (2). *Vanessa Io* in Ulster. The Irish Naturalist, vol. 11. Jan. p. 23.
- (3). *Cerastis ligula* Esp. at Poyntzpass, Ireland. Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 12 (37). Febr. p. 45.
- (4). *Phibalocera quercana* attacking rhododendrons. Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 12 (37) Nov. p. 277.
- Jones, A. Hugh.** July in the Cévennes (Lepidoptera). Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 12 (37). Nov. p. 261—264.
- Jordan, C.** Zur Morphologie und Klassifikation der Tagfalter. Tagebl. V Internat. Zool.-Congr. No. 8. p. 20—21. Discussion.
- Joutel, Louis H.** (1). Note on *Sesia sigmoidea*. Journ. New York Entom. Soc. vol. 9. No. 4. p. 190.
- (2). A self-decorating Geometrid Larva. t. c. No. 4. p. 191.
- (3). Larva of *Isochaetes Beutenmülleri* on Staten Island. t. c. No. 4. p. 190.
- Junkel, Gust.** Uebersicht der bis jetzt in der Umgebung von Crimmitschau in Sachsen durch Fang und Zucht aufgefundenen Tagschmetterlinge. Entom. Jahrb. (Krancher), 11. Jhg p. 175—185.
- Junod, H. A.** 1899. La Faune entomologique de Delagoa. Introduct. et P. 1. Lépidoptères. Avec 4 pls. Bull. Soc. Neuchat. Sc. nat. T. 27. p. 176—250—251.
- Kane, W. F. de Vism.** Catalogue of the Lepidoptera of Ireland Supplementary List. (Contin.). The Entomologist, vol. 33. Dec. p. 326. — vol. 34. Jan. p. 14—16. — Supplementary List. (Conclud.). t. c. March p. 85—88.
- Bringt: *Phothedes* (1), *Agrotis* (4), *Panolis* (1), *Pachnobia* (1), *Taeniocampa* (4), *Anchocelis* (1), *Dianthoecia* (2), *Hecatera* (1),

Dasypolia (1), Hadenia (2), Asteroscopus (1), Cucullia (2), Plusia (2), Heliethis (1), Chariclea (1), Bankia (1), Hydrilla (1), Euclidia (1), Catocala (1), Bomolocha (1). — Geometrae: Venilia (1), Eurymene (1), Amphidasis (1), Boarmia (2), Dasydia (1), Hyria (1), Asthena (1), Acidalia (2), Bapta (1), Selidosema (1) p. 85—88. Bupalus (1), Sterrha (1), Abraxas (1), Hybernia (2), Cheimatobia (1), Oporabia (2), Larentia (2), Emmelesia (1), Eupithecia (15), Lobophora (3), Melanippe (1), Phibalapteryx (1), Tanagra (1). — Pyralides: Scoparia (4), Oroberna (1). — Pterophori: Platyptilia (4), Amblyptilia (1), Oxyptilus (1), Leioptilus (3), Acyptilia (4). — Crambi: Schoenobius (1). — Phycidae: Homoeosoma (1), Nephopteryx (1), Rhodophaea (1), Zelleria (1). — Addenda: Lithosia (1), Triphaena (1), Tethea (1), Euclidia (1), Eurymene (1).

— (2). A Catalogue of the Lepidoptera of Ireland. Reprinted, with an Introduction from the „Entomologist“. London, West, Newman & Co., 1901. 8°. (XVIII, VIII, 166 p. 1 color. pl.) 10 sh.

— (3). Destruction of Cherry Trees by *Semasia woerberiana*. The Irish Naturalist, vol. 10. No. 7. p. 146.

Kathariner, L. Zweijährige Puppenruhe bei *Papilio machaon*. Insekten-Börse, 18. Jhg. No. 27. p. 212.

— (2). Titel p. 596 sub No. 2 des vor. Berichts.

Schluss. 7. Einfluss auf die Zeit der Entwicklung und die Grösse der Falter (p. 7—8). Angaben von Schoch, Standfuss u. von Linden. Letztere bringt zwei ganz verschiedene Vorgänge mit einander in Beziehung, die streng auseinander zu halten sind: Entwicklung (organische Differenzierung) u. Wachstum (Massenzunahme). Erstere kann von letzterem ganz unabhängig sein. Nach K.'s Meinung ist auf Grössendifferenzen kein Gewicht zu legen. — 8. Schluss (8—9). Aus den Versuchen ergibt sich, dass die beiden Hälften des Spektrums einen gegensätzlichen, sehr deutlichen Einfluss auf die Farbe der Puppenhaut haben, u. zwar, dass der „chemisch aktive“ Theil analog dem völligen Lichtmangel sich verhält, der „chemisch inaktive“ dagegen ähnlich dem vollen Tageslicht eine Hellfärbung bedingt, ausserdem aber noch einen spezifischen Einfluss bezüglich des Farbtones der Chitinhaut äussert. — K.'s Resultate bezügl. der Pigmentirung u. Hautfärbung widersprechen Semper's Ansicht ebenso O. Hertwig's bezügl. des Einflusses der farbig. Strahlen. — Von chemisch aktiven u. inaktiven Strahlen darf in der Biologie nicht die Rede sein. — Diesbezügl. Veröffentlichung soll folgen.

Kaye, Wm. Jam. (1). A Preliminary Catalogue of the Lepidoptera Heterocera of Trinidad. With 2 pls. Trans. Entom. Soc. London, 1901. P. II. p. 115—158, 159—160.

45 neue Spp., n. g.: *Parvapenna*, Arima.

— (2). Progress in the Classification of the Sphingids during a Century and a half. Entom. Record, vol. 13. No. 2. p. 62—66.

- (3). Re-classification of the Lepidoptera. In: Trans. of the City of London Entomol. a Natural History Society for the year 1900 (Pp. 74) London Institution, E. C. 1901.
- Kennel, J.** Neue Wickler des paläarktischeu Gebietes aus den Sammlungen des Herrn O. Staudinger und A. Bang-Haas. Deutsch. Entom. Zeitschr. 1900. 2. lep. Hft. (Iris, Bd. 13. 2. Hft.) p. 205—305.
115 n. Spp.
- Kenyes, J. N.** Abundance of *Thecla pruni* and *T. w-album*. Entom. Record, vol. 13. No. 9. p. 278.
- Ketel, .** Arge Galathea L. Ein für Mecklenburg neuer Tagfalter, nebst Notizen über einige andere Schmetterlinge. Arch. Ver. Fr. Naturg. Mecklenb. 55. Jhg. II Abth. p. 167—168.
- Kidner, A. R.** *Plusia moneta* at Cambridge. The Entomologist, vol. 34. Nov. p. 317.
- King, Jam. J. F. X.** *Vanessa antiopa* in Shetland. Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 12 (37). Sept. p. 226—227.
- Kirby, W. F.** Familiar Butterflies and Moths. With 18 color. pls. London, Cassell & Co., 1901. 8°. (XIII, 114 p.).
Als Einführung in das grössere Werk „European Butterflies and Moths“ sehr brauchbar. — Kurze Besprech. The Entomologist, vol. 34. p. 260.
- Kirkland, A. H.** Berichtet über die Ausbreitung der Brown-tail Moth (wissenschaftl. Name nicht gegeben, wahrscheinlich ist es *Porthesia chrysorrhoea*) in Massachusetts. 1897 wurde sie zuerst im Staate festgestellt u. der bereits 1896 von ihr besetzte Bezirk auf 29 engl. □ Meilen geschätzt, dieser wuchs 1897 auf 158, 1898 auf 448 u. 1899 auf 928 □ Meilen. Sie hat nunmehr die Grenzen von Massachusetts überschritten u. ist in New Hampshire u. Maine eingedrungen. 1900. Proc. 12 th. Ann. Meeting Assoc. Econom. Entom. (held in New York City last June 1900). — U. S. Dept. Agriculture Division Entom. (n. s.) Bull. 26, p. 1—102, 2 pls. and 1 textfig.
- Klos, Rud.** Zur Lebensgeschichte von *Tephroclystia virgaureata* Dbld. Verhandlgn. k. k. zool.-bot. Ges. Wien, 51. Bd. 10. Hft. p. 785.
- Koča, G.** Lepidopterologiai adatok (Lepidopterologische Mittheilungen). Rovart. Lapok, 8. köt. 1 füz. p. 16. — Ausz. p. 1.
- Köhler, Erz.** Titel p. 598 des vor. Ber. Ref. von Schröder, Chr. Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 30.
- Kollmergen, F.** Versuch einer Macrolepidopteren-Fauna von Corsica. Deutsch. Entom. Zeitschr. 1900. 2. lep. Hft. (Iris, Bd. 13) 2. Hft. p. 189—204.
- Krause, Ernst.** Dimorphismus bei Schmetterlingen. Prometheus, No. 591 12. Jhg. No. 19 p. 300—301. — Nach Standfuss.

- Krulikowsky, L.** Petites notices lépidoptérologiques. I. Revue Russe d'Entom. T. 1 No. 4/5 p. 173—175. — II. *ibid.* No. 6 p. 234—238.
I.: 2 neue Varr., II.: 1 neue Var.
- Krüger, Geo.** Bilder aus dem Süden. Entom. Zeitschr. 13. Jhg. p. 178, 195—6, 203. — Lepid.-Fauna Spaniens.
- Kusnezow, Nic.** (1). On the protective coloration and attitude of *Libythea celtis* Esp. With fig. (Russisch). Horae Soc. Entom. Ross. T. 35. No. 1/2. p. 30—37. — Canad. Entom. vol. 33. No. 3. p. 92. — Aus. von N. von Adelung, Zool. Centralbl. 8. Jhg. No. 15/16. p. 529—530. — With 1 cut. Psyche, vol. 9. No. 300. p. 184.
Beschreibt die Schutzfärbung der Flügel von *Libythea celtis* aus der Krim. Ruhestellung, einem toten Blatte ähnlich, Antennen u. Palpen helfen dabei, der Schmetterling steht darin einzig da.
- (2). On two new species of *Biston* Leach (*Amphidasys* Tr.) t. c. No. 1/2. p. 42—48.
- (3). (Lepidoptera, Noctuidae) (Some experiments on *Catocala fraxini* L.) (Russisch). Avec 2 figs. Revue Russe d'Entom. T. 1. No. 6. p. 225—228, Résumé p. 229—230.
„Temperaturexperimente“ mit *Catocala fraxini* L. Ausz. von Chr. Schröder. Allg. Zeitschr. f. Entom. 7. Bd. No. 6. p. 124.
- Lagerheim, G.** Zur Frage der Schutzmittel der Pflanzen gegen Raupenfrass. Mit 5 Fig. Entom. Tidskr. 21. Årg. Hft. 3./4. p. 209—232.
- Landquart, H. Th.** Schmetterlinge und Ameisen. Beobachtungen über eine Symbiose zwischen *Lycaena argus* L. und *Formica cinerea* Mayr. Mit 1 Taf. Chur, Jos. Casanova, 1901. 8°. (40 p.). — Ausz. von Chr. Schröder. Allgem. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. No. 8. p. 123.
- Lane, E. W.** Larvae beating in Epping Forest in 1901. The Entomologist, vol. 34. March, p. 103.
- Lang, Henry, C.** (1). Butterfly collecting in Austro-Hungary in 1900. The Entomologist, vol. 34. Oct. p. 263—267.
- (2). Notes on Butterflies from the Maritime Alps. The Entomologist, vol. 34. Oct. p. 298—299.
- (3). *Cyaniris argiolus* (siehe *Lycaena*) abundant at Southend. The Entomologist, vol. 34. Oct. p. 292.
- Lathy, Percy, J.** (1). An Account of a Collection of *Rhopalocera* made at Zomba in British Central Africa. With 1 pl. Trans. Entom. Soc. London, 1901, P. I. p. 19—35, 36.
176 Spp., dar. 4 neue.
Liste von 176 Arten, von denen einige (5) neu und verschiedene aus der Gegend von Zomba noch nicht bekannt. Die Liste bringt: *Danais* (2), *Amauris* (3), *Melanites* (2), *Gnophodes* (2), *Monotrichts* (6), *Henotesia* (2), *Physcaenura* (1), *Neocoenyra* (1), *Pardopsis* (1), *Acraea* (17), *Atella* (1), *Hypanartia* (1), *Pyrameis* (1),

Precis (18), Catacroptera (1), Salamis (1), Hypolimnas (3), Eurytela (2), Byblia (1), Crenis (3), Cyrestis (1 n.), Neptis (3), Pseudacraea (2), Hamanumida (1), Euphaedra (1), Euptera (1), Charaxes (20), Abisara (1 n.), Alaena (1), Pentila (2), Mimacraea (1), Teriomima (2), Lachnocnema (1), Deudorix (2), Hypolycaena (2), Jolaus (1), Spindasis (1), Axiocerses (1), Leptomyrina (1), Lycaenesthes (1), Cupido (10), Leptosia (1), Herpaenia (1), Mylothris (3), Appias (1), Pieris (3), Teracolus (5), Eronia (2), Catopsilia (1), Terias (4), Colias (1), Papilio (9), Sarangesa (3), Tagiades (1), Eagris (1 + 1 n.), Abantis (2 + 1 n.), Hesperia (1), Oxypalpus (1), Parosmodes (1), Cyclopides (2), Kedestes (1), Chapra (1), Baoris (1 n.), Andronymus (1), Perichares (1), Artitropa (1), Rhopalocampta (1). — Abgebildet (farbig) sind auf Taf. III: Cyrestis sublineata n. sp., Charaxes penricei Rothsch. u. Ch. leoninus Butl. ♀, Abisara delicata n. sp., Jolaus lalos Druce ♀, Eagris ochreana n. sp., Abantis arctomarginata n. sp. u. Baoris cana n. sp.

— (2). The Genus of „*Dircenna Barrettii*“ Dannatt. The Entomologist, vol. 34. Jan. p. 10—11.

Lawrance (Laurance), Alfr. J. (1). *Pterostoma palpina* double-brooded. The Entomologist, vol. 34. Oct. p. 228.

— (3). *Drymonia chaonia* at Bromley. Entom. Record, vol. 13. No. 7. p. 288.

— (4). *Chariclea umbra* (marginata) at Sugar. The Entomologist, vol. 34. Aug. p. 229.

— (4). Lepidoptera at Farnborough, Kent, and Neighbourhood. The Entomologist, vol. 34. Dec. p. 354—355.

Leech, John, Henry. (geboren 5. Dez. 1862; gestorben 29. Dez. 1900, im Alter von 38 Jahren). Abb. auf Taf. in: The Entomologist, vol. 34. No. 453. Nekrolog p. 33—38. Zusammenstellung seiner Publikationen von 1879—1900 (32 Titel + 1 Nachtrag v. p. 130).

— (2). Lepidoptera Heterocera from China, Japan and Corea. With descriptions of New Species by Richard South. Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 385—514. Mit 2 Taf. XIV u. XV.

Behandelt die Pyralidae (No. 1572—2006). 434 Spp., dar. 73 neue u. 38 von Leech bereits anderen Orts beschr.

The Leech Collection presented to the Nation. The Entomologist, vol. 34. June, p. 175.

Leigh, G. F. *Acherontia atropos* in South Africa. The Entomologist, vol. 34. Dec. p. 348.

Lelièvre, Ern. *Zygaena hippocrepidis*. Feuille jeun. Natural. (4). An. 31. No. 363. p. 97.

Lenthe siehe die Schmetterlinge des Seebergs.

Lepidoptera (occurrence of various species). The Entomologist, vol. 34. Febr. p. 56, 58. — (occurrence and capture of different species). The Entomologist, vol. 33. Dec. p. 351—355. — vol. 34. Jan. p. 21—24.

Linde, A. *Lygris pyropata*. Societ. Entom. 16. Jhg. No. 15. p. 115—116.

von Linden, M. Gräfin. Die Flügelzeichnung der Insekten. Mit besonderer Berücksichtigung der Zeichnung der Lepidopteren. Ihre Entwicklung, ihre Ursachen und ihre Bedeutung für den verwandtschaftlichen Zusammenhang der Arten. Mit 16 Abbildgn. Biol. Centralbl. 21. Bd. No. 20. p. 625—633. (1. Fortsetz.) Mit 16 (Doppel-)Fig. — No. 21. p. 657—682. Mit 22 (24) Fig. — No. 23. p. 753—779.

- (2). Morphologische und physiologische Ursachen der Flügelzeichnung und Färbung der Insekten, mit besonderer Berücksichtigung der Schmetterlinge. Tagebl. V. Internat. Zool. Congr. No. 8 p. 21—22 (Discussion). — Ausz.: Insekten-Börse, 18. Jhg. No. 34 p. 268—269.

Die Gesetzmässigkeit mit der sich die Zeichnung der Thiere entwickelt u. umbildet, macht es von vornherein unwahrscheinlich, dass die Farbenvertheilung im Kleide der Thiere zufällig oder durch natürliche Auswahl gezüchtet sei. Es ist vielmehr anzunehmen, dass der Thierzeichnung eine tiefe morphologische u. physiologische Bedeutung zukommt. Als Bildungsstätte der Farben ist der Darm der Raupe zu betrachten, als Bildungstoff die aufgenommenen Pflanzenfarbstoffe. Die im Raupendarm vorhandene zuerst grasgrüne, später gelbgrüne Chlorophylllösung verwandelt sich vor der Verpuppung in rothe Flüssigkeit, die wie vorher das Chlorophyll von den Darmzellen resorbirt wird, vom Blute aufgenommen und theils durch den Blutstrom, theils durch amöboide Zellen in die Epidermiszellen gelangt. Die rothen Farbstoffe der Vanessen sind somit Modifikationen eines gelben Farbstoffes, der dem grünen verwandt ist, der ja auch in den Früchten der Pflanzen mannigfache Veränderungen erleidet. Der rothe Farbstoff findet sich hauptsächlich an den Stellen intensiver Athmung, woraus sich schliessen lässt, dass er eine grosse Rolle für den Stoffwechsel hat. Hierüber können wir aber erst ins Klare kommen, wenn wir seine chemische Beschaffenheit kennen.

Die Arbeit ist ein mit grösserer Ausführlichkeit durchgearbeitetes Thema, das schon 1890 der Pariser Akad. der Wissenschaft. vorgelegen hatte. Ref. Compt. rend. Acad. Sci. Paris 1900, II p. 1070. Die Verf. stellt nicht allein Untersuchungen an über die interessanten Beziehungen der Phylogenie u. Embryogenie bei den Schmetterlingen, sondern sie untersucht auch den Werth der heute üblichen Forschungsmethoden, wie sie durch Darwin u. seine Schüler in die Wissenschaft eingeführt sind. Sie sucht die Einflüsse festzustellen u. zu prüfen unter denen die Farben u. ihre Anordnung entstanden sind. Die Charaktere eines Thieres sind theilweise entstanden durch die indirekte Thätigkeit des Willens, andererseits sind sie das Produkt der Einflüsse der äusseren Umgebung, der automatischen Reflexfunktion des Organismus. Hieraus

lässt sich die Entstehung der Farben auf den Flügeln der Insekten leicht erklären. v. Linden findet 1. die Flügel der Urinsekten wiesen netzförmige unter sich ähnliche Adern auf. — 2. Einige dieser Adern wurden später grösser u. kräftiger als die andern u. die Zahl der kleinen Adern ging zurück, so dass der Flgl. auf seiner Fläche in Felder getheilt erschien. — 3. Die verschwundenen Adern werden oft durch Falten auf den Flgln. dargestellt. — 4. Die Adern bilden den Weg, durch welche das Blut in die Flgl. eintritt, sie enthalten auch fast immer einen Tracheenast, sind also Circulations- u. Athmungsorgane. — 5. Der Farbstoff der Thiere erscheint im Allgemeinen auf den Strecken, welche die Blutgefässe einnehmen, darnach muss bei den Flgln. der Schmetterlinge die Färbung auf den Adern auftreten. — 6. Der Farbstoff zeigt sich längs der Queradern, er tritt also in gebrochenen Querlinien oder Zickzackform auf. — 7. Indem sich der Farbstoff auf den Adern seitlich ausbreitet, entstehen nach u. nach Bänder, die untereinander zusammenfliessen können, an anderen Stellen verschwinden u. endlich isolirte Flecke bilden können, welche mit den Adern nicht mehr in direkten Zusammenhang stehen. — Daraus ergibt sich, dass ein chemisches Phänomen in Verbindung mit der Athmung die Entstehung des Pigments auf dem Insektenflügel bewirkt hat; Auslese u. Zuchtwahl kommen also nicht in Betracht. Einfarbigkeit der Zeichnung, Bänder, Flecken, Buntscheckigkeit (letztl. eine verschied. Hemmungsbildung in der Entwickl. der Schuppen). — Im Uebrigen vergl. das Ref. v. S. Sch. in der Insektenbörse, 18. Jhg. p. 242—243.

- Littlewood, Frank** (1). Rearing of Lepidoptera. Third Annual Report of the Kendal Entomological Society. Session. 1900. Kendal: 1901. (10 pp.).
 — (2). Intermediate forms of *Amphidasis betularia*. With 2 illustr. The Entomologist, vol. 34. Aug. p. 213—215.
- Lochhead, W.** The Silkworm Industry in Ontario. 31. Ann. Rep. Entom. Soc. Ontario 1900 p. 57—59.
- Lowe, Frank, E.** (1). *Tortrix pronubana* in Guernsey. Entom. Record, vol. 12. No. 12. p. 316—317.
 — (2). *Acherontia atropis* in Guernsey. Entom. Record, vol. 13. No. 12. p. 375.
 — (3). Observations of *Lasiocampa quercus* etc. in 1901. Entom. Record, vol. 13. No. 12. p. 375—376.
- Lorenz, Emil.** Verwehte Lepidopteren. Societ. Entom. 16. Jhg. No. 1. p. 5—6.
- Lucas, W. J.** (1). *Euchloë cardamines* at rest. The Entomologist, vol. 34. July, p. 204.
 — (2). *Lycaena corydon* protected by resemblance. t. c. Aug. p. 228.
 — (3). Aberration of *Gonopteryx rhamni*. With 1 fig. t. c. Oct. p. 261.

- (4). Second Brood of *Epinephele janira* and *E. Tithonus*. t. c. Oct. p. 287.
- von Lutzau, M.** Neue baltische Schmetterlinge. Korr.-Bl. Naturf. Ver. Riga, XLIV p. 65. — 7 Arten.
- Lyman, Henry, H.** (1). Life-History of *Xylina Bethunei* G. & R. Canad. Entom. vol. 33. No. 1. p. 1—3.
- (2). Notes on Walker's Types of *Spilosoma congrua* and a few other Types in the British Museum. Canad. Entom. vol. 33. No. 4. p. 93—98.
- (3). A new *Gortyna*, and Notes on the Genus. Canad. Entom. vol. 33. No. 12. p. 317—320. — *G. aerata* n. sp.
- M. A.** Sollte die *Catocala sponsa*-Raupe nur von der Eiche Nahrung nehmen, oder lebt sie auch auf anderen Bäumen u. welchen? Entom. Zeitschr. (Internat. Ver.) 14. Jhg. No. 4. p. 29—30.
- Malloch, J. R.** A List of Tortricidae and Tineina of the Parish of Bonhill, Dumbartonshire. Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 12 (37). Febr. p. 33—36. Aug. p. 185—188.
- Mansion, A.** Moeurs des *Liparis*. Revue Scientif (4.) T. 15. No. 2. p. 49—51.
- Marloff, Fred.** (*Scoliopteryx libatrix* in a mine). Entom. News, vol. 12. March, p. 91.
- Marshall, A.** Notes from Cranbrook, Kent. The Entomologist, vol. 34. Febr. p. 58.
- Marshall, Guy, A. K.** On the female Pouch in *Acraea*. t. c. March, p. 73—75.
- (2). Some experiments in seasonal dimorphism. Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 398—403.

An bekannten europäischen Schmetterlingen sind schon ganze Reihen von Experimenten bezüglich des Einflusses der Temperatur u. Feuchtigkeit angestellt, an aussereuropäischen tropischen Formen, etwa von dort, wo die Gegensätze zwischen Trockenheit und Feuchtigkeit sehr gross, fast noch garnicht. Nur Doherty hat an *Melanitis leda* einen diesbezügl. Versuch angestellt. M. veröffentlicht nun seine diesbezügl. Resultate, die am besten in Form seiner Tabelle (p. 400—401) wiedergegeben werden: Serie I. Aufzucht unter normalen Bedingungen, in feuchte Luft erst nach der Verpuppung gebracht. — Serie II. Die Periode des Aufenthalts in feuchter Luft wird ausgedehnt, die Raupen 5—36 Tg. vor der Verpuppung in Zinnschachteln (mit feuchter Erde u. Luft) gehalten. Trotz der öfteren Lüftung that hier Schimmel viel Schaden, der jedoch den gesunden Raupen nicht viel schadete. — Bemerk. zu den einzeln. Resultaten, siehe Original.

Die Herausnahme erfolgte, sobald die Färbung unter der Puppenhaut deutlich sichtbar war.

Nachstehende Tabelle ist vom Ref. (durch Kürzung) stark zusammengezogen, im übrigen aber vollständig.

Serie I.

Species	A	B	C	D	E
<i>Terias senegalensis</i>	IV. 9.	IV. 9.	IV. 17.	IV. 21.	♂ dr.
"	IV. 14.	IV. 13.	IV. 23.	IV. 27.	♂ dr.
"	IV. 15.	IV. 17.	—	—	Ichn.
"	IV. 22.	IV. 23.	V. 4.	V. 8.	♀ dr.
"	IV. 24.	IV. 26.	—	—	† d. Sch.
"	IV. 26.	IV. 27.	V. 8.	V. 12.	♀ dr.
"	V. 4.	V. 3.	V. 17.	V. 24.	♀ dr.
"	V. 4.	V. 3.	V. 16.	V. 20.	♀ dr.
"	IV. 9.	IV. 10.	—	—	†
Desjardinsi	IV. 21.	IV. 22.	—	—	† d. Am.
"	IV. 21.	IV. 23.	V. 4.	V. 10.	♂ dr.
"	IV. 21.	IV. 22.	V. 4.	V. 10.	♂ dr.
"	IV. 21.	IV. 23.	—	—	† d. Sch.
brigitta	IV. 11.	IV. 12.	—	—	Ichn.
"	IV. 22.	IV. 23.	—	—	† d. Sch.
"	IV. 24.	IV. 26.	V. 8.	V. 15.	♀ dr.
Precis archesia	IV. 16.	IV. 17.	V. 6.	V. 8.	♂ dr.
"	IV. 21.	IV. 21.	nicht	V. 11.	dr., def.
"	IV. 28.	IV. 30.	V. 17.	V. 21.	♂ dr.
"	V. 5.	IV. 6.	V. 28.	V. 30.	♂ dr. ¹⁾
Byblia achelöia	IV. 22.	IV. 23.	V. 12.	V. 12.	♀ dr.
"	V. 1.	V. 1.	V. 22.	V. 23.	♂ dr.
"	V. 5.	V. 6.	—	—	†
"	V. 7.	V. 7.	V. 29.	V. 30.	♂ fast w.-s.
ilithyia	V. 11.	V. 12.	VI. 4.	VI. 7.	♂ dr., def.

1) Var. *Staudingeri* Dew. — 2) Fast volle dry-season-Form, aber keine Spur von subapikalen Flecken auf d. Unters. d. Vflg.

3) Kleines ♂ mit Unters. d. wet-seas.-Form, aber „black borders above about intermediate in width“.

Serie II.

Species	A	B	C	D	E
<i>Byblia ilithyia</i>	IV. 28.	V. 13.	—	—	†
"	IV. 28.	V. 14.	—	—	†
"	IV. 28.	V. 31.	—	—	†
<i>Teracolus omphale</i>	V. 5.	V. 16.	VI. 7.	—	†
"	V. 5.	V. 30.	VI. 7.	—	†
"	V. 5.	V. 15.	—	nicht	♀ dr.
Terias senegalensis	IV. 25.	IV. 4.	V. 20.	V. 24.	♂ dr.
"	IV. 25.	IV. 5.	V. 20.	V. 26.	♂ dr.
"	IV. 25.	IV. 10.	V. 27.	VI. 1.	♂ dr. def.
"	IV. 25.	IV. 12.	V. 29.	VI. 2.	♀ dr. def.
"	IV. 25.	IV. 12.	V. 29.	nicht	♂ dr.
"	IV. 25.	IV. 12.	—	—	†
"	IV. 25.	IV. 12.	nicht	VI. 3.	♀ dr.
"	IV. 25.	IV. 14.	VI. 3.	VI. 11.	♀ dr.
"	IV. 25.	IV. 20.	VI. 15.	nicht	dr.
"	IV. 25.	IV. 25.	VI. 15.	—	dr.
"	IV. 25.	IV. 27.	VI. 15.	—	dr.
"	IV. 25.	VI. 1.	VI. 15.	—	dr.
Desjardinsi	IV. 24.	IV. 29.	VI. 16.	V. 17.	♀ dr.
"	IV. 24.	V. 1.	—	—	† d. Sch.
"	IV. 24.	V. 7.	V. 22.	V. 28.	♀ def. ²⁾
"	IV. 24.	V. 9.	V. 21.	V. 28.	♂ ³⁾

Kürzungen: A = Datum des Einbringens in die feuchte Kammer. —
B = Verpuppung. — C = Herausnahme. — D = Ausschlüpfen. — E = Resultat. —
dr. = dry-season-Form (Form der Trockenzeit). — w.-s. = Wet Season-Form (Form
der Regenzeit). — def. = deformiert. — † = tot. — † d. Sch. = Tot durch
Schimmel. — † d. Am. = von Ameisen zerstört. — Ichn. = Ichneumonisiert.

- Mason, Phil. B.** Buff-coloured *Amphydasis betularia*. The Entomologist, vol. 34. Aug. p. 228.
- Mathew, Gervase, F.** (1). *Anticlea sinuata* in Devon. Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 12 (37) p. 45—46.
 — (2). *Taeniocampa gracilis* laying its eggs in a piece of Sponge. The Entomologist, vol. 34. March, p. 97—98.
 — (3). Vanessids in 1900. t. c. March, p. 100.
 — (4). *Acherontia atropos* and *Sphinx convolvuli* in the Harwich District. t. c. Oct., p. 281—283.
 — (5). *Eugonia autumnaria* at Dovercourt. t. c. Nov. p. 317.
- Maurer, Petrus.** (Eine verdunkelte Aberration von *Melitaea athalia* Rott.). Mit 1 Fig. auf Taf. 11. Jahresber. Wien. Entom. Ver. 1900. p. 4.
 — (2). (Ueber die Zucht von *Nonagria arundinis* F.) t. c. p. 3—4.
- May, Alb.** *Acherontia atropos* Larvae: a Variety. The Entomologist, vol. 34. Nov. p. 317—318.
- Mayer, A. G.** (Vorhandensein und Dauer geistiger Vorgänge bei Raupen). Ausz.: Insekten-Börse, 19. Jhg. No. 9. p. 69. — Aus Washington Acad. Sc.
- Mc Corquodale, W. J. Hume.** Hornfeeding Larvae. Nature, vol. 64. No. 1662. p. 446.
- Mc Lachlan, R.** Abundance of *Lycaena argiolus* near London. Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 12 (37) p. 227.
- Meade-Waldo, G.** Collecting Lepidoptera in Tangier. The Entomologist, vol. 34. July, p. 206—207.
- Mégnin, Pierre.** A propos du procès-verbal de la séance du 2 février dernier. Observation de stomatite érucique chez les Animaux. Compt. rend. Soc. Biol. Paris, T. 53. No. 6. p. 138—139.
 cf. *Liparis chrysoorrhoe*. Artault.
- Meldolt, R.** The courtship of *Anthocharis cardamines*. The Entomologist, vol. 34. Apr. p. 128.
- Mera, A. W.** Hybrid *Oporabias*. Entom. Record, vol. 13. No. 12. p. 360.
- Merrick, F. A.** A new Devise. Useful for taking Moths from Tree Trunks, Fences etc., or from the Ground without using the Net. With 1 fig. Entom. News, vol. 12. June, p. 169—170.
- Merrick, H. D.** A new *Callimorpha*. Entom. News, vol. 12, Febr. p. 45. — *C. Lecontei Dyarii* n. var.
- Merrifield, F.** (1). Irregularity in Emergence of Drepanidae. The Entomologist, vol. 34. March, p. 98.
 — (2). *Selenia illustraria* (tetralunaria) and its broods. The Entomologist, vol. 34. Dec. p. 341—342.
- Metzenauer, Ed.** (*Aglia tau* in der Rheinpfalz). Insekten-Börse, 18. Jhg. No. 21. p. 160.

- Metzger, Ant.** 1900. Beitrag zur Lepidopteren-Fauna von Weyer in Oberösterreich (I. Nachtrag.) 10. Jahresber. Wien. Entom. Ver. 1899. p. 65—67.
- Meves, J.** Nonnen-Calamität in Schweden. Zeitschr. f. Forst- u. Jagdwesen, 33. Jhg. No. 9. Sept. p. 330—337.
- Meyrick, E.** (1). A new Genus and Species of Australian Hesperidae. Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 12 (37) July, p. 168. — *Mesodina* n. g., *aeluropis* n. sp.
- (2). Macrolepidoptera (Sandwich Islands). Titel p. 559 des Berichts f. 1899.
- Behandelt im Ganzen 292 Arten, dar. 200 neue, die sich vertheilen auf 49 Gatt., dar. die neuen: *Nesamiptis*, *Progonostola*, *Sisyrophyta*, *Tritoclais*, *Promylaea* u. *Protaulacistis*.
- (3). Descriptions of New Lepidoptera from New Zealand. Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 565—592.
- Behandelt *Caradrinidae*: *Orthosia* (1), *Leucania* (1 n.). — *Plusiadae*: *Hypenodes* (1 n.). — *Phycitidae*: *Homoeosoma* (1 n.). *Crambidae*: *Orocrambus* (1 n.), *Crambus* (2 n.). — *Pyraustidae*: *Scoparia* (5 n.). — *Epiblemidae*: *Strepsicrates* (1 n.). — *Tortricidae*: *Pyrgotis* (1 n.), *Proselena* (1 n.), *Harmologa* (2 n.), *Cacoecia* (2 n.). — *Gelechiidae*: *Gelechia* (1 n.). — *Oecophoridae*: *Gymnobathra* (1 n.), *Borkhausenia* (1 n. + 1). — *Elachistidae*: *Stathmopoda* (2 n.). — *Plutellidae*: *Yponomeuta* (1 n.), *Plutella* (1 n.). — *Tineidae*: *Amphixystis* n. g. (1 n.), *Dryadula* (1 n.), *Ereunetis* (1 n.). — **Supplement**: *Epiblemidae*: *Epiblema* (1 n.). — *Tortricidae*: *Adoxophyes* (1 n.), *Cacoecia* (2). — *Elachistidae*: *Batrachedra* (2 n.).
- Middleton, B. L.** Lepidoptera in Co. Westmeath. The Entomologist, vol. 34. March, p. 102. — Abstr.: The Irish Naturalist, vol. 10. No. 4. p. 90.
- Miller, J.** *Phlogophora meticulosa* in winter. The Entomologist, vol. 34. April. p. 131. — Carr, F. M. B. *ibid*.
- Mitford, R. S.** (1). *Melitaea athalia* in Devon. The Entomologist, vol. 34. April, p. 127—128.
- (2). *Lycaena argiolus* in London. The Entomologist, vol. 34. May, p. 160. — Mc Arthur, H. the same *ibid*.
- von Mitis, Heinr. Ritter.** (1). *Vanessa xanthomelas* Esp. aberr. chelys. With 1 Fig. auf Taf. 10. Jahresber. Wien. Entom. Ver. 1899. p. 77—81.
- (2). Ueber einige *Rhopaloceren*-Aberrationen. Mit 7 Fig. auf Taf. op. cit. 11. Jahresber. 1900. p. 113—115.
- Moberly, J. C.** Habits of *Brephos notha*. Entom. Record, vol. 13. No. 7. p. 220.
- (2). Siehe *Atmore*.
- Mocsary, Alex.** A *Deilephila nerii*-röl. I. A *Deilephila nerii* L. életéhez. Rovart. Lapok, 8 köt. 6. füz. p. 109—110. (Zur Biologie von D. n.).

- Moffat, J. Alston** (1). A Surprise. *Canad. Entom.* vol. 33. No. 10. p. 288. — *Telea polyphemus* double-brooded.
- (2). *Anosia archippus*, yet again. With 1 pl. 31. *Ann. Rep. Entom. Soc. Ontario*, 1900. p. 44—51.
- Montandon, A. L.** Contributions à la faune entomologique de la Roumanie. *Lepidoptera.* *Bull. Soc. Sc. Bucarest.* An. 11. No. 5. p. 563—568.
- Montgomery.** (Notes on *Colias edusa* and its var. *helice*). *Proc. South London Entom. Nat. Hist. Soc.* 1900. p. 107—108.
- Morse, A. P.** 1896. Both Sides of Butterflies. *Journ. New York Entom. Soc.* vol. 4. No. 1. p. 20—22.
- Morton, K. J.** (1). *Acalla ferrugana* Fr. in Spring. *Ann. Scott. Nat. Hist.* 1901. Apr. p. 119.
- (2). *Selenia bilunaria* Esp. is double-brooded in Scotland. *Ann. Scott. Nat. Hist.* 1901. Apr. p. 119—120.
- (3). Trichoptera, Neuroptera-Planipennia, Odonata, and Rhopalocera collected in Norway in the summer of 1900. *Entom. Monthly Mag.* (2). vol. 12 (37) Jan. p. 24—25. — (conclud.) Febr. p. 29—33.
- Mory, Eric.** Ueber einige neue Schweizerische Bastarde d. Spingiden-Genus *Deilephila* und die Entdeckung abgeleiteter Hybriden in der Natur, sowie Beschreibung einer neuen Varietät von *Deilephila vespertilio* Esp. *Mittheil. Schweiz. Entom. Ges.* 10. Bd. 8. Hft. p. 333—359—360. — Auszug in: *Insekten-Börse*, 18. Jhg. No. 27. p. 209—210. — *Ausz. von Chr. Schröder. Allgem. Zeitschr. f. Entom.* 6. Bd. No. 16./17. p. 270.
- Moss, A. M.** Notes on *Colias edusa* and *Acherontia atropos*. Third Annual Report of the Kendal Entomological Society. Session. 1900. Kendal: 1901 (7 pp.). — Diesbezügl. Angaben seit 1877.
- Musham, John, F.** (1). *Cosmotriche potatoria* at Sugar? *Entom. Record*, vol. 13. No. 5. p. 165.
- (2). *Nonagria neurica* at Lincoln. *Entom. Record*, vol. 13. No. 11. p. 332.
- Müller, J.** 1892. Neue Beobachtungen über die Schielspinne (*Pholcus phalangoides*). Der Tonapparat des Forst- oder Sägebocks (*Prionus coriarius*). Eine musikalische Raupe (*Sphinx elpenor*). *Insektenbesuch bei Salbeiblüthen.* *Progr. Deutsch. Obergymn. Kremsier*, 1892. 8°. (p. 3—18).
- Nash, C. W.** Notes on *Danaus archippus*. 31. *Ann. Rep. Entom. Soc. Ontario*, 1900. p. 86.
- Naufock, Alb.** 1900. Ein weiterer Beitrag zur Zucht von *Lignyoptera fumidaria* Hb. 10. *Jahresber. Wien. Entom. Verein.* 1899. p. 73—75.
- Nazari, A.** Titel p. 561 des Berichts f. 1899. — *Ref. Allg. Zeitschr. f. Entom.* 6. Bd. p. 25—26. — Darstellung des Darmtrakts u. Veränderungen desselb. während des Larvenzustandes

u. Betrachtungen physiologischer Natur. Direkte Entnahme von Laubelementen aus den drei getrennten Darmabschnitten u. ihre quantitative chemische Bestimmung. Untersuchungen über das Lösungsvermögen der Darmschleimwand mittelst der Methode der künstlichen Verdauung in Bezug auf Albumine, Annide u. in Olivenöl. — Versuche, der Raupe mit der Nahrung Bakterienkulturen einzuführen, zeigten vollkommene Sterilität des gesunden Thieres dagegen.

- Nenükow** hat nach *Physiol. Russe*, I p. 244—250 (1899) Eier u. Raupen von *Pieris rapae* unter farbiger Beleuchtung grossgezogen. Das Licht wurde zu diesem Zwecke durch farbige Lösungen geschickt. Die Entwicklung ging — sowohl ins Gesammt, als auch in ihren Einzelheiten — am schnellsten vor sich im gewöhnlichen weissen Licht; die Wirksamkeit der übrigen Strahlen ist der Reihenfolge nach roth, violett, grün. Beim Grün war die Entwicklung merklich verzögert, auch war die Sterblichkeit eine grosse. Weder bei *Pieris rapae*, noch bei *Vanessa urticae* wurde eine Veränderung der Färbung wargenommen. — *Abstr. Journ. Roy. Micr. Soc. London*, 1900 p. 456. *The Entomologist*, vol. 34. p. 139.
- Newburger, W.** Ein neuer Apparat zur Einschränkung der Raupenplage. *Insekten-Börse*, 18. Jhg. No. 27. p. 213.
- Neustetter, Heinr.** (1). Beitrag zur Macrolepidopteren-Fauna von Kärnthen. 10. Jahresber. *Wien. Entom. Ver.* 1899. p. 29—59.
- (2). Ein lepidopterologischer Ausflug in die Euganaeen und nach Battaglia in Ober-Italien. *op. cit.* 11. Jahresber. 1900. p. 87—102.
- Newcomb, H. H.** (1) A Treap to Montreal. *Entom. News*, vol. 12. No. 7. p. 198—200.
Lepidopterologische Sammelnotizen.
- (2). A new *Chionobas* from Maine. *Entom. News*, vol. 12. Sept. p. 206. — *Chionobas katahdin* n. sp.
- (3). *Chionobas katahdin* and an account of its discovery. t. c. Oct. p. 225—231.
- Newnham, F. B.** *Argynnis adippe*-♂ paired with *A. paphia*-♀. *Entom. Record*, vol. 13. No. 10. p. 298.
- Newland, C. Bingham.** Lepidoptera in the Frensham District. *Entom. Record*, vol. 13. No. 3. p. 107—109.
- Newman, L. W.** (1). Hybrid *Smerinthus ocellatus* ♂ × *S. populi* ♀. *Entom. Record*, vol. 13. No. 12. p. 362.
- (2). *Plusia moneta* at Bexley and Neighbourhood. *Entom. Record*, vol. 13. No. 12. p. 376.
- (3). *Mellinia ocellaris* in North Kent. *Entom. Record*, vol. 13. No. 12. p. 376.

- de Nicéville Lionel** (1). 1899. On a new Genus of Butterflies from Western China allied to *Vanessa*. Journ. Asiat. Soc. Bengal, vol. 68. P. II. No. 3. p. 234.
- (2). 1900. Note on *Calinaga*, an aberrant Genus of Asiatic Butterflies. op. cit. vol. 69. P. II. No. 2. p. 150—155.
- (3). 1900. The Food-plants of the Butterflies of the Kanara District of the Bombay Presidency, with a Revision of the Species of Butterflies there occurring. op. cit. vol. 69. P. II. No. 2. p. 187—278.
- (4). Note on the Butterflies comprised in the Subgenus *Tronga* of the Genus *Euploea*. op. cit. vol. 70. P. II. No. 1. p. 12—38.
- (5). Cannibalism among Caterpillars. Canad. Entom. vol. 33. No. 5. p. 131—132. — Ausz. aus: Journ. Asiat. Bengal. vol. 69. 1900.
- de Nicéville, Lionel and N. Manders.** 1900. A List of the Butterflies of Ceylon, with Notes on the Various Species. Journ. Asiat. Soc. Bengal, vol. 68. P. II. No. 3. p. 170—233.
- Nicholl, Mary De la Beche.** (1). Butterflies of the Lebanon. With a Preface and Notes by Henry John Elwes. Trans. Entom. Soc. London, 1901. P. I. p. 75—97. — 106 Spp.
- (2). Butterflies in the Lebanon. (With map). Entom. Record, vol. 13. No. 6. p. 169—173. (concl.) t. c. No. 7. p. 205—209.
- Noël, Paul.** Ein neuer Feind der Erdbeerpflanzen. — Ausz. von S. Sch. Insekten-Börse, 18. Jhg. No. 50. p. 396—397. — *Hepialus lupulinus* L. Nach Le Naturaliste.
- Nöldner, E.** Zwei neue *Heliconius*. • Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. 1. Hft. p. 5—8. — *H. elatus* n. sp. u. *demeter* Staud. var. *Bouqueti*.
- Oberthür, Ch.** (1). Observations sur le dimorphisme et le mimétisme de *Paronia pulchra*. Bull. Soc. Entom. France, 1901, No. 3. p. 42—44.
- (2). Note sur les *Hadena alpigena* et *Meissonieri*. t. c. p. 139—142.
- (3). Note sur la *Phragmatobia fulginosa* L. var. nouv.: *flavida* Ch. Oberth. t. c. No. 15. p. 273—274.
- (4). (Titel p. 611 sub No. 6 des vorig. Berichts). Ausz. von Chr. Schröder. Allgem. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. No. 16/17. p. 269. — In dieser Arbeit werden vom Verf. behandelt die im Laufe der Zeit verschwundenen, resp. seltener gewordenen Lepidopteren Englands. — Was Frankreich betrifft, so scheint der früher bei Rennes gemeine *Limenitis camilla* verschwunden zu sein. *Pap. podalirius* wird in der Bretagne seltener. Beschr. von 28 Varr. (meist englische) der Gatt. *Argynnis*, *Vanessa*, *Lycaena* u. eines *Colias edusa*-Hermaphroditen.

- L'odorat chez les Insectes (*Callosamia promethea*). Extr. Revue Scient. (4.) T. 16. No. 17. p. 538—539.
- Insectes transportés de Cambridge, Mass. à Loggerhead, Key, Florida.
- Oldaker, F. A.** (1). Entomological Notes for May, 1901. The Entomologist, vol. 34. July, p. 205—206.
- (2). Entomological Notes for June, 1901. t. c. vol. 34. Aug. p. 228—229.
- Sammelnotizen über Lepidopt. in Dorking.
- (3). Notes on Lepidoptera during July and August 1901. t. c. Sept. p. 258—259.
- (4). Notes on Lepidoptera for September 1901. t. c. Dec. p. 354.
- Ormerod, Eleanor A.** Obituary. The Entomologist, vol. 34 p. 235—236. Thätigkeit u. Werke. Gestorb. am 19. VII. 1901 im Alter von 73 Jahren.
- Ottolengui, R.** On the Protection of *Chionobas semidea*. Entom. News, vol. 12. No. 9. p. 283.
- Oudemans, J. Th.** (1). (Over twee *Drepana*-Soorten). Entom. Tijdskr. Nederl. Entom. Vereen. 44. Deel. 1. Afl. Versl. p. 8—15.
- (2). 1901. Étude sur la position de repos chez les Lépidoptères. Rapport door Hubrecht en Hoek. K. Akad. v. Wetensch. Amsterd. Versl. Wis. en Natuurk. Afd. 10. D. 28. Dec. p. 349—350.
- Pabst, M.** Die Nymphaliden-Gattungen *Vanessa*, *Melitaea* und *Argynnis*, die *Satyriden* und *Hesperiden* der Umgegend von Chemnitz und ihre Entwicklungsgeschichte. Entom. Jahrb. (Krancher) 11. Jhg. p. 137—165.
- Packard, A.** (1). A new Genus of Sphingicampid Moths allied to *Bunaea*. Journ. N. York Entom. Soc. vol. 9. No. 4. p. 191—192. — *Lobobunaea*.
- (2). On the Larval Forms of several exotic *Ceratocampid* Moths. Psyche, vol. 9. No. 308. p. 279—282.
- Pagenstecher, Arnold.** (1). Beiträge zur Lepidopterenfauna des Malayischen Archipels. XIV. Ueber die Gattung *Nyctemera* Hübner und ihre Verwandten. Jahrb. Nassau. Ver. f. Naturk. 54. Jhg. p. (89) 91—175. — Apart: Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1901. 8°. M. 3,60.
- Geschichte unserer Kenntnisse über diese Falter in der entom. Literatur (p. 91—104). Charakt. (p. 105—106). Besprech. der 84 Arten (p. 106—170). Uebersicht der aufgeführten Arten (p. 171—174). Tafel-Erklär. p. 175.
- (2). Titel p. 612 des vor. Berichts. Ref.: Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 301—302.
- (3). Ueber die geographische Verbreitung der Tagfalter im malayischen Achipel. (Titel p. 612 sub No. 2 des vorig.

- Berichts). Ausz. von Chr. Schröder, Allgem. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. No. 19, p. 301—302.
- (4). Die Lepidopterenfauna des Bismarckarchipels („Zoologica“, 27 u. 29). Deutsch. Entom. Zeitschr. 1900. 2. Iep. Hft. (p. 265—268 gehören zu Jhg. 1899. Iris, Bd. XII.) — Besprochen von P. C. T. Snellen. Tijdschr. v. Entomol. Nederl. Entom. Vereen. 43. D. 3./4. Af. p. 247—261.
- (5). Libytheidae. (Das Thierreich 14. Lief. Lepidoptera. Red. A. Seitz). Mit 4 Abbildgn. Berlin, R. Friedländer & Sohn, Feb., 1901. gr. 8°. (18 p.) M. 2,—; Subscr.-Pr. M. 1,50.
- Partridge, (Colonel).** Further Notes on Forcing *Agrotis Ashworthi*. The Entomologist, vol. 34. Sept. p. 246—247.
- Paux, Pierre.** Les Lépidoptères du département du Nord. Revue Scient. France et Belg. T. 35. p. 453—716.
- Pavél, Joh.** (1). Lepidopteren. Graf E. Zichy, dritte Asiat. Forschungsreise, 2. Bd. p. (171) 173—177.
- 139 Spp.
- (2). Geb. 1842 zu Grosswardein, gestorb. 15. Juni 1901. — Kurzer Nekrolog. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 330.
- Peachell, F. H. and G. E. Peachell.** Capture at Electric Light. The Entomologist, vol. 34. March, p. 103.
- Perkins, C. R. L.** (1). On a new genus of Geometridae from the Hawaiian Islands. Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 12 (37). Sept. p. 215—216.
- Nesochlide n. g., epixantha n. sp.
- (2). A new Genus of Hawaiian Geometridae (*Acrodrepanis*). t. c. Oct. p. 251—252.
- Perkins, Miss A. Steele.** *Camptogramma fluviata* at Rhyl, Flintshire. The Entomologist, vol. 34. Apr. p. 130—131.
- Die **Peters'schen** Tafeln schliessen nunmehr 1901 Bd. VI ab u. zwar Hft. 6:
- Taf. IX Fig. 1. *Dilophonota oenotrus* Cr.; Fig. 2. *D. piperis* Boisd.; Fig. 3. *D. ello* L.; Fig. 4. spec.?; Fig. 5. *D. ello* Cr. (nec. L.); Fig. 6. *Pachylia lyres* Hb.; Fig. 7. *P. ficus* L.; Fig. 8. *P. ficus* Cr. (nec. L.); Fig. 9. *P. ficus* L. — Hft. 10: Taf. X. Fig. 1. *Hemeroptanes triptolemus* Walk.; Fig. 2. spec. Fig. 3. spec. Fig. 4. spec.? Fig. 5. *Oxydia* spec.; Fig. 6. *Leucula nephodia* Hüb.; Fig. 7. *Oxydia* spec.
- Petersen, Wilh.** Zur Morphogenese der doppelten Bursa copulatrix bei Schmetterlingen. Mit 4 Fig. Allgem. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. No. 21. p. 323—325.
- Die p. 615 des vor. Berichts erwähnte doppelte Bursa copulatrix bei *Zygaena* hatte sich der Verf. so zu erklären versucht, dass die blasige Erweiterung am Verbindungsgang zwischen *Oviductus communis* u. Bursa, wie sie bei anderen Arten u. zwar gewöhnlich in der Mitte des Samenganges vorkommt, zur Bursa-Oeffnung herabgerückt ist u. somit das Bild einer doppelten Bursa giebt. Bei der Fortsetzung seiner Untersuchungen hat der Verf. aber Formen zu

sehen bekommen, die die Morphogenese der doppelten Bursa deutlich erkennen lassen. Wie ausführliche Untersuchungen an *Tortrix xylostearna* L. Fig. 1, *T. heparana* Schiff. Fig. 2, *rusticana* Tr. Fig. 3 u. *Euxanthis* (*Conchylis*) *hamana* L. lehren, ist die Pseudo-Bursa nichts anderes als eine an die eigentliche Bursa copulatrix heranrückte Bulla seminalis.

- (2). (Titel p. 615 des vor. Berichts). Nebst 5 Schemata. — Ref. von Chr. Schröder, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 90—91. — Dasselbst findet sich auch eine Schilderung der Urform der Lepidopteren.

Petri, L. Osservazioni sopra gli stigmi della *Sericaria mori*. Con 1 tav. e 5 fig. nel testo. Bull. Soc. Entom. Ital. An. 33. 2. Trim. p. 89—103, 104.

Pfankuch, K. *Arctia purpurata* etc. Titel p. 355 dieses Berichts.

Pfützner, R. (1). Die Macrolepidopteren der Sprottaufer Gegend. I. Theil. Deutsch. Entom. Zeitschr. 1901. 1. lep. Hft. p. 88—112.

- (2). Beschreibung von Aberrationen aus meiner Sammlung (Fortsetz.). Deutsch. Entom. Zeitschr. 1901. 1. lep. Hft. p. 113—115.

Phillips, Hub. C. (1). Oviposition of *Cosmotriche potatoria*. Entom. Record, vol. 13. No. 9. p. 279.

- (2). *Dilina tiliae* at Hampstead. op. cit. vol. 13. No. 9. p. 279.

Phillips, Hubert S. *Porthesia chrysoorrhoea* and *Eutricha quercifolia*. Entom. Record, vol. 13. No. 12. p. 374.

Piepers, M. C. Titel p. 616. sub No. 2 lies daselbst *receuillis* statt *receuillis*. Ref. von Chr. Schröder, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 124. — Die kolor. Tafeln bringen Abb. von Raupen der Gatt. *Scopelodes*, *Nemeta*, *Hyphorma*, *Setora*, *Thosea*, *Miresa*, *Latoia*, *Cania*, *Altha*, *Orthocraspeda*, *Olona*, *Ploneta*, ausserdem neben *Zeuzera postencisa* Hamps., 8 n. spp. von *Limacodidae*.

Pierce, F. N. The Buff Variety of *Amphidasis betularia*. The Entomologist, vol. 34. July, p. 203—204.

Pilley, J. B. Late butterflies. The Entomologist, vol. 34 p. 58. — *Euchloe cardamines*, *Pararge egeria*, *Grapta c-album*, *Pieris rapae*.

Poling, Otto C. (1). Some recent Work in the Genus *Catocala*. Canad. Entom. vol. 33. No. 5. p. 125—129.

n. spp.: *C. Frenchii* u. *C. chiricahua*, 1 n. var.

- (2). Notes on *Neophasia Terlootii* Bhr. from Arizona, with Description of a new Variety. Canad. Entom. vol. 32. No. 12. p. 358—359. — *N. Terl.* var. *Princetonia*.

Poljanec, Leop. (1). Zur Morphologie der äusseren Geschlechtsorgane bei den männlichen Lepidopteren. Mit 3 Taf. u. 5 Textfig. Arb. Zool. Instit. Wien. T. 13. 2. Hft. p. 155—194—196.

Abstr. External Sexual Organs in Male Lepidoptera. Journ. Roy. Micr. Soc. London 1901. P. 5. p. 525.

Pommerol, F. Un hémiptère destructeur des chenilles du pommier. Revue scient. Bourbonnais. 1901. 14. année, No. 157. p. 18—23.

Die Capside *Atractotomus mali* Meyer ist ein grimmiger Feind der in einem und dems. Neste lebenden Raupen von *Hyponomeuta malinella* Zell. u. *H. padella* Zell.

Poppius, B. 1900. *Lygris reticulata* (in Finland). Meddel. Soc. Fauna Flora Fenn. 25. Hft. p. 8.

Porritt, G. T. (1). *Leucania vitellina*, *L. albipuncta*, *Laphygma exigua*, *Heliothis armigera*, etc. in South Devon. Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 12 (37). Jan. p. 11—12.

— (2). Melanism in *Larentia multistrigaria*. t. c. June, p. 149.

Poujade, G. A. Sur l'écllosion à Paris d'une Saturnide de Madagascar. Bull. Soc. Entom. France, 1901. No. 17. p. 300. *Ceranchia Apollina* Butl.

Prehn, . Einiges über Flugzeit und Flugart von Schmetterlingen. Entom. Jahrb. (Krancher) 11. Jhg. p. 197—198.

Prideaux, R. M. (1). Irregularity of Emergence, and Larval Retardation. The Entomologist, vol. 34. Apr. p. 128—130.

— (2). Pairing of *Euchloë cardamines*. t. c. June, p. 179—180.

— (3). Hybernating Stage of *Acidalia imitaria*. Entom. Record, vol. 13. No. 5. p. 164.

— (4). Some notes on Sexual Dimorphism observed in the Scaling of *Colias edusa*. With 1 pl. t. c. No. 5. p. 141—142.

— (5). Stridulation of Male of *Macrothylacia rubi*. t. c. vol. 13. No. 7. p. 224.

— (6). Further notes on the Assembling of *Macrothylacia rubi*. t. c. No. 7. p. 224.

Prinz, Joh. Die Zucht und die ersten Stände von *Sesia annellata* Z. 11. Jahresber. Wien. Entom. Ver. 1900. p. 109—112.

Prout, Louis B. (1). The Generic Nomenclature of the *Noctua popularis* of Fabricius. Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 12 (37). Febr. p. 36—37.

— (2). On some Geometrids from the Grisons collected by Dr. T. A. Chapman in 1900. t. c. June, p. 136—139.

— (3). The Lepidopterous Fauna of Hampshire. The Entomologist, vol. 34. Nov. p. 312—313.

— (4). The Lepidopterological Books of the Nineteenth Century. Entom. Record, vol. 13. No. 1. p. 20—26.

— (5). *Sesiidae* or *Aegeriidae*. t. c. No. 4. p. 122—124.

— (6). Corrections in Generic Nomenclature. t. c. No. 6. p. 183—184.

— (7). Rapidity of Wing-Growth in *Cyclophora* (*Zonosoma*) *pendularia* Cl. t. c. No. 6. p. 184.

- (8). Some new Geometrid Varieties and Aberrations. t. c. No. 11. p. 336.
- (9). Staudinger and Rebel's Catalogue (Concl.). t. c. No. 12. p. 345—349.
- (10). *Lithosia sericea* Gregs. bon. sp. t. c. No. 12. p. 359. — Note by J. W. Tutt, *ibid.* p. 359.

Püngeler, Rudolf. Neue Macrolepidopteren aus Centralasien. (Forts.) Mit 3 Taf. Deutsch. Entom. Zeitschr. 1901. 1. Iep. Hft. p. 177—191. — Forts. zu Titel p. 618 des Berichts f. 1900. 22 neue Arten.

Quail, Ambr. (1). Life Histories in the Hepialid Group of Lepidoptera, with Description of one New Species and Notes on Imaginal Structures. With 2 pls. Trans. Entom. Soc. London, 1900. P. III. p. 411—422.

Gorgopis Bacotii n. sp.

- (2). Marginal Wing Bristles in Lepidoptera. With 1 fig. The Entomologist, vol. 34. Febr. p. 47—48.

Quail fand am Vorderrande verschiedener Lepidopterenflügel eine Reihe feiner Borsten, die senkrecht zur Fläche stehen, nach dem Ende zu sich verjüngen u. nach innen gekrümmt sind. An der Basis jeder Borste findet sich eine knopfartige Verdickung. Auf den Vorderflügeln stehen sie an der Basis des Costalrandes u. in regelmässigen Zwischenräumen an der Costa entlang, um den Apex herum u. den Aussenrand entlang bis zum äussersten Ende der ersten Cubitalader, drüber hinaus nicht, auch nicht auf dem Innenrande der Vorderflgl. Auf den Hinterflgl. zeigte sich die erste Borste auf der Spitze der ersten Radialader. Sie finden sich dann in regelmässigen Zwischenräumen bis nahe an die Analader. — Viele Geometriden ruhen mit ausgebreiteten Flügeln, bei Nacht tragen sie diese senkrecht. Dienen die Randborsten dazu vielleicht die Ränder der Flgl. zusammenzuhalten? Vielleicht besteht die normale Thätigkeit der Muskeln darin, die Flügel zu spreizen u. die Fähigkeit sie aufrecht zu halten ist hauptsächlich den Borsten zuzuschreiben?

- (3). *Nyctemera annulata* Bois., of New Zealand. Life History. With 5 figs. t. c. May, p. 141—145.

Quajat, E. Sulla svernatura ed incubazione delle uova del filugello. Annuario d. R. Staz. bacolog. di Padova. vol. XXVII, 1899, p. 13—43.

Experimentelle Prüfung der Massnahmen, welche dazu dienen sollen, ein früheres Ausschlüpfen der Seidenraupen aus dem Ei zu ermöglichen, eine zweite Herbstgeneration von Raupen zu erhalten. Darauf werden die Bedingungen erörtert, welche zur Vermeidung des Nichtauskriechens der Eier nothwendig sind. Zur normalen Entwicklung gehört das Ueberstehen einer Kälteperiode, die durch allmähliches oder (geringes) sprungweises Sinken der Temperatur eingeleitet u. dito wieder gesteigert werden muss. Die Dauer der

Ueberwinterungskälte 0° bis etwa 8° hängt von der Vorbehandlung der Eier ab. Sie kann durch längeres vorheriges Verweilen der Eier bei 10—12° sehr verkürzt werden. Doch beträgt die Zeit mindestens 4½ Monat. Selbst wenn schon Eiablage d. 1. Gener. Mitte Mai erfolgt, findet dann die 2. erst im Oktob. statt u. viele schlüpfen nicht infolge unnatürl. Verhältnisse.

Ragonot, E. L. Monographie des Phycitinae et des Galleriinae. Avec 34 pls. color. Romanoff, Mém. sur les Lépidopt. T. 8. (1002 p.).

Neue Gattungen sind: Hyporatusa, Lympha, Salinaria, Yosemitea, Metallosticha, Urbana, Mescinia, Meyrickiella, Metephestia, Oxybia, Epischia, Mesciniadia, Ebratica, Endommasis, Hulstia, Stylobasis, Lydia, Eurythmidia, Eleusina, Patagonia, Nonia, Parramatta, Alatinosa, Sudania, Rhodochrysa, Enosima, Ampycodes, Erythphlebio, Epidauria, Hosidia, Tinerastia, Omphalophora Hmps., Stasia, Prosthena Hmps., Paraphycita Hmps., Cathayia Hmps., Meyronia, Microchlora Hmps., Parazanclodes, Metaraphia Hmps., Anerastidia, Arenipses H., Paraphomia H., Paroxyptera Rag., Metachrysa Hmps., Barbifrontia Hmps., Ptyonocera Hmps., Oxydysia Hmps., Lophothoracia Hmps.

— (2). Siehe Romanoff.

Ransom, Edward. Lepidoptera at Sudbury, Suffolk and neighbourhood (Essex) during 1900. Entom. Record, vol. 13. No. 6. p. 192—195.

Raynor, Gilb. H. (1). Egg-laying of *Cymatophora octogesima*. Entom. Record, vol. 13. No. 5. p. 154—155.

— (2). *Hoporina croceago* ab latericolor n. aberr. Entom. Record, vol. 13. No. 6. p. 186.

Rebel, H. (1). 1899. Diagnosen neuer Lepidopteren aus Südarabien und von der Insel Sokotra. Anz. kais. Akad. Wien, Math.-naturw. Cl. 1899. No. XXVII. p. 359—361.

7 neue Spp.

— (2). Neue Lepidopteren aus Bosnien und der Herzegowina. Verhdlgn. k. k. bot.-zool. Gesellsch. Wien, 51. Bd. 10. Hft. p. 798—804.

— (3). Notes synonymiques sur deux espèces de Géométrides. Bull. Soc. Entom. France, 1901. No. 10. p. 192—193.

Acidalia italica Mill. u. *Eupithecia cossurata* Mill.

— (4). Neue paläarktische Tineen. Deutsch. Entom. Zeitschr. 1900. 2. lep. Hft. (Iris, Bd. 13. 2. Hft.) p. 161—188.

36 n. sp.; n. g.: *Procalantica*, *Paraplutella*, *Deuterotinea*.

Reichert, Al. (Titel p. 620 des vor. Berichts). Ref. Rebel, Verhdlgn. zool.-bot. Ges. Wien, 51. Bd. p. 384.

Reid, Percy C. (1). Lepidopterological Notes on the Year 1900. Entom. Record, vol. 13. No. 4. p. 130—133.

— (2). *Xylomiges conspicillaris*. The Entomologist, vol. 34. May, p. 157. — Tetley, Alfr. S. id. ibid. p. 160.

- (3). *Odontopera bidentata* ovipositing on *Arundo phragmites*. Entom. Record, vol. 13. No. 7. p. 221.
- Reuter, Enzo.** (1). *Orthotaelia sparganella* Thnbg. (für Finland neu). Meddel. Soc. Fauna Flora Fenn., Hft. 24. p. 13.
- (2). 1900. *Himera pennaria* L. (ny för Finland). op. cit. 25. Hft. p. 3—6.
- (3). 1900. *Nunnan* (*Lymantria* [*Liparis*] *monacha* L.) funnan i Finland. op. cit. 26. Hft. p. 41—42. — Ausz. p. 220.
- (4). 1900. (Lepidopterologiska Notiser.) op. cit. 26. Hft. p. 78—79.
- (5). Tre sällsynte fjärilar. op. cit. 27. Hft. p. 9—10.
- (6). (Titel p. 621 sub 2 des vorigen Berichts).
- Auf Grund eigener Beobachtungen, Litteraturangaben u. privaten Mittheilungen u. Sammlungen zählt Verf. die Zünsler u. Wickler des Schären-Gebietes um Åland u. Åbo auf. Es sind insgesamt 246 Sp. (80 Pyral., 184 Tortr.) u. 32 Varr., resp. Aberr. (3 Pyr., 29 Tortr.), von denen 32 Sp. (11 Pyr., 21 Tortr.) u. 28 Varr. (1 Pyr., 27 Tortr.) für die finländische Fauna neu sind. Genauere zahlenmäßige tabellarische Uebersicht über das Verhältniss der Fauna von Åland u. Åbo im einzelnen u. zueinander. (Aufzähl. nach Staud.'s Katalog von 1871).
- Reuter, O. M.** Ett anmärkingsvardt rede för en Bombycid-puppa. Meddel. Soc. Fauna Flor. Fenn. 27. Hft. p. 62—63.
- Ribbe, Carl.** (1). Neue Lepidopteren von Ceram, Niederländisch-Ostindien. Mit 1 Taf. Deutsch. Entom. Zeitschr. 1900. 2. lepid. Hft. (Iris Bd. 13. 2. Hft.) p. 334—337. — 4 n. spp.
- (2). Bemerkungen zu neuen Lepidopteren, die vor Kurzem beschrieben wurden. Deutsch. Entom. Zeitschr. 1900. 2. lepid. Hft. (Iris, Bd. 13. 2. Hft.) p. 338—340.
- (3). Kurze Bemerkungen über den Schmetterlingsfang der Vögel. Insekten-Börse, 18. Jhg. No. 18. p. 300—301.
- (4). Die Umgebung von Granada und Malaga in Andalusien, vom lepidopterologischen Standpunkte aus betrachtet. t. c. No. 44. p. 348—349, No. 45. p. 354—355, No. 46. p. 362—363, No. 47. p. 371.
- Riesen, A.** Beitrag zur Macrolepidopteren-Fauna der Insel Usedom. Stettin. Entom. Zeit. 62. Jhg. p. 160—168.
- Liste der erbeuteten Arten (p. 161—162). Bemerk. zu einzelnen Arten: *Pieris* (1), *Limenitis*, *Melitaea* (1), *Psilura* (1), *Hadena*, *Plusia* (1), *Synopsia* (1). — Die Fauna der Insel Usedom ist von den Strandorten Ost- und Westpreussens nicht unwesentlich verschieden. Von den von Usedom stammenden Thieren kommen in den östl. Strandorten nicht vor: *Epin. lycaon*, *Bomb. castrensis*, *Had. monoglypha* var. *obscura*, *Cuc. artemisiae*, *Plus. pulchrina* var. *ypsilon*, *Zon. linearia*, *Metroc. margaritaria*, *Syn. sociaria* u. *Cid. rubidata*.
- Riffarth, H.** (1). Die Gattung *Heliconius* Latr. Neu bearbeitet und Beschreibung neuer Formen. (Fortsetzung). Berlin.

- Entom. Zeitschr. 46. Bd. 1. Hft. p. 25—183. — Apart: als Th. II. Berlin, R. Friedländer & Sohn in Comm., (Juni) 1901. 8°. (159 p.) I./II. M. 8,—. — Gruppe I. p. 25—108. No. 1—168. — Gruppe II. p. 109—177. No. 169—300.
- Inhaltsverzeichnis zu Theil I (cf. vor. Bericht p. 622 sub 2. Berl. Entom. Zeitschr. 45 [46. 1901 ist falsch] p. 183—214) u. Druckfehlerverzeichnis (p. 178). — Inhaltsverzeichnis zu Theil II. Gruppen, Arten u. Subsp. oder Varr. p. 179—182. Mit Angabe der betreff. No. — Druckfehlerverzeichnis zu Theil II. p. 183.
- Register: cyrbia p. 151 statt 141.
- (2). (Titel p. 622 des orig. Berichts). Ausz. von Chr. Schröder, Allgem. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. No. 11. p. 173.
- Ritsema-Bos, J.** Phytopathologisch Laboratorium. Willie Commelin Scholten; verslag over de inlichtingen, gegeven in 1899. 66 p. Amsterdam 1900. — Auch Lepidopteren-Schädlinge Ref. von Schröder, Chr. Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 29.
- Robbins, R. W.** *Boletobia fuliginaria* at Hale End. Entom. Record, vol. 13. No. 10. p. 306.
- Robertson, R. B.** (1). Lepidoptera at Lyndhurst. Entom. Record, vol. 13. No. 7. p. 220—221.
- (2). Lepidoptera in the New Forest. t. c. No. 9. p. 276—277. No. 10. p. 301—302.
- (3). Dwarf Lepidoptera. t. c. No. 12. p. 360.
- (4). Lepidoptera in the New Forest, Bournemouth etc. t. c. No. 12. p. 369.
- (5). *Leucania vitellina* and *L. albipuncta* at Boscombe. t. c. No. 12. p. 372—373.
- Robson, John E.** *Acherontia atropos* in Durham. The Entomologist, vol. 34. Dec. p. 353.
- Rockstroh, H.** Buch der Schmetterlinge und Raupen. Eine Anleitung zur Anlage von Sammlungen und deren Behandlung. 7. Aufl. unter Beibehaltung der Systematik aus der 6. Aufl. umgearbeitet von weil. E. L. Taschenberg. Mit 231 Abbildgn. auf 16 naturgetreu color. Taf. Halle a. S., Geseuius, 1901. 8°. (VIII, 135 p.) M 6,—.
- de Rocquigny-Adanson, G.** (1). *Anthocharis cardamines*. Feuille jeun. Natural. (4.) 31. Ann. No. 365. p. 142—143.
- (2). *Pieris rapae* L. t. c. No. 367. p. 191.
- (3). Une expérience sur les chenilles processionnaires du pin (*Cnethocampa pityocampa*). t. c. No. 369. p. 227—228.
- (4). *Papilio Machaon* L. Revue Scientif. Bourbon. 14. Ann. No. 167. Nov. p. 197—204.
- Rollason, W. A.** (1). Late and early Dates of certain Lepidoptera in Cornwall. The Entomologist, vol. 34. Jan. p. 23.

— (2). *Lycaena aegon* and *L. astrarche* (Medon) in Cornwall. t. c. Dec. p. 353.

Romanoff, Nic. Mich. Son Altesse impériale. Mémoires sur les Lépidoptères T. VIII. Avec 34 (XXIV—LVII) pls. color. St. Pétersbourg, 1901 (imprim. Paris, Lahure). Berlin, R. Friedländer & Sohn in Comm. Imp. 8°, (XLI 602 p.) M. 80,—.

Enthält Ragonot, E. L. Monographie des Phycitinae et des Galleriinae.

Rostagno, F. (1). 1900—1901. Classificazione descrittiva dei Lepidotteri italiani. Boll. Soc. Zool. Ital. An. 9. (Ser. 2. Vol. 1.) Fasc. 5./6. p. 222—239; An. 10. (Ser. 2. Vol. 2.) Fasc. 1./2. p. 20—40.

— (2). Classificazione descrittiva dei Lepidotteri italiani. op. cit. An. 10. (2.) Vol. 2. Fasc. 2./3. p. 98—122 (Continua.)

Rothschild, The Hon. Walth. (1). Some new Butterflies and Moths. Nov. Zool. Tring, vol. 8. No. 3. p. 218—220.

7 n. sp. — Nymphalidae: *Danaus* (1). — Erycinidae: *Abisara* (1). — Lycaenidae: *Mimacraea* (1). — Geometridae: *Dysphania* (1), *Bordeta* (1), *Milionia* (1). — Agaristidae: *Phalaenoides* (1).

— (2). Lepidoptera from Egypt and the Soudan. t. c. No. 4. p. 426—434.

45 (46 No.) Arten, dar. 7 neue, sowie die neue Gatt. *Crypsolidia*.

Sie vertheilen sich so: *Danais* (2), *Cupido* (3), *Catochrysops* (1), *Synchlœ* (1), *Pieris* (1), *Colias* (1), *Catopsilia* (1), *Idmais* (1), *Teracolus* (3), *Parnara* (1), *Utetheisa* (1), *Notolophus* (1), *Odontocheilopteryx* (1), *Sesamia* (1), *Prodenia* (1), *Laphygma* (1), *Agrotis* (2), *Synedoidea* (1), *Mestleta* (1 + 1 n.), *Eublemma* (1 n.), *Metachrostis* (1), *Megalodes* (1 n.), *Sphingomorpha* (1), *Trigonodes* (1), *Pandesina* (1), *Polydesma* (1), *Acantholipes* (1), *Plusia* (2), *Crypsotidia* n. g. (1 n.), *Rhynchina* (1), *Tephрина* (1), *Zamerada* (1), *Pseudosterrha* (1 n.), *Craspedia* (1), *Crocalia* (1), *Scotomera* (1 n.), *Oligochroa* (1 n.), *Eromene* (1).

Rothschild, The Hon. Walt. and **K. Jordan.** (1). On some Lepidoptera. With 2 pls. t. c. No. 4. p. 401—407.

33 Arten, dar. 8 neue; 3 neue Unterarten.

Die Spp. vertheilen sich folg.: *Papilio* (1 n. subsp. + 1 bek. + 2 n. Sp.; zu meeki: Fig. A.), *Delias* (1 n. subsp.), *Danaus* (1), *Charaxes* (1 n. Sp.), *Abisara* (1), *Mimacraea* (1). — Saturniidae: *Rothschildia* (1 n.), *Antheraea* (1), *Automeris* (1 n.), *Argema* (1 n. subsp.). — Geometridae: *Dysphania* (1), *Milionia* (2), *Bordeta* (1), *Egybolis* (1 n.). — Agaristidae: *Immetalia* (1 n.), *Phalaenoides* (1), *Asota* (1 n.) — Chalcosiinae: *Herpa* (4), *Doelia* (1), *Pintia* (1), *Caprima* (6).

Der Versuch mit dem Dreifarbendruck der Tafeln ist gut geraten (besonders die Saturnide), wenn auch im Allgemeinen zu rot.

Das metallische Grün u. Blau tritt nicht scharf hervor. Gelb u. Rot sind nicht leuchtend genug.

— (2). On some new or rare Oriental Lithosiinae. t. c. No. 4. p. 409—424.

38 (37 No.) Formen, 24 neue Arten, 13 neue Subspecies, nämlich: *Clerckia* ([1 + 3 n.] sp. + 1 n. subsp.), *Zygaenopsis* (zahlr. Formen, dar. neue Spec. u. Subsp.), *Tricholepis* (3 n.sp. + 1 n. subsp.), *Trichocerosia* (1 + 3 n. sp.), *Caprimima* (div. Spp. u. Subsp.), *Byrsia* (n. sp. u. n. subsp.), *Asura* (1 n. sp.) u. *Metuegoa* (1 n. sp.).

de Rougemont, F. 1899. (*Caradrina lenta* [Tr.] nouveau pour la Suisse). Bull. Soc. Neuchat. Sci. Nat. T. 27. p. 290.

Rowden, A. O. *Callimorpha hera* in the Exeter District. The Entomologist, vol. 34. Oct. p. 296.

Rowley, R. R. Notes on the Missouri Springs. Entom. News vol. 12. Jan. p. 12—14.

Rübsaamen, Ew. H. Bericht über meine Reisen durch die Tucheler Heide in den Jahren 1896 u. 1897. Nebst Beiträgen von Fr. Dahl, Th. Kuhlitz u. Fr. Thurau. Mit 14 Textfig. Schrift. d. Naturf. Ges. zu Danzig. N. F. 10. Bd. 2. u. 3. Hft. Abhdlgn. p. 79—148.

Darin giebt Fr. Thurau sub No. V eine Liste der erbeuteten Schmetterlinge I. Rhopal. (34, No. 1—34). — II. Heteroc. 1. Sphinges (11, No. 35—45). 2. Bomb. (20, No. 46—65). 3. Noctuae (27, No. 66—92). 4. Geom. (19, No. 93—111). — III. Microlep. (7, No. 112—118).

Rudow, F. Eine Beobachtung an der Honigmotte, *Galleria mellonella* L. Insekten-Börse, 18. Jhg. No. 18. p. 139—140.

Russell, A. Pupation of *Sphinx ligustri* Larvae. Entom. Record, vol. 13. No. 4. p. 137—138.

Russell, G. J. C. Aberration of *Enodia hyperanthus*. Entom. Record, vol. 13. No. 12. p. 360.

Rydon, Arth. Hope. Experiments in Rearing *Lymantria* (*Liparis*) *monacha* and *Clostera curtula* in Moist Atmosphere. Entom. Record, vol. 13. No. 8. p. 253—254.

Sahlberg, John. (1). Om *Plastenis retusa* L. och dess förekomst i Finland. Meddel. Soc. Fauna Flora Fenn., 24. Hft. p. 48—49.

— (2). Om en hylsvältrande fjärillarv. op. cit. 24. Hft. p. 88—89. — Ausz. Hülsenumkippende Raupe. *ibid.* p. 185—186.

— (3). 1900. (*Catocala promisa* neu für Finland). op. cit. 26. Hft. p. 44—45.

— (4). Trädgårdonunnen (*Ocneria* [*Liparis*] *dispar*) funnen i Finland. op. cit. 27. Hft. p. 94—96.

Saunders, Edw. *Vanessa antiopa* at Woking. Entom. Monthly Mag. (2.) vol 12 (37) Apr. p. 100.

- Schäffer, Cäsar.** Wasser bewohnende Raupen. Verhdlgn. Naturw. Ver. Hamburg 1900. N. F. VIII. p. XLIV—XLV.
- Schaus, Wm.** (1). Titel p. 527 des Berichts f. 1897 sub No. 1 behandelt 20 neue Arten von Geometriden.
- (2). 1896. New Species of Heterocera. Journ. New York Entom. Soc. vol. 4. No. 2. p. 51—60.
41 neue Arten; 4 neue Gatt.: *Thelosia*, *Tarema*, *Prolimacodes* u. *Cyclara*.
- (3). 1896. New Species of American Heterocera. t. c. No. 3. p. 130—145.
67 neue Arten, 7 neue Gatt.: *Sansarepta*, *Pseudalus*, *Thalesa*, *Castrica*, *Prumala*, *Nezula* u. *Bertholdia*.
- (4). 1896. New Species of Heterocera from Tropical America. t. c. (vol. 4) p. 147—154. — cf. Bericht f. 1896. p. 442.
Behandelt 41 neue Arten, sowie die 3 neuen Gatt.: *Arpia*, *Nodoza* u. *Zonoda*.
- (5). New Species of Geometridae from Tropical America. P. I. Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27. No. 2. p. 165—194.
141 nn. Spp., n. g.: *Porona*.
- (6). New Species of Geometridae from Tropical America. Part. II. t. c. No. 3. p. 241—276.
149 neue Arten; neue Gatt.: *Phaludia*, *Pseudapicia*, *Pherotesia*, *Cargolia*, *Prohydata*, *Cortixa*.
- (7). A Revision of the American Notodontidae. With 2 pls. Trans. Entom. Soc. London, 1901. P. III. p. 257—343.
91 neue Arten; neue Gatt. sind: *Drastoma*, *Pronerice*, *Tagela*, *Cargida*, *Pentobesa*, *Theroa*, *Ctianopha*, *Proelymiotis*, *Antiopha*, *Poresta*, *Tachuda*, *Kalkoma*, *Farigia*, *Eustema*, *Psorocampa*, *Betola*, *Naduna*, *Pauluma*, *Drugera*, *Hardingia*, *Eucerura*, *Salluca*, *Skaphita*, *Notoplusia*, *Dognina*, *Malocampa*, *Gisara*, *Boriza*, *Rincodes*, *Meragisa*, *Goaxis*, *Afilia*, *Notela*, *Euharpyia*, *Eunotela*, *Herbertina*, *Goacampa*, *Kurtia*, *Anita* u. *Pseudhapigia*.
- (8). Descriptions of some new Species of Heterocera. Ann. Nat. Hist. (7.) vol. 7. March, p. 265—270.
19 n. spp. u. zwar: *Arctiadae*: *Hyperthaema* (2), *Neritos* (1), *Robinsonia* (1), *Halisidota* (4), *Amastus* (2), *Ischnocampa* (2), *Turuptiana* (2), *Hyalarectia* (1), *Maenas* (1), *Antarctia* (1), *Holomelina* (2).
— *Hypsidae*: *Pericopsis* (1).
- (9). New Species of Noctuidae from Tropical America. op. cit. vol. 8. July, p. 38—51. — (concl.) p. 77—99.
p. 38—51: 25 nn. spp.; n. g. *Phialta*.
p. 77—99: 51 n. spp.; n. g.: *Ypsoca*, *Peteroma* u. *Pagyra*.
Vertheilung: p. 38—51: *Calydia* (1), *Palindia* (1), *Dyomyx* (1), *Baridia* (1), *Homoptera* (4), *Matigramma* (1), *Campometra* (3), *Phialta* n. g. (1), *Placonia* (2), *Safia* (4), *Yrias* (6). — p. 77—99: *Ypsora* n. g. (1), *Pseudanthracia* (1), *Peteroma* n. g. (5), *Caenipeta*

(2), *Baniana* (1 + ? 1), *Poesula* (1), *Phurys* (6), *Mocis* (2), *Heteropygas* (1), *Argidia* (1), *Thermesia* (1), *Sanys* (2), *Ophisma* (2), *Bendis* (1), *Gonodonta* (1), *Euthermisia* (1), *Renodes* (1), *Pagyra* n. g. (1), *Triommatodes* (3), *Capnodes* (1 + ? 1), *Rhosologia* (4).

— (10). 1901. New Species of Heterocera from Tropical America I. Journ. New York Entom. Soc. vol. 9. No. 1. p. 40—48. II. *ibid.* No. 2. p. 73—77.

I. 32 neue Arten, 2 n. g.: *Marecidia*, *Costria*. — II. 18 neue Arten.

Schenkling, S. (1). Ist die Abstammung der Schmetterlinge an den Flügeln zu erkennen? *Insekten-Börse*, 18. Jhg. No. 31. p. 242—243.

— (2). Benannte *Saturnia*-Hybriden. t. c. No. 31. p. 243—244.

— (3). Der Einfluss der Farben auf die Entstehung des Geschlechts bei den Seidenwürmern. t. c. No. 42. p. 331—332.

Schille, Fryd. (1). Fauna lepidopterologiczna doliny, Popradu i jego doplynsów. Część IV. (Faune lépidoptérologique de la vallée de Poprad et de ses affluents. VI Partie). — *Krakow, Spraw. Kom. Fizyogr.* T. 35. p. 26—34.

— (2). Ein Beitrag zur Biologie von *Phlyctaenodes* Hb. (*Eurycreon* Ld.) *sticticalis* L. *Societ. Entom.* 16. Jhg. No. 14. p. 105.

Die Schmetterlinge des Seebergs. A. Grossschmetterlinge von Mitgliedern des Entomologischen Vereins in Gotha. B. Kleinschmetterlinge von Max Lenthe. *Naturw. u. Gesch. vom Seeberg.* p. 137—141, 142—146.

Schnabel, . Ueber die Zucht von *Arctia flava*. *Zeitschr. f. Entom.* Breslau, N. F. 26. Hft. p. 22—23.

Schneider, J. Sparre. Coleoptera og Lepidoptera ved Bergen og i naermeste omegn. Mit deutschem Résumé. Mit 1 col. Taf. *Bergens Mus. Aarb.* 1901. 1. Hft. (p. 217, 218, Résumé p. [220] 221—223).

Liste von 292 Lepidopteren.

Schreiber, Carl. Raupen-Kalender. Nach den Futterpflanzen geordnet für das mitteleuropäische Faunengebiet. *Deutsch. Entom. Zeitschr.* 1901. 1. lep. Hft. p. 1—64. 2. lep. Hft. p. 277—326.

Schreiber, . Verzeichniss der seit dem Erscheinen der Anton Schmid'schen „Regensburger Lepidopteren-Fauna“ und der zweiten Auflage des „Regensburger Raupen-Kalender“ vom gleichen Verfasser, für die hiesige Gegend als „neu“ gefundenen Raupen und Schmetterlinge. *Ber. Naturwiss. Ver. Regensburg.* 8. Hft. p. 61—62.

Schultz, Osc. Aberrationen von *Jaspidea celsia* L. Mit 6 Abbildgn. *Allgem. Zeitschr. f. Entom.* 6. Bd. No. 12. p. 183—185.

Schütze, K. T. Die Kleinschmetterlinge der sächsischen Oberlausitz II. Theil. (Fortsetz.) *Deutsch. Entom. Zeitschr.* 1901.

1. lep. Hft. p. 118—138. — Forts. zu Titel p. 573 des Berichts f. 1899.

Selater, P. L. (List of Lepidoptera collected in St. Lucia W. Ind.) Proc. Zool. Soc. London, 1901. vol. 1. P. II. p. 223.

Scudder, Sam. H. (1) A courageous Butterfly, *Oeneis Semidea*. With 1 pl. Psyche, vol. 9. No. 301. p. 195—197.

— (2). Some insects of special interest from Florissant, Colorado, and other points in the tertiaries of Colorado and Utah. Bull. U. S. Geol. Survey, No. 93, 1892, 25 pp. 3 pls. — Nach Zool. Record for 1901 Insecta, p. 67.

Sedlaczek, St. A *Valeria oleagina* F. második ivadéka. Rovart. Lapok 8. köt. 9. füz. Nov. p. 189—190. — Ausz. Hft. 9. p. 22.

Seifert, Otto. Life-History of *Platysenta videns* Guen. Journ. N. York Entom. Soc. vol. 9. No. 1. p. 12—19.

Semper, Geo. Die Nachtfalter — Heterocera. 5. Lief. Mit 4 Taf. C. Semper, Reis. Archip. Philipp. Wiss. Result. 6. Bd. (p. 569—624).

Service, Rob. *Sphinx convolvuli* in Kirkcudbrightshire. Ann. Scott. Nat. Hist. 1901. Oct. p. 238—239.

Seth-Smith, L. M. *Lycaena minima* (*Polyommatus alsus*) in August. The Entomologist, vol. 34. Sept. p. 254.

Sharpin, Archdale. Notes from Brodick, Arran, N. B. The Entomologist, vol. 34. Jan. p. 24.

Sharpe, Emily M. (1). A List of Lepidoptera collected by Mr. Ewart S. Grogan in Ctr.-Afrika. Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 278—286.

— (2). Titel siehe Hft. 1 p. 21 dieses Berichts.

Lepidopt.: Danaididae: *Danais* (2). — Satyridae: *Ypthima* (1). — Acraeidae: *Acraea* (1 + 1 n.). — Nymphalidae: *Pyrameis* (1), *Junonia* (2), *Precis* (1), *Byblia* (1), *Hypolimnas* (1), *Hamanumida* (1). — Lycaenidae: *Lachnocnema* (1), *Epamera* (1), *Spindasis* (1), *Tarucus* (2), *Polyommatus* (1), *Plebeius* (1). — Pieridae: *Mylothris* (1), *Belenois* (1), *Synchlœ* (1), *Teracolus* (11), *Eronia* (1), *Catopsilia* (1), *Terias* (1). — Papilionidae: *Papilio* (1). — Hesperidae: *Parnara* (1), *Sarangesa* (1), *Gomalia* (1). — **Heterocera:** Noctuidae: *Sphingomorpha* (1), *Ophiusa* (1), *Hypena* (1), *Cercocala* (1). — Notodontidae: (1 Sp.?) — Syntomidae: *Syntomis* (1).

Sheldon, W. G. (1). On a probable new Locality for *Anthrocera exulans*. Entom. Record, vol. 13. No. 4. p. 136—137.

— (2). *Colias hyale* and *C. edusa* near Croydon in 1900. t. c. No. 3. p. 109—110.

— (3). *Notodonta dromedarius* feeding upon *Corylus avellana*. t. c. No. 3. p. 110.

— (4). Lepidoptera in the Western Highlands. Entom. Record. vol. 13. No. 4. p. 135—136.

— (5). *Colias hyale* hibernated and bred. Entom. Record, vol. 13. No. 7. p. 222—223.

- Shepherd-Walwyn, H. W.** (1). Larvae and Pupae of *Plusia moneta* in Kent. *The Entomologist*, vol. 34. p. 208.
- (2). Larvae and Cocoons of *Plusia moneta* at Bidborough. *Entom. Record*, vol. 13. No. 7. p. 222.
- (3). *Leucania L-album* reported Tunbridge Wells. t. c. No. 12. p. 376. — Note by J. W. Tutt *ibid.* p. 376—377.
- Sherborn, C. Davies.** (1). Moore's „*Lepidoptera Indica*“. *Ann. Nat. Hist.* (7.) vol. 8. Dec. p. 565—566. — Berichtigungen.
- Sherborn, C. Davies and B. B. Woodward.** The Dates of Esper's Schmetterlinge. *Ann. of Nat. Hist.* (7.) vol. 7. Jan. p. 137—140.
- Tabellarische Zusammenstellung (p. 138—140) der Publikationszeit von Esper's Schmetterlinge. Die Anordn. der Tabelle ist: die verschied. Theile, Hefte, Seitenzahl, Tafeln, Daten.
- Shibabigk, G.** (1). Zur Raupenkunde. *Entom. Jahrb. (Krancher)* 11. Jhg. p. 201—202.
- (2). Die Verpuppung der Raupen der Makrolepidopteren. t. c. p. 203—205.
- Sich, Alfred.** (1). Illustrations of Lepidoptera being Imprints of Impressions. *Entom. Record*, vol. 13. No. 2. p. 66—72.
- (2). Egg of *Nepticula* sp. t. c. No. 12. p. 362—363.
- (3). Oviposition of *Coleophora murinipennella*. *Entom. Record*, vol. 13. p. 244—245.
- Sikora, F.** Mimicry bei Raupen. Mit 1 Taf. *Helios*, 18. Bd. p. 63—64.
- Skinner, Henry.** (1). 1896. Impressions received from a Study of our North American Rhopalocera. *Journ. New York Entom. Soc.* vol. 4. No. 3. p. 107—118.
- (2). On a Small Collection of Butterflies made in California and Arizona. *Entom. News*, vol. 12. June, p. 170—171.
- (3). (*Habit of Libythea celtis*). t. c. March, p. 119—120.
- Sladen, C. A.** (1). Notes on Lepidoptera from Wiltshire. *The Entomologist*, vol. 34. Oct. p. 299.
- (2). Hibernation of *Vanessidae*. t. c. Nov. p. 316.
- Slevogt, B.** (1). Werden *Arctia caja* und andere grellgefärbte Falter von Vögeln gefressen? *Societ. Entom.* 15. Jhg. No. 24. p. 187—188.
- (2). Neuheiten der Sammelsaison 1899—1900. t. c. No. 8. p. 57—58.
- 3 neue Varr., 1 neue Aberration.
- (3). Neue Variationen über ein altes Thema. t. c. No. 11. p. 81—82.
- Schmetterlinge und Vögel.
- Slingerland, M. V.** Further experiments against the peach-tree-borer (*Sannina exitiosa*). With 5 figs. *Cornell Univ. Agric. Exper. Stat. Bull.* 192. (8 p.). — Ausz. v. L. Reh, *Allgem. Zeitschr. f. Entom.* 7. Bd. No. 1. p. 30.

- Slingerland, M. V.** *Pieris occidentalis*. Entom. News, vol. 12. Jan. p. 18.
- Slosson, Annie Trumbull.** A Successful Failure. Entom. News, vol. 12. No. 7. p. 200—203, No. 8. p. 239.
Lepidopterologische Bemerkungen.
- (2). Protection of *Chionobas semidea*. Entom. News, vol. 12. No. 10. p. 316—317.
Bezieht sich auf den betreff. Artikel von Carpenter.
- (3). 1896. Note on *Enaemia crassinervella* Zell. (*Miezia igninix* Walk.). Journ. New York Entom. Soc. vol. 4. No. 2. p. 86—87.
- Smith, Geoffrey.** (1). Variation in the genus *Erebia*. With 1 fig. The Entomologist, vol. 34. Oct. p. 276—281.
- (2). Variation in the genus *Erebia*. Part I. t. c. Nov. p. 306—308.
- Smith, John B.** (1). Types and Synonymy. Canad. Entomol. vol. 33. No. 5. p. 146—148.
- (2). *Acronycta* and Types. t. c. No. 8. p. 232—234.
- (3). Concerning Protests and other Things. t. c. No. 10. p. 276—279.
- (4). Notes on *Mamestra divacea* Morr. and its allies. With 1 pl. Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27. No. 3. p. 230—240.
- 14 Sp., dar. 6 neue.
- (5). Titel p. 632 sub No. 7. des vor. Berichts. Ausz. von Ch. Schröder. Allgem. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. No. 16/17. p. 267.
- Smyth, Ellison A.** *Philampelus elisa* (n. sp.). Description of a new species of *Philampelus* from Mexico. With 1 pl. Entom. News, vol. 12. Apr. p. 106—109.
- Snellen, P. C. T.** (1). *Lycaena donina* n. sp. Tijdschr. v. Entom. Nederl. Entom. Vereen. 43. D. 3./4. Afl. p. 262—264.
- (2). Aanteekeningen van *Pyriliden*. Met 3 pls. t. c. 3./4. Afl. p. 265—309, 310.
23 n. spp., nn. gg.: *Eusabena*, *Eugaceria*.
- (3). *Lycaena euphemus* Hübn.: een voor des Nederlandsche Fauna nieuwe dagvlinder. op. cit. 44 D. 1. Afl. p. 54—62.
- (4). *Tasenia*, nieuw Genus der *Pyriliden*. t. c. 1. Afl. p. 63—65.
- (5). Beschrijvingen van nieuwe exotische *Tortricinen*, *Tineinen* en *Pterophorinen* benevens aanteekeningen over reeds bekend gemaakte soorten. Met 2 pln. t. c. 2. Afl. p. 67—97, 98.
22 (19 neue) Arten.
- (6). Beschrijving von *Elymnias Vordermani* nov. sp. t. c. 2. Afl. p. 99—101.
- Snyder, Prof. and Mrs. A. J.** Over the Range in a Wagon. Entom. News, vol. 12. Apr. p. 113—118, May, p. 140—147, June, p. 163.

Solly, R. V. *Choerocampa celerio* in Wiltshire. *The Entomologist*, vol. 34. Nov. p. 318.

Sorhagen, L. Grabowiana. Ein Nachtrag zu den „Kleinschmetterlingen der Mark Brandenburg“. *Allgem. Zeitschr. f. Entom.* 6. Bd. No. 16/17. p. 241—245, No. 18. p. 276—279, No. 19. p. 296—298, No. 20. p. 311—314, No. 21. p. 327—332, No. 22. p. 343—347.

p. 241—245. Leben Grabow's (Staudinger's Schwiegervater). Seine Entdeckungen waren bis dato der Oeffentlichkeit entzogen. Abb. von Raupen u. Puppen u. s. w. einer Reihe von Schmetterl. nebst Angabe der Abb., die sich folgendermassen vertheilen: A. Pterophorina: *Cnemidophorus* (1), *Mimaeseoptilus* (2), *Pterophorus* (1), *Aciptilia* (1). — B. Alucitina: *Alucita* (1). — C. Pyralidina: *Scoparia* (1), *Eurrhyncha* (1), *Botys* (6), *Eurycreon* (2), *Pionea* (1), *Orobena* (2). — p. 276—279. *Agrotera* (1), *Hydrocampa* (1), *Parapoynx* (1), *Cataclista* (1). — Chilonidae: *Schoenobius* (1), *Chilo* (2). — D. Crambidae: *Crambus* (2), *Phycidae*: *Dioryctria* (2), *Nephopteryx* (2). — p. 296—298. *Nephopteryx* (2), *Étiella* (1), *Acrobasis* (2), *Myelois* (1), *Nyctegretis* (1), *Euzophera* (1), *Anerastria* (1). — Gallierae: *Galleria* (1). — p. 311—314. Tortricina: *Teras* (4), *Tortrix* (10), *Sciaphila* (2), *Cheimatophila* (1). — p. 327—332. *Conchylis* (6), *Retinia* (3), *Penthina* (6), *Aspis* (1), *Grapholitha* (8), *Carpocapsa* (2), *Coptoloma* (1), *Phthoroblastis* (1). — p. 343—347. Tmetocera (1, ab. n. Sorh.), *Steganoptycha* (2), *Phoxopteryx* (4), *Dichrorampha* (1). — E. Choreutinae: *Simaethis* (1). F. Tineina: *Scardia* (1), *Tinea* (1). — Forts. folgt.

Soule, Caroline G. (1). (On *Cecropia* cocoons). *Entom. News*, vol. 12. Febr. p. 45.

— (2). Notes on the Mating of *Attacus cecropia* and others. *Psyche*, vol. 9. No. 303. p. 224—226.

— (3). A new use of an ovipositor. *Psyche*, vol. 9. No. 304. p. 240. — *Deidamia inscripta*.

— (4). The inner Cocoon of Attacine Moths. *Psyche*, vol. 9. No. 305. p. 252.

— (5). Mating of *Attacus Gloveri*. t. c. No. 306. p. 255.

South, R. Siehe Carr, F. M. B. und Leech.

Sparke, F. G. J. *Orobena externalis* (*margaritalis*) in Suffolk. *The Entomologist*, vol. 34. Oct. p. 296.

Speiser, P. Die beiden Formen der *Plusia chrysis* L. *Entom. Jahrb.* (Krancher), 11. Jhg. p. 186—192.

Spuler, Arn. Die Schmetterlinge Europas. 3. Aufl. von E. Hofmann's gleichnamigem Werke. Stuttgart, C. Hoffmann's Verlagsbuchhdlg. (A. Blei), 1901. 4^o.

In 38 Lief. à M 1,—; 1. Lief. (Aug.) VIII, 8 p. 3 Taf.

Standfuss, Max. Synopsis of Experiments in Hybridization and Temperature made with Lepidoptera up to the end of 1898 (Contin.). *The Entomologist*, vol. 33. Dec. p. 340—348.

(2 pls.) u. vol. 34. Jan. p. 11—13. — (Conclud.) March, p. 75—84.

- (2). Deux nouveaux hybrides du genre *Smerinthus*. Bull. Soc. Entom. France, 1901. No. 4. p. 86—89.
- (3). Einfluss der Temperatur auf die Artbildung. Ausz. Naturw. Wochenschr. 16. Bd. No. 20. p. 231—233. — Nach Ann. Soc. Entom. Paris.

Starkey, Jam. S. *Vanessa Io* in Co. Sligo. The Irish Naturalist, vol. 10. No. 5. p. 115.

Staudinger, O. und H. Rebel. Catalog der Lepidopteren des paläarktischen Faunengebietes. 3. Aufl. des Catalogs d. Lepidopt. d. europäischen Faunengebiets. Mit Portr. O. Staudinger's. A. m. Tit. I. Theil. Famil. Papilionidae—Hepialidae von O. Staudinger u. H. Rebel; u. II. Theil. Famil. Pyralidae—Micropterygidae von H. Rebel. Berlin R. Friedländer & Sohn. 1901. 8°. (I: XXXII, 411 p.; II: 368 p.) I./II. M. 15,—; geb. M. 16,—.

- (2). Catalog der Lepidopteren des paläarktischen Faunengebietes. Index der Familien und Gattungen. Index der Arten, Varietäten, Aberrationen und deren Synonyme. Berlin, R. Friedländer & Sohn, 1901. 8°. (p. 267—368).

Referate: The New Edition of „Staudinger's Catalog“. The Entomologist, vol. 34. Sept. p. 237—241. — Siehe ferner Tutt (10).

Das Referat von Sorhagen in d. Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 264—265 fasst mehr die Entwickl. u. Entstehung dess. in's Auge u. die Zahl der Arten. Es giebt ferner eine interessante Zusammenstellung derjenig. (10) Autoren, die mehr als 200 Sp. beschrieben haben. Sie sei hier (in anderer Fassung) wiedergegeben.

No.	Autor	Zahl der		Insgesamt	No.	Autor	Zahl der		Insgesamt
		Macros	Micros				Macros	Micros	
1	Staudinger	881	377	1258	6	Ragonot . .	—	405	405
2	Hübner . .	409	311	720 ¹⁾	7	Christoph .	188	215	403
3	Zeller . . .	27	544	571	8	Fabricius .	143	98	241
4	Herr.-Sch.	164	270	434	9	Lederer . .	137	73	210
5	Linné . . .	309	96	405	10	Stainton .	1	202	203

Verbess., die nicht berücksichtigt sind: *Lithocolletis lativittella* wofür *L. lativittella*, *Glyph. argyrogutella* Rag. wofür *Gl. argyrogettella* Rag. zu setzen. — Bei *Teras quercinana* fehlt der Autorname (Z.). — *Lita semidecandrella* Autor Threllfall.

Der neue Katalog in 3. Auflage ist endlich erschienen, seitdem seit der Herausgabe der 2. etwa 30 Jahre verflossen sind. Er trägt den neueren Anforderungen Rechnung, ohne in der Anordnung der Familien u. Gatt., sowie in der Benennung der Arten um-

¹⁾ Incl. der in der Geyer'schen Forts. aufgestellten Spp.

wälzende Veränderungen zu bringen. Die Eintheilung in Macro- u. Microlepidoptera ist fallen gelassen.

Theil I von Staudinger u. Rebel. Portrait Staudinger's (pp. XXX + (2) + 411). Dieser Band bringt das, was man früher Macrolepidopteren nannte, u. zwar auf 39 Familien vertheilt (5 derselben in 17 Subfamilien getheilt, 764 Gatt.):

- | | | |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| 1. Papilionidae | 16. Brahmaeidae | d) Orthostixinae |
| 2. Pieridae | 17. Bombycidae | e) Boarmiinae |
| 3. Nymphalidae | 18. Drepanidae | 26. Uraniidae |
| a) Nymphalinae | 19. Callidulidae | 27. Epiplemidae |
| b) Danaïnae | 20. Thyrididae | 28. Nolidae |
| c) Satyrinae | 21. Noctuidae | 29. Cymbidae |
| 4. Libytheidae | a) Acronyctinae | 30. Syntomidae |
| 5. Erycinidae | b) Trifinae | 31. Arctiidae |
| 6. Lycaenidae | c) Gonopterinae | a) Arctiinae |
| 7. Hesperidae | d) Quadrifinae | b) Lithosiinae |
| 8. Sphingidae | e) Hypeninae | 32. Heterogynidae |
| 9. Notodontidae | 22. Agaristidae | 33. Zygaenidae |
| 10. Thaumetopoeidae | 23. Cymatophoridae | 34. Megalopygidae |
| 11. Lymantriidae | 24. Brepidae | 35. Cochlididae |
| 12. Lasiocampidae | 25. Geometridae | 36. Psychidae |
| 13. Endromididae | a) Geometrinae | 37. Sesiidae |
| 14. Lemoniidae | b) Acidaliinae | 38. Cossidae |
| 15. Saturniidae | c) Larentiinae | 39. Hepialidae. |

Theil II von Rebel umfasst die „Microlepidoptera“ mit 18 Familien, 42 Subfam. u. 483 Gatt.:

- | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1. Pyralidae | a) Choreutinae | 11. Gracilariidae |
| a) Galleriinae | b) Glyphipteryginae | a) Gracilariinae |
| b) Crambinae | c) Douglasiinae | b) Lithocolletinae |
| c) Schoenobiinae | 6. Yponomeutidae | 12. Lyonetiidae |
| d) Anerastiinae | a) Yponomeutinae | a) Lyonetiinae |
| e) Phycitinae | b) Argyresthiinae | b) Phyllocnistinae |
| f) Epipaschiinae | 7. Plutellinae | 13. Nepticutidae |
| g) Chrysauginae | a) Plutellinae | 14. Talaeporiidae |
| h) Endotrichinae | b) Orthotaeliinae | 15. Tineidae |
| i) Pyralinae | 8. Gelechiidae | a) Atychiinae |
| k) Hydrocampinae | a) Gelechiinae | b) Ochsenheimeriinae |
| l) Scopariinae | b) Blastobasinae | c) Acrolepiinae |
| m) Pyraustinae | c) Oecophorinae | d) Setomorphinae |
| 2. Pterophoridae | 9. Tinaegeriidae | e) Lypusinae |
| 3. Orneodidae | 10. Elachistidae | f) Teichobiinae |
| 4. Tortricidae | a) Scythridinae | g) Tineinae |
| a) Tortricinae | b) Momphinae | h) Adelinae |
| b) Conchylinae | c) Heliozelinae | 16. Crinopterygidae |
| c) Olethreutinae | d) Coleophorinae | 17. Eriocraniidae |
| 5. Glyphipterygidae | e) Elachistinae | 18. Micropterygidae |

Theil II p. 249--266 bringt Addenda und Corrigenda.

Die Zunahme der Gatt. u. Arten in den 3 Auflagen veranschaulicht folgende Uebersicht:

Gattungen:

	1. Aufl. 1861	Zu- wachs	2. Aufl. 1871	Zu- wachs	3. Aufl. 1901
Macros	388	+ 27	415	+349	764
Micros	217	+ 99	316	+167	483
Insgesamt	605	+126	731	516	1247

Arten:

	1. Aufl. 1861	Zu- wachs	2. Aufl. 1871	Zu- wachs	3. Aufl. 1901.	
Macros	2600	+254	2854 (Sorh.—5)	+1903	4754	
Micros	2710	+510	3220 (Sorh.—6)	+1742	+ 13 Add. 4782	4757 (Sorh.—6)
					+180 Add.	4962 (Sorh.—7)
Insgesamt	5310	+764	6074	+3645		9719

Sorhagen hat an den betr. Stellen eine Differenz, woraus seine Gesamtzahl an Arten 9707 beträgt.

Der gewaltige Zuwachs an Arten kommt durch die Erweiterung des Titels europäische u. paläarktische, der Erweiterung der südlichen u. östlichen Grenzen des paläarktischen Gebietes. Früher ging die Ostlinie bis zum Amur, jetzt bis Ussuri einschliesslich, vielfach ist auch Nord-China, Korea u. Japan mit eingeschlossen.

Eine Reihe von Synonymen, die in der 2. Auflage angegeben ist, ist in der 3. Auflage (vielleicht des Raumes wegen) fallen gelassen. Für synonyme Zwecke dürften wir also auf beide Auflagen angewiesen sein. Bei einer Reihe von Arten sind die Gattungsnamen geändert, bei andern, so den Gatt. *Agrotis*, *Cidaria* (umgeändert in *Larentia*) u. *Acidalia* sind sie beibehalten, sogar die weitere Gruppenbildung derselben fortgelassen, trotz vermehrter Artenzahl (so *Agrotis* 1871: 171 Sp., 1901: 304 Sp.). — Hübner's Verzeichniss im 2. Theil mit dem Publikationsdatum 1818 ist ungenau u. erst 1826 zu setzen. — Druck kleiner, Ansichten über d. Güte desselb. geteilt.

Stearns, Arth. E. Rapid development of *Smerinthus ocellatus*. Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 12 (37). Oct. p. 258—259.

Stefanelli, P. Nuovo Catalogo illustrativo dei Lepidotteri ropaloceri della Toscana. (Contin. e fin.) Bull. Soc. Entom. Ital. An. 32. Trim. 4. p. 381—387, 388—396.

— (2). (Titel p. 637 des vor. Berichts — lies daselbst Stefanelli nicht Stefannelli).

Neue, wesentlich erweiterte Zusammenstellung der Rhopaloceren-Fauna von Toscana. Es sind fast 200 Sp. u. Varr. als Toscana

angehörig aufgeführt, darunter befinden sich folg. von St. selbst aufgestellte Formen: *Pieris rapae* ab. *leucotera*, var. *rossii*, ab. *erganoides*, *Colias edusa* ab. *faillae* ♂, *Polyommatus alciphron* var. *intermedia* ♀, *dorilis* ab. *fulvior* ♀. — *Vanessa cardui* var. *minor* Canlo fehlt in der Liste, ist nach Neuburger, W. aber dort vorhanden.

Steuart, A. M. *Chrysophanus phloeas* var. *Schmidtii* near Paisley. *The Entomologist*, vol. 34. Dec. p. 352.

Stevenson, Charl. Not surprised. *Canad. Entom.* vol. 33. No. 11. p. 316.

Telea polyphemus.

Stichel, H. (1). Zur Synonymie einiger Arten der Gattung *Catonephele* Hb. Mit 2 Taf. *Berlin. Entom. Zeitschr.* 46. Bd. 1. Hft. p. 1—4.

— (2). Ueber das Fliegen tropischer Falter. t. c. 1. Hft. Sitz.-Ber. p. (3)—(4).

— (3). *Discophora amethystina* n. sp. t. c. 1. Hft. Sitz.-Ber. p. (4)—(5).

— (4). (*Zonosoma ianthinarium* n. sp.) t. c. 2./3. Hft. Sitz.-Ber. p. (19)—(21).

— (5). (*Discophora perakensis* n. sp.). t. c. 2./3. Hft. Sitz.-Ber. p. (21).

— (6). Berichtigung und Ergänzung zu meinem Artikel über bemerkenswerthe Schmetterlings-Varietäten im 44. Bd. t. c. 1. Hft. p. 21—24.

— (7). *Parnassius Apollo* L. Ergänzende Bemerkungen zu dem Artikel im XVI. Jahrg. p. 294 fgd. *Insekten-Börse*, 18. Jhg. p. 7. p. 51—52.

— (8). *Vanessa io*, aberr. nov. *pavo*. t. c. No. 39. p. 309.

— (9). Zwei neue Formen der Gattung *Discophora*. t. c. No. 40. p. 317.

— (10). (Ueber *Heliconiden*). t. c. No. 47. p. 373. — Aus Berlin. *Entom. Verein*.

Stütz, Herm. Der Genitalapparat der *Microlepidopteren* (Titel p. 637 des vor. Berichts). Ausz. von Chr. Schröder, *Allgem. Zeitschr. f. Entom.* 6. Bd. No. 13. p. 206.

Stockwell, H. Douglas. (1). Notes from Dover. *The Entomologist*, vol. 34. Jan. p. 25—26.

— (2). *Aporia crataegi*, *Pieris daplidice* etc. at Dover. *Entom. Record*, vol. 13. No. 10. p. 306—307.

Strand, Embr. (1). Beitrag zur Schmetterlingsfauna Norwegens. *Nyt Magaz. f. Naturvid.* Bd. 39. Hft. 1. p. 25—72.

Liste von 300 Arten, Bemerk. über 65 ders.

Bearbeitung der vom Verf. im Jahre 1900 im nördl. Norwegen gesammelten Schmetterlinge. Tabell. Uebersicht (horizontal die Fundorte, vertikal die Arten) der 300 Arten nebst Fundorten (p. 27—43), sämtl. Lepid.-Gruppen betreffend (p. 44 sq.). Es sind im Ganzen 116 *Macros* u. 184 *Micros*, von denen für die arkt. Fauna neu: *Sesia spheciformis* Gerning, *Plusia Gamma* L., *Eupithecia*

rectangulata L., Phoxopteryx subarcuana Dougl., Paedisca immun-dana Fr., Steganoptycha vacciniana Z., Blabophanes feruginella Hb., Nemophora pilella F., Argyresthia retinella Z., Heydenia auromaculata Frey, Pancalia Leuwenhoekella L., Elachista montanella Wk. Für Norwegen neu: Gracilaria falconipenella Hb., Ornix scoticella Stt., Elachista gangabella Z., Lithocolletis quercifoliella Z., L. insignitella Z., L. cerasicolella H.-S., L. salictella Z., L. clerckella L. var. aereella Tr., Cemiostoma spartifoliella Hb., Opostega salaciella Tr., Nepticula sorbi Stt., N. salicis Stt. Interessante zum Theil neue Formen finden sich besonders in der Gatt. Cidaria. — Siehe im syst. Theil.

- (2). Beschreibung neuer Schmetterlingsformen aus Norwegen. t. c. 2./3. Hft. p. 285—288.
9 neue Varr. u. col.

Strecker, Herm. Index of Species to Kirby's Synonymic Catalogue of Lepidoptera Heterocera. Reading, P. A. U. S. A., 1899 (bei R. Friedländer & Sohn. Preis M. 4,—). — Ref. Rebel, Verhdgn. zool.-bot. Ges. Wien. 51. Bd. p. 383—384. Dem 1. Bande des Kirby'schen Heteroceren-Kataloges (Sphinges and Bombyces, 1892) fehlt bekanntlich ein so unentbehrlicher Index. Diesem Bedürfniss schafft Strecker dadurch Abhilfe.

Studd, E. F. C. (1). Lepidoptera at Oxtou. Entom. Record, vol. 13. No. 10. p. 302.

- (2). Larva of Anthrocera trifolii hibernating a second Winter. Entom. Record, vol. 13. No. 10. p. 307—308.

— (3). Siehe Atmore.

Swain, A. M. (1). Plusia moneta and Porthesia chrysoorrhoea at Norwood. Entom. Record, vol. 13. No. 10. p. 304.

- (2). Catocala fraxini at Norwood. Entom. Record, vol. 13. No. 11. p. 333.

Swainson, Mrs. E. M. Notes on Larvae of Lepidoptera. Journ. New York Entom. Soc. vol. 8. No. 1. p. 32—34.

- (2). Notes on Lepidopterous Larvae from Jamaica, B. W. I. op. cit. vol. 9. No. 2. p. 77—82.

Swinhoe, C. (1). New Genera and Species of Eastern and Australian Moths. Ann. Nat. Hist. (7.) vol. 7. May, p. 463—473, June, p. 487—501.

p. 463—473. 23 n. spp.; n. g. (nom. nov.) Monosyntaxis (für Monotaxis Hmps.). — Die Vertheilung ist folgende: p. 463—473: Boarmiidae: Abraxinae: Abraxas (1). — Limacodidae: Susica (1 bek.), Thosea (1), Contheyla (1). — Arctiidae: subf. Arctiinae: Rhodogastria (1). subf. Nyctemerinae: Nyctemera. subf. Lithosiinae: Monosyntaxis nom. nov. (1 bek.), Pseudoblabe (?) (2), Lyclene (2), Miltochrista (1). — Cossidae: Arbela (1). — Hepialidae: Phassus (1). — Acontiidae: Cophanta (2 bek.), Xanthoptera (1 + 1 bek.), Metachrostis (1), Rivula (1), Fulemma (3), Cerynea (1), Oruza (1).

p. 489—501. Sarothripinae: *Gadirtha* (1), *Blenina* (1), *Cletthara* (1 + 1 bek.), *Sarothripa* (1). — Stictopterinae: *Vizaga* n. g. (1). — Gonopteridae: *Capotena* (1), *Carea* (1), *Erizada* (1 bek.). — Trifidae: *Aucha* (1), *Hadena* (1), *Semiophora* (1), *Elusa* (1), *Caradrina* (1). — Quadrifinae: subf. *Polydesminae*: *Pandesma* (1). *Ophiusiinae*: *Bocula* (1), *Motina* (1), *Tiruvaca* n. g., *Platyja* (1). — Focillidae: *Zethes* (1), *Egnasia* (1 bek.), *Diomea* (2), *Rhesala* (3 + 1 bek.).

— (2). New Genera and Species of Eastern and Australian Moths. (concluded). op. cit. vol. 8. July, p. 16—27.

15 n. spp., nn. gg.; *Amilaga*, *Heterormista*, *Aphypena*, *Eucosmocara*, *Stenopeltis*, *Hemiloba*. — Im Einzelnen: *Hypenidae*: subf. *Deltoidinae*: *Amilaga* (1 bek.), *Daxata* (1), *Zanclognatha* (1 bek.). *Pseudocraspedia*(?) (2), *Cacyparis* (1). subf. *Hypeninae*: *Marapana* (1), *Heterormista* (1), *Bomolocha* (2), *Aphypena*, *Eucosmocara* (1), *Stenopaltis* (1), *Moscha* (1). — *Nymphulidae*: *Hemiloba* (1), *Oligostigma* (1). — *Pyraustidae*: subf. *Hymeniinae*: *Chalcidoptera* (1 bek.), *Pyraustinae*: *Pachyzancla* (1), *Pionea* (1).

— (3). New and little-known Moths from India and Australia. t. c. Aug. p. 123—139.

40 (27 n. sp.) n. g.: *Sundwarda*.

Vertheilung: *Eupterotidae*: *Eupterote* (1). — *Chalcosiidae*: *Cyclosia* (1). — *Lithosiidae*: *Chionema* (1). — *Drepanulidae*: *Callidrepana* (1 bek.). — *Cossidae*: *Duomitus* (1). — *Macariidae*: *Luxiaria* (1). — *Ennomidae*: *Hypochrosis* (1). — *Trifidae*: *Heliocheilus* (2), *Canthylidia* (2), *Adisura* (1), *Heliothis* (1), *Euplexia* (1), *Amphipyra* (1 bek.), *Diethusa* (1 bek.). — *Acontiidae*: *Erastria* (1 bek.), *Bryophila* (1), *Eutelia* (1). — *Sarothripidae*: *Blenina* (1). — *Quadrifidae*: *Sundwarda* n. g. (1), *Praxis* (1), *Achaea* (1), *Grammodes* (2), *Niguza* (1). — *Focillidae*: *Osericana* (1 bek.). — *Hypenidae*: *Dichromia* (1). — *Nymphulidae*: *Camptomastix* (Typen), *Oligostigma* (1 bek.). — *Endotrichidae*: *Cangetta* (1 bek.). — *Pyraustidae*: *Entephria* (1), *Tabidia* (1 bek.), *Pagyda* (1), *Nacoleia* (1 bek.), *Metasiodes* (1 bek.), *Margaronia* (1), *Lepidoplaga* (1 bek.), *Pionea* (2 bek.), *Hemiscopsis* (1 bek.).

Sykes, Mark L. Evolution in Butterfly Scales. The Entomologist, vol. 34. Dec. p. 350—351.

Tait, Rob. (1). Foreign *Agrotis Ashworthii*. The Entomologist, vol. 34. Febr. p. 30—41.

— (2). October Collecting in the New Forest. Entom. Record, vol. 13. No. 12. p. 372.

Tannreuther, Geo. W. (1). A Case of Supernumerary Wings in *Pieris rapae*. With 3 figs. Zool. Anz. 24. Bd. No. 654. p. 620—622. — Ausz. Journ. R. Micr. Soc. London, 1901. P. 6. p. 642—643.

Teich, C. A. (1). Beitrag zur Lepidopterenfauna in Baldohn. Korr.-Bl. Naturf.-Ver. Riga, XLIV. p. 10—13.

- (2). Ueber einige bemerkenswerthe Varietäten und Aberrationen meiner Sammlung. t. c. p. 14—17. — 15 Arten.
- (3). Reiseskizze. Insekten-Börse, 18. Jhg. No. 39. p. 308—309.
- Lepidopteren aus Lappland.
- Teszák, K.** Anthocharis cardamines második generációja. Rovart. Lapok, 8. köt. 9. füz. Nov. p. 188—189. — A. c., zweite Generation. Ausz. Hft. 9. p. 22.
- Tetley, Alfr. S.** (1). Notes on the Season of 1900 in Carnarvonshire. The Entomologist, vol. 34. March, p. 102—103.
- (2). Siehe Reid, Percy, C.
- Theobald, W. G.** (1). Colias hyale in Junc. The Entomologist, vol. 34. Apr. p. 130.
- (2). Vanessa antiopa in Huntingdonshire. t. c. Dec. p. 352.
- Therese, Prinzessin von Bayern.** Auf einer Reise in Südamerika gesammelte Insekten. Forts. Mit 2 Taf. III. Lepidopteren. Mit Diagnosen neuer Arten, Varietäten etc. von Rebel, Weymer und Stichel. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. 2./3. Hft. p. 235—304, 305—307, 368.
- 212 + 1 Sp., dar. 9 neue, u. 15 Sp. Raupen. Angabe des Tages oder Zeitpunktes des Fanges u. möglichst genaue Fundorte. Reisegebiet zum grossen Teile wie das von Stübel. Literatur zur Bestimm. Reise-Route: I. Kleine Antillen, II. Venezuela, III. Columbien, IV. Ecuador, V. Peru, VI. Brasilien. — Die einzelnen Spp., Fundorte nebst Bemerk. — Alfab. Verzeichn. d. Spp. u. Varr. p. 305—307. Tafel-Erkl. p. 308.
- Thomann, H.** Titel p. 366 dies. Berichts. — Auch: Inaug.-Diss. (Zürich), Chur 1901. 8^o. (40 p.). — Ausz. von K. Escherich, Zool. Centralbl. 9. Jhg. No. 3. p. 89—91.
- Thompson, Ben. Blaydes.** New differentia of Agrotis tritici and nigricans. Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 12 (37). Jan. p. 13—14.
- Thornewill, Ch. F.** (1). Notes on the Larva of Eupithecia subfulvata. The Entomologist, vol. 34. Dec. p. 349—350.
- (2). Thecla W-album in Shropshire. The Entomologist, vol. 34. Aug. p. 231.
- Thornhill, E. H.** (1). Note on Hybernating Xylina semibrunnea. Entom. Record, vol. 13. No. 8. p. 249.
- (2). Larvae of Sphinx convolvuli at Boxworth. t. c. No. 9. p. 278.
- Thurau, Fr.** Siehe Rübsaamen.
- Tichomirov, O.** 1900. Die Skorzonera als Futter für die Seidenraupen. Aus dem Russ. übersetzt von G. v. Trentovius. Riga. J. Deubner in Comm., 1900. 8^o. (22). — Sep.-Abdr. aus Land- u. Forstwirthsch. Zeit. 1900. No. 47.
- Tomala, Ferd.** (1). Sesia empiformis Esp. var. hungarica n. var. Rovart. Lapok, 8. köt. 3. füz. p. 47—50 — Ausz. p. 67.

- (2). *Lasiocampa otus* Drury. t. c. Nov. p. 188. — Ausz. Hft. 9. p. 22.
- Treichel, A.** Zur Lepidopterenfauna des Kreises Berent. Schrift. Naturf. Ges. Danzig. N. F. 10. Bd. 2./3. Hft. p. 163—172.
- Tutt, J. W.** (1). Migration and Dispersal of Insects: Lepidoptera. Entom. Record, vol. 13. No. 3. p. 97—102, No. 4. p. 124—125. No. 7. p. 198—201, No. 8. p. 233—237, No. 9. p. 255—256.
- (2). Abundance of Lepidoptera at Gresy-sur-Aix in August. 1900. t. c. No. 3. p. 88—91.
- (3). *Lasiocampa quercus* var. *meridionalis* n. var. t. c. No. 4. p. 113—114.
- (4). Eggs of Lepidoptera. — *Psodos trepidaria*. t. c. No. 4. p. 137.
- (5). Migration and Dispersal of Insects: Lepidoptera. t. c. No. 5. p. 145—147.
- (6). Striking Aberration of *Smerinthus ocellatus*. t. c. No. 5. p. 163—164.
- (7). The Position of *Lemonia* (*Crateronyx*) *dumi*. t. c. No. 5. p. 167—168.
- (8). Reported Hybridity among the Sesiides. t. c. No. 6. p. 174—175.
- (9). Names for Saturnian Hybrids. t. c. No. 6. p. 183.
- (10). Staudinger and Rebel's Catalogue. Entom. Record, vol. 13. No. 8. p. 230—233. No. 9. p. 265—270, No. 10. p. 286—287, No. 11. p. 320—325.
- (11). Imaginal Development in Pupae of *Lachneis lanestris*. — The Opening of the so called Lid of the Cocoon. t. c. No. 8. p. 244.
- (12). Habits of certain Butterflies when disturbed during Copulation. t. c. No. 10. p. 298.
- (13). Hybrid *Lasiocampa quercus* ♂ and *Pachygastris trifolii* ♀. t. c. No. 10. p. 298.
- (14). Probable second Pairing of *Melanargia galathea*. t. c. No. 10. p. 298—299.
- (15). New Names among the Lachneids. t. c. vol. 13. No. 11. p. 327—328.
- (16). On the Distribution of certain British Lepidoptera. t. c. No. 12. p. 361—362.
- (17). Siehe Prout.
- Uffeln,** . Beitrag zur Kenntniss von *Mamestra glauca* Hb. und *Drynobia melagona* Bkh. Deutsch. Entom. Zeitschr. 1901. 1. Iep. Hft. p. 145—148.
- Uhryk, Ferd.** Ujabb adatok magyarország lepke-faunájához. Rovart. Lapok, 8. köt. 10. füz. p. 209—212. — Neuere Beiträge zur ungarischen Lepidopteren-Fauna. Ausz. 3. Hft. p. 6.

- Urech, F.** Détermination du poids des chrysalides de Lépidoptères pendant leur transformation. Arch. Sci. phys. et nat. (Genève) (4.) T. 12. No. 11. Nov. p. 503—504. Aus Soc. helvét. Sc. Nat.
- Urwick, W. F.** (Varieties of some Lepidoptera). Proc. South London Entom. Nat. Hist. Soc. 1900. p. 96.
- Verson, Emr.** (1). Sull' armatura delle zampe spurie nella larva del filugello. Con 1 tav. Ann. R. Staz. Bacolog. Padova. vol. 29. p. 41—62—65. — Aus Atti R. Istit. Ven. Sc. L. ed A.
- (2). Sull' organizzazione dei mercati dei bozzoli nel Regno. I. II. t. c. p. 15—40, 97—104.
- (3). Sull' armatura delle zampe spurie della larva del filugello. Con 1 tav. Estr. degli Atti R. Istit. Venet. Sc. Lett.: Arti, T. 60. 2. P. p. 719—735, 736—738.
- (4). Sull' ufficio della cellola gigante nei follicoli testicolari degli insetti. Atti d. R. Ist. Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, T. LVII. 1898/1899.

Vertritt die Ansicht, dass die nach ihm als Verson'sche Zelle bezeichnete grosse Zelle am Grunde des Hodenschlauches eine Geschlechtszelle ist, contra La Valetta-St. George, Ziegler, vom Rath u. Toyama, die dieselbe nur als Stützzelle auffassen wollen. Die Abgrenzung des Plasmas dieser Zelle gegen das der Spermatogonien, welche La Valette-St. G. gesehen hat, ist nach Verson eine künstliche, durch das Konservierungsmittel (Flemming'sche Flüssigkeit), entstandene. Bei Kleinenberg's Pikrinschwefelsäure entsteht sie nicht. Verson weist ferner auf die zahlreichen kleinen Kerne hin, die sich bei älteren Raupen um den grossen, oft mit Furchen versehenen, wohl sicher amitotisch sich theilenden Kern der Verson'schen Zelle finden u. welche weiter in die zwischen den Spermatogonien aufgefasernten peripherischen Protoplasmatheile der Zelle rückend, von den Kernen der Spermatogonien absolut nicht unterscheidbar sind. Eine Umgebung der kleinen Kerne mit einem Protoplasmahof, wie sie Toyama schildert, sah Verf. nie.

- (5). Titel p. 586 des vor. Berichts. Ref. von Speiser, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 46. — Eine Infektionskrankheit. Auftreibungen an den Muskelfasern, die an Sarcosporidien-schläuche erinnerten, doch fehlt ihnen die Hüllmembran etc.

Vignon, P. Sur l'histologie du ver-à-soie (Note préliminaire). Bull. Soc. Zool. France, T. 26. No. 4/7. p. 114—115.

De Vos tot Nederveen Cappel, H. A. Over de stekels aan de Voorschenen bij eenige N. Amerikaansche Agrotis-Soorten. Entom. Tijdskr. Nederl. Entom. Vereen. 44 D. 1. Af. p. 40—45.

Wagner, J. Saturnia pyri (ab. Abafii). Con 1 fig. Rovart. Lapok, 8. köt. 1. füz. p. 17—18.

Walker, F. A. Lepidoptera Rhopalocera of Paris. The Entomologist, vol. 34. Dec. p. 355—356.

- Walker, S.** (1). Gynandromorphous *Epione vespertaria*. Entom. Record, vol. 13. No. 10. p. 297—298.
 — (2). *Chrysophanus phlaeas* ab *Schmidtii* near York. t. c. No. 12. p. 360.
- Walsingham, Lord.** (1). New Corsican and French Micro-Lepidoptera (Contin., cf. vor. Bericht p. 645 sub No. 8). Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 12 (37), July, p. 177—(180), Aug. p. 181—184.
 6 (5 n.) sp. — 4 n. spp.
 — (2). Spanish Microlepidoptera. t. c. Oct. p. 233—239.
- Walsingham, Lord and John Hartley Durrant.** Revision of the Nomenclature of Micro-Lepidoptera (Contin. von Titel p. 645 sub No 1 des vorig. Berichts). Entom. Monthly Mag. vol. 12 (37), Aug. p. 189—190.
- Warburg, J. C.** On some Races of *Lasiocampa quercus*. Entom. Record, vol. 13. No. 8. p. 237—240. — No. 9. p. 256—259. — No. 11. p. 313—317. — concl. No. 12. p. 338—342.
- Ward, W. T. C.** *Vanessa io* near Londonderry. The Irish Naturalist, vol. 10. No. 9. p. 172.
- Warne, Em.** *Deiophila pulchella* in Surrey. The Entomologist, vol. 34. Oct. p. 297.
- Warren, W.** (1). New Thyrididae, Epiplemidæ and Geometridæ from the Aethiopian Region. Nov. Zool. Tring, vol. 8. No. 1. p. 6—20.
 Behandelt 33 Sp. (32 n. + 1 bek.), nebst den neuen Gatt. *Chloroteras*, *Mesocolpia*, *Mimoclystia*, *Dasymacaria*. Sie vertheilen sich folg.:
Thyrid.: *Dysodia* (1), *Tridesmodes* (1). — *Epipleme.*: *Gathynia* (1). — *Geometr.*: *Geometrinae*: *Chlorodrepana* (1), *Chloroteras* n. g. (1), *Victoria*. — *Sterrhinæ*: *Craspedia* (3), *Phyletis* (1), *Problepsis* (2), *Ptychopoda* (1). — *Astheninæ*: *Asthenotricha* (1). — *Tephroclystiinæ*: *Calluga* (1), *Mesocolpia* n. g. (1), *Tephroclystia* (1). — *Hydriomeninæ*: *Collix* (1), *Epirrhoe* (1), *Glaucopteryx* (1), *Mimoclystia* n. g. (1). — *Deiliinæ*: *Heterostegane* (1). — *Ascotinæ*: *Alcis* (2 + 1 bek.), *Chogada* (1). — *Fidoniinæ*: *Fidonia* (1). — *Selidoseminæ*: *Thysanopyge* (1). — *Ennominae*: *Aeschropteryx* (?) (1), *Dasymacaria* n. g. (1), *Epigynopteryx* (2), *Neuropolodes* (1), *Paracrocota* (1).
 — (2). New *Uraniidæ*, *Epiplemidæ*, and *Geometridæ* from the Oriental and Palæarctic Regions. t. c. p. 21—37.
 36 (35 n.) spp.; n. g.: *Amoebotricha*, *Monochyria*, *Didymoctenia*, *Scionomia*.
 Die Vertheilung ders. ist folgende: *Uraniidæ*: *Stesichora* (1). — *Epiplemidæ*: *Epiplema* (1). — *Geometr.*: *Sterrhinæ*: *Brachycola* (1), *Craspedia* (3), *Emmiltis*, *Phrissosceles* (1 bek.), *Pisoraca* (1), *Ptychopoda* (4). — *Hydriomeninæ*: *Amoebotricha* n. g. (1), *Cidaria* (1), *Epirrhoe* (1), *Kuldscha* (1), *Larentia* (1 bek.), *Monochyria* n. g., *Perizoma* (2), *Pseudocollix* (1), *Xanthorhoe* (1). — *Tephroclyst-*

tinae: *Gymnoscelis* (1), *Megatheca* (1), *Micrulia* (1), *Tephroclystia* (1). — *Braccinae*: *Bursada* (1). — *Ascotinae*: *Alcis* (1 + 1 n. aberr.). — *Didymoctenia* n. g., *Ectropis*(?) (1 n.). — *Scotopteryginae*: *Scotopteryx*(?) (1). — *Fidoniinae*: *Chiasmia* (1). — *Selidoseminae*: *Scionomia* n. g. — *Semiothisinae*: *Gubaria* (1). — *Ennominae*: *Eurytaphria* (1), *Prionia* (1), *Zanclopera* (1).

— (3). *Drepanulidae*, *Uraniidae* and *Geometridae* from the Palaearctic and Indo-Australian Region. t. c. p. 190—201.

25 (20 n.) spp.; n. g. *Ametroptila*, *Mimozethes*, *Mnesiloba*, *Yashmakia*.

Vertheilung ders.: *Drepanulidae*: *Ametroptila* n. g. (1), *Mimozethes* n. g., *Problepsidis* (1), *Pseudomodesa* (1). — *Uraniidae*: *Stesichora* (1). — *Geometridae*: *Dysphaniidae*: *Dysphania* (1 bek.) — *Geometrinae*: *Microloxia* (1), *Prasinocyma* (1). — *Sterrhinae*: *Craspedia* (3), *Hemipogon* (1), *Ptychopoda* (1). — *Astheninae*: *Cretheis* (1 bek. + 1). — *Tephroclyst.*: *Ardonis* (1), *Mnesiloba* n. g., *Deiliniinae*: *Hesterostegane* (1), *Yashmakia* n. g. (1 n.). — *Braccinae*: *Bursadopsis* (1). — *Abraxinae*: *Obeidia* (1). — *Bistoninae*: *Eubyja* (1 n. ab.). — *Ascotinae*: *Alcis* (1). — *Fidoniinae*: *Proteostrenia* (1 n. ab.). — *Ennominae*: *Auzeodes* (1), *Hypochrosis* (1 bek.), *Hyposidra* (1).

— (4). *Drepanulidae*, *Thyrididae*, *Epiplemidae* and *Geometridae*. t. c. No. 3. p. 202—217.

38 (33 n.) spp.; n. g.: *Mixocera*, *Pycnodontia*, *Cacostegania*, *Acanthoscelis*.

Vertheilung: *Drepanulidae*: *Ausaris* (1), *Phalacrothyris* (1 bek.). — *Thyrididae*: *Dysodia* (1). — *Epiplemidae*: *Epiplema* (3). — *Geometridae*: *Pseudoterpninae*: *Pingasa* (1). — *Geometrinae*: *Antharmostes*(?) (1). — *Eucrostes* (1), *Mixocera* n. g. (1), *Pycnodontia* n. g. (1), *Rhomborista* (1 bek.). — *Sterrhinae*: *Pacrista* (1), *Craspedia* (3 + 1 bek.), *Janarda* (1). — *Tephroclystiinarum*: *Gymnoscelis* (2). — *Astheninae*: *Asthenotricha* (1), *Dichroma* (1). — *Hydriomeninae*: *Ochyria* (1). — *Palyadinae*: *Melinoessa* (1). — *Deiliniinae*: *Cacostegania* n. g. (1), *Zamarada* (2 + ? 1). — *Semiothisinae*: *Gonodela* (1), *Semiothisa* (1), *Tephriopsis* (2). — *Ennominae*: *Acanthoscelis* n. g. (1), *Aeschropteryx* (2 n. ab. + 1). *Epigynopteryx* (1), *Eurythecodes* (1), *Paracrocota* (1 = *Aspilates* sp.).

— (5). New American Moths. t. c. No. 4. p. 435—492.

136 Arten, dar. 126 neue. Neue Gatt.: *Agriochlora*, *Acrista*, *Episcea*, *Heterocrita*, *Melochlora*, *Mesothea*, *Neocrasis*, *Anthalma*, *Apleria*, *Anomoneura*, *Stamnoctenis*, *Apodroma*, *Leuculopsis*, *Mimeophyle*, *Dasciopteryx*, *Callopsiodes* u. *Mimosema*.

Eupterotidae: *Agriochlora* n. g. (1). — *Thyrididae*: *Siculodes* (1). — *Aorista* n. g., *Hemioplisis* (1), *Siculodopsis* (1). — *Geometridae*: *Oenochrominae*: *Leptoctenopsis* (1). — *Cylopodinae*: *Cylopodia* (1), *Darna* (1), *Dioptis* (3), *Ephialtis* (1 bek. + 3 + 1 ab.), *Episcea* n. g. (2), *Josia* (3 + 2 ab.), *Phaeochlaena* (3), *Scea* (1),

Tithraustes (5). — Geometrinae: Heterocrita n. g., Melochlora n. g. (2), Mesotheca n. g. (1), Miantonota Warr. Bemerk., Neocrasis n. g. (1), Oospila (1), Phrudocentra (1 ab.), Racheospila (6), Tachyphyle (1). — Sterrhinae: Anisodes (3), Anteois (2), Arhostia (2), Rhodochlora (1), Craspedia (3), Haemalea (1), Pogonogya (1), Ptychopoda (2), Heterephyra (1). — Astheninae: Cambogia (7), Eois (1). — Hydriomeninae: Anthalma n. g. (1), Coenocalpe (1), Epirrhoë (7), Eulype (1), Hammaptera (2 + 1 ab.), Pelurga (1 bek.), Plemyriopsis (1), Polyphasia (1), Rhopalista (1 bek.), Spargania (2). — Trichopteryginae: Aperia n. g., Anomoneura n. g. — Eucestiinae: Cophocerotis (1), Graphidipus (1), Stammoctenis n. g. — Heterusiinae: Apodroma n. g. (1), Erateina (1), Heterusia (2). — Eudulinae: Eudule (1). — Tephroclystiinae: Tephroclystia (2). — Braccinae: Nelo (1 ab. + 1). — Nephodiinae: Leucula (1). Leuculopsis n. g. (1), Nipteria (3). — Ascotinae: Alcis (1), Cymatophora (1), Hymenomima (1), Stenalcidia (1), Scotopterix (1). — Fidoniinae: Fidonia (1), Mimophyle (1), Narragodes (1), Scoria (1). — Selidoseminae: Dasciopteryx n. g., Thysanopyga (1), Semiothisinae: Syrrhoedia (1), Tephropsis (1). — Ennominae: Anisoperas (1), Azelina (1), Brachysema (1), Callopsiodes n. g. (1), Certima (2), Cyclomia (1), Ellopia (1), Epiplatymetra (1), Euangerona (1), Ira (1), Microgonia (1 bek. + 1), Mimosema n. g. (1), Nematocampa (1), Neodora (1), Paracomistis (1 bek. + 2), Periclina (1), Pero (2), Prochoerodes (1).

Watts, Ch. W. Resting of *Vanessa urticae*. Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 12 (37). Nov. p. 275.

Webb, Sydney. Note on *Metzneria littorella* Dgl. Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 12 (37). June, p. 149—150.

Webster, J. M. Results of some Experiments in Protecting Apples from the Attacks of the second Brood of Codling Math. With 1 fig. 31. Ann. Rep. Entom. Soc. Ontario, 1900. p. 37—38. — *Carpocapsa pomonella*.

Weeks, Archibald C. An Aberration of *Papilio Philenor*. With 1 pl. Journ. New York Entom. Soc. vol. 9. No. 2. p. 82—83.

Weeks, A. G. (1). New Lepidoptera from Bolivia. Entom. News, vol. 12. No. 9. p. 264—267.
4 neue Arten.

— (2). New diurnal Lepidoptera from Bolivia. Canad. Entom. vol. 33. No. 10. p. 265—269, No. 11. p. 293—296. — Contin. No. 12. p. 321—324.

p. 265—269: 8 neue Arten.

p. 321—324: neue Arten: *Pytonides hirta*, *Thecla Francis*,

Nisoniades tithoneta.

— (3). Description of Nine New Bolivian Butterflies. Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27. No. 4. p. 353—360.

Weissmantel, W. *Saturnia spini* mint kártékony állut. Rovart. Lapok, 8. köt. 7. füz. p. 145—146. — Ausz. S. sp. als Schädling, Hft. 7. p. 18.

— (2). *Saturnia pyri* t. c. 5. füz. p. 106. — Ausz. No. 5. p. 12.

— (3). *Deilephila celerio* L. t. c. p. 107. — Ausz. No. 5. p. 12.

— (4). *A Deilephila nerii*-röl. II. D. n. előfordulása. t. c. 6. füz. p. 110—112. — Ausz. (über das Vorkommen von D. n.) No. 6. p. 13.

Wells, H. O. *Lepidoptera in the New Forest at Whitsuntide.* The Entomologist, vol. 34. July, p. 207—208.

Wendland, . Beobachtungen über einige bemerkenswerthe paläarktische Lepidopteren. Jahrb. Nassau. Ver. f. Naturk. 54. Jhg. p. (73) 75—87. — Apart: Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1901. 8°. M. —, 60.

Bringt 1. Neuere Beobachtungen über seltene Schmetterlingsarten und -Varietäten, welche schon von Roessler, Fuchs u. A. für St. Goarshausen bekannt gemacht waren (p. 77—81). — 2. Beobachtungen ferner über seltene Arten, welche zwar in einer oder der anderen nassauischen Oertlichkeit, aber bisher noch nicht bei St. Goarshausen gefunden waren (p. 81—84), und 3. Beobachtungen, endlich von Arten, welche aus dem Reg.-Bez. Wiesbaden überhaupt noch nicht bekannt waren (p. 84—85). — Daran schliessen sich die Beschr. von *Agrotis chardinyi* var. *Fuchsii* n. etc. (p. 85—87).

Wheeler, G. A fourth Season among Swiss Butterflies. Entom. Record, vol. 13. No. 4. p. 117—121.

Wheeler, Wm. C. E. *Oenistis (Gnophria) quadra* in Dublin. The Entomologist, vol. 34. Aug. p. 230.

Whitaker, A. Larvae of *Sphinx convolvuli* in Yorkshire. Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 12 (37). Oct. p. 257—258. — In Surrey (H. Goss) *ibid.* p. 258.

Whittaker, Osc. Notes from Somersetshire. The Entomologist, vol. 34. Jan. p. 24.

Whittle, F. G. (1). *Lepidoptera in 1900 in the Southend District.* Entom. Record, vol. 13. No. 6. p. 190—192.

— (2). *Lepidoptera in Essex.* t. c. No. 10. p. 303.

— (3). *Lepidoptera in the Southend District.* t. c. No. 12. p. 372.

Winkler, Hans. Ueber die Furchung unbefruchteter Eier unter der Anwendung von Extraktivstoffen aus dem Sperma. Nachr. d. k. Ges. d. Wiss. zu Göttingen, Mathem.-phys. Klasse. 1900. Hft. 2.

Es ist durch verschiedentliche Versuche festgestellt, dass sich Eier gewisser Thiere, die sich normalerweise nicht parthenogenetisch fortpflanzen, auch ohne Befruchtung, lediglich durch die Einwirkung von Chemikalien zu mehr oder weniger weitgehender Furchung bringen lassen. So hat, um von Lepid. zu sprechen, Tichomirow Eier von *Bombyx mori* durch Eintauchen in concentrirte Schwefel-

säure (oder auch durch längere Zeit andauerndes Bürsten) zur Eingehung einiger Theilungen veranlasst.

Winn, Albert F. Curious Effect of the Attack of an *Asilus* Fly on *Colias phylodice*. *Canad. Entom.* vol. 33. No. 12. p. 330—331.

Wolley, Dod. F. H. (1). Preliminary List of the Macro-Lepidoptera of Alberta, N.-W. T. *Canad. Entom.* vol. 33. No. 2. p. 40—42, No. 6. p. 157—172.

— (2). *Pyrameis cardui*. t. c. N. 8. p. 237.

Woodbridge, Frc. C. *Selenia tetralunaria* (illustraria) in Scotland. *The Entomologist*, vol. 34. June, p. 179.

Woodforde, F. C. (1). *Noctua castanea* Esp., var. *Xanthe* var. n. *Entom. Monthly Mag.* (2.) vol. 12 (37). May, p. 116—117.

— (2). *Brephos nota* in Worcestershire with some Notes on the Habits of the Imagines. *Entom. Record*, vol. 13. No. 6. p. 195—196.

— (3). Habits of *Asthena sylvata*. t. c. No. 9. p. 276.

— (4). Variation of *Zonosoma pendularia*. t. c. No. 10. p. 296.

— (5). Some exceptional sizes in Lepidoptera. t. c. No. 12. p. 359.

— (6). Lepidoptera in North Wales. t. c. No. 12. p. 369.

— (7). Lepidoptera in South Devon. *Entom. Record*, vol. 13. No. 10. p. 304.

Wormsbacher, Hy. Captures of 1900 (No. 3). *Entom. News*, vol. 12. March, p. 91.

Wynn, G. W. Lepidoptera at Sugar in Warwickshire in 1900. *Entom. Record*, vol. 13. No. 5. p. 164.

Nachtrag.

Adkin, R. Siehe *Cossus ligniperda*.

Agassiz, G. Catalogue des variétés et aberrations de ma collection. *Macrolépidoptères de la zone paléarctique*. *Mittheil. Schweiz. Entom. Ges.* 10. Bd. p. 237—256.

Austaut. Notices sur deux variétés inédites du *Parnassius apollo*. *Le Naturaliste*, 22. Année 2 sér. 1900 p. 142.

Barrett, Charles G. The Lepidoptera of the British Islands. vol. VII Pp. 1—336. London: Lovell Reeve & Co. 1901.

Behandelt den Rest der Boarmiidae, die Geometridae, einen Theil der Acidaliidae, insgesamt 43 Gatt. u. 85 Arten. *Abraxas pantaria*, *Dasydia torvaria* u. *Mniophila cineraria* werden aufgeführt, aber nicht als britische Arten behandelt. *Tephrosia biundularia* Esp. (= *crepuscularia* Hübn.) werden ausführlich besprochen. Es ist viel darüber u. sogar sehr hitzig diskutiert worden; das Resultat ist: beide Rassen bilden eine Art.

[**Clerck, Carolus.** *Icones insectorum rariorum*. 1759 u. 1764 auf Veranlass. der Königin Ulrike von Schweden herausgegeben.

Sehr gute Abb. nach der im Schlosse Drottningholm befindlich. Sammlung, nach welcher Linné beschrieben hat. — Befindet sich in der Königl. Bibliothek zu Berlin.]

Darboux, G. et Houard, C. Catalogue systématique des Zoocécidies de l'Europe et du Bassin méditerranéen. Avec une préface par A. Giard. Gr.-8°. XI + 564 p. 863 figs. (dav. 608 Orig.). — Enthält die Beschr. von 4169 Cecidien. Preis 30 Fr.

Distant, W. L. (Titel p. 649 dieses Berichts). Bringt nn. spp. der folg. Gatt.: *Proruca* (1), *Xanthoptera* (1), *Eutelia* (1), *Plusia* (1).

Doherty, Will. (geboren am 15. Mai 1857 in Cincinnati, Ohio, gestorben zu Nairobi, 25. Mai 1901 an Dysenterie).

Obituary von Ernst Hartert, Nov. Zool. Tring, vol. 8. No. 4. p. 494—506. Zusammenstell. seiner Reiserouten von 1878—1893, etc. — Liste der auf seinem Material basirenden (18) Arbeiten (ob vollständig?) p. 504—505. — Liste seiner lepidopt. (7) Publikationen (p. 505—506).

Hüttner, Aug. (Titel p. 592 des vorigen Berichts). Refer. Rebel, Verhdlgn. zool.-bot. Ges. Wien, 51. Bd. p. 384.

Illidge, R. Notes on the Entomology of a Tea Tree Swamp. Proc. Roy. Soc. Queensland, vol. XV 3 p. — Ref. von Chr. Schröder, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 155. — Führt auch Lep. auf.

Mayer. (Titel p. 606 des Berichts für 1900). Ref.: The Entomologist, vol. 34 p. 164.

Riesen, A. Beitrag zur Macrolepidopteren-Fauna der Insel Usedom. Stettin. Entom. Zeitung, 62. Jhg. No. 1—6 p. 160—8.

van Uldriks, F. J. en Bruinsma. Titel p. 585 des vor. Berichts. Refer. Illustr. Zeitschr. f. Entom. 5. Bd. p. 303.

Weed, C. M. (1). The forest tent-caterpillar (Second report). Bull. New Hampshire exp. Stat. Durham, 75, p. 109—130, fig. 37—51. — Ausz. von Chr. Schröder, Allgem. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 266—267. — Auch zahlr. Vögel sind Feinde.

— (2). The lives of some everyday butterflies, moths, grasshoppers and flies. New York, 162 pp., 150 illustrations. — Review, Entom. News, Philad., vol. XII p. 216.

Weeks, A. G. Illustrations of hitherto unfigured Lepidoptera (incomplete), 8°, 32 pp., 5 pls.; photographic views not numbered.

B. Uebersicht nach dem Stoff.

Statistik:

Variationsstatistik: Speiser (p. 191 Wert ders.) u. Smith, G. (*Erebia*).

Lokalstatistik: Eingesammelte Schädlinge in Bromberg und Umgegend (Insektenläse 18. Jhg. p. 317).

Mathematik: vaat.

Geschichte: Bachmetjew ¹⁾ (Lepidopterologen von Bulgarien), ^{a)}.

Historisches: Mottenfest ^{b)}.

älteste vorhandene Motte: Frohawk ²⁾ (Insektenbörse 18. Jhg. p. 292).

Verzeichnisse: Schreiber (Fauna von Regensburg).

Kataloge: Beutenmüller ⁹⁾ (Noctuiden im Umkreis von New York City), ¹¹⁾ (der beschrieb. Verwandl. austral. Lep.), Catalogue (Lep. Phalaenae d. Brit. Mus.), Kane ²⁾ (Irlands Lep.), Staudinger u. Rebel ^{1), 2) c)}, Stefanelli ^{1), 2)} (Toscana), Tutt ⁹⁾ (Staud. u. Rebel's).

Entwicklung des Katalogs (Zuwachs der Arten u. Gattungen): Staudinger u. Rebel, ^{d)}.

Listen: Butler, A. G. ¹⁾ (brit. Ostafrika, ²⁾ (Kikuyu Country, Mombasa), ⁸⁾ (Weisser Nil), ⁴⁾ (Mombasa—Taveta), ⁵⁾ (Munis, Mount Kenya), ⁷⁾ (Uganda Protectorate), ⁹⁾ (North Nigeria), ¹²⁾ (Hunan), Donovan (Lep. von County Cook), Fletcher, Th. B. ³⁾ (Wei-Hai-Wei), Green (am elektr. Licht auf Ceylon erbeutete Lep.), Gross (Macros von Oberösterreich u. Steiermark), Grote, A. R. ¹⁰⁾ (nordamerik. Apatela), Hampson ²⁾ (Bahama-Lepid.), Hanham ²⁾ (Manitoba), Kane (Lepidoptera of Ireland), A. von Lafaury (siehe Consant, Publikationen dess.), Lathy (Lepid. v. Zomba), Leech ¹⁾ (seiner Publikationen), Malloch (Tortr. u. Tineid. v. Parish of Bonhill, Dumbartonshire), de Nicéville and Manders (der Lepid. von Ceylon nebst Bemerk.), Prout (Grinons), Pavel ¹⁾ (Lepid. der 3. asiat. Forschungsreise), Riesen (Macrolep. v. Uselom), Rothschild (Lep. v. Egypten u. vom Sudan), Schneider (Bergen), Slater (Lepid. von St. Lucia), Strand ¹⁾ (norweg. Lepid.), Therese, Prinzessin von Bayern (Südamerik. Lepid. nebst Bemerk.), Wolley (Lepidopt. of Alberta, N.-W. T.), ^{e)}. — Macrolepidoptera von Kendal, siehe unter Grossbritannien. Kendal.

Etiquettenliste siehe unter Technik.

Prodromus: Himsl (der Macrolep. des Traun- u. Mühlkreises).

Tabellen: Ball (Einfluss der Temperatur auf Puppen), Marshall, Guz A. K. (betr. Exper. über den Saisondimorphismus).

illustr. analytische: André, Frionnet (der Raupen der Haute Maine).

Synonymie: Rebel ³⁾ (Geometr.), Smith, J. B. ¹⁾, Stichel ¹⁾ (Catonephelē).

Monographien: Cannaviello ²⁾ (Beiträge zu einer solchen von Macroglossa), ⁶⁾ (dito zu Vanessa: Grapta), Pagenstecher ¹⁾ (Nyctemera), ⁵⁾ (Lilythidae), Ragonot (Phycitinae u. Galleriinae), Riffarth ¹⁾ (Heliconius), (Ronanoff).

^{a)} Schmetterling auf der Hand der Kaiserin Friedrich in der Todesstunde. Insektenbörse, 18. Jhg.

^{b)} Insektenbörse 18. Jhg. p. 364 (Ende August 1901 wiederhol. — 1504 zum ersten Male gefeiert).

^{c)} Referat: Insektenbörse 18. Jhg. p. 177. Papier u. Druck gut. — Auch Chr. Schröder hält die Anordn. in St.'s Katalog für keine endgültige. Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 269.

^{d)} Herausgabe eines handschriftl. Katalogs aller neuen Gatt. u. Arten für bestimmte Gruppen oder Faunen etc. vom Concilium bibliographicum. Insektenbörse 18. Jhg. p. 410. — Wird angezweifelt. — Der bereits existierende Zettelkatalog lässt an Vollständigkeit u. Ausführlichkeit zu wünschen übrig.

^{e)} Ueber Lepidopterenlisten für Händler (Preise, Seltenheit) siehe Insektenbörse.

Synopsis: Standfuss ¹⁾ (der Hybrid.-Experim.).

Revisionen: Butler, A. G. ⁹⁾, Dietz (Pigritia), French ¹⁾ (Catocala, de Nicéville ³⁾ (der Rhopal. d. Canaradistriktes, Bombay), Schaus ⁷⁾ (Notodontidae), Walsingham & Durrant (der Nomenklatur bei den Microlep.).

Bemerkungen: de Crombrugge de Picquendaele (Microl. d. belg. Faune), Dyar ¹¹⁾ (Ueber Grote's Bem. zu den Saturn.). Grinnell, Grote, A. R. ¹⁾ (Laspeyria), ²⁾ (Samia), Heath, E. F. (Lep. in South Manitoba), Hopson ²⁾ (Apat. iris on the Hants Borders), Joutel ¹⁾ (Sesia sigmoidea), Ketel (zu ein. Schmetterl. in Mecklenburg), Krulikowsky (Neue Varr.), Lyman ³⁾ (Gortyna), Marloff (Scoliopteryx libatrix in a mine), Moffat ²⁾ (Anosia archippus), Montgomery (Colias edusa n. var.), Moss (Colias edusa, Acherontia atropos), Nash (Danais archippus), de Nicéville ²⁾ (Calinaga), ⁴⁾ (subg. Tronga), de Nicéville and Manders (zu den Lepid. von Ceylon), Nicholl ¹⁾, ²⁾ (zu den Tagfaltern vom Libanon), Oberthür ²⁾ (Hadena 2 spp.), ³⁾ (Phragmatobia fuliginosa var. n.), Partridge (zum Treiben v. Agrotis Ashworthi), Reid ¹⁾ (Lepid. Bemerk. über das Jahr 1900), Ribbe ²⁾ (zu kürzlich neu beschrieb. Lep.), Sharpin (Lep. von Brodick, Arran), Sladen ¹⁾ (Wiltshire), Slosson ¹⁾ (Successful failure), ³⁾ (Enaemia crassinervella), Smith, J. B. ⁴⁾ (Mamestra u. Verw.), Snellen ²⁾ (Pyaliden), Snyder, Prof. and Mrs. A. J. (Over the Range in a Wagon), Stevenson (Not surprised. Betrifft Telea polyph.), Swainson ¹⁾ (Lep.-Raupen), ²⁾ (Lep.-Raup. von Jamaica), Thornevill (Raupe von Eupithecia subfulvata), Webb (Metzneria littorella).

Einführungen: Kirby.

Beiträge: von Bönninghausen (z. Lep.-Fauna von S. Bras. etc.), Cannaviello ²⁾ (zu ein. Monogr. von Macroglossa), ⁶⁾ (dito zu Vanessa: Grapta), Czekelius (zur Schmett.-Fauna von Siebenbürgen), Dietze ¹⁾, ²⁾ (Zur Kenntniss der Eupitheciën), Fassl ¹⁾ (Josephstadt), Hauder (zur Lep.-Fauna von Oesterreich ob der Enns), Metzger (Weyer, Oberösterreich), Montandon (zur Fauna Rumäniens), Naufock (zur Zucht von Lignyoptera fumidaria), Neustetter ¹⁾ (Macrol.-Fauna von Kärnthen), Pagenstecher ¹⁾ (z. Lepid.-Fauna d. malayisch. Archipel), Schille ²⁾ (zur Biologie von Phlyctaenodes sticticalis), Strand ¹⁾ (Fauna von Norwegen), Teich (Baldohn), Uffeln (Mamestra glauca und Drynobia melagona), Uhryk (ungar. Fauna).

Studien, Untersuchungen, Versuche:

Studien: Favre (über die Eupitheciën von Valois), Kraepelin ^{a)}, Skinner ¹⁾ (nordamerik. Rhopal.).

vergleichende: Dyar ¹⁴⁾ (von 7 jung. Arctiiden).

Untersuchungen: Kritische: Lathy ²⁾ (Dircenna Barrettii).

Versuche: Kollmorgen (einer Macrolep.-Fauna von Corsica).

Zeitschriften: (Swetulka: Leuchtturm ^{b)}).

^{a)} Naturstudien im Hause.

„ im Garten.

„ in Wald u. Feld. } Teubner's Verlag. à M. 3,40.

^{b)} Organ der ersten bulgarischen entomologischen Gesellschaft in Slivno. 1899 begründet. Erscheint monatlich.

Kalender, Jahrbücher: Krancher ³⁾, Schreiber (Raupenkalender, tabellarisch).

Berichte: Froggatt (Kartoffelplage in Windsor).

Jahresbericht: Annuario etc. ^{b)}.

Fortsetzungen: Fischer²⁾ (Experim.-Forschungen), Himsl (Prodromus), Riffarth¹⁾ (Heliconius), Walsingham a. Durrant (Forts. d. Nomenkl.).

Nachträge, Ergänzungen, Zusätze:

Nachträge: Höffner (Schmetterl. des Lavantthales etc.), von Hoyningen-Huene¹⁾ (Teich's balt. Lep.-Fauna), Metzger (Oberösterreich, zur Lepid.-Fauna), Sorhagen (Grabowiana).

Ergebnisse: Gauckler ³⁾ (Karlsruhe).

Ergänzungen, Supplemente: Kane¹⁾ (zur Liste der Lepidopt. of Ireland), Stichel⁶⁾ (zum Artikel über Varr.), ⁷⁾ (zu Parn. apollo) [siehe ferner unt. Verbesserung].

Zusätze: Dale²⁾ (zu den Lep. von Glanvilles Wootton), Hanham¹⁾ (zur Liste der Manitoba-Lep.), Rothschild u. Jordan ^{c)}.

Mittheilungen: Koča.

vorläufige: Vignon (Histologie von Bombyx mori).

Berichtigungen, Verbesserungen:

Berichtigungen: Clark²⁾ (Lycaena), Cowl⁵⁾ (zum Ausschl. von Pachytelia villosella), Grote, A. R.¹⁾ (Agronoma), ⁴⁾, Stichel⁶⁾ (z. Artikel üb. Varr.).

Merkwürdige Angabe in Stgr.'s Katalog: Wendland p. 87 (bezügl. Agrotis chardinyi).

Verbesserungen: Chapman³⁾ (Erebia glacialis), Prout⁶⁾ (Nomenklatur), Staudinger u. Rebel, Stichel⁶⁾ (Berichtig. u. Ergänz. zur Monographie in Bd. 45 (im Text steht 44 [cf. Bericht f. 1900 p. 637 sub 2])).

Uebersichten: Collamarini ^{d)}, Hering (der Sumatra - Pyraliden), Junkel (über die Tagschmetterl. der Umgebung von Krimmitschau).

über beschriebene Arten: Staudinger u. Rebel.

Rückblick: Dyar⁴⁷⁾ (ein Jahrhundert von Raupen-Beschreibungen), Fernald³⁾ (ein Jahrhundert nordamer. Lepid.-Forschung), Grote, A. R.¹¹⁾.

Theorien. Charaktere. Principien: vacant.

Vergleiche siehe Unterscheidung.

Uebersetzungen: vacant.

a) Entom. Jahrbuch für das Jahr 1902. XI. Jhg. Leipzig 1902. Frankenstein u. Wagner. M. 1,60.

b) Zoological Report for 1901 (1902) London. XIII. Insecta. Lepid. u. Zool. Jahrb. Neapel 1902. Bericht f. 1901.

c) Versuch mit 3 Farbendruck. Im allgem. zu rot, doch gut gerat. bes. d. Saturn. Das metall. Grün u. Blau tritt nicht scharf hervor, gelb und rot sind nicht leuchtend genug.

d) Collamarini, G. Biologia animale (Zoologia generale e speciale). 23 tab. 426 pp. in „Manuali Hoepli“ No. 300—301. Milano 1900. — Die Man. Hoepli sind in Italien ungefähr das, was bei uns die „Weber'schen Katechismen“ sind. Also für billiges Geld eine gedrängte Uebersicht des Wissenswertesten. — Auch Lep. besprech. u. abbildend. cf. Ref.: Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 189.

Bibliographie: Prout⁴⁾ (Lepid. Literatur des 19. Jahrhunderts), Sherborn^{a)} Sherborn u. Woodward (Daten von Esper's Schmetterlinge)^{b)}.

Publikationsdaten einer Reihe von französ. Reisewerken: Sherborn und Woodward^{c)}: Voyage en Abyssinie, dans les Prov. du Tigre etc. par, Ferret et Galinier, Guérin, Reiche [1850], dito par Comm. scient. Lefebvre's: Guér. Méneville [1849]; Voyage en Algérie: Lucas [1846—1849, Einzelheiten siehe p. 163]; Expéd. dans les parties centr. de l'Amér. d. Sud: Lucas [1859]. — p. 333—336: Voyage de l'Astrobale etc. Dumont d'Urville: Lépid. [1832]; Voy. autour du Monde . . Favorite . . Laplace. Feisthamel Lep. [1839]; Voy. dans l'Inde, Jacquemont. Insecta v. Blanchard [1844]; Expéd. scient. de Morée [Lep. 1832]. — p. 493. Faune française [niemals beendet, Daten nach Bibliog. Franç. Lep. p. 1—96. July 1821; p. 97—176. Apr. 1829; p. 177—256. Dec. 1829].

Neuere Arbeiten: Poling (Catocala).

Kritiken: Butler, A. G.^{d)}, Czekelius²⁾ (der Literatur Siebenbürg. Lep.), Fischer²⁾ (Ursache und Wesen der Kälte-Varietäten der Vanessen), Giard (Bestimmung des Geschlechts), Schnabel^{e)} (Rössler's Raupenbestimmungswerk), Tutt^{f)}.

Kritische Untersuchungen: Lathy²⁾ (Dircenna Barretti).

Nachlässigkeiten: Unwissenschaftlichkeit verschiedener Lepidopterologen^{g)}.

Proteste etc.: Smith, J. B.³⁾.

a) Publikationsdaten z. Moore's Lepidopt. indica. Pt. XX—L. Berichtigung. (1895—1901).

b) Esper's Schmetterlinge. Erscheinungsdaten tabellarisch zusammengestellt. Sherborn, Davis & Woodward, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 137, tabellar. Zusammenst. p. 138—140.

c) Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 161—164, 333—336, 491—493.

d) Staudinger bezügl. der Bestimmung paläarktischer Schmetterlinge weltberühmt, in puncto exot. weniger sorgfältig (careful). Verschiedene Tiere tragen Manuskript-Namen und sind mit solchen in den Handel und in die Sammlungen gelangt, ohne auf ihre Identität mit bereits bek. geprüft zu sein. Butler, A. G., The Entomologist, vol. 34 p. 301.

e) Bestimmung darnach recht umständlich; Beschr. ungenau etc. Zeitschr. f. Entom. Breslau 1901 p. IX.

f) Tutt tadelt die Art wie Staudinger's Katalog alle wichtigen u. unwichtigen Farbenspielarten der deutschen Fachpresse aufführt, die allein gut durchgearbeiteten britischen Thiere jedoch nicht, obgleich er sie nicht für belanglos hielt, sondern einer Anzahl sogar neue Namen gegeben hat, so Agrotis similans ab. suffusa = obscurata Staud.; Agr. cursoria ab. sagitta = sagittata; Jocheraera alni ab. suffusa = steinerti Casp. — Die Deutschen sollten sich mehr um die Literatur kümmern. — So ganz Unrecht hat er nicht. Insektenbörse 18. Jhg. p. 306.

g) Sucht der Benennung von Varietäten u. Abberationen, Citiren von Art-namen ohne Autor oder ohne Gatt. Speiser im Entom. Jahrb. 1901. Lieber dafür die Zahl der Eier in Gelegen zählen etc. Cf. auch Insektenbörse, 18. Jhg. p. 402.

Streiflichter: auf die lepidopt. Arbeiten des 19. Jahrhunderts: Chapman¹⁾.

Besprechungen: Doboneck^{a)}.

Bezeichnung (einheimische u. populäre).

Ungarische (in der Uebersetzung): siehe Acherontia.

Amerikanische: Chittenden¹⁾ (*Laphygna frugiperda* S. u. A. = The Fall Army Worm), Chittenden¹⁾ (*Peridroma sancia* Hübn. = variegated Cutworm), Chittenden²⁾ (*Plathypena scabra* Fabr. = Green Clover Worm), Clarke, W. T. (*Gelechia operculella* = Potatoe worm in California), Doane and Brodie (*Peridromia saucia* = variegated cutworm), Davis³⁾ (Dog Head's Butterfly on Staten Isl.), Fletcher, J. (Codling Moth = *Carpocapsa pomonella*), Fletcher, J. Gibson (Greenhouse Leaf Tyer = *Phlyctaenia ferrugalis* Hbn. = *Botis Harveyana* Grt.), Hinds (Fall cancerworm = *Alsophila pometaria* Peck.), Kirkland (Brown-tail Moth in Massachusetts), Slingerland (Peach-tree-borer = *Sannina exitiosa*), Webster (Codling moth = *Carpocapsa pomonella*). — Im übrigen sind eventuelle Bezeichnungen aus dem system. Theile unter den einzelnen Arten ersichtlich.

Lehrbücher, Handbücher: Bachmetjew¹⁾ (bulgarische, siehe unter Technik). — Siehe ferner unter Sammelwerke.

Reisebeschreibungen: Semper (Philippinen, Heterocera).

Sammelwerke: Buckler (Raupen britisch. Lep.), Dieckerson (Moths and Butterflies^{b)}), Godman u. Salvin (Biol. Centr. - Amer.), Rockstroh (Buch der Schmetterlinge), Romanoff (Mém. sur les Lépid. Phycit. u. Galler.), Kirby (Familiar Butterflies and Moths^{c)}), Spuler (Schmetterlinge Europas, 3. Aufl.), Thiele^{d)} (Hoffmann's Schmetterlingswerk).

Index: Strecker (zu Kirby's Katalog).

Literatur: Bachmetjew¹⁾ (Bulgarien^{e)}).

^{a)} Scheint brauchbar zu sein. Es lässt sich gut nach bestimmen. Biolog. Notizen. Zeitschr. f. Entom. Breslau, 1899 p. XIX.

^{b)} Ref.: Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 101—102.

^{c)} Small 4°. London, Paris, New York and Melbourne, Cassel & Co., Limited, 1901. — Ref. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 229.

^{d)} Bespr. Berlin. Entom. Zeitschr. 47. Bd. Sitz.-Ber. f. 1901 14. Nov. — Insektenbörse 18. Jhg. p. 413. — Abb. in früherer Auflage zu bunt, jetzt matt, wie nach alt. Origin. kolorirt. Fortlassen der Sp.-Namen auf den Tafeln kein Fortschritt.

^{e)} Es seien daraus noch folg. Titel erwähnt, die in den Berichten bisher noch nicht berücksichtigt wurden:

Anon. ? 1900. Raupen von *Eurycreon sticticalis*. Sejatsch (Warna) III Nr. 8 p. 507.

Joakimow, D. 1899. Beitrag zur Insektenfauna des Rylagebirges. Periodische Zeitschr. Sofia. LVIII p. 758—778. — op. cit. LX p. 858—884.

Kowatschew, W. T. 1898. Materialien zur Fauna der Umgebung von Rustschuk. Jahrb. d. bulg. naturf. Gesellsch. II Nr. 3 p. 20—28. Sofia.

— (2). 1894. Materialien zum Studium der bulgarischen Fauna. Period. Zeitschrift. Sofia. XLVII p. 742—749.

Nekrologe: zu Constant ^{a)} (von A. von Lafaury), Leech ¹⁾ ^{b)} (auch kurze Lebensskizze in Insektenbörse 18. Jhg. p. 41—42), Ormerod ^{c)}, Pavél ²⁾, Seebold ^{d)} (Staudinger). — Eine Reihe kurzer Nekrologe mit Abbild. giebt auch Krancher ^{e)}.

Staudinger's Grabdenkmal: Entom. Jahrb. (Krancher) 11. Jhg. p. 90.

Atlanten, Tafeln, Abbildungen:

Tafeln: Peters'sche (siehe p. 682 dieses Ber.).

kolorirte: Piepers (Raupen verschied. Heter.). — Ausserdem in verschiedenen Publikationen (Zeitschriften).

Illustrationen: Sich (sind Imprints of Impressions).

Die **Sitzungsberichte** verschiedener engl. entom. Gesellschaften erscheinen gleichzeitig im Entomologist u. im Entom. Monthly Mag.

Referate: Es referirt: A bafi - Aigner ²⁾: Staudinger's u. Rebel's Katalog (weitere Referate des Katalogs siehe unter Staudinger u. Rebel). — Gebhard: Standfuss's Temperatur- u. Hybridationsversuche. — Prout ³⁾: (Staudinger's u. Rebel's Katalog. — Rebel: Strecker. — Rüber: Aurivillius („Rhop. exot.“).

Malkow, K. (1). 1896. Ueber Insekten an jungem Raps. Oralo (Sofia) III. Nr. 24 p. 418—419.

— (2). 1900. Feinde der Kulturpflanzen. Sadowo (Sadowo) III Nr. 9 p. 332—336, Nr. 10 p. 385—388.

Markowitsch. 1900. Beitrag zu Lepidopteren der Umgebung von Rasgrad. Swetulka (Slivno) I. Nr. 5 p. 14—35.

Nedelkow. 1895. Einige Worte über die schädlichen Insekten. Priroda (Sofia). II Nr. 5 p. 77—80.

P. 1899. Neu gefundene Schmetterlinge. Swetulka (Slivno) I Nr. 2 p. 14.

Pigulew, Chr. 1899—1900. Insekten von Slivno. I. Lepidoptera. Swetulka (Slivno) [Organ der bulg. entom. Ges.] I. Nr. 1 p. 6—8; Nr. 2 p. 14—18; Nr. 3 p. 22—24; Nr. 4 p. 31—32; Nr. 5 p. 39—40.

— (2). 1899. Die vertikale Vertheilung der Schmetterlinge bei Slivno. Swetulka I Nr. 1 p. 2—3.

— (3). 1899. Pieris napi L. t. c. Nr. 3 p. 22.

— (4). 1900. Schädliche Insekten in Bulgarien. t. c. Nr. 6 p. 45—47.

Todorow, T. 1897. Botys silacerlis Hb. Oralo (Sofia) IV Nr. 16 p. 253.

Trifon (1). 1896. Noch ein Feind an den Weinreben. Oralo (Sofia) III Nr. 12 p. 219—220.

— (2). 1897. Weinreben-Motte. t. c. Nr. 18 p. 280—281.

— (3). 1897. Die wichtigsten Insekten auf Rosen. t. c. Nr. IV Nr. 8, 9, 10, 11, 12, 15.

Walatschew, J. 1899. Einige Feinde der Obstbäume. Oralo (Sofia) VI. Nr. 17 p. 271—272.

^{a)} Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 173—174.

^{b)} t. c. p. 49—50.

^{c)} t. c. p. 230.

^{d)} Ann. Soc. Entom. France, vol. 70 p. 6—7.

^{e)} Entom. Jahrb. f. 1902 11. Jhg. p. 250—256 nebst divers. Abb.

Beobachtungen: Lowe³⁾ (*Lasiocampa quercus*), Oberthür¹⁾ (Dimorphismus u. Mimetismus v. *Paronia pulchra*), Petri (Stigmen von *Bombyx mori*), Rudow (*Galleria melonella*).

Eier: Bacot¹⁾ (*Lasioc. fasciat. var. excellens*), Chapman¹⁶⁾ (*Agrotis agathina*),¹⁹⁾ (*Lachneis lanestris*),²⁰⁾ (*Trochilium apiforme*, Clark¹⁾ (*Lepidopt.*),²⁾ (*Lycaenid.*), Cockerell, W. P. (*Arachnis Zuni*), Girault (*Thyridopteryx ephemeriformis*), Sich²⁾ (*Nepticula*), Tutt⁴⁾ (*Psodos trepidaria*).

Raupen: Beutenmüller¹⁰⁾ (dreier *Lep.*),¹²⁾ (*Catocala illecta*),¹³⁾ (*Homoptera edusa*), Bower⁴⁾ (*Plusia moneta*), Buckler (britisch. *Lepid.*), Draudt (*Eupithecia conterminata*), Chapman²⁵⁾ (von *Luffia lap.* im Sept.), Cockayne¹⁾ (*Nyssia lappon.*), Coquillet (Beschr. von 3 R.), Dyar⁶⁾ (*Enaemia crassin.*),⁸⁾ (2 Noct.),⁹⁾ (*Syntomeida epilais*),¹³⁾ (*Calybia slossoniae*),¹⁵⁾ (*Lagoa pyxidifera*),²⁰⁾ (*Eucheira socialis*),²³⁾ (*Lophostethus Dumolinii*),⁴¹⁾ (vorläuf. Bemerk. zu *Arctia*),⁴²⁾ (einige *Pyral.*),⁴⁴⁾ (*Arctia intermedia*),⁴⁵⁾ (*Psaphidia thaxterianus*),⁴⁷⁾ (ein Jahrhundert von Raupen-Beschreib.),⁵⁰⁾ Fitch (purpurne Raupe von *Sphinx ligustri*), (Húsevö etc.) (*Lycaena epius*), Mayer, A. G. (Vorhandensein u. Dauer geistiger Vorgänge), Metzzenauer^{a)} (Nervosität der R. v. *Van. antiopa*), Packard²⁾ (exot. *Ceratocamp.*), Peters (Abb. der Heter.-R. siehe p. 664 dieses Berichts), Rössler^{b)}, Russell (*Sphinx ligustri*, Verpuppung), Shephard-Walwyn¹⁾ (*Plusia moneta* zu Kent),²⁾ (desgl. zu Bidborough), Shibabigk¹⁾ (zur Raupenkunde), Studd (*Anthrocera trifolii*, 2 Winter überwintert), Swainson¹⁾ (Bemerk.),²⁾ (von Jamaica, Bemerk.), Thornevill (Bemerk. z. R. von *Eupith. subfulv.*). — Weiteres siehe unter Biologie.

Bestimmungstabellen: Frionnet (Raupen von Haute Marne).

Raupenkalender: Schreiber (nach Futterpflanzen geordnet).

Puppen: Chapman²²⁾ (Entw. der Imago in ders.),²⁷⁾ (Bemerk. z. Puppe von *Oeta floridana*) [nebst Dyar], Fowler¹⁾ (Töne ders.), Reuter, O. M. (*Bombyc.*), Shephard-Walwyn¹⁾ (*Plusia moneta*), Tutt¹⁰⁾ (Imaginalentw. in ders. von *Lachneis lanestris*).

Puppenhülsen: Schnabel^{c)}.

Puppenstadium: Chapman²³⁾ (*Lachneis lanestris*). — Verpuppung siehe unter Biologie.

Puppengehäuse: Adkin²⁾ (*Sesia*).

Kokon: Chapman²¹⁾ (*Lachneis lanestris*),²⁴⁾ (lid of coc. of *L. lan.*), Dadd¹⁾ (*Hybocampa Milhauseri* u. *Cerura bicuspis*), Shephard-Walwyn²⁾ (*Plusia moneta*), Soule¹⁾.

innerer: Soule⁴⁾ (*Attacinae*). — Siehe ferner unter Biologie.

Systematik: Grote, A. R.³⁾ (holarkt. *Lep.* nach dem Flügelgeäder),⁵⁾⁶⁾ (nordamerik. *Lep.*), Hampson¹⁾ (neue Familie: *Sabaliadae*).

System. Stellung: Staudinger u. Rebel¹⁾,²⁾, Tutt⁶⁾ (*Lemonia dumi*).

a) Insektenbörse, 18. Jhg. p. 227.

b) Titel p. 624 des vorig. Berichts. Ref. Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 231.

c) Verschiedengefärbte (bei ausgeschlüpften *Eugonia autumnaria*). Wohl zurückzuführen auf etwa von den Faltern ausgeschiedene Feuchtigkeit. Zeitschr. f. Entom. Breslau, 1901 p. VIII–IX.

System. Bemerkungen: Alté ^{a)}.

Theilung: Dyar ²²⁾ (der Gatt. Sphingicampa).

Klassifikation: Jordan (Tagfalter), Kaye ²⁾ (Fortschritt derselb. bei den Sphingiden innerhalb 150 Jahren), ³⁾ (Re-classification), Rostagno ¹⁾ ²⁾ (italien. Lepid.).

Sammlungen: Butler ⁶⁾ (brit. Lycaen.), Dyar ⁴⁹⁾ (Ant. Schmid's u. O. Hoffmann's Catalogue (Lep. Phalaen. des Brit. Mus. microlep.), Gauckler ^{b)} (Karlsruhe), Kennel (neue Tortric. aus den Samml. v. Staudinger u. Banghaas), (Leech Collection jetzt im Kensington Museum ^{c)}, Lyman ²⁾ (Mus. Brit. Walk.'s Type von *Spilosoma congrua* u. einige andere), Pfitzner ²⁾ (Beschr. von Aberr. aus sein. Sammlung), Walker ^{d)}, Teich ²⁾ (Varr. u. Aberr. seiner Samml.). — Anlage u. Behandlung siehe unter Technik.

Vereine: (Liste etc. derselben) ^{e)}.

Typen: Dyar ²⁷⁾ ²⁸⁾ (Acronycta), Grote, A. R. ¹⁾ (Agronoma), ⁷⁾ (Acronycta), Lyman ²⁾ (*Spilosoma congrua* u. einige andere im Mus. Brit.), Smith, J. B. ¹⁾ ²⁾ (Acronycta).

Originalbeschr.: Guenée's: Grote, A. R. ⁹⁾.

Unterscheidung: Dyar ²¹⁾ (Spp. von Sibine), Thompson (zw. *Agrotis tritici* u. *nigricans*).

Unterschiede zwischen Macro- u. Microlepidopteren (Schmetterl. u. Raupen: Goetschmann ^{f)}).

spezifische Unterschiede: Dyar ²⁵⁾ (zwischen 2 *Alypia*-Arten), Fuchs ⁷⁾,

Identifizirungen: Dyar ²⁷⁾ (gewisse bei Acronycta).

Gesetze: (Schutz): Carpenter, S. C. (*Chionobas semidea*).

Nomenklatur, Terminologie etc.: Grote ⁷⁾ (Gattungstitel *Burtia*), Prout ¹⁾ (*Noctua popularis*), Walsingham & Durrant (Revision ders. bei den Microlep.).

^{a)} Als Ergänzung zu des Autors Wunsch Autorennamen wegzulassen, etc. sei Speiser erwähnt, der ausführt, warum dies nicht angängig.

^{b)} Neuaufstellung u. Besprech. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 91—93, 98—100. (Zahlr. „lebende Bilder“).

^{c)} Leech's Sammlung ist in den Besitz der National Collection of Lepidoptera, Sitz im naturhistor. Museum zu South Kensington, übergegangen. The Entomologist vol. 34 p. 175. Sie enthält Rhopalocera: ca. 1100 spp. [darunter allein über 400 ♂- u. ♀-Typen von Leech] in mehr als 18000 Exemplaren. — Europ. Heter.: ca. 23000 Exempl., einschliessl. prächtiger Aberr. und grosser Serien variabler Spp. — Ostasiat. Heter.: ca. 3000 Spp., worunter ca. 800 v. Typ. Spp. von Leech.

^{d)} Bemerk. zur „Curtis“-Sammlung brit. Insekten. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 76.

^{e)} Entom. Jahrb. (Krancher) 11. Jhg. p. 238—249. („Iris“ zu Dresden; „Fauna“ u. „Iris“ zu Leipzig; Chemnitz, Limbach, „Entom. Ver.“, „Deutsch. Entom. Ges.“, „Berl. Entom. Ges.“ u. „Orion“ zu Berlin; Aachen; Königsberg i. Pr.; Darmstadt; Nürnberg; Fürth; Karlsruhe i. B.; „Wien. Entom. Ver.“; „Entom. Club“ zu Teplitz-Schönau; „Entom. Ver. für Karlsbad u. Umgebung“).

^{f)} Zeitschr. f. Entom. Breslau, 1900 p. XXII.

Namensänderungen: Berg, Gill (Hollandia in Holandella).

Nomenklaturänderungen. — Protest dagegen: Heath, E. F. ²⁾.

Terminologie der Rippen: Grote ¹²⁾ (p. 657—659).

Benennung: Schenkling ²⁾ (Saturnia Hybriden), Stichel ^{a)}, Tutt ⁸⁾ (Saturniidae), ¹⁴⁾ (Lachneiden), Verrall, G. H. ^{b)}.

Richtigstellung des Namens: Butler, A. G. ¹¹⁾ (Catasticta).

Vorsicht in der Beurteilung der Artberechtigung: Stichel ^{c)}.

Berechtigung der Benennung von Varr. etc.: ter Haar (Verteidiger dieser Ansicht).

Unzulässigkeiten in der Bezeichnung: Speiser ^{d)}.

Unrichtigkeiten: (des Herrn Kraatz gelegentlich des Nekrolog auf Staudinger. cf. Iris 1901 Hft. 1 u. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 338.

Schreibweise, kürzere: Chapman ¹⁰⁾ (für Hybriden).

Sammelnotizen: Carr ¹⁾, ²⁾ (Grossbritannien), Teich (Russisch Lappland), Wormsbacher, ^{e)}, ^{f)}, ^{g)}. — Siehe ferner unter geogr. Verbreitung.

Sammelbetrachtungen: Fingerling's Arbeiten, siehe Anmerkung.

Sammelmethode: neue: Fleck ^{h)}.

Fang: Alte ⁱ⁾ (neues Tötungsglas), Gastine et Vermorel (Pyrilide, mittelst elektr. Licht), Lane (Raupen in Epping Forest), Merrick (an Baumstämmen, Zäunen, Boden, ohne Netz).

^{a)} Stich. ist von einer Benennung (vom Standpunkt reiner Nützlichkeit) der bei Temperaturexperim. benannt. Formen nicht sehr erbaut u. will sie nur für extremste, zu fixierende Formen gelten lassen. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 51.

^{b)} Benenn. der Insektenbeine. Grosse Verwirrung in derselben. Richtigstellung. The Entomologist vol. 34 p. 84. — auch Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 64.

^{c)} Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900 18. Okt. (p. 25): [Pap. ceneus].

^{d)} Weglassen der Autorennamen der Artnamen bei Varr. (z. B. Lycaena ab. dubia) etc. anknüpfend an die Regeln der Deutsch. Zool. Ges. — Folgen solches ungenauen Arbeitens.

^{e)} Interessante Sammelnotizen, saisonmässige Winke u. s. w. bringen die im 18. Jhg. der Insektenbörse erschienenen Artikel von Fingerling, Max: Vor dem Erwachen, Die Zeit ist da, Vorsommer, Augustfreuden, Der Herbst im Walde, Ruhepause.

^{f)} Four months collecting [Lepidoptera] in the isle of Lewis. The Entomologist, vol. 34 Nov. p. 305—306.

^{g)} Für Lokalitäten, Fang beim Licht, am Köder sind die Sitz.-Berichte der verschiedenen Gesellschaften einzusehen.

^{h)} **Fleck, Eduard.** Eine neue Sammelmethode. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 275—276. — Abgedruckt aus: Die Macrolepidopteren Rumäniens. Berlin N.W. Verlag W. Junk. — Fangvorrichtung unter elektr. Bogenlampe oder Acetylenlicht. Sack aus Baumwollengewebe, der während der Saison an der Lampe hängen bleibt.

ⁱ⁾ Insektenbörse, 18. Jhg. p. 388 mit Abb. Nachteile der früheren — Vorteile des neuen.

Exkursionen, nächtl.: Gauckler ¹⁾ (auf Raupen, bei Durlach, Zusammenstellung: 19 Spp.).

Aufsuchen: Crisp ¹⁾ (von Raupen, die während der Nacht fressen), Dadd ¹⁾ (Kokons von *Hypocampa milhauseri* u. *Cerura bicuspis*).

am Köder: a), Musham ¹⁾ (*Cosmotriche potatoria* an dems.?).

Zucker: Day, G. O. ⁵⁾ (*Phaethra menyanthidis*), Wynn (Warwickshire).

Lage des Baumes dabei von Einfluss: Schnabl ^{b)}.

am Licht: Barraud ³⁾.

an Acethylengas: Gastine et Vermorel (Pyralide, Fang u. Vernichtung).

an elektr. Licht: Green ^{c)}, Peachell, F. H. and G. E.

Zucht: Andrews, T. B. (*Cossus ligniperda*), Atmore ²⁾ (*Hylophila bicol.*), Blair (*Lasiocampa quercus*), Breit (Sommergeneration von *Notodonta tritophus*), Cambridge, O. Pick. (*Acherontia atropos*), Collamarini, G. ^{d)}, Dollmann (erfolgloser Versuch *Colias edusa* zu ziehen), Foster (*Haploa Hübn.*), Gibson ¹⁾, Heckel (Psychiden), Henderson, J. (Kokons von *Miselia oxyacanthae*), Littlewood ¹⁾, Maurus, P. (*Nonagria arundinis*), Naufock (Beitrag zur Z. von *Lignyoptera fumidaria*), Prinz (u. erste Stände von *Sesia annellata*), Rydon (*Lymantria mon.* u. *Clostera curtula* in feucht. Luft), Schnabel (*Arctia flava*), Schulz (*Deilephila alecta* — cf. syst. Teil), Sheldon ⁵⁾ (*Colias hyale*); e) (*Psyche viadrina*).

Treiben: Partridge (*Agrotis Ashworthi*, Bemerk. dazu).

Zuchtergebnisse: Frohawk ¹⁾ (*Colias* spp.).

Eiszucht: Thurau ^{f)}.

Seidenraupenzucht: g), ^{h)}, Collamarini, G. (siehe p. 714 in Anm. (Ueb. n. d. Stoff)).

Seidenraupen-Industrie: Lochhead (Ontario).

Inkubationszeit: Quajat (von *Bombyx mori*).

Infektionskrankheit: Verson ⁵⁾.

a) Mathew, Gervase, F. Moths carried off sugar by Sand-Hoppers (*Talitrus locusta*). The Entomologist, vol. 34 April, p. 124.

b) Zeitschr. f. Entom. Breslau, 1900 p. XVI.

c) Ungeheurer Fang an demselben um das Buern-Lager auf Ceylon, Diyatalawa: 38 Lamp. jede 2000 Kerz. Stärke in 25 Fuss Höhe.

d) Siehe p. 714 in Anmerk.

e) Insektenbörse, 18. Jhg. p. 201 (siehe im system. Theile).

f) Experimente mit *Emydia striata* L. Produkte bei gleicher Behandlung ganz verschieden. Vergl. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900 4. Jan. (p. 2).

g) Wie die Schöneberger Seidenzüchter wurden. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 292. — Aus Berlin. Lok.-Anz.

h) Rührig in Sprockhövel (Westfalen) betreibt solche. Methode, Resultate u. s. w. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 412. — Fütterungsmethode nach Herz mit Blättern der Schwarzwurzeln (*Scorzoneria*). In 3 Zimmern. Papierkästen statt Horden. Nistgelegenheit: zu Dreiecken zusammengeknüpfte Papierstreifen. Bei 40 000 Raupen nur eine Arbeitskraft nötig, in den letzt. 8 Tag. 1—2 weitere Kräfte. Billig, rentabel für Beamte, Lehrer u. s. w., zumal da die Schwarzwurzel überdies noch ein beliebtes Gemüse ist.

Messung: Andres ^{a)}, Speiser ^{b)} (Somatometrie).

Technik: Praktische Winke: Tutt ^{c)}.

Anlegen von Sammlungen: Bachmetjew ¹⁾ (p. 123 diesbezügl. Literatur in bulgarischer Sprache).

Anlage u. Behandlung: Rockstroh, ^{d)}.

^{a)} **Andres, A.** (1). La determinazione della lunghezza base nella misurazione razionale degli organismi. 11 p. Estr. d. Rendiconti d. R. Istit. Lomb. di sc. e lett. ser. II vol. XXXIV. 1901.

— (2). La misurazione razionale degli organismi col metodo dei millesimi somatici o millisomi (Somatometria). R. Istit. Lomb. d. sc. e lett. ser. II vol. XXXIII. 1900.

Welche Abmessung des tierischen Körpers wird am zweckmässigsten als Grundlage für derartige vergleichende Messungen genommen? Als selbstverständliche Forderung gilt: Die Endpunkte der zu Grunde liegenden Distanz müssen sich stets leicht und möglichst mathem. auffinden lassen. Extremitäten, Anhänge sind nicht in dieselbe aufzunehmen. Eine durchgängige Norm durchs ganze Thierreich lässt sich nicht aufstellen. Für die Mehrzahl gilt die Achse der Symmetrie. Bei anderen, Echin., Cnid. die überhaupt grösste Abmessung. L. kann beliebig in mm, Zoll, Ellen etc. genommen werden.

Der 2. Abschnitt giebt eine „graphische“ Methode an, wie an einem Strahlensystem, welches durch seine Mitte gelegte Linien senkrecht in 1000 Teile zerlegt, diese „Millisomen“ direkt abgelesen werden können. Zum Schluss eine Erörterung, ob Camerano's Eintheilung in 360 oder Andres' in 1000 den Vorzug verdient; wir stimmen wohl für das letztere.

^{b)} Vorschlag Andres', die Ergebnisse von Messungen an thierischen und anderen Organen in übersichtlich vergleichbarer Weise auszudrücken. Nicht Angabe der absolut. Länge etc., sondern in Bezug auf die Grösse des Trägers u. diese dabei auf die Normalzahl 1000 bezogen. L Länge des Ind., l die des Organs, so $\frac{x}{l} = \frac{1000}{L}$ oder $x = l \frac{1000}{L}$. $\frac{1000}{L} =$ somatischer Coefficient. Angabe einer Tabelle f. d. bequemen Gebrauch, welche die Werte dieses Coeff. für L = 1 bis 4000 angiebt.

^{c)} Dieselben enthalten (mit weissem Papier durchschossen) einen Theil der schon im „Entom. Rec. and Journ. of Var.“ enthaltenen „Practical Hints“, der andere Theil ist neu. Sammelanleitungen, wo, wie, was etc. — cf. Ref. Chr. Schröder, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 265—266.

^{d)} Bajkuschev, K. Kurze Ratschläge zum Anlegen von naturhistorischen Sammlungen. Silistra 1891. 76 pp.

Bachmetjew, P. Schmetterlinge. Praktische Ratschläge für das Sammeln der Schmetterlinge. Sofia 1896. 50 p. mit 22 Fig.

Nedelkow, N. Instruktionen zum Anlegen von entomologischen Sammlungen. Sofia 1898. 38 pp.

Abtöten: Adkin ^{a)}, Goetschmann ^{b)}, Kr. ^{c)}, Main u. Harrison ^{d)}.

Präparation: Ausblasen der Raupen: Kr. ^{e)}.

Conservirung: ^{f)}, Bogdanow ^{g)}.

Neue Methode: Marpmann ^{h)}.

Insektenbezettelung u. Notizbuch: Fletcher ⁱ⁾.

Formalin ^{k)}: Glycerin: immer noch das Beste:

Aufblasen: Gibson ^{l)} (der Raupen). Insektenbörse, 18. Jhg. p. 75.

Apparate: Alté ^{l)}.

Apparat zur Einschränkung der Raupenplage: Neuburger.

Etiketten: Treudl ^{m)}.

Wasserflecken: Fischer ⁿ⁾, ⁿ⁾. Entölen: Bastelberger (p. 657 vor. Ber.)

Reinigung: Schaufuss ^{o)}. Ref.: Insektenbörse, 18. Jhg. p. 74.

Lepidopterenpreise: (Cossus balcanicus) ^{p)}.

Gefälschte Schmetterlinge: ^{q)}.

^{a)} betäubt mit Cyankali u. tötet mit Oxalsäure. The Entomologist vol. 34 p. 323.

^{b)} Zygänen gespiesst, in Schachtel mit Naphthalin gesteckt, binnen $\frac{1}{4}$ Std. tot. — Jander, auch andere Falter, wie villica, mit Schwefeläther betäubt, auf Naphthalin schnell absterbend. Zeitschr. f. Entom. Breslau 1900 p. XX.

^{c)} Welches ist das beste und ungefährlichste Mittel? Anfrage. Entom. Jahrb. (Krancher) 11. Jhg. p. 106.

^{d)} benutzen nach ihrer Ansicht Chloroform mit mehr Erfolg. t. c. p. 323.

^{e)} Entom. Jahrb. (Krancher) 11. Jhg. p. 57. Abtöten: nackte in Wasser, behaarte in Cyankalium. Ausdrücken des Inhalts, Aufblasen mit Mund oder Gebläse (bekannte Methode).

^{f)} der Raupen (wobei die zartesten Farben erhalten bleiben). Diesbezügl. Anfrage. Entom. Jahrb. (Krancher) 11. Jhg. p. 169.

^{g)} Versuche mit Spiritus, Perenyi'scher Flüssigkeit, Glycerin, Flüssigk. von Trois, Crosa's Methode, Natriumbisulfid-Lösung, Austrocknen, Moskauer Kochsalz, teilw. mit Rezeptangabe.

^{h)} Zeitschr. f. angew. Mikroskopie 1901. — cf. Insektenbörse 18. Jhg. p. 258. (Fluornatrium u. Formaldehyd etc.).

ⁱ⁾ The Entomologist, vol. 34 p. 216—218. Seine Methode bietet mehrere Vortheile.

^{k)} Bedeutung u. s. w., verschiedene Besprechungen in der Insektenbörse (diesbezügl. Publik. in ders. siehe im 18. Jhg. p. 165).

^{l)} Neuer Fangapparat mit Abb. Insektenbörse 18. Jhg. p. 220 (wichtig der Raum für bereits gefangene Insekten ist gänzl. gesondert innerhalb des Sammelapparates).

^{m)} Eine Etikettenfrage. Treudl, Victor, Insektenbörse 18. Jhg. p. 236—237.

ⁿ⁾ im auffall. Lichte glänzend, im durchfall. transparent; besondere Art des Glasigwerdens. Bestes Mittel: Einlegen (6—10 Std.) in eine Mischung von Alkoh. absol. 20, Salmiakgeist 1—2 Theile. — cf. auch Insektenbörse 18. Jahrg. p. 177.

^{o)} Carbolspiritus (Spiritus 5, Carbol 1). Insektenbörse 18. Jhg. p. 53.

^{p)} f. 400 M. Nach Insektenbörse 18. Jhg. p. 329.

^{q)} Insektenbörse 18. Jhg. p. 293.

Morphologie. Histologie.

Morphologie: Chapman⁷⁾ (der Imago von *Cnethocampa pityocampa*), Jordan (Tagfalter), Quail¹⁾ (Hepialidae).

Histologie: Vignon (vorläufige Mitteilung über dieselbe bei *Bombyx mori*).

Verson'sche Zelle eine Geschlechtszelle: Verson⁴⁾.

Randborsten: Fernald^{1, 4)} (auf den Flgln.).

Nervenendigungen auf den Flügeln: Guenther.

Epithel der Larven (resp. Raupen) von *Chironomus* und *Bombyx mori*: Vignon⁵⁾.

Flügel: Grote, A. R.¹²⁾, Schenkling¹⁾ (Färbung der Lepid. an denselben erkenntlich).

Borsten auf dens.: Fernald¹⁾,⁴⁾.

Geäder: Grote, A. R.³⁾ (Einteilung der holarkt. Lep. nach dems.).

Terminologie der Rippen: Grote¹²⁾ (p. 657—659).

Bau: Chapman⁶⁾.

Ober- u. Unterseite: Morse.

Schuppen: Prideaux⁴⁾ (beim Geschlechtsdimorphismus von *Colias edusa*), siehe ferner unter Entwicklung.

Stigmen: Petri (von *Bombyx mori*, Beobacht. über dieselb.).

Bau der Abdominalfüsse der Lep.- Raupe: Verson³⁾.

Haut u. Anhänge: Randborst. d. Flgl.: Quail²⁾.

Anhänge: Beziehung der Kopfborsten zu dens. bei *Perophora Melsheimeri*: Dyar¹⁾.

Dornen (Stekels): de Vos tot Nederveen Cappel (einiger nordam. *Agrotis*).

Postspiracularer Höcker: Dyar¹⁶⁾ (bei Noct.-Raupen).

Weibliche Tasche: Marshall (*Acraea*).

Analpinsel: Fruhstorfer^{b)}.

Analpinsel als Defensiv- oder Schreckwaffe: Fruhstorfer^{c)}.

Duftfleck: Fruhstorfer^{d)} (*Euploea Isamia*).

Sinnesorgane: siehe Nervenendigungen unter Flügel weiter oben.

a) Vignon, P. Recherches de Cytologie générale. Sur les épithéliums, l'appareil pariétal, protecteur ou moteur. Le rôle de la coordination biologique. Arch. zool. expér. 1901 p. 371 sq. [incomplète], pls. XV—XVIII.

b) Beschreib. ders. bei mehreren Arten. Sie besitzen nach Fr. wohl einen hohen Wert zur Unterscheidung der Species, wenn nicht der Subgenera; siehe im syst. Teil unter *Danais plexippus*, *Salpinx superba*, *Crastia lorquini* u. *godarti*. Das Hervorstrecken der Duftpinsel geschieht gemeinsam mit dem Ausströmen eines nach Honig riechenden penetranten Duftes. Die grauen Analpinsel d. *Danaiden* werden bei Berührung des Insekts nicht herausgestreckt, sondern nur bei starkem Druck, sind nicht so lang wie bei den *Euploen* u. haben wohl ihre frühere Wirkung als Drohwaffe verloren. **Fruhstorfer**, Insektenbörse, 18. Jahrg. p. 19.

c) Werden beim Fangen ausgestülpt u. nach Art des Stachels der Wespe hin und her bewegt. l. c.

d) Aus 2 Rosetten bestehend; der eine lang gestielt, mit Strahlhaaren besetzt und einem kleinen äusserst zierlichen Stern auf der Spitze. l. c.

- Genitalapparat:** Dyar²⁶⁾ (*Halisidota Harrisii*), Fleischmann (*Psodos noricana*), Stitz (Auszug).
- Geschlechtsorgane, äussere** (männlicher Lep.): Poljanec¹⁾, ²⁾ (Refer.).
- Bursa copulatrix:** Petersen (Morphogenese ders.).
- Bogattungstasche** (weibliche): Marshall, A. (bei ein. *Acraea*).
- Kopulationsorgane:** Stichel^{a)}.

Physiologie.

- Physiologie:** Betrachtungen über den Darmtraktus, Experimente: Naufock.
- Temperatureinflüsse auf das Puppenstadium:** Ball.
- Experimentelle zoologische Studien:** Bachmetjew^{b)}, Fischer¹⁾ (Entstehung u. Wesen der Varr. u. Aberr.), ²⁾ (Kritische Abhandl. über Ursache und Wesen der Kälte-Varr. der Vanessen), ³⁾ (procentuales Auftreten d. Van.-Aberr.).
- Experimente:** Andrews, Edw.¹⁾ ²⁾ (Curious exper. with *Lasioc. quercus*), de Rocquigny-Adanson (mit Raupen des Processionsspinner), Slingerland (Peach-tree-borer).

a) Bei äusserlich recht verschied. Arten von ♂-Heliconiden sind vielfach spezifische Unterschiede schwer nachweisbar. Bemerkungen hierzu, Bau des Kopulationsapparats. — Bei der Gatt. *Discophora* hat sich das Kop.-Organ als recht brauchbares Unterscheidungsmerkmal bewährt. Berl. Entom. Zeitschr. 47. Bd. Sitz.-Ber. f. 1901, 19. Sept. — auch Insektenbörse 18. Jhg. p. 332–333.

b) Bachmetjew's (russisch Bakhmetieff) Arb. über Temperaturexperimente bei Insekten aus Zeitschr. f. wiss. Zool. — Erschien auch unter dem Titel: De la température vitale minima chez les animaux dont la température du sang est variable. I. Insectes. Arch. des Sci. Biol. VIII, 3 (St. Petersburg). Das Résumé ist allgemein verständlicher: Wiedergabe in der Insektenbörse, 18. Jhg. p. 234.

Bachmetjew, P. Experimentelle entomologische Studien vom physikalisch-chemischen Standpunkt aus. I. Bd. Temperaturverhältnisse bei Insekten. Leipzig, 1901 8°. 160 p. m. 7 Textfig. Verlag W. Engelmann, Preis 4 M.

Enthält I. Betrachtungen über die eigene Temperatur der Insekten. Sucht unter Anführung zahlr. Experimente u. Aufstellung tabellar. Uebersichten den Einfluss der Lufttemperatur, Feuchtigkeit, Bewegung, Ernährung u. Athmung des Insekts auf dessen Körpertemperatur zu ergründen. — II. Betrachtungen über die vitalen Temperaturextreme der Insekten nebst Anhang über die Messmethode (Princip der Thermoelectricität). Bestimmung des vitalen Temperatur-Maximum u. -Minimum, „kritischer Punkt“. Beeinflussung des letzt. durch die Abkühlungsgeschwindigkeit, Geschlecht, Entwicklungsstadium, Hungern, Wiederholung des Verfahrens, Säftecoefficient u. Zeit.

Die Resultate der Zusammenfassung sind aus früheren Berichten (Heft 1 des entom. Teiles unter „Allgemeines“ ersichtlich). — Referat der Arbeit siehe St(ichel): Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. p. 555–556.

physiologische: Naufock.mit feuchter Luft: Rydon (*Lymantria mon. u. Clostera curtula*).den Saisondimorphismus betreffend: Fischer³⁾ (Einfluss auf Bildung von Varr. u. Aberr.).Temperatur betreffend: Kuznezow³⁾ (*Catocala*), Marshall, Guy A. K.Hybridation betreffend: Standfuss¹⁾ (Synopsis).

bezügl. einer 2. Generation: Quajat.

zum Schutz vor der 2. Generation: Webster.

Farbensinn der Raupen: b).**Epithelien:** Biolog. Beziehungen unter denselben siehe p. 724. — Anm. unter Vignon.**Apparat zur Säurebestimmung:** a).**Geruch:** (L'odorat p. 681 dieses Berichts).

Aasgeruch: Fruhstorfer c).

Einfluss:

eines milden Winters: Nagel (1898/1899). — auf die Flugzeit der ersten Geometriden. Zeitschr. f. Entom. Breslau. 1899 p. 38—39. — Der Zeitpunkt des ersten Auftretens lag 10—12 Tage früher als in anderen Jahren.

äusserer bei der Bildung von Varietäten u. Aberrationen: Fischer³⁾. der Witterung: Ball (auf Puppen), Dahlström⁶⁾ (auf die Färbung),⁷⁾ (auf die Varietätenbildung).der Temperatur: Abafi-Aigner¹³⁾, Standfuss³⁾ (auf Artbildung).der Farben: Kathariner (auf die Zeit der Entwicklung u. Grösse der Falter), Nenükow (Raupen von *Pieris rapae*), Schenkling³⁾ (auf Entstehung des Geschlechts bei Seidenwürmern).

des Spektrum: (auf die Farbe der Puppenhaut), chemisch „aktive“ u. chemisch „inaktive“ Strahlen: Kathariner.

Vitales Minimum: Bakhmetieff⁴⁾.**Flügelzeichnung:** Merrifield⁵⁾.**Färbung:** Fischer³⁾.

nicht auf Diffraction beruhend: Croft.

Abnorme: Hauchecorn (einiger einheim. Lep.). — Siehe auch später unter Schutzfärbung.

Bestimmung des Geschlechts: Giard (Kritik).[a) Auch erwähnt etc. in: *The Entomologist*, vol. 34. p. 184.b) *Insektenbörse*, 18. Jhg. p. 285. — Die Insekten bevorzugen die weisse Färbung, wie Experimente mit weissen u. schwarzen Lappen beweisen.c) Aasgeruch individuell oder spezifisch? Verbraucht sich bei einigen sehr schnell, ob bedingt durch Aufsaugen aromatisch resp. widerlich riechender Blumensäfte? Fruhstorfer, *Insektenbörse* 18. Jhg. p. 19.d) Bakhmetieff, M. P. De la température vitale minima chez ces animaux dont la température du sang est variable. 23 pp. in *Arch. Scienc. Biol. T. VIII No. 3.* — Ref. *Allg. Zeitschr. f. Entom.* 6. Bd. p. 285—286.e) *Trans. Entom. Soc. London* 1900 Proc. p. XIV—XV.

Bestimmung des Puppengewichts: Fryer (*Acherontia atropos*).

während der Metamorphose: Urech.

Ovipositor, neue Verwendung für denselben: Soule³⁾ (*Deidamia inscripta*).

Chemische Produkte: a).

Phylogenie. Entwicklung. Vererbung.

Abstammung: Schenkling¹⁾ (an den Flügeln erkenntlich).

Urform der Lepidopteren: Petersen²⁾.

Convergenzerscheinungen: Grote¹²⁾ (p. 661 die Sphingidenform ist unter den Insekten eine gewöhnlich vorkommende Conv.-Erschein.).

Jugendstände: Merrifield (*Selenia illustraria*).

Erste Stände: Beutenmüller⁶⁾ (*Sphinx gordius*), ⁷⁾ (*Ceratomia amyntor*), ⁸⁾ (*Smerinthus geminatus*), ¹⁴⁾ (*Lobobunaea phaedusa*), Dodge, G. M. a. G. A. (Catalcae), Fleischmann (*Psodos noricana*), Prinz (u. Zucht von *Sesia annellata*).

Generationen:

Zweite Generation: Adkin¹⁰⁾ (*Epinephele janira*), Barraud²⁾ (*Lyc. minima* [albus]), Butler, W. E.¹⁾ (*Larentia viridaria*), Kloos^{b)}, Lawrance (*Pterostoma palpina*), Lucas⁴⁾ (*Epinephele janira* u. *E. tithonus*), Moffat¹⁾ (*Telea polyphemus*), Morton²⁾ (*Selenia bilunaria* in Schottland), Quajat (von *Bombyx mori* nicht vorteilhaft, diesbezügl. Experimente), Webster (Versuch die Aepfel vor der 2. Gen. von *Carp.* zu schützen).

keine zweite Generation: Evans¹⁾ (von *Selenia bilunaria* in Schottland).
dritte: Garratt, Rich. (*Selene illustr.*), Gilles (*Selena illunaria*), ferner Argynnia [syst. Teil].

späte Generation: Carr⁴⁾ [u. South] (*Pachycnemia hippocastanaria*).

Sommergeneration: Breit (Zucht ders. von *Notodonta tritophus*).

Metamorphose: Fawcett (südafrik. Lep.).

Parthenogenesis: Chapman¹²⁾ (*Luffia*), Reimer^{c)} (*Lasioc. potatoria*).

Morphogenese: Petersen (der doppelten Bursa copulatrix).

Entwicklung: Good (*Feniseca Tarquinius*), Pabst (*Nymphal.*, *Satyr.*, *Hesper.*), Sykes (Schuppen).

der Imago: Tutt¹⁰⁾.

der Imago in der Puppe: Chapman²²⁾ (*Lachneis lanestris*).

parallele, gewisser Raupencharaktere: Dyar¹⁸⁾ (zw. Syntom. und Pericopiden).

verzögerte, der Raupe: Prideaux¹⁾.

auffallend späte: Gauckler (*Sphinx ligustri* L., am 11. Septemb. frisch entwick. ♂).

beschleunigte: Stearns (*Smerinthus ocellatus*).

der Antennen: Chapman¹⁾.

a) de Varigny, H. Les animaux chimistes. Revue scientif. (Paris) T. 14 p. 809—811. — Ref. Chr. Schröder, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 286.

b) Wie weit ist solche bekannt bei unseren Vanessen? Gewöhnlich nur 1 Generation, in günstigen Jahren zwei. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz-Ber. f. 1900 27. Sept. (p. 24).

c) Insektenbörse, 18. Jhg. p. 68—69.

der Flügelzeichnung: Entwicklung, Ursache, Bedeutung für den verwandtschaftl. Zusammenhang der Arten: von Linden.

der Schuppen ^{a)}:

Entwicklungsstadien: Dyar ³⁾ (nordamer. Heter.).

Furchung unbefruchteter Eier durch Extraktivstoffe aus dem Sperma: Winkler, H.

Wachstum, schnelles, der Flügel: Prout ⁷⁾ (*Cyclophora pendularia*).

Darmtraktus, Veränderungen desselb. während des Larvenzustandes: Nazari.

Entstehung des Geschlechts: Schenkling ³⁾ (Einfluss der Farben auf dass. bei Seidenwürmern).

Vererbungsproblem: Fischer ³⁾ (Darstellung dess. nach Lamarck u. Weismann).

Arthbildung: Standfuss ³⁾ (Einfluss der Temperatur).

Mesenteron u. Gnostodeum nicht mit einander verbunden: Flint ^{b)}.

Biologie: im Allgemeinen:

Lebensprobleme: Giglio-Tos ^{c)}.

im Speziellen: Abafi-Aigner ⁴⁾ (Noctuen), ⁶⁾, ¹⁶⁾ (Agrotiden), Allen, Beutenmüller ¹⁵⁾ (*Eudaemonia brachyura*), Bowles, E. A. (*Lithosia muscerda*), Chapman ⁴⁾ (*Loxopera deaurana*), Colthrup ⁷⁾ (Verhalten bei gestörter Paarung), Daecke (*Thecla damon*), Day, G. O. ³⁾ (*Lithosia complana* var. *sericea*), Dyar ³⁾ (nordam. Heter.), ⁴⁾, ⁵⁾ (Slug Caterpillars), ⁷⁾ (*Euclea delphinii*), ¹⁹⁾ (*Callidapteryx dryopterata*), ²⁹⁾ (*Haematopsis grataria*), ³⁰⁾ (*Heliomanta cycladata*), ³¹⁾ (*Senelys enucleata*), ³²⁾ (*Eudule mendica*), ³³⁾ (*Sciagraphia heliothidata*), ³⁴⁾ (*Xanthotype crocataria*), ³⁵⁾ (*Eois inductata*), ³⁶⁾ (*Cingilia catenaria*), ³⁷⁾ (*Alsophila pometaria*), ³⁸⁾ (*Sabulodes transversata*), ³⁹⁾ (*Eucrostis viridipennata*), Eckstein ¹⁾ (Kiefernspanner: *Fidonia piniaria*), ²⁾ (Nonne), Fletcher, J. a. Arth. Gibson (*Phlyctaenia ferrugalis*), Frohawk ⁸⁾ (*Colias hyale*), ⁴⁾ (*Hesperia comma*), Gauckler ⁵⁾ (*Chesias spartiata*), Gibson ²⁾ (*Arctia virguncula* Kirby), ³⁾ (*Euprepia caja* var. *americana*), ⁴⁾ (*Arctia phalerata*), Heyche (*Cnethocampa pinivora*), Hinds (*Alsophila pometaria*), Hinneberg, K. auch C. (*Phtheochroa amandana*), Klos (*Tephroclystia virgaureata*), Lyman ¹⁾ (*Xylina Bethunei*), Moberly ¹⁾ (*Brephos notha*), Mocsary (*Deil. nerii*), Quail ¹⁾ (*Hepialidae*), Schille ²⁾ (*Phlyctae-nodes sticticalis* L.), Seifert (*Platysenta videns*), Simroth ^{d)}, Skinner ³⁾

Prideaux (1). Die Bemerk. betreffen: *Plusia iota*, *Pararge egeria*, *Lycaena argiolus* u. *L. alexis*, *Anticlea badiata*, *Melanippe unangulata*, *Chrysophanus phlaeas* und *Colias edusa*. The Entomologist vol. 34 Apr. p. 128—130.

a) The Entomologist vol. 34 Dec. p. 350—351.

b) *Endromis versicolor*. The Entomologist, vol. 34 p. 363.

c) Giglio-Tos, Ern. Les problèmes de la vie. I. La substance vivante et la cytotérière. 28 fig. 286 p. Turin 1900. — Ref. Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 298—299.

d) Simroth, Heinr. Abriss der Biologie der Tiere. Sammlung Götschen. I. 163 p. G. J. Götschen, Leipzig 1901. — Behandelt auch Lep.: *Bombyx mori*. — Ref. von Chr. Schröder, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 300—301.

(*Libythea celtis*), Tutt ¹¹) (Benahmen einiger Schmetterl., die während der Paarung gestört wurden), Woodforde ²) (der Imagines von *Brephos nota*), ³) (*Asthena sylvata*).

Gewohnheiten: Dadd ²) (Raupe von *Senta maritima*).

Raupenleben, Länge dess.: Cowl ⁵) (*Pachytelia villosella*).

Nahrung: M. A. (*Catocala sponsa*, nur von Eiche lebend oder auch von and. Bäumen), Metznerauer (siehe im syst. Teil unter *Gastropacha quercus*).

Falter an Aas: Bogdanow ^a), Fassl ²).

Instinkt, veränderter (sobald die Raupe von Parasiten heimgesucht ist): Chapman ²) (*Acanthopsyche opacella*).

Intelligenz: Davis ¹) (beim Anbringen der Kokons).

Vorhandensein u. Dauer geistiger Vorgänge bei Raupen: Mayer, A. G.

Eiablage: Bethune-Baker (*Lycaena icarus*), Grützner (*Endromis versicolora*), Philips ¹) (*Cosmotricha potatoaria*), Raynor ¹) (*Cymatophora octogesima*), Reid ³) (*Odontopora bidentata*), Sich ³) (*Coleophora murinipenella*).

in einem Stück Schwamm: Mathew ²) (*Taeniocampa gracilis*).

forcirte: Grützner (*Endromis versicolor*, siehe syst. Teil).

Salben der Raupen: ^b).

Verpuppung: Adkin ¹) (*Cossus lign.*), Russell, A. (*Sphinx ligustri*), Shibabig ²) (der *Macrolepidoptera*. — Art u. Weise bei den verschied. Gruppen).

Ausschlüpfen: Cowl ²) (*Acherontia atrop.* in 1900), Cowl ⁵) (Berichtigung dazu), Poujade (einer madagass. Saturn. in Paris).

vor-, frühzeitiges: Churchill ¹) (in Sussex, West), Clarke, H. S. ²) (in Isle of Man), Rollason, W. A. ^c) (in Cornwall).

spätes: Rollason, W. A. ^a) (in Cornwall).

im Herbst: Adkin ¹¹) (*Lophopt. cucullia* u. *Acronycta menyanthidis*).

Unregelmässigkeit in dems.: Merrifield ¹) (*Drepanidae*), Prideaux ¹) (vor. p., Anm.).

Ueberwinterung: Colthrup ²) (Raupe von *Lasioc. quercus*), ³) (*Hemerophila abruptaria*), Sheldon ⁵) (*Colias hyale*), Sladen ²) (*Vanessidae*), Thornhill (*Xylina semibrunnea*).

zweiter Winter: Studd (Raupe von *Anthrocera trifolii*).

Ueberwinterungsstadium: Prideaux ³) (*Acidalia imitaria*).

Ueberliegen: vacat.

Kokon: Anbringen desselben: Davis ¹) (Intelligenz dabei), ²) (*Cecropia*).

Oeffnen desselben: Tutt ¹⁰).

Kokonschneider: Chapman ²⁶) (*Actias luna*).

Flug: Fletcher ^a) ²), Stichel ²) (tropischer Falter).

Art desselben: Prehn.

^a) Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 37. Falter an stark in Verwesung übergegangenem Hasen: 42 *Melit. athalia*, 5 *Arg. adippe*, 13 *Lyc. argus*, 1 *Arg. dia*, 1 *Thecl. ilicis*, keine von den häufiger dort flieg. *Arg. aglaja* darunter (weitaus die Mehrzahl in der Magengegend); Lobositzer Gegend a. d. Elbe.

^b) von Aigner - Abafi, L. A kernyók bekenéséröl. (Ueber das Salben der Raupen). Rovart. Lapok 7 köt. p. 189—191 (cf. Titel p. 549 sub No. 15 des vor. Ber. lies kernyók statt hernyók). — Autorefer.: Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 187.

^c) The Entomologist vol 34 Jan. p. 23.

Zeit desselben: Prehn ^{b)}.

Hauptflugzeit: Dahl (p. 61). Titel siehe p. 301 dieses Berichts.

bei Tage: Bachmetjew ²⁾, Cockayne ²⁾ (*Orthosia rufina*).

bei Nacht: Bachmetjew ²⁾ u. ^{c)} (Ursache), Fletcher, Th. B. ²⁾.

Puppenstadium: Colthrup ³⁾ (*Hemerophila abruptaria*).

Ausgedehnte Dauer dess.: Day, G. O. ²⁾ (*Petasia nubeculosa*).

abnorme Länge dess.: Ash ⁶⁾ (*Agrophila trab.*).

Puppenruhe: zweijährige (*Papilio machaon*).

Ausruhen: Lucas ¹⁾ (*Euchloë cardamines*), Watts (*Vanessa urticae*).

Ruhestellung: Kuznezow (*Libythea celtis*), Oudemans ²⁾.

Vorkommen, Auftreten, Erscheinen:

Vorkommen: Colthrup ⁶⁾ (*Eutricha quercifol.*), Frohawk ¹⁾ (*Colias*-Spp. in 1900), Sheldon ¹⁾ (*Anthrocera exulans* [neue Lokalität]), Weismantel ⁴⁾ (*Deilephila nerii*).

zahlreicher Lepidoptera in Grossbritannien: siehe Lepidopt. p. 672.

Auftreten: Frohawk ¹⁾ (*Colias*).

Vanessidae in 1900: Campbell-Taylor (Grossbritannien), Mathew ³⁾ (desgl.).

Procentuales der *Vanessa*-Aberrationen: Fischer ³⁾.

Variation in demselben: Delorme ⁴⁾.

der Raupen besonders in der Regenzeit: Dahl (Titel p. 301 dieses Berichts) p. 61.

zahlreiches: Adkin ⁶⁾ (*Cyaniris arg.* in London), ⁸⁾ (*Lycaena arg.* near Eastbourne), Carr ³⁾ (*Lycaena argiolus*), Cerva ²⁾ (*Simplicia rectalis*), Cuthbert (*Van. io* in 1901), Gauckler ²⁾, ^{e)}, Kenyes (*Thecla pruni* u. *w-album*), Tutt ²⁾.

a) Die Vanessiden scheinen Neigung zu haben auch Abends zu fliegen. Es wurden schon verschiedene Stücke am Licht gefangen.

b) Morphiden, *Thecla* etc. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. für 1900, 18. Jan. (p. 3—4).

c) Unterschied in der Art des Fluges. Tagfalter flattern, die meist. Nachtfalter summen. Das Fliegen der Falter bei Tag und bei Nacht wird durch 3 Faktoren bedingt: Muskelarbeit (Wärmeproduktion), Behaarung u. Färbung, die in ein. gewiss. Verhältn. zu einand. stehen. — Ref. auch in Insektenbörse 18. Jhg. p. 73—74.

Die von Bachmetjew aufgestellte Theorie lässt sich schematisch so darstellen:

Muskelkraft der Flügel	Tagschmetterlinge		Nachtschmetterlinge	
	Behaarung	Färbung	Behaarung	Färbung
schwach	schwach	schwarz	stark	weiss
mittel	schwach	schwarz	mittel	grau
stark	schwach	schwarz	schwach	schwarz

Die Widersprüche, die diese Theorie u. die Wirklichkeit aufweisen, müssen in Kompensationen gesucht werden und in Nebenfaktoren.

d) Delorme, Paul. 1885. Des variations dans l'époque d'apparitions des Lépidoptères. Le Naturaliste, 7. Ann. p. 77—79.

e) Bei Karlsruhe 1901: *Sphinx convolvuli* L., *Gnophria quadra* L. und *Pieris brassicae* L. Insektenbörse 18. Jhg. p. 389.

massenhaftes: Aschke ^{a)}, Rey (*Cnethocampa*. — cf. syst. Teil), Thuru ^{b)}.
frühzeitiges: Burrows, C. R. N. ⁴⁾ (*Macrogl. stellat.*), Cottam (*Pieris rapae* in London), (Early Spring Lepid.), Hill (*Zonosoma porata*, Morton ¹⁾ (*Acalla ferrugana*), Rollason ¹⁾ (in Cornwall). — Siehe ferner *Phigalia pedaria* und *Hybernia leucophaearia* im system. Teil.

spätes: Buxton (*Vanessa polychl.* in Dec.), Pilley, Rollason ¹⁾ (in Cornwall).

im April: Cowl ³⁾ (*Pachytelia villosella*).

im Juni (letzt.): Clutten, W. G. ¹⁾ (*Acipt. galactodact.*), Theobald ¹⁾ (*Colias hyale*).

im Juli: Huggins, H. jun. ²⁾ (*Sphinx ligustri*, erwachsen), Oldaker ³⁾ (Dorking).

im August: Heath (Lep. in South Devon), Seth-Smith (*Lycaena minima*).

im September: Chapman ²⁵⁾ (Raupen von *Luffia lapidella*), Oldaker ³⁾ (Dorking).

im October: Tait ²⁾ (Sammeln in New Forest).

im Herbst: Crallan ¹⁾ (*Nemeophila plantaginis*), Eaton, A. E. (Notes from Seaton, Devon).

Winterschmetterl.: Dyar ²⁴⁾ (von Lake Worth, Florida), Miller *Phlogophora meticulosa*.

Winteraufenthalt: Dadd ²⁾ (*Senta maritima*).

Baden: de Joannis ²⁾, (in China [Ngan-Noei] beobachtet ^{c)}).

Schmetterling: Couragierter: Scudder (*Oeneis semidea*).

Puppe: Sich sonnende Puppe: siehe *Bombyx mori*-Puppe.

Raupe: Hülsenumkippende: Sahlberg ²⁾.

Selbstschmückende: Joutel ²⁾.

Wasserbewohnende: Schäffer.

Sich sonnende Raupe: siehe *Arctia caja*-Raupe.

Tonerzeugung: Chapman ¹⁵⁾ (*Acherontia atropos*), Cowl ⁴⁾ (*Smerinthus populi*),

Fowler ¹⁾ (von Puppen erzeugte), ^{d)}, Müller (musikalische Raupe [*Sphinx elpenor*]), Prideaux ⁵⁾ (des ♂ von *Macrothylacia rubi*).

Aussterben bek. Schmetterlinge: Grote ^{e)} (*Chrysophanus dispar* in England).

Abnehmen u. Verschwinden: Oberthür ⁴⁾ (in England u. Frankreich).

Steuerung; wie demselb. abzuhelfen: Alte ¹⁾.

^{a)} In einem Sommer bei Beeskow (Mark) 600 Stück. Berlin. Entom. Zeitschr. 47. Bd. Sitz.-Ber. April. — cf. Insektenbörse 18. Jhg. p. 157.

^{b)} Thuru in Ostpreussen 200 Stück. l. c.

^{c)} Schmetterlinge, sich mit ausgebreiteten Flügeln aufs Wasser legend (*Pieride*). de Joannis, Bull. Soc. Entom. France, 1901 p. 228—229. — Wiedergabe eines Briefes eines apostol. Vikars (in Kiang-nan) auf einer Reise in Ngan-Noei, China. Beim Uebersetzen über den Tschao-See bemerkte dieser auf das Wasser sich niedersetzende Schmetterl. (*Pieriden*? [mehr als 50 in einer Std. beobachtet]).

^{d)} Lautäusserungen von Schmetterlingspuppen. Fowler. Ref. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 140—141.

^{e)} nach Tutt, Entom. Record 1896 p. 57. — 1848 die letzt. freien Stücke erbeutet. Preis früher 50 Pf., jetzt ca. 150 Mk.

- Wiederauftreten:** Bower ¹⁾ (*Gelechia malvella*).
- Wiederentdeckung:** Chapman ⁴⁾ (*Loxopera deaurana*), nebst Diskussion über das Vorkommen einiger Lep. Proc. Entom. Soc. London 1901 p. VII.
- Bevölkerung** ausgedehnter öffentl. engl. Parks (Hyde Park etc.) m. Schmetterl. Insektenbörse 18. Jhg. p. 137.
- Züge:** Göldi (grossartige, am Amazonenstrom).
- Schwärme:** (*Bupalus piniarius* L.) ^{a)}.
- Verbreitung:** Carr ¹⁾ (diverse Fundorte), Cockerell ²⁾ (*Heterochroa californica*), Kirkland (Brown-tail Moth in Massachusetts), Tutt ¹⁾, ¹⁵⁾ (gew. Lepid. in Grossbritannien).
- Wanderung:** Abafi-Aigner ¹⁷⁾ (in Ungarn), Barrett, J. P. ^{b)}, Bell-Marley (*Pieris daplidice*), Tutt ¹⁾. — ferner ^{c)}.
- Fremdlinge:** Tait ¹⁾ (*Agrotis Ashworthii* in Grossbr.).
- Paarung, Begattung:** Butler, W. E. ⁵⁾ (*Dimorpha versicolora*), Gadeau de Ker-ville ^{d)}, Newnham (*Argynnis adippe* ♂ × *Arg. paphia*-♀), Prideaux (*Euchloe cardamines*).
 zweimalige: Tutt ¹³⁾ (*Melanargia galathea*).
 Verhalten bei Störung während derselben: Colthrop ⁷⁾, Tutt ¹¹⁾ (Behmen einiger Lep.).
 Liebeswerben: Meldolt (*Anthocharis cardamines*).
 Mating: Soule ¹⁾, ⁵⁾ (*Attacus*). 2 ♂ m. 1 ♀: siehe *Zygaena*.
 Assembling: Prideaux ⁵⁾, ⁶⁾ (*Macrothylacia rubi*).
- Anziehungskraft:** totes ♀ zieht noch ♂ an: Ash ⁵⁾ (*Acidalia virg.*).
 des weibl. Schmetterlingsduftes: Mayer ^{e)}.
- Geschlecht:** Erkennen desselb. an den Puppen: Hess (siehe *Smerinthus populi*).
 Verhältniss der Zahl der Männchen zu der der Weibchen: Quedenfeldt ^{f)}.
- Variation:** Adams (Verbreit. ders. von Van. io), Adkin ³⁾ (*Acidalia avers.*), ²⁾ (*Melanippe*), Fischer ¹⁾ (Experim. Untersuchungen üb. Entstehung und Wesen), ²⁾ (Ursache und Wesen der Entstehung bei den Vanessen. Kritische Abhandl.), Hill ²⁾ („Buff“ Var. von *Amphid. betul.*), de Joannis ³⁾ (*Monema*

a) Entom. Jahrb. (Krancher) 11. Jahrg. p. 70. — Um elektr. Lampen und Laternen.

b) The Entomologist vol. 34 Jan. p. 23.

c) *Pieris brassicae* L. (Kohlweissling). Raupen auf Eisenbahnschienen (1901) in grossen Zügen vor den Thoren Berlins. Insektenbörse 18. Jhg. p. 341.

d) Mit 5 Abb. Stellung, Zeit, Dauer. Die meisten bleiben ruhig während des Coitus, andere vibriren zeitweise heftig mit den Flügeln etc. Heterosexuelle seltsame Paarungen zwischen verschied. Spp. u. homosexuelle Paarung. Anforderung zum Sammeln weiteren Materials (Aufzeichnung der Stellung etc.).

e) Ref. Insektenbörse 18. Jhg. p. 161.

f) Besprechung von Quedenfeldt in Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitzber. f. 1900 13. Dez. (p. 29). Verhältnis bei Lepidopt., Menschen, Pflanzen etc. Parthenogenesis des Zuckerrohrs, *Lilium tigrinum* etc. — Verhältniss bei Lep. 105, 57: 100 (nach Standfuss' Handbuch). Insektenbörse 18. Jhg. p. 53. Bemerk. dazu.

flavescens), May (Acher. atrop., Raupenvar.), Prout⁸⁾ (neue von Geom.), Slevogt²⁾ (neue), Smith, G.¹⁾, ²⁾, Stichel⁵⁾, Teich¹⁾, Ter Haar (Polyommatus), Urwick, Woodforde⁴⁾ (Zonosoma pendularia).

der Flecke etc.: Smith (Erebia) Geoffr.

in der Grösse: siehe Colias hyale u. Ennomos alniaria.

lederfarbige Varietät: Mason (Amphidasis betul.), Pierce (Amphidasis betul.). — Im übrigen vergleiche im system. Theil die einzelnen Arten.

Entstehung u. Wesen: Fischer¹⁾.

Aberration: Abafi-Aigner³⁾, ²¹⁾ (Colias), Anderson³⁾ (Anthrocera filipendulae), Bird²⁾ (Diloba coeruleocephala), Clark, J. A. (Peronea crist.), ²⁾ (Melanarg. galath.), Colthrup⁴⁾ (Smerinthus tiliae), Dahlström, J. ^{a)}, Frohawk⁵⁾ (Colias hyale, Gonopteryx rhamnii), Fischer¹⁾ (Experim. Untersuchung über Entstehung u. Wesen), ²⁾ (Ursache u. Wesen der Entstehung bei d. Vanessen), ²⁾ (procentuales Auftreten), Fuchs³⁾ (Geometriden), Gauckler⁴⁾ (Agrotis comes), Henderson, J. (Bryophila muralis), Hills²⁾ (Thymelicus thaumas), von Hoyningen-Huene²⁾ (esthländ. Eulen u. Spanner), Lucas³⁾ (Gonopteryx rhamnii), von Mitis¹⁾ (Van. xanthom. aberr. chelys), ²⁾ (einige Rhop.-Aberr.), Pätzner²⁾ (Beschreib. von solch. aus seiner Sammlung), Prout⁸⁾ (neue von Geom.), Raynor²⁾ (Hoporina croceago), Russell (Enodia hyperanthus), Schultz (Jaspidea celsia), Slevogt²⁾ (neue), Teich¹⁾, Ter Haar²⁾, Tutt⁵⁾ (Smerinth. ocell.), Wagner (Saturnia pyri), Weeks, A. C. (Papilio Philenor).

einseitige: Burstert (Sphinx pinastri).

dunkle (melanistische): Ash¹⁾ (Abraxas sylvata), Bankes¹⁾ (Eupithecia nanata zu Shirley Surrey), ³⁾ (Heliothis peltigera), Maurus, P. (Melitaea).

albinistische: Bankes¹⁾ (Bactra lanceolana).

Entstehung u. Wesen: Fischer¹⁾, ²⁾ (procentuales Auftreten ders.).

Grösse: auffallende: Heckel^{b)} (im Jahre 1901).

ausnahmsweise: Woodforde⁵⁾.

Variation ders. siehe Colias hyale u. Ennomos alniaria.

Saisondimorphismus: Bird (Cilix glaucata), Butler, A. G.⁹⁾, ¹⁰⁾ (Bemerk. zu dems. bei den Precis-Arten), Marshall, Guy A. K. (Experimente), Rey^{c)} (auch Fruhstorfer, ibid. sub 19. Sept.).

a) Bestimmt erwartete Aberr. schlüpften in Folge Einflusses von Kälte u. Nässe zur Zeit der Reife der Puppe aus. Insektenbörse 18. Jhrg. p. 237. — An Apatura (von Eperjes) gezeigt.

b) Insektenbörse 18. Jhg. p. 261.

c) Die Annahme des Fehlens ders. in den Tropen ist nach Rey ungerechtfertigt. Beispiele. Berlin. Entom. Zeitschr. 47. Bd. Sitz.-Ber. f. 1901 19. Sept. — auch Insektenbörse 18. Jhg. p. 333. — Fruhstorfer's u. Stichel's Erwiderung. — Reihe von indischen Schmetterling., die auffallenden (adaptiven) Saisondimorphismus aufweisen. l. c. Sitz.-Ber. f. 1901 3. Okt. — Insektenbörse 18. Jhg. p. 349. — Fruhstorfer's Ixias-Regenzeit- u. Trockenzeitformen. — Bei seinem Aufenthalt in Tonkin fand er während der Regenzeit unter lauter Trockenzeitformen nur 1 Regenzeitform. Die Theorie erweist sich als nicht zutreffend. — Rey unterscheidet direkten (durch Wechsel der Jahreszeiten direkt hervorgerufenen) u. adaptiven (auf Anpassung der je nach der Jahreszeit verschiedenen

Dimorphismus: Oberthür¹⁾ (*Paromia pulchra* etc.), Krause.

sexueller: Prideaux⁴⁾ (in der Beschuppung von *Colias edusa*), Rey⁵⁾.

Gynandromorphismus (Hermaphroditismus): (Gynandromorphism p. 662 des Ber.), Harrison u. Main (*Amphidasis betul.*), Walker, S. (*Epione vespertaria*), b).

Scheinzwitter etc. vacant.

Zwitter: Alté²⁾ (p. 169 Diagnose der 4 Formen: halbirte, nicht halbirte, vollkommene, unvollk. Zwitter), Dahlström (siehe *Apatura* im syst. Theil).

Kreuzungen: Bacot (*Lasiocampa quercus* u. Varr.),²⁾ (dito). Newnham (*Argynnis adippe* ♂ × *Arg. paphia* ♀).

Rassen: Warburg (*Lasiocampa quercus*). Wert ders.: siehe *Thais polyxena*.

Bastarde: Alté²⁾ (p. 169. -- Diagnose ders.). Mory^{c)} (schweizerische).

Abnormitäten, Monstrositäten, Missbildungen: Tannreuther (*Pieris rapae*).

Anomalien: Ueberzählige Flügel: Tannreuther (*Pieris rapae*).

asymmetrisch gezeichnete Flügel: siehe *Smerinthus tiliae*.

Verkümmerung?: starke Ausbuchtung der Vflgl., manchmal wie eingeschnitten: (siehe *Ocneria dispar*).

Anlocken: d)

Melanismus: Porritt²⁾ (*Larentia* — cf. syst. Theil). Rey^{e)}. Stichel^{f)} (Bemerk.).

Treichel (*Melit. athalia*, wohl durch den dunklen Wald bedingt. Siehe eventuell auch im syst. Theil unter den einzelnen Formen u. unter *Aberr.*, *dunkle*). Hensel^{g)}. Thureau^{h)}.

Albinismus: (*Leukodermie*), Bankes¹⁾ (*Bactra lanceolana*).

Partieller: Bodeⁱ⁾.

Umgebung beruhend) Saisondimorphismus. I. c. Sitz.-Ber. f. 1901. 17. Okt. — siehe Insektenbörse 18. Jhg. p. 365. — Er nimmt an, dass bei direkt. Saisondim. die Trockenzeitform, stets kleiner, auf keinen Fall grösser als die Regenzeitform wären, während bei adapt. Saisondim., also bei Arten mit schützend gefärbter Useite die Trockenzeitformen nie kleiner, meist grösser als die Regenzeitformen seien. — Weitere Reihe. Rey, t. c. p. 397.

a) Aeussert sich in Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz. - Ber. f. 1900 27. Sept. gegen die von Standfuss vertretene Ansicht, dass bei sex. Dimorph. das ♀ die phylogenetisch ältere Form sei. Nach seiner Ansicht sind die von d. männl. Typus abweichend. weibl. Bildungen jüngerer Ursprungs. Beispiele. p. (23)–(24).

b) The Entomologist vol. 34 Dec. p. 348–349.

c) Ref. Chr. Schröder, Allgem. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 270.

d) *Pieris rapae* u. *Plusia gamma* von *Araujia albens* Don. gefang. Proc. Entom. Soc. London 1900. p. XVII.

e) Sitz.-Ber. Berlin. Entom. Zeitschr. Sitz.-Ber. f. 1900. — (*Amphidasis betularia* L., *Boarmia crepuscularia* Hb., *Ocneria*) (ibid. 10. Mai [p. 18]).

f) Ref. aus Jahresber. des Wien. entom. Ver. f. 1895 nebst Bemerk. Berlin. Entom. Zeitschr. Sitz.-Ber. f. 1900. 19. April (p. 16).

g) Nimmt periodische Schwankungen an, die Stichel ibid. auf das Fehlen gewisser Vorbedingungen zurückführt.

h) Ibid. an *Angerona prunaria* L.

i) Gehört zu den Trophoneurosen. Berlin. Entom. Zeitschr. 47. Bd. Sitz.-Bér. f. 1901. 17. Okt. — Insektenbörse, 18. Jahrg. p. 365.

Verblassen eines Schmetterlings infolge Blutverlusts der Puppe
siehe *Deilephile nerii*.

Kälteformen, Wärmeformen: vacant.

Zwischenformen: Littlewood²⁾.

Zwergformen: Ash²⁾, Robertson³⁾.

Hybridation: Standfuss¹⁾ (Synops. der diesbezügl. Experimente).

Hybriden: Mera (*Oporabias*), Newman¹⁾ (*Smerinthus ocell.* ♂ × *Sm. populi* ♀).
Standfuss (2 neue von *Smerinthus*), Tutt⁷⁾ (*Sesiidae*),¹²⁾ (*Lasiocampa quercus* u. *Pachygastris*).

Teratologie: Hampson⁴⁾.

Einbuchtung am Aussenrande der Vflgl.²⁾.

Gallen: siehe unter Beziehung zu den Pflanzen.

Geniessbarkeit, Ungeniessbarkeit: siehe unter Feinde: Verfolgung durch Vögel.

Mimikry: Fruhstorfer^{b)}. Sikorah (Raupen).

Theorie: Rey^{c)} (vertheidigt dieselbe). Hensel u. Kloos^{d)} (sind ebenfalls dafür. t. c. 29. März [p. 13]). Stichel^{e)} f) (ist dagegen).

Nachahmungen, die sich auch auf das Benehmen der Thiere erstrecken: Rey^{g)}.

Antennen u. Palpen bei der Mimikrystellung mitbenutzt: Kusnezov (*Libythea celtis*, steht darin einzig in ihrer Art).

Mimetismus: Oberthür¹⁾ (von *Paronia pulchra*).

Färbung, Zeichnung: siehe unter Physiologie.

Schutzfärbung: Kusnezov (*Libythea celtis*). Lucas (*Lycaena corydon*).

Blattähnlichkeit: siehe im syst. Theil unter *Noctuidae*: *Phyllodes*.

Eier — Raupen — Puppen — Kokon: siehe vorher.

Zählebigkeit: Brown, H.^{b)}. Howe¹⁾ (*Hybernia ruficeps*). Rowland (alpin. Lep.).
Schmetterlinge in Eis: Howe¹⁾,²⁾ (*Hyb. ruficapr.*).

Kannibalismus: (unter Raupen): de Nicéville⁵⁾.

Elimination: Crampton.

Verwehte Lep.: Lorenz.

a) Siehe *Papilio podalirius* u. *Vanessa io*, — auch unter Asymmetrie.

b) Im Fluge Pieridenähnliche Ricaniden, wie Dornen an den Zweigen eines Fruchtbaumes (*Caramella*). Insektenbörse, 18. Jhg. p. 74.

c) Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900. 29. März. p. 13—14.

d) t. c. p. 15.

e) Neu u. der herrschenden Ansicht entgegengesetzt sei die Erklärung Rey's bezügl. der Umbildung von *Hypolimnas bolina* (p. 15). — Mimikry-Diskussion von Stichel, Rey u. Hensel *ibid.*, 3. Mai (p. 17—18).

f) t. c. (p. 14—15).

g) Berl. Ent. Z. 46. Bd. S.-B. 29. März (p. 14): *Hypolimnas misippus* ♀ fliegt im Gegensatz zum ♂ ganz langsam. *Volucella* brummen wie Hummeln, *Trochilium apiforme* wie eine Hornisse.

h) Im Winter flieg. Lepid. müssen stärkere Kältegrade ertragen können etc. *The Entomologist*, vol. 157—158. *Gonepteryx rhamni* u. *Papilio machaon*, *Melitaea cynthia*, bis 8000' Höhe fliegend.

Beziehung zu Thieren: Raupen von Ameisen bewacht: (Caterpillars attended).

Mybiose: Landquart (zwischen Schmetterlingen u. Ameisen). Thomann. Weed (Clisiocampa distria).

Verfolgung durch Vögel: Caspari II, W., Hilse a), b), Rey c), Ribbé d), Rudow e), Slevogt¹⁾, ²⁾ f), Stichel (l. c. p. 148).

Beziehung zu Pflanzen: Raupenfrass. Schutzmittel der Pflanzen gegen denselben: Lagerheim.

Phytopathologie: Ritsema-Bos.

zu Blüten: Vorliebe für rothe: siehe *Papilio helenus*.

Nährpflanzen: Burrows, C. R. N. ¹⁾ (*Phorodesma smaragd.*). Day, G. O. ⁴⁾ (von *Neuronia saponariae*). de Nicéville ³⁾ (der Lepid. des Canara-Distriktes). Schreiber (Raupenkalender).

Bocksbart: Arkle ¹⁾ (Raupen von *Hecatera serena* nicht auf dems.).

Corylus avellana: Sheldon ³⁾ (Notod. dromed. auf dems.).

Schwarzpappel: g) Weinstock: h).

a) Diskussion der früheren Artikel. — Ja u. nein, je nachdem wie die Frage aufgefasst wird. Dass aber andererseits Vögel wirklich einzelne Schmetterlinge jagen, verfolgen, fressen oder vernichten, nicht aus Erhaltungstrieb, sondern aus Genusssucht, Uebermuth, Geilheit, Bosheit, das steht fest. Beispiele: Schwalbe, Lerchen, Rothkelchen, Sperling, Hausrothschwanz, Grasmücke, Würger, Steinschmätzer. Enthalten die Schmetterlinge vielleicht gährende ätzende Substanz, die zur besseren Verdauung vorher genossener Nahrungsmittel dienen sollen? Als Hauptnahrungsmittel werden sie nicht verzehrt.

b) Insektenbörse, 18. Jhg. p. 355.

c) (zu Frings u. Slevogt in No. 10 u. 11 d. Soc. Entom.). — Berlin. Entom. Zeitschr. 47. Bd. Sitz.-Ber. f. 1901. 24. Jan. cf. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 76—77. — Zygänen. Nicht die Farbe, sondern der Geruch oder ein gewisser Stoff hält die Vögel von ihnen zurück. Hensel, *ibid.* Sitz.-Ber. f. 1901. 24. Jan. — cf. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 77.

d) Bringt Einiges für und dagegen. Schwalben, Staare, Spatzen auf Noctuenjagd. In den Tropen wurden hauptsächlich Tagschmetterl. erbeutet, nicht selten der ganze Magen vollgestopft. Vögel tragen weder hier noch in den Tropen zur Verminderung der Schmetterl. bei. Von Raupen u. Puppen dagegen werden ganze Massen verzehrt. Ribbé glaubt nicht an Nachahmung. Begründung dafür. Nachahmende u. nachgeahmte Thiere werden gefressen etc.

e) Insektenbörse, 18. Jhg. p. 187—188. Vögel u. Insekten: Zahlreiche Beobachtungen. Die Insekten werden in Massen gar nicht genossen, die Vögel lieben die Abwechslung u. wollen eine Thätigkeit beim Aufsuchen derselben entwickeln. Trotzdem sind sie von grossem Nutzen und vertilgen eine Masse Schädlinge.

f) Zusammengestellt aus versch. Autoren etc., auch Insektenbörse, 18. Jhg. p. 89 sq. — Diskussion zwischen B. Slevogt u. C. Frings, siehe auch t. c. p. 257.

g) Zahl der Schmetterlinge u. Puppen auf einer einzigen Schwarzpappel auf 5000 Stück geschätzt. Insektenbörse 18. Jhg.

h) Siehe ebenda wie unter Tabak.

- Kolonialpflanzen:** Feige: a). — Tabak: b). — Thee: Green²⁾ (Schädlinge).
Silene nutans L.: Chrétien⁵⁾ c) (Kleinschmetterlinge).
 Skorzonerä: Tichomirow (als Futter für die Seidenraupe).
- Landwirtschaft:** Kartoffel: Froggatt¹⁾ (Plage). — Siehe ferner unter Schädlinge.
- Forstwirtschaft:** Weed (forest tent-caterpillar).
 Kiefer: Eckstein¹⁾ (*Fidonia piniaria*, Biolog.),²⁾ (Nonne).
- Schaden:** Cecconi (*Grapholitha tedella* in Italien). Neuburger (neuer Apparat zur Einschränkung). Raciborski (*Phlyctaenodes sticticalis* L. — cf. syst. Theil). Webster (d. 2. Gener. von *Carpocapsa* an Aepfeln).
- Hauswirtschaft:** Honig: Cerva¹⁾ (*Cossus* als Honigdieb).
 Schädlinge des Honigs: d).
 Hornfressende Raupen: Mc Corquodale.
- Obst- und Gartenbau:** Apfel: Webster (*Carpocapsa*. Schutzversuche).
 Birne: Burrows, C. R. N.²⁾ (*Sesia myopaeformis*).
 Erdbeere: Noël (neuer Feind. — *Hepialus lupulinus*).
 Fuchsie: Bower³⁾ (Raupen v. *Macrogl.* stell. an den Blüten ders.)
 Kirsche: Kane (*Semasia woeberiana*).
 Rhododendron: Johnson (*Phibalocera quercana*).
- Schädlinge:** Bachmetjew¹⁾ (Bulgarien), Cecconi (*Grapholitha tedella* in Italien), Chittenden¹⁾ (*Laphygma frugiperda*), Clarke, W. T. (Gelech. operc. in Californ.), Chittenden¹⁾ (*Peridroma saucia*),²⁾ (*Plathypena scabra*, Cockerell¹⁾ (*Clisiocampa*), Collamarini (siehe Anmerk. p. 714 dieses Berichts), Fletcher (*Carpocapsa pomonella*), Froggatt²⁾ (Codling Moth = *Carpocapsa pomonella* L.), Goethe (siehe unter *Tortrix ambigua* im system. Theil), Heyche (*Cnethocampa pinivora*), Hinds (*Alsophila pometaria*), Kirkland (Brown-tail Moth), Meves (Nonne in Schweden), Ormerod,^{e)} Phillips (*Porthesia chrys.* u. *Eutricha*
-
- a) Feigen (Smyrna-) in Kisten von der Honigmotte theilweise für menschlichen Gebrauch ungenießbar gemacht. Auch Schmarotzer bei dens. gefunden. *Bracon ficicola* n. sp. Rudow, Insektenbörse, 18. Jhg. p. 324.
- b) *Heliothis armiger* Hübn. u. *Macroglossa stellatarum*. R. Stat. di Entom. agrar. di Firenze, Ser. I. Hft. 3.
- c) Auf dieser Pflanze leben nur Motten: *Lita tischeriella* Zell. u. *L. cauligenella* Schmid. (beide für die Pflanze spezifisch), *Nannodia eppelsheimeri* Stdgr., *Coleophora otitae* Zell., *C. nutantella* Mühlig u. n. sp. (nach Art von *otitae* in den Blättern lebend). Le Naturaliste 1901. No. vom 15. Jan. Beschr. der R.
- d) *Acherontia atropos*, *Smerinthus populi* u. *Sphinx ligustri*. Insektenbörse. 18. Jhg. p. 68.
- e) Ormerod, Miss El. A. Report of Injurious Insects and common farm pests during the year 1899 with methods on prevention and remedy. 2 tab., ill., 152 p. Simpkin-Marshall-Hamilton-Kent Co., London. 1900. — Auch biol. Notiz. über *Pieris brassicae* L., *P. rapae* und *L. napi* L.

quercifolia), Slingerland (Peach-tree-borer), Weissmantel¹⁾ ²⁾ (*Saturnia spini*), Weismantel^{a)} (*Saturnia spini*)^{b)}.

Plagen: Froggatt¹⁾ (Kartoffelplage).

Krankheiten durch Lepidopteren: Entzündungen: Artaut (durch Raupen von *Liparis chrysorrhoea*).

Stomatitis: Mégnin (bei Thieren).

Verwüstungen: Gastine et Vermorel (Pyralide).

Bekämpfungsmittel: Berlese¹⁾ ²⁾ (*Cochylis ambiguella*), Collamarini G. c), Green²⁾ (gegen Theeschädlinge), Ormerod, Röhrig^{d)}, Webster (der Aepfel v. d. 2. Gen. von *Carpocapsa*), e).

Schutz: Carpenter S., C. (*Chionobas semidea*, gesetzl.), Ottolengui (*Chionobas*), Slosson²⁾ (*Chionobas semidea*), Gastine et Vermorel (Pyralide, mittelst elektr. Licht.)

Feinde: Marchal (des Kohlweisslings)^{f)}, Pommerol (Capside: *Atractotomus mali* Meyer, ein Feind der Raupen von *Hyponomeuta malinella* u. *padella*), Weed (*Clisiocampa disstria*, g).

Siehe ferner unter Verfolgung durch Vögel.

Seltsame Wirkung des Angriffes eines *Asilus* auf *Colias phylo-dice*: Winn.

Parasiten: Zehntner^{h)} (Titel p. 332 sub No. 1 des Ber. f. 1900), Cockerell¹⁾ (*Clisiocampa*).

Pilze: Benham, W. B. i).

a) In Rov. Lapok in Südungarn längs eines Eisenbahndammes 30—40000 u. mehr Raupen dieses Falters, welche die angepl. 5—7 jähr. Weiden, Gras, Klee, Schafgarbe, *Plantago* u. s. w. sogar Wolfsmilch verzehrten.

b) *Phalera bucephala* in einer Allee in Karbitz bei Aussig. Insektenbörse. 18. Jhg.

c) Siehe p. 714 dieses Berichts in Anmerk.

d) Röhrig (*Ocneria dispar*, neues Verfahren zu Bekämpf. des Schwammspinners — cf. syst. Theil).

e) *Pieris brassicae*. Belohnungen für die Vernichtung (Bromberger Gartenbauverein. 1900. Statistik. Insektenbörse 18. Jhg. p. 317.)

f) Nymphen von *Nabis labiventris* Bohem. (Hemipt.) saugten die Eier aus. Bull. Soc. Entom. France 1900 Nr. 17. — Ref. Insektenbörse 18. Jhg. p. 140.

g) Spitzmaus (viele *Hepialus lupulinus* werden von ihr verzehrt). Noël, P. Naturaliste, 1901 p. 155. — Wiedergabe: Insektenbörse. 18. Jhg. p. 396—397.

h) Parasiten der dem Zuckerrohr schädli. Schmetterlinge. — cf. Ref. von Reh, L. Allg. Zeitschr. für Entom. 6. Bd. p. 228.

i) Note on *Cordiceps sinclairii* Berkeley. Trans. New Zealand Instit. vol. XXXII. 1900. p. 4—8 pl. I. *C. hugelii* (= *robertsii*) the New Zealand „Vegetable Caterpillar“. Erwähnt, weil auch bei Raupen beobachtet. In der genannten Publikation handelt es sich um den Pilz einer *Cicadetta* (Hemipt.). — Ref. The Entomologist, vol. 34 p. 187—188.

Fauna. Verbreitung.**Geographische Verbreitung:**

Adams C. C. (der Variat. von Van. io). Pagenstecher³⁾ (geogr. Verbreitung der Tagfalter: Referat von Chr. Schröder).

Graphische Methoden zur Darstellung der geographischen Verbreitung: ^{a)}

Faunen: von Hormuzaki ^{b)}.

1. Arktisches und Antarktisches Gebiet.

Arktisches Gebiet: Abafi-Aigner⁵⁾.

Holarktisches Gebiet: Grote A. R.³⁾ (Eintheilung der Lep. nach dem Flügelgeäder).

Erweiterung der ungarischen Lepid.-Fauna: Abafi-Aigner¹⁴⁾.

2. Inselgebiet.

Hawaiische Inseln: Perkins ¹⁾, ²⁾ (neue Geometriden).

Dammarinseln: Warren ²⁾.

Fergussoninseln: Neu Britannien: Swinhoe ¹⁾.

Sulu-, Trobriandinseln: Druce ¹⁾. Samoainseln: Pagenstecher ¹⁾.

Salomonsinseln: Rothschild u. Jordan ¹⁾, Swinhoe ³⁾.

Louisiaden-, Woodlark-, Salomonsinseln, d'Entrecasteaux - Inseln: Rothschild u. Jordan ²⁾.

Neu-Guinea: Fruhstorfer (siehe in Anhang sub No. 2), Rothschild ¹⁾.

Neu Seeland: Meyrick ³⁾, Quail ^{c)} ^{d)}, Philpott ^{e)}.

^{a)} Airaghi, Zina, Leardi. I metodi grafici nello studio della distribuzione degli animali. Atti d. Soc. Ital. d. Sc. nat. XXXIX, 1900. 15 p. 3 Taf. — Zusammenstellung der verschiedenen gebrauchten graphischen Methoden z. Darst. der Verbr. resp. des Vorkommens einzelner Thierspecies. 1. farbige Umzeichnung; 2. Flächen kolorirt; 3. Einzeichnung besonderer Zeichen für die einz. Spp. an jed. Fundort; 4. Tabellen, dess. Kopf die Fundorte, der Rand die Spp. trägt; 5. schematische Diagramme. — Verf. bevorzugt Methode No. 3, weil sie zugleich einen Ueberblick über die Beobachtungscentren gestattet.

^{b)} Einige Worte über sogenannte „Lokalfaunen“. Verhdlgn. zool.-bot. Ges. Wien, 51. Bd. p. 368—373. — Hierzu Bemerk. von Anton Handlirsch. t. c. p. 373—374.

^{c)} Quail, A. Embryological structure of New Zealand Lepidoptera: Part I. Trans. New Zealand vol. XXXIII. p. 159—165. pl. IX. — Bezieht sich auf Ei und Raupe.

^{d)} Quail, A. On Lysiphragma howesii sp. nov. Trans. New Zealand Instit. vol. XXXIII. p. 154—158. pl. VIII.

^{e)} Philpott, A. A Catalogue of the Lepidoptera of Southland. Trans. New Zealand Instit. vol. XXXIII. p. 167—185. — Lewis, Mount Ida. t. c. p. 186—187. — Howes, t. c. p. 188—190.

3. Paläarktisches Gebiet.

- a) Insgesamt oder mehrere der folgenden Gebiete zusammen:
 Kennel (neue Tortric., 115 Spp.), Ragonot, Rebel⁴⁾ (neue Tineen), Staudinger u. Rebel^{1), 2)}, Warren²⁾ (Uran., Epiplem., Geometr.),³⁾ (Drepan., Uran., Geometr.), Wendland.
- b) Europäisches Gebiet insgesamt: (Etiquettenliste), Fuchs⁶⁾, Spuler^{*)} (Bombyx).

c) Europäisches Gebiet im einzelnen:

Mitteuropäisches Gebiet: Schreiber (Raupenkalender).

Deutschland: Disqué (p. 741 in Anm.), Fuchs, Pfitzner, Schütze.

Mittelddeutschland: Biedenkopf, Jäger (Sammelnotizen).

Alt Paleschken: Treichel (Vanessa levana L., Melitaea athalia Rott.

Argynnis paphia ♀ var. valesina H. Aberr.).

Baden: Gauckler³⁾ (Ergebnisse des Jahres 1900).

Baldohn: Teich (Beitrag).

Baltisches Gebiet: von Lutzau (neue Formen). Teich¹⁾ b).

Berent: Treichel.

Berlin: Alté⁶⁾ (Abnahme, Statistik), Enderlein (Argynnis aglaja ab. Wi mani).

Brandenburg: Sorhagen (Grabowiana).

Chemnitz u. Umgegend: Pabst (Nymphal., Satyr., Hesper.).

Gross Pallubin u. Umgegend: Eichmann⁴⁾.

Hildesheim; Seidler⁶⁾.

Josephstadt i. B.: Fassl¹⁾ (Beitrag).

Karbitz bei Aussig: f).

Karlsruhe: Gauckler²⁾ (zahlr. Auftreten einzelner Formen).

Kurische Nehrung: Rey (Cnethocampa siehe im system. Theil).

Kahlberg (Ostseebad): Petersdorf (1900 stark von Cnethocampa pinivora heimgesucht). — bei Horst: Belling. — bei Gravosa: Schulz, G. L.

a) In Europa die Gatt. nur in 1 Art, nebst Abart vertreten, bei Jerusalem eine ganze Reihe von Abart. nebst Varr.

b) Nachträge zu C. A. Teich's baltischer Lepidopt.-Fauna u. dessen vollständigem Verzeichnisse. Sitz.-Ber. Gesellsch. Dorpat 12. Bd. p. 460—475.

c) Anfang 1898 ca. 25 km im Umkreis von Berlin 808 Spp. (Rhop. 99, Sping. 45, Bomb. 134, Noct. 308, Geom. 222) ohne Varr. u. Aberr., davon in neuer Zeit nicht mehr gefunden: Rhop.: 4 (P. podalirius, M. maturna, P. maera, achine). — Sping.: 1 (Sciapteron var. rhingaeaeforme). — Bomb.: 1 (Laelia coenosa). — Noct.: 2 (Luperina zollikoferi, Anarta cordigera). — Insgesamt in 3 Jahren 8 Spp. (ohne eventuelle neue). — Vorschlag eines Jagdkalenders (nebst Schema). Angabe der Monate, wann zu sammeln.

d) Bericht über die 3. Vers. d. Westpreuss. Bot.-Zool. Ver. zu Neustadt Westpr. 1880. p. 68—70. 161 Sp.

e) Einige seltenere Arten der Schmetterlingsfauna von Hildesheim. Stück von Hadena gemmea im Juli 1900 gefangen. Bemerk. hierzu; gehört wohl eher zu Polia. Insektenbörse 18. Jhg. p. 173. — Einige andere Lepid. ibid

f) Phalera bucephala als Schädling.

- Leipziger Gebiet: Reichert ^{a)} (Katalog der Grossschmetterl.)
 Mecklenburg: Ketel (Arge galathea, für Gebiet neu).
 Oberblasewitz bei Dresden: Schaufuss ^{b)} (1880. Schädling an Linde).
 Sächsische Oberlausitz: Schütze (Kleinschmetterlinge).
 Regensburg: Schreiber (Verzeichniss der Fauna). Disqué ^{c)}.
 Rheinland: Wendland.
 Rheinpfalz: Metzenauer (Aglia tau).
 Sachsen: Krimmitschau: Jänkel (Tagfalter). — Gladau: siehe Pieris napi
 (im systematischen Teil).
 Seeberg: (Die Schmetterlinge des Seebergs p. 692 dieses Berichts, ferner ^{d)})
 Schleswig: Glüsing ^{e)} (Bemerk. zur Fauna).
 Speyer: Umgegend: Disqué ^{f)}.
 Sprottauer Gegend: Pfitzner ¹⁾.
 St. Goarshausen: Wendland (selt. Arten u. Varr.).
 Usedom: Riesen.
 Westpreussen: Schädlinge: Rehberg ^{g)}.
 Wiesbaden: Wendland.
 Tucheler Haide: Rübsaamen, Thurau.
 Wandsbeck: Tietzmann (Sammelbericht, monatl.)
Schwanz: André (Bestimm.-Tab.), Mory (Bastarde), de Rougement (Caradrina
 lenta für Fauna neu), Wheeler, G. (4. Sammelsaison).
Alpen: Brown, H. Rowl. (Lebenszähigk. alp. Lep.).
Splügen: Brown, H. Rowl.²⁾ Stelvio: Brown, H. Rowl.²⁾.
Brenner: Brown, H. Rowl.²⁾ Tessin: Chapman.

^{a)} cf. Titel p. 620 des vor. Berichts. Die 2. Aufl. giebt an 237 Gatt., 672 Arten, 75 Varr., die 3. Aufl. 252 Gatt., 782 Arten, 110 Varr.

^{b)} Insektenbörse. 18. Jhg. p. 309.

^{c)} Titel p. 740 dieses Berichts. Ferner Verzeichniss der in der Pfalz vorkommenden, aber bisher noch nicht bei Speyer aufgefundenen Kleinschmetterlinge. t. c. p. 229—250.

^{d)} Die Thierwelt des Seebergs: „Entomologischer Verein“ zu Gotha. Die Grossschmetterlinge des Seebergs. Naturw. u. Gesch. vom Seeberg 1901 p. 136—141. — **Lenthe, Max.** Die Kleinschmetterlinge des Seebergs. t. c. p. 142—146. — cf. Ref. Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 265. — (Gotha): Seeberg: Liste der Grossschmetterlinge 772 Sp. m. 29 Varr. (für ganz Thüringen nach Knapp 1574 Spp. u. Varr. (besonders durch Max Lenthe-Gotha festgestellt). Erfurt: 662 Spp. (nach „Iris“).

^{e)} Insektenbörse, 18. Jhg. p. 213.

^{f)} **Disqué, H.** (1). Verzeichniss der in der Umgegend von Speyer vorkommenden Kleinschmetterlinge. Deutsch. Entom. Zeitschr. lep. Hft. 14. Bd. p. 149—176, 197—228. — Ferner oben.

— (2). Verzeichniss der in der Pfalz vorkommenden, aber bisher noch nicht bei Speyer aufgefundenen Kleinschmetterlinge t. c. p. 229—250.

^{g)} Schädliche Insecten Westpreussens und deren Bekämpfung. **Rehberg, A.** 1. Die wichtigsten Schädlinge unserer Halmfrüchte. Mit 54 Einzelbildern in 10 Fig. Schrift. naturf. Ges. in Danzig. N. F. 10. Bd. 4. Hft. 1902 p. 64—81. — Lep. p. 69—72.

Grisons: Prout²⁾ (einige Geometriden).

Engadine: Chapman^{3), 5)}.

Albula-Pass im Engadin: Nagel^{a)}.

Pontresina (Ober Engadin): Thieme^{b)}.

Oesterreich:

Kärnten: Neustetter¹⁾ (Macrolep.-Fauna).

Karpathen: Hormuzaki.^{c)}

Lavantthal, Kor- u. Saualpe: Höffner.

Oberösterreich: Gross (Liste der Macros).

Traun u. Mühlkreis: Himsl. Weyer: Metzger (Beitrag).

Oesterreich ob der Enns: Hauder.

Steiermark: Gross (Liste der Macros). Zara u. Umgegend: Pregel (1884).

Oesterreich-Ungarn: Lang¹⁾ (Sammeln im Jahre 1900).

Ungarn: Abafi-Aigner^{7), 9), 14)}, (Erweiterung der ungarischen Fauna)¹⁷⁾
(Wanderungen). Uffeln, Uhryk (Beiträge zur Fauna).

Budapest: Gabrielli.

Eperjes: Dalström¹⁾ (Bombyc.),^{2), 3)} (Noctuen),^{4), 5)} (Geometridae).

Galizien: Schille^{d)}.

Poprad: Schille¹⁾.

Russland: Baltisches Gebiet siehe unter Deutschland.

Esthland: von Hoyningen-Huene^{1), 2), 3)} (einige neue u. verk. Formen).

Russisch-Lappland: Teich³⁾.

Frankreich: André (Bestimmungstabellen), Chretien^{1), 3), 4), 5)}, Dietze²⁾
Walsingham.

Beaujolais: Gastine et Vermorel (Pyalide, Vernichtung).

Bordeaux: Brown²⁾.

Cannes: Chapman¹⁸⁾.

Cevennen: Brow, H. Rowl.³⁾, Jones.

Depart. du Nord: Paux.

Corsica: Kollmorgen (Versuch ein.

Gresy sur Aix: Tutt.²⁾

Macr.-Lep.).

Haute-Marne: Frionnet (Bestimmungstab. d. Macro-Lep. Raupen).

Paris: Dumont (Hemerophila nycthemeraria, für die Umgegend von P. neu),

Mabille^{e)}, Poujade (Ausschlüpfen einer Saturnide aus Madag.), Walker,

F. A. (Rhopalocera).

Seealpen: Lang²⁾ (Bemerk. zu den Lepid.)

Valois: Favre (Studie über die Eupitheciiden dieses Gebietes).

Vernet les Bains: Homberg^{f)}.

a) Besonders günstig für Erebiiden. (11 Sp. + 6 Varr.) Zeitsch. f. Entom. Breslau, 1900 p. XX.

b) Im Sommer 1901 hat Thieme 62 Spp. Tagfalter erbeutet. Das Gebiet liegt 6000 Fuss hoch. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900. 4. Okt. (p. 24).

c) Ueber die in den Karpathen einheimischen Arten der Gatt. Erebia Dalm. u. deren Beziehungen zur pleistocenen Fauna Mitteleuropas. Deutsch. Entom. Zeitschr. 14. Bd. lep. Hft. p. 353—380.

d) Sprawozd. Kom. Krajo T. 35 Cz. II, p. 26—34 u. 78—101.

e) Bull. Soc. Entom. France, 1901 p. 199.

f) Bull. Soc. Entom. France, 1901, p. 317.

Grossbritannien: Barrett, C. G. ¹⁾ (*Hadena lateritia*, für brit. Fauna neu).
 Buckler (Raupen britisch. Lep.) Kirby (populäres Werk), Tutt ¹⁵⁾ (Verbreit.
 gewiss. Lepid.). — Siehe ferner unter *Colias*, *Vanessa* u. *Acherontia*.

North-West: Arkle ²⁾ (monatl. geordnet).

Anglesea: Freer ²⁾.

Barrhead: DalGLISH, And. Adie (*Choerocampa nerii*).

Bath: Jefferys ¹⁾ (Saison 1900).

Berwick-on-Tweed: Bolam (*Sphinx convolvuli*).

Bexley u. Umgegend: Newman ²⁾ (*Plusia moneta*).

Bidborough: Sheppard-Walwyn ²⁾ (*Plusia moneta*).

Blackheath: Dannatt ²⁾ (*Leucania vitellina*).

Boscombe: Robertson ⁵⁾.

Bournemouth: Robertson ⁴⁾.

Boxworth: Thornhill (Raup. von *Sphinx conv.*).

Brighouse: Blakeborough ^{a)}. Brighton: Hyams ^{b)}.

Burnley: Clutton, W. G. ²⁾, Clutton & Wright ^{c)}.

Diverse Distrikte:

Kendal District: ^{d)}.

London District: ^{e)}. — Siehe ferner St. Helens.

St. Helens: Simonswood: ^{f)} (Rauchdistrikt. — Der Rauch der Faktoreien
 hat in den letzt. Jahren nachgelassen).

Bold District: ^{g)}.

Ecclestone District: Cotton ^{h)}.

Knowsley District: Thompson ⁱ⁾.

Cambridge: Crisp ²⁾ (*Deileph. livorn.*), Kidner (*Plusia moneta*).

Carnarvonshire: Dobrée ^{k)}, Tetley ¹⁾.

Castle Moreton: Fox, C. E. Dobr. ¹⁾, ²⁾ (*Xylomiges conspic.*).

Chester District: Arkle ³⁾.

Chichester u. Umgegend: Anderson ¹⁾, ²⁾.

Chingford: Croker, A. J. Chislehurst: Bower ^{e)}.

Cornwall: James, R., Rollason ¹⁾ (späte u. frühe Daten von Lepid.), Rollason ²⁾
 (*Lycaena aegon* u. *astrarche*).

^{a)} Notes from Br. The Entomologist, vol. 34. Jan. p. 23—24.

^{b)} Brighton District: Hinkins.

^{c)} Journ. Burnley Soc. 1901, No. 18.

^{d)} List of the Macrolepidoptera of the Kendal District. Third Annual Report, of the Kendal Entomological Society. Session 1900. Kendal. (5 pp.). — Es werden 374 Sp. namhaft gemacht; Supplemente sollen folgen.

^{e)} einschliessl. der Geometridae. in: Trans. of the City of London Entom. a. Natural History Soc. for the year 1900 (Pp. 74) London Institution, E. C. 1901.

^{f)} The Entomologist, vol. 34 p. 163—180. Macrolep., die interessantesten ders. werden aufgezählt.

^{g)} t. c. p. 164; auch *Colias edusa*.

^{h)} t. c. p. 163.

ⁱ⁾ t. c. p. 163.

^{k)} Der Autor heisst Fox, C. E. Dobrée u. ist Dobrée, C. E. von p. 649 zu p. 658 zu stellen.

- Co. Dublin: Greer ¹⁾, ²⁾. Co. Sligo: Starkey.
 Cranbrook: siehe Kent.
 Croydon: Sheldon ²⁾ (*Colias hyale* u. *edusa*).
 Derry: Hart (*Vanessa io*).
 Devon: Mathew ¹⁾ (*Anticlea sinuata*), Mitford ¹⁾ (*Melitaea athalia*).
 North: Lynton: Oldaker.
 Seaton: Eaton, A. E. (Autumnal Notes), Eaton, E. H. (*Colias edusa*).
 South: Heath (Lep. in August): Porritt ¹⁾ (divers. Lepid.): Woodforde ⁷⁾.
 North Somerset: Carr ⁵⁾.
 Doncaster: Corbett ²⁾ (*Argynnis adippe*, *Dryas paphia*).
 Dorking: Oldaker ^{a)} ¹⁻⁴⁾.
 Dover: Stockwell ¹⁾, ²⁾.
 Dovercourt: Mathew ⁵⁾ (*Eugonia autumnaria*).
 Dublin: Wheeler, Wm. (*Oenistis* (*Gnophria quadra*).
 Dulwich, East: Colthrup ⁵⁾ (*Sphinx conv.*).
 Dumbartonshire: Evans, W. E. (*Acherontia atropos*). — Parish of Bonhill: Malloch (*Tortr.* u. *Tineid.*).
 Durham: Robson (*Acherontia atropos*).
 Eastbourne: Adkin ⁵⁾ (*Lycaena arg.*, zahlr. Vork.), Blenkarn ^{b)}.
 Epping Forest: Lane (Raupenfang).
 Esher District: Fleet.
 Essex: Burrows, C. R. N. ⁷⁾ (*Sphinx convolv.*), Ransom, Mathew, Whittle ²⁾.
 Exeter District: Rowden (*Callimorpha hera*).
 Flintshire, Rhyl: Perkins (*Camptogramma fluviata*).
 Folkestone: Freke (*Colias* spp.), Hills ¹⁾.
 Frensham District: Newland.
 Frodingham: Corbett ¹⁾ (*Actebia praecox*, *Cramb. pinetellus*).
 Glanvilles Wootton: Dale ²⁾ (Zusätze zu den Lep.).
 Gravesend: Huggins, H. jun. ¹⁾ (*Colias hyale*).
 Guernsey: Lowe ¹⁾ (*Tortrix pronubana*), ²⁾ (*Acherontia atropos*).
 Hale End: Robbins (*Boletobia fuliginaria*).
 Hampshire: Adams, Fred. C. ¹⁾, ²⁾ (*Pap. machaon*), Fowler ²⁾ (*Caradrina ambigua*), Moberly ^{c)}, Prout ⁵⁾ (*Lepid.-Fauna*), Robinson ^{d)}.
 Hampstead: Hopson (*Sphing.* zu Hampstead), Philips ²⁾ (*Dilina tiliae*).
 Harwich District: Mathew ⁴⁾ (*Acherontia atropos* u. *Sphinx conv.*)
 Hereforshire: Wood ^{e)}.

^{a)} Oldaker, F. A. Entomological notes for May, 1901. The Entomologist, vol. 34, July, p. 205; desgl. Notes for June, 1901. t. c. p. 228—229. — Diverse Lep.

^{b)} Blenkarn, Stanley, A. Notes from Eastb. The Entomologist, vol. 34. Jan. p. 25—26.

^{c)} The Entomologist, vol. 34 p. 18.

^{d)} t. c. p. 182.

^{e)} Additions to the list of Lepidoptera since 1892, with notes of capture. Trans. Woolhope Club; 1898—1899. p. 186—189.

- Hertfordshire: Barraud³⁾ (Schmetterl. am Licht), Gibbs^{a)}.
 Highlands, Western: Sheldon⁴⁾.
 Holy Island, Northumberland: Embleton (Raupen von *Sphinx convolvuli*).
 Huntingdonshire: Theobald²⁾ (Van. antiopa).
 Ilford etc.: Adams^{b)}.
 Isle of Purbeck: Bankes²⁾ (*Argyresthia atmoriella* Buks.).
 Isle of Wight: Fox, C. W. (*Sphinx convolv.*), Goss²⁾ (*Vanessa antiopa*).
 Kendal: Moss^{c)}.
 Kent: Huggins (*Sesia andrenif.*), Huggins, H. jun.³⁾ (desgl.), Shepheard-Walwyn¹⁾ (*Plusia moneta*).
 Kent, Cranbrook: Marshall.
 North Kent: Barraud¹⁾, Newman (*Mellinia ocellaris*).
 North West Kent: Bower²⁾ (*Spilodes sticticalis*).
 Walmer, Kent: Bloomfield (*Clostera anachoreta*).
 King's Lynn: Atmore¹⁾.
 Kirkcubrightshire: Service (*Sphinx convolv.*).
 Knudsford: Day, G. O.¹⁾. Lee: Carr³⁾ (*Lyc. argiolus*).
 Lincoln: Musham²⁾ (*Nonagria neurica*).
 Llandrindod (Radnorshire): Arkle⁴⁾.
 London: Adkin⁶⁾ (*Cyaniris arg.*, zahlr. Vorkommen), Cottam (*Pieris rapae*, frühes Erscheinen), Mc Lachlan (*Lycaena argiol.*), Mitford²⁾ u. Mc Arthur (*Lycaena argiolus*).
 London District: Bower¹⁾ (*Gelechia malvella*).
 East Lothian: Evans²⁾ (*Sphinx convolv.*).
 Lyndhurst: Robertson¹⁾.
 Margate: Colthrup⁶⁾ (*Eutricha quercifolia*).
 Middlesex: Brown, H. Rowl. (*Cyaniris arg.*, *Plusia moneta*).
 Minehead: Cotton, John.
 Mucking: Burrows, C. R. N.⁵⁾ (*Trochil. bembecif.*), ⁶⁾ (*Pap. machaon*), ⁸⁾ (*Mellinia ocellaris*).
 New Forest: Adams, Adkin, B. W.¹⁾, Bankes²⁾ (*Lophopteryx carmelita* Esp.), Carr²⁾ (Easter in N. F.), Dale¹⁾ (*Cloantha perspicillaris*), Robertson²⁾, ⁴⁾, Tait²⁾ (Octob.-Sammeln), Wells.
 Norfolk: Harris.
 Northamptonshire: Goss¹⁾ (*Rhopalocera*).
 Norwood: Swain¹⁾ (*Plusia moneta* u. *Porthesia chrys.*), ²⁾ (*Catoc. fraxini*).
 North Wales: Woodforde⁶⁾. Oxton: Studd¹⁾.
 Paisley: Steuart. Penarth District: Howe³⁾.
 Pertshire: Cockayne³⁾ (*Nyssia lapp.*).
 Breadalbane district: Goss, H.³⁾ (Aufzählung, ev. nebst Bemerk.)
 Portland: Hyde¹⁾, ²⁾ (Notes).
 Reading: Barnes, W.¹⁾ ²⁾ (*Ennomos autumnaria*), Butler, W. E.²⁾ (*Acidalia imitaria*), ³⁾ (*Helotropha leucostigma*), ⁴⁾ (*Anticlea sinuata*), ⁶⁾ (*Ennomos autumnaria*).

a) Trans. Hertfordshire Soc. vol. XI. p. 43—45.

b) Notes from Ilford. The Entomologist, vol. 34. Nov. p. 321.

c) Rep. Kendal entom. Soc. vol. III. p. 26—30.

- Ringwood: Fowler ³⁾ (*Caradrina ambigua*, ⁴⁾ (*Sphingidae*).
 Romford: Claxton (*Mamestra abj. u. Spilodes palealis*).
 Sandown: Bell (*Leucania L-album*).
 Scarborough: Barker ³⁾.
 Scilly Isles: Adkin, B. W. ²⁾. Sherwood Forest: Hardy.
 Shropshire: Boxer (*Limenitis sibylla*), Thornewill (*Thecla w-album*).
 Skipwith: Ash ⁴⁾. Somerset, North: siehe Devon.
 Somersetshire: Doidge, H. (*Xylomiges perspicillaris*), Whittacker, O
 Southend: Lang ³⁾ (*Lyc. argiolus*, zahlr.).
 Southend District: Whittle ¹⁾, ³⁾ (*Lepid.*).
 South Wales: Barrett, C. G. (*Hadena lateritia*).
 Staffordshire: Freer ¹⁾. — North: Bostock ^{b)}.
 St. Margaret's Bay: Dannatt ²⁾ (*Leucania vitellina*).
 Sudbury, Suffolk, Essex: Ransom (*Lepid. während 1900*).
 Suffolk: Bower ⁵⁾ (*Catocala fraxini*), Frohawk ⁶⁾ (*Catocala fraxini*), Sparke
 (Orobena).
 Surrey: Warne (*Deiopeia pulchella*).
 Sussex: Hyams (*Pieris daplidice*).
 West: Churchill ¹⁾ (Early Spring).
 Thanet: Barrett, J. B.
 Tangier: Meade-Waldo (Sammelnotizen).
 Torquay: Crocker, M. (*Leucanea extranea u. Dasycampa rubiginea*).
 Tunbridge Wells: Shephard-Walwyn ³⁾ (*Leucania L-album*).
 Ulster: Johnson ²⁾ (*Van. io*).
 Wandsworth: Cowl ¹⁾ (*Plusia moneta*).
 Watford, Herts: Arkle ⁵⁾.
 Warwickshire: Garrett (*Lycaena minima*), Wynn.
 Wiltshire: Sladen ¹⁾ (Bemer.), Solly (*Choeroc. celerio*).
 Wisbeck District: Glenny (*Acherontia atropos*).
 Witherstack: Forsyth.
 Whitsuntide: New Forest: Wells.
 Windsor: Froggatt ¹⁾ (Kartoffelplage).
 Woking: Saunders (*Van. antiopa*).
 Worcestershire: Day (*Sterra sacraria*), Woodforde (*Brephos nota*).
 York: Walker ²⁾ (*Chrysophanus phlaeas*).
 Yorkshire: Ash ³⁾, Hewett ^{c)}, Whitaker, A. (Raupen von *Sphinx convol. d*).
Ireland: Cuthbert, Green ³⁾ (*Agrotis cinerea* für irische Fauna neu), Grierson,
 P. H. (*Van. io* in the west), Jackson (*Oenistes quadra*), Johnson ¹⁾
 (*Van. c-alb.*).
 Carlingford Mountain: Carpenter, G. H. (*Oenistes quadra*).
 Poyntzpass: Johnson ³⁾ (*Cerastis ligula*), Kane ¹⁾ (Supplem.-Liste).

a) Arge u. *Thecla quercus*. Naturalist, 1901 p. 291.

b) Rep. North Staffordshire Club vol. XXXV p. 59—63.

c) Lep. in 1900. Naturalist, 1901 p. 81—98, 108.

d) *Sphinx convolvuli*. Raupe. Naturalist, 1901 p. 289.

- Co. Cork: Donovan (Lep.-Liste).
 Co. Westmeath: Middleton.
 Isle of Man: Clarke, H. S. ¹⁾, ²⁾.
 Londonderry: Ward (Vanessa io).
- Schottland:** Brown ^{a)}, Evans ¹⁾ (*Selenia bilunaria*, keine 2. Gener.), ³⁾ (Raupen von *Sphinx convolv.*), ^{b)}, Morton ²⁾ (2. Gener. von *Selen. bilunaria*), Service ^{c)}, Woodbridge (*Selenia tetralun*).
- South, West: Dalglish ²⁾. Bonhill, Dumbartonshire: Malloch.
 Breadalbane: Goss. Brodick, Arran: Sharpin.
 Shetland: King (Van. antiopa).
 Brodick, Arran, N. B.: Sharpin ^{d)}.
- Schweden:** Meves (Nonnencalamität).
 Stockholm, Lund u. Upsala: Zusammenstellung der dort aufbewahrten Insekten-Sammlungen. Typen. Bull. Soc. Entom. France 1901, p. 186—187—188.
 Södermanland: (Berättelse). Ostergötland: (Berättelse).
 Schärengbiet um Åbo u. Åland: Reuter ⁶⁾ (Züinsler u. Wickler).
 Bergen: Schneider (Liste).
- Lappland:** Teich ³⁾.
- Norwegen:** Morton (Rhop. im Sommer 1900 [Rhopaloceren - Liste p. 32—33]), Schneider ^{e)} (Col. og Lep. etc.), Strand ¹⁾ (Beiträge zur Fauna), ²⁾ (Beschr. neuer Formen).
- Finnland:** Aro (neue Sp. für dass.), Federley (für das Gebiet neue Arten), Lampa ^{f)} (für die Fauna neue Arten), Poppus (*Lygris reticulata*), Reuter ¹⁾ (*Orthotaelia sparganella* f. Fauna neu), ²⁾ (*Himera pennaria*), ³⁾ (*Lymantria monacha*), Sahlberg ¹⁻⁴⁾ (neue Form. für das Gebiet etc.).
- Holland:** Friesland: Ter Haar ^{g)}.
 's Hertogenbosch en Alkmaar: Caland.
- Belgien:** André (Bestimm.-Tab.), de Crombrugge de Piquendaele (*Microlep.*) Hippert.
- Niederlande:** Snellen ³⁾ (*Lycaena euphemus*, für Fauna neu).
- Italien:** Cecconi (*Grapholitha tedella*, Schädling), Rostagno ¹⁾, ²⁾ (Classifikation).
 Ober-Italien: Euganeen u. Battaglia: Neustetter ²⁾. — Toskana: Stefanelli (Katalog der Lep.).
 Mittel-Italien: (Statistik der Schädlinge) ^{h)}.
 Süd-Italien: Cannaviello ¹⁾ (Bemerk. zu Lep.), ⁴⁾ (*Tineinae*), ⁷⁾ (Bemerk. zu einig. Papil).

a) Ann. Scott. Nat. Hist. 1901 p. 240.

b) t. c. p. 239.

c) t. c. p. 239.

d) Sharpin, Archdale. The Entomologist, vol. 34 p. 24.

e) Besprech. durch Stichel, Berlin. Entom. Zeitschr. 47. Bd. Sitz.-Ber. f. 1901, 26. Sept. — cf. Insektenbörse 18. Jhg. p. 341.

f) Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 158.

g) Tijdschr. Entom. 44 D. p. 3, 4 u. t. c. p. 3, 4, 16 Verslag.

h) 15 Jahre lang durchgeführt. R. Stat. di Entom. agrar. di Firenze, Ser. I. Hft. 3.

- Messina: Santoro-Silipigni ^{a)}. Vesuv: Cannaviello, H. ^{b)}.
 Sicilien: Fuchs ¹⁾.
Spanien: Krüger, Walsingham ²⁾.
 Andalusien, Umgebung von Granada u. Malaga: Ribbe ^{c)}, ⁴⁾.
Balkanländer: Europäische Türkei:
Bulgarien: Bachmetjew ¹⁾ (Temperaturschwankungen. — Literatur; dem Gebiet eigene Formen).
Rumänien: Abafi-Aigner ¹⁵⁾, de Caradja ¹⁾, ²⁾, Fleck (Macrolep.-Fauna), Jacquet ^{d)},
 Montandon (Beiträge z. Fauna), ^{e)}.
Griechenland: Elwes (Faun. Bemerk.) ^{f)}, Fontaine ^{g)}.
Bosnien: Rebel ²⁾ (neue Lepid.). **Serbien:** —
Herzegowina: Rebel ²⁾ (neue Lepid.).
Mittelmeergebiet: Fletcher, Th. B. ⁴⁾.

Asien.

- De Nicéville (Calinaga), Pavel ¹⁾ (Lepid. der 3. asiat. Forschungsreise).
Orient. Region: Rothschild and Jordan (neue Lithosiinae), Warren ²⁾ (Uran., Geometr.).
Indo-australisches Gebiet: Swinhoe ¹⁾ ²⁾ (n. gg., n. spp.).
Kleinasien, Syrien: Warren ³⁾. Libanon ^{h)}: Nicholl ¹⁾ ²⁾ ⁱ⁾ (Tagfalter).
 Palästina: Püngeler ^{k)}.
Indien: Hampson ³⁾ ¹⁾, Moore ^{m)}, de Nicéville ³⁾, Swinhoe ³⁾ (n. spp.), Warren ²⁾ ³⁾.

^{a)} Boll. Soc. Zool. Ital. vol. IX p. 81—89.

^{b)} Cannaviello, H. Sur les Noctuae de la région de Vésuve. *Miscell. entom.* vol. IX. p. 81—89.

^{c)} Ribbe unterscheidet für den Sammler 6 Sammelgebiete in der Umgebung von Granada: 1) oberhalb der Alhambra; 2) Sierra de Alfacar; 3) bei der Eisenbahn; 4) Gärten u. Berge bei Peñuela; 5) Sierra Nevada; 6) Rio Genil. — Sammelnotizen daselbst.

^{d)} Separata bei W. Junk, Berlin NW.5 zu haben. Aus Faune de Roumanie. Faunologisch angesichts der so verschiedenen Klimata sehr beachtenswert, doch noch wenig erforscht.

^{e)} Aristides von Caradja's Arbeiten aus der Iris werden von E. Fleck hinsichtlich der *Macros* revidiert u. ergänzt. Für die *Micra* besorgt dies Caradja selbst. Fleck gibt zahlreiche Notizen zur Variabilität. Bei den *Micra* sind auch biolog. Angaben gemacht.

^{f)} *Trans. Entom. Soc. London* 1900. Proc. p. XIV—XV.

^{g)} t. c. p. XV.

^{h)} Die hohen Berge dess. beherbergen wohl eine grössere Zahl alpiner Formen als man bisher annahm. *The Entomologist*, vol. 34 p. 132. — Bemerk. zu den Formen etc.

ⁱ⁾ Bemerk. auch in *Proc. Entom. Soc. London*, 1901. p. III.

^{k)} Püngeler, R. Neue Macrolepidopteren aus Palaestina. *Deutsche Entom. Zeitschr.* 14. Bd. lep. Hft. p. 331—333.

^{l)} *The moths of India. Series II, Part IV. Journ. Bomb. Soc.* vol. XII. p. 571—591.

^{m)} Moore, F. *Lepidoptera indica. Part XLIX—LIII, viz. vol. IV* p. 1—96 pls. 379—404.

- Bombay: Canaradistrikt: de Nicéville³⁾ (Nährpflanzen der dortig. Rhopal.),
Butler⁶⁾.
- Tongking: Fruhstorfer⁵⁾. — Haut Tongking: Cav-Baag: de Johannis⁴⁾.
Annam: Fruhstorfer⁴⁾.
- Ceylon: de Nicéville and Manders (Liste der Lepid., nebst Bemerk.).
Diyalatawa, Boer camp: Green¹⁾ (Fang am elektr. Licht).
- Assam: Snellen. Nias: Fruhstorfer²⁾, Dudgeon.
- Sikhim, Bhutan: Elwes & Hampson²⁾. Ostasien: Fruhstorfer¹⁾.
- Indochina: Fruhstorfer³⁾. Perak: Druce¹⁾.
- China: Druce¹⁾, Leech²⁾. Hunan: A. G.¹²⁾ (Liste der Lep.).
Ngan-Noei: de Joannis²⁾ (badende Schmetterlinge).
West: de Nicéville (n. g. Vanessa verw.).
Hongkong: Fruhstorfer⁶⁾.
Wei-Hai-Wei: Fletcher, Th. B.³⁾ (Liste nebst Bemerk.).
- Chinesisch Turkestan: Püngeler. Japan: Hampson³⁾, Leech²⁾, Ragonot.
- Korea: Leech²⁾.
- Centralasien: Chinesisches Turkestan: Püngeler (neue Macrol.).
Malayische Halbinsel: Fruhstorfer¹⁾ (Papilio).
- Malayischer Archipel: Butler⁴⁾, Druce¹⁾, Fruhstorfer (siehe Anhang sub No. 3),
Grose-Smith (in Rhopal. exotic.), Hampson³⁾, Pagenstecher¹⁾ (Beiträge z.
Lepid.-Fauna), Ragonot, Rothschild & Jordan²⁾, Snellen⁴⁾,⁶⁾, Swinhoe¹⁾,
²⁾,³⁾, Warren²⁾,³⁾.
- Niederländisch-Ostindien: Ceram: Ribbe¹⁾.
- Indo-australisches Gebiet: Warren³⁾ (Drepan., Uran., Geom.).
Sumatra: Hering (Uebersicht über die Pyraliden).
Vulkan Kaba: Hagen⁶⁾. Java: Piepers u. Snellen (siehe Anhang).
Philippinen: Semper (Heterocera).

Afrika.

- Aurivillius, Butler, Distant, Druce¹⁾,²⁾, Grose Smith^{f)}, Hampson¹⁾,³⁾, Lathy¹⁾,
Ragonot, Rothschild¹⁾, Sharpe²⁾, Warren¹⁾,⁴⁾.
- Aethiopisches Gebiet: Warren¹⁾ (Thyrid., Epiplema u. Geometr.).
- Nordafrika: Rothschild²⁾ g). Westafrika: vacat.
- Ostafrika: Druce²⁾. Britisch: Butler, A. G.¹⁾
Kikuyu Country u. Mombasa: Butler, A. G.²⁾
Weisser Nil: Butler, A. G.³⁾
Mombasa-Taveta-Wälder: Butler, A. G.⁴⁾

a) Catalogue of the Heterocera of Sikhim and Bhutan. Part X, Hypsidae. Journ. Bomb. Soc. vol. XIII p. 672—674.

b) Zahlr. interess. Bemerk. über Lepidopt. in der Insektenbörse. 17. u. 18. Bd.

c) Bemerk. zu einigen Macros. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 18.

d) Butler, A. G. Notes on the genera Tanaecia and Nora with descriptions of new species. Ann. Nat. Hist. (7.) vol. 7 p. 356—366.

e) Globus 1901. Nr. 16—17. — Ref. Insektenbörse. 18. Jhg. p. 380—381. Auch Lepidopten behandelnd.

f) Grose-Smith, Rhopalocera exotica. Partes 55—57. London 1901.

g) Die unter Rothschild (2) p. 689 des Berichts citierte Arbeit ist von Rothschild, N. nicht Rothschild, W.

- N. W. Tangana: Alberta: Wolley (vorläuf. Liste der Macros).
 Uganda Protectorate: Butler ⁷).
- Nord-Ost-Afrika:** Egypten: Rothschild ²).
 Sokotra: Rebel ¹) (neue Lepid.). **Südarabien:** Rebel ¹) (neue Lepid.).
- Central-Afrika:** British Central-Afr.: Zomba: Lathy ¹).
 Oestl. Centr.-Afr.: Munisu, beim Mount Kenya: Butler, A. G. ⁵).
 Northern Nigeria: Butler, A. G. ⁸). Sudan: Rothschild, N. (cf. Ann. p. 749).
- Süd-Afrika:** Barret, C. G. ²), Fawcett (Metamorphose divers. Lep.), Leigh
 (Acherontia atropos).
 Transvaal: Distant. Delagoabay: Junod.
 Natal: Warren ¹).
- Madagascar:** Ragonot. **Reunion:** vacat.
Bourbon: Warren ¹).

Amerika:

- Schaus ²), ³), ⁷), (Notodontidae, Revision), Warren ⁵) (Heterocera).
- Nord-Amerika:** Barnes ³) (Beschreibung neuer Spp.), Beutenmüller (Sesiidae ^a)
 Dietz, Doane and Brodie (variegated cutworm), Dyar ³) (Entwickl.
 divers. Heter.), Busck ^b), Fernald ³) (ein Jahrhundert lepid. Forschung),
 Grote, A. R. ¹⁰) (Liste von Apatela Spp.), Hinds (Alsophila pometaria),
 Lyman ³), Newcomb ²), Poling ¹), Ragonot, Schaus ⁵), ⁶), ⁸), ¹⁰), Skinner ¹)
 (Studien üb. nordamerik. Form.), Smith ⁴), de Vos tot Nederveen Cappel
 (Agrotis, over de stekels etc.), Warren ⁵).
- Alberta: Dod ^c).
- Arizona: Dyar ⁴⁰) (neue Zygaenide), Poling (Neophasia Terlootii n. var.),
 Skinner ²).
- Californien: Clarke, W. T. (Gelechia operc.) Skinner ²).
- Canada: Busch ¹) (neue Tineide). Colorado: Florissant: Scudder, Snyder.
- Florida: Dyar ⁴³) (anscheinend neue Tortricide).
- Palm Beach: Fernald ²) (neue Pyral. u. Tortr.). — Süd: Dyar ⁴²) (Beschr.
 einig. Pyral.-Raupen). — Loggerhead, Key: (L'odorat p. 681 dies. Ber.).
- Lake Worth: Dyar ²⁴) (Winterschmetterl.).
- Maine: Newcombe ¹), ²) (Chionobas n. sp.).
- Manitoba: Hanham ¹) (Zusätze zur Liste) ²). — Süd: Heath, E. F. (Bemerk.
 zum Vorkommen von Lep.).
- Mexiko: Smyth, E. A. (Philampelus n. sp.)
- Missouri-Quellen: Rowley. Montreal: Newcomb.
- Nebraska; Sioux County: Cary, M. (Rhopal.).
- New Jersey: Dyar ¹²) (Gluphisia severa).
- New Mexico: Hudsonian Zone: Cockerell ³) (Rhopal.), Dyar ⁴⁸).
- New York: Beutenmüller ³).
- Ontario: Lochhead (Seidenraupen-Industrie).

^a) **Beutenmüller, Wm.** Monograph of the Sesiidae of America, North of Mexico. Mem. Amer. Mus. I, Part VII p. 217—352 pls. XXIX—XXXVI.

^b) **Limnoecia**, Proc. Entom. Soc. Washington, vol. IV p. 421.

^c) **Macrolepidoptera**. Canadian Entom. vol. 33 p. 40—42 etc.

Salt Lake City: Browning.

Staten Island: Davis ³⁾ (Dog Head's Butterfly), Joutel ⁸⁾ (Isochaetes Beutenmülleri).

Yellowstone National Park: Burrison (Rhopal.).

Mittelamerika: Dognin ^{a)}, Druce ¹⁾, ²⁾, Dyar ²¹⁾, Godman (& Salvin) (Biolog. Centr.-Amer.), Hampson ³⁾, Ragonot, Schaus ⁵⁾, ⁶⁾, ⁷⁾, ⁸⁾, ¹⁰⁾, Smyth, Stichel ¹⁾, Warren ⁵⁾.
Costa Rica: Warren ⁵⁾.

Antillen etc.: Butler, Godman (& Salvin), Ragonot, Schaus ⁵⁾, ⁶⁾, ⁷⁾, ¹⁰⁾, Warren ⁵⁾.

Bahamas: Hampson ²⁾ (Liste nebst Bemerk.).

Dominica: Warren ⁵⁾.

Jamaica: Swainson ²⁾ (Bemerk. zu Raupen).

Trinidad: Kaye ¹⁾ (Katalog der Heterocera).

Westindien: St. Lucia: Sclater (Liste).

St. Vincent: Warren ⁵⁾.

Tropisches Amerika: Druce ²⁾, Schaus ⁴⁾, ⁸⁾, ¹⁰⁾ (Heterocera), ⁵⁾, ⁶⁾ (Geometridae), ⁹⁾ (Noctuidae).

Südamerika: Butler ⁹⁾, ¹¹⁾, Dognin ¹⁾, ²⁾, Druce ¹⁾, ²⁾, Dyar ¹⁷⁾, Godman (& Salvin), Hampson ³⁾, Nöldner, Ragonot, Rothschild & Jordan ¹⁾, Schaus ⁵⁾, ⁶⁾, ⁸⁾, ⁹⁾, ¹⁰⁾, Stichel ^{b)}, Therese, Prinzessin v. Bayern.

Amazonenstrom: Göldi (Schmetterlingszüge).

Argentinien: Haylaerts (neue Psychide).

Rio Janeiro: von Bönninghausen (Beiträge).

Bolivia: Weeks, A. G. ¹⁾, ²⁾, ³⁾.

Brasilien: Süd: von Bönninghausen (Beiträge).

Columbien: Therese von Bayern ^{c)}.

Ecuador: Warren ⁵⁾.

Honduras: Warren ⁵⁾.

Venezuela: Warren ⁵⁾.

Australien.

Australien: Beutenmüller ¹¹⁾ (Catalog beschr. Verwandl. austral. Lep.), Druce ¹⁾, Hampson ³⁾, de Joannis ¹⁾, Lower ⁴⁾, Lucas, Meyrick ¹⁾ (Hesperiadae), Ragonot, Swinhoe ¹⁾, ²⁾, ³⁾ (n. gg., n. spp.), Warren ²⁾.

Bismarckarchipel: Pagenstecher ⁴⁾.

^{a)} Dognin, P. Description de Lépidoptères nouveaux. Le Naturaliste 1901 p. 31, 68.

^{b)} Stichel, H. Auftheilung der Gattung Opsiphanes Westw., Beschreibung neuer Brassoliden und synonymische Notizen. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. p. 487—524, Taf. VIII, IX.

^{c)} In Columbien waren an den sonnigen Hängen, in der tierra templada, also in Höhen von 1000—2000' die Schmetterlinge viel häufiger als im heissen Tieflande, in der tierra caliente. l. c. p. 239.

^{d)} Lower, O. B. Descriptions of new genera and species of Australian Lepidoptera. Trans. Roy. Soc. S. Austral. vol. XXV p. 63—98.

Hawaiische Inseln siehe Inselwelt.

Neu-Seeland: Meyrick³⁾ (neue Lepid.), Quail³⁾ (Nyctemera annulata).

Sandwich-Inseln: Meyrick²⁾ (Macrolep.).

Palaeontologie.

Grote¹²⁾ (p. 659—661).

Von fossilen Schmetterlingen sind bekannt aus der

Neuzeit der Erde:

Quartärformation.

Copalschmetterlinge: Tagfalter u. kleine Motten von Zanzibar, wohl zu Spp. gehörig, die noch jetzt dort leben.

Tertiärformation. Für die bis 1891 publiz. Funde vergl. Scudder, Bull. U. S. Surv., Nr. 71. p. 671—682: 110 No., deren einige zusammenfallen. Die wenig sicher bestimmt. Tagfalter gehören den Nymphaliden an u. sind von den recenten Arten versch.

Miocän: Gabbro (cf. Rebel 1898). Oeningen in Baden: Heer (1849: 2 Spp. v. Bombycites, 1 Larvenhülle von Psyche). — Von Radoboj sind Noct. Reste bek., ferner die recent. Gatt. Pontia(?), Eugonia u. die foss. Mylothrites.

Oligocän: Gute Funde aus dem Kalkschiefer bei Aix in d. Provence. Die Bestimm. der Nachtfalter sind unsicher. An Tagfalt. sind bek.: Thaites, Pamphilites, Coliates(?), Lethites, Jupiteria, Neorinopsis u. Satyrites. — Braunkohle von Rott am Siebengebirge u. v. Florissant in N.-Am.: Prolibythea, Prodryas, Nymphalites. — interoligocäner Bernstein des Samlandes: Tineiden, Tortriciden, SpHINGIDEN(?); Lycaena-Raupen(?). — Der Bernstein der Ostsee enthält viel Lepid., zumeist Kleinschmetterlinge. (Um zu wissenschaftl. Resultaten zu gelangen, müsste aber erst das Geäder tropischer Micros, speziell südostasiat. ev. südamerik. eingehend mit denen im Bernstein vorkommenden verglichen werden.)

Eocän: Isle of Wight: eine angebliche Lithosia. Die tertiären Funde unterstützen die Ergebnisse der Untersuchungen wonach die Nymphaliden u. die Hesperiden „Dickköpfe“ ältere, die Pieriden u. Lycaeniden moderne Typen der Stammlinie der Hesperiadés darstellen.

Mittelalter der Erde:

Oberer Jura. Lithograph. Schiefer von Solenhofen 2 angebl. SpHING. von Weyenberg: Sphinx Snelleni u. Pseudosirex Darwini (beide nach Scudder zu den Hymen. zu stellen. — Oppenheim's angebl. Glasflügler sind ebenfalls Hymen.

Brauner Jura in Sibirien: Angebl. Tineide, Palaeocossus jurassicus (= Palaeontia oolitica Butl. nach Brauer) Oppenheim.

Obere Kreide: In fossilen Blättern nach Fritzsche u. Hagen vermuthl. Tineadae(?)-Minen.

Es ist unwahrscheinlich, dass die Schmetterlinge im Jura oder in der Kreide durch specialisirte Formen vertreten waren.

Paläozoische Formation: Keine zuverlässige Bestimm. von Lep., Macros fehlen sicher; sie scheinen sich aus Tineiden ähnl. Formen entwickelt zu haben.

Lepidopteren im Copal von der Zanzibarküste (Akazienharz im Römermuseum 2 Tagfalter (dar. anscheinend eine Nymphalide), mehrere Tineiden, eine grosse Puppe. Geolog. Alter nicht sehr hoch. Berlin. Entom. Zeitschr. 47. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900. 18. März. — cf. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 108.

Barbarothea n. g. *Libytheinarum*, Scudder, Bull. U. S. Geol. Survey. No. 93. p. 21. — *florissanti* p. 22. Taf. III. Fig. 1—5 (Tertiär von Nord-Amerika).

C. Systematischer Theil.

Rhopalocera.

Autoren: Aurivillius, Ball, Beutenmüller, Bönninghausen, Browning, Butler, Carpenter, Chodolowsky, Druce, Dyar, Fischer, Frohawk, Fruhstorfer, Godman, De Graaf, Grose-Smith, Grote, Hormuzaki, Joannis, Kuznezow, Landquart, Lathy, Marshall, Meyrick, Moore, Newcomb, de Nicéville, Nicholl, Nöldner, Oberthür, Pagenstecher, Püngeler, Rebel, Riffarth, Rothschild, N., Rothschild, W., Rothschild u. Jordan, Scudder, Sharpe, Snellen, Snyder, Stichel, Swainson, Thomann, Weeks.

Katalog der paläarktischen Formen: Standinger u. Rebel. Besprechung p. 697—699 dieses Berichts. Es sei ferner noch Folgendes hervorgehoben:

Die Papilionidae, an der Spitze stehend (nach Grote); die Reihenfolge der Gatt. wollte Staud. nur in wenigen Fällen geändert wissen, dasselbe gilt von den Sphingiden. Maassgebend waren für die Saturniiden die Gesichtspunkte Grote's, für Noctuiden u. Geometriden diej. Hampson's u. Meyrick's. Bei den Syntomiden u. Lithosiiden wurden Hampson's monogr. Arbeiten, bei den Psychiden die von Heylaerts benutzt. Unbefriedigend lassen uns die Cossiden. Bei den Pyraliden wurde Hampson mit geringen Abweichungen befolgt. Die Oecophoriden u. Blastobasiden wurden als Subfam. zu den Gelechiidae gestellt, die Lyonetiiden als eigne Familie behandelt, als Resultat neuerer Forschung.

Einleitung (p. I—XIV). — Verzeichniss d. Abkürz. von Autorennamen u. Publik. (p. XV—XXVI) 2-spalt.; je 4 auf 1 p. — Verz. d. Abkürz. von Ortsnamen u. Lokalitäten (p. XXVII—XXX). — Verzeichniss u. Erklär. der nicht allgemeinverständl. Abkürzung. u. Zeichen (p. XXXI). — Uebersicht der Familienreihenfolge (p. XXXII) wurde p. 698 dieses Berichts wiedergegeben. — I. Theil. Die einzelnen Familien, Gatt. u. Arten (p. 1—411) — cf. p. 698 dieses Berichts. — II Theil. Die einzeln. Fam., Gatt. u. Art. (p. 1—248). — Nachträge (Addenda) zum Theil I (p. 249—256). — zum Theil II (p. 250—265). — Berichtigungen (Corrigenda) p. 266. — Index der Fam. u. Gatt. zum Theil I (p. 267—282). — Index der Arten, Varr., Aberr. u. deren Synonyme zum Theil I (p. 283—334), dito zum Theil II (p. 335—368).

Nach Durchsicht des Katalogs durch den Referenten ist die Zahl der behandelten Arten

Theil I 4744 Spp., dazu im Nachtrag 13 (bis) = 4757

Theil II 4782 Spp., dazu im Nachtrag 181 (bis, ter, quat.) = 4963

Gesamtzahl der aufgeführten Arten 9720

Eine Reihe von Formen hat eine Aenderung der Gattungsnamen erfahren, so sind die wichtigsten Benennungen folgende:

Früher		Jetzt	Früher		Jetzt
Leucophasia	sinapis	Leptidia	Porthesia	chrysoorrhoea	Euproctis
Vanessa	c-album	Polygonia	Leucoma	salicis	Stilpnotia
Ephinephele	hyperanthus	Aphantopus	Oeneria	dispar	Lymantria
Thecla	rubi	Callophrys	Psilura	monacha	"
"	quercus	Zephyrus	Bombyx	neustria	Malacosoma
"	betulae	"	"	castrensis	"
Polyommatus	dispar	Chrysophanus	"	lanestris	Eriogaster
"	phloeas	"	"	quercus	Lasiocampa
Lycaena	baetica(us)	Lampides	"	trifolii	"
"	argiolus	Cyaniris	"	rubi	Macrothylacia
Cartero-			Lasiocampa	potatoria	Cosmotriche
cephalus	palaemon	Pamphila	"	ilicifolia	Epicnaptera
Hesperia	lineola	Adopaea	"	quercifolia	Gastropacha
"	thaumas	"	Acronycta	ligustri	Craniophora
"	actaeon	"	Neuronia	popularis	Epineuron
"	comma	Augiades	"	cespitis	"
"	sylvanus	"	Luperina	haworthii	Celaena
"	malvae	Syrichthus	"	matura	"
Nisoniades	tages	Thanaos	Asteroscopus	nubeculosa	Brachionycha
Smerinthus	tiliae	Dilina	"	sphinx	"
Deilephila	nerii	Daphnis	Leucania	brevilinea	Nonagria
Sphinx	convolvuli	Protoparce	Caradrina		
"	pinastri	Hyloicus	(Hydrilla)	arcuosa	Petilampa
Deilephila	celerio	Chaerocampa	Chariclea	umbra	Pyrrhia
"	elpenor	"	Agrophila	trabealis	Emmelia
"	porcellus	Metopsilus	Aventia	flexula	Laspeyria
Macroglossa	fuciformis	Hemaris	Gonophora	derasa	Habrosyne
"	bombylifomis	"	Asphalia	diluta	Polyploca
Harpypia	bicuspis	Cerura	"	flavicornis	"
"	furecula	"	"	rideus	"
"	bifida	"	Phorodesma	pustulata	Euchloris
"	vinula	Dicranura	"	smaragdaria	"
Notodonta	tremula } (dictaea) }	Pheosia	Iodes	lactearia	Thalera
"	dictaeoides	"	Nemorina	strigata	Hemithea
"	bicoloria	Leucodonta	Zonosoma Ld.	—	Ephyra Dup.
"			Cidaria Tr.	—	Larentia Tr.

Früher		Jetzt	Früher		Jetzt
Cidaria Tr.	candidata	Asthena	Halia	wauaria	Thamnonoma
Eupithecia	—	Tephroclystia	"	brunneata	"
"	coronata	Chloroclystis	Emydia	striata	Coscinia
"	rectangulata	"	"	cribrum	"
"	debiliata	"	Euchelia	jacobaeae	Hipocrita
Cidaria	poly-	Phibala-	Calligenia	miniata	Mitlochrista
"	grammata	pteryx	Setina	irrorella	Endrosia
"	lapidata	"	"	mesomella	Cybosia
"	vitalbata	"	Nudaria	senex	Comacla
"	tersata	"	Gnophria	quadra	Oenestis
Cabera	pusaria	Deilinia	Lithosia	muscerda	Pelosia
"	exanthemaria	"	Psyche	vilosella	Pachytelia
Eugonia Hüb.	—	Ennomos Tr.	"	hirsutella	Sterrhopterix
Pericallia	syringaria	Hygrochroa	Fumea	sepium	Bacotia
Odontopera	bidentata	Gonodontis	Aspilates	strigillaria	Perconia
Rumia	luteolata	Opistograptis	Spilosoma	fuliginosa	Phragmatobia
Macaria Curt.	—	Semiothisa	Nemeophila	plantaginis	Parasemia

Papilionidae.

Papilionidae aus Süd-Amerika. **Therese von Bayern** p. 240—241:

polydamas L., erithalion Bsd., alyattes, serapis Bsd. u. hippodamas Feld.
Fundorte. Bemerk. etc.

— vom Wege von Mambasa zu den Taveta-Wäldern: Mylothrys (1), Terias (1), Teracolus (10), Catopsilia (1), Glutophryssa (1), Herpaenia (1), Eronia (1), Papilio (6). Roger's Bemerk. zu einigen ders. **Butler** Ann. Nat. Hist. (7). vol. 7. p. 31—34.

— von Munisu, 4150'. **Butler** (5) p. 200—202. — 29 Sp.

Achivus (Papilio) machaon L. von Wei-Hai-Wei. **Fletcher**, The Entomologist, vol. 34. p. 173. — Frühjahrsgeneration: typische: machaon, Sommergeneration entschieden var. asiatica Mén., doch von normaler Grösse u. nähert sich nicht der grossen Form hippocrates Feld.

Baronia brevicornis. Besch. **Godman**, Biol. Centr.-Amer. Rhop. II. p. 730. Taf. CXI. Fig. 15—18.

Calinaga siehe Danaidae.

Jasoniades (Papilio) xuthus L. von Wei-Hai-Wei. **Fletcher**, The Entomologist, vol. 34. p. 173.

Ornithoptera. ♀ leichter zu erlangen als die ♂, bei allen anderen Rhopal. ist's umgekehrt. **Oberthür**, Bull. Soc. Entom. France 1901. p. 44. — trojana Stgr. Zwitter? Zeichn. u. Färb. ♂, Abd. nach Form u. Aussehen, Afteröffn. ♀, tertiäre ♂-Geschlechtscharaktere in Form der sogen. Analfalten an d. Iseite der Hflgl. mit filzig., gelbl. Dufthaaren. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900. 8. Febr. (p. 6—7).

— goliath var. titan. **Grose-Smith**, Rhopal. exot. Papil. Ornithopter pl. IV. p. 7.

- Papilio. 3 Spp. von Central-Afrika aufgezählt. **Sharpe**, Ann. Nat. Hist. (7). vol. 8. p. 284.
- Aus dem indoaustralischen Gebiet beschreibt **Fruhstorfer** in der Deutschen Entom. Zeitschr. lep. Hft. 14. Bd. zahlreiche neue Varietäten.
 - **Fruhstorfer** beschreibt ferner in der Societ. Entom. vol. XVI: mahadeva var. *selangoranus* n. p. 51. — *agetes* subsp. *tenuilineatus* n. p. 89. — *delesserti* subsp. *hyalinus* n. p. 89. — *erebus* subsp. *petronius* n. p. 89. — *evemon* var. *igneolus* n. p. 89. — *pagani* var. *langsonensis* n. p. 89. — mahadeva subsp. *phanrangensis* n. p. 98 u. 144. — *eurypilus* *rasse sulanus* n. p. 99. — *megarus* subsp. *sagittiger* n. p. 105. — *macareus* subsp. *indochinensis* n. p. 106. — *evemon* subsp. *albiciliatus* p. 106. — *alcinous* subsp. *mansonensis* n. p. 113.
 - crassipes* ♂ **Fruhstorfer**, Societ. Entom. vol. XVI. p. 113.
 - **Fruhstorfer** charakterisirt endlich in der Deutsch. Entom. Zeitschr. lep. Hft. 14. Bd.: *noblei* ♀ p. 268. — *doddsi* ♀ p. 269. — *bianor* subsp. *gladiator* p. 270. — *demoleus* *annamiticus* p. 271. — *neumoegeni* ♀ p. 273. — *henricus* subsp. p. 273 ♀.
 - Im Einzelnen: *Papilio cenea* Stoll ♂. **Lathy**, Trans. Entom. Soc. London, 1901. p. 32 (Zomba, Centr.-Afr.). — *pelodurus* Butl. Die Unterschiede zw. ♂ u. ♀ liegen hauptsächlich auf d. Useite u. sind von gleichem Charakter wie bei den Geschlechtern von *P. hesperus* Westw. p. 33.
 - cenea* ein ungeschwänztes ♀ aus Mhonda, wohl zur ab. *trophonius* Westw. zu rechnen. Berlin. Entom. Zeitschr. Sitz.-Ber. 1900. 18. Okt. (p. 26).
 - ceneus* Stoll eine Lokalf. von *dardanus* Brown. — Pap. *ophidocephalus* Oberth. keine Lokalf. von *menestheus* Drury, wie Aur. angeibt. Berlin. Entom. Zeitschr. Sitz.-Ber. f. 1900. 18. Okt. (p. 25).
 - clytia*, verschiedene Aberr. **Fruhstorfer**, Berlin. Entom. Zeitschr. 47. Bd. Sitz.-Ber. f. 1901. 14. Nov. — Insektenbörse, 18. Jhg. p. 413.
 - dardanus* Brown (= *merope* Cram.) von Westafrika u. *ceneus* Stoll aus Ostafrika. Letzt. von Aurivillius als selbständige Sp., mit dem Zusatz „vielleicht eine geogr. Var. der ersteren?“ Stichel's eingehende Vergleiche beider führen zu der Erkenntniss, dass *cepheus* nur eine Lokalform ist. Berlin. Entom. Ges. Sitz.-Ber. f. 1900. 18. Okt. (p. 25).
 - demodocus* Esper in Somaliland bei Laskarato, 3000'. **Sharpe**, The Entomologist, vol. 34. p. 6.
 - dissimilis* u. Pap. *panope* Uebergangsstück. **Rey**, Berlin. Entom. Zeitschr. 47. Bd. Sitz.-Ber. f. 1901. 31. Okt. — Insektenbörse, 18. Jhg. p. 389.
 - dixoni* **Grose-Smith**, Rhopal. exot. *Papilio* XXI. p. 50. Fig. 3, 4.
 - eracon* **Godman**, Biol. Centr.-Amer. Rhopal. II. p. 728. Abb. Taf. CXI. Fig. 11, 12.
 - eurypylus*. **Rothschild** u. **Jordan**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 402. In der Revision (Nov. Zool. Tring II 1895) sind 2 Spp. darunter verwechselt *jason* u. *eurypylus*, erstere in mannigfalt. Formen vorkommend v. continent. Asien bis Celebes u. den kleinen Sundainseln, letzt. v. cont. Asien bis z. Bismarck-Archipel u. Austral. Sorgfältige Synonymie der versch. Formen wünschenswerth.
 - helenus* ♀ von Hongkong m. schmaler. weissen Hinterflügelflecken, nähert sich mehr der indisch. als der japan. Form. **Fruhstorfer**, Insektenbörse,

18. Jhg. p. 4. — liebt rothe Blüten. **Fruhstorfer**, Insektenbörse, 18. Jhg. p. 18.

- homerus Raupe. **Swainson**, Journ. New York Entom. Soc. vol. IX. p. 77.
- iopas **Godman**, Biol. Centr.-Amer. Rhopal. II. p. 728. Abb. Taf. CXI. Fig. 9, 10.
- machaon. Zweijährige Puppenruhe. **Kathariner**, Insektenbörse, 18. Jhg. No. 27. p. 212. — Raupe. Hofman giebt 7—9 braunrothe Fleckchen in den schwarzen Ringen auf der Raupe an. **Prehn**, Entom. Jahrb. (Krancher) 11. Jhg. p. 90 fand bei Saarburg i. L. nur 6. Ob lokal variabel? — Temperaturexperimente. **Ball**, Ann. Soc. Entom. Belg., T. 44. p. 385—388. — in Hampshire. **Adams**, Entom. Monthly Mag. (2). vol. 12 (37). p. 172 u. 297.
- scheint in England auf die unbebauten Moore von Norfolk u. Cambridge-shire beschränkt zu sein. **Oberthür**.
- in den Norfolk Broads ist seine Existenz durch günstige Lage, Flug u. s. w. gesichert etc. The Entomologist, vol. 34. p. 364. — at Mucking. **Burrows**, Entom. Record, vol. 13. No. 9. p. 278. — Pap. mach. and other Lep. **Fleet**, H. t. c. No. 10. p. 304—305.
- Bemerk.; in Bourbonnais. **de Rocquigny-Adanson**, Revue Scient. Bourbonnais 14. Ann. No. 167. Nov. p. 197—204.
- Varr. in S. Italien. **Cannaviello**, Miscell. entom. vol. IX. p. 131—135.
- ab. bimaculatus Eimer (ausser dem schwarz. Fleck in Zelle 7 noch solcher in Zelle 6 vorhanden, bei P. immaculatus Kabis fehlt der Fleck in Zelle 6 ganz). Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900. 11. Jan. (p. 2).
- Stück, bei dem das submarginale Band der Vflgl. innen von ein. breiten, schwarzen Bande eingefasst ist, bei dem ferner der Diskalfleck zu einem Fleck verbreitert ist, der sich mit dem Bande vereinigt. The Entomologist, vol. 34. p. 61.
- seltene Aberr. in Zermatt 1901 gefangen, die im Allgem. der Aberr. niger Reuti entspricht, d. h. völlig geschwärzt ist mit Ausnahme der rothen Augenflecke am Irande der Hflgl. Besitzer Püngeler, R. (Aachen). Berlin. Entom. Zeitschr. Sitz.-Ber. f. 1900. 1. Nov. (p. 26).
- merkwürdiges ♂ Stück aus dem Posenschen, 1901. In Grösse u. Form vollständig entwickelt. Grundfarbe normal. Recht. Vflgl. bis auf das Wurzelfeld normal gefärbt. Dieses u. der 1. u. 3 Vrandflecken schwach schwärzlich bestreut. Der rechte Hflgl. erscheint normal, nur die Subcostale im äusseren Drittel breit gelb gefärbt. Linker Vflgl. bis auf einige kleinere Gruppen von dunkl. Schuppen durchweg ohne Schwarz. Alle Zeichn. nur bläulich markirt u. dadurch wie Unter-malung wirkend. In gleicher Weise auch der linke Hflgl. angelegt, nur ist das breite Band nach aussen durch schwarze Dreiecke, nach innen durch gleichfarbige Halbmonde begrenzt. Analage wieder normal. Die Useite entspricht der Oseite. Die übrig. Körpertheile wie bei der Stammform gefärbt. **Thiele**, Berlin. Entom. Zeitschr. 47. Bd. Sitz.-Ber. f. 1901. 17. Okt. — Insektenbörse, 18. Jhg. p. 365.
- ♀, verküppelt u. eigenthümlich gefärbt. Nur Basal- u. Mitteltheil voll ausgebildet. Der schwarze Basaltheil ist mit dem ersten Zellfleck vollständig verflossen u. bildet eine gleichmässig gefärbte Fläche, die

- sich gegen den Innenrand gleich ausdehnt. Oberer Zellfleck ganz schmal, der Aussentheil stark verdüstert. Berlin. Entom. Zeitschr. 47. Bd. Sitz.-Ber. f. 1901. 7. Febr. — cf. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 93.
- ♀, Teratologisches Stück. **Hampson**, Entom. Monthly Mag. (2). vol. 12 (37). p. 120,
- metaphaon. **Godman**, Biol. Centr.-Amer. Rhopal. II. p. 728. Beschr. Abb. Fig. 13, 14.
- ophidocephalus Oberth. keine Lokalf. von menestheus Drury. Berlin. Entom. Zeitschr. 47. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900. 18. Okt. (p. 25—26). — Kopulationsorgane sehr verschieden.
- panope. Uebergangsstücke zu dissimilis siehe dort.
- Neu: panope *ab. janus n.* (an Stelle der weissen Apikal- u. Subapikalflecken schwarze, die sich von dem hellbraun. Grunde deutlich abheben. Bei ein. Stück ist der ganze Apex schwarz beschuppt u. das Thier sieht wie mit Oel bespritzt aus. Ein ♂ ist noch besonders merkwürdig durch die schwarzblaue Grundfarbe der Flgl., welche sich erst nahe dem Aussenrand aufhellt. Solche Stücke, bei denen auch die weiss. Vflgl.-Tupfen ganz obsolet sind, bild. ein. Uebergang von panope zu *ab. onpape* u. beweisen, dass wir es trotz der gross. Abweichung von der Norm, doch mit Exempl. ders. Art zu thun haben). **Fruhstofer**, Berlin. Entom. Zeitschr. 47. Bd. Sitz.-Ber. f. 1901. 14. Nov. — Insektenbörse, 18. Jhg. p. 413. (Annam u. Siam). — *ab. papone* auch in Assam.
- philenor *subsp. wasmuthii n.* **Weeks**, Journ. New York Entom. Soc. vol. IX, p. 82. Abb. Taf. VI.
- podalirius wird in der Bretagne immer seltener. **Oberthür.**
- Stück mit Einbuchtung am Aussenrand der Vflgl. (ob infolge mechanisch. Wirkung durch Spinnfaden. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900. 4. Jan. (p. 2). — *ab. Schultzi*. **Bathke, Frdr.**, Deutsch. Entom. Zeitschr. 1900. 2. lepid. Hft. (Iris, Bd. 13. 2. Hft.) p. 332—333.
- L. Stücke vom Harz, gezogen:
1. ♂ *ab. undecimlineatus* Eim. Von der Wurzel gezählt, ist die 5. im Mittelfeld aberrativ auftretende Binde nur schwach. Binde 7 u. 8, die in der Regel zusammenfliessen, sind deutlich getrennt, ihre Fortsetz. nach d. Irande nicht in der Verlängerung von 7, sondern deutlich nach aussen gerückt zw. 7 u. 8, unterhalb Mediana 3. Mittelbinde d. Hflgl. im ober. Theil deutlich ziegelroth ausgefüllt, im Analauge d. Hflgl. nur einzelne Spuren blauer Bestäubung, rothes Colorit, breit u. intensiv, blaue Randmonde reducirt.
 2. ♂ *ab.* wie vorige. Schwarze Bestäubung ungewiss begrenzt, schattenhaft. 3. Binde breit, entsendet einen schattirt. Ausläufer aus dem Winkel von Mediana 1 nach aussen. Ders. verbindet sich in schwacher Schattirung bogenförmig nach oben mit der aberrativ auftretenden Binde 5. Binde 6 u. 7 verschwommen, endigen bei der Medianader, sodass deren Fortsetz. nach dem Irande deutlich abgetrennt ist. Diese beginnt unterhalb Mediana 3. Binde 8 breit schattenhaft, bis Mediana 2 reichend, läuft also neben der Verlängerung der Binden

6 u. 7 einher u. ist leicht mit ihr verbunden. Hflgl. wie die des vor., die röthl. Füllung der Mittelbinde reicht bis zum Analauge. In dem reducirten schwarz. Theile dess. oberseits keine Spur von Blau. Gesamteindruck: matte Farbenentwickl. u. Neigung zur Melanose.

3. ♂, vor. ähnl. Die aberrativ auftret. 5. Binde deutlicher. Verlängerung der Binde 3 unterhalb der Medianader schwach. Verlängerung von Binde 8 über Mediana 3 hinaus nur schattenhaft. Binde 9 u. 10 mit Binde 11 auf $\frac{2}{3}$ der Länge verschwommen. Mittelbinde der Hflgl. ohne röthl. Füllung, sonst wie vor.

4. ♂, dem vor. ähnl., aber mit intensiverer schwarzer Bestäubung, namentl. die verfloß. Binden 9–10 u. 11 sehr breit u. dunkel, alle 3 deutlich bis zum Iwinkel. Binde 6 u. 7 deutl. getrennt. Die blauen Randmonde der Hflgl. stehen sehr schmal u. scharf begrenzt in breitem, intensiv schwarzen Saume.

5. ♀, zum vorig. gegensätzl. gefärbt. Bindenzeichn. im normal. Ton, aber sehr reducirt. Binde 3 deutlich bis zur Mediana, darüber hinaus bis zur Submediana nur angedeutet. Desgl. Binde 5 u. 6, der Binde 6 u. 7 der ab. undecimlineatus entsprechend, wie beim 2. Stück unter der Mediana unterbrochen. Die Verlängerung ist abgesetzt u. nach aussen gerückt. Mittelbinde der Hflgl. verkürzt, reicht nur bis zur Mediana, ist schmal u. ohne rothe Füllung. Der schwarze Theil des Analauges ohne Blau. Der schwarze Saum schmal, ebenso die blauen Randmonde. **Stichel**, Berlin. Entom. Zeitschr. 47. Bd. Sitz.-Ber. f. 1901. 7. Febr. — cf. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 93.

polycanon Cram. ♂ u. ♀ sehr verschieden, ebenso ♀♀ unter sich, so dass Cram. sie als besondere Arten: androgeos u. piranthus beschrieb. androgeos hat Priorität. piranthus hat auf der dunkl. Oseite lebhaft. metall. Glanz u. ist eine in Cayenne vorkommende Sexualaberr.

Sp. von Wei-Hai-Wei (gross, schwarz). **Fletcher**, The Entomologist, vol. 34. p. 174.

supape. Höchst merkwürdige Aberr. (der panope-Form mit weissen Vfgl.-spitzen). Das Stück zeigt auf d. Vfgl. statt der weissen Strahlen dunkel stahlblaue. (Ob eine Neubildung, progressive Form, Uebergang zur paradoxus Gruppe bildend?) **Fruhstorfer**, Insektenbörse, 18. Jhg. p. 339 u. 346.

veiovius ein wundervoller Danaidennachahmer. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 329. victoriae subsp. isabellae n. (die weiss. u. gelb. Flecke sind viel kleiner als bei reginae u. victoriae; das ♀ stimmt am besten mit dem von regis, hat ab. grössere Submarginalflecke). **Rothschild** u. **Jordan**, Nov. Zool. Tring, vol. 8. p. 401–402 ♂♀ (Isabel, Solomon Islds.).

xuthus L. ♀-Stück mit sehr breiter, fast bis zur Mittelzelle reichender tief-schwarzer Binde d. Hflgl., auch sonst sehr düster. — ♂, bei dem auf dem recht. Vfgl. in Zelle 5 unter den sogen. Gabelflecken noch ein dritter kleiner Punkt vorhanden ist. — ♂, bei dem im gelben Fond der Zelle 2 d. Vfgl., zwischen der 1. u. 2. Mediana, ein verhältnissmässig grosses rundes Fleckchen vorhanden ist, aber nur auf d. rechten Flgl. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900. 1. Febr. (p. 6).

Neue Arten:

- meeki* (ähnelte agamemnon) p. 402 ♀ Fig. A. (Isabel, Salomonsinseln). — *nandina*. **Rothschild u. Jordan**, Nov. Zool. Tring, vol. 8. p. 403. Taf. IX. 1 ♂ (Escarpment, Brit. Ostaf., 6500—9000').
chochabamba **Weeks**, Canad. Entom. vol. 33. p. 265 (Bolivia).

Parnassius apollo L. Berichtigungen zu Austaut (cf. p. 710 dieses u. p. 687 des vor. Berichts). **Stichel** (7).

1. Die „Varr.“ *hesebolus* Nordm. (false *hesebalus* Alph. *transbaicalensis* Stödr. i. l. u. *mongolicus* cd. sind unter erst. Namen als Subsp. zu vereinigen. — 2. Die *Aberr. wiskotti* ist fälschl. *wiskitti* genannt. Autor nicht Honrath, sondern Oberthür. — 3. *brittingeri* Reb.-Rog. ist als *Aberr.* aufgeführt, repräsentirt aber eine geographische Subsp. — 4. Falsch ist: *Styr* en Australie statt *Steyr* in *Autriche*.

Zu den Neubeschreibungen: 1. **P. Apollo** var. *eiffellensis* (in der Eifel von Kaisersech [nicht Kaisereck Aust.] cf. Bericht f. 1900). = subsp. *vingingensis* Stich. (= *ab. weskampi* [1897] Guben. Verein). Mehrere Merkmale, die er anführt, sind Schwankungen unterworfen. — 2. **P. ap. ab. inversa** betrachtet Aust. als Gegenstück zu *brittingeri* Reb.-Rog.; *brittingeri* hat aber den Rang einer Unterart in begrenztem Fluggebiet. Austaut's Form hat als *ab. sexualis* ♀ Werth, welche völlig den Typus des ♂ angenommen hat. — Bemerk. zu den *Apollo*-Stücken, die *Hormuzaki* 1895 vom Thale Colbu, nächst Dorna (800 m) in den Ostkarpathen, beschr. — Auffallend ist die Grösse (76—80 mm) ders., die die der subsp. *carpathicus* Reb.-Rog. (68—75) noch übersteigt. — Beschr. der Charaktere etc. u. Bemerk. Hier ist die Eventualität nicht ausgeschlossen, dass sich die asiat. *hesebolus* aus der Mongolei im östl. Karpathengebirge wiederholt. — *Bartholomaeus* (vom Königssee u. nächst Berchtesgaden, am Berge Jenner). Die Formen verhältnissmässig weniger charakt. ausgefärbt (wohl in Folge von Witterungseinflüssen); die Unterart ist in ihren Eigenschaften noch nicht genügend konsolidirt p. 52. — Zu *Gauckler* (p. 581 sub. No. 11 u. p. 687 des vor. Ber.): *apollo geminus*. Innerhalb der gewöhnl. Alpenform kommen dunklere, auffälliger geschwärzte Individuen vor. Sie als Lokal-Var., wie *Gauckler* zu bezeichnen, ist unkorrekt, es ist richtiger eine individuelle *Aberration*. — Liste der bis Febr. 1901 bekannt. *Apollo*-Formen (16 Subsp. + 8 var.) einschliessl. der 1899 beschr. (cf. Bericht f. 1899 p. 622) *inversa* Austaut,

- ein in Zermatt gefang. Pärchen in Copula präparirt. **Schnabel**, Zeitschr. f. Entom. Breslau. 1900. p. XIX.
- ein ♀, das durch dunkle Bestäubung ausgezeichnet ist, ein anderes ♀ mit auffällig grossen rothen Ocellen d. Hflgl. (letz. vermuthl. aus den Karpathen). Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900. 4. Jan. (p. 2).
- Stück aus den Alpen mit gelb. statt rothen Augen. Zeitschr. f. Entom. Breslau. 1901. p. IV.
- *ab. brittingeri* Reb. Rog. Gross sieht sie im 11. Jahresber. des Wien. Entom. Ver. in ihrer extremst. Ausbildung als *Aberr. an.* **Stichel**

- findet, dass die aus Steiermark kommenden Falter sämtlich mehr oder weniger die Eigenschaften der *brittingeri* aufweisen. Nach der Meinung des letzt. muss der Name erweiterte Geltung als Bezeichnung einer Lokalform erhalten. Berlin. Entom. Zeitschr. 47. Bd. Sitz.-Ber. f. 1901. April. — cf. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 157.
- subsp. *albus* Reb. u. Rog. Stück vor 50 Jahren in der Grafschaft Glatz gefangen, dort nunmehr ausgestorben. — var. *graeus* i. l. in coll. Ziegler aus Griechenland, ausgezeichnet durch vorherrschend weisse Färb., kleine rothe Ocellen u. Kleinheit der beiden äusseren Flecken des Vrandes, sowie fast verschwindende Apicalflecke; nach Stichel = subsp. *liburnicus*. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900. 22. März (p. 11—12). — *apollo* ♀, dess. link. Hflgl. ein weissgekerntes Auge hat u. ein Innenrandfleck mit rothem Kern, während das entsprechende Auge des rechten Flgls. innen ganz roth u. der Irandsfleck ganz schwarz.
- apollonius* Stück, dessen Aussenrandflecke bis auf ganz minimale Reste geschwunden sind, wodurch es fremdartig erscheint. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900. 25. Okt. (p. 25).
- Spanische Varietäten. **Chapman**, Proc. Entom. Soc. London. 1901. p. XIX.
- delius* Esp., abweichende Stücke vom Julierpass 2200 m u. vom Faxthäl 1900 m bei Silz Maria: 1. ♂ ohne schwarz. Fleck am Irand der Vflgl. — 2. ♂ mit dies. Fleck. — 3. ♂ mit gelbl. Flecken am Vrande u. röthlich gelb. Ocellen. — 4. ♀ mit gross. weissen Kernen in den Ocellen. — 5. ♀ mit fast rothen Ocellen u. noch einige andere Formen. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900 22. März, (p. 12).
- mnemosyne* L. von **Aigner-Abafi** (11). — Variation ders. in Ungarn von **Aigner-Abafi**, Rovart. Lapok., vol. 8. p. 141—144.
- simonius*. Exempl. mit nur 31 mm Flgl.-Spannung. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900. 25. Okt. (p. 26).
- Neu sind:
- boëdromius* **Püngeler**, Deutsch. Entom. Zeitschr. Iep. Hft. 14. Bd. p. 177. Taf. I. Fig. 3. — *loxias* p. 178. Fig. 5, 6. (beide aus dem Chines. Turkestan).

Pieridae.

- Pieridae von Central-Afrika. **Sharpe**, Ann. Nat. Hist. (7.) vol. 8. p. 283. — 6 Spp.
- Acmepteron nemesis* Latr. Fundorte etc. **Therese von Bayern**, p. 241.
- Anthocharis cardamines*. The courtship of . . **Meldola, R.** The Entomologist, vol. 34. p. 128. — Bemerk. zur Puppe. **Plateau**, Le Naturaliste, 1901. p. 42. — Erscheinungsdaten. **de Rocquigny-Adanson, G.**, Feuille jeun. Natural. (4). 31. Ann. No. 365. p. 142—143.
- mesopotamica* Stgr. eine besondere Form der selten. *Anth. charlonica* Donz., nur auf eine einzige Lokalität bei Gülek, Kleinasien beschränkt, wohl an Crucifere lebend. Mai, Juni 1300—1700 m, Anf. Sept. 2. Gener.

- Holtz**, Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900. 18. Febr. (p. 8).
- Aporia crataegi*. Auch in der Umgebung Schleswigs selten. **Glüsing**, Insektenbörse, 18. Jhg. p. 213. — Unterschiede in der Zeichnung der Puppe u. Imago. *The Entomologist*, vol. 34. p. 29—30.
- dauidis* O. var. *venata* Leech ♂. Teratologisches Stück. **Hampson**, Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 12 (37). p. 119.
- Appias albina*. Raupe u. Puppe. **de Nicéville**, Journ. Asiat. Soc. Bengal, vol. 69. p. 254.
- Archonias philemon* Stdgr. von Bolivia ist eine typische *Catasticta colla* Doubl. — *cornelia* Stdgr. von Bogota ist eine typ. *Catasticta hebra* Lucas von Columbien. — *opposita* Stdgr. von Bolivia eine typ. *Catast. manco* Doubl. **Butler, A. G.** *The Entomologist*, vol. 34. p. 301. — *Hopferi* Stdgr. von Bolivia eine typ. *Catast. pinava* Doubl. p. 302. — *tamina* Stdgr. v. Manizales, Orinoco etc. ist eine typ. *Catast. tomyris* Feld. von Bogota. — *xeque Mengel* eine typ. *Catast. chrysolopha* Kollar p. 302.
- jacinta* Stdg. in litt. (steht bei *C. chelidonis* u. *C. zancle* (= *C. cora*?) p. 302—303 ♂ (Bolivia).
- Belenois margaritacea* E. M. Sharpe von Munisu, etwas abw. von Sh.'s Abb. **Butler** (5) p. 202. — *mesentina* (Walk.) in Somaliland, Bihen, Dula. **Sharpe**, *The Entomologist*, vol. 34. Suppl. p. 4.
- Catasticta*. On names applied to certain species of the Pierid genus. **Butler, A. G.** *The Entomologist*, vol. 34. Nov. p. 301—303. — *jacinta* u. *apaturina*. **Butler**, *The Entomologist*, vol. 34 p. 302—303 (beide von Süd-Amerika).
- C.-Spp. siehe *Archonias*.
- Crowleyi* (steht in gewisser Beziehung zwischen *C. potamea* u. *C. strigosa* (= *actinotis* ♂). **Butler, A. G.** *The Entomologist*, vol. 34. p. 302 ♂ (Monte Sierra and Culata, Venezuela).
- Catopsilia ebulæ* L., *philea* L., *argante* F. Fundorte nebst Bemerk. **Therese von Bayern** p. 245.
- crocale*. Raupe, Puppe. **de Nicéville**, Journ. Asiat. Soc. Bengal, vol. 69. p. 251.
- florella* (Fabr.) Fundorte in Somaliland. **Sharpe**, *The Entomologist*, vol. 34. Suppl. p. 6; — in den Gärten um Karthum gemein; auch bei Shendi einige Stücke. **Rothschild**, Nov. Zool. Tring, vol. 8. p. 427.
- Colias*. Jüngste u. variabelste Art ders.: *C. hyale* L. **Aigner-Abafi**, Insektenbörse, 18. Jhg. p. 196. Nach Rovart. Lapok. vol. VIII. p. 30. — Weniger zu Abänderungen geneigt sind: *C. chrysotheme* Esp., *myrmidone* Esp. u. *edusa* F., bei denen hauptsächlich das ♀ variiert. Es ist wohl anzunehmen, dass das ♂ ursprüngl. dieselb. Färb. wie das ♀ hatte u. letzt. nunmehr bestrebt ist, dems. in der Umgestaltung zu folgen. Die Umgestaltung geht vom Hflgl. aus. Stücke mit Verdüsterung der Hflgl. Ganzer Saum des Hflgl. schwarz, blos auf Vflgl. schwache Spur von 2 gelb. Flecken. Verf. nennt sie *C. edusa*, *ab. paveli* p. 196 (bei Budapest). — *chrysotheme*, *ab. hurleyi* n., unter Beibehaltung der Zeichn. geht die lebh. Färb. in Weiss über, an Vorderrand u. Franzen ein violett. Anflug. Gelber Mittelfleck aus dem grauen Grunde lebhaft hervortretend p. 196 (Mödling bei Wien). — *heldreichi* n. (var.) *ab. fontainei* n. das lebhaft Bräunlichgelb der

Stammform, sowie die lichtgelb. Saumflecke sind weissl. geworden. Hflgl. mit gelbl. grün. Anflug. p. 196 (Griechenland: Berg Chelmos bei Kalaurya [Halbinsel Morea]).

3 neue Aberrationen. **Aigner-Abafi** (3), desgl. (21).

- aurorina** H.-S., **libanotica** Led. u. Heldreichi Stgr. Diskussion über die Benennung etc. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900. 15. Febr. (p. 7 u. 8); — **Aurorina var. Taurica** n. (Cat. No. 118 a bis). ♂ **Libanoticae similis**, ♀ **alba** aut **flava**, alis posticis maculis flavis ante-marginalibus permagnis, confluentibus. Spannweite 58 mm). **Rebel**, Verhdlgn. zool.-bot. Ges. Wien, 51. Bd. 1901 Sitz.-Ber. vom 3. Mai 1901 p. 310—311 (Bulgardagh [Maaden] ca. 800 m Höhe. — Der Fundort **Taurus** ist bei **libanotica** zu löschen). — Bemerk. zu andern turorina-Formen.
- chrysotheme var. hurleyi** n. (cf. auch antea). **Aigner-Abafi**, Rovart. Lapok, vol. 8. p. 30.
- dimera** Doubl. Hew. Fundort. **Therese von Bayern** p. 245—246.
- edusa**. Vorkommen u. Verbreitung. — On the occurrence of **Colias edusa** and **C. hyale** in 1900 and the results of rearing the var. **Helice** from **Helice ova**. **Frohawk, F. W.** The Entomologist, vol. 34. Jan. p. 2—5.
- in 1900. **Mathew, G. F.** The Entomologist, vol. 34. Jan. p. 19. — desgl. **Sich, Alfr.** t. c. p. 19. — Desgl. **Nevinson, E. B.** t. c. p. 19. — Desgl. in Yorkshire, 1900. **Hewett, W.** t. c. p. 19. — in Hampshire. **Winder, Edm.** t. c. p. 19—20 — in October, 1900. **Hill, Ainslie.** t. c. p. 20. — in N. Staffordshire. **Woodforde, F. C.** t. c. Febr. p. 56. — in N. Wales. **Woodforde, F. C.** t. c. p. 56. — in 1900. **Tetley, A. S.** t. c. p. 56.
- in 1900, near Winchester. **Cardinall, Alan, W.** The Entomologist, vol. 34. p. 99. — in Northumberland. **George Bolam**, t. c. p. 99. — in North England. **Oliver, G. B.** t. c. p. 99.
- on the golfs links at Handsworth, nur 4 engl. Meilen v. Centrum v. Birmingham. t. c. p. 135.
- in Eastbourne. t. c. Sept. p. 252—253. — in Buckinghamshire. **Oliver, G. B.** t. c. Oct. p. 291.
- in Kent. **Andrews, T. B.** t. c. p. 292, desgl. **W. E. Butler** u. **Frohawk, F. W.** t. c. p. 292.
- in Cornwall. **Rollason, W. A.** t. c. Nov. p. 315. — in Hampshire. **May, Alb.** t. c. p. 315—316. — at Folkestone. **Freke, Percy E.** t. c. Dec. p. 351. — at Seaton, Devon, in 1901. **Eaton, E. A.** Entom. Monthly Mag. (2). vol. 12 (37). p. 275.
- in 1900. Notes by **A. Russell, Jos. Anderson** etc. Entom. Record, vol. 12. No. 10. p. 276—280. No. 11. p. 305—307.
- in 1900. **Sanford, P. G.** etc.; in Normandy. **Dupont, L.**; in Middlesex and Touraine. **H. Roland Brown.** t. c. No. 12. p. 347—348.
- and **Acherontia atropos**. Notes on. **Moss, A. M.** Third Annual Report of the Kendal Entomological Society Session. 1900. Kendal: 1901 (7 pp.). — Diesbezügl. Angaben seit 1877.
- bei Cairo. **Rothschild.** Nov. Zool. Tring, vol. 8. p. 427.

Morphologie:

- Geschlechtsunterschiede der Schuppen. **Prideaux**. Entom. Record, vol. 13. p. 141.

Biologie (u. Zuchtnotizen):

- var. helice. Stücke aus dem Ei gezogen. **Frohawke**. The Entomologist, vol. 34. p. 2.

Varietäten, Hermaphroditen:

- — var. helice nebst Zwischenformen u. hyale sehr blasses Stück. The Entomologist, vol. 34. p. 30. — Stück, bei dem die Flgl.-Ränder ganz dunkel sind, wie beim ♂. t. c. p. 131.
- Hermaphrodit, rechte Seite völlig ♀, link. Vflgl. ♂, link. Hflgl. ♀. **Oberthür**. Neu: var. *pavelli* n. (cf. auch oben). **Aigner-Abafi**. Rovart. Lapok, vol. 8. p. 30.

eurytheme Boisd. × Col. philodice Godt. **Rey**. Berlin. Entom. Zeitschr. 47. Bd. Sitz.-Ber. f. 1901. 31. Okt. — Insektenbörse, 18. Jhg. p. 389.

hecate. **Strecker (Weeks)** Illustr. etc. p. 6. pl. III (Bolivia).

Heldreichi Stgr. vom Parnass. die ♂ dieser als Var. v. aurorina H.-S. gelt. Form sind konstant, ♀ variabel; ein auffälliges Stück mit stark schwärzl. Bestäubung im Diskus der Vflgl. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900. 4. Jan. (p. 1). — Neu: var. *fontainei* n. (cf. antea). **Aigner-Abafi**. Rovart. Lapok, vol. VIII. p. 30.

hyale L. Vorkommen, Verbreitung:

- in 1900. **Mathew, G. F.** The Entomologist, vol. 34. Jan. p. 19. — desgl. **Sich, Alfr.** t. c. p. 19. — desgl. **Nevinson, E. B.** t. c. p. 19. — in Yorkshire, 1900. **Hewett, W.** t. c. p. 19. — in Hampshire. **Winder, Edmund.** t. c. p. 19—20; **Barrett, J. P.** t. c. p. 20. — in June. **Theobald, W. G.** t. c. Apr. p. 130. — pupa: a correction. **Frohawke, F. W.** t. c. p. 204. — Von der Insel Wight. **Mitford, R. S.** t. c. July. p. 207. — in June. **Simmonds, H. W.**; desgl. **Huggins, H.** t. c. July. p. 208. — at Eastbourne. **Adkin, R.** t. c. Sept. p. 252—253. — near Maldon. **Raynor, Gilb. H.** t. c. p. 253. — in Essex. **Fitch, A. Edw.** t. c. p. 253. — in Kent. **Huggins, H.** t. c. p. 253. — in Berkshire. **Thompson, Harold.** t. c. Oct. p. 291. — in Buckinghamshire. **Oliver, G. B.** t. c. p. 291. — in Essex. **Lang, Henry, C.** t. c. p. 291. — in Hampshire. **Bellamy, Ferd. G.** t. c. p. 291—292. — in Kent. **Carpenter, Joseph H., Colthrup, C. W.** u. **Andrews, T. B.** t. c. p. 292. — in Kent. **Butler, W. E.** u. **Frohawke, F. W.** t. c. p. 292. — in Surrey. **Seth-Smith, L. M.** t. c. p. 293. — in Hampshire. **May, Alb.** t. c. Nov. p. 315—316. — in Kent. **Chittenden, D.** p. 316. — in Wiltshire. **Solly, R. V.** p. 316. — at Folkestone. **Freke, Percy E.** t. c. Dec. p. 351.
- in 1900. (Notes by **A. Russell, Joh. Anderson** etc.). Entom. Record, vol. 12. No. 10. p. 276—280. No. 11. p. 305—307.
- at Chichester. **Jos. Anderson.** — at Burgess Hill. **J. C. Dollman.** — in the Croydon District. **W. G. Sheldon.** Entom. Record, vol. 13 No. 11. p. 334.

- Bemerk. zur Puppe: a correction. **Frohawk, F. W.** The Entomologist, vol. 34. p. 204.
- at Gravesend. **Huggins, H. jun.** Entom. Record, vol. 13. No. 10. p. 305.

Biologie: Larval history. **Carpenter.** Proc. Entom. Soc. London 1901. p. 26.
 — Life history of *Colias hyale* (Contin.). **Frohawk, F. W.** The Entomologist, vol. 34. June, p. 167—171. — Correction. *ibid.*, July, p. 204. — Forts. aus The Entomologist, vol. 25. (1892).

Variationen, Aberrationen:

- 1. Stück von $2\frac{1}{8}$, 2. von $1\frac{1}{4}$ engl. Zoll Spannweite. The Entomologist, vol. 34. p. 61. — var. mit einem breiten langgestreckt. Fleck auf der Unterseite der Flügl. The Entomologist, vol. 34. p. 61.
- Aberr. **Frohawk, F. W.** The Entomologist, vol. 34. Dec. p. 352.
- siehe ferner unter *Eurymus*.

myrmidone var. *balkanica*. **Rebel**, Verhdlg. Ges. Wien. 51. Bd. p. 134.

phicomone Esp. in Westpreussen. Berlin. Entom. Zeitschr. 47. Bd. Sitz-Ber. f. 1901. 7. Feb. In der Sitz. im April: Ergänzung: gefangen in Mohrrungen. cf. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 93. — Bastard siehe *curytheme*.

simoda aus Japan. **Thurau** unterscheidet in Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900. 15. Febr. (p. 8) drei Formen: 1. eine schwefelgelbe, — 2. eine hochgelbe, — 3. eine solche m. verdunkelt. Hflgl. Sie lassen sich auch auf der Rückseite trennen, 1. ist unten blassgelb, — 2. hat rötlich. Ton, — 3. hat grünl. Hflgl. — **Stichel** bringt Bemerk. zu den hierbei zahlr. unterschied. Col. Formen (p. 8).

Delias bromo, *crithoe* u. *tobahana*. Verhältniss ders. zu einander. **Dymas de Nicév.** ist nicht als ♀ von *Bromo* Frühst. zu betrachten, wie **Butler** (Revis. 1897) will, sondern repräsentirt eine leichte Var. ders., die sich hauptsächlich durch die geringe Entwickl. des rothen Basalflecks auf d. Hflgl. oberseits u. das vollständige Fehlen rother Schuppen unterseits, nahe der Basis der Rippe unterscheidet; Charaktere, die zu geringfügig sind, um eine Sp. darauf zu begründen. Vergleiche mit *bromo*. **de Joannis, J.** Bull. Soc. Entom. France, 1901. p. 206—207.

- **Grose-Smith** behandelt u. bildet ab in *Rhopal. exotica* *Delias* VIII: *neyi* p. 29. Fig. 1, 2. — *niepelti* p. 29. Fig. 3, 4. — *kummeri* p. 30. Fig. 5, 6. — *itamputi* p. 30. Fig. 7, 8. — *cuningputi* p. 30. Fig. 9, 10. — Desgl. in op. cit. *Delias* IX: *iltis* p. 32. Fig. 1—3. — *aroeae* p. 33. Fig. 4, 5. — *Weiskei* p. 33. Fig. 6—8. — *mirifica* p. 34. Fig. 9—10. — Die meisten ders. sind im vorig. Jahre von **Ribbe** beschr., cf. vor. Bericht p. 692.

Neu: *ellipsis* n. sp. (wegen der Useite, — Hleib. fehlt). **de Joannis.** Bull. Soc. Entom. France, 1901. p. 207—208 („Australie“).

agostina subsp. *annamitica* n. **Fruhstorfer.** Societ. entom. vol. XVI. p. 98 (Annam).

schönbergi subsp. *isabellae* n. **Rothschild** u. **Jordan.** Nov. Zool. Tring, vol. 8. p. 403 ♂♀ (Isabel, Salomons-Isl.).

Eucheira socialis. **Raupe.** **Dyar.** Proc. Entom. Soc. Washington, vol. IV, p. 420.

- Eronia buqueti* (Boisd.). Fundorte in Somaliland. **Sharpe**. The Entomologist, vol. 34. Suppl. p. 6.
- Euchloe cardamines*. Spätes Vorkommen. **Pilley, J. B.** The Entomologist, vol. 34. p. 58. — Paarung. **Prideaux**. t. c. June, p. 178—180. — at rest. **Lucas, W. J.** t. c. July, p. 204.
- L. ♂. Teratologisches Stück. **Hampson**. Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 12 (37). p. 119.
- Eurema xanthochlora* Koll. Fundorte. **Therese von Bayern**. p. 243. — neda Godt., limbia Feld., lydia Feld., marginella Feld., deflorata Koll. Fundorte nebst Bemerk. (Abweichungen etc.) p. 244—245.
- Eurymus (Colias) hyale* aut. (= kirbii Lewis von Wei-Hai-Wei). **Fletcher**. The Entomologist, vol. 34. p. 173.
- Gonepteryx Cleopatra* L. auf der Insel Arbe (Norddalmatien). Verhdlgn. zool.-bot. Ges. Wien. 51. Bd. 1901. Sitz.-Ber. vom 4. Jänner 1901. p. 7—8. — rhamni siehe *Colias hyale*. **F. W. Frohawk**; **Aberr. Frohawk, F. W.** The Entomologist, vol. 34. Dec. p. 352.
- Idmais chrysonome* (Klug) bei Gebel Margel an Akazienbüschen häufig. **Rothschild**. Nov. Zool. Tring, vol. 8. p. 427.
- Klug u. phisadea var. palaestinensis aus dem Jordanthal u. vom rothen Meer. Berlin. Entom. Zeitschr. 47. Bd. Sitz.-Ber. für 1901. 17. Okt. — Insektenbörse, 18. Jhg. p. 365.
- Leptidia sinapis* gehört sein. Flügelgeäder nach nicht zu den Pierididae, sondern zu den Dismorphiidae (in Europa durch *Leptidia*, in Asien durch *Azalais*, in S. America durch *Dismorphia* u. nahest. Gatt. vertreten). **Grote**. Verhdlgn. zool.-bot. Ges. Wien, 51. Bd. p. 656.
- Leptophobia aripa* Bsd., *eleone* Doubl.-Hew. u. *penthica* Koll. Fundorte. **Therese von Bayern**. p. 242.
- Leucophasia sinapis*-Puppe mit blasserother statt weisser Längslinie. The Entomologist, vol. 34. p. 259.
- crataegi* seit 10 Jahren in Engl. nicht wiedergefunden. **Oberthür**.
- sinapis* wird seltener in England. **Oberthür**.
- Mylothris agathina* (Cram.) in Somaliland. Gan Liban. **Sharpe**. The Entomologist, vol. 34. Suppl. p. 4. — *rubricosta* Mab. ♂ u. ♀ dieser schönen Sp. bei Zomba, Centr.-Afr. erbeutet. Das ♀ unterscheidet sich vom ♂ durch stärkere Grösse, grössere Ausdehnung des schwarzen Anfluges am Apex d. Vflgl. u. grössere Randflecke auf beiden Flgl. **Lathy**. Trans. Entom. Soc. London, 1901. p. 31.
- Parnara mathias* (Fabr.). Somaliland: Biji. **Sharpe**. The Entomologist, vol. 34. Suppl. p. 6.
- bei Cairo. **Rothschild, N.** Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 428.
- Pereute leucodrosime* Koll. Fundorte. **Therese von Bayern**. p. 243.
- Pieris*. Abb. eines Theils d. Vflgls. einer älteren Puppe. **Grote**. Verhdlgn. zool.-bot. Ges. Wien. 51. Bd. p. 658.
- brassicae* L. 1901 bei Karlsruhe zahlreich. **Gauckler**. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 389. — bei Zinnowitz im Anf. August 1900 massenhaft. **Riesen**. p. 162—163. — Kohlernte von 1900 im östl. Deutschland durch ihn fast vernichtet. Insektenbörse 18. Jhg. p. 317. — Stück bei Tusnad in Siebenbürgen mit hell rosenrotem Anfluge. The Entomologist

- vol. 34. p. 31. — Aus Weismantel, Rovart, Lapok, VII. p. 175 u. Auszug p. 16. — var. *castaleuce* Rüb. charakt. **Holtz.** Berlin, Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900. 18. Febr. (p. 8).
- canidia* Sparrm. von Wei-Hai-Wei. **Fletcher.** The Entomologist, vol. 34. p. 173.
- daplidice.* Britische Fundorte: at Dover. **Stockwell, Douglas, H.** The Entomologist, vol. 34. Sept. p. 252. — at Eastbourne. **Adkin, Rob.** t. c. p. 252—253. — in Jersey. **Blyth, S. E. F.** t. c. Oct. p. 291. — in Sussex. **Hyams, H.** t. c. Dec. p. 351. — Von Eastbourne. The Entomologist, vol. 34. p. 360. — wird nur hin u. wieder an der Südküste Englands gefangen. **Oberthür.** — wandernd. **Bell Marley, H. W.** The Entomologist, vol. 34. p. 98.
- (subg. *Pieris*) *diana* Feld. u. *locusta* Feld., (subg. *Perrhybris*) *malenka* Hew. u. *marana* Doubl., (subg. *Tatochila*) *xanthodice* Luc. Taf. IV. Fig. 1 ♂, 2 ♀. Fundorte. Bemerk. etc. **Therese von Bayern.** p. 241—242.
- napi* gezogen etc. The Entomologist, vol. 34. p. 185. — Die Serie, die im Juni—Juli schlüpfte, war sehr gleichförmig, die des April—Mai variabel im ♀.
- *melanist.* Form von **Burger** (siehe Bericht f. 1900 p. 695) engl. Beschr. The Entomologist, vol. 34. p. 31. (gefang. im Frühjahr bei Dretzel, in der Nähe von Gladau, in Sachsen).
- *L. f.* (gen. II) *napaeae* Esp., *form.* (gen. I) *verna n.* bildet den Gegensatz zu d. Esper'schen *napaeae* u. zeichnet sich durch stärker bestaubte Useite d. Hflgl., besonders an den Rippen aus, sowie dadurch, dass der schwarze Spitzenfleck d. Vfogl. kleiner u. an den Enden der Rippen unterbrochen ist. Ebenso sind die Vfogl. durchgehends spitzer als bei *napaeae* u. var. *bryoniae* O. mit *ab. immaculata n.* (ausgezeichnet durch das Fehlen oder Undeutlicherwerden der schwarzen Flecke an d. Oseite d. Vfogl.) **Strand.** Nyt Mag. etc. 39. Bd. 1901. p. 45 (Langöen u. Lüdingen). — Variabilität der *bryoniae* ♀ p. 45. — var. *flava* Kane. farb. Abb. The Entomologist, vol. 34. Taf. IV. Fig. 6. — beschr. op. cit. vol. 26. p. 119.
- rapae* *L.* Stück im Hause ausgeschlüpft am 22. Febr. 1901. The Entomologist, vol. 34. p. 184; — frühzeitiges Auftreten in London. **Cottam, Arthur.** t. c. Apr. p. 131. — spätes Vorkommen. **Pilley, J. B.** The Entomologist, vol. 34. p. 58. — von **Abafi-Aigner** (17). Wanderungen in Ungarn; — von Wei-Hai-Wei. **Fletcher.** The Entomologist, vol. 34. p. 173. — in Aegypten. **Rothschild.** Nov. Zool. Tring, vol. 8. p. 427; — breitet sich allmählich in New Mexico aus. Stück bei Las Vegas gefangen. **Cockerell, T. D. A.** The Entomologist, vol. 34. July. p. 204. — Experimente, Aufzucht unter farbigem Licht. **Nenikow.** — Keine Farbenveränderung beobachtet; — m. undeutl. Fleck auf dem Diskus der Hflgl. The Entomologist, vol. 34. p. 61. — **de Rocquigny-Adanson.**
- *L.* hat wie *napi* einen allerdings weniger auffälligen Saison-Dimorphismus. Frühjahrsbrut im allgemeinen blasser. Berlin, Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900. 1. Febr. (p. 5). — Zwergform *ibid.* — Stücke

aus Griechenland. Variabilität. *ibid.* Vergl. mit var. *orientalis* Oberth. (p. 5—6). — *forma deleta n.* (die Frühlingsgeneration hat den Spitzenfleck sehr undeutlich u. weiss bestaubt; dies ist auch zuweilen bei Faltern der 2. Gener. der Fall. Diese werden als neu bezeichnet). **Strand.** *Nyt Mag. etc.* 39. Bd. 1901. p. 44.

Pinacopteryx rubrobasalis Lanz. *Bemerk. zur Synon. etc.* **Butler** (5). p. 202.
Pontia daplidi e L. von Wei-Hai-Wei. **Fletcher.** *The Entomologist*, vol. 34. p. 173.

Prioneris. Zahlreiche Zwischenzeitformen von *watsoni* Neer (Trockenzeitform) zu *seta* Moore (Herbstform) u. auf *thestyli* Doubl. (Regenzeitform). Berlin. *Entom. Zeitschr.* 47. Bd. Sitz.-Ber. 24. Okt. — *Insektenbörse*, 18. Jhg. p. 373.

Sarangesa eliminata Holland. Somaliland: **Mandera.** **Sharpe.** *The Entomologist*, vol. 34. Suppl. p. 6.

Synchlœ glaucanome (Klug) in Somaliland: **Biji n. Bihen Dula.** **Sharpe.** *The Entomologist*, vol. 34. Suppl. p. 4; — bei Shendi, wohl echtes Wüsthier. **Rothschild.** *Nov. Zool. Tring*, vol. 8. p. 427.

Tachyris ilaire Godt. Fundorte. **Therese von Bayern.** p. 243.

Tatochila xanthodice Luc. *Litt. Bemerk. zu Berg's Abb., Vergl. etc.* **Rebel.** Berlin. *Entom. Zeitschr.* 46. Bd. p. 290—1. Taf. IV. Fig. 2.

Teracolus eulimene (Klug). 1 Stück am Westufer des Nils bei Shendi auf einer Akazie. **Rothschild, N. (2).** p. 427. — *liagore* (Klug) (nach Sharpe die dry-season-form von *daira* Klug) zahlreich in der Wüste bei Shendi. p. 427. — *daira* Klug. 2 Stücke bei Shendi. p. 428. Experimente bezügl. des Saisondimorphismus. **Marshall.**

Terias anemone Feld. var. *mariesii* Butl. von Wei-Hai-Wei. **Fletcher.** *The Entomologist*, vol. 34. p. 173.

floscula. **Weeks.** *Proc. New England Zool. Club*, vol. II. p. 89 (Bolivia).

Thais polyxena Schiff. Von ders. Stelle, Krapina in Kroatien in einem Jahre aus 150 Puppen fast nur die Stammform, nur 20 Stück aberrirten, doch nicht so gelb wie bei ab. *ochracea* u. nicht so schwarz wie *cassandra*. Im Vorjahre aus 60 Exempl. nur Stücke, welche alle von der Stammform abwichen u. alle sehr gross; ab. *ochracea*, die griechische Form, ab. *cassandra* Hüb. sehr dunkel, bei einigen die schwarzen Flecken zu Wellenlinien verschmolzen. **Jander.** *Zeitschr. f. Entom.* 26. Hft. Breslau, 1901. p. 26—27. — Giebt Anlass zum Nachdenken über Werth u. Unwerth mancher „Varietät“, „Lokalrasse“ u. s. w.

— Fabr. *Sui Lepidopteri del gen. Thais.* **Cannaviello, E.** *Riv. Ital. Sci. Nat. (Siena)*, Ann. 21. No. 3/4. p. 28—39.

Danaidae.

Danaiden von Central-Afrika. **Sharpe.** *Ann. Nat. Hist. (7)*, vol. 8. p. 278—279. — 3 Spp.

Amauris Grogani (mit *damocles* Beauv. verw. hinsichtl. der Lage der weissen Flecke auf den Vflg., im allgem. Aussehen A. *Ansorgei* Sharpe ähnelnd).

- Zur Gruppe *damocles* u. *echeria* zu rechnen. **Sharpe**. *Ann. Nat. Hist.* 7. vol. 8. p. 278—279 ♂ (*Mushari*, 8000').
- hecatoides* (verw. m. *A. hecate* Butl. u. *A. inferna* Butl., Unterschiede). **Aurivillius**, *Entom. Tidskr.* 22. Årg. p. 113 nebst Abb. Fig. 19 (Banzyville, M'Boko u. Roubi im Congostaat). — Gehört in die Uebers. der Rhop. Aethiop. zur Abt. B d *†, weicht aber von den dort aufgeführten Arten durch den schmalen Diskalflecken 1b der Vflgl., welcher die Rippe 1 nicht (oder selten nur mit ein. klein. Vorsprunge) erreicht u. durch den fehlenden oder sehr kleinen Diskalflecken 6 d. Vflgl. ab.
- niavius* L. aus Kamerun wird von *Hypolimnias anthedon* Dbl. überraschend nachgeahmt. Im Süden fliegt die var. *dominicanus* deren Hflgl. mehr weisslich aufgehellte sind, merkwürdigerweise fliegt ebenda die analog veränderte Hyp.-Form var. *wahlbergi* Trim. *Berlin. Entom. Zeitschr.* 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900 13. Dez. (p. 30).
- Calinaga*. Eigentümlichkeiten. *Taxonomie. de Nicéville*. *Journ. Asiat. Soc. Bengal*, vol. 69. p. 150—155.
- Arten ders. (var. *gantama* nom. nov.?) **Moore**. *Lep. ind.* vol. IV. p. 44—49. pls. 390 u. 391.
- Calliploea adyte* *subsp. natunensis* n. **Fruhstorfer**. *Deutsch. Entom. Zeitschr.* 14. Bd. lep. Hft. p. 337.
- Crastia lorquini* besitzt kürzeren Analpinsel als *Euploea* (?) *Isamia* ohne Gipfelrosette ebenso *Cr. godarti*. **Fruhstorfer**. *Insektenbörse*, 18. Jhg. p. 18.
- Danais chrysippus* var. *chrysippus* (L.). Zahlreich in den Gärten bei Kairo. **Rothschild**. *Nov. Zool. Tring*, vol. 8. p. 426. — *chrys. f. dorippus* Klug. *Khartoum*, seltener als die Type.
- chrysippus* L. nebst 2 Varr. Mimikry der *Hypolimnias misippus* L. siehe **Rey** unter *Mimicrytheorie* p. 735 dies. Berichts.
- evesinus* Cram. Fundorte in Columbien. **Therese von Bayern**. p. 246.
- klugi* (Butl.) u. *dorippus* (Klug) in Sonaliland. **Sharpe**. *The Entomologist*, vol. 34. Suppl. p. 1.
- plexippus* L., auf starken Druck kommen die Analpinsel heraus u. verbreiten einen ähnlichen, mäuseähnl. Geruch wie *Radena similis*; zerbissen schmecken sie leicht bitter. **Fruhstorfer**. *Insektenbörse*, 18. Jhg. p. 4. — Der Duftapparat der Hflgl. übertrifft alle anderen Arten u. stinkt lebhaft nach Aas, ähnl. wie *Necrophorus* aus den Schneckenstöpseln (in Japan). p. 4. — Duftfleck 1 mm dick und fleischig; zerbissen fast geschmacklos. Aasgeruch noch 36 Std. nach dem Tode gleich stark penetrant. p. 18.
- Danaus gilippus* var. *jamaicensis* Raup. **Swainson**. *Journ. New York Entom. Soc.* vol. IX. p. 80.
- weiskei*. **Rothschild** u. **Jordan**. p. 218 (Neu Guinea); — p. 403 Hinweis auf Abb. Taf. X. Fig. 1.
- Danisepta rhadamanthus* Fb. von einer Papilionide *Isamiopsis danisepta* Butl. nachgeahmt (Assam). *Berlin. Entom. Zeitschr.* 47. Bd. Sitz.-Ber. f. 1901. April. — cf. *Insektenbörse*, 18. Jhg. p. 157.
- Euploea*. Untergattungen. Listen der Spp. u. Revision von *Tronga*. **de Nicéville**. *Journ. Asiat. Soc. Bengal*, vol. 70. p. 12—38.
- coreta*. Raup. u. Puppe. **de Nicéville**. *op. cit.* vol. 69. p. 217.
- Arch. f. Naturgesch.* 68. Jahrg. 1902. Bd. II. H. 2.

- Ituna lamirus* Latr. Fundorte nebst Bemerk. **Therese von Bayern.** p. 246.
Lethe arete ♂ stark nach Vanille duftend. **Fruhstorfer.** Insektenbörse, 18. Jhg. p. 26.
Radena similis ♂ auf weithin einen abscheulichen Mäusegeruch verbreitend, der vom Körper u. nicht von dem blassgelbl. Analpinsel ausgeht. Penis von dreieckigen, nach unten in eine Spitze auslaufenden Chitinplatten geschützt. **Fruhstorfer.** Insektenbörse, 18. Jhg. p. 4.
Salpinx leucostictos. Neue Varr. ders. beschreibt **Fruhstorfer** in der Deutschen Entom. Zeitschr. lep. Hft. 14. Bd. p. 335—337. — Neu ist: *miraculosa* p. 334 (Tonkin). — *superba* Herbst. Fleck variabel, bei ein. ♂ alle weissen Punkte der Hflgl. fehlend; riecht schwach, anale Duftpinsel dunkelgelb sehr complicirt. **Fruhstorfer.** Insektenbörse, 18. Jhg. p. 18.
Tronga. Note on the Butterflies comprised in the Subgenus *Tronga* of the Genus *Euploea.* **de Nicéville.** Journ. Asiat. Soc. Bengal. vol. 70 P. II. No. 1. p. 12—38.

Ithomidae. Neotrupidae.

- Dircenna Barrettii* Dannatt: **Lathy** (2).
Epilera subg. n. siehe *Ithomia*.
Hymenitis moschion. **Godman.** Biol. Centr.-Amer. Rhopal. vol. II. p. 649 (Mexico). — *andreas.* **Weeks.** Entom. News Philad. vol. 12 p. 264 (Bolivia).
Ithomia (subg. *Ithomia*) *terra* Hew., *oenanthe* Weym., *cleora* Hew., *zerlina* Hew., *starkei* Stgr. Fundorte in S. Amer. **Therese von Bayern.** p. 247—248 u. *pseudo-agalla* Rbl. n. sp. p. 248 ♂ Abb. Taf. IV. Fig. 3 ♂. (Urwald bei Pozuelos, nordöstl. von Babahoyo [W. Ecuador] 146 m Seehöhe). **Rebel.** Beschr. t. c. p. 291—292 (gleichet habituell stark der *Pteronymia agalla* God. & Salv. oder auch *Pt. veia* Hew.)
(subg. *Pteronymia*) *aletta* Hew., *apia* Feld. p. 249.
(subg. *Hymenitis*) *cymothoe* Hew. u. *andromica* Hew. p. 249.
(subg. *Epilera* nov. subg. Rbl.) *singularis* n. sp. p. 249—250 ♂. (Westecuador: Balsabamba, 630 m). **Rebel.** Beschr. t. c. p. 292—293. (Vergleich u. Unterschiede). Abb. Taf. IV. Fig. 4 Geäder u. 5.
gardneri. **Weeks.** Trans. Amer. Entom. Soc. vol. XXVII. p. 357. (Bolivia).
Mechanitis doryssus Bates. Fundort in Columbien, nebst Bemerk. **Therese von Bayern.** p. 247.
— *var. suturata* n. **Godman.** Biol. Centr.-Amer. Rhopal. vol. II. p. 642.
Napeogenes stella Hew. Fundorte; wohl selten. **Therese von Bayern.** p. 247.
Tithorea humboldtii Latr. u. *pavonii* Butl. Fundorte etc. **Therese von Bayern.** p. 246—247.

Acraeidae. Heliconiidae.

- Acraeidae von Central-Afrika. **Sharpe.** Ann. Nat. Hist. (7.) vol. 8. p. 280—281. — 8 Spp.
Acraea ♀, Gebrauch der Tasche. **Marshall.** The Entomologist, vol. 34. p. 73.
— **Grose-Smith** behandelt in den Rhop. exot. *Acraea* VI folg. Spp.:
unimaculata p. 19. Fig. 1—3. — *dissociata* p. 19. Fig. 4—6. — *disjuncta* p. 20. Fig. 7, 8. — *ansorgei* p. 21. Fig. 9, 10. — *conjuncta* p. 22. Fig. 11, 12.
— Derselbe op. cit. *Acraea* VII:

- humilis p. 23. Fig. 1—3. — cuva Fig. 4. — quirinalis Fig. 5, 6. — pomponia Fig. 7, 8. — pelasgius Fig. 9, 10. p. 25.
 — Derselbe op. cit. Acraea VIII: toruna p. 27. Fig. 1, 2. — althoffi p. 28. Fig. 3, 4. — subserena Fig. 5, 6. — paragea p. 29. Fig. 7, 8.
 cabira Hopff. Serie von gelb. u. gelbbraunen Formen, von Zomba, Centr.-Afr., welche beide Varietäten vollständig miteinander verbindet, demgemäss sinkt apocida Oberth. (für die extremste gelbbraune Form) zum Synonym herab. **Lathy.** Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 22.
 caecilia var. Fabr. (von Munisu, 4150') könnte für onerata gehalten werd., wenn man davon absieht, dass die internervular folds nicht geschwärzt sind. **Butler** (5) p. 200.
 chilo Godm. in Somaliland. **Sharpe.** The Entomologist, vol. 34. Suppl. p. 2. — *Gaekwari* (verw. mit *A. regalis* Oberth. versch., durch blackish suffusion over the fore-wing. Die schwarzen Flecke auch grösser). p. 2 (bei Laskarato, 3000'). — Ein unbenanntes Stück ist ihr in der Zeichnung sehr nahe, doch fehlen die transparenten Flecke auf den Vflgn.
 onerata Trim. Beschr. d. ♂ v. Taveta. **Butler.** Ann. Nat. Hist. (7.) vol. 7. p. 26.

Actinote. **Therese von Bayern** führt Fundorte nebst Bemerk. u. s. w. an von pellenea Hbn., mucia Hpf. p. 250. — antea Doubl.-Hew. p. 250—251. — acipha Hew. p. 250. — albofasciata Hew. p. 250. (**Rebel.** t. c. p. 293—294). Abb. Taf. IV. Fig. 6. — ozomene Godt. Abb. Taf. I. Fig. 7. — ozom. var. *Gabrielae* Rbl. p. 250—1. **Rebel.** t. c. p. 294—295. (West-Ecuador: Aqua Santo, zwischen Babahoyo u. Guaranda 795 m). (Die neue Lokalform fällt nicht mit der von Staudinger in den Verkehr gebrachten Varietät Calimene zusammen, welche die Basalflecken d. Vflgl.-Useite ganz roth zeigen soll. Eine weitere O. Var. aus Neu Granada zeigt ebenfalls die Vflgl.-Useite ganz röthl., wogegen die Basis d. Hflgl.-Useite in gröss. Ausdehnung gelb wird). — *olgae Rebel.* t. c. p. 295—297 (zur Ozomene-Gruppe gehörig u. der Rosaria Weym. aus Ecuador zunächst stehend. — Von der typ. Ozom. God. sogleich versch. durch die ausgedehntere rosa Basalfärbung d. Vflgl.-Oseite u. die rosa (statt gelbe) Basalfügelgefärb. d. Hflgl.-Useite. Auch findet sich bei Ozom. auf d. Vflgl.-Useite niemals die Spur ein. äuss. Querbinde. — Von Rosaria Weym. aus Ecuador, deren columb. Localrasse die n. sp. vielleicht darstellt, wesentl. versch. durch die auf d. Vflgl.-Oseite stark in Rückbildung begriffene äussere Querbinde. Auch soll Rosario auf d. Vflgl.-Useite im Apikaltheil meist eine rothgelbe Strahlenzeichn. besitz., die hier vollständig fehlt). p. 252. Abb. Taf. V. Fig. 9 u. 10 (divers. Fundorte am Osthang der Central-Cordilleren von Columbien). — neleus Latr. p. 252.

Die Gatt. hat nach Godm. & Salvin ihre Heimath in Ecuador u. Peru, wurde aber von **Therese von Bayern** am arten- u. individuenreichsten in Columbien gefunden. p. 252.

Heliconiden. Kurze Darstellung der Zeichnung, ihrer Entwickl. u. Variation. **Stichel.** Berlin. Entom. Zeitschr. 47. Bd. Sitz.-Ber. f. 1901. 24. Okt. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 373. — Kreuzungen unter diesen Formen kommen vor, so wurde *H. ph. udalrica* × *H. ph. vesta* ♀ in copula gefangen.

Euides hübnerei Mén. Fundorte. **Therese von Bayern.** p. 254.

Heliconius Latr. Fortsetzung der Monographie. **Riffarth.**

Die den in Theil I neu beschriebenen Varietäten u. Aberrationen vorgehaltenen Artnamen sind theilweise nicht mehr richtig u. ist der folgende Theil II dieses Werkes hierfür massgebend.

Der erste Theil (vergl. hierzu den vorig. Bericht p. 701—704) behandelte die allgemeine Eintheilung etc. sowie die Beschreib. der neuen Spp., Varr. u. Aberr. — Der zweite, vorliegende Theil behandelt die Gruppierung, sowie Beschreib. (nebst Litteratur, Synonymie, Unterschiede, Fundorte, Zahl der untersuchten Stücke etc.).

Gruppe I. Zu der p. 701 des vorig. Berichts gegebenen Charakteristik sei noch hinzugefügt: Von Untergruppe Ib ab kann der ♂-Hinterflg.-Vorderrand allein als Hauptgruppenmerkmal betrachtet werden.

a) *Silvana*-Gruppe (p. 25—77). Charakt. ders. p. 25—28.

Grundfarbe d. Vflg. gelblichbraun bis dunkelkastanienbraun, selten schwarzbraun. Apicaltheil braunschwarz mit einem Dreieck, oder mehreren schwefelgelb. bis weissen oder auch braun. Subapicalflecken, die manchmal bindenförm. zusammenfliessen oder auch ganz fehlen. Saumflecken bei den ♀. Querbinde, die theilweise durch die braune Grundfarbe verdrängt sein kann. Endzell-, Median- u. Randfleck, Keilfleck u. oft nur theilw. vorhand. Submedianstreif. Aussenrand d. Hflg. mehr oder weniger breit schwärzlich. Meist tiefschwarze Mittelbinde. Auch auf d. Hflgln. finden wir 1—3 Apikal flecken. Paarweise weisse, gelbl. oder braungraue meist strichförmige Saumflecken. Subcostal. u. Copalstreifen etc.

Im schwarz. Apicaltheil d. Vflg. nur ein ziemlich grosser weisser, selten gelb. Subapicalfl., von den ganz fein schwarzen Adern durchzogen. Bei den ♀♀ fließen Endzell-, Median- u. Randfleck fast immer mehr od. weniger zus., eine unregelmäss. schwarze Binde bildend etc.;

No. 1—4. *narcaea* Godt. mit den subsp.: *flavomaculatus* Weym., *satis* Weym., *polychrous* Feld. p. 28—29.

Meist 4, manchmal sehr grosse schwefelgelbe Subapikalfl., die beiden mittl. sind die grössten. Die beiden Medianflecke nicht mehr fleckenartig, sondern hängen als schwarze Masse mit dem Randfleck breit zusammen u. zwar so, dass der obere Theil d. Zelle 2 oder fast die ganze Zelle bis an die Mittelzelle schwarz ist u. dadurch am Ende d. Zelle 2 ein. nach inn. vortretenden spitz. Winkel bildet. Die schwefelgelbe, bisweilen weisse Querbinde mehr oder weniger stark in Flecke aufgelöst, etc.:

No. 5—10. *ismenus telchinia* Doubl.-Hew., *ism. clarescens* Butl. — *ismenus* Latr. mit *fasciatus* Godm. u. *Salv.*, *faunus* Stgr., *hermanni* Riff. p. 30—32.

3, selten 4 mittelgross. bis kleine Subapical fleckchen zwischen den Rippen liegend, die auch fehlen können. Die schwefelgelbe, manchmal von der Grundfarbe verdrängte Querbinde der Vflg. liegt hinter der Mittelzelle, selten in diese hineingehend. — ♂ Vrand d. Vflg. hellglänzendgrau ohne dunklere Einfassung. Rippen sämmtlicher Flgl. beim ♂ zum grössten Theil oder ganz schwarz (bei den *eucoma*-Formen sind sie immer braun, etc.):

No. 11—12. *hippola* Hew. mit *lyrcaeus* Weym.

No. 13--21. *numata* Cram. mit *guiensis* Riff., *melanops* Weym., *superioris* Butl., *gordius* Weym., *isabellinus* Bates, *mavors* Weym., *nubifer* Butl., *geminatus* Weym.

Die 3-4 zwischen den Rippen liegenden Subapicalflecke der Vflgl. meist ziemlich gross, die beiden obersten oft zusammenhängend etc. Der schwarze Randfl., der ober. Medianfl. u. der Endzellefleck fliessen meistens untereinander u. m. dem schwarz. Apikaltheil so zusammen, dass sie die hinter der Mittelzelle liegenden Theile der schwefelgelb. Binde stark in Flecke auflösen u. theilweise fast, seltener ganz verdrängen. Unterer Medianfleck in Zelle 1 nur selten vorhanden, etc.;

No. 22--26. *silvana* Cram. mit *diffusus* Butl., *metaphorus* Weym., *robigus* Weym., *ethra* Hübn.

3-4 kleine bis grosse zwischen den Adern liegende manchmal theilweise zusammenhängende Subapicalflecken, die selten fehlen, etc. Vrand des ♂ Hflgl. bräunlich grau, theilweise mit schwach dunklerer Umrandung. Die Rippen sämtlicher Flgl. auch beim ♂ nicht schwarz. Durch diese beiden Eigenschaften von den *numata*-Formen unterschieden, die sehr hellen Vorderrand u. mehr oder weniger schwarze Rippen beim ♂ aufweisen:

No. 27--38. *eucoma* Hübn. mit *flavofasciatus* Weym., *tyndarus* Weym., *numismaticus* Weym., *metalilis* Butl., *mentor* Weym., *semiflavus* Weym., *claudia* Godm. & Salv., *juntana* Riff., *flavus* Weym., *cephallenia* Feld., *aerotome* Feld.

No. 39--40. *gradatus* Weym. mit *thielei* Riff.

Vrand der ♂-Hflgl. ist heller grau wie bei *eucoma*, Umrandung dess. dunkler u. breiter, sodass die innere helle Farbe sehr deutlich hervortritt. Rippen höchstens in der Mitte der Hflgl. schwarz, sonst braun. Oben meist ohne Saumflecken.

No. 41. *sulphureus* Weym.

No. 42--43. *paraensis* Riff. mit *latus* Riff. — 44. *aulicus* Weym.

3-4 mittelgr., zwisch. d. Adern liegende Subapicalflecke; die schwefelgelbe Querbinde zuweilen bis in die Mittelzelle ausgedehnt. Keilfleck mehr rundlich etc. Rippen braun, nur auf den ♂-Hflgl. in d. Mitte u. auf den Vflgl. in der schwefelgelben Binde etwas schwarz. ♂-Vrand d. Hflgl. hellglänzendgrau m. dunklerer Umrandung. Aussenrand d. Hflgl. oben meist ohne Saumflecken:

No. 45. *schulzi* Butl. — No. 46--47. *vetustus* Butl. mit *metellus* Weym.

No. 48--50. *novatus* Bates mit *mirus* Weym., *leopardus* Weym.

Wie vorhergehende Gruppe, aber Querbinde u. Subapicalflecke weiss, statt gelb u. Vflgl.-Basis bis zum Ende des Keilflecks, der darin eingeschlossen ist bis über die Mediane 1 schwarzbr., Hflgl. ebenfalls gleichmässig schwarzbraun, etc.: No. 51. *pasithoë* Cram.

Die 3-4 Subapicalflecke d. Vflgl. sehr variabel. Sie sind braun bis schwefelgelb, oft mit gelb. Kern etc. Hflgl. dadurch ausgezeichnet, dass die Aussenrand- u. Mittelbinde sehr selten bis zur Flügelspitze reicht, etc.:

No. 52--61. *aristiona* Subsp.: *aurora* Bates, *elegans* Weym., *floridus* Weym., *arcuella* Druce, *seraphion* Weym., *timaeus* Weym. — *aristiona* Hew. mit *splendidus* Weym., *bicoloratus* Butl., *phalaris* Weym.

Die folg. Formen gehören ebenfalls zur aristiona-Gruppe. Querbinde der Vflgl. immer schwefelgelb, während sie bei den vorhergehenden mit höchst seltenen Ausnahmen wie die Grundfarbe gefärbt ist.

No. 62—69. *aristiona* subsp.: *lenaeus* Weym., *euphone* Feld., *subsp. terapotensis* Bang-Haas i. l. n. (untersch. v. *euphone* dadurch, dass die Mittelbinde d. Hflgl. schmaler u. weniger zusammenhängend ist, etwa 3—4 mm breit, aus einzelsteh. Flecken bestehend. Auch nach aussen gerader begrenzt; die einzeln. Flecke gleichen schiefen Quadraten. Bei einzelnen Stückchen ist sie durch kleinere Fleckchen mit dem Subcostalstreif. bogenf. verbunden. Die nur in der inneren Hälfte vorhandene Randbinde ist oft in Flecke aufgelöst oder fehlt ganz) p. 59 ♂♀ (Peru: Tarapoto). — ar. subsp.: *euphrasius* Weym., *standingeri* Weym., *pretiosus* Weym., *idalion* Weym., *messene* Feld.

Apicalspitze d. Vflgl. schwarz, ohne Subapicalflecken etc. Submedianstreif gewöhnl. sehr breit, nur in der inneren Flgl.-Hälfte vorhanden, hinter der Mitte meist scharf rundlich abschneidend. Hflgl. öfter ganz oder fast ganz schwarz mit 2—4 schmal. schwefelgelb. Apicalfl. etc. Ist Mittel- u. Randbinde isolirt, so ist erstere oben glatt, nach unten meist stark gezähnt u. nur durch die feine schwarze obere Radiale mit dem Schwarz des Apicaltheils verbunden:

No. 70—72. *ithaka* Feld. mit *vittatus* Butl. u. *marius* Weym.

Von der *aristiona* Gruppe versch. dadurch, dass die Aussenrandbinde d. Hflgl. meist aus sehr lang gezogenen den Adern aufsitzenden spitzen Dreiecken besteht, etc. ♂ Vrand d. Hflgl. dunkler seidengrau, etc.:

No. 73—78. *pardalinus* Bates mit *lucescens* Weym., *radius* Butl., *dilatatus* Weym., *maeon* Weym., *tithoreides* Stgr.

Meist grosse Thiere. Die gelb. zwisch. den Adern lieg. Subapicalflecke der Vflgl. meistens in einer mehr gebogenen Linie stehend. Uebergang zur *clara*-Gruppe. Häufig mehr wie 4 Fleckchen vorhanden. Hflgl. ähnl. den. der vor. Gruppe, werden aber nie ganz schwarz. Mittelbinde meist nach der Wurzel zu glatt u. zusammenhängend, nach unten meist in spitze kleine Dreiecke aufgelöst, die manchmal isolirt stehen. Sie hängt mit der sehr schmal schwarz. oberen Radiale mit dem Aussenrand zusammen etc.:

No. 79—81. *fortunatus* Weym. mit *spurius* Weym. — No. 81. *sergestus* Weym. — No. 82—83. *ennius* Weym. m. *nigrofasciatus* Weym. — No. 84—89. *quitalena* Hew. mit *felix* Weym., *concors* Weym., *jonas* Weym., *sisyphus* Salv., *versicolor* Weym.

Von allen vorhergehenden Gruppen versch. dadurch, dass im schwarz. Apicaltheil eine gleichmässige gebogene Reihe von schwefelgelben, selten weiss. Subapicalflecken vorhanden ist. Bei einigen Formen tritt innerhalb dieser Reihe noch eine Reihe gleichartig manchmal etwas verloschener u. kleinerer Flecken auf etc.:

No. 90—102. *clara* Fabr. m. *semiphorus* Stgr., *annetta* Riff., *anderida* Hew., *holcophorus* Stgr., *albicilla* Bates, *crysanthis* Godm. & Salv., *discomaculatus* Weym., *xanthicus* Bates, *jucundus* Bates, *zuleika* Hew., *alpipunctata* Riff. u. *fornarina* Hew.

b) *Cydn*-Gruppe (p. 78—85). Charakt. ders. p. 78—79.

Die Gruppe ist in der Zeichnungsanlage analog der Gruppe II h. Gruppierung:

Die Querbinde der Vflgl. ist in kleine Flecke aufgelöst, Hflgl. mit vom Aussenrande abstehender Randbinde:

No. 103. *cydno hermogenes* Hew., scheint ein Zwischenglied zwischen den clara- u. *cydno*-Formen zu sein.

Die Querbinde der Vflgl. ist fast immer vollkommen ungetheilt, selten ist sie im oberen Theile oder an der Mediana von Schwarz unterbrochen. Hflgl. mit Randbinde:

No. 104—113. *cydno* subsp.: *zelinde* Butl., *galanthus* Bates, *stübeli* Riff., *diotrephes* Hew., *chioneus* Bates. — *cydno* Dbl.-Hew. mit den Subsp.: *hahneli* Stgr., *termerinda* Hew., *alitheia* Hew., *haenschi* Riff.

Die Querbinde der Vflgl. ist durch die schwarz gewordene Zelle 3 u. dem damit verbundenen Endzelleck in zwei Binden getheilt. Der Mittelzelleck ist von dem Bindentheil der Zelle 2 durch die schwarze Mediana abgetrennt. Hflgl. mit Randbinde oder Querbinde:

No. 114—118. *cydno subcydnicus* Stgr., *cydnides* Stgr., *epicydnides* Stgr., *weymeri* Stgr., *gustavi* Stgr.

No. 119. *pachinus* Salv. (etwas isolirt stehende Art).

c) *Melpomene*-Gruppe (p. 85—108). Charakt. ders. p. 85—87. Gruppierung:

Mittelfleck der Vflgl. innen gelb, *cydno* ähnlich, aussen roth u. theilweise *melpomene* ähnlich. Die Hflgl. der ersten Form stehen zwischen *cydno* u. *melpomene*, die der 2. sind wie bei *melpomene*:

No. 120. *rubellius* Gr. Smith & Kirby. — No. 121. *heurippa* Hew.

Die Basis der Vflgl. u. die Hflgl. schwarzbraun, ohne Zeichnung u. ohne blauen Glanz. Die Vflgl. entweder mit *thelxiope* Fleckenbinde u. Mittelfleck, oder mit *melpomene* Mittelfleck, oder die Zeichnungen beider Formen gemischt oder nur theilweise vorhanden. Hflgl.-Useite 2—4 rothe Wurzelpunkte u. gelben Basalstreif am Vorderrande (vergl. auch *penelamanda*, *amandus* u. *aphrodyte* am Schluss der *melpomene*-Formen).

No. 122—133. *melpomene* L. mit *atrosecta* Riff., *melpomenides* Riff., *lucinda* Riff., *karschi* Riff., *lucia* Cram., *melanippe* Riff., *diana* Riff., *deinia* Möschl., *funebria* Möschl., *faustina* Stgr., *cybele* Cram.

Wie die vorhergehende Untergruppe mit rother Basalzeichnung der V- u. Hflgl. Ausserdem treten auf den Hflgl. noch die rothen Strahlenzeichnungen der *thelxiope* auf:

No. 134—140. *melpomene* Subsp.: *tyche* Bates, *hippolyte* Bates, *augusta* Riff., *aglaopeia* Stgr., *thelxiope* (nicht *thelxiope* wie im ersten Theile steht), *thelxiopeia* Stgr., *aglaope* Feld.

Hieran schliesen sich einzelne so verschiedenartige, zum Theil vereinzelte Formen, dass von dem bisherigen Modus der Zusammenstellung abgesehen werden muss, um eine möglichst natürliche Reihenfolge beizubehalten:

No. 141—145. *melpomene*. Subsp.: *mirabilis* Riff., *unimaculata* Hew., *vicina* Mén., *eulalia* Riff. u. *amor* Stgr.

Die schwefelgelbe Fleckenbinde der Vflgl. u. der schwefelgelbe Mittelzelleck sind so dicht zusammengedrückt, dass sie einen zusammenhängenden grossen Mittelfleck bilden. Derselbe ist sehr variabel u. meist durch die Diskocellularadern schwarz unterbrochen. Die sonstigen Adern sind nur ganz fein schwarz.

Selten ist der Mittelzelleck nur theilweise vorhanden, noch seltener fehlt er ganz.

No. 146—151. melpomene. Subsp.: penelope Stgr., richardi Riff., margarita Riff., contiguus Weym., timareta Hew., pluto Stgr.

Der gelbe Vflgl.-Mittelzelleck nimmt aussen rothe Färbung an, die sich nach u. nach so verbreitert, dass sie den ganzen Fleck roth färbt, u. mithin zu einen melpomene-Fleck gestaltet.

No. 152—154. melpomene. Subsp.: erebia Riff., rufolimbatus Butl. u. penelopeia Stgr.

Bei den drei folg. Formen ist der grelle penelope-Fleck der Vflgl. vollständig durch den roten melpomene-Fleck verdrängt und die letzte Form steht melpomene so nahe, dass sie kaum einen Namen für sich beanspruchen kann. Es schliesst sich also das Ende dieser Gruppe wieder an den Anfang an, so dass dieselbe in sich wieder ein geschlossenes Ganzes bildet.

No. 155—157. melpomene. Subsp. penelamanda Stgr., amandus Gr.-Sm. & Kirby, aphrodyte Stgr. — Diese letzt. Formen bilden die westl. Varr. von melpomene und gehen wieder in Bolivien u. Peru in die typische Form über, die dort in fast genau gleichen Stücken wie am Amazonas und in Surinam gefunden wurde.

Grundfarbe schwarzbraun, meist mit stark blauem Schiller. Vflgl. mit ein. meist melpomene ähnl. roten Mittelzelleck, der manchmal sehr schmal auftritt, kurz u. mehr bindenförm. und öfters innen weiss (sehr selten gelb) ist. Bei einer Form 2 grosse rote Fleck. auf den Vflgl. — Hflgl. entweder ganz ohne Zeichn. od. m. schwefelgelb. spitz auslaufend. Querbinde in der Nähe der Basis od. mit weiss gefleckt. Randbinde, die dem Aussenrande aufsitzt u. durch die schwarz. Adern geteilt ist. Die schwefelgelb. Querbinde der Hflgl. tritt auch manchmal nur auf d. Useite auf, oder ist hier blind vorhanden:

No. 158—161. amaryllis Feld. mit euryades Riff., rosina Boisd., euryas Boisd.

No. 162—164. vulcanus Butl. mit modestus Riff. u. cythera Hew. — No. 165. batesi Riff. — No. 166. nanna Stich. — No. 167. besckei Mén.

Die folgende u. letzte Form schliesst sich in der Zeichnungsanlage den nächstfolg. tithorea ähnl. Formen an, hat aber sämmtl. Merkmale der Gruppe I: No. 168. atthis Doubl.-Hew.

Gruppe II. Charakt. siehe p. 701 des vor. Berichts.

a) Hecalesia-Gruppe (p. 109—115). Charakt.: Basalstreif am Vrande d. Hflgl.-Useite entweder gelb, braun oder grau, niemals rot. Rote Wurzelpunkte niemals vorhanden. Enthält 9 Tithoreen ähnl. Formen, von teilw. sehr verschied. Charakter. Hier werden unterschieden 2 Gruppen:

1. No. 169. crispus Stgr. — No. 170. hecuba Hew. — No. 171. choarina Hew. — No. 172. cassandra Feld. und

2. No. 173—175. hecalesia Hew. mit formosus Bates u. gynaesia Hew. — No. 176. octavia Bates. — No. 177. longarena Hew.

b) Aoede-Gruppe (p. 115—119). Charakt. p. 115—116.

Hflgl. stark gerundet, der dunkelgraue, matt glänz. ♂-Vrand d. Hflgl. geht bis in die Mittelzelle u. über die obere Radiale bis in Zelle 6 hinein (ist also breiter wie bei allen anderen Gruppen) u. endigt vor der schwarzen Flgl.-Spitze breit rund. Rote Wurzelpunkte niemals vorhanden. Körper sehr kräftig.

Hinterleib unten auf jed. Ring mit breitem schwefelgelben Fleck, auf jedem Ring ein kräftig. gelb. runder Punkt etc. — Auch hier werden weitere Gruppen gebildet.

Gruppe I: No. 178. *godmani* Stgr. — Gruppe II: No 179. *metharme* Erichs. — Gruppe III: No. 180—182. *Aoede* Hübn. mit *astydamia* Erichs., *lucretius* Weym. u. *bartletti* Druce.

c) *xanthocles*-Gruppe (p. 119—122). Charakt. p. 119.

Hfogl.-Vrand des ♂ fast so dunkel wie die Grundfarbe u. häufig. wie die des ♀ mit hellerem an der Wurzel rötl. gelb. Längsstreifen versehen etc. Der schwefelgelb., bisw. rote oder mit rotgelb gemischte Basalstreif am Vrande der Hfogl.-Useite meist nur als schwefelgelber Fleck an der Wurzel sichtbar. Körper sehr kräftig. Gliedmassen-Einschnitte auf d. Oseite des Hleibs intensiv schwefelgelb. Fühler länger wie die Mittelzelle. 2 Gruppen:

1. No. 184—186. *xanthocles* Bates m. *vala* Stgr. u. *paraplesius* Bates und
2. No. 187—189. *xanth.* *melete* Feld., *melittus* Stgr. u. *melior* Stgr.

d) *Egeria*-Gruppe (p. 122—125). Charakt. p. 122—123.

Hfogl.-Spitze aussergewöhnlich lang ausgezogen. Aussenrand mässig gezähnt. Costalader des Hfogls. an der Basis schwefelgelb. Vfogl.-Useite auffall. hell und glänzend grau, teilweise m. ein. Stich ins Violette. Die rot. Zeichn. d. Oseite kaum durchbrechend, die gelben oft stark grau bestäubt. Basalstrich am Vrand schwefelgelb etc.

No. 190—193. *egeria* Cram. mit *egerides* Stgr., *hyas* Weym. und *astraea* Stgr.

e) *Burneyi*-Gruppe (p. 125—127). Charakt. p. 125—126.

Aehnl. der *egeria*-Gruppe. ♂ Vrand d. Hfogl. dunkelbraungrau, Costalader an der Basis schwefelgelb. Vor d. Vfogl.-Spitze 1—4 kleine schwefelgelbe Subapicalfleckchen, die zwischen den Adern liegen und selten ganz fehlen.

a) Strahlen auf den Hfogl. deutlich, an der Basis sehr breit:

No. 194—195. *burneyi* Hübn. mit *hübneri* Stgr.,

b) Strahlen nur als Ansätze vorhanden:

No. 196—197. *burneyi*, subsp.: *catharinae* Stgr. u. *lindigii* Feld.

f) *Erato*-Gruppe (p. 128—133). Charakt. p. 128—129.

Costalis d. Hfogl. an der Basis schwefelgelb. Vfogl. mit 1—3, öfters teilweise, selten ganz fehlend. schwefelgelb. Subapicalfleckchen, von denen das oberste vom Winkel der Subcostalis 4 u. 5, das zweite von d. ober. Radiale schwarz durchschnitten wird. Basalstreif d. Hfogl.-Useite am Vrande rot, oft teilweise, selten ganz schwefelgelb. Wurzelflecke rot, in jeder Zelle einer, meist in die nicht immer vorhandenen u. schwächer rot gefärbt. Strahlenzeichn. übergehend u. daher teilweise als Wische erscheinend. Saumflecke entweder zu Streifenwischen ausgezogen oder als deutl. weisse, gelbl. oder bläulich weisse Pünktchen sichtbar.

No. 198—208. *erato* L. mit *transiens* Stgr., *eratonius* Stgr., *amathusia* Cram., *doris* L., *aristomache* subsp. n. (ist die *doris*-Form des westl. Abhanges der Anden; von *doris* verschied. dadurch, dass die gelbe Flecken-Gruppe in d. Vfogl.-Mitte schmaler und besonders am Ende der Mittelzelle sehr schmal erscheint etc.) p. 131—132 ♂ ♀ (*Balzapamba*, 860 m, *Palmas* 100 m, *Columbien*). — subsp. *tecta* Riff., *metharina* Stgr., *luminosus* subsp. n. (Vfogl. ähnl. wie

aristomache. Auf den Hflgl. sind die Strahlen heller blau u. besonders in der äusseren Flgl.-Hälfte glänzend weissblau) p. 132 ♂♀ (Chiriqui). — subsp. *viridis* Stgr., *obscurus* Weym. — No. 209. *hierax* Hew.

g) *Clytia*-Gruppe (p. 134—136). Charakt. p. 134.

Hflgl.-Costa in d. inneren Hälfte schwefelgelb. Vflgl.-Useite: *Costalis* u. *Subcostalis* bis fast an das Ende der Mittelzelle schwefelgelb oder weiss bestäubt. Basalstreif d. Vrandes d. Hflgl.-Useite durch einen schwefelgelben Fleck an der Wurzel vertreten. In jeder Zelle ein roter Wurzelpunkt, innerer und äusserer an der Costa liegender als langer roter Wisch ausgezogen. (Ueberrest der rot. Strahlenzeichn.). Statt der Saumfleckchen manchmal von den weissen Franzenfleckchen ausgehende hellere Streifenwische vorhanden, in jeder Zelle 2. Hleib d. ♂ Hflgl. überragend. Fühler viel länger wie die Mittelzelle.

No. 210—216. *clytia* Cram. m. *flavescens* Weym., *wallacei* Reak., *mimulinus* Butl., *elsa* Riff., *parvimaclata* Riff. u. *colon* Weym.

h) *Sappho*-Gruppe (p. 136—141). Charakt. p. 136—137.

Vflgl. breit mit breiter Spitze. Hflgl. meist breit und rundlich. Vrand d. ♂ dunkelbraungrau, der des ♀ dunkl. schwärzlich braun. Vflgl.-Useite: *Mediana* nicht gelb bestäubt. Hflgl.-Useite: an der Wurzel jeder Zelle ein roter Wurzelfleck, meist aussergewöhnl. gross u. zusammenhängend; der am Irande liegende etwas länger wie die mittleren, der oberste, zwisch. *Costalis* u. *Subcostalis*, ist manchmal der längste u. läuft spitz aus. Vier Gruppen:

No. 217—219. Vflgl.-Binde nicht in 2 Binden getrennt etc.: *sappho* Dru. mit *leuce* Doubl. u. *eleusinus* Stgr.

Die Vflgl.-Binde ist in 2 Binden getrennt, deren eine schmalere als Subapicalbinde auftritt, die andere vom Ende der Mittelzelle bis in die Nähe des Analwinkels geht. Sonst wie vorhergehende Formen.

No. 220—221. *sappho*: subsp. *primularis* Butl., *eleuchia* Hew.

Der Blauglanz ist nur schwach. Die beid. Vflgl.-Binden sind in d. Breite ziemlich gleich u. die Subapicalbinde geht in fast gerader Linie u. endigt ohne Spitze in der Nähe des Aussenrandes. Die Hflgl. haben eine schwefelgelbe Querbinde, die den Aussenrand nicht berührt. Auf der Useite ist der rote Basalstreif am Vrande u. der rote Wurzelfleck zwischen *Costa* u. *Subcosta* sehr lang ausgezogen: No. 222. *hewitsoni* Stgr.

Der Blauglanz stark. Vflgl. m. 2 Binden. Subapicalbinde sehr schmal, genau in der Mitte zwischen Querbinde u. Flügelspitze. Hflgl.-Useite: roter Basalstreif am Vrande sehr kurz, rote Wurzelflecke kleiner wie bei den vorhergeh. Formen, nicht in die Länge gezogen: No. 223. *congenor* Weym.

i) *Antiochus*-Gruppe (p. 141—144). Charakt. p. 141—142:

Basalstreif am Vrande d. Vflgl.-Useite rot, häufig ganz fehlend. Auf der *Mediana* ein schwefelgelb bestäubter Streifen. Roter Basalstreif d. Hflgl.-Useite gewöhnlich sehr kurz, fast nur ein roter runder Fleck. Oberster roter Wurzelfleck zwischen *Costalis* u. *Subcostalis* mit Ausnahme einer Form sehr lang und breit als Wisch ausgebildet (bis 12 mm l.). Wurzel der Mittelzelle m. weiss. Fleckchen. Am Ende der 4 Halspunkte öfters ein karminroter Schulterfleck. Vbeine oben ganz gelb:

No. 224—229. *Antiochus* L. mit *aranea* Fabr., *alba* Riff., *zobeide* Butl., *ocannus* Stgr., *salvinii* Dew.

k) Sara - Gruppe (p. 144—149). Charakt. p. 144—145.

Kleinere Thiere m. normal. Flgl.-Schnitt. Vflgl.-Useite: Basalstreif am Vrande rot. Subcostalis bis etwa zum Mittelzellende schwefelgelb bestäubt. Medianstreif fehlt. Hflgl.-Useite: Basalstreif am Vrande rot, verschieden lang. Rote Wurzelpunkte meist zieml. gross, der dem Vrande zunächst gelegene oft lang ausgezogen. Rote Punktbinde häufig fehlend, dann am Innenrande durch einen oder mehrere rote Punkte angedeutet. Auf der Wurzel der Mittelzelle ein gelbes Fleckchen. Körper meist m. blauem Glanze. Hinter den 4 Halsflecken jederseits je ein roter Schulterfleck. Vbeine oben ganz gelb; verschiedene Gruppen:

No. 230—231. *leucadia* Bates mit *pseudorhea* Stgr.

No. 232—241. *sara* Fabr. mit *apseudes* Hüb., *albimaculata* Stgr., *albula* Riff., *brevimaculata* Stgr., *sprucei* Bates, *rhea* Cram., *albinea* Riff. u. *verae-pacis* Bates. — subsp. *theudela* Hew. (Hflgl. m. schwefelgelb. Saumbinde, Vflgl. ähnlich wie *sara*).

l) Phyllis - Gruppe (p. 144—170). Charakt. p. 144:

Ebenso variabel u. reichhaltig wie I c. Die Formen machen ganz ähnliche Veränderungen durch wie bei diesen u. daher oft mit ihnen zu verwechseln. Vflgl.-Useite: Basalstreif am Vrande etw. vorhanden u. dann meist rot oder fehlend und durch die gelbrote bis rote Basalfarb. verdrängt. Hflgl.-Useite: Basalstreif am Vrande schwefelgelb, oft nach innen rotgelb, oft rudimentär. In jeder Zelle je ein selten fehlender roter Wurzelpunkt, welche bei den m. rot. Strahlen versehenen Tieren den Anfang dieser Strahlen bilden. Auf der Wurzel der Mittelzelle ein gelbl. Fleckchen. Hinter den 4 Halsflecken jederseits ein roter Schulterfleck. Diverse Gruppen: No. 242. *himera* Hew.

No. 243—244. *xenoclea* Hew. mit *notabilis* Salv. & Godm.

No. 245—249. *cyrbia* Godt. mit *diformata* Riff., *venus* Stgr. u. *juno* Riff., *favorinus* Hopff.

No. 250—252. *petiverana* Doubl. mit *demophon* Mén. u. *tristis* Riff.

No. 253—258. *hy dara* Hew. mit *guarica* Reak., *colombina* Stgr., *antigona* Riff., *nocturna* Riff., *chestertonii* Hew.

No. 259—263. *phyllis* Subsp.: *magnifica* Riff., *amphitrite* Bang & Haas i. lit. n. subsp. (ohne Blauglanz. Von *viculata* hauptsächlich verschied. dadurch, dass der Vflgl.-Fleck bedeutend breiter, meist glatter begrenzt u. orangerot ist) p. 157—158 ♂ (Hillapani, Peru). — subsp. *viculata* Riff. (steckt in den meisten Samml. unter *melpomene*), *calycopis* Cram., *callista* Riff.

Wie die vorhergehend. Gruppe; Vflgl. jedoch mit roter bis rotgelb. Basis, wie bei *vesta*. Hflgl. ohne Zeichnung. Roter Basalstreif am Vrande d. Vflgl.-Useite oft durch die rote Farbe der Basis verdrängt.

No. 264—268. *phyllis*. Subsp.: *dryope* Riff., *corallii* Butl., *elimaea* Erichs., *amalfreda* Riff., *cybelina* Stgr.

Vflgl. wie vorherg. Gruppe. Hflgl. jedoch mit roter u. rotgelber Strahlenzeichnung wie *vesta* etc.

No. 269—283. *phyllis*, subsp.: *erythraea* Cram., *udalrica* Cram., *andremona* Cram., *leda* Stgr., *vesta* Cram., *amazona* Stgr., *estrella* Bates, *emma* subsp. n. (klein, nicht über 37 mm Vflgl.-Länge, im allgemeinen wie *estrella*, rote Zeichn. heller, mehr gelbrot, kurze zusammenhängende schwefelgelbe Binde sehr schmal etc.) p. 164 ♂♀ (Sarayacu, Pachitea, Jurimaguas, Peru, Archidona 640 m).

— subsp. *etylus* Salv., *demeter* Stgr., *buqueti* Nöldn., *lativitta* Butl., *venustus* Salv., *anactorie* Doubl. Hew., *sanguineus* Stgr.

Teilweise wie vorhergeh. Formen. Vflgl.-Fleck breit bindenartig, gewöhnl. hinter der Mittelzelle, meist rot. Auf Hflgl. meist schwefelgelbe phyllis-Querbinde, zuweilen mit roter *vesta*-Strahlenzeichn. zusammen etc.

No. 284—289. *phyllis*. Subsp. *anacreon* Gr.-Sm. u. Kirby, *ottonis* Riff., *artifex* Stich. — *phyllis* Fabr., subsp. *phyllidis* Gr.-Sm. u. Kirby, *amatus* Stgr. m) *Charithonia*-Gruppe (p. 170—173). Charakt. p. 170.

Fgl.-Form versch., meist lang gestreckt. Vflgl.-Useite: der schwefelgelbe Medianstreif, der sich auf *Mediana* 1 weiter fortsetzt, mehr oder weniger als Längsbinde ausgebildet, bei der Stammform bis zum Aussenrand gehend. Hflgl.-Useite: 2 rote Wurzelpunkte, vor der Mitte d. Irandes noch 1—2 rote Fleckch. Wurzel der Mittelzelle m. gelbl. Flecken [bei 293 u. 294 fehlend].

No. 290. *hermathena* Hew. — No. 291—292. *charithonia* Linn. mit *peruviana* Feld.

No. 293. *nattereri* Feld. — No. 294. *fruhstorferi* Riff.

n) *Clysonimus*-Gruppe (p. 173—177). Charakt. p. 173—174.

Vflgl. ziemlich schlank, Fgl. Spitze gerundet. Vflgl.-Useite: Basalstreif am Vrande rot, kurz, breit. Hflgl.-Useite: Am Vrand ein breit-gelb. Basalstr., oft durch einen roten Fleck innerhalb der *Praecostalis* ersetzt, 3—4 rote Wurzelpunkte und auf der Wurzel d. Mittelzelle ein gelbl. Flecken. Useite der Fgl.: In jeder Zelle 2 mehr oder weniger hellere verloschene Längsstreifen, die sich in der Nähe der Mittelzelle vereinigen.

No. 295—297. *clysonimus* Latr. mit *montanus* Salv. u. *hygiana* Hew. — No. 298. *hortensia* Guér. — No. 299—300. *telesiphe* Doubl. Hew. mit *sotericus* Salv.

Heliconius elevatus (zeigt in ihrer Aehnlichkeit mit *Aglaope* Feld. u. *vicina* Mén. Verwandtschaft, lässt sich aber von ihnen trennen) Nöldner, Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. p. 5—7 ♂♀ (*Amazonas*). — *demeter* Staud. var. *bouqueti* n. (von Type versch. dadurch, dass sich die gelb. Flecke d. Vflgl. vom Zellenende entfernen u. so den Zellenschluss als ein schwarzes Feld umstellen. Der Fleck der II. Rdz. ist völlig isolirt; der im Zellenende ist gross und deutlich). — *demeter* u. var. *Bouqueti* sind zwei, trotz der Aehnlichkeit ihrer Zeichnungsanlage mit *Egeria* Cram. oder Formen der *Thelxiope*-Gruppe vollkommen von diesen isolirte Thiere, deren Merkmale Nöldner p. 8 zusammenstellt.

phyllis mit transparenten Binden. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900 (p. 19).

spadicarius Weeks, Proc. New England Zool. Club II p. 72 (Bolivia).

— **Therese von Bayern** zählt folg. Arten nebst Fundorten und sonst. Bemerk. auf: *sprucei* Bates p. 252—253 Abb. Taf. V Fig. 11; Charakt. durch **Rebel**, t. c. p. 297. — *cyrbia* Godt., *clysonymus* Latr., *euryas* Boisid., *hydara* Hew. p. 253.

Pareba vesta nebst Raupe u. Puppe. Moore, Lep. ind. vol. IV p. 31 pl. 387.

Planema montana Butl. (v. *Munisu*) Bemerk. = *meruana*, P. *bertha* Vuillot das ♂ dazu. Falls sie als Var. von *aganice* angesehen werden sollte, könnte sie auch mit gleich. Recht als Var. zu jeder and. Pl.-Sp. betrachtet werden.

Butler (5) p. 199.

Telchinia violae nebst Raupe u. Puppe. Moore, Lep. ind. vol. IV p. 36 pl. 388.

Nymphalidae.

- Nymphalidae von Munisu, 4150'. **Butler** (5) p. 197—200. — 39 Arten, dar.
 interessant: *Precis guruana*, *P. Gregorii*, *Planema montana*, *Acraea uvui*.
 — von Central-Afrika, **Sharpe**, *Ann. Nat. Hist.* (7) vol. 8 p. 281—282.
 — 15 Sp.
 — vom Wege zwischen Mombasa und den Taveta-Wäldern: *Amauris* (2),
Limnas (1), *Samanta* (1), *Monotrichtis* (1), *Neocaenyra* (1), *Physcaenura*
 (1), *Ypthima* (1), *Charaxes* (4), *Precis* (5), *Protogoniomorpha* (1),
Pyrameis (1), *Panoepa* (1), *Euralia* (2), *Hypolimnas* (1), *Hamanumida* (1),
Euphaedra (2), *Euryphene* (1), *Neptis* (1), *Eurytela* (1), *Hypanis* (1),
Acraea (10), *Pardopsis* (1). **Butler**, *Ann. Nat. Hist.* (7) vol. 7 p. 23—27.
- Nymphaliden-Raupe. Fundort. **Therese von Bayern** p. 288.
- Adelpha creton* **Godman**, *Biol. Centr.-Amer. Rhopal.* II p. 692 pl. CIX Fig. 1, 2.
 — *deborah* **Weeks**, *Trans. Entom. Soc. London* 1901 p. 353. — *helepecki*
 p. 354 (beide aus Bolivia).
- Aganisthos odius*. Raupe. **Swainson**, *Journ. New York Entom. Soc.* vol. IX
 p. 78. — *odius* F. Fundorte nebst Bemerk. **Therese von Bayern**,
 p. 263—264.
- Ageronia ferentina* **Godt.** u. *amphinome* L. Fundorte nebst Bemerk. **Therese
 von Bayern** p. 259.
- Agrias amydonius* **Stgr. subsp. trajanus n.** **Fruhstorfer**, *Deutsch. Entom.
 Zeitschr. lep.* Hft. 14. Bd. p. 327. — *Berlin. Entom. Zeitschr.* 47. Bd. Sitz-
 Ber. f. 1901, 17. Okt. — *Insektenbörse* 17. Jhg. p. 365. Von der Stammart
 bisher nur ein ♂ aus Pebas am oberen Amazonas bek., während von der
 Lokalform 2 ♂♂ u. 1 ♀ von Obidos am unter. Amazonas vorliegen. Das ♂
 hat breite schwarz gezeichnete Vflgl., der Purpurfleck dagegen tritt zurück.
 Hflgl. breiter rot bezogen. Duftpinsel braun statt gelb, Analflecken blau
 statt gelb. Auf der Useite der Hflgl. tritt eine orangefarb. Binde auf, die
 namentlich d. ♀ ein sehr zierliches Aussehen verleiht, p. 365. — *claudia*
var. vesta n. **Fruhstorfer**, l. c. p. 351.
- Anaea*. **Therese von Bayern** bringt Fundorte nebst Bemerk. zu folg. Arten:
onophis **Feld.** u. *pasibula* **Doubl. Hew.** p. 263. — *opalina* **Godm. Salv.** vom
 Vulkan Chiriqui in **Staudinger's** Exotenwerk irrtümlich als *Siderone clara*
 abgebildet. **Stichel** giebt eine mutmassl. Erklärung für diese Annahme.
Insektenbörse 18. Jhg. p. 61.
titan ♀, **Godman**, *Biol. Centr.-Amer. Rhopal.* II p. 696 ♀ pl. CIX Fig. 6, 7.
 — *schausiana* p. 697 Fig. 8—10. — *clara* p. 698 Fig. 11 und 12. —
 Charakt. ders.
- Anartia jatrophae* L. und *amalthea* L. Fundorte nebst Bemerk. **Therese von
 Bayern** p. 258.
- Apatura*. Ausschlüpfen bestimmt erwarteter Formen in Folge Einflusses von
 Kälte u. Nässe zur Zeit der Reife der Puppe. *Insektenbörse* 18. Jahrg.
 p. 237. Zwitter: links lichte ab. *clytie dilutior* ♀ — rechts tiefblauer
ilia ♂. — *ilia* ♀ mit graulila Färb. und reinweissen Binden. **Schnabel**,
Zeitschr. f. Entom. Breslau, 1900 p. XV. — *ilia* W. V und *var. clytie*.
Jänichen, R., *Insektenbörse* 18. Jhg. No. 8 p. 60—61, No. 9 p. 66—67. —

- Iris on the Hants Borders. Entom. Record vol. 13 No. 12 p. 374. — iris in Sussex. **Delves, W. jun.**, The Entomologist vol. 34 Oct. p. 293. — ♀. Teratologische Stücke. **Hampson**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 119. — iris ab. iole Schiff., für den Bezirk von Wiesbaden neu. **Wendlandt** p. 84. — zunilda Godart. Dimorphismus, Mimetismus. **Oberthür**, Bull. Soc. Entom. France 1901 p. 43—44.
- Arge dia var. *baldohnensis* n. **Telch**, Korrespondenzbl. des Naturf. Vereins in Riga (Riga. 8°), vol. XLIV p. 11.
- Argynnis. Diverse Varr. nebst Fundorte. **Ziegler**, Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900, 8. Febr. (p. 6).
- adippe L. zu Wei-Hai-Wei. **Fletcher**, The Entomologist vol. 34 p. 155.
- -♂ paired with *A. paphia*. **Newnham, F. B.**, Entom. Record vol. 13 No. 10 p. 298.
- var. *taurica* Stgr. Charakt. Vorkommen auf der Südseite des cilicischen Taurus bis 1500 m Höhe. **Rey**, Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900, 8. März (p. 10).
- and *Dryas paphia* near Doncaster. **Corbett, H. H.**, Entom. Record vol. 13 No. 9 p. 278.
- aglaia aus Friedland (Kr. Waldenburg) mit blauem Schiller auf den Flgl. u. ein ♂ aus Johannesbad mit schwarzen Flecken, die grösser sind als gewöhnlich. Zeitschr. f. Entom. Breslau 1899 p. XVI.
- Aberrante ♂♂. **Adkin**, The Entomologist vol. 34 p. 59 (bei Brighton gefangen). — Varietäten: 1. basal. $\frac{2}{3}$ schwarz, ausser ein. gelb. Diskoidalfleck, unterseits die Silberflecke jedes Hflgls. auf 2 reduziert. — 2. grünlicher Fleck auf beid. linken Flgl., ähnl. denen wie man sie häufig bei *A. paphia* findet. — 3. mit schwarz. Flecken auf dem central. Theil der Unterseite, die zu unregelmäss. Bändern zusammenlaufen. — 4. 2 ungewöhl. dunkl. ♀, von denen eins einen unpigment. Fleck auf beiden link. Flgl. zeigt. **Adkin**, t. c. p. 60.
- *kenteana* Stdgr. i. l. (var. *kenteana* n. bezieht sich auf Stücke aus Transbaicalien, wo besonders melano-♀♀ gefangen wurden. — Besch. noch nicht publizirt). **Stichel**, Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. p. 23. — *aglaja* ab. *albicans* Dietrich, Mittheil. Schweiz. Entom. Ges. 1868 p. 334 (Grundf. der Oseite weiss, nur an den Hflgl. nach innen gelbrötlich. Bestäubung um die Silberflecke der Useite blaugrün, ebenso Behaarung des Körpers. — Riffersweil, Bez. Affoltern, Schweiz). Wohl einziger in d. Litt. bekannt. Fall von Albinismus bei dieser Art, p. 23—24. — *aglaja* aberr. Fallou (Ann. Soc. Entom. France, 1871 p. 102 Taf. 2 Fig. 5, 6) (Kombination von ab. *emilia* Quensel u. ab. *charlotta* Haw. mit Hinzutritt der eigentüml. silbernen halbovalen Zeichnungen unterseits. Gefangen bei Zermatt) p. 24.
- ab. *Wimani* Holmgren bei Berlin. **Enderlein, G.**, Berlin. Ent. Zeitschr. 46. Bd. p. 320 (Finkenkrug, 30. VI. 1901. — Das von Stichel abgebild. Exempl. stammt aus der Schweiz (Albulastr.). Uebergänge besitzt das Mus. Berol. aus Kopenhagen u. Finland, Helsingfors. Vielleicht ein Produkt grosser Hitze u. Trockenheit.
- var. *Charlotta*. **Hyams, H.**, The Entomologist vol. 34 Dec. p. 352.

- amathusia Esp. in Westpreussen. Berlin. Entom. Zeitschr. 47. Bd. Sitz.-Ber. f. 1901, 7. Febr.; bei Angerburg u. Danzig (Sitz. im April) u. Insektenbörse 18. Jhg. p. 93.
- Euphrosyne mit weissen Aussenrändern d. Hflgl. u. geringeren Flecken d. Vflgl. **Schnabel**, Zeitschr. f. Entom. Breslau 1900 p. XV.
- Strand erbeutete nur 1 Stück. **Strand**, Nyt. Mag. etc. 39. Bd. p. 48. — selene Schiff. p. 48. — aglaja L. var. *borealis* n. (nordische Stücke scheinen 2 konstante Abweichungen von denen südl. Gegend. aufzuweisen. Basalhälfte dunkler, Saum- u. Apicalhälfte heller. Untersch. zw. nördl. u. südl. Stücken konnte Strand an sein. Stücken nicht finden. Bezügl. d. Farbe d. Useite d. Hflgl. lassen sich folg. Merkmale als durchgehends nachweisen: Nördl. Stücke haben kleinere Silberflecke, wovon die 2 erst. (am Analwinkel) der Mittelreihe immer zusammengeflossen sind, u. die Form der Flecke ist mehr elliptisch, als gewöhnl. an südlich. Exempl. Grundfarbe mehr grünlich ohne deutl. braunrote Zeichn. An der Useite der Vflgl. sind die schwarz. Flecke gewöhnl. kleiner u. das Apicalfeld mehr einfarbig. var. *borealis* n. ist ausgezeichn. durch dunkl. Färbung der Basals. (siehe oben), etwas anders gefärbt. Useite u. geringere Grösse) p. 50 (ausgeprägte Stücke nur im Norden. Die südl. Stücke bilden den Uebergang zu den mittel-europäischen).
- ino Esp. nicht sehr häufig, auf den Wiesen längs der Kleinen Ferse zwisch. Hoch u. Alt Paleschken. **Treichel** p. 165.
- lathonia in Dorsetshire. **Crallan, G. E. J.**, The Entomologist, vol. 34 Dec. p. 352.
- ♂ mit sehr gross. schwarz. Flecken, namentl. am Irande d. Vflgl. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900, 22. März (p. 12).
- wird nur hin u. wieder an der Südküste Englands gefangen. **Oberthür.**
- nephele H. S. Es ist unrichtig, diese Form zur hochnordischen Var. Fingal Hbst. zu ziehen. nephele ist in die Mitte zwischen Euphrosyne und Fingal zu schieben. **von Huene**, Stettin. Entom. Zeit., 62. Jahrg. p. 155.
- niobe ♂ aus Tirol, dess. Hflgl. auf d. Oseite im Wurzelfeld schwarz gefärbt sind u. auf der Useite mit Ausnahme der zimmtbraunen Randbinde u. einiger kleiner gelblicher Flecken, Perlmutterglanz haben, der nur durch das rotbraune Geäder geteilt ist. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900, 22. März (p. 12).
- u. ab. eris Mg. im Grunewald bei Berlin. ♀♀ sehr variabel in d. Grundfärbung u. Verteil. d. schwarz. Zeichnung. Hell gelbbraun u. rötlich braun in verschied. Tönen. Kontinuierliche Reihe von einfacher Zeichnung bis zu verschied. Komplikationen. Bemerk. zu zahlreich. teils aberrierenden Stücken. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900, 2. Aug. (p. 21—22).
- var. eris. ♂ mit oberseits stark zusammengeflossenen Flecken u. wolkiger Färbung. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900, 2. Aug. (p. 23).
- nitocris var. *coerulescens*. Biol. Centr. - Amer. Rhopal. II p. 675 pl. CXII Fig. 15—18.

- pales. Stück von Riffelalp mit völlig verdüsterten Vflgn. und Anlage von Melanismus auf den Hflgn. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900, 18. Jan. (p. 3).
- melanotisches Stück der ab. *napaea* Hb. kommt dem von Wagner, Wien. Entom. Ver. 6. Jahresber. 1895 Taf. I Fig. 4' besproch. melanot. Stück vom Dobratsch nahe. Oberseits Grundfarbe stark verdüstert, auf den Vflgn. mit rostrot bestäubt. Apex u. ebensolchen kurz. Saumstrichen zwischen d. Rippen u. einig. unregelmässigen Flecken im Discus; auf d. Hflgn. solche Saumstriche zwischen II₁, III₁, III₂. Die schwarz. Zeichn. hier auf d. Oseite ganz verloschen. Useite d. Vdflgl. analog dem im Vorjahre beschr. Stück, ebenso der Basalteil der Hflgl. m. d. schwarzbraun verdunkelt. Flecken, im Gegensatz zu dem von Wagner beschrieb. Stück, welches einen hellen Basalteil zeigt. Hingegen stehen rostbraune Randstriche an III₂, III₃, IV₁, IV₂ in Uebereinstimmung mit dem Kärntner-Stück. **Galvagni**, Verhdlgn. zool.-bot. Ges. Wien 51. Sitz.-Ber. v. 4. Okt. 1901 p. 625—626.
- Pandora S. V. bei Rekawinkel, Umgegend von Wien. **Konta**, Verhdlgn. zool.-bot. Ges. Wien 51. Bd. 1901 Sitz.-Ber. vom 3. Mai 1901 p. 310. — ♀, das ähnl. der ab. *valesina* Esp. von *paphia* L. melanotisch gefärbt ist. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900, 8. März (p. 9—10).
- paphia*. Raupen zu Dutzenden an der Unterseite der Veilchenblätter. **Shibabigk** (1) p. 201. — at Witherslack. **Forsyth, C. H.** The Entomologist, vol. 34 Sept. p. 253. — *paphia* L. ♂. Teratologisches Stück. **Hampson**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 119. — (von Beddgelert). Uebergangsformen von der Type zu var. *valezina*. The Entomologist vol. 34 p. 364. — ♀, partiellen Uebergang zu *valesina* darstellend. Die Hflgl. besitzen grünl. Färb. u. d. rechte Vflgl. zeigt die subapikale Aufhellung der Abart. Berlin. Entom. Zeitschr. Sitz.-Ber. f. 1900 11. Okt. (p. 25). — Hermaphrodit. rechte Flgl.: var. *valezina*, links: gewöhnl. ♂ Typus, abgesehen von einigen dunklen Spritzflecken. The Entomologist, v. 34 p. 60. — Gemischte Var. ders. p. 60. — ♂ von Bad Wildungen. Melanotisch gefärbt, besonders ausgezeichnet durch breite, strahlenartig angeordnete, gesättigt schwarze Streifen, die von der Wurzel der Flgl. bis zur Mitte reichen. Useite normal. Berlin. Entom. Zeitschr. 47. Bd. Sitz.-Ber. f. 1901 17. Okt. — Insektenbörse, 18. Jhg. p. 365. — var. *delila* Charakt., auffallend sind die ♀. **Holtz**, Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900. 18. Febr. (p. 8). — ab. *anargyra* Stgr. zu Gülek. (p. 8—9). — ♀ var. *valesina* aus dem Walde bei Alt-Paleschken, die insofern eine weitere Aberr. darstellt, als die beiden dem Ende der Mittelzelle d. Vflgl. zunächst gelegenen gelblich grünen Fleckenreihen oben sehr breit u. hell bleichgelb werden ohne jeden grünlichen Anflug. **Treichel** p. 166. — ab *valesina* Esp. übertrifft in einigen Gegenden Deutschlands die Stammform *paphia* an Zahl der Individuen (Eberswalde, ein Ort bei Stettin, mehrere in d. Schweiz u. in Tirol [Sterzing]). Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. 10. Mai (p. 191). — ab *valesina* Esp. auffallend schwarzes ♀ von Altenbrak im Harz. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. 29. März

(p. 13). — ♂ mit zwitterartig eingesprengter Farbe des ♀ (Jungferneide bei Berlin), desgl. ein ♀ aus Coeslin, Pommern, auf dessen recht. Oseite die beiden äusseren Fleckenreihen glänzend bleigrau statt schwarz sind. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900 8. März (p. 9–10). — selene W. V. 2 Aberr., eine zeigt verdunkelte Oseite, während bei der andern auf O.- u. Useite Basal- u. Diskaltheil fast zeichnungslos, Randfeld jedoch sehr markant gezeichnet; durch diesen Kontrast sehr merkwürdig. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900 (p. 21). — sp. var. von Spanien, stark mit schwarz untermischt, in Gestalt wie *aglaia*, Unterseite wie *adippe* gezeichnet. The Entomologist, vol. 34 p. 324.

thore Hübn. von Pontresina. Berlin. Entom. Zeitschr. 47. Bd. Sitz.-Ber. f. 1901. 17. Okt. — Insektenbürse 18. Jhg. p. 365.

Athya punctata Leech u. *Limenitis albomaculata* Obth. ahmen sich vollkommen nach. **Oberthür**, Bull. Soc. Entom. France, 1901 p. 44.

Byblia ilythya (Drury). Fundorte in Somaliland. **Sharpe**, The Entomologist, vol. 34 Suppl. p. 3. — brood, larva, pupa. **Moore**, Lep. ind. vol. IV p. 13 pl. 381.

Callicore. **Therese von Bayern** bringt die Fundorte nebst Bemerk. von folg. Arten: *neglecta* Salv. (= *C. granatensis* Bsd.). — *nystographa* Bois. Abb. Taf. V Fig. 12 u. *marchalii* Guér. p. 262.

— Beschr. von **Rebel**, t. c. p. 299–300.

asteria **Godman**, Biol. Centr. Amer. Rhopal. II p. 687 pl. CVIII Fig. 31, 32. beleses p. 688 pl. CVIII Fig. 33, 39.

Catonephele chromis Doubl. nec *Godm.* Salv. = *Epicalia pierrettii* Doubl. Hew. p. 260. Fundorte. **Therese von Bayern**.

Catonephele. Der von **Stichel** geäusserte Zweifel, dass die von Doubl.-Hewits. in Gen. Diurn. Lep. Tafel 27 Fig. 1 u. von Salvin-Godm. in Biol. Centr.-Amer. Taf. 24a Fig. 2 als *Caton.* (*Epic.*) *chromis* abgebild. *Caton.* ♀♀ identisch seien, sind berechtigt. Es handelt sich um 2 verschiedene Arten. **Stichel**, Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. p. 3 sq. Sie verhalten sich so

1. *Catonephele chromis* Dbl.-Hew. — Venezuela, Colombien-Bolivien (?)

= ♀ *Myse. chromis* Dbl.-Hew.

♂ *Epical.* bezw. *Caton. Pierrettii* Dbl.-Hew., Salv.-Godm., Kirb., Stich. (antea).

ab. sex. ♀ columbana n. p. 2 — Columbien.

= *Epical.* bezw. *Caton. Pierrettii* ♀ Salv.-Godm. (nec Dbl.-Hew.) Stich., Kirb. (antea).

2. *Catonephele Godmani* n. sp. (p. 2 Taf. I Fig. 2 ♂ Taf. II Fig. 3 ♀). — Nord Columbien, Central-Amerika.

= ♂♀ *Epical.* bzw. *Caton. chromis* Godm.-Salv. (nec Dbl.-Hew.) Kirb., Stich. (antea).

Epicalis Pierrettii Butl. a. Druce.

— *salambria* Feld. ♀. Ergänzt. zur Beschr. p. 3–4 Abb. Taf. II Fig. 4. Durch die Ergänzt. wird ein sicheres Unterscheidungsmerkmal gegen *chromis* u. *Godmani* ♀♀ gegeben, sowie eine bessere Zusammengehörigkeit der ♂ u. ♀ wahrscheinlicher: Auf d. Useite der Hflgl. ist die obere, die beinfarbige Mittel-

binde begrenzende dunkle geschwungene Linie kürzer nach aussen gebogen als bei den ♀♀ der beiden and. Spp. u. hat über R 1 einen starken, zipfelartigen Fortsatz nach aussen, der der Lage einer geschwungenen Linie zw. SC u. R, 2 auf d. Hflgl.-Useite d. ♂ ungefähr entspricht.

Als Beitrag zur Kenntniss der geogr. Verbreitung werden p. 4 Mittheilungen aus den Sammelergebnissen (Fundorte) von R. Haensch in Ecuador (1899 u. 1900) mitgetheilt. Sie betreffen A. aus Ecuador westl. der Anden: *C. nyctimus* Westw., *numilia esite* Feld. — B. Aus Ecuador östl. der Anden: *C. chromis* Dbl.-Hew., *salambrina* Feld., *numilia* Cram., *acontius* L. (in Gestalt subsp. *exquisitius* Stich. nahe, doch abweich., ob constant?), *obrinus* L. u. *hewitsoni* Feld.

Cethosia cydippe subsp. *iphigenia* n. = *C. cyd.* var. *Holl. Nov. Zool. Tring* März 1900. — Von d. typ. *cyd.* L. aus Amboina u. von Cram's Abb. der damit synonym. ino durch den schmälere schwarze Aussensaum aller Flgl. verschieden. Das subapik. Weiss der Vflgl. ist bei keinem der 3 Stücke zu ein. breit. Fleck zusammengeflossen, sond. in 3 rundl. Punkte aufgelöst, von denen der mittl. am grössten ist). **Fruhstorfer**, Berlin. *Entom. Zeitschr.* 47. Bd. Sitz.-Ber. f. 1901. 31. Okt. — *Insektenbörse* 18. Jhg. p. 389 (Buru). — Auch in der *Deutschen Entom. Zeitschr. lep. Hft.* 14. Bd. p. 329. — *cydippe* subsp. *woodlarkiana* n. t. c. p. 339.

Charaxes Spp. von Zomba, Centr. Afr. Bemerk. zu einzelnen Arten. **Lathy**, *Trans. Entom. Soc. London*, 1901 p. 26–28. farbig. Abb. in *Nov. Zool. Tring*, vol. 8: *penrici* Rotsch. Taf. III Fig. 2. — *leoninus* Butl. Fig. 4.

Charaxes nandina (sorgf. Beschr. soll im Anhang zur *Charaxes*-Monogr. folgen) **Rothschild** u. **Jordan** p. 403 Taf. IX Fig. 2 ♂ (Escarment, Brit. East Afr., 6500–9000').

rosae Butl. Charakt. Merkmale, **Butler**, *Ann. Nat. Hist.* (7) vol. 7 p. 24.

Chlosyne saundersii Doubl.-Hew. Fundorte. **Therese von Bayern** p. 256.

Colaenis euchroia Doubl. Hew. u. *phaerusa* L. Fundorte etc. **Therese von Bayern** p. 254.

Cynthia arsinioë subsp. *buruana* n. **Fruhstorfer**, *Deutsche Entom. Zeitschr. lep. Hft.* 14. Bd. p. 329.

Cyrestis. Besprechung der Arten mit besonderer Rücksicht auf den Bau der Geschlechter. **De Graaf**, *Tijdschr. v. Entom.* vol. XLIV p. 121–224 Taf. VII–XVI.

Neu: *cocles* subsp. *cocleoides* n. **Fruhstorfer**, *Deutsch. Entom. Zeitschr. lep. Hft.* 14. Bd. p. 274. — *periander* subsp. *vatinia* n. **Fruhstorfer**, *Societ. Entom. vol. XVI* p. 97. — *nivea* subsp. *tonkiniana* n. p. 98.

Cyrestis sublineata (nahe verw. mit *C. elegans* Boisd., von der sie sich unterscheidet durch stärker vorgezogenen Apex d. Vflgl. stärker ausgesprochene u. orangefarb. Zeichnung oberseits u. in der schwarz. Linienzeichn. der Hflgl., die auf beiden Seiten ähnlich ist) **Lathy**, *Trans. Entom. Soc. London*, 1901 p. 25 ♂♀ Abb. Taf. III Fig. 1 (Zomba, Centr.-Afr.).

Cystineura bogotana Feld. (? *cana* Er.) Fundorte nebst Bemerk. **Therese von Bayern** p. 254–260. — *semifulva* Feld. desgl. p. 260.

Diestogyna umbrina (erinnert an *D. atrovirens* Mab. u. *albo punctata* Aur. Von ersterer abweichend durch die deutl. Zeichn. d. Oseite u. die violette äuss. Begrenzung des Wurzelfeldes auf d. Useite d. Hflgl., von *albo punctata* sowohl durch letztgenanntes Kennzeichen wie auch durch das Fehlen der weiss.

- Saumpunkte. Wurzelfeld d. Hflgl.-Useite fast einfarbig dunkelbraun nur in Andeutung von 2—3 violett. Schattenzeichn.). **Aurivillius**, Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 116—117 ♂ (Congogebiet: Boyenghé am Ikalembafluß). — *nigropunctata* (ausgezeichnet durch die helle scharf gezeichnete Oseite u. die strohgelben schwach gezeichnete Useite mit den scharf hervortretenden schwarzen Punkten. Useite jener von tadema am nächst.; Flgl. etwas mehr langgestreckt als gewöhnlich u. die Flgl.-Form erinnert darum an diej. des ♀) p. 117 ♂ (Congogebiet: Boyenghé am Ikalemba-Fluß).
- Dione juno** Cram. nebst var. *andicola* Bates. Fundorte. **Therese von Bayern** p. 254.
- Didonis biblis** Fabr. Fundorte nebst Bemerk. **Therese von Bayern** p. 259.
- Dryas paphia** near *Doncaster* siehe *Argynnis adippe*.
- Dynamine albidula** **Weeks**, Canad. Entom. vol. XXXIII p. 266 (Bolivia).
- Epiphile epimenes** Hew. Fundorte nebst Bemerk. **Therese von Bayern** p. 261.
- Eresia drypetis** Godm. Salv. Fundorte. **Therese von Bayern**, p. 255. — *frisica*. Raupe. **Swainson**, Journ. New York Entom. Soc. vol. IX p. 80.
- Ergolis ariadne**. Raupe u. Puppe. **Moore**, Lep. indic. vol. IV p. 17 pl. 382. — *meziane* Brut. pl. 383. — *taprobana*. Brut. pl. 384.
- Eunica bechina** Hew. u. *pomona* Feld. Fundorte nebst Bemerk. **Therese von Bayern** p. 260.
- Euphaedra neophron** Hopff. u. *violacea* kommen nie zusammen vor. Das Blau der frischgefang. *neoph.* scheint durch chemisch. Zersetzung in Grün überzugehen, das Blau der *viol.* ist anscheinend konstant. **Butler**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 25.
- Euptoicta hegesia** Cram. Funde. **Therese von Bayern** p. 254—255.
- Euripus consimilis**. Raupe. Puppe. **de Nicéville**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 69 p. 222.
- Eurybia hari** **Weeks**, Canad. Entom., vol. 33 p. 268 (Bolivia).
- Euryphene phranza** Hew. *forma Moreelsi* n. (beide Flgl. haben oben dieselbe dunkelbraune Grundfarbe ohne Spur von Grün oder Blau; die matten schwarzen Zeichnungen, sowie die ockergelbe Subapicalbinde u. der weisse Spitzenfleck der Vflgl. wie bei der Hauptform) **Aurivillius**, Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 115—116 ♀ (Boyenghé am Ikelemba). — *ikelemba* (nach der Zeichn. d. Useite mit *E. cinaethon* Hew. sehr nahe verw. Da aber die Submarginallinie d. Vflgl. bis zum Hwinkel tief gewellt (bei *cinaethon* nach hinten fast eben) u. die dunkle Diskalquerlinie tiefer gezackt ist, scheint es unwahrscheinlich, dass es sich nur um ein dimorphes ♀ von *cinaethon* handelt) p. 116 ♀ (Congostaat: Boyenghé am Ikelemba-Fluß).
- Gnatotriche exclamationis** Koll. u. *sodalis* Stgr. Fundorte. **Therese von Bayern** p. 256.
- Grapta c-album**. Spätes Vorkommen. **Pilley, J. B.**, The Entomologist vol. 34 p. 58.
- Grapta** siehe *Vanessa*. **H. Cannaviello**.
- Gymnesia** (? *Gynaecia*) *dirca*. Raupe. **Swainson**, Journ. New York Entom. Soc. vol. IX p. 79.
- Gynaecia dirca** L. Fundorte nebst Bemerk. **Therese von Bayern** p. 262—263.
- Heterochroa iphicha**. **Swainson**, Journ. New York Entom. Soc. t. c. vol. IX p. 78.

- Hamanumida daedalus* Fabr. Fundorte in Somaliland. **Sharpe**, The Entomologist, vol. 34 Suppl. p. 3.
- Hestina assimilis* L. zu Wei-Hai-Wei. **Fletcher**, The Entomologist, vol. 34 p. 255. — *namoides* (von nama untersch. durch spitzere Hfogl. mit breitem rotem Anflug. Auch unterseits sind die Hfogl. breiter braun bezogen, während die Costaltheile d. Vfogl. melanotisch dunkler gefärbt sind. Berlin. Entom. Zeitschr. 47. Bd. Sitz.-Ber. f. 1901 10. Okt. — Insektenbörse 18. Jhg. p. 357 (Sumatra).
- Hypanartia dione* Latr. Fundorte. **Therese von Bayern** p. 256.
- Hypolimnas bolina*. Thieme glaubt ein sicheres Erkennungszeichen für diese Art darin gefunden zu haben, dass auf d. Useite d. Hfogl. im Analwinkel helle, dunkel umzogene Flecken stehen u. dass die Apikalflecken hinsichtlich ihrer Zahl u. Stellung stets übereinstimmen. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900. 26. Apr. (p. 17). — *missippus* (L.) Fundorte in Somaliland. **Sharpe**, The Entomologist, vol. 34 Suppl. p. 3. — *missippus* L. Mimikry siehe Danais. Siehe Rey unter Mimicrytheorie p. 735 dies. Ber.
- Limenitis camilla* früher bei Rennes in Frankreich gemein, jetzt wohl erloschen.
- Oberthür.**
- albomaculata* Obth. siehe *Athyma punctata*.
- sibylla* bei Zinnowitz sehr zahlreich, in Ost- u. Westpreussen stets vereinzelt. **Riesen** p. 163. — in Woolmer Forest. **Rowden, A. O.** The Entomologist, vol. 34. Oct. p. 293. — Etwas vom Aufenthalt der Raupe. Wunderlichkeit des Aussehens der Puppe. Vorderseite: eine Ohreule, Rückseite: Teufel m. Hörnern u. feurig. Augen. **Shibabigk** (1) p. 201—202. — *sibylla* etc. in Shropshire. **Boxer, C. R. L.** The Entomologist, vol. 34. March, p. 99.
- Junonia alamana*. Stück auf rothen Blüten, von seiner braunen Schutzfärbung keinen Gebrauch machend. **Fruhstorfer**, Insektenbörse 18. Jhg. p. 19.
- clelia* (Cram.) u. *cebrene* (Trim.) Fundorte in Somaliland. **Sharpe**, The Entomologist, vol. 34 Suppl. p. 2—3.
- lavinia* Cram. var. *basifusca* Weym. u. *coenia* Hb. Fundorte nebst Bemerk. **Therese von Bayern** p. 257. .
- Megalura*. **Therese von Bayern** bringt Fundorte nebst Bemerk. zu folg. Arten: *coresia* Godt., *corinna* Latr. u. *marcella* Feld.
- Melitaea artemis* Fabr. farb. Abb. The Entomologist, vol. 34 Taf. IV Fig. 7. — *aurina* var. *praeclara* Kane tab. cit. Fig. 8, beschr. op. cit. vol. 26 p. 159. *adippe* siehe *dictynna* Esp. auf folg. Seite. — *aur.* var. *scotica* Robson. tab. cit. Fig. 9, beschr. op. cit. vol. 26. p. 187.
- athalia* Rott. aus den Alpen, sehr abweichend von hiesig. Stücken, ferner ein bei Berlin gefang. Stück, das durch den schwarzen Saum der Hfogl. Aehnlichkeit mit der var. *berisalii* Rühl vom Simplon hat. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900 11. Jan. (p. 3). — in Devon. **Mitford, R. S.** The Entomologist, vol. 34 Apr. p. 127—128. — *athalia* Rott., var. *navarina* S. L. u. var. *albicans* **Riesen** bei Zinnowitz auf Usedom. **Riesen** p. 163—164. — *athalia* in Devon. **Mitford** (2).
- athalia*. Alle M. des Kreises Berent zeichnen sich durch dunkle Färb. aus. Stark melanotische Aberr. aus einem lichten Buschwald bei Alt Paleschken (1 Stück, u. aus einer bedeutend schattigeren Lokalität

bei Pogutken 3 Stücke); die stark verdunkelte Lokalität (Wald) scheint das Zustandekommen solcher fast ganz schwarzer Aberr. zu begünstigen. **Treichel.** — *athalia* wird in England seltener u. *cinxia* findet sich nur noch auf der Insel. **Oberthür.** — Eine verdunkelte Aberration von *Mel. athalia* Rott. **Maurer, Petrus.** Mit 1 Fig. auf Taf. 11. Jahresber. Wien. Entom. Ver. 1900. p. 4.

aurinia Rott., ♀ *cinxia* L. ♀ u. *athalia* Rott. Je ein teratologisches Stück. **Hampson,** Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 119. — *aurelia* Nick. ♀ aus Sulden mit Silberglanz auf d. Hflgl. unterseits bis zur Randbinde, mit Ausnahme von 3 gelbl. Flecken. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. vom 22. März 1900 (p. 12).

aurinia. Mehrere bei Berlin gefangenen Stücke stellen Uebergangsformen zu var. *provincialis* u. var. *orientalis* dar. — Sitz.-Ber. f. 1900 1. Nov. p. (27).

beckeri **Godman,** Biol. Centr. Amer. Rhop. II p. 676 pl. CVIII Fig. 9, 10.

cinxia in the Isle of Wight. **Goss, H.** Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 171. Seit 27 Jahren im Jahre 1901 sehr häufig. — von der Insel Wight; gezogen: helle u. dunkle Varr. des ♀, ♂ mit besonders hellen Oberflgl., 1 ♂ mit fast schwarz. Hflgl. The Entomologist, vol. 34 p. 360. — var. ♂ (Isle of Wight). **Mitford, R. S.** t. e. July, p. 207. — 3 Varietäten: 1. Querlinien auf den Vflgl. fehlen. — 2. centrale Querlinien theilweise verloschen. — 3. centrale Flecke der Vflgl. zusammengefloßen. The Entomologist, vol. 34 p. 259.

cynthia Hbn. ♂ aus Sulden am Fusse des Ortler, dessen schwarze Mittelbinde auf den Vflgl. nach dem Innenrande um ein Drittel verkürzt ist, so dass sich die weisse Grundfarbe um dens. Raum vergrößert. — *aurelia* Nick., hellgefärbtes Stück, dessen Oseite an den Franzen die sonst nur auf der Useite sichtbare Doppellinie zeigt. — *asteria* Frey auf dem Albula oberhalb Weissenstein etwa 2200 m. Auffallend der wirbelnde Flug. Dieses ist die kleinst. *Mel.* Europas. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900 8. Febr. (p. 6). — *cynthia* W. V. u. *maturna* var. *wolfensbergeri* bei Pontresina gefangen. Berlin. Entom. Zeitschr. 47. Bd. Sitz.-Ber. f. 1901. 17. Okt. cf. Insektenbörse 17. Jhg. p. 365. ♂ ♂ von *wolfensb.* ändern wenig ab, ♀ ♀ sind dagegen variabel.

dictynna Esp. Ab. von Adelboden im Berner Oberland, 1375 m. Die Hflgl. tragen auf der Useite nur silberglänzende Flecke u. eine hellgelbe Saumlinie. Sitz.-Ber. f. 1901. 3. Oct. — cf. Insektenbörse 18. Jhg. p. 349. — Stück mit ganz schwarz. Uflgl.; *adippe* ab. *Cleodoxa*, Stück m. breitem schwarzen Saumrande auf allen Flgl. aus den Alpen. Zeitschr. f. Entom. Breslau, 1901 p. IV.

didyma O. Einschaltung zu sein. Artikel im 45. Bande der Zeitschr. (cf. vor. Bericht p. 731) **Stichel,** Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. p. 22—23 u. zwar führt er auf die (im vorig. Bericht p. 731 einige Zeilen zuvor [wozu p. 276 im Bericht zu ergänzen ist]) erwähnten Varr. *Oberthür's* in Bull. Soc. Entom. France 1900, ferner eine von R. v. *Mitjs* im XI. Jahresbericht d. Wien. Entom. Ver. 1900 p. 113 Taf. I Fig. 3 beschr. Aberr. aus Frankreich.

- Als weitere albinistische Formen werden aufgeführt: *didyma* ♂ var. Müller, Stettin. Entom. Zeitschr. 1855 p. 108 Taf. II No. 1 (bei Brünn gefang. — Schmutzig weiss mit gering. roten Anfluge etc.) u. *didyma* Abänd. Dietrich, Mittheil. Schweiz. Entom. Ges. II 1868 p. 333 (gelbrote Grundfarbe namentl. auf den Vflgl. ins Weissliche gehend. — Affoltera, Schweiz). — Für diese albinistischen Formen stellt Stichel die Bezeichnung *didyma ab. pudica* n. auf, p. 23.
- Hermaphrodit, links ♀, rechts ♂ bei Rennes gefangen. **Oberthür**, Bull. Soc. Entom. France 1900 p. 276 Abb. Taf. I, auch von Stichel, Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. p. 23 kurz erwähnt.
- var. *neera* Fisch. d. Wald. Unterschiede von der Stammform: hellere leuchtend. Grundfarbe, die bei den ♀ ins Rosafarbene zieht. Ganzes Thier ausserdem viel weniger stark gefleckt; die Useite d. Hflgl. hat blässere, mehr zerklüftete Binden. **Holtz**, Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900, 15. März (p. 10–11).
- Euphrosyne*, teilweise albinistisches Stück aus den Alpen. Zeitschr. f. Entom. Breslau 1901 p. IV.
- phoebe* Knoch. helle, dunkle, z. Theil melanistische Stücke aus Süd-Tirol im Pusterthal u. bei Tarasp im Unterengadin. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900, 8. März (p. 9). — Bei 2 ♀ verbreitert sich die helle Grundfarbe d. Vflgl. bis zur Fleckenreihe des Aussenrandes, wodurch sie sich der *Mel. aetherie* Hbn. nähern.
- schausi*. **Godman**, Biol. Centr.-Amer. Rhop. II p. 676 pl. CVIII Fig. 11, 12. Neu: *chitralensis* **Moore**, Lep. ind. vol. IV p. 9 pl. 380 Fig. 1 (Afghanistan).
- Meliceta sikkimensis* = (*orientalis* Elw. nec Mén.) **Moore**, Lep. indic. vol. IV p. 5 pl. 380 Fig. 4.
- Microtia elva* Bates. Fundorte. **Therese von Bayern** p. 255.
- Monotrichtis sufitza* Hew. (seltene Var. mit 5 Ocellen auf d. Useite der Vflgl., 1., 2., 4. klein, 2. etwas grösser, 5. wie gewöhnlich). **Butler**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 23.
- Myscelia ethusa* = (*rogenhoferi* and *pattenia*). **Godman**, Biol. Centr.-Amer. Rhopal. II p. 685. — *streckeri*, Abb. **Weeks**, Illustr. etc. p. 6 pl. I Fig. 3, pl. II.
- Neptis kallaura*. Raupe, Puppe. **de Nicéville**, Journ. Asiat. Soc. Bengal, vol. 69 p. 228.
- Nora*. Bemerk. zur Gatt. **Butler**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 364. — Liste der 12 Spp.: *kesava* Moore, *rangoonensis* Swinh., *bipunctata* Vollenh., *obsoleta* Fruhst., *decorata* Butl., *erana* de Nicév., *laverna* Butl., *ilka* Fruhst., *somadeva* Feld. (♂ ist *cordelia* Fruhst., das ♀ *N. laverna* ♀ von Dist., Moore u. de Nicév., irrtümlich als das ♀ von *N. laverna* von Borneo beschr.), *ramada* Moore (♀ ist *N. indras* Vollenh.), *surjas* Vollenh. (das ♂ ist mit *N. ramada* verwechselt worden), *salia* Moore nebst Beschr. einer Var. *cordata* Weymer, verwandt damit ist *tanagra* Staud. — Neu: *indistincta* p. 366 ♀ (Borneo), wahrscheinliche Beschr. des ♂.

Nymphidium victrix Rebel **Therese von Bayern** p. 271 Taf. V Fig. 13 ♂ u. 14 ♀ (am Amazonas. — Bereits 4 St. im Mus. Wien, aber unbeschr.). Beschr. von **Rebel**, t. c. p. 300–302.

Für Nymph. Phliassus Cl. gehalten. — Vergleich, Litteratur etc. Durch die Untersuchungen ergibt sich die Synon. der nächstverw. Nymph.-Arten:

A. Artgruppe mit gelbbraunem Vrandsfleck d. Vfogl.:

1. *Phliassus* Cl. Sc. II, t. 41 f. 5; Cr. Pap. Ex. II, t. 182 f. A, B; *Phillone* God. Enc. IX p. 574 No. 50; *velabrum* God. & Salv. Pr. Z. S. 1878 p. 368; Biol. C. Amer. I p. 477 t. 45 f. 19, 20; Stgr. Exot. Tgf. p. 261 t. 92 ♀.

2. *Hewitsoni* nom. nov.; *Phliassus* Hew. Exot. Butt. IV Nymph. 4 p. 31.

B. Artgruppen ohne gelbbraunen Vorderrandsfleck der Vfogl.:

3. *Phillone* Hew. (nec God.) Exot. Butt. IV Nymph. 4 fig. 29 (30).

4. *victrix* n. sp. *Nymphidium* spec. Th. v. Bayern, Reise Bras. Trop. p. 179 f. ♂♀ 1897.

Ophiusa melicerta (Drury) **Sharpe**, The Entomologist, vol. 34 Suppl. p. 7.

Panacea prola Doubl. Hew. u. *procilla* Hew. Fundorte. **Therese von Bayern** p. 259. Beschreibung der letzt. Sp. von **Stichel**, t. c. p. 297–299 Abb. des Vfusses nebst Tars. p. 298 Fig. 1 u. 2.

Pandora prola ♀ Abb. **Weeks**, Illustr. etc. p. 7 pl. IV.

Paromia pulchra ♀ Dimorphismus u. *Mimetismus* ders. **Oberthür**, **Charles**, Bull. Soc. Entom. France 1901 p. 42–44.

Penthema binghami *subsp. annamitica* n. **Fruhstorfer**, Deutsch. Entom. Zeitschr. Iep. Hft. 14. Bd. p. 265 Taf. V Fig. 1, 2. — *annamitica* **Fruhstorfer**, Societ. entom. vol. XVI p. 89 (Annam).

Perisama vaninka Hew. Fundorte. **Therese von Bayern** p. 261. — *bonplandii* *var. rubrobasalis* n. p. 261. (Ist in Kirby Syn. Cat. 208 nicht als Var. von *bonpl.* Guér. ausgeschieden, in *Hewitson* Exot. Butterflies III Cat. t. 10 f. 72 als *Catagramma bonpl.* var. abgebildet. — Westecuador: *Balsabamba*). *humboldtii* Guér., *oppellii* Latr. Fundorte nebst Bemerk. p. 261–262.

Phyciodes fragilis Bates und *ptolyca* Bates. Fundorte. **Therese von Bayern** p. 255.

Godman beschreibt in d. Biol. Centr.-Amer. Rhopal. II folg. Spp.: *dymas* p. 679 pl. CVIII Fig. 13, 14. — *anomalus* p. 679 tab. cit. Fig. 17, 18. *faustus* p. 680 tab. cit. Fig. 19, 20. — *alexon* p. 681. tab. cit. Fig. 23–26. — *cyno* p. 681 tab. cit. Fig. 27–30.

Neu: *hepburni* p. 679 pl. CVIII Fig. 15, 16 (Mexico). — *phlegias* p. 680 Fig. 21, 22 (Honduras). — *nortbrundii* **Weeks**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. XXVII p. 359 (Bolivia).

ismeria n. *aberr. nigra*. **Cary**, **Merritt**, Canad. Entom. vol. 33 No. 11 p. 305–311 (Sioux County, Nebraska).

Polygona c-aureum L. zu *Wei-Hai-Wei*. **Fletcher**, The Entomologist, vol. 34 p. 255.

Precis. Revision der Gatt. **Butler** (9). Die Unterscheidung der Trocken- u. Regenzeit ist nach B. nicht schwer, die Zwischenform macht mehr Bedenken. Bei den afrikan. Arten ist die Regenform konstant kleiner als die Trockenform, bei den orientalischen ist es umgekehrt. — Die Trockenform d. Gatt. hat stärkere Sichelform der Vfogl. u. stärker ausgeprägte Blattform der

Unterseite als die Regenform; bei vielen sind die Ocellen bei d. Trockenform auf blosse Punkte reduziert (wie bei den Satyrinae). — Die Auffassung der Formen als Sp. oder Subsp. überlässt B. dem Belieben der Forscher. — w. = wet-, i. w. = intermediate wet-, i. dr. = interm. dry- und dr. = dry-Phase).

1. *villida* (Fabr.) p. 197 w.: Gilbert, *Ellice* (wetest Form) a. *Navigator* Isl. u. *Viti Levu*. — i. w.: *Aneiteum*, *Vaté*, *Ovalau*, *Mango*, *New Ireland*, *New Guinea*; *Tasmania*, *Port Darwin*. — i. dr.: *Java*, *Christmas Isl.*, *Roebuck-Bay*, *Sydney*, *Moreton Bay*, *Champion Bay*, *Toowoomba*, *Port Darwin*. — dr.: *Condillac Isl.*, near *Lord Howe's Island*, *Tasmania* (driest form), *Queensland*. — 2. *vestina* (Feld.) (frisch einer *Vanessa urticae* sehr ähnlich) p. 197—198 (*Bolivia*, *Ecuador*; *Peru*). — 3. *Hübneri* Kirby (merkl. versch. v. *lavinia* Cram., letzt. vielleicht nur eine selt. Var. ders.) p. 198 (*Rio Janeiro*, *Pará*). — 4. *occidentalis* (Feld.) (ob var. von *Hübneri*?) p. 198 (*Pará*, *Buenos Aires*). — 5. *hilaris* (Feld.) p. 198 (*Paraguay*). — 6. *lavinia* (Cram.) Syn. p. 198 (*Surinam*, *Rio Negro*). — 7. *evarete* (Cram.) (Bemerk. zu den verschied. synon. Formen) p. 199 (W.-Ind., *Centr.-Am.*, *Bogota*). — 8. *constricta* (Feld.) p. 199 (*Bogota*). — 9. *fuscescens* n. sp. (allg. Aussehen von *evarete*) p. 199 (*Porvenir*, *Ecuador* u. *Quito*). — 10. *infuscata* (Feld.) (Beschr. der dry-s.-Form) p. 199—200. — 11. *caenia* (Hübner.) (nicht schwer von *evarete* zu unterscheiden) p. 200 (w.: *Texas*, *Bermudas*; i.: *Californ.*; d.: *Calif.*, *Bermudas*).

Die Spp. der folg. Gruppe sind oft mit einander verwechselt worden: 12. *orithya* L. p. 200—201 (W. u. N. *China*, *Foo Chow*, *Hong-Kong*, *Hainan*, *Formosa*, *Madjico Sima*, *Loo-Choo*). Charakt. u. Untersch. der chinesischen Stücke von den indischen. — 12. *Royeri* (Voll.) p. 201 (*Saparea Isl.* u. *New Guinea*). — 14. *ocyale* (Hübner.) p. 201 (*Java*, *Celebes*). — 15. *Wallacei* (Dist.) p. 201 (*Malacca*, *Sarawak*, vielleicht gehört auch die *Philipp.* Form hierher). — 16. *albicincta* (Butl.) p. 202 (N. *Austral.*, *Baudinn*, *Damma*, *Semao Isl.*). — 17. *Swinhoei* (Butl.) p. 202 (*Indien*, *Burma*). — 18. *here* (Lang) (*Bagdad*, *Aden*). Untersch. v. vor. — 19. *boopsis* (Trim.) p. 202 (*East Afr.* von N. bis S.). — 20. *clelia* (Cram.) p. 202—203 (*Afr.* u. *Aden*). Bemerk. zur Untersch. der Saisonformen. — 21. *epiclelia* (Boisd.) (Inselform von *clelia*) p. 203 (*Madagascar*). — 22. *aenone* L. (Untersch. d. Saisonformen) p. 203 (*China*, *Burma*, *Pegu*, *Mergui*, *Andamans*, *Nicobars*, *Ceylon*, ganz *Indien*). — 23. *crebrene* (Trim.) p. 203 (ganz *Afr.*, *Aden*). — 24. *paris* (Trim.) p. 204 (*Madag.*). — *Westermanni* (Westw.) (Untersch. d. Saisonform.) p. 204 (W. u. O. *Afr.*). — 26. *sophiae* (Fabr.) p. 204 (ganz *W. Afr.*; d.-form ist anscheinend selten, sieht aus wie eine winzige *Panopea lucretia*). — 27. *infracta* (Butl.) p. 204—205 (O. u. O.-*Centr.-Afr.*). — 28. *hadrope* (Westw. u. *Hew.*) p. 205 (W. *Afr.*). — 29. *octavia* (Cram.) p. 205 (W. u. N. *Afr.* bis *Albert Nyanza* u. *Somaliland* im Osten. — Reihe von Uebergangsformen von wettest- zu driest-Formen). — 30. *sesamus* Trim. p. 205 (S. u. O. *Afr.*). — 31. *antilope* (Feisth.) Syn. (*antilope* die d., *simia* = *micromera* die wet-Phase) p. 206. — 32. *cuama* (Hew.) (*cuama* die d., *Trimeni* die w.-Phase) p. 206 (*Ost-Afr.*, südl. bis *Mashonaland*). — 33. *ceryne* (Boisd.) p. 206 (S. u. O.-*Afr.*). — 34. *pelarga* (F.) Syn. Bemerk. zu den Saisonformen,

p 206—207 (W. u. Aequat.-Afr.). — 35. actia Dist. Bemerk. hierzu, p. 207 (Ost-Afr.).

Hieran schliesst sich eine weitere Gruppe, deren Oberseite einförmig in allen Saisonformen ist und deren Unterseite stets mehr oder weniger blattähnlichen Charakter trägt.

36. sinuata Plötz (= pelargoides Aur. = serena Weym.) p. 207—8 (W. Afr.). — 37. milonia Feld. (= kowara Ward = var.? Junonia rauana Gr.-Sm. 1898) p. 208 (W. u. O. Afr.). — 38. aurorina (Butl.) (steht P. tugela sehr nahe, deren w.-Form sie sein könnte; das Brit. Mus. besitzt jedoch alle Formen) p. 208 (Ostaf. von Natal bis Mumisu, Brit. E. Afr.). — 39. tugela Trim. p. 208—209 (Natal bis Nyasaland). — 40. pyriformis Butl. Beschr. d. Saisonf. p. 209 (O. Afr.). — 41. eurodoce (Westw.) Saisonformen, p. 209 (Madagascar). — 42. coelestina Dew. p. 209—210 (Northern road to Uganda). — 43. archesia (Cram.) in Brit. Mus. in 7 Stufen vertreten. (extrem. w.: pelagis — unben. — chapunga — semitypica — archesia — und extr.-d.: Staudingeri — Aurivillius hat übersehen, dass die nahe verw. limnoria eine ähnl. Variation zeigt) p. 210 (S. Afr., nordwärts bis zum Victoria-Nyanza). — 44. limnoria (Klug) im Brit. Mus. 6 Stufen (extr. w.: guruana — unben. — unben. — limnoria — taveta — extr. d.: naib). — 45. andremlaja (Boisd.) p. 210, extr. w.: andremlaja — musa, Galami — extr. d.: Boisduvali (Madagascar). — 46. terea (Drury) d.-form. wohl selten (W. u. Aequat. Afr.). — 47. tereoides n. sp. (terea nahe) p. 211 (Brit. E. Afr. bis Arusa Galla Country). — 48. elgiva (Hew.) (hat ausgeprägtere Trockenzeitform) (südl. bis Brit. O. Afr.). — 49. Goudotii (Boisd.) p. 211 (Madagasc.). 50. Gregorii (Butl.) p. 211 (Br. O. Afr.). — 51. stygia Aur. (die extr. d. ist wohl sehr selten) p. 211—212 (W. Afr.). — natalica Feld. p. 212 (S.-, O.-, C.-Afr.); i. = hecate. — 53. chorimene (Guér.) p. 212 (W. Afr.), d. = orthosia. — 54. iphita (Cram.) p. 212 (Ind., Ceylon, Mergui, Pegu, Burma, China, Malacca, Borneo). — 55. intermedia Feld. (nach B. nicht gleich iphita) p. 212 (Celebes). — 56. ida (Cram.) p. 212 (Java, Ceylon, Bombay, Nepaul). — 57. adelaida Staud. (w.-form wie ida; die typ. ad. wohl eine i.) p. 213 (Borneo, Philipp.). — 58. hedonia L. (i. wohl = hellanis, d. = ?) p. 213 (Celeb., Ternate, Mysol, Ceram, Amboina, Ké, Dobbo, Aru, New Guinea, Trobriand, New Britain, New Ireland, Salomon Isl.). — 59. zelima (F.) (austral. Vertreter der hedonia) p. 213 (Austral., Queensl.). — 60. atlites (Joh.) Charakt. d. d.-Form p. 213 (Ostind., Ceylon, Nicobaren, Andamanen, Burma, Malacca, Java, Nias, Sumatra, Borneo, Philipp.). — 61. antigone (Feld.) p. 213—214 (Aru u. New Guinea); Misk's Beschr. ist nicht schlecht. — 62. expansa Butl. p. 214 (Ké, Damma, Timor Laut). — 63. erigone (Cram.). Bemerk. zu den Formen, p. 214 (Java). — 63a. Walkeri (Lokalf. von erigone, ist eine der Stufen, die von expansa zu erigone führt) p. 214 ♂♀ (Semaol Isl.). — 63b. celebensis (Lokalf. v. erigone) p. 214 (Celebes). — 64. lemonias (L.) p. 214 (Indien, Burma, China, Formosa, Philipp., Lankowi, Penang, Malacca. — d. nur leicht gezeichnet u. Unterseite rosig). — 64. timorensis (Wall.) p. 214 (Timor, Sumba); w.: valesca nach Fruhst. — 66. iona (Gr.-Sm.) p. 215 (Neu-Guinea). — 67. rhadama (Boisd.) p. 215 (Madagascar, Mauritius, Rodriguez, Johanna). — 68. touhilimasa (Vieillot) Bemerk. zu sein. Zeichn. (1895) p. 215 (Fwambo und zw. Tanganyika und Nyasa). —

69. *artaxia* (Hew.) d.: *artaxia*; w.: *Nachtigalli*, p. 215 (Mashonaland, Portugese E. Afr., Nyasa, Fwambo). — 70. *almana* L. (w.: *asterie*, d.: *almana*) Syn. u. Bemerk. zu den einzeln. Formen p. 215—216 (Ind., Ceylon, Andamans, Mergui, Pegu, Burma, Siam, Malacca, Penang, Sum., Java, Philipp., Formosa, China, Celebes).
- archesia* Cram. Bemerk. zu den von Zomba erbeuteten Stücken (theils schmale Binde); auch var. *aestiv. pelasgis* Godt., ab. *chapunga* Hew. wurde erbeutet. **Lathy**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 23. — var. *pelasgis* God. var. *striata* n. (besond. Benennung, weil diese Lokal(?) - Form so verschieden ist. Die Abweichung besteht darin, dass das dunkle Saumfeld beider Flgl. oben u. unten m. 2 Reihen von blauen Strichen geziert ist u. dass die helle Mittelbinde unten zum grössten Theil hell rothgelb u. nur nach innen weisslich ist). **Aurivillius**, Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 117—118 (M'Boko am unteren Congogebiet).
- natalensis* Stgr. Grosse Serie von Zomba, Centr.-Afr. einschliesslich var. *hib. sesamus* Trim. u. der von Trimen in S. Afr., Butt., t. 4 f. 4 abgebild. Zwischenform. **Lathy**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 23. — *simia* Wall. ist die wet season form von *P. antilope* u. nicht die w.-s.-f. von *cuama* Hewits., wie Marshall vor etlichen Jahren wollte u. *trimenii* als Zwischenform betrachtete. **Butler, A. G.** The Entomologist, vol. 34 p. 7. — *trimenii* ist die wet-season Form von *cuama*. — *simia* = *antilope* hat ein mehr nördlicheres Vorkommen als *trimenii* = *cuama*. — *taveta* Rogenh. (Somaliland, bei Laskarato, 3000'). **Sharpe**, The Entomologist, vol. 34 Suppl. p. 3.
- Prepona aelia* **Godman**, Biol. Centr.-Amer. Rhop. II p. 694 pl. CIX Fig. 3. — *brookiana* p. 695 Fig. 4, 5.
- Prothoe francki* *subsp. vilma* n. **Fruhstorfer**, Deutsch. Entom. Zeitschr. lep. Hft. 14. Bd. p. 340. — *francki* *subsp. Nausikaa* n. **Fruhstorfer**, Soc. Entom. vol. XVI p. 98.
- Pseudergolis wedah* nebst Raupe und Puppe. **Moore**, Lep. ind. vol. IV p. 41 pl. 389.
- Pyrameis atalanta* L. überwinternde Stücke im Kreis Berent. **Treichel** p. 166. — in N. W. America. **Dod**, Canad. Entom. vol. 33 p. 237. — Varietäten u. Aberrationen: mit blassem Saume auf einem Hflügel. The Entomologist, vol. 34 p. 62. — Besch. u. Abb. einer Aberr. in Ann. Soc. Linn. 1868. Bei dieser sind die sonst leuchtend roth gefärbten Binden auf beiden Flgl.-Paaren hellroth u. durchsichtig. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. 31. Mai (p. 19). Gegenstücke aus Paraguay 2 *Heliconius phyllis* mit gleichfalls transparenten Binden (p. 19). — ab. *Klemensiewiczzi* Schille (cf. Bericht f. 1900 p. 733 ist von Frings nicht bei einer Temperatur von + 6° C., sondern Kälteeinwirkung unter 0° C. (Frostexperiment) erzogen. **Stichel**, Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. p. 21. — Bemerk. u. Bericht. zu sein. Artikel im 45. Bd.: *atal.* ab. *klymene* Fischer wird in Kreisen der Züchter der Temperatur-Aberrationen als Synonym zu ab. *Klemensiewiczzi* Schille gezogen. Streng rechtlich ist dies nicht, da beim Vergleich der Abbild. doch auffällige Verschiedenheiten sind. Beide gehören ders. Entwicklungsrichtung an. *Klem.* ist eine Vorstufe zur *Extrem*-Form *klymene*. **Stichel** ist selbst nicht

für diese Benennungsmethode. p. 21—22. — atal. ab. parisiensis Girard Besch. Benennung an sich werthlos, kann aber bei den Versuchen der „Zwangserziehung“ gelegentlich wieder auftreten p. 22; unsymetr. gebild. Admiral (ob bilateral hermaphroditisch?) p. 22.

- Eine durch Frosteinwirkung erhaltene Aberr., die wohl an ab. klymene Fisch. anzuschliessen ist: Vrandfleck der Vflgl. reducirt, Prachtbinde breit gestreckt, in d. Randbinde d. Hflgl. fehlen die Punkte, oberhalb ders. beiderseits ein weisses Pünktchen. Unten an Stelle des Costalflecks lange blaue Wische auf d. Vflgl., die Hflgl. Useite eintöniger, wengleich nicht zeichnungslos. **Thurau**, Sitz.-Ber. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. 18. Okt. (p. 26). — Teratologische Stücke: 1 ♂, divers. ♀. **Hampson**, Entom. Monthly Mag. (2). vol. 12 (37.) p. 119.
- cardui** L. Weite Verbreit. in 4 Welttheilen u. Unveränderlichkeit, daher sehr alter Typus. So denkt Stichel nach von Mitis. Thieme hebt dagegen die bestehende Wanderlust u. grosse Flugkraft dieses Falters hervor. Wanderzüge. Aendert doch, die innerasiatischen Stücke sehen anders aus als die unsrigen. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900 19. Apr. (p. 16—17). — **Wolley**.
- (Somaliland: Laskarato). The Entomologist, vol. 34 Suppl. p. 2.
- zu Wei-Hai-Wei. **Fletcher**, The Entomologist, vol. 34 p. 255. callirrhoe Fb. (= indica Herbst) desgl. p. 255.
- virginiensis** Drury. Fundorte nebst Bemerk. **Therese von Bayern**, p. 256. — *carye* Hb. desgl. p. 257.
- siehe ferner unter *Vanessa*.

Siderone vulcanus Feld. Fundorte nebst Bemerk. **Therese von Bayern**, p. 264.

Tanaecia u. **Nora**. Bemerk. über die Gatt.: **Butler**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 356—358. — Beschrieb. sind bis jetzt 21 Sp., nämlich:

1. von der *Pelea*-Gruppe: *T. pelea*, *palguna* Moore, *stygiaria* Fruhst. u. *pulasara* (supercilia ein Synon. dazu u. Robertsii, eine blässere Var.), *heliophila* Fruhst. — 2. von der *Vikrama*-Gruppe: *T. Vordermanni* Feld., *vikrama* Feld. u. *violaria* Butl. — 3. von der *Apsarasa*-Gruppe: *T. munda* Fruhst., *apsarasa* Vollenh. u. *martigena* Weymer. — 4. von der *Nicévillei*-Gruppe: *T. phintia* Weymer, *clathrata* Vollenh., *caerulescens* Gr.-Smith, *Nicévillei* Dist. — 5. von der *Valmikiis*-Gruppe: *orphne* Butl., *consanguinea* Dist. (*T. orphne* nahe verw.), *lutala* Moore, *valmikiis* Felder, *varuna* Vollenh. (*pardalis* wohl das ♂ dazu), *aruna* Feld., *sakii* de Nicév. — 6. von der *Palawana*-Gruppe: *palawana* Staud.

Dazu kommen hinzu als neu:

ampla (*palguna* nahe) p. 359 ♀ (Philippine Island). — *producta* (*pulasara* nahest.) p. 360 ♀ (Philippine Island). — *Crowleyi* (*pulasara* nahest.) p. 360 ♀ (Nord Borneo). — *superba* (allgem. Zeichnung der *pelea*-Gruppe) p. 360—361 ♂ ♀ (Sumatra). — *Fruhstorfferi* (verw. mit *munda*) p. 361 ♂ ♀ (Borneo, wahrsch. zu Labuan gesammelt). — *evanescens* (verw. mit *munda*) p. 361—362 ♂ (Labuan). — *Watsoni* (*apsarasa* nahe verw.) p. 362 ♂ ♀ (Sumatra u. N. E. Sum.). — *albifasciata* (verw. mit *martigena*) (vielleicht nur eine Form von *Fruhstorfferi*) p. 362—363 ♂ (Borneo). — *subochrea* (Form u. allgem. Zeichn. wie *T. lutala*; steht *consanguinea* am nächsten, hat aber Gestalt u. Palpen von *T. lutala*)

p. 363 ♂ ♀ (Sarawak). — *margarita* (Form. u. Zeichn. oben u. unten wie vorig., doch Grundfarbe oben wie *T. lutala*) p. 363—364 ♂ ♀ (Sarawak, Borneo). — *Dohertyi* (verw. mit *T. aruna*, ♂ ähnelt mehr *valmiki* in der Form) p. 364 ♂ ♀, hierzu var. ♂ p. 364 (Sula Archipelago).

Synchlœ eumeda. Charakt. u. Abb. **Godman**, Biol. Centr.-Amer. Rhop. II p. 672 pl. CVIII Fig. 1, 2. — *dryope* p. 672 Fig. 3, 4. — *endeis* p. 672 Fig. 5, 6. — *hylaëus* p. 672 Fig. 7, 8.

Teracolus spp. in Somaliland: *calais* (Cram.), *phisadia* (Godt.), *castalis* (Stdgr.), *chrysonome* (Klug), *leo* Butl., *heliocaustus* Butl., *protomedia* (Klug), *eupompe* Klug, *daira* (Klug), *xanthus* Swinh., *casta* Gerst., *phillippsi* Butl. **Sharpe**, The Entomologist, Suppl. vol. 34 p. 4—6.

Terias hapale Mab. in Somaliland: *Biji*. **Sharpe**, The Entomologist, vol. 34 Suppl. p. 6.

Terinos robertsia *subsp. niasica* n. **Fruhstorfer**, Societ. entom. vol. XVI p. 99. — *terpander* *subsp. natuensis* n. t. c. p. 114.

Vanessidae werden gewöhnl. für so allgemein verbreitet betrachtet, dass nur wenige Sammler auf präzise Fundorte usw. achten. Mehr Beachtung hinsichtlich der Verbreitung usw. wäre sehr erwünscht. **Adkin** (9). — Neigung auf Abends zum Lichte zu fliegen. **Fletcher, T. B.** The Entomologist, vol. 34 p. 54. — Vorkommen in Grossbritannien in 1900: **Adkin** (9). — **Colthrup, C. W.**, The Entomologist, vol. 34. Febr. p. 57. — dito **Marshall, A.**, t. c. p. 57—58. — dito **Vinall, Hugh, J.**, t. c. p. 58. — in 1900. **Mathew, Gervase, F.**, t. c. March p. 100. — **Campbell-Taylor, J. E.** t. c. May, p. 159—160. — Hibernation of. **Sladen, C. A.**, t. c. Nov. p. 316.

Vanessa. Temperaturexperimente. **Fischer** (1). Abb. auf p. 305. *Van. antiopa* L. normal Fig. 1. — var. *artemis* Fschr. Fig. 2 (Kälte + 1° C.) — var. *artemis* Fschr. Fig. 3. Wärme + 40° C. — Beitrag zu einer Monographie der Gatt. **Cannaviello**. — *Van. antiopa* in Shetland. **King, J. F. X.**, t. c. p. 226—227. — in Middlesex. **Goss, H.**, t. c. p. 256. — at Eltham. **Jones, A. H.**, t. c. p. 257. — near Maidstone. **Walker, A. O.**, t. c. p. 257. — in Surrey, 1900. **Seth-Smith, L. M.**, The Entomologist, vol. 34 Febr. p. 57. — in South-East London. **Browne, George, B.** t. c. Sept. p. 254. — in Bucks., **Smith, Geoffrey**, t. c. Okt. p. 293. — in Essex. **Frohawk, F. W.** t. c. p. 293. — in Sussex. **Frohawk, F. W.** p. 293. — in Hampshire. **Crallan, G. E. J.** p. 316. — in Devonshire. **Phillips, W. J., Leigh** p. 316. — at Epsom p. 316. — in the North of London. **Podmore, A.** p. 316. — in Huntingdonshire. **Theobald, W. G.** t. c. Dec. p. 352. — at Woking. **Saunders, Edw.** Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 100. — in the Isle of Wight. **Goss, H.** Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 171.

— Raupen sehr nervös. **Metzenauer**, Insektenbörse, 18. Jhg. p. 227.

— *atalanta* Kilbun. **Walker, F. A.** The Entomologist, vol. 34. Jan. p. 22. — in Scotland t. c. p. 22. — **Rainbow, M.**, t. c. May p. 160.

— Puppen leicht verletzt. In Folge davon Farbe der Flgl. durch den Saft theils abgebeizt, theils membran durchlöchert, besonders am Rand. Sonst keine Abweichungen. 27. Sept. (p. 23). — Abb. von Variationen siehe **Fischer**.

— *C. album* in Ireland. **Johnson, W. F.** The Irish Naturalist, vol. 11. Jan. p. 23. — The Entomologist, vol. 34. Jan. p. 18—19.

- *cardui* am Weinstock schädlich. R. Stat. di Entom. agrar. di Firenze Ser. I Hft. 3. Insektenbörse 18. Jhg. p. 101. — Wanderungen in Ungarn. von **Abaff-Aigner** (17).
- (*Cynthia*) *cardui* in Salop. **Thornewill, Chas. F.** The Entomologist, vol. 34 Jan. p. 20. — Bemerk. **Jeffrey, T. B.** t. c. p. 290—291. — *cardui*. Stück von Campitello mit intensiv rother Färbung. **Stertz**, Zeitschr. f. Entom. Breslau, 1900 p. XIV.
- davus* var. *Rothliebi* at Delamare. **Crabtree**, The Entomologist, vol. 34 Oct. p. 287—288.
- egea* Ende Juli bei Hildesheim gesehen. Das Vorkommen dieser mehr südl. Form sehr interessant. — cf. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 261.
- io* Raupen 1901 zahlreich — bei Leipzig auf *Symphytum officinale* gefunden. Berlin. Entom. Zeitschr. Sitz.-Ber. f. 1900 2. Aug. (p. 21).
- io* L. in Ireland. **Johnson, W. F.**, Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 12 (37) Oct. p. 257. — in S. Devon. **Eaton, A. E.**, p. 171. — Bemerk. **Jeffrey, T. B.**, t. c. p. 290—291. — Abundance of *Vanessa io* in 1901. **Cuthberth, H. G.**, The Irish Naturalist, vol. 10 No. 10 p. 203. — in Ulster. **Johnson, W. F.**, The Irish Naturalist, vol. 11 Jan. p. 23. — in Co. Sligo. **Starkey**. — near Londonderry. **Ward**.
- in the West. **Grierson, P. H.**, t. c. vol. 10 No. 3 p. 72.
- Peacock Butterfly (*Vanessa io*) near Derry. **Hart, W. E.**, t. c. No. 7 p. 145.
- Anzahl von Stücken aus einem Gelege, die sämmtlich in d. Mitte der Vflgl. einen schwarzen Punkt tragen; auffallende Erscheinung, da Varr. der Art sehr selten. Nach **Rey**, ein phylogenet. Rückweis, da der schwarze Fleck genau an ders. Stelle ist, wo verw. *Vanessen* solchen besitzen. Berlin. Entom. Zeitschr. 47. Bd. Sitz.-Ber. f. 1901 3. Jan. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 61.
- Geographische Verbreitung der Aberrationen. **Adams, C. C.** — procentuales Auftreten der Varietäten. **Fischer** (3).
- *ab. pavo n.* (ohne Einwirkung von Zwangsmitteln gewonnen. — Der Saum aller Flgl. ist zuerst schmal stahlblau, dann kupferfarben schillernd. Die etwas länglichen, ziemlich kleinen Ocellen d. Hflgl. irisiren bei gewisser Beleuchtung über u. über metallisch blau, ebenso der grosse schwarze Costalfleck der Vflgl.). **Stichel**, Berlin. Entom. Zeitschr. 47. Bd. Sitz.-Ber. f. 1901 5. Sept. — cf. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 309. — In drei Stücken aus Böhmen. — Ein viertes Stück bildet den Uebergang zur normal. Form mit der Einschränkung, dass der Saum der Flgl. schwächer, der Costalfleck garnicht irisirt.
- mit Einbuchtung am Aussenrand d. Vflgl. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900 4. Jan. (p. 2).
- L. Einfluss der verschied. Strahlen des Spectrums auf Puppe u. Falter. 7. Einfluss auf die Zeit der Entw. u. Grösse der Falter. **Kathariner**. — Nach Standfuss anscheinend eine Beschleunigung des Wachstums der Raupe u. Entw. d. Puppe im violetten Licht. Nach K. erschienen die Puppen u. Schmetterlinge folg.

urticae	roth.	Tagesl.	Chininlös.	gelb.	dunkel	blau
Puppen	5. VI.	6. VI.	6. VI.	6. VI.	7. VI.	7. VI.
Falter	16. VI.	16. VI.	16. VI.	17. VI.	19. VI.	17. VI.
Faltergrösse	25,7	26,3	25,3	26,1	26,1	26,5

bei io in dieser Beziehung nichts Positives, an dems. Tage erschienen Puppen u. späterhin Falter in allen Gruppen.

Grösse: 2 Versuchsreihen.

Versuchsreihe	roth	gelb	blau
1	30,8	29,9	29,6
2	30,4	30,0	29,6

Nach K. auf die Grössendifferenz kein Werth zu legen.

levana L. ein einziges, sehr kleines ♀ auf einer Waldwiese bei Alt Paleschken, ebenda 2 Stücke der Sommergeneration prorsa L. **Treichel**, p. 165. — lev. var. prorsa L. 1901 bei Berlin nicht selten. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 221.

polychloros in 1900. **Webb, Sydney**. The Entomologist, vol. 34 Febr. p. 57. — **Annett, H. E.** t. c. May p. 160. — Note on. Fundorte betreff. **Chapman**. t. c. June p. 180. — Note on etc., sehr häufig in der Nähe von Dorking. **Oldaker, F. A.** t. c. p. 180. — at Witherslack. **Forsythe, C. H.** t. c. Sept. p. 253. — at Lee. **Carr, F. M. B.** t. c. p. 253. — in London. **Chittenden, D.** t. c. Nov. p. 316. Aus Sitz. Berl. Entom. Ges. 47. Bd. vom 20. Mai 1900. — in December. **Buxton, C. S.** The Zoologist (4.) vol. 5 Jan. p. 32. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 173. — mit sehr blasser Grundfärbung. The Entomologist, vol. 34 p. 60.

urticae. **Marshall, A.** The Entomologist, vol. 34 Febr. p. 57. — bei Dorking häufig. **Oldaker, F. A.** t. c. June p. 180. — in S. Devon. **Eaton, A. E.** Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 171.

— Note on and from of Van. urt. **Imms, A. D.** Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 12 (37) June p. 148—149.

— Resting of. **Watts, Ch. W.** Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 12 (37) p. 275.

— Stück bei Birmingham gefangen, das anscheinend eine Zwischenform zwisch. der konstant. nördl. Form polaris u. der Type darstellt. **Imms**, Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 12 (37) p. 148—149.

— Im April bei Hildesheim gefangen, bei dem die rothe Farbe der Flgl.-Oseite durch reines Knochenweiss ersetzt war. Im Fluge daher einer Thais-Art gleichend. Sitz.-Ber. des Ver. f. Schmett.-Freunde in Hildesheim, 20. Mai. — cf. **Heckel**. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 173.

— L. Ueber einige künstl. Variationen ders. **Cholodkovsky, N.** nebst Litteraturangaben. Aufzucht unter sorgfältig chemisch zubereiteten gefärbten Gläsern (Ueberzug mit gefärbter Gelatine u. zwar roth durch Safranin, blau durch Himmelblau, gelb durch Aurantia). Auch unter

gewöhnl. Licht (Ausschluss der ultravioletten Strahlen durch Chininsulphat). Die Resultate boten nicht viel Ueberraschendes, nur 1 Form unter Gelb u. 2 unter Blau waren sehr interessant. Abb. ders. auf Taf. VI.

- L. Einfluss der verschied. Strahlen des Spectrums auf Puppe u. Falter. 7. Einfluss auf die Zeit der Entwicklung. **Kathariner** siehe Van. io L.
- ab. *ichnusoides* de Selys durch Kälteeinwirkung entstand. Stück. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900 11. Jan. (p. 3).
- ab. *pusilla* n. (viel kleiner als gewöhnl., die Saumbinde dunkel rostgelb; gezogen). **Strand**. Schrift. naturf. Ges. in Danzig N. F. 10. Bd. 2./3. Hft. p. 285.
- xanthomela *subsp. japonicas* n. (von der Stammform durch beträchtlichere Durchschnittsgrösse u. gesättigtere Färbung verschieden. — Japan). Beschr. **Stichel**. Berlin. Entom. Zeitschr. 47. Bd. Sitz.-Ber. f. 1901. 14. Febr. — cf. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 100. — Ein Stück zeigt die Charaktere in prägnanter Weise nur auf einer Seite. — ab. *chelys* von **Mitis**.

Victorina epaphus Latr. Fundorte nebst Bemerk. **Therese von Bayern** p. 258

Brassolidae, Morphidae, Discophoridae.

Brassolis. 1. *astyra* Godt. **Stichel**, Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. p. 519 (Brasil.). — 2. *sophorae* (L.) p. 519 mit α) *soph. sophorae* (L.) p. 520 (Guiana, Brasil.). — β) *soph. subsp. luridus* n. p. 520 ♂ (Columbien). — γ) *soph. vulpeculus* n. p. 520 ♂ (Paraguay: Novo Germania). — 3. *haenschi* (abges. von Gestalt u. Färb. d. Vflgl.-Binde durch die Lage der Hflgl.-Binde spezif. von *B. sophorae* L. versch.) p. 520—521 ♂ (Santa Inez, Ecuador, östl. d. Anden, 1250 m). — 4. *isthmia* Bates p. 521 (Centr.-Amer., Columb.). — *granadensis* n. sp. p. 520—521 ♂♀ Fig. 4 (Columb. — Ecuador).

Die von Kirby im Syn. Cat. Diurn. Lep. macrosiris Doubl.-Hew. und *B. strix* Bates gehören zu *Dynastor* Westw.

Caligo. Bezügl. dieser Gatt. u. *Opsiphanes* nähert sich die Thatsache d. Nachtfliegens der Behauptung Prehn's, doch fliegen sie buchstäblich auch nicht des Nachts. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900 18. Jan. (p. 4). — *ilioneus* Cram. Fundorte nebst Bemerk. **Therese von Bayern** p. 265.

Catoblepia n. g. (für die *xanthus*-Gruppe der Gatt. *Opsiphanes* Wstw.) *dohrni* (O. *xanthus* L. nahe, hat aber breitere, am Apex weniger ausgezog. Vflgl. Hflgl. braunviolett, namentlich bei schräger Beleuchtung schön violett schillernd) **Stichel**, op. cit. Sitz.-Ber. f. 1901 14. Nov. — Insektenbörse 18. Jhg. p. 413 (Ecuador). — *versitincta* (m. *xanthus* verw., das ♂ hat eine schrägliegende, wie ein stumpfes Dreieck gestaltete Binde auf d. Vflgl. und ist sonst dunkler. Das dem ♂ ähnl. ♀ hat eine hellere, blauviolett schillernde Grundfarbe) p. 413 (Cayenne, Surinam).

Discophora amethystina n. **Stichel**, Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900 p. 4 (Borneo). — *necho subsp. propinqua* n. p. 5. — *celinde* var.

- perakensis* n. **Stichel**, t. c. p. 21. — indica. Raupe u. Puppe. **de Nicéville**, Journ. Asiat. Soc. Bengal vol. LXIX p. 220. — Charakt. von:
- amethystina* (steht dem ♂ der *D. simplex* Stgr. nahe; Vflgl. m. zusammenh. Binde. Diese ist aber ausgedehnter u. breiter, sowie von ganz ander. Farbenton als bei simpl. Die Farbe ders. erinnert an das herrliche Blau der *Zeuxidien*. Useite in d. Zeichn. derj. von *simplex* ähnl., besitzt aber einen eigentüml. bläulich kupferrot schillernden Ton). **Stichel**, Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900 (p. 4) ♂ (Nord-Borneo, Brunei). — *celinde* Stoll. var. *continentalis* Stdgr. ♂-Stücke aus Sikkim fast heller u. grösser als typisch. *celinde*-♂. Ob Nordindische Zeitform? (p. 4-5). — *necho* *subsp. propingua* n. (p. 5) für die Nias-Form. Weitere Bemerk. siehe im Original-Bericht.
- subsp. fruhstorferi* n. (von der Stammform des *de Nicév.* aus Ober-Burma dadurch unterschieden, dass die orangefarbene Binde d. Vflgl. bedeutend verschmälert und nur bis zur 3. Medianader zusammenhängend ist etc.) **Stichel**, Berlin. Entom. Zeitschr. 47. Bd. Sitz.-Ber. f. 1901, 12. Sept.; auch Insektenbörse 18. Jhg. p. 317 (Central-Tonkin: Chiem-Hoa). — *lepida* *subsp. significans* n. (von der Stammform zu unterscheiden, dass die 3 zusammenhanglosen unter der Subcostale beginnenden bläulichen Flecke vergrössert u. zu einer Binde zusammengeflossen sind, die bis zur Mediana 2 reicht etc.) p. 317 ♂ (2 Stücke von Karwan an der Ostküste v. Brit. Indien).
- perakensis* (*celinde* Stoll nahe) **Stichel**, Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900, 5. Juli (p. 21) (Malacca, Perak, Kwala Kangsar).
- Eryphanis lycomedon* Feld. (= *E. wardi* Bsd.) und *opimus* Stgr. Fundorte. **Therese von Bayern** p. 265.
- Morphiden fliegen an sonnigen Tagen des Morgens bis zum heissesten Mittag bei so intensiver Glut, dass den europ. Sammlern durch die Einwirkung d. Hitze die Haut des Rückens abgeschält wurde. **Stichel**, Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900, 18. Jan. (p. 3) — Entgegen der von Prehn in Krancher's Jahrb. f. 1900 p. 169 geäusserten Ansicht. Auch Hahnel erwähnt Angaben im gleichen Sinne (p. 3-4).
- Morpho. Bemerk. dazu (Notes on the Genus *M.*). **Rowley**, Trans. Leicester Soc. 1901 p. 75-87.
- sulkowsky* Koll. (= *M. ganymedes* Westw. u. *peleides* Koll.). Fundorte nebst Bemerk. **Therese von Bayern** p. 264-265.
- Ooptera Aur. Charakt. der Gatt. **Stichel**, Berl. Entom. Zeitschr. 46. Bd. p. 488-489.
- A. *Aorsa*-Gruppe. Vflgl. hinter dem Apex geeckt, Ast 3 der Subcostalis in d. Vrand, Ast 4 in den Apex auslaufend. — Hflgl. an der vorderen Mediana mit schwanzartig. Zipfel. ♂ mit klein. Haarpinsel im hinteren Theil der Zelle (bei 2), der theilweise in der taschenartig. Falte an der hinteren Mediana ruht oder ohne Haarpinsel in der Zelle (bei 1), alsdann mit büstenartig. Haarbüschel an der Submediana. Unten 2 Ocellen. — Arten: 1. *aorsa* (Godt.) mit *aorsa aorsa* (Godt.) S. Brasil. p. 489 und 2. *O. aorsa subsp. hilara* n. (lebhafter u. dunkler als die erstere etc.) p. 489-490 ♂ (Ecuador, Aguamo, 370 m, östl. der Anden). — 2. *arsippe* m. *a. ars.*

arsippe (Hopff.) S. Peru u. β ars. *subsp. bracteolata* n. (Grundfarbe dunkler als vor.) p. 490 ♂ (Bolivia).

B. Syme-Gruppe. Vflgl. mit abgerundetem Apex, Ast 3 u. 4 der Subcostalis in diesen auslauf. Hflgl. ohne schwanzartig. Fortsatz, unten mit 2 rundl. Ocellen. ♂ mit kleinem, theilweise in der taschenartig. Falte der hint. Mediana verborg. Haarpinsel hinten in der Zelle (bei 4 u. 5) oder ohne solchen (bei 3). — 3. fruhstorferi (Rüber) S. Brasil. p. 490. — 4. sulcius (Stgr.) S. Brasil. p. 490. — 5. syme (Hübner) Brasil. mit α syme syme Rio de Janeiro p. 491 u. β syme *subsp. fumosa* n. (Grundfarbe dunkler als vor.) p. 491 ♂ ♀ (Brasil. Espirito Santo).

C. Staudingeri-Gruppe. Vflgl. mit spitzerem Apex, Hflgl. ohne Schwanzanhänge u. ohne eigentl. Haarpinsel. In der Zelle lang behaart. Hintere Mediana entspringt sehr nahe der Flgl.-Wurzel u. bildet beim ♂ gleich hinter der Zelle eine tiefe, mit grauen mehlartig. Staubschuppen ausgefüllte Tasche. Useite mit 2 Augen. 1 Vertreter: 6. Staudingeri (Godm.-Salv.) p. 491.

— aorsa *subsp. hilaris* n. [cf. antea] (von aorsa Godt. durch sattere Färbung u. völlig einfarb. Hflgl. mit grell weissen Cilien unterschieden). **Stichel**, Berlin. Entom. Zeitschr. 47. Bd. Sitz.-Ber. f. 1901. 14. Nov. — Insektenbürse 18. Jhg. p. 413. — arsippe *subsp. bracteolata* n. [cf. antea] (Opsiphanes adippe Stgr. i. l.? — Anstatt der Binde bei arsippe Hopff. stehen auf den Vflgl. einzelne weitgetrennte Fleckchen) p. 413.

Opsiphanes Westw. Auftheilung der Gatt. **Stichel** (Titel p. 751 Anm. b) zerfällt die Gatt. in 4 engere Gatt. Uebersicht:

1. Praecostalzelle des Hflgls. länger als breit, Palpen struppig behaart
Genus I. Opoptera Aur.

— Praecostalzelle des Hflgls breiter als lang. Palpen glatt 2

2. Vordere u. hintere Ecke der Vflgl.-Zelle etwa in gleichem Abstand von der Wurzel. Vordere u. mittlere Discocellularis scharf rechtwinklig zu einander gestellt.
Genus III. Selenophanes Stgr.

— Zelle des Vflgls. vorn schief abgeschlossen, nicht gewinkelt, vorderes Zellende wesentlich näher zur Wurzel als die weit vorspringende hintere Ecke. Vordere u. mittlere Discocellularis garnicht oder schwach winklig zu einander gestellt. 3

3. Subcostalis u. Costalis durchweg schmal, aber deutlich getrennt, ohne wesentliche Divergenz. Mittlere u. hintere Mediana gestreckt, parallel oder fast parallel verlaufend.
Genus II. Catoblepia n.

— Subcostalis gleich nach dem Beginn merklich in kurzer Krümmung von der Costalis abgewendet, sodann diese in flachem Bogen nach vorn berührend u. theilweise eng an dieselbe angedrängt. Mittlere Radiale mehr oder weniger stark gekrümmt, ziemlich nahe an der unteren entspringend u. mit dieser wesentlich divergirend
Genus IV. Opsiphanes Westw.

Opsiphanes Westw. (sens. strict.). Charakt. **Stichel**, Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. p. 503—504.

A. Batea-Gruppe. Oberseite ocker- bis bleichgelb mit mehr oder weniger breiter schwarzer Einfassung. ♂ Hflgl. oben mit 2 Haarpinseln, je einer im hinteren Teil der Zelle u. an der Submediana, letzterer auf

einer blanken Reibefläche mit 2 Ausnahmen (No. 2 u. 4), diese ohne Pinsel
Abdomen beiderseits mit wulstartigen Duftorganen.

1. *batea* (Hübner) p. 504 (S. Brasil.). — 2. *bassus* Feld. p. 504 (S. Brasil.) mit
 $\alpha\alpha$ ab. *luteipennis* (Btl.) hal.? p. 504. — 3. *didymaon* Feld. p. 504—505
(S. Brasil., Paraguay). — *catharinae* n. sp. (Useite fast wie *didymaon* Feld.,
im allgemeinen etwas hellerer Ton) p. 505 ♂ (Sta. Catharina).

B. *Cassiae*-Gruppe. Oseite einfarbig ockergelb oder dunkelbraun
mit weisser, gelber oder rostrother Binde oder Fleckenbinde. ♂-Hflgl. ohne
Ausnahme mit 2 Haarpinseln, je einer hinten in der Zelle u. an der Sub-
mediana; letzterer auf blanker Reibefläche. ♂-Abdom. jederseits m. wülstig.
Duftfleck u. Reibefleck:

5. *boisduvalii* Dbl. Hew. p. 506 (Centr.-Amer.). — *cassiae* L. Linné's Original-
beschr. etc. Schwierige Deutung. Schliesst sich Aur.'s Deutung an, lehnt
die von Berg ab p. 506—509. Litteratur etc. (scheint mehr auf C. Bras. u.
S. Brasil. beschränkt zu sein). — 7. *tamarindi* Feld. mit α *tam.* *tamarindi*
Feld. p. 510 (Mexico — Ecuador, Venezuela). — $\alpha\alpha$ ab. *spadix* Stich.
(Binde des Vflgl. schmal, teilweise aufgelöst, bräunlich statt weissgelb.
Einzeln unter der Stammform) p. 510. (Balzapamba). — β . *tam.* *bogotanus*
Dist. p. 510 ♂ ♀ (Columbien). — 8. *zelotes* Hew. p. 511 (Columbien). —
9. *quiteria* (Cram.) mit α *quit.* *quiteria* (Cram.) p. 511 (Guiana, Amazonas)
u. β *meridionalis* Stgr. p. 511 (Süd Brasilien, Paraguay). — γ *quit.* *quirinus*
Godm. u. Salv. p. 512 (Guatemala — Panama). — δ *quit.* *subsp. quaestor*
n. p. 512 ♂ Fig. 1 (Ecuador, östl. der Anden, Coca, 260 m). — ϵ *quit.* *subsp.*
bolivianus n. p. 512 ♀ (Bolivien). — 10. *badius* n. sp. (*quiteria* am nächst.,
doch grösser etc.) p. 513 ♂ Taf. IX Fig. 4 (Columbien, Muzo). — *sallei*
Westw.-Hew. p. 513 mit α *sall.* *sallei* Dbl. Hew. (Venezuela, Centr.-Amer.)
— β *sallei subsp. mutatus* n. p. 514 ♂ Fig. 2 (St. Inéz, 1250 m, Ecuador,
östl. der Anden). — 12. *camena* Stgr. p. 514 (Columbien, Cauca). —
13. *invirae* Hübner. mit α *inv.* *invirae* Hbn. p. 514—515 (Guiana, Brasil.,
Columb., Venez. u. Costa Rica). — β *inv.* *subsp. intermedius* n. (sehr grosse
Lokalform) p. 515 ♂ (Amaz. super.). — 14. *cassina* Feld. mit α *cass.* *cassiniae*
Feld. p. 515—516 Fig. 3 ♂ ♀ (Brasil.: Rio Negro sup.) — β *cass.* *fabricii*
Boisd. p. 516—517 ♂ ♀ (Guatemala, Honduras, Columb., Westl. Ecuador).
— γ *cass.* *subsp. aequatorialis* n. p. 515 Taf. IX Fig. 5 (Archidona, 640 m,
Coca, 260 m. Ecuador, östl. d. Anden). — δ *cass.* *subsp. chiriquensis* n. p. 517
— 518 (Chiriqui). — ϵ *cass.* *subsp. merianae* n. p. 518 ♂ ♀ (Nordöstl. S.-
Amer., Antillen?).

Als zweifelhafte Sp. zu erwähnen: *O. lutescentefasciatus* Goeze
p. 519.

- *tamarindi* Feld. Raupe u. Puppe. Beschr. d. R. u. P. Puppenruhe vom
3—29. Juni, nebst Auszug aus diesbez. Mittheil. von Müller in Zool. Ib.
I. Hft. 3/4 1886 p. 593. — cf. Bericht für 1902.
— *Staudingeri*. Charakter. **Godman**, Biol. Centr. Amer. Rhopal. II p. 665
Tafel CVII Fig. 17, 18.

Selenophanes Stgr. Charakt. d. Gatt. **Stichel**, Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd.
46. Bd. p. 499—500.

A. *Cassiope*-Gruppe. ♂-Vflgl. unterseits mit filzigem, erhabenem,
schmallänglichem Duftfleck vor der Submediana. Hflgl. mit dementsprechender

mehliges Reibefläche vor der Subcostalis oder nach oben gerichtetem Haarbüschel nächst der Präcostalzelle (bei 2). Zwischen hinterer u. mittlerer Mediana kein Duftfleck. Ocellen der Hfogl.-Useite sichel- oder nierenförmig.: 1. *cassiope* (Cram.) mit α *cass. cassiope* (Cram.) p. 501. Variiert mit Uebergängen zu den folg.: β *cass. cassiopeia* (Stgr.) p. 501 (Ob. Amazonas, S. Peru). — γ) *cass. subsp. amplior* n. p. 501 ♂ (Columbien). Mittelform zw. α u. β , kleiner als letzter. — δ) *cass. andromeda* n. p. 501 ♂ (Bolivien). — 2. *supremus* n. (Gestalt ähnelt *cassiope* etc.) p. 501—502 ♂ (Santa Inéz, Ecuador, östl. der Anden, 1250 m).

B. Josephus-Gruppe: ♂ Hfogl. m. ein. tiefschwarz., beinahe dreieckig., sammetartig. Duftfleck zwisch. hinterer u. mittl. Mediana. Vor der Subcostalis ein nach vorn gerichteter, heller, Haarpinsel. p. 502. — 1. *josephus* (Godm.-Salv.) m. α *jos. josephus* Godm.-Salv. p. 503. — β *jos. subsp. excultus* n. p. 503 (Columbien, Muzo?).

— *supremus* [cf. antea] (ausgezeichnet durch eine stark gezackte, gelbbraune Diskalbinde d. Vflgl. u. eine Reihe weisser submarginaler Flecke. Berlin. Entom. Zeitsch. 47. Bd. Sitz.-Ber. f. 1901 14. Nov. auch Insektenbörse, 18. Jhg. p. 413 (Ecuador). — *cassiope subsp. andromeda* n. [cf. antea] (Opsiphanes a Stgr. i. l. (ist eine *cass.* mit breiter rothbrauner Discalbinde d. Vflgl. u. breitem bis in d. Hälfte der Flgl.-Fläche hineintretend, Saum d. Hfogl. von gleicher Farbe) p. 413.

Tenaris kubaryi subsp. aroana n. (steht Stgr.'s *kubaryi* von Deutsch-Guiana am nächsten, ist aber etwas grösser u. hat einen schwachen sattbräunlichen Costalsaum des Vflgl. Der Hrand d. Vflgl. u. der Costalsaum d. Hfogl. sind hell schiefergrau bezogen. Basaltheil d. Hfogl. gelblich). **Fruhstorfer**, Deutsche Entom. Zeitschr. XIV. Bd. p. 330, auch Berlin. Entom. Zeitschr. 47. Bd. Sitz.-Ber. f. 1901. 24. Okt. — Insektenbörse 18. Jhg. p. 373 (am Aroafluss in Britisch Neu-Guinea). — *sticheli* (kirschi Stgr. nahe, jedoch unterschieden durch die kleineren hellgelb umrandeten Ocellen auf den Hfogl. Der Subapikalfleck der Vflgl. ist reiner weiss, der übrige Theil d. Vflgl. dunkler grau als bei kirschi). Deutsche Entom. Zeitschr. XIV. Bd. p. 330, auch Insektenbörse 18. Jhg. p. 373 (Milnebay an der Südostspitze der Insel Neu Guinea).

Satyridae.

Satyridae von Central-Afrika. **Sharpe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 279—280. — 6 Spp.

Caeris chorinaeus F. Fundorte. **Therese von Bayern** p. 265. — *gertrudtus* ♂. **Godman**, Biol. Centr.-Amer. Rhopal. II p. 648 pl. CVII Fig. 1, 2.

Coelites notis subsp. sylvanum n. **Fruhstorfer**, Deutsch. Entom. Zeitschr. lep. Hft. 14. Bd. p. 275.

Chionobas katahdin **Newcomb**, Entom. News Philad. vol. XII p. 225 pl. VIII (Maine). — Protection of Ch. semidea [by law]. **Carpenter, Sidney C.**, Entom. News Phil. vol. 12 June p. 161—162. — Desgl. **Ottolengui, R.**, t. c. No. 9 p. 283.

Coenonympha amaryllis Cram. zu Wei-Hai-Wei. **Fletcher**, The Entomologist,

vol. 34 p. 156. — *pamphilus*, linke Unterseite des Flügels dieselbe Färbung wie die Oberseite. t. c. p. 61.

davus von Westmoreland, dunkler als die schottischen Stücke u. nicht so rot als die von Welsh. The Entomologist vol. 34 p. 362.

Cystineura cowiana Butler, Proc. Zool. Soc. London, 1901 p. 713 (St. Lucia u. Trinidad.)

Daedalma bronza Weeks, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. XXVII p. 355 (Bolivia).

Epinephele hyperanthus L. ♀, Stück, bei dem auf d. recht. Vflgl. drei, auf d. link. nur 2 Ocellen. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900 18. Jan. (p. 3). — hyper. var. von Oxshott, die sich stark der var. *arete* nähert. The Entomologist vol. 34 p. 324. — hyper. L. ♂ Aberr. aus der Jungfernaheide bei Berlin. Zeichnungslose Oseite in Folge dünner Schuppenlagerung namentlich auf den Hflgl. mit graphitähn. Glanz, Useite stark melanotisch. Vflgl.-Useite mit 3 ungewiss gelb gerandet., längl. verwischte, ungekehrte Flecken, die 5 Fleck. der Hflgl. auch ungewiss begrenzt, aber rundlicher u. schwach weissl. gekernt. Die bei typ. Stücken weissen Franzen zeigen die grauschwarze Farbe d. Flgl. **Stichel**, Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900 2. Aug. (p. 22). — *janira*, 2. Generation. **Adkin, R.**, The Entomologist vol. 34 Nov. p. 310. — ♀-Stück, das auf dem link. Hflgl. albinistisch verfärbt ist. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900 18. Jan. (p. 4). — ♂-Stück mit gross. weiss. Fleck auf d. link. Oberflgl. (upper wing), ähnl. d. Var. in Neumann's Brit. Butterflies. **Oldaker, F. A.**, The Entomologist vol. 34 Dec. p. 354. — ♂ mit teilweiser weissl. Verfärb. der Flgl. Berlin. Entom. Zeitschr. Sitz.-Ber. f. 1900 5. Juli (p. 21). — *tithonus* L. ♂. Teratologisches Stück. **Hampson**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 119. — mit goldgelben Flecken von Oxshott. The Entomologist vol. 34 p. 361.

Neu: *imbrialis* Weeks, Proc. New England Zool. Club, vol. II p. 81 (Bolivia).

Erebia. Die karpatischen Spp. und ihre Beziehungen zur pleistocenen Fauna.

Hormuzaki, Deutsche Entom. Zeitschr. lep. Hft. 14. Bd. p. 353—380.

— Variabilität. The Entomologist, vol. 34 p. 61. — Ueber einige *Erebien*. **Chapman** (8).

— Variation in der Gatt. (aus dem Englischen Seeengebiet u. von Savoiën). **Smith, Geoffroy**; Part I. The Entomologist, vol. 34 p. 276—281 (mit Tabellen und Kurven. Variabilität der Flecke „spot power“ und Berechnung ders. für die kommende Generation) p. 306—308.

arete. Verschied. Varr. vom Kulla-Gebirge, Süd-Schweden. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900 18. Jan. p. 3.

ceto Hbn. ♂ von melanotischer Färbung mit sehr kleinen Flecken auf der Oseite von Adelboden im Berner Oberland, 1375 m, — desgl. 2 ♂ von *E. ligea* aus Brunneck im Pusterthal, welche auf der Oseite statt der rostroten Binde nur rote Flecken, z. Theil mit schwarz. Kern tragen u. Aehnlichkeit mit *euryale ab. ocellaris* Stgr. haben. Sitz.-Ber. f. 1901 3. Okt.; Insektenbörse 18. Jhg. p. 349.

glacialis. Correction. **Chapman**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 10. Berichtigung zu Entom. Monthly Mag. vol. 11 (36) p. 292; — auch: The Entomologist vol. 34 p. 17.

- Iappona* Esp. cum *ab. caeca* n. (Ocellen der Oseite und Useite d. Vfgl. geschwunden. Die ganze Oseite ist schwarzbraun mit einer nur ganz schwachen Andeutung des rotgelb. Feldes. Kleiner als normal. Ein Stück bildet den Uebergang dazu, indem die 2 vorderst. Aug. an d. Oseite angedeutet sind, aber nicht an d. Useite). **Strand**, *Nyt. Mag. etc.* 39. Bd. 1901 p. 50—51 (Langöen). — *ligea* L. u. var. *adyte* Hb. Bemerk. hierzu p. 51.
- Euptychia*. **Godman** behandelt in d. *Biol. Centr.-Amer. Rhopal. II* folg. Spp.: *cleophes* p. 653 pl. CVII Fig. 3, 4. — *clinas* p. 656 pl. CVII, Fig. 9, 10. — Neu sind: *pellonia* p. 655 pl. CVII Fig. 5, 6. — *pephredo* p. 657. — *hilaria* p. 658 (alle drei von Mexico). — *luttela* **Weeks**, *Trans. Amer. Entom. Soc.* vol. XXVII p. 356 (Bolivia). — Derselbe beschreibt in den *Proc. New England Zool. Club*, vol. II: *monahani* p. 103. — *therkelsoni* p. 104 (alle beide aus Bolivia).
- **Therese von Bayern** bringt Fundorte nebst Bemerk. zu folgend. Spp.: *hesione* Sulz. p. 265—266. — *ocypete* F., *camerta* Cram., (?) *peria* Butl. p. 266. — *vesta* Butl. p. 266—267. — *libye* L. p. 267. — spec. (bei *modesta* Butl.) p. 267 ♂ (Puerto Berrio am mittl. Rio Magdalena. — Zur Bestimm. zu defekt).
- Gnophodes* *Grogani* (verw. mit *parmeno* Doubl. u. *Hewits.*, doch sofort unterscheidbar durch den grossen dunklen Fleck („brand“) auf d. Vfgl.). **Sharpe**, *Ann. Nat. Hist.* (7.) vol. 8 p. 279—280 (Mushari, 8000').
- Ipthima* sp. von Wei-Hai-Wei. **Fletcher**, *The Entomologist*, vol. 34 p. 156.
- Lasiophila* (eine andenbewohnende Gatt.). **Therese von Bayern** bringt Fundorte nebst Bemerk. zu folg. Spp.: *zapatoza* Westw., *prosymna* Hew. u. *phalaesia* Hew. p. 268—269.
- Lethe* *baucis* *subsp. philemon* n. (ebenso wie *Clerone aerope excelsa* **Fruhst.** eine grosse Ausgabe d. chines. *aerope* **Leech** vorstellt, verhält es sich mit dieser tonkinesischen *Lethe*, die als eine aussergewöhnlich grosse Lokalform von **Leech's** abgebild. *baucis* gelten kann. *Phil.* differirt hauptsächlich durch die viel breitere u. reinweisse Schrägbinde d. Vfgl. u. auf d. Hfgl.-Useite durch die gröss. Ocellen, die mit deutl. silbrig violett. Ringen umgeben sind. Auch zeigt die ultracellare Längsbinde jenseits der Zelle eine schmale aber lange Ausbuchtung zwisch. Uraud u. Mediane. — Ist auch verw. mit *Lethe naga* **Doh.** von **Oberassam**. Von dieser *Aber.* ist *phil.* leicht zu trennen, weil die weisse Apicalbinde auf der Useite d. Hfgl. fehlt). **Fruhstorfer**, *Deutsche Entom. Zeitschr. lep. Hft.* 14. Bd. p. 275. — *Berlin. Entom. Zeitschr.* 47. Bd. Sitz.-Ber. f. 1901. 31. Okt. — *Insektenbörse* 18. Jhg. p. 389.
- Lymanopoda* *cinna*. Charakt. **Godman**, *Biol. Centr.-Amer. Rhopal. II* p. 660 pl. CVII Fig. 13, 14.
(eine andenbewohnende Gatt.) *labda* Hew. u. *albocincta* Hew. Fundorte nebst Bemerk. **Therese von Bayern**, p. 267—268.
- Melanargia* *astanda* var. *taurica* **Roeb.** u. Stammform. Bemerk. dazu. **Holtz** u. **Redakt.** *Berlin. Entom. Zeitschr.* 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900. 18. Febr. (p. 9).
- galathea* *ab. amarginata* **Metzger** von **Millstadt** in **Kärnten** (im Verhältniss 6 pro Mille der Stammart). **Schima**, *Verhdgn. zool.-bot. Ges. Wien*,

51. Bd. Sitz.-Ber. f. 1901. 4. Okt. p. 625. — ab. galene O. fehlt dort p. 625.
- **Aberrations.** **Clark, J. A.** Entom. Record, vol. 13 No. 12 p. 358.
- var. *procida* Hbst. Stücke aus Laibach in Krain durch sattere Färb. der schwarz. Zeichn. ausgezeichnet, die ausgedehnter ist als diejenige von Stücken aus Schlesien u. so dunkel wie bei italien. Exempl. **Schulz, G. L.** Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900 (p. 26).
- Oeneis mongolica** Oberth. zu Wei-Hai-Wei. **Fletcher,** The Entomologist, vol. 34 p. 156.
- semidea. Biologie. **Scudder,** Psyche, vol. IX. p. 195—197 pl. 1.
- Oressinomma typhla** Doubl. Hew. Fundorte nebst Bemerk. **Therese von Bayern.** p. 267.
- Pararge (Crepeta) deidamia** Ev. zu Wei-Hai-Wei. **Fletcher,** The Entomologist, vol. 34 p. 156.
- eigeria*, gezogen, dünnschuppig mit dunkler Zeichnung. The Entomologist, vol. 34 p. 61.
- Spätes Vorkommen. **Pilley, J. B.** The Entomologist, vol. 34 p. 58.
- maera** L. Stark melanotisch im Kreise Berent. Man könnte diese Form, die im Gegensatz zu der var. *adrasta* ganz dunkel, fast ohne jede Spur von Rostbraun oder -gelb auf d. Oseite d. Flgl. ist, var. *tricolor* nennen. Im Spätsommer kommen ab u. zu helle Stücke vor, die nicht viel von der norm. Form abweichen. **Treichel,** p. 167.
- var. *borealis* Fuchs bei Storaavandet in Tysfjorden beobachtet. **Strand,** Nyt Mag. etc. 39. Bd. 1901 p. 52. — **maera** L. var. *monotonia* Schneider Bergens Mus. Aarbog, 1901 p. 141 pl. Fig. 1.
- Megaera** mit 2 Augen in der Spitze d. Vflgl. (aus den Alpen). Zeitschr. f. Entom. Breslau, 1901 p. IV.
- Pedaliodes primera.** **Weeks,** Canad. Entom. vol. 33 p. 293 (Bolivia).
- **Therese von Bayern** bringt Fundorte nebst Bemerk. zu: *poesia* Hew., *psonia* Hew., *manis* Feld., *pausia* Hey., *pallantis* Hew. u. *panyasis* Hew. p. 269—270.
- Pronophila** (eine andenbewohnende Gatt.) *thelebe* Doubl. Hew. u. *porsenna* Hew. Fundorte nebst Bemerk. **Therese von Bayern,** p. 268.
- Satyrus.** **Holtz** bespricht in der Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900 15. März (p. 11) mehrere Arten aus seiner cilicischen Ausbeute: *ma-murra* var. *obscura* Stgr. wohl eine gute Art. — *semele*, etwas bunter u. schärfer gezeichnet als deutsche Stücke. — *mersina* von Stgr. als var. von *semele* beschrieben, fliegt aber mit dieser zusammen an derselb. Stelle u. zeigt niemals Uebergänge (in Höhen von 1000—1400 m). Untersch. von *semele*: ♂ auf Vflgl. sehr dunkelbraun u. meist ohne die rostbraun. Flecke. Die Flecken auf den Vflgl. u. bei d. ♀ sind gesättigter braun u. nicht so blass als bei *semele*. Auch hab. die ♀ kein. lichterem Aussentheil d. Hflgl., so dass die braunen Randflecken scharf von der dunkl. Grundfarbe abstehen. Besonders auffallend ist die fast eintönige graue Useite d. Hflgl. Sogar die beiden mittleren schwarzen Zackenlinien u. die schwarzen Randlinien treten nur schwach hervor.
- Ypthima asterope** (Klug) Somaliland. **Sharpe,** The Entomologist, vol. 34 Suppl. p. 1.

- an den Küsten Syriens im Libanongebiet gefangen, der einzige Vertreter seiner Familie zwischen Syrien u. Manchuria. *The Entomologist*, vol. 34 p. 132.

Erycinidae (oder Riodinidae).

- Abisara. Die ostindischen Spp. **Moore**, *Lep. ind.* vol. IV p. 82—90 pls. 401—403. — Raupe u. Puppe von *A. prunosa* p. 87 pl. 402.
- delicata* (nahe verw. m. *A. rogerii* Druce, aber das weisse Feld auf beiden Flgln. viel mehr ausgedehnt). **Lathy**, *Trans. Entom. Soc. London*, 1901 p. 28 ♂♀ Taf. III Fig. 4 (Zomba, Central-Afr.).
- weiskei* **Rothschild**, *Nov. Zool. Tring*, vol. 8 p. 218—219 ♂ (Aroa River, British New Guinea) Abb. Taf. X Fig. 2 ♂ (zu roth).
- Amarynthis muscolor*. **Weeks**, *Canad. Entom.* vol. 33 p. 267 (Bolivia).
- Ancyluris meliboeus* F. Fundorte nebst Bemerk. **Therese von Bayern**, p. 270.
- Apodemia erostratus* Doubl. Fundorte nebst Bemerk. **Therese von Bayern**, p. 271.
- Bacotis nesaea*. Charakt. **Godman**, *Biol. Centr.-Amer. Rhopal.* vol. II p. 706 pl. CX Fig. 11, 12.
- Baltonca* n. g. (pro parte *Dodonae*). **Moore**, *Lep. ind.* vol. IV p. 73. — Neu: *binghami* n. sp. p. 75 pl. 398 Fig. 4.
- Chamaelinnas phoenias* Hew. Fundorte Bemerk. **Therese von Bayern**, p. 270.
- Dicallaneura diantha* **Grose-Smith**, *Rhop. exot. Dicallaneura* II p. 7 Fig. 1—3. — *fulgarata* p. 7 Fig. 4—5 (beide von Neu Guinea).
- Dodona*. Die indischen Spp. behandelt **Moore** in den *Lep. ind.* vol. IV p. 62—73 pls. 395—397. — *elvira* ♀ **Grose-Smith**, *Rhop. exot. Dicallaneura* II Fig. 12, 13 p. 10. — Neu: *angela* p. 9 7 pl. Fig. 10 u. 11 (Tenasserim).
- Elymnias patua subsp. stictica* n. **Fruhstorfer**, *Deutsche Entom. Zeitschr.* 14. Bd. lep. Hft. p. 271. — In dems. Bande beschreibt **Fruhstorfer** auch p. 271—273 mehrere neue *Varr.* von *E. nigrescens*.
- vordermani* **Snellen**. *Tijdschr. v. Entom.* vol. XLIV p. 99 (Kangean Islands).
- Emesis brimo*. Charakt. **Godman**, *Biol. Centr.-Amer. Rhopal.* II p. 704 pl. CX Fig. 5 u. 6. — Neu: *poeas* p. 704 pl. CX Fig. 7—10.
- Ericyna* ist vergeben. — Erycinidae fälschlich für *Er. lysippus* gebraucht. **Grote**, *Verhdlgn. zool.-bot. Ges. Wien* 51. Bd. p. 656.
- Eurygona cheles*. Charakt. **Godman**, t. c. p. 699 pl. CX Fig. 1, 2.
- Lasasia rosamonda*. **Weeks**, *Illustrations of hitherto unfigured Lepidoptera*, p. 9 pl. V. — *kennethi*. **Weeks**, *Proc. New Engl. Club*, vol. II p. 71 (Bolivia).
- Lemonias idmon*. Beschr. **Godmann**, *Biol. Centr.-Amer. Rhop.* II p. 708 Taf. CX Fig. 15—18. — *eudocia* p. 708 Fig. 19, 20. — *zeurippa* p. 709 Fig. 21, 22. — *maxima*. **Weeks**, *Illustrations of hitherto unfigured Lepidoptera* p. 3 Taf. I Fig. 4.
- Limnas chrysippus* in einer Sammlung vom Uganda Protectorate. Die ganze Reihe der Uebergangsform. vollständig. **Butler**, *Ann. Nat. Hist.* (7.) vol. 6 p. 562.
- gynaecias*. Beschr. **Godman**, *Biol. Centr.-Amer. Rhopal.* II p. 701 pl. CX Fig. 3.

- Lyropteryx lyra* Saund. Fundorte nebst Bemerk. **Therese von Bayern**, p. 270.
- Metacharis melucina* Synonymie u. Verwandtschaft. **Godman**, t. c. p. 706. —
 Neu: *indissimilis* **Weeks**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 vol. XXVII
 p. 358 (Bolivia).
- Nymphidium victrix* n. sp. siehe unter Nymphalidae.
- Sisemia minerva* Feld. Fundorte nebst Bemerk. **Therese von Bayern**, p. 270 —1.
- Sospita. Die ostindischen Spp. Behandelt **Moore** in Lep. indic. vol. IV p. 77
 —81 pls. 399 u. 400. — Neu: *phylloides* t. c. p. 81 (China).
- Taxila. Die ostindischen Spp. behandelt **Moore** in Lep. ind. vol. IV p. 90—95.
 Hierzu pl. 404.
- fasciata ♀ **Grose-Smith**, Rhop. exot. Dicallaneura II p. 8 Fig. 6, 7.
- Tharops trotschi* **Godman**, Biol. Centr.-Amer. Rhop. II p. 707 p. CX Fig. 13, 14
 (Panama, Columbia).
- Theope **Godman**, giebt eine Charakt. folg. Spp.: talna t. c. p. 711 pl. CX Fig.
 23, 24. —diores p. 711 tab. cit. Fig. 25—28. — eleutho p. 712 tab. cit. Fig.
 29, 30. — mania p. 712 tab. cit. Fig. 31, 32. — matuta p. 712 tab. cit.
 Fig. 33, 34.
- Zemerus retiarus* ♀ **Grose-Smith**, Rhop. exot. Dicallaneura II p. 9 pl. Fig. 8, 9.

Libytheidae.

Libytheidae. Pagenstecher. Monographie der Gatt. *Libythea* mit den 3 Unter-
 gatt. *Libythea* F., *Dichora* Scudd. u. *Hypatus* Hübn. in 10 Spp. u. 17 Varr.
 Flügelgeäder u. frei aufgehängte Puppen weisen auf eine Verwandtschaft
 mit den Nymphaliden, die schlanken, schwach behaarten Raupen m. kleinem,
 runden Kopf ähneln denen der Pieriden, der Bau der Vorderbeine nähert
 sie den Lycaenidae. Ihre speciellen Eigenthümlichkeiten zeigen sich in der
 Form der Palpen u. Antennen. Die Gatt. ist in allen Welttheilen vertreten
 u. fossil aus Colorado bekannt.

Pagenstecher charakterisirt die Familie folgendermassen:

Körper kräftig, kleine Palpen bis zu halber Antennenlänge über den Kopf
 vorragend, lang u. dicht behaart, wagrecht vorgestreckt. Antennen kurz, vom
 Grunde bis zur Spitze sich allmählich verdickend. Vflgl. am Aussenrande
 hinter dem Apex stark ausgeschnitten. Die Zellen beider Flgl. sind durch eine
 zarte Ader geschlossen. Vorderbeine des ♂ verkümmert, die des ♀ vollkommen.
 — Raupen schlank, schwach behaart, denen der Pieridae ähnlich, mit kleinem,
 rundem Kopf. — Puppe kurz, am Schwanzende aufgehängt. — Ei elliptisch,
 flaschenförmig, zweimal so lang wie breit, gerippt, mit längsgerichteten Streifen.

Das Flgl.-Geäder und die frei aufgehängten Puppen weisen auf eine Ver-
 wandtschaft mit den Nymphaliden hin; der Bau der Vorderbeine nähert sie den
 Lycaenidae; ihre besondere Eigenart zeigt sich in der Form der Palpen und
 Antennen, die bei den einzelnen Arten etwas wechselt. — Europa, Indien,
 Australien, Afrika, Amerika. Fossil in Kolorado (Florissant).

1 Gatt. mit 3 Untergattungen, 10 Arten u. 17 (p. 1; 18 p. 3) Varietäten.
 Schemat. Abb. des Geäders p. 2 Fig. 1 v. *Lib. celtis*.

Libythea F. Synon. **Pagenstecher** (5) p. 1—3. Charakt. d. Gatt. Ueber die
 ganze Erde verbreitet, fehlt nur in den kalten Zonen. Lieben offene Plätze
 in der Nähe des Wassers. Flug lebhaft.

Uebersicht der Untergattungen:

1. { Antennen allmählich verdickt, ohne deutlich abgesetzte Keule
a. Subg. *Libythea* p. 3.
2. { Antennen mit deutlich abgesetzter Keule.
2. { Palpen über halber Antennenlänge
b. Subg. *Hypatus* p. 14.
3. { Palpen unter halber Antennenlänge
c. Subg. *Dichora* p. 11.

Subg. *Libythea* F. Charakt. p. 3. — Uebersicht über die 6 Arten und 13 Varr. p. 3—4. 1. L. (L.) *geoffroy*, ♂ p. 8, 2. L. (L.) *narina* p. 6, 3. L. (L.) *geoffroy* ♀ p. 8, 4. L. (L.) *libera* p. 7, 5. L. (L.) *hybrida* p. 8, 6. L. (L.) *myrrha* p. 5, 7. L. (L.) *celtis* p. 6.

celtis Fuessly p. 4 Abb. Fig. 2 mit 1 Var. (südl. Europa bis Kleinasien).

myrrha Godart p. 5—7 (Himal., Assam, Ober-Tenasserim, Kontinentales Indien, Birma, Tavoy, Siam, Malayische Halbinsel, Borneo, Java, Sumatra, W. China, Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Kap York. — 2. Var.: var. *rama* F. p. 6 (aus Südindien, waldig. Gegenden von Ceylon, 1000—1500 m Höhe u. var. *nicévillei* Olliff p. 6 (Nord-Australien).

narina Godart p. 6—7 (Kontinentales Indien u. s. w.) mit 1 Var. *rohini* L. Marshall p. 7 (Indien, Khasi Hills).

libera Nicév. p. 7—8 (Birma).

hybrida L. Martin p. 8 (Berge des Karobottacks).

geoffroy Godart p. 8—9 Abb. des ♂ Fig. 3 (Timor, Wetter, Lombok, Sumbawa, Sumba, Ké, Neu-Guinea, Birma). 9 Var.: var. *sumbensis* A. Pagenst. p. 9 (Sumba). — var. *antipoda* Boisd. p. 9 (Neu-Kaledonien). — var. *philippina* Staud. p. 10 (Philipp.). — var. *celebensis* Staud. p. 10 (Minahasso). — var. *ceramensis* Wall. p. 10 (Ceram, Amboina). — var. *batchiana* Wall. p. 10—11 (Batjan, Halmahera). — var. *pulchra* Butler p. 11 (Neu Britanien). — var. *orientalis* Godm. & Salvin p. 11 (Salomonsinseln Arla- u. Guadalcanar). — var. *quadrinotata* Butl. p. 11 (Loyalitätsinsel Lifu).

b) *dichora* Scudder. Charakt. p. 11 (Afrika, Madagaskar, Mauritius). — 3 Arten, 2 Lokalvarietäten. — 7. L. (D.) *labdaca* Westw. p. 12 (Sierra Leone, Togo, Kamerun, Zentral-Afrika). — 8. L. (D.) *laius* Trim. p. 12—13 (Ost-Natal, Küstendistrikt u. Ostküste bei Quillimane) mit var. *tsiandava* Grose-Smith p. 13 (S.W. Madagask.). — *cinyras* Frim. p. 13 (Maurit., Madag. mit 1 Var.: var. *ancoata* Grose-Smith p. 13—14 (Nord-West-Küste von Madag.).

c) Subg. *Hypatus* Hübn. Charakt. p. 14 (Amerika). — 1 Art m. 3 Varr. L. (H.) *carinenta* (Cramer) p. 14 Abb. Fig. 4 (S. Mexico, Texas, Honduras, Brasil., Paraguay, Argent.). — var. *bachmani* Kirtland, p. 15 (Verein. Staat. v. Nord-Amerika bis Canada). Wanderungen mehrfach beobachtet. — var. *motya* Boisd. & Lec. p. 15 (Cuba, Portorico). — var. *terena* Godart p. 15 (St. Domingo).

Alphabetisches Register p. 16—17. — Nomenclator generum et subgen. p. 18. — Litteratur-Kürzungen p. VI—VIII. — System. Index p. IX.

Fossile Gattung: *Barbarothea* n. g. (1 n. sp.). Scudder p. 753 dieses Berichts.

- Libythea*. Die indischen Spp. **Moore**, Lep. ind. vol. IV p. 50—62 nebst pls. 392—394 mit *leptoides* p. 57. — *alompra* p. 58 u. *hauwelli* p. 61 nom. nov.
- rama. Raupe und Puppe. **de Nicéville**, Journ. Asiat. Soc. Bengal, vol. 69 p. 232.
- celtis* Esp. ahmt ein trockenes Blatt nach, wobei sie die gestreckten Palpen zu einer Art Blattstiel benutzt, was Rhopal. durch die Appendices ihrer Flgl. anzudeuten pflegen. **Kuznezow** (hierzu Holzschnitt). Copie dess. in Psyche vol. 9 p. 184.
- Biologie. **Skinner** (3).

Lycaenidae.

Eier. Erratum. **Clark, F. N.**, Entom. Record, vol. 13 No. 3 p. 109.

- Lycaenidae* vom Wege zwischen Mombasa und den Taveta-Wäldern. **Butler** (4): *Tingra* (1), *Lachnocnema* (1), *Axiocerses* (2, nebst Var.), *Argiolaus* (1), *Stugeta* (1, n. Lokalf.), *Hypolycaena* (2), *Virachola* (2), *Spindasis* (1), *Lycaenesthes* (3), *Cacyreus* (1), *Castalius* (1), *Tarucus* (1), *Azanas* (1), *Catochrysops* (3), *Chilades* (1), *Cupidopsis* (1), *Nacaduba* (1), *Zizera* (1). **Butler**, Ann. Nat. Hist. (7.) vol. 7 p. 27—31.
- von Munisu. **Butler**, p. 200. — 4 Sp., dar. interessant: *Uranothauma nubifer* von Central-Afrika. **Sharpe**, Ann. Nat. Hist. (7.) vol. 8 p. 282—283. — 9 Spp.
- Amblopala avidienus* Hewits. von Wei-Hai-Wei. **Fletcher**, p. 156.
- Argiolaus lalos* var. H. H. Druce. Zeichnung. **Butler**, Ann. Nat. Hist. (7.) vol. 7 p. 28—29 ♀ (*Chaengombe*).
- Arrugia umbra* **Grose-Smith**, Rhop. exot. Lycaenidae African p. 128 Abb. Taf. XXVII Fig. 5, 6. (*Cameroon*).
- Axiocerses harpax* Fabr. var. *tjoane* Wallengr. Bemerk. hierzu. **Butler**, Ann. Nat. Hist. (7.) vol. 7. p. 28 ♂ (*Chaengombe*, *Rabai*, *Mombasa*). — *amanga* Westw. Bemerk. zur Zeichn. p. 28.
- Catochrysops eleusis* (*Demaison*). Anscheinend in Aegypten südl. von Luxorgemein, in der Nähe von Akazienbüschen. **Rothschild**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 426—427.
- *peculiaris* Rogenh. Beschr. ein. weisser Form (♀) der Zwischenstufe von *Mombasa*. Bemerk. Roger's. **Butler**, Ann. Nat. Hist. (7.) vol. 7 p. 30.
- phasma* (Unters. weissl. braun wie *patricia*, doch Zeichn. fast wie *celaeus*. Nach den Schwänzen d. Hflgl. *patricia* nahe). **Butler**, Ann. Nat. Hist. (7.) vol. 7 p. 290 ♂. (*Lagos*, *Ashanti* zw. *Cape Coast Castle* und *Kumassi*).
- Carsoni* (*patricia* nahe) p. 290 ♂ (*Twambo*, *Tanganyika*).
- Chilades Alberta* (= *Catochrysops cyclopteris* Butl. 1888). **Butler**, Ann. Nat. Hist. (7.) vol. 7 p. 291 ♂♀ (*Tamaja*, *Equatorial Afr.*; *Nadada*).
- Chrysophanus athamantis* var. *alexandra* n. **Püngeler**, Deutsche Entom. Zeitschr. lep. Hft. 14. Bd. p. 179 Taf. II Fig. 6. — dispar. **Brown, H. Rowl.** 1899. Entom. Record, vol. 11 No. 10 p. 277—278. — *feredayi*. Charakt., Synonymie. **Hutton**, Trans. New Zealand Instit. vol. XXXII p. 96.

- phloea L. von Wei-Hai-Wei. **Fletcher**, p. 156. — var. **Schmidtii** near Paisley. **Stewart, A. M.** The Entomologist, vol. 34 Dec. p. 352. — dito near York. **Walker, S.** (2).
- Cupido Spp. in Aegypten. **Rothschild**, Nov. Zool. Tring, vol. 8. — **baeticus** L. (gemeinste Form. — in allen Kulturgebieten von Cairo bis Karthum) p. 426. — **theophrastus** (F.) bei Karthum anscheinend selten, gemein bei Shendi, auf Akazienbüschen) p. 426. — **ubaldus** (Cram.) selten, nur bei Shendi p. 426.
- argiades** Pall. u. **argus** L. von Wei-Hai-Wei. **Fletcher**, p. 156.
- argyrotoxus** Bergstr. ♀. Teratologisches Stück. **Hampson**, Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 12 (37) p. 120.
- Cyaniris argiolus** (Lycaena) in the Metropolitan Area. **Adkin** (6). — at Blackheath. **Dannatt** (1). — in Middlesex. **Brown, H. R.**, Entom. Record, vol. 13 No. 11 p. 333. — **argiolus** L. abundant at Southend. **Lang, Henry C.**, The Entomologist, vol. 34 Oct. p. 293. — von Wei-Hai-Wei. **Fletcher**, p. 156.
- Durbania limbata** **Grose-Smith**, Rhop. exot. Lycaenidae African, vol. XXVII p. 127 Fig. 1 u. 2. — **micra** p. 140. — idem, op. cit. vol. XXIX p. 140 Abb. Fig. 10—12.
- Epitola divisa** (steht **E. honorius** [teresa Hew.] sehr nahe). **Butler**, Ann. Nat. Hist. (7.) vol. 7 p. 288—289 ♂♀, (Sierra Leone; Bandajuma, Cape Coast Castle).
- Epamera umbrosa** (Butl.) Somaliland. Bihen Dula. **Sharpe**, The Entomologist, vol. 34 Suppl. p. 3.
- Feniseca tarquinius**. Nahrung der Raupe. **Good**, Canad. Entom. vol. 33 p. 228.
- Iraota Nicevillei** (= **I. maecenas** Moore, Lep. Ceylan I p. 102 pl. XL Fig. 2, 2 a ♀ (1880—81). **Butler**, Ann. Nat. Hist. (7.) vol. 7 p. 291 (Ceylon).
- Iridopsis ansorgei** **Grose-Smith**, Rhop. exot. Lycaenidae African, XXVIII p. 135 Fig. 10, 11. — **exquisita** Fig. 12, 13.
- Jolans lalos** Druce ♀ Abb. Taf. III Fig. 5 (farbig). **Lathy**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 29.
- Lachnocnema bibulus** (Fabr.). Somaliland: Laskarato. **Sharpe**, The Entomologist, vol. 34 Suppl. p. 3. — Roger's Bemerk. zur Färbung d. ♂. **Butler**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 28.
- Liptena rothi** **Grose-Smith**, Rhopal. exot. Lycaenidae African, XXVIII Fig. 1—3 — Neu: **rufula** p. 133 Abb. Fig. 4, 5. — **tulliana** p. 134 Fig. 6, 7 (beide aus dem tropisch. Afrika).
- Lycaena argiolus** bei London. **Mc Lachlan, R.**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 227. — in London. **Chittenden, D. t. c.** p. 316. — abundance at Lee. **Carr, F. M. B.**, The Entomologist, vol. 34 Sept. p. 254. — in London. **Mitford** (2), desgl. **Mc Arthur, H.** ibid.
- **argus** u. Ameisen. Symbiose von Raupen u. Ameisen. Morphologie der R.-Haut. **Thomann**. — Diskussion. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 69. — Symbiose von Raupen u. Ameisen (*Formica cinerea*). Morphologie der Haut. **Thomann**. Falls es sich um *Lyc. argus* handelt, ist es seit langen Jahren bekannt, ibid. — Soll auch nichts Neues, sondern nur eine gründliche Studie sein. cf. p. 113. Eingehendes Ref. p. 113—114.

- var. *argyrognomon* ♀ Bergstr. mit blau überflossenen Flügeln. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900 18. Jan. (p. 3). — Aberr. (p. 3).
 - *acis* ♀ Aberr. auf der Rückseite statt der Ocellen längliche Wische (p. 3) (sämmtlich vom Kullagebirge, Süd-Schweden).
 - *argyrogomon* var. *aegidion* Meissn. Während das ♀ dieser Var. in der Schweiz fast „ausnahmslos braun“ bleibt, haben alle Stücke Strand's blaue Bestäubung, wenigstens an der Wurzel der Flgl., u. nicht selten ist der grösste Theil der Flgl.-Fläche blau bestäubt: *forma caerulea* n. — Die rothen Halbmonde an d. Oseite sind oft undeutl., besonders auf den Vflgl. u. bisw. fehlen sie ganz u. gar, sowohl auf d. Vflgl. als auf den Hflgl.: *ab. extincta* n. — Sowohl von ♂ als ♀ findet man bisw. (selten) Stücke, an welchen die schwarzen Ocellenpunkte (die Mittelreihe u. z. Th. auch die Basalpunkte) zu längl. keilförmig. Strichen ausgezogen sind (schon früher von Sparre, Schneider u. Strand beschr.): *ab. extensa* n. — Eine weitere Abänderung ist dadurch ausgezeichnet, dass die rothgelb. Flecke d. Useite d. beid. Flgl.-Paare verschwunden sind: *ab. demaculata* n. **Strand**, *Nyt Mag.* etc. 39. Bd. p. 47—48 (Norwegen, Tysfjorden).
 - *arg. var. transcaucasica* n. **Rebel**, *Annal. Wien. Hofmus.* 16. Bd. p. 166.
- Lycæna** Spp. in Siebenbürgen. **Czekelius**, Titel p. 622 des Ber. f. 1899: *argiades* Pall. *ab. coretas* O., *ab. polysperchon* Berg., *aegon* Schiff., *argus* L., *zephyrus* Friv., *arion* Pall., *Eaton* Berg., *astrarche* Bergstr., *icarus* Rott., var. *icarinus* Scriba, *eumodon* Esp., *amanda* Schn., *bellargus* Rott., *corydon* Poda, *hylas* Esp., *meleager* Esp., *donzelli* B. v. *hyacinthus* H.-S., *argiolus* L., *sebrus* B., *minima* Fuessl., *semiargus* Rott., *cyllarus* Rott., *cuphenus* Hb., *alcon* F. u. *arion* L.
- diverse Sp. nebst Bemerk. über Abweichungen einzelner Arten, so *hylas* Esp. m. aschgrauer statt weisser Useite. **Treichel** p. 165.
 - *acis* u. *arion* werden in England seltener. **Oberthür**.
 - *acis* siehe *argus*. —
 - *aegon* u. *astrarche* (Medon) in Cornwall. **Rollason**, *W. A.* The Entomologist, vol. 34. Dec. p. 353.
 - *amyntula* var. *heeri* n. **Grinnell**, *Canad. Entom.* vol. 33 p. 192; zahlreich bei Eastbourne. **Adkin**, *The Entomologist*, vol. 34. Jan. p. 16—17.
 - on Holmwood Common, Dorking. **Oldaker**, t. c. June p. 180. — and other Insects in May. **Walker**, *F. A.*, t. c. June p. 182.
 - *arion*. Unterschied zwischen den Stücken von Cornish u. Gloucestershire, erstere heller, blasser, mit mehr metallischem Glanze. **Bethune-Baker**, *The Entomologist*, vol. 34 p. 362. Gynandromorphes Stück unter denen von Cornish p. 362.
 - *Baton* Bergstr. für finnische Fauna neu. **Lampa**, *Entom. Tidskr.* 22. Årg. p. 158.
 - *bellargus*. Gynandromorphes Stück von Reigate, rechts ♂, links ♀, doch nicht ganz frei von den blauen Schuppen des ♂. Genitalia? *The Entomologist*, vol. 34. p. 184.

- corydon, protected by resemblance. **Lucas, W. J.** The Entomologist, vol. 34 Aug. p. 228.
 - euphemus Hübn. für Niederlande neu. **Snellen** (3).
 - hylas. Glatzer Gebirge, neuer Fundort, für Schlesien selten. Zeitschr. f. Entom. Breslau. 1899. p. XV. — auch bei Mahlen p. IX.
 - astrarche (medon) in **Cornwall, Rollason, W. A.**, The Entomologist, vol. 34. Dec. p. 353.
 - corydon protected by Ressemblance. **Lucas, W. J.** The Entomologist, vol. 34. Aug. p. 228. — gefangen zu Dover, Varr. u. Aberr., darunter 2 ♀, deren Oberflgl. ganz blau (Zwergformen, nicht grösser als *L. minima*) u. ♂, bei denen auf der Useite die Flecke fehlen. The Entomologist, vol. 34 p. 322. — Teratologische Stücke: Poda ♂ u. icarus Ross. 2 ♂, 1 ♀, bellargus 2 ♂. **Hampson**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 119–120.
 - epus. Ueber die Raupe. Húsevü Lycaena hernyó. Rovart Lapok, 8. köt. 7. füz. p. 147. — Ausz. Hft. 7. p. 18.
 - Icarus. Eiablage. **Bethune-Baker**.
 - dolus var. *antidolus* n. **Rebel**, Ann. Wien. Hofmus. 16. Bd. p. 167.
 - minima in Warwickshire. **Garrett, D. F.** The Entomologist vol. 34. Aug. p. 229–230. — (alsus) double-brooded. t. c. Okt. p. 294. — (Polyommatus alsus) in August. **Seth-Smith, L. M.**, The Entomologist, vol. 34. Sept. p. 254. — double-brooded. **Barraud, Philip J.** t. c. Oct. p. 294.
- Neue Spp.: *gisela* **Püngeler**, Deutsch. Entom. Zeitschr. lep. Hft. 14. Bd. p. 180 Abb. Taf. II Fig. 12 (Chinesisch Turkestan). — *babhru* **Weeks**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. XXVII p. 357 (Bolivia).

- Lycaenesthes phoenicis* **Karsch** ♀. Besch. **Aurivillius**, Entom. Tidschr. 22. Årg. p. 118. (Boyenghé am Ikelemba-Fluss).
- **Grose-Smith** behandelt u. bildet ab in Rhopal. exot. Lycaen. African vol. XXIX: lycotas p. 137 Fig. 1–3. — liparis p. 138 Fig. 4–5. — locuples p. 138 Fig. 6, 7.
 - lycaenina. Raupe, Puppe. **de Nicéville**, Journ. Asiat. Bengal. Soc. vol. 69 p. 237.
- Mimacraea dohertyi* (erste Mim. aus Brit. Ostaf.) **Rothschild**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 219 ♂ ♀ (Escarpment, Brit. East Afr., während der Trockenzeit, 6500–9000' Höhe). Abb. Taf. X Fig. 3 ♂.
- Mycalesis obscura* (golo sehr ähnlich. Die 6 Stücke stimmen aber alle darin überein, dass der Pinsel des Feldes 6 d. Hflgl. fehlt, alle haben einen weit kleineren Mehlflecken im Felde 1a der Vflgl.). **Aurivillius**, Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 114 ♂ (Congogebiet; Beni Bendi, Mukinbungu). — *campina* (?campa Trimen [Proc. Zool. Soc. London 1894] führt in der Tab. der Rhop. Aethiop. auf Danckelmanni Rog., der sie sehr ähnelt u. als eine kleine Trockenzeitform ders. gelten könnte. Der Mehlflecken im Felde 1a der Vflgl. liegt indessen, ganz wie bei *M. Safitza* an oder etwas vor der Mitte der Rippe 1) p. 114–115 ♀ Abb. Fig. 20 (Mashunaland, Umtali). — **Butl.**'s Vermuthung, dass *M. ena* **Hew.** eine Zeitform von *M. selousi* ist, kann unmöglich richtig sein. Bei *ena* ♂ ist der Mehlfleck im Felde 1a d. Vflgl. sehr lang u. schmal, bei *Selousi* ♂ sehr kurz u. breit. Bei *Selousi* findet sich ferner in dems. Fleck auf d. Useite ein weiss. Mehlflecken, der bei *ena* ♂ fehlt. Uebrigens ist die Useite bei *ena* scharf gestrichelt. Wahr-

scheinlich ist es dagegen, dass *M. Selousi* nur eine Lokalform von *M. desolata* Butl. ist.

- Nemeophila metelkana* Ld. Beschreib. Lebensweise. von **Aigner-Abafi** (18).
Niphanda fusca Brem. von Wei-Hai-Wei. **Fletcher** p. 156.
Pentila praestans **Grose-Smith**, Rhopal. exot. Lycaenidae African XXIX p. 141
 Fig. 15, 16 (Sierra Leone).
Plebeius (*Lycaena*) *hanno* Stoll. Fundorte nebst Bemerk. **Therese von Bayern**
 p. 271. — (*Lyc.*) *cossius* Cram. p. 272.
 — *trochilus* (Frey) in Somaliland: **Biji**. **Sharpe**, The Entomologist, vol. 34
 Suppl. p. 4. — Besch. v. Raupe u. Puppe. **de Nicéville**, Journ. Asiat. Soc.
 Bengal vol. 69 p. 234.
Polyommatus dorilis Hfn. 2 Varr.: 1. *var. Brantsi*, 2 ♀, von denen 1 eine
 Uebergangsform zur *var. Uyeni* bildet. Charakt. Anwesenheit von veilchen-
 blauen Mondflecken über den rothen Randflecken der Hfogl.-Oseite (wie bei
phlaeas L.). Zuerst von Brants in Sepp., 2. Ser. Theil II p. 104 erwähnt. —
 Scheint verbreitet zu sein. — 2. *var. Uyeni* n. Eine Parallelvarietät zur
P. phlaeas L. *var. Schmidtii* (ausgezeichn. durch blassgelbe Grundfärb. der
 Vflgl. u. des Saumes d. Hfogl. statt der lebhaft rothen Normalfärb.; erstere
 prägt sich auch auf der Useite aus). 1 Stück, ein anderes bildet d. Ueber-
 gang. — Die Tafel stellt ausserdem noch *var. subalpina* Snell. dar. —
 Hufn. Zwei varietäten. **Ter Haar D.** Met 4 fig. (pl.) Tijdschr. Entom.
 Nederl. Entom. Vereen. 43. D. 3./4. Afl. p. 235–238. — Ausz. von Chr.
 Schröder, Allgem. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. No. 10. p. 284.
 — *dispar* seit 1860 nicht mehr in England gefangen, wird mit 4–12 Lstr.
 bezahlt. **Oberthür.** — *chryseis* gehörte wohl noch Ende des 19. Jahrh. der
 britisch. Fauna an.
 — *baeticus* (L.) in Somaliland: **Biji** u. Laskarato. **Sharpe**, The Entomologist
 vol. 34 Suppl. p. 4.
 — *var. gordius* Sulz. sehr helles ♀ aus Montpellier — ein sehr grosses aus
 dem Engadin — 2 ♀♀ mit verdunkelten Hfogl. aus Landek in Tirol, von
 denen eins einen breiten schwarz. Innenrand an den Vflgl. hat — ein ♂
 ebendaher, bei dem die am Innenrand der Vflgl. stehenden Flecken in Form
 eines Hufeisens zusammengeschmolzen sind — ein ♂, bei dem die erst.
 Vrandflecken durch einen Strich verbunden sind. An einem Flügel fehlt
 dieser Strich. — cf. Bericht für 1902.
 — *icarus* ♀ mit blauem rechten Oberflgl. u. ein Stück kleiner als *Cupido*
minima. The Entomologist, vol. 34 p. 61. — *icarus* u. *P. bellargus* ♀ mit
 einem Theil ♂-Färbung. The Entomologist, vol. 34 p. 185. — Einzelne mit
 weissen Spritzflecken, sämmtl. von Eastbourne.
 — *phlaeas* L. (?) in Tysfjorden; (äusserst scheu, wohl scheuer als ihre südl.
 Genossen). **Strand**, Nyt Mag. etc. 39. Bd. 1901, p. 47. — *pruni* siehe
betulae.
 — *virgaureae* L. 1900 im Kreise Berent, West-Pr. häufig, die 3 früh. Jahre
 garnicht beobachtet. **Treichel** p. 165. — *hippothoë* L. nicht selten, aber
 lokal. p. 165. — *dorilis* Hufn. nicht gar häufig im Kr. Berent. p. 165. —
phlaeas L. Frühlingsgeneration klein u. selten, Herbstgeneration gross und
 häufig p. 165. — *var. aureomicans* Heyne beschränkt sich nach **Holtz** auf
 die Ostspitzen der Bulgar Dagh, wo sie in 2000–3000 m Höhe um die

- Kyzyl Tepe zu finden ist. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900 15. März (p. 11).
- var *estonica* H. ab. ♂ *apicepunctata* ab. ♀ *albopunctata*. von **Huene**, Stettin. Entom. Zeit. 62. Jhg. p. 154 (Estland).
- Tarucus theophrastus** (Fabr.) in Somaliland: Biji. **Sharpe**, The Entomologist, vol. 34 Suppl. p. 3—4. — *telicanus* Lang. p. 4.
- Pseuderesia picta** **Grose-Smith**, Rhopal. exot. Lycaenidae African vol. XXVIII p. 134 Abb. Fig. 8, 9.
- Moreelsi* (hinsichtlich d. Useite am nächst. mit *Ps. debora* Kirby übereinstimmend. In Rhop. Aeth. zu Abth. A β^* § gehörig). **Aurivillius**, Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 118—119 ♂ ♀ (Congogegebiet: Boyenghé am Ikelemba-Fluss).
- Rapala lankana**. Beschr. von Raupe und Puppe. de **Nicéville**, Journ. Asiat. Soc. Bengal vol. 69 p. 239.
- Scotlantiades** (sic) *subdita* **Grose-Smith**, Rhopal. exot. Lycaenid. African XXVII p. 129 Fig. 7, 8 (Nandi).
- Spindasis**. **Grose-Smith** bildet ab in Rhopal. exot. Lycaenidae African XXVII: *nilus* Fig. 9, 10. — *victoriae* Fig. 11—13. — *bellatrix* Fig. 14, 15.
- Neu: *minima* (wahrsch. S. *lilacina* am nächst., doch sehr von allen bek. Spp. versch.) **Butler**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 289—290 ♂ (Puttalam, Ceylon).
- victoriae* **Butl.** Beschr. d. ♂ (Oberseite zwisch. Zeichn. von *natalensis* und *nyassae*, die der Unters. der der letzt. ähnlich) **Butler**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 29 ♂ (Rabai).
- Stugeta Bowkeri** **Trimen**, local. form. *mombasae* **Butler**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 29 ♂ ♀ (Mombasa).
- Teriomima pupio** **Grose-Smith**, Rhopal. exot. Lycaenidae African XXIX p. 140 Fig. 8, 9. — *xantho* Fig. 13, 14.
- Thaduka multicaudata**. Erste Stände. de **Nicéville**, Journ. Asiat. Soc. Bengal vol. 69 p. 241.
- Thecla** von **Prehn** als Nachtfliieger bezeichnet, fliegt gern im Sonnenschein. Berlin. Entom. Zeitschr. Sitz.-Ber. f. 1900 18. Jan. (p. 4).
- betulae et pruni*. **Fletcher**, T. B., Feuille jeune. Natural. (4.) An. 31, No. 363 p. 97. — Sind in England äusserst selten. **Oberthür**.
- damon*. Bemerk. zur Biologie. **Daecke**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 No. 1 p. 26—27.
- erybathis*. ♀ Beschr. **Godman**, Biol. Centr.-Amer. Rhopal. exot. II p. 715 pl. CXI Fig. 3, 4.
- hygela* **Hew. u. spec.** Fundorte nebst Bemerk. **Therese von Bayern** p. 271.
- micans* **Brem.** von Wei-Hai-Wei. **Fletcher** p. 156.
- myrtale* **Klug.** im Libanon erbeutet. Seit der Beschr. (1832) eine der am wenigst. bek. Form des paläarkt. Gebiets.
- var. *armena*. **Rebel**, Ann. Hofmus. Wien 16. Bd. p. 165.
- pruni*. Abundance of *Thecla pruni* and *T. w-album*. **Kenyes**, J. N., Entom. Record vol. 13 No. 9 p. 278.

- rubi L. Anscheinend der einzige Vertreter der Gatt. im Kreise Berent, West-Pr. **Treichel** p. 165.
- Stück mit creamgelb. Fleck auf den Vdflgl. von Wrotham, Kent. **The Entomologist** vol. 34 p. 259.
- *var. nordlandica* (die weissen Punkte der Useite d. Hflgl. fehlen, dadurch immaculata Fuchs ähnl. Es ist nämlich die Useite nicht grasgrün, sondern viel dunkler, bräunlich mit schwach grünlichem Anflug; auch die Oseite der Flgl. dunkler als gewöhl. Fühlerkolbe an der Spitze nahezu einfarbig. Auch erscheinen die Flgl. ein wenig mehr abgestumpft). **Strand**, *Nyt Mag. etc.* 39. Bd. 1901. p. 45—46 (Langöen, Loelingen). — Im arkt. Norwegen nur sehr sparsam: Süd-Varanger, Saltdalen, Vefsen). Bemerk. zu sonstig. Uebergangsformen.
- spinetorum. Beschr. **Godman**, *Biol. Centr.-Amer. Rhopal.* II p. 717 Fig 5, 6.
- spini Schiff. Ei. Abb. des Eies im Querschnitt. **Gillmer, M.**, *Insektenbörse*, 18. Jhg. p. 252.
- w-album in Shropshire. **Thornewill, Chas.**, *The Entomologist*, vol. 34 Aug. p. 231.
- Neu: **Weeks** beschreibt
- a) in den *Proc. New England Zool. Club* II: *sadieii* p. 101. — *lucaris* p. 102 (beide aus Bolivia);
- b) im *Canad. Entomol.* vol. 33: *harrietta* p. 294 (Bolivia);
- c) in den *Entom. News Philad.* vol. XII: *infrequens* p. 265. — *dieckiei* p. 266 (ebenfalls beide aus Bolivia).
- Godman** beschreibt u. bildet ab in der *Biol. Centr.-Amer. Rhopal.* II: *gaumeri* p. 714 Abb. Taf. CXI Fig. 1, 2. — *sesara* p. 722 Fig. 7, 8 (beide aus Mexiko).
- Uranothauma nubifer* in Munisu, 4150', interessant das nördl. Vorkommen dies. südl. Form, man würde eher *U. cordatus* erwartet haben. **Butler** (5) p. 200.
- Virachola zeloides* (= *Rapala zela* Butl. not Hew. 1896) (Untersch. v. *zela*) **Butler**, *Ann. Nat. Hist.* (7.) vol. 7. p. 289 ♂ (Kasungu Mountain, Nyika, 5345').
- Zizera maha* Koll. von Wei-Hai-Wei. **Fletcher** p. 156. — otis. Beschr. von Raupe u. Puppe. **de Nicéville**, *Journ. Asiat. Soc. Bengal* vol. 69 p. 236.

Hesperitidae.

- Hesperitidae von Munisu, 4150'. **Butler** (5) p. 203. — 7 sp.
- von Central-Afrika. **Sharpe**, *Ann. Nat. Hist.* (7) vol. 8 p. 284. — 1 sp. v. *Rhopalocampta*.
- vom Wege zwischen Mombasa u. den Taveta-Wäldern: *Tagiades* (1), *Pyr-gus* (1), *Parosmodes* (1), *Acleros* (1), *Andronymus* (1), *Kedestes* (1), *Baoris* (1), *Parnara* (1), *Ceratrachia*(?) (1). **Butler**, *Ann. Nat. Hist.* (7) p. 34—35.
- Abantis arctomarginata* (*A. bismarcki* Karsch sehr nahe, unterschieden von ders. durch den stark gestreckt. hyal. Fleck zwisch. mittl. u. hinter. Medianader u. die viel schmäleren schwarz. Säume der Hflgl.). **Lathy**, *Trans. Entom. Soc. London*, 1901, p. 34 ♂ Taf. III Fig. 7 (Zomba, Centr.-Afr.).

- *nigeriana* (verw. m. *zambeziaea*, *paradisea* u. *A. plerotica*). **Butler**, *Ann. Nat. Hist.* (7) vol. 8 p. 59—60 (Northern Nigeria).
- Achlyodes fredericus** Hb. Fundorte. (S. Am.). **Therese von Bayern** p. 274. — Als neu beschreibt **Weeks** in den *Proc. New England Zool. Club* vol. II: *guilfordi* p. 106. — *fera* p. 107. — *seatoni* p. 108 (sämmtlich aus Bolivia).
- ? **Actaea adopaea** am Galgenberg, Hildesheim. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 261.
- ? **Adopaea actaeon** bei Hildesheim. — cf. Insektenbörse 18. Jhg. p. 261.
- Anisochonia albiplaga** Feld. Fundorte. (S. Am.). **Therese von Bayern** p. 274.
- Antigonus nearchus** Latr. Fundorte. (S. Am.). **Therese von Bayern** p. 244.
- Artines** n. g. **Godman**, *Biol. Centr. Amer. Rhopal.* II. p. 608. — *atizies* p. 608 pl. CIII Fig. 49, 50 (Central- u. S. Amer.).
- Baoris philippina**. Raupe. Puppe. **de Nicéville**, *Journ. Asiat. Soc. Bengal* vol. 69 p. 274. — Neu: *cana* (steht *B. fatuellus* Hopff. nahe, verschieden durch stärkere olivengrüne Grundfärbung beider Vflgl. oberseits u. das weissgraue Aussehen der Unterseite). **Lathy**, *Trans. Entom. Soc. London*, 1901 p. 35 ♂ Taf. III Fig. 8 (Zomba, Centr.-Afr.).
- Bungalotis heras** ♀. **Godman**, *Biol. Centr.-Amer. Rhop.* II p. 737 pl. CXII Fig. 13, 14.
- Butleria auripennis** Blanch. unserem *Heteropterus (Cyclopides) morpheus* Pall. verw. Form mit völlig metallisch-goldiger Unterseite. *Berlin. Entom. Zeitschr.* 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900. 26. Apr. (p. 17). — *duovata* **Weeks**, *Proc. New England Zool. Club.* II p. 89 (Bolivia).
- Callimormus**. Charakt. d. Gatt. **Godman**, *Biol. Centr.-Amer. Rhop.* II. p. 603. — *juventus* Abb. Taf. CIII Fig. 28—31. — *filata* Fig. 32, 33. — *gracilis* Fig. 34. — *corades* Fig. 35—37.
- Caprona adelica**. Die am Yelva Lake, Borgu gesammelten Stücke stimmen mit **Karsch's** Abb. d. ♀, u. es ist deshalb wahrscheinlich, dass **Mabille** beide sp. unter dem Namen *Stethotrix heterogyna* verwechselt hat, u. dass *C. adelica* wirklich von *C. pilaana* verschieden, oder *C. pil.* die Form der Regenzeit, u. *C. adelica* die der trockenen Jahreszeit ist. **Butler**, *Ann. Nat. Hist.* (7) vol. 8 p. 58—59.
- Carterocephalus palaemon** var. Hflgl. dunkel, mit Ausnahme eines deutlichen orangegelben Flecks. *The Entomologist*, vol. 34 p. 131.
- Carystes deleta** H.-Sch. u. *coryna* Hew. Fundorte nebst Bemerk. **Therese von Bayern** p. 275—276.
- Carystoides** n. g. (Type: *Hesperia basochesi*) **Godmann**, *Biol. Centr.-Amer. Rhopal.* II. p. 611. Abb. pl. CIV Fig. 8—11.
- Cecropterus zarez** Hb. Fundorte. (S. Am.). **Therese von Bayern**, p. 274.
- Ceratrachia** (?) *stellata* Mab. Hollands Vermuthung, dass *C. punctulata* Butl. eine Var. der gen. Sp. ist, wird von **Butl.** widersprochen; *punctul.* ist kräftiger etc. **Butler**, *Ann. Nat. Hist.* (7) p. 35.
- Coeliades**. Charakt. d. Gatt. **Godman**, *Biol. Centr.-Amer. Rhopal.* II. p. 591. — *ficella*. Abb. Taf. CII Fig. 33—36.
- Cyclopaedes palaemon** ♂. Teratologisches Stück. **Hampson**, *Entom. Monthly Mag.* (2) vol. 12 (37) p. 120.
- Cyclopides morpheus**, neu f. Schlesien, gef. bei Wehrse, Kr. Guhrau, auf feucht Waldboden. *Zeitschr. f. Entom.* Breslau, 1901 p. 1V—V.

- Cyamaenes malitiosa* **Godman**, Biol. Centr.-Amer. Rhopal. II Abb. Taf. CII Fig. 41—43. — *lutulenta* Fig. 44, 45. — *silius* Taf. CIII Fig. 4—6. — *berus* Fig. 7—10. — Neu: *syraces* p. 595 Taf. CIII Fig. 1—3.
- Damas* n. g. (Type: *Goniloba clavus*) **Godman**, t. c. p. 621 Abb. Taf. CV Fig. 1—4.
- Dion* n. g. (Type: *Carystus gemmatus* Butl.) **Godman**, t. c. p. 592 Abb. Taf. CII Fig. 37, 38.
- Diphoridas phalaenoides* Hb. Fundorte (S. Am.) **Therese von Bayern** p. 274.
- Eagris ochreana* (verw. m. *E. denuba* Ploetz, doch in folg. Punkten verschieden: die beiden unteren (lower) subapikalen hyalin. Flecken fehlen; Vflgl. mit bronzefarb. Reflex, Hflgl. ohne weisses Feld u. submargin. Flecke, wie bei *E. phyllophila* Trim. Hflgl. unterseits stärker ockergelb als bei *E. denuba*; schwarz. Zeichn. kleiner, der Apikalfleck nur wenig dunkler als die Grundfarbe). **Lathy**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 34 Taf. III Fig. 6 (Zomba, Centr.-Afr.).
- Enosis quadrinotata* **Godman**, Biol. Centr.-Amer. Rhopal. II p. 610 Abb. pl. CIV Fig. 7.
- Epeus* n. g. **Godman**, t. c. p. 601. — *veleda* p. 601 Abb. pl. CIII Fig. 21—23. (Mexico).
- Eprius* *nom. nov.* für *Epeus* (siehe vorher). **Godman**, t. c. p. 741.
- Eudamus*. **Therese von Bayern** bringt Fundorte nebst Bemerk. zu folg. Sp.: *simplicius* Stoll., *eurycles* Latr. (= *Urbanus fortis dorantes* Hb.) p. 272. — *undulatus* Hew. u. *catillus* Cram. p. 273.
— *biollegi*. Charakt. **Godman**, t. c. p. 732 Abb. Taf. CXII Fig. 5, 6.
Neu: *cachinnans* **Godman**, t. c. p. 732 Abb. Taf. CXII Fig. 3, 4.
- Eutocus* n. g. **Godman**, Biol. Centr. Amer. Rhopal. II p. 599. — *phthia* p. 600 Abb. Taf. CIII Fig. 18—20. — *volasus* p. 600 (beide aus Central-Amerika).
- Falga sciras* **Godman**, t. c. p. 610 Abb. Taf. CIV Fig. 5, 6.
- Flaccilla* n. g. (Type *Pap. aecas* Cram.) **Godman**, t. c. p. 593 Abb. Taf. CII Fig. 39—40.
- Gorgythion difficilis* **Weeks**, Proc. New England Zool. Club vol. II p. 81 (Bolivia).
- Halpe hirtacus*. Raupe, Puppe. **de Nicéville**, Journ. Asiat. Soc. Bengal, vol. 69 p. 270.
- Hasora alexis*. **de Nicéville** beschreibt in Journ. Asiat. Soc. Bengal, vol. 69 p. 259 die Raupen u. Puppen von: *butleri* p. 260. — *chabrona* p. 262. — *badra* p. 263.
- Hesperia comma*. Biologie. **Frohawk**, The Entomologist, vol. 34 p. 325—330.
— (*Syrichthus*) *maculatus* Brem. u. *sinicus* Butl. von Wei-Hai-Wei. The Entomologist, vol. 34 p. 174.
— (= *Syrichthus*) *syrichthus* F. Fundorte, nebst Bemerkung. **Therese von Bayern** p. 274—275. — (*Syr.*) *domicella* Er. — (*Syr.*) *notata* Blanch. p. 275.
— *sylvanus*. **Marshall, A.** hat sie noch nicht auf gelbem Stechginster (Yellow gorse) gesehen. The Entomologist, vol. 34, July, p. 205.
— (*Thymelicus*) *thauamas*, blass strohgelbes Stück. The Entomologist, vol. 34 p. 30.
— Aberration of *Thymelicus thauماسi*. **Hill, S. G.** Entom. Record vol. 13 No. 12 p. 359.

- Heteropia cyda*. **Godman**, Biol. Centr.-Amer. Rhopal. II p. 734 Taf. CXII Fig. 7, 8.
- Hyarotis adrastus*. Erste Stände. **de Nicéville**, Journ. Asiat. Soc. Bengal vol. 69 p. 272.
- Hylephila phylaeus* Drury n. (?) dictynna Gdm. Salv. Fundorte nebst Bemerk. **Therese von Bayern** p. 275.
- Jemadia hewitsoni* Mab. Fundorte. **Therese von Bayern** p. 272. — *licinus*. **Godman**, Biol. Centr.-Amer. Rhopal. II p. 731.
- Kedestes protensa* (verw. mit *tucusa*; die schwarzen Flecke der Diskalreihe der der Hflgl. bilden kein reguläres W wie bei *tuc.*). **Butler**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 60 (Northern Nigeria).
- Lycas* n. g. **Godman**, Biol. Centr.-Amer. Rhopal. II p. 618. — (Typen: *Hesperia argentea* u. *ceraca*). — *argentea* Abb. pl. CIV Fig. 29, 30.
- Lychnucoides* n. g. (Type: *Hesperia saptine*) **Godman**, t. c. p. 612 Abb. Tafel CIV Fig. 12—15.
- Megaleas* n. g. (Type: *Hesperia syrna*) **Godman**, t. c. p. 617 Abb. Taf. CIV Fig. 27—28.
- Mesodina* n. g. Hesper. (Trapezites u. Telesto sehr nahe, von beiden verschied. durch das Fehlen d. mittl. Sporen d. Hinterbeine. — Type: *halyzia* Hew.) **Meyrick**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 168. — *aeluropis* p. 168 ♂ (Austral., N. S. Wales: Katoomba in the Blue Mountains).
- Methionopsis* n. g. **Godman**, Biol. Centr.-Amer. Rhopal. II p. 598. — *modestus* p. 598 Abb. Taf. CIII Fig. 14—16. — *typhon* p. 599 Abb. tab. cit. Fig. 17 (beide aus Central-America).
- Mnaseas* n. g. (Type: *Thymelicus bicolor* Mal.) **Godman**, t. c. p. 597 Abb. Tafel CIII Fig. 11—13.
- Mnasicles* n. g. **Godman**, Biol. Centr. - Amer. Rhopal. II p. 602. — *geta* p. 602 Abb. Taf. CIII Fig. 24—26. — *hicetaon* p. 603 Taf. CIII Fig. 27.
- Mnestheus* n. g. (Type *Phlebodes ittona*) **Godman**, t. c. p. 606. — *ittona* Abb. Taf. CIII Fig. 38—41. — *ludens* Abb. tab. cit. Fig. 45, 46. — Neu: *cometho* p. 607 (Mexico).
- Nascus phocus* ♀ var. **Godman**, t. c. p. 735 Abb. Taf. CXII Fig. 11, 12.
- Nisionades tithoneta* **Weeks**, Canad. Entom. vol. 33 p. 323 (Bolivia).
- Orphe* n. g. (Type: *Hesperia gerasa*) **Godman**, Biol. Centr. - Amer. Rhopal. II p. 619. — *vatinius* n. sp. p. 619 Abb. Taf. CIV Fig. 31, 32.
- Orses* n. g. (Type: *Hesperia cynisca*) **Godman**, t. c. p. 621 Abb. Taf. CV Fig. 5, 6. — *iricolor* p. 623 Abb. tab. cit. Fig. 7, 8.
- Pamphila*. Type. **Aurivillius**, Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 250.
guttata Brem. u. *sinensis* von Wei-Hai-Wei. The Entomologist vol. 34 p. 174. (Carterocephalus) *palaemon* Pall. bei St. Goarshausen, recht selten. **Wendlandt** p. 81.
- silvius*. Vorkommen in der Umgegend von Hildesheim bestätigt (cf. Seitz, Zool. Centralbl. 1897, Aug.). Insektenbörse 18. Jhg. p. 261.
- Weeks** beschreibt eine Reihe neuer Arten aus Bolivia u. zwar:
- a) in Proc. New England Zool. Club vol. II: *errator* p. 73. — *coroicana* p. 79. — *vesana* p. 80. — *viridenex* p. 80. — *alleni* p. 85. — *idee* p. 86. — *reedi* p. 86. — *brinquenydam* p. 87. — *milesi* p. 88. — *artiei* p. 91. — *coroiconensis* p. 92. — *warreni* p. 92. — *serenus*

- p. 93. — *allianca* p. 93. — *septimanus* p. 94. — *planus* p. 95. — *taberi* p. 95. — *leopardus* p. 96. — *hurleyi* p. 97.
- b) in den Entom. News Philad. vol. XII: *cusillumia* p. 267.
- c) in den Trans. Amer. Entom. Soc. vol. XXVII: *cuadrada* p. 359.
- d) im Canad. Entom. vol. 33: *argentea* p. 296.
- Parosmodes numa* (verw. m. *P. icteria* Mab.) **Druce**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 432—433 ♂ (East Afr., Dar-es-Salaam).
- Pedestes submaculata*. Erste Stände. **de Nicéville**, Journ. Asiat. Soc. Bengal vol. 69 p. 268.
- Perichares*. Charakt. **Godman**, Biol. Centr.-Amer. Rhopal. II p. 630. — *corydon* Abb. Taf. CVI Fig. 14, 15. — *lotus* tab. cit. Fig. 18—22. — Neu: *agrippe* p. 632 Taf. CVI Fig. 16, 17 (Nicaragua).
- Phocides* (= *Erycides*) *pygmalion* Cram. Fundorte. **Therese von Bayern** p. 273.
- Pyrgus pelagica* **Weeks**, Illustr. etc. p. 4 Abb. Taf. I Fig. 5. — *syrichthus*. Raupe. **Swainson**, Journ. New York Entom. Soc. vol. IX p. 80.
- Pyrrhopyge gellias*. Besch. **Godman**, Biol. Centr.-Amer. Rhopal. II p. 731 Abb. Taf. CXII Fig. 1, 2.
- Pyrrhopygopsis* n. g. (Type: *Pyrrhopyge socrates*) **Godman**, t. c. p. 634. — *oratus* Abb. Taf. CVI Fig. 27—30. — *reedii* **Weeks**, Canad. Entom. vol. 33 p. 295 (Bolivia).
- Pythonides* (*Zopyrion*) *satyrina* Feld. u. (*Gorgythion*) *pyralina* Hopf. Fundorte nebst Bemerk. **Therese von Bayern** p. 273.
- hirta* **Weeks**, Canad. Entom. vol. 33 p. 321 (Columbia).
- Syrichthus andromedae* Wallgr. Bemerkenswert die späte Flugzeit des von Strand erbeuteten Stückes. **Strand**, Nyt. Mag. etc. 39. Bd. 1901 p. 52.
- malvae* (alveolus) var. *taras* (Isle of Wight). **Mitford, R. S.**, The Entomologist vol. 34 July p. 207.
- Talides sergestus* **Godman**, Biol. Centr.-Amer. Rhopal. II p. 633 Abb. Taf. CVI Fig. 23, 24. — var. ♂ Abb. Fig. 25, 26.
- Telegonus finitimus* **Weeks**, Proc. New England Zool. Club, vol. II p. 104. — *tritonae* p. 105 (beide aus Bolivia).
- Thanaos* (*Nisoniades*) *montanus* Brem. von Wei-Hai-Wei. **Fletcher**, The Entomologist vol. 34 p. 174.
- Themesion* n. g. (Type: *Hesperia certima*) **Godman**, Biol. Centr.-Amer. Rhopal. II p. 614. — *certima* p. 614 Abb. Taf. CIV Fig. 18, 19. — *orbis* p. 615 Taf. CIV Fig. 20, 21.
- Thracides*. Charakt. **Godman**, t. c. p. 623. — Abb. folg. Spp. auf Taf. CV: *phidon* Fig. 9, 10. — *deceptus* Fig. 11, 12. — *luda* Fig. 13—15. — *henricus* Fig. 21—23. — *aroma* Fig. 24—26. — *aurifer* Fig. 27, 28. — Auf Taf. CVI: *placens* Fig. 1, 2. — *salius* Fig. 3—5. — *longirostris* Fig. 6—9. — *chiomara* Fig. 10.
- Neu sind: *molion* p. 625 Abb. Taf. CV Fig. 16—18. — *seron* p. 625 Abb. tab. cit. Fig. 19, 20. — *polles* p. 627 tab. cit. Fig. 29, 30. — *xanthura* p. 630 Abb. Taf. CVI Fig. 11—13 (sämtlich aus Central-America).
- Thymele polias* **Godman**, t. c. p. 735 Abb. Taf. CXII Fig. 9—10 (Panama).
- Thymelicus thaumas* siehe *Hesperia*.
- Tisias* n. g. (Type: *Proteides myna*). **Godman**, t. c. p. 613 Abb. Taf. CIV Fig. 16, 17.

- Turesis* n. g. (Type: *Hesperia lucas*) **Godman**, t. c. p. 616 Abb. Taf. CIV Fig. 22, 23. — Neu: *theate* p. 617 Abb. tab. cit. Fig. 24—26.
- Vettius* n. g. (Type: *Papilio phyllus* Cram.) **Godman**, t. c. p. 589. — Abb.: *phyllus* Taf. CII Fig. 28, 29. — *lafresnayi* Fig. 30—32.
- Zenis minos* **Godman**, t. c. Abb. Taf. CII Fig. 24—27.

Heterocera.

Sphingidae.

- Heterocera. Abb. von Raupen spec.? **Peters**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. Hft. 6 Taf. IX Fig. 4 Raupe. — Hft. 10 Taf. X: Fig. 2. Raupe. — Fig. 3. Raupe. — Fig. 4. Raupe, Fig. 4a Raupen (in Mehrzahl) fressend.
- Sphingidae von Central-Afrika. **Sharpe**, Ann. Nat. Hist. (7.) vol. 8 p. 284. — 1 Sp. v. *Chaerocampta*.
- von den Bahamas. **Hampson** (2) p. 250—251 6 Spp.
- at Hampstead. **Hopson, Montagu F.**, Entom. Record, vol. 13 No. 12 p. 373—374.
- Auf Trinidad vertreten durch die Gatt. *Protoparce* (3), *Pseudosphinx* (1), *Diludia* (1), *Dilophonota* (1) **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London 1901 p. 139.
- at Ringwood. **Fowler, J. Hy.**, The Entomologist, vol. 34 Nov. p. 320—321.
- Acherontia atropos*. Remarques sur l'Ach. atrop. (par **J. Fallou, G. Knockaert, H. Girandeaun, X. Raspail**). Le Naturaliste, 7. Ann. No. 23 p. 181—182.
- Bemerk.: **Moss**. Titel siehe p. 763 dieses Berichts unter *Colias edusa*.
- Auch **Burrows** (3).
- Fundorte:
- in Salop. **Thornewill, Chas. F.**, The Entomologist, vol. 34 Jan. p. 20.
- in Kendal District. **Moss, A. M.**, t. c. p. 20. — in Yorkshire **Hewett, W.**, t. c. p. 20—21. — in Scotland. t. c. p. 21.
- in Suffolk. **Bakes, H. W.**, t. c. Febr. p. 55. — in North Staffordshire. **Woodforde, F. C.**, t. c. p. 55—56. — in North England. **Oliver, G. B.**, t. c. March, p. 99. — in Warwickshire. **Baker, Chas.**, t. c. p. 100.
- in Northumberland, 1900. **Bolam, George**, t. c. p. 100. — on rearing (Zucht). **Pickard, Cambridge, O.**, t. c. Aug. p. 227. — in the Harwich District. **Mathew, Gervase, F.**, p. 281—283. — in Kent. **Colthrup, C. W.**, t. c. Oct. p. 294. — in Norfolk. **Moss, Arthur, Miles.**, t. c. p. 294, desgl. **Woolhouse, J. W.**, t. c. p. 294. — Larvae: a variety. **May, Albert**, t. c. Nov. p. 317—318. — in Cornwall. **Rollason, W. A.**, t. c. Nov. p. 318. — in Sussex. **Lawrance, A. J.**, t. c. Nov. p. 318. — in Yorkshire. **Walsh, Geo. B.**, t. c. p. 318. — in South Africa. **Leigh, G. F.**, t. c. Dec. p. 348. — in Durham. **Robson, J. E.**, t. c. Dec. p. 353.
- in Dumbartonshire. **Malloch, J. R.**, Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 12 (37) p. 258, desgl. **Evans, W. Edgard**, t. c. p. 276.
- near Chelmsford, **Eizabeth, Miller**; near Petersborough **T. M. Cottam**; in Kent, **L. W. Newmann** and **A. Russell**; in the Northern Counties of England and Southern Scotland, **J. W. Tutt**, Entom. Record, vol. 12 No. 10 p. 275—276, at Carnforth, **H. Murray** etc. *ibid.* No. 11 p. 302.

- at Bexley, **L. W. Newmann**; in Guernsey, **F. E. Lowe**; in Hampstead, **M. F. Hopson**; in Essex, **C. R. N. Burrows**; at Ponde de l'Arche (Eure), **L. Dupon**, Entom. Record, vol. 12 No. 12 p. 346.
- at Shepperton **S. G. C. Russel**, Entom. Record, vol. 13 No. 9 p. 277. — at Doncaster **H. H. Corbett**, ibid. p. 279.
- in Guernsey **Lowe, T. E.**, Entom. Record, vol. 13 No. 12 p. 375.
- in the Wisbech District in 1900. **Glenny, Freder**, Entom. Record, vol. 13 No. 5 p. 156—158.
- Benennung: Raupe: „Kartoffelhund.“ Falter: „Wolfsfalter“ oder „Honigwolf.“ Insektenbörse, 18. Jhg. p. 68.
- Nahrung: Nimmt der Schmetterling Nahrung zu sich? Noch nicht am Köder gefangen. Zeitschr. f. Entom. Breslau, 1900 p. XIX. Siehe unter Schaden (weiter unten).
- Raupe auf Nussbaum. **Stephan, J.**, Entom. Jahrb. (Krancher) 11. Jhg. p. 29.

Die Raupe ist polyphag. Man hat sie bis jetzt gefunden auf *Lycium barbarum* (Teufelszwirn), *Fraxinus excelsior* (Esche), *Evonymus europaeus* (Pfaffenhütchen), *Datura stramonium* (Stechapfel), *Syringa vulgaris* (Flieder), *Daucus carota* (Möhre), *Rubia tinctorum* (Färberröthe), *Philadelphus coronarius* (Pfeifenstrauch, Jasmin), *Pirus malus* (Apfel), dazu neu *Juglans regia* (Walnuss).

- Schaden: Als Schädling. In Norddeutschland nicht, aber im Süden Europas. So wurde in Nord Italien ein guter Bienenstand von 20 Stücken total ruiniert. **Dr. Krancher**, der darüber im Entom. Jahrb. 11. Jhg. p. 101 berichtet, erhielt auf diese Weise gegen 250 Acher.-Schmetterl., deren Leiber alle mit Honig gefüllt waren.
- Stimme: **Chapman**, Cry of. Entom. Record, vol. 13 No. 4 p. 127—128. Stimme mit Stethoscop untersucht. Ref. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 140. — Beim Abschneiden des Rüssels hört der Ton auf. Der Ton wird durch Luft hervorgebracht, die der Schmetterling aus einer Höhlung, welche an der Basis mit ein. schmal. Spalt versehen ist, in den Rüssel bläst.
- Ausschlüpfen: **Cowl, M. E.** Emergence in 1900. Entom. Record, vol. 13 No. 5 p. 155.
- Zucht: On rearing *Acherontia atropos*. **Cambridge, O. Pickard**, The Entomologist, vol. 34 Aug. p. 227.
- Puppengewicht: Note on the weight of pupae. **Fryer, Herb. Fortescue**, Entom. Monthly Mag. (2.) vol. (12) 37 April p. 100. — Das höhere Gewicht von Oktober-Puppen ist zu notiren. Es wurden gewogen:

	Höchstes	Geringstes	Durchschnitt.
14 im Sept.	11,945	7,706	9,004
7 im Okt.	12,515	8,387	10,340
Durchschnittsgew. von 21 Puppen 9,472			

Nach ein. Notiz des Herausgeber des Entom. Monthly Mag. ist Alter u. Geschlecht der Puppen festzustellen, wegen ihres Einflusses auf das Gewicht. Vergl. hierzu **Meldola**, Ann. Nat. Hist. (4) vol. 12 (1873).

- Variation: gezogen, ein sehr blasses Stück u. eins mit sehr breiter, dunkler Zeichnung. *The Entomologist*, vol. 34 p. 62.
- Larvae: a Variety. **May, Alb.**, *The Entomologist*, vol. 34 Nov. p. 317—318.

Ambulyx trisecta (sehr leicht kenntl. Sp. Von den 3 Querlinien auf d. Oseite der Vflgl. liegt die 1. vor d. Mitte, d. 2. hinter d. Mitte, die 3. nahe am Saume, mit dem sie jedoch nicht parallel ist. Die 1. u. 2. erreichen den Hrand, die 3. nur Rippe 2. Am Hrand liegt im Feld 1b zwisch. d. 2. u. d. 3. Querlinie ein dunkler Flecken. Die taschenförm. angeordneten Cilien der Fühler sind gut entwickelt u. d. Hschiene haben 4 sehr lange Sporen). **Aurivillius**, *Entom. Tidskr.* 22. Årg. p. 119—120 ♂ (Congogebiet: Zongo Mokoanghay). — strigilis auf Trinidad. **Kaye**, *Trans. Entom. Soc. London*, 1901, p. 138.

Amphonyx antaeus Drury. *Biologie*. **Dyar** (3).

Anceryx scyron Stoll. *Beschr.* **Kaye**, (1) p. 138—139 Taf. 5 Fig. 12.

Ceratomyia amyntor. Erste Stände. **Beutenmüller**, *Journ. New York Entom. Soc.* vol. IX p. 88.

Choerocampa. Auf Trinidad vertreten durch die Spp. tyndarus Bois., neoptolemus Cram. u. tersa L. **Kaye**, *Trans. Entom. Soc. London*, 1901 p. 138.

celerio. Ob celerio wirklich nur Gast in Ungarn u. Deutschland? **Abaff-Aigner** (19) p. 227. — in Wiltshire. **Solly, R. V.**, *The Entomologist*, vol. 34 Nov. p. 318.

elpenor. Early appearance. **Vaughan, J. W.**, t. c. March, p. 100; — var. ♂ gezogen, purpurfarb. Hflgl., ein anderes mit purpurner Zeichnung auf den Vflgl. *The Entomologist*, vol. 34 p. 360. — siehe ferner *Deilephila*.

nerii L. in Scotland. *The Entomologist*, vol. 34 Febr. p. 56.

— near Barrhead. **DalGLISH, AND. ADIE.**, *Ann. Scott. Nat. Hist.* 1901. Jan. p. 52.

— siehe ferner unter *Deilephila* u. *Sphinx nerii*.

tersa L. Fundorte etc. **Therese von Bayern**, p. 276. — ceratomioides Grote et Rob. desgl. p. 276.

Cocytius (Amphonyx) medor Stoll. Fundorte etc. **Therese von Bayern**, p. 277.

Daremma catalpae. Raupe. **Rowley**, *Entom. News Philad.* vol. XII p. 12—14.

Deilephila alecto L. Zweimaliges Besprengen der Puppen täglich sehr angebracht, zur Erzielung guter Zuchtergebnisse. *Berl. Entom. Zeitschr.* 47. Bd. Sitz.-Ber. f. 1901. 23. Mai. — cf. *Insektenbörse* 18. Jhg. p. 253.

- Hybriden: Ueber einige neue Schweizerische Bastarde des Sphingiden-Genus *Deilephila* und die Entdeckung abgeleiteter Hybriden in der Natur, sowie Beschreibung einer neuen Varietät von *Deilephila vespertilio* Esp. **Mory, Eric**, *Mittheil. Schweiz. Entom. Ges.* 10. Bd. 8. Hft. p. 333—359—360. — Auszug in: *Insekten-Börse*, 18. Jhg. No. 27 p. 209—210. — Ausz. von Chr. Schröder. *Allgem. Zeitschr. f. Entom.* 6. Bd. No. 16 (17) p. 270.

Bisher 2 Bastarde aus der Gatt. *Deilephila* in der Natur gefangen

$$\text{epilobii B.} = \left(\frac{\text{vespertilio } \text{♀}}{\text{euphorbiae } \text{♂}} \right) \text{ und } \text{vespertilioides B.} = \left(\frac{\text{vespertilio } \text{♀}}{\text{hippophaes } \text{♂}} \right),$$

dazu kürzlich von Bartels hybr. standfussi = $\left(\frac{\text{elpenor } \text{♀}}{\text{porcellus } \text{♂}}\right)$. Aus Raupen,

die 1900 in Hünningen im Oberelsass auf *Epilobium rosmarinifolium* gefunden waren u. sich schon als solche von Bastarden erwiesen, zog Mory Falter, die wie er nachweist, aus *epilobii* ♂ × *vespertilio* ♀ hervorgegangen sind. Er nennt sie *hybr. eugeni* n., der erste „abgeleitete“, „sekundäre“ Bastard, ein Bastard zweiter Ordnung. Dazwischen fanden sich (vielleicht aus drei hornlosen Raupen hervorgegangen) mutmaassliche Bastarde dritter Ordnung,

die er *hybr. lippei* n. nennt: $\left(\frac{\left(\frac{\text{euphorbiae } \text{♂}}{\text{vespertilio } \text{♀}}\right) \text{♂}}{\text{vespertilio } \text{♀}}\right)$ ♂ × *vespertilio* ♀,

alles als freilebende Formen bekannt. Bemerkenswerth ist, dass beide (sekundäre u. tertiäre Hybriden keine direkten sind, denn es paart sich das Bastard-♂ mit d. ♀ der Stammart, nicht mit dem Bastard-♀. Analog könnte ein allerdings von *D. vespert.* kaum unterscheidb. Bastard 4. Ordn. entstehen, es müsste sich denn die rothe Beschuppung des Vflgls. (Merkmal des tertiär. Bastards) vererben.

hybr. pauli n. aus *D. hippophaes* ♀ × *euphorbiae* ♂. Die Merkmale ders. erinnern an solche, die weit von ihrem Fundorte lebenden Arten *dahlia*, *tithymali* u. *mauretanicæ* zu finden sind. Annahme eines atavistischen Falles. — Vergl. hierzu die Bemerk. in der Insektenbörse, 18. Jhg. p. 209—210.

- *celerio* L. **Weissmantel** (3).
- *lineata* F. Fundorte in Columb. etc. **Therese von Bayern** p. 276.
- *elpenor* nicht selten in Kranst am Köder gefangen. *Zeitschr. f. Entom.* Breslau, 1900 p. XIX. — Siehe ferner *Choerocampa* u. *Sphinx nerii*.
- *livornica* at Cambridge. **Crisp, E.**, *Entom. Record*, vol. 13 No. 12 p. 376.
- *nerii*. Naturgeschichte. **Mocsáry, Weissmantel** u. **Aigner** in: *Rovart. Lapok* vol. VIII p. 85, 109—116, 136. — desgl. *Revue* p. 13. — **von Aigner-Abafi** (19). — Vorkommen. **Weissmantel** (4).
- A *Deilephila nerii*-röl. IV. **J. Jósa**, A. D. n. Deéses, **Bordan, St. A.** leanderpille *hazánk lakója* *Rovart. Lapok*, 8. köt. 7. füz. p. 136—138. — Ausz. D. n. in Deés. Der Oleanderfalter ist in Ungarn heimisch. Ausz. Hft. 7 p. 17.
- A *Deilephila nerii*-röl. I. A *Deilephila nerii* L. *életéhez*. **Mocsary, Alex.** *Rovart. Lapok*, 8. köt. 6. füz. p. 109—110. (Zur Biologie von D. n.).
- *nerii* L. Vorkommen, Heimathsrecht. Ist in Ungarn heimisch u. tritt in 2 Generationen auf. Auch weiter nördlich: Breslau, Ostpreussen, Beeskow in d. Mark, in grösseren Mengen Raupen gefunden. **Abafi-Aigner** (19). —
- An *Vinea maior* u. *minor* (Schlesien, Danzig), an *Cornus mas*, sonstige Bemerkungen nach **Abafi-Aigner**, *Insektenbörse* 18. Jhg. p. 305—306.
- Stück, dess. Flgl. theilweise wie ausgebleichen waren. Die bleiche Farbe ist nachgewiesenermassen durch sogen. Blüten einer and. Puppe beim Transport entstanden. *Berl. Entom. Zeitschr.* 47. Bd. Sitz.-Ber. f. 1901. 31. Okt. — *Insektenbörse*, 18. Jhg. p. 389.
- Dilina (Smerinthus) tiliae*. **Fletcher** (5). — ab. (Grundfarbe lichtgrau, Mittelflecken dunkelorange, Aussenrand hellgelb). **Wendlandt**, p. 77. — at *Hampstead*. *Entom. Record*, vol. 13 No. 9 p. 279.

- Dilophonota Abb. auf Petersen's Tafeln. Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. Hft. 6 Taf. IX: oenotrus Cr. Fig. 1 Raupe, Fig. 1a Puppe, piperis Boisld., Fig. 2 R., Fig. 2a ello L., Fig. 3 R., Fig. 3a ello Cr. (nec L.) Fig. 5 R., 5a P.
- Hemerophanes triptolemus Walk. **Peters**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. Hft. 10 Taf. X Fig. 1, 1a, b Raupe in versch. Stell., Vordertheil von vorn einem Schlangenkopfe gleichend, seith. einem Widderkopf ähnlich. — Fig. 1c Puppe.
- Lepisesia ulalume var. *rachel* n. **Bruce**, Entom. News Philad. vol. 12. Jan. p. 19.
- Lophostethus dumolinii ist eine Sphingide. Besonderheiten der Raupe. **Dyar**, Proc. Entom. Soc. Washington, vol. IV p. 440.
- Macroglossa Ochs. Contributo ad una monografia sul genere M. **Cannaviello**, **Enrico**, Riv. Ital. Sci. Nat. An. 21. No. 1 p. 10—17. — fusiformis. Note on Fundort: Fernside, Redhill, Surrey. **Beadnell**, **Herbert**, t. c. July p. 208. — stellatarum feeding at Flowers of Fuchsia. **Bower**, **B. A.** Entom. Record, vol. 13 No. 3 p. 111. — stellatarum, 1900 häufig. **Barrett**, **J. P.** The Entomologist, vol. 34. Jan. p. 22. — in Kilburn. **Walker**, **F. A.** t. c. p. 22. — in March. **Burrows**, Entom. Record, vol. 13 No. 5 p. 166. — in Cranbrook, Kent. **Marshall**, **A.** t. c. Febr. p. 56. — Note on (Fundort: Fernside, Redhill, Surrey). **Beadnell**, **Herbert**, t. c. July p. 208. — **Mackinnon**, **J. M. H.** t. c. Oct. p. 295. — in Thanet. **Barrett**, **J. P.** — stellatarum. Raupen in Bromley, Kent. Dreierlei Färb.: 1. schön nelkenroth, 2. grün mit weissen Linien, 3. sehr dunkel olivenf., fast schwarz. The Entomologist, vol. 34 p. 323. — frischgeschlüpfte Stücke tragen auf den Flgln. eine dichte bräunliche Beschuppung, die nach kürzester Flugzeit verloren geht. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900. 4. Okt. (p. 24).
- Macroglossinae. Auf Trinidad vertreten durch die Gatt. Enyo (2), Eupyrroglossum (1), Aellopus (1). **Lathy**, Trans. Entom. Soc. London, 1901. p. 140.
- Mellinia ocellaris at Mucking. **Burrows** (8).
- Pachylia lyres Hb. Abb. in Petersen's Taf. Illustr. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. Taf. IX Fig. 6 R., ficus L. Fig. 7 R., Fig. 7a P., ficus Cr. nec L. Fig. 8 u. 9 R.
- Philampelus satellitia L. Fundorte in Columb. etc. **Therese von Bayern** p. 277. — Neu: *elisa* **Smyth**, Entom. News Philad. vol. XII p. 106 Taf. IV (Mexico). — (Protoparce) rustica F., paphus Stoll. u. cingulata F. Fundorte nebst Bemerk. **Therese von Bayern** p. 277.
- Pseudosphinx tetrio L. u. spec. Raupen. Fundort. **Therese von Bayern**, p. 288.
- Smerinthus. Die ersten Stände der Hybriden. **Frings**, Soc. Entom. vol. XV p. 164.
- *hybr. Leoniae* Stdfs. (Resultat der Paarung von Smer. tiliae L. × ocellata L. ♀ [ca. 1000 Stück gezogen]; ähnelt mehr ersterer, als letzt. Zusammenstell. der Charaktere, die an die eine u. die andere Form erinnern; schlägt weit mehr nach der tiliae, denn nach der Mutter). **Standfuss**, Bull. Soc. Entom. France, 1901 p. 86—87. — *hybr. Fringsi* Stdfs. (aus Sm. atlantica Aust. ♂ × Sm. populi L. ♀, merkl. d. letzt. nahest. Zusammenstellung d. Charakt. nach beiden Richtungen hin. — Unterschiede von *hybr. hybridus* Westw. Der Hybr. nov. ist beträchtl. grösser, hat breitere Flgl. etc. Unterschiede dess. von dem Smer. atlantica Aust. u. dem riesenhaften [dem Sm. populi

- unserer Gegend entsprech.] hybr. metis Aust.) p. 87—89. — Ref. Insektenbörse 14. Jhg. p. 149.
- Hybrid *Smerinthus ocellatus* ♂ × *S. populi* ♀. **Newman, L. W.** Entom. Record, vol. 13 No. 12 p. 362.
- *geminatus*. Erste Stände. **Beutenmüller**, Journ. New York Entom. Soc. vol. IX p. 89.
- *ocellatus*. Stück bei Cranbrook, Kent. **Marshall, A.** The Entomologist, vol. 34. July, p. 205. — Rapide Entwicklung. Ein Stück in 3 Mon. vom Ei bis zum vollk. Insekt. **Stearns, Arth. E.** Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 258—259. — Sonderbare Aberr. **Tutt** (6).
- *populi*. Stridulation of, **Cowl, M. E.** Entom. Record, vol. 13 No. 5 p. 164.
- 2. Generation. **Oldaker, F. A.** The Entomologist, vol. 34. Dec. p. 354.
- 1 Stück, bei dem das Basalfeld der Hflgl. mit Gelb statt Dunkelroth untermischt ist. The Entomologist, vol. 34 p. 30. — Eine mit 2 hervorrag. Körnchen am vorletzten Hleibe [nach Abb. in Kranch. Jahrb. 1. Jhg. 1892 das ♂ andeutend] lieferte ein ♀. **Hess, P.** Entom. Jahrb. (Krancher) 11. Jhg. p. 202.
- *quercus* Schiff. **Aigner-Abafi** (17). — Zuchtnotizen (Zucht erfordert grosse Aufmerksamkeit).
- *tiliae*. Variationen. Gezogen im Mai 1900 u. 1901, darunter 1. ein ♂, bei dem der recht. Oberfl. (upper wing) gebändert, der linke 2 gewöhnl. Flecke zeigt — 2. ein gebändertes ♀ — 3. ♂ mit nur 1 Fleck u. 4. ein reichgefärbtes ♀. The Entomologist vol. 34 p. 209.
- ♀. Binde der Vflgl. fehlt, nur durch einen ganz kleinen Punkt angedeutet. — ♂, bei dem die Binde nur auf dem linken, etwas verkrüppelten Vflgl. fehlt. — 2 ♀, deren eins auf d. recht. Seite der Vflgl. eine wachsfarbige Grundfarbe hat, bei d. andern ist die Grundfarbe beider Vflgl. goldgelb statt feuerroth. **Ziegler**, Berl. Entom. Zeitschr. 47. Bd. Sitz.-Ber. für 1901. 7. Febr. — cf. Insektenbörse 18. Jhg. p. 93.
- — 2 Varr.: 1. Grundfärb. d. Vflgl. blassrehsbraun mit undeutl. Zeichnung, blassrothe Färb. auf den Hflgl. — 2. Grundfärb. d. Vflgl. dunkelbraun mit sehr intensiv grüner Zeichnung, das Band ist nur durch einen klein. Fleck repräsentirt. The Entomologist, vol. 34 p. 260.
- — ♀ mit asymmetr. gezeichnet. Vflgl. Am recht. Flgl. fehlt die Mittelbinde u. ist dieselbe nur durch einen Costalfleck vertreten. Sitz.-Ber. f. 1900. 18. März. cf. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 108.
- — Aberration. **Colthrup**, Entom. Record, vol. 13 No. 10 p. 297.

Scepsis fulvicollis Hb. Biologie. **Dyar** (3).

Sphinx convolvuli 1901 bei Karlsruhe zahlreich. **Gauckler**, Insektenbörse, 18. Jhg. p. 389. — at Eastbourne. **Adkin, R.**, The Entomologist vol. 34 Jan. p. 23. — in Scotland, t. c. p. 23. — in 1901. **Nash, W. Gifford** u. **Miller, J.**, t. c. Aug. p. 231. — Larvae at Maldon. **Fitch, A. Edw.**, t. c. Sept. p. 254, desgl. in Lancashire. **Grimshaw, F. J.**, t. c. p. 254—255. — in Essex. **Fitch, E. A.**, t. c. p. 255. — in Sussex. **Giles, L. S.**, t. c. p. 255. — Variation der Raupen. **Mathew**, t. c. p. 283. — at Bromley, Kent. **Hill, L. F.**, t. c. Oct. p. 294. — in Thanet. **Barrett, J. P.**, t. c. p. 294. — in Norfolk. **Woolhouse, J. W.** p. 294. — near Southampton p. 294—295. — in Surrey, t. c. p. 295. — in Sussex. **Mackinnon, J. M. H.**, t. c. p. 295. —

- in Scotland. **Brown, Henry H.** p. 295. — Pupa (von Sussex coast).
Frohawk, F. W. p. 295. — in London district. **Kitchener, Geo. P.** p. 295.
- — in 1901. Angaben zahlr. Autoren, folg. Gebiete betreffend: Berkshire (**Butler, W. E., Thornewill, Chas. F.**), Bucks (**Barton, W. H.**), Cornwall (**Rollason, W. A.**), Devonshire (**Main, Hugh u. Phillips, W. J. Leigh**), Dorsetshire (**Hyde, Ino T.**), Essex (**Harrison, A.**), Hampshire (**May, Alb., Crallan, G. E. J., Jenkyns, M. S.**), Hertfordshire (**Barraud, Philip J.**), Kent (**Lawrance, A. J., Chittenden, D.**), Middlesex (**Grosvenor, T. H. L., Spencer, L. A., Walch, Geo. B.**), Somerseshire (**Lawson, J. P.**), Suffolk (**Kidner, A. R., Walker, J. C., Pyett, Claude A.**), Worcestershire (**Edwards, W.**), t. c. p. 313—315. — in Northumberland. **Robson, John E.**, t. c. Dec. p. 353. — in Hampshire. **Hooker, W. G.**, t. c. p. 353.
- — in Piedmont. **J. W. Tutt**, at Boscombe **R. B. Robertson**, at Blackheat **W. Dannatt** etc. Entom. Record vol. 13 No. 12 p. 374—375.
- — Raupen in Yorkshire (Variabilität ders.). **Whitaker, J.**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 257—258. — in Surrey. **Goss, H.**, t. c. p. 258.
- — at Berwick-on-Tweed. **Bolam, Geo.**, Ann. Scott. Nat. Hist. 1901. Apr. p. 118.
- — at Eltham. **Jones, A. H.**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 275. — at Kingston on Thames. **Goss, H.**, t. c. p. 275. — at Hoylake. **Burgess Sopp, E. J.**, t. c. p. 275. — in Gloucestershire. t. c. p. 276. — at Woking. t. c. p. 276. — Raupe zu Guestling, Sussex. **Bloomfield, E. N.**, t. c. p. 276.
- — in East Lothian etc. **Evans, Wm.**, Ann. Scott. Nat. Hist. 1901. Oct. p. 239. — in East Dulwich. **Colthrup, C. W.**, Entom. Record vol. 13 No. 10 p. 306.
- — in Essex. **Burrows**, Entom. Record, vol. 13 No. 10 p. 305—306. — Raupen zu Boxworth. **Thornhill, E. H.** t. c. No. 9 p. 278.
- — Variation der Raupen auf Holy Island, Northumberland. **Embleton, Alice L.**, t. c. p. 297—298. — in Scotland. **William, Evans**, t. c. p. 298. — in the Isle of Wight. **Fox, C. W.**, t. c. p. 298. — in North Devon. **Longstaff, G. B.**, t. c. p. 298. — at Folkestone. Ungewönl. Vorkommen. **Judge, W. G.**, t. c. p. 299.
- — at Chichester. **J. Anderson**, at Angmering, Burgess Hill etc. **J. C. Dollman**, in Warwickshire **G. W. Wynn**, at Stratford **C. Murray**, in London Fields **J. Alderman**, at Folkestone **St. S. Hills**, at Chelmsford **E. Miller**, Entom. Record vol. 13 No. 11 p. 335—336.
- — in Kirkcudbrightshire. **Service, Rob.**, Ann. Scott. Nat. Hist. 1901. Oct. p. 238—239.
- — Fruchtbarkeit ders. in Holland. **Kallenbach**, Tijdschr. v. Entom. vol. XLIV p. 115—120.
- — Rüssel der Puppe. **Oudemans**, t. c. Verslag p. 11.
- — Variabilität der Raupen siehe oben unter **Mathew, Whitaker**, auch **Embleton**.
- — siehe *Acherontia atropos* **Gerv. F. Mathew**.

- drupiferarum. Photograph of the larva of . . . Entom. News vol. 11 Nov. p. 581.
- elpenor. Eine musikalische Raupe. **Müller** (1892).
- gemminatus. Erste Stände. **Beutenmüller** (8).
- gordius. Erste Stände. **Beutenmüller**, Journ. New York Entom. Soc. vol. IX p. 87.
- ligustri L., frisch entw. ♂ noch am 11. Sept. **Gaußler**, Insektenbörse, 18. Jhg. p. 388. — Im Juli erwachsen.
- — Pupation of Larvae. **Russell, A.**, Entom. Record, vol. 13 No. 4 p. 137—138. — lig. full fed in July. t. c. No. 10 p. 305.
- — Purple larvae of (purpurfarbig. Raupen). **Fitch, Edw.**, The Entomologist vol. 34 Sept. p. 254.
- nerii L., massenhaftes Vorkommen in Ostpreussen u. Beeskow, siehe p. 731 des Berichts in Anm. a u. b. — siehe ferner Choerocampa u. Deilephila nerii.
- ocellatus. Schnelle Entwickl. **Stearns, Arth. E.**
- pinastri. Eigentümliche einseitige Aberr. Mit 2 Fig. auf p. 165. **Burstert**. — Durch Einfluss übermässig feuchter Luft eingetretene Verdunkelung auf experimentellem Wege gewonnen.

Aegeriidae (oder *Sesiidae*).

- Sesiidae. Monographie nebst Abbildungen aller nordamerikanischen Arten. Ausführliche Bibliographie ders. **Beutenmüller**, Mem. Amer. Mus. pt. VI p. 217—352 pls. XXIX—XXXVI.
- Sesiidae or Aegeriidae. **Prout, Louis B.** Entom. Record. vol. 13 No. 4 p. 122—124. — von Nord-America. **W. F. K.** The Entomologist vol. 34. Oct. p. 289. — Puppen-Gehäuse. **Adkin** (2). — Hybriden: **Tutt** (8).
- Ceratocorema *aurania*. **Druce**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 4 p. 205 (Perak, 2000—3500'). — Aegeriide, zu p. 708 dies. Ber. f. 1899.
- Melittia satyriniformis Hübn. Note on. **Beutenmüller** (3).
- Sciapteron tabaniforme Rott. Auftreibung der Zweige. Zeigt sich bei Entfernung der Rinde Frass mit rundl. Kot vermischt, so handelt es sich um Sciapt. tabanif., mit längl. dagegen Larve von Saperda populnea. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. 7. Juni (p. 19).
- Sesia v. Aegeria. **Prout**, Entom. Record, vol. XIII p. 122—124.
- Bemerk. zu einigen Arten dieser Gatt. **de Joannis**, Bull. Soc. Entom. France 1901 p. 40—42. — Betrifft S. ichneumoniformis, megillaeformis und chrysidiformis (biolog. Notizen). S. megillae möglicherweise ein Kreuzungsprodukt beider. — Genista tinctoria ist eine Futterpfl. für ichneum. — megillaeformis eine Hebride.
- andreniformis in Kent. **Huggins, H.** The Entomologist vol. 34 Sept. p. 255; desgl. Entom. Record No. 10 p. 305.
- annellata Z., die Zucht und die ersten Stände. **Prinz, Joh.** 11. Jahresber. Wien. Entom. Ver. 1900. p. 109—112.
- arctica **Beutenmüller**. **Beutenmüller** (5).
- chrysidiformis Esp. Bemerk. zu Vorkommen u. Lebensweise. **Wendlandt**. p. 81.

- *deceptura* Butl. auf Trinidad. **Kaye** (1) p. 158.
 — *empiformis* Esp. var. *hungarica* n. **Tomala, Ferd.** (1).
 — *myopaeformis* on Pear. **Burrows, C. R. N.** Entom. Record, vol. 13 No. 7 p. 222.
 — *sigmoidea*. Biologie. **Joutel**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 No. 4 p. 190.
 — *spheciformis* Gerning. Stück bei Storaas in Tysfjorden, bisher im arktisch. Norwegen nicht beobachtet. **Strand**, Nyt Mag. etc. 39. Bd. 1901 p. 52.
 Neu ist: *mariona* **Beutenmüller**, Mem. Amer. Mus. vol. VI p. 308 pl. XXXIII Fig. 21 (Colorado).
Trochilium apiforme. Ei. **Chapman**, Entom. Record, vol. XIII p. 226. — *bembeciformis* at Mucking. **Burrows**, Entom. Record, vol. 13 No. 9 p. 278.

Bombyces

(einschliesslich Chalcosiidae, Agaristidae etc. excl. Uraniidae. — Epiplimidae siehe unter Geometridae.

Sarrothripinae siehe Noctuidae. — Thyrididae siehe Pyralidae).

Autoren: Aurivillius, Barnes, Beutenmüller, Chapman, Dognin, Druce, Dyar, Fischer, Foster, Fuchs, Girault, Hampson, Heylaerts, Illidge & Quail, Kaye, Konigsberger¹⁾, Lower, Lucas, Packard, Pagenstecher, Piepers & Snellen, Püngeler, Rothschild, Rothschild & Jordan, Schaus, Sonthonnax, Soule, Swainson, Swinhoe, Therese von Bayern, Verson, Warburg, Warren.

Phylogenetische Tabellen der Bombyciden-Familie u. der Epiplimidae: Dyar (19).

Familien und Gattungen: Hampson (5).

Lasiocampide, flügellose: Hampson²⁾.

Bombycide-Raupe spec.? Illustr. Zeitschr. f. Entom. 5. Bd. No. 11 Taf. VII Fig. 7. Raupe.

Acantharctia metaleuca **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 321 Taf. XLVI Fig. 18 (Ostafrika).

Acanthopsyche opacella: instinct altered when parasitised. **Chapman, T. A.** Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) March, p. 62—64. — Berichtigung hierzu t. c. p. 127.

Actias luna. The Cocoon-Cutter of . . . **Chapman, T. A.** Entom. Record vol. 13 No. 10 p. 300. — . . . p. 625 sub 29 lies *Actias* statt *Arctias*.

— *hybr. mortoni* (= *Actias luna* ♂ × *selene* ♀) Insektenbörse 18. Jhg. p. 243.

Aegocera brevivitta **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 600 Taf. LII Fig. 10. — *obliquisigna* p. 603 Taf. LIV Fig. 13. — *abyssinica* p. 604 tab. cit. Fig. 14 (alle drei aus Ostafrika).

Aemilia testudo **Hampson**, t. c. p. 185 Taf. XLII Fig. 21 (Peru). — *assignata* p. 185 Taf. XLII Fig. 21 (Brasilien).

¹⁾ **Konigsberger, J. C. & Zimmermann, A.** De dierlijke vijanden der Koffiecultuur op Java. Med. Plantentuin Java vol. XLIV Deel II p. 7—113 pls. I—VI.

²⁾ Proc. Entom. Soc. London, 1901 p. IX.

- Aethria analis* **Schaus**, Journ. New York Entom. Soc. vol. IX p. 42 (Peru). — *carnicauda* Bull. auf Trinidad **Lathy**, Trans. Entom. Soc. London 1901, p. 118.
- Afilia* n. g. **Schaus** (3) p. 319. — Type: *cinerea* n. sp. = *Cerura cinerea* Druce (nec Walk.) Biol. C. Amer. Het. I p. 241. — *cinerea* p. 320 ♂ ♀ Taf. XII Fig. 1. (Orizaba, Guadaluajara, Mexico).
- Agaristidae. Beschreibender Katalog, 225 Arten; Uebersichtstabelle über die Gatt. **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 517—520.
- von Centralafrika. **Sharpe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 285 2 Spp.
- in der Rheinpfalz. **Metzenauer, Ed.**, Insektenbörse 18. Jhg. No. 21 p. 160.
- Agliatau in den Buchenwäldern bei Kaiserslautern. **Metzenauer, Ed.**, Insektenbörse, 18. Jhg. p. 165.
- Agriochlora* n. g. Eupterotidarum. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 435. — *klagesi* p. 435 (Suapure, Caura River, Venezuela).
- Agylla holochrea* (441 a) **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7.) vol. 8 p. 182 ♂ ♀ (W.-China, Chang Yang). — *complanodes* (441 b) p. 182—183 ♀ (Brit. Centr. Afr. L. Nyasa).
- Altha rufipuncta* **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 253—254 ♂ (Nassau).
- Amastus phaeosoma* **Hampson**, Cat. Lep. Phal. vol. III p. 136 Taf. XXXIX Fig. 10. — *albipuncta* p. 136 tab. cit. Fig. 8. — *maculicincta* p. 136 tab. cit. Fig. 4. — *rhodatus* p. 140 tab. cit. Fig. 12 (sämtlich aus S.-Amer.).
- *coccinator* **Schaus**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 267 (Colombia). — *adela* p. 267—8 (Castro, Parana).
- *episcotosia* **Dognin**, Le Naturaliste, 1901 p. 69 (Chiriqui). — *polystrigata* p. 69 (Venezuela). — Beide werden auch Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 174 beschrieben.
- *antonio* **Dognin**, Le Naturaliste, 1901 p. 179 (Tucuman), — auch Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 304.
- Amaxia osmophora* **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 32. — *apyga* p. 33 Tafel XXXVI Fig. 7 (beide von Costa Rica). — *erythroleps* p. 34 tab. cit. Fig. 16 (Amazonas).
- Ametroptila* n. g. Drepanulidarum. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 190. — *semibrevis* p. 190 ♂ (Poeh Mts., Sarawak, Borneo).
- Ammalo ursula*. Illustr. Zeitschr. f. Entom. 5. Bd. No. 10 Taf. VI Fig. 3 Raupe, 3a Kokon.
- Amsacta grammiphlebia* **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III. p. 323 Taf. XLVI Fig. 4. (Mashonaland).
- Amurilla* nom. nov. für *Amuria Auriv.* nec Staud. **Aurivillius**, Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 251.
- Anaxita sophia* **Dognin**, Le Naturaliste, 1901 p. 31 u. Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 173 (Venezuela).
- Aneurocampa mingeus* H.-Sch. Illustr. Zeitschr. f. Entom. 5. Bd. No. 11 Taf. VII Fig. 6. Taf. VII Raupe.
- Animula* sp. (sehr nahe *A. Hübneri* Westw. von Austral.) **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 254 ♂ (Nassau).
- Anita* n. g. **Schaus** (7) p. 332. — Type: *basipuncta* p. 332 Taf. XII Fig. 8 (Aroa, Venezuela).
- Anomoetes nox* **Aurivillius**, Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 123 ♂ (Französisch Congo: Kuilu).

Antaea Hübn. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 342. — 2 Spp.; Type: juturna Cr. (1780).

Antarctia fervida **Schaus**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 269 (Petropolis, Castro, Brazil).

Antherea compta ♂ beschr. in Nov. Zool. Tring. VI, 431 [1899]. **Rothschild & Jordan**, Nov. Zool. Tring. vol. 8 p. 404 Taf. X Fig. 4 ♂. — pernyi G.-M. von Wei-Hai-Wei. **Fletcher**, The Entomologist, vol. 34 p. 198.

Bezeichnungen:

Antherea hybr. pernyama (= *A. pernyi* ♂ × *yamamai* ♀)

„ „ kirbyi (= *A. pernyi* ♂ × *roylei* ♀)

„ „ moorei (= *A. roylei* ♂ × *pernyi* ♀).

Insektenbörse, 18. Jhg. p. 243.

Anthrocera exulans. On a probable new Locality. **Sheldon, W. G.** Entom. Record, vol. 13 No. 4 p. 137—137.

— filipendulae. Aberration of. **Anderson, J.** Entom. Record, vol. 13 No. 12 p. 359

— trifolii. Larva of *Anthrocera* hibernating a second Winter. **Studd, E. F. C.** Entom. Record, vol. 13 No. 10 p. 307—308.

Antichloris eriphia F. auf Trinidad. **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London 1901, p. 118.

Anticyra rufovittata **Aurivillius**, Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 122 ♂ (Congo-gebiet).

Antiopha n. g. **Schaus** (7) p. 275. — *multilinea* p. 275 Type Abb. Taf. XI Fig. 3 ♀ (Rio Janeiro; Castro; Brazil). — *collaris* p. 275—276 (Castro, Parana).

Antiora Walk. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 266. — 1 Sp.; Type: subfulva Walk. (1856) = *Drymonia ochromixta* H.-S. (1856).

Anurocampa H.-S. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 266. — 1 Sp.; Type: *A. mingens* H.-S. (1854).

Aorista siehe *Uraniidae*.

Apatelodes basifulva **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 142 Taf. VI Fig. 17 (Trinidad).

fastidiosa **Dognin**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 308 (Tucuman).

(?) firmiana Cram. Raupen nebst Bemerk. Fundort. **Therese von Bayern** p. 289.

Apela Walk. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 327. — 1 Sp.; Type: *divisa* Walk. (1855) wurde irrthümlich als von Indien beschr.

Aphyle incarnata **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 20 (Amazonas).

Apteron (*Cochlophanes*) *crenulella* Brd. (*helix* Sieb.). Verschwinden der Art bei St. Goarshausen etc. **Wendlandt** p. 80—81. — Glaubt nicht an d. Parthenogenesis derselben.

Arachnis zuni. Eier. **Cockerell, W. P.**, Entom. News vol. 12 p. 209. — Neu: *albescens* **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 394 Taf. XLVII Fig. 25.

Aracomolis n. g. **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 38. — *rhodographa* p. 38 (S.-Amer.).

Arbela disciplaga **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 469 ♂ ♀ (Sarawak, Borneo; Singapore).

Arctagyrtia nov. gen. für *Agyrtia nana* Walk. **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III. p. 173.

- Arctia*. Vergl. Studium von 7 jung. Arctien. **Dyar** (14). — Vorläuf. Bemerk. zu den Raupen der Gatt. **Dyar** (41).
- aulica* L. bei St. Goarshausen entgeg. der Angabe Roessler's sehr selten. **Wendlandt** p. 80.
- caja* L. Experimente. **Fischer** (3). Abbildungen von *Aberr.* Taf. 1. Abgekühlt bis auf -8° C. Fig. 1, 2, bei normaler Temp. Fig. 3-8. — Futterpflanze. Siehe unter *Gastropacha*. — Werden *Arctia caja* und andere, grellgefärbte Falter von Vögeln gefressen? **Sievogt, B.**, Societ. Entom. 15. Jhg. No. 24 p. 187-188. — Raupen im Frühjahr sich sonnend. *The Entomologist* vol. 34 p. 186. — Stück m. strahlenartig. schwarzer Zeichn. auf den Hflgl. t. c. p. 60. — Stück mit sehr blassen Flügeln. t. c. p. 62. — Stück mit berauchten Hflgl., geschlüpft Dez. 1890. 3. Gener. t. c. p. 184. — ♂ u. 3 ♀. 4 teratologische Stücke. **Hampson**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 118. — Nach Schoch frassen die Raupen doppelt so viel im violetten Licht als die im roten u. blauen. **Kathariner**. — Die Falter erschienen 14 Tage früher. **Kathariner**, siehe *Vanessa*.
- flava* aus Davos in der Schweiz. Aufzucht vom Ei ab. **Schnabel**, in der Zeitschr. des Ver. für schles. Insektenk. 26. Hft. 1901 p. 22-23.
- intermedia*. Raupe. **Dyar**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 25-26.
- phalerata* Harr. *The Life-History of . . .* **Gibson, Arth.**, Canad. Entom. 1900 vol. 32 No. 12 p. 369-376.
- purpurata* etc. Titel p. 355 dieses Berichts. — Ein Schmarotzer ders. bisher nicht bekannt. Aufgefunden wurde: *Erigorgus purpuratae* von Pfanckuch in der Lüneburger Heide bei Bremen. **Pfanckuch**.
- purpurea*. Neue Varr. siehe weiter unten. — Futterpflanze, siehe unter *Gastropacha*.
- quenselii* aus Raupen vom Gerner Grat gezogen. Die Tiere sind recht variabel, im Allgemeinen dunkler in der Zeichn., als solche aus den Ostalpen (z. B. Davos). Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900 18. Okt. (p. 25). — bei Santa Maria gefunden, mit Löwenzahn gefüttert. *Zeitschr. f. Entom. Breslau* 1899 p. XVI. — Zur Zucht d. Raupen. **Nagel**, t. c. p. 39. Vor Verwendung frischen Futters wird gewöhnlich gewarnt, N. hat es hingegen ohne Schaden gegeben.
- villica*. Durch Zucht gewonnene 2. Generation. Unterschieden von den freilebenden durch geringere Grösse. ♂ ausgebreit. nur 35 mm (also 20 mm Differenz), ähnl. die ♀. Die rötl. Farbe am Hleib beschränkt sich besonders beim ♂ auf die Spitze. Interessant ist, dass die Flecke auf beid. Hflgl. einander ungleich zu sein pflegen. Bei 6 Stück ist das Gelb auf d. Hflgl. nicht rein, sondern schwärzl. angehaucht. **Thurau**, Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900 8. März p. 10.
- virguncula* Kirby. *The Life-History of . . .* **Gibson, Arth.**, Canad. Entom. vol. 33 No. 12 p. 325-329.
- Neu: *rueckbeili* **Püngeler**, Deutsche Entom. Zeitschr. 14. Bd. lep. Hft. p. 190 Taf. III Fig. 11 (Chinesisch Turkestan).
- *purpurea* L. (Hein. I p. 250. zerstreut im Süden u. Nordosten, bis Hamburg, Hannover, Juni) 1. var. *berolinensis* (kleiner, sparsam. u. kleiner gefleckt, weicht von der Bremenser Form var. *atromaculata* Stgr.

wesentlich ab). — 2. *ab. immaculata* (alle Flgl. ungefleckt). **Fuchs**, Stettin. Entom. Zeitung, 62. Jahrg. p. 126—128 (beide von Berlin). — Bemerk. zur Verbreitung etc.

Arctiadae. **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 247. — 2 Spp.

Arctianae. Beschreibender Katalog: 946 Arten. — Uebersichtstabelle über d. Gatt. **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 2—8.

— auf Trinidad vertreten durch Spp. der Gatt. *Idalus* (1), *Eupseudosoma* (1), *Rhipha* (1), *Melese* (1), *Ecpantheria* (1), *Thalesa* (1), *Phaegoptera* (1), *Agorea* (1), *Ammalo* (1), *Deiopeia* (1). **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London 1901 p. 120—122.

Argema maenas subs. latona n. **Rothschild** u. **Jordan**, Nov. Zool. Tring vol. 8 p. 404—405 ♂ (Nord-Celebes). Fundorte der versch. Formen:

Argema maenas	{	maenas Nord-Indien.
		ignescens Andamanen.
		diana Java.
		latona Celebes.
		rosenbergi Amboina.

Argyroeides vespina **Schaus**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 42 (Parana).

Argyrolepidia n. g. (Type: *Bombyx pamphila* Stoll) **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 550.

Arhacia H.-S. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 287—288. — 1 Sp.; Type: *combusta* H.-S. (1854) = (*Anodonta*) *fascis* Schs. (1890).

Arsenura armida Cram. (= *Rhescynthis erythrinae* Hb.) in S.-Amer. **Therese von Bayern** p. 281.

Artaxa usta **Lucas**, Proc. Soc. Queensland vol. XVI p. 76 (Queensland).

Asota nervosa (Untersch. von *diana*) **Rothschild & Jordan**, Nov. Zool. Tring vol. 8 p. 406 ♂♀ (Salomonsinseln: Kulambangra, Rubiana).

Asteropetes n. g. (Type: *Seudrya noctuina* Dr.) **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III, p. 605.

Asura amabilis **Rothschild & Jordan**, Nov. Zool. Tring vol. 8 p. 424 ♂♀ (Isabel, Salomon Isl.).

Atasca Swinhoe siehe *Nyctemera*.

Atolmis unifascia **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 477 (Sumbawa).

Attacus cecropia and others. Notes on the Mating. **Soule, Caroline G.**, Psyche vol. 9 No. 303 p. 224—226. — *erycina* Shaw. (= *Phalaena hesperus* Cram.) in S.-Amer. **Therese von Bayern** p. 281—282.

Neu: *tucumani* **Dognin**, Le Naturaliste 1901 p. 179 (S.-America).

Ausaris amaura **Warren**, Nov. Zool. Tring vol. 8 p. 202 ♀ (Ogrugu, Amambara River, Lower, Niger).

Automeris belti Druce in S.-Amer. **Therese von Bayern** p. 281. — *stuarti* **Rothschild & Jordan**, Nov. Zool. Tring vol. 8 p. 404 ♂♀ Taf. X Fig. 5 ♀ (La Paz, Bolivia).

Automolis idalia **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 48 Taf. XXXVI Fig. 17. — *flammans* p. 50 tab. cit. Fig. 9. — *albimaculifera* p. 54 tab. cit. Fig. 18. — *collateralis* p. 64 tab. cit. Fig. 6. — *rectiradia* p. 65 tab. cit. Fig. 13 (sämmtl. aus S.-Amer.).

Bacotia sepium Spr. in New Forest u. Bemerk. etc. **Chapman** (9).

- Bardaxima Walk. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 270. — 4 (1 n.) Sp. Type: longara Stoll. (1791) = (Bardaxima) lucilinea Walk. (1858) = (Nystalea?) demea Druce (1895) = fulgurifera Walk. (1869). — Neu: *demera* p. 271 (Demerara).
- Baritius *brunnea* **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 99 (Amazonas).
- Belemnia *ochriplaga* **Hampson**, t. c. p. 209 Taf. XLIII Fig. 8. — *aplaga* p. 210 tab. cit. Fig. 12 (beide aus S. Amer.).
- Belemniastis* n. g. (Type: *Belemnia whiteleyi* Dr.) **Hampson**, t. c. p. 213.
- Bertholdia *myosticta* **Hampson**, t. c. p. 79 Taf. XXXVII Fig. 19 (trop. Amerika). — *braziliensis* p. 79 tab. cit. Fig. 3. — *flavidorsata* p. 82 tab. cit. Fig. 21 (Bolivia).
- soror* **Dyar**, Proc. Entom. Soc. Washington vol. IV p. 391 (Venezuela).
- Betola* n. g. **Schaus** (7) p. 289—290. — *arolata* p. 290 Abb. Taf. XI Fig. 6 (Aroa, Venezuela). — *tucumanata* **Dognin**, Le Naturaliste, 1901, p. 249 (Süd-Amerika).
- Blera Walk. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 311. — 4 Spp.; Type: *politia* Cr. (1782).
- peruda* **Druce**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 78 ♂ (Venezuela, Merida).
- Bombiliodes *carminata* (Untersch. von *capistrata*) **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 246 ♀ (Nassau). — *jamaicensis* **Schaus**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 40 (Jamaica). — *xanthogastroides* p. 40 (Parana).
- Bombyx. Europa hat nur eine einzige Art, die zur Gruppe trifolii gehört und die einzige Abart *medicaginis* steht der Stammform sehr nahe. Im Gegensatz dazu bietet der relativ schmale Landstrich zwischen Jerusalem u. dem Jordantal trotz ganz spärlicher, nur im Frühjahr reicherer Vegetation eine ganze Reihe von Arten u. Varr. **Stertz**, Zeitschr. f. Entom. Breslau 1900 p. XV. — Wird bestritten. Es sind mehrere Varr. in Europa bekannt, theils aus Spanien (Andalusien) u. Madeira. **Wocke**, *ibid.*
- mori L. - Eier ergaben im weissen Licht und im Violett purpur die kräftigsten Raupen, die weisse Seide u. die zahlreichst. Eier bei den erzielten ♀; gelbes Licht wirkte ähnlich, blaues entgegengesetzt. **Simroth** (siehe p. 728 dieses Berichts in Anm. e). — Puppen im Kokon sich sonnend. The Entomologist vol. 34 p. 186.
- Sull' armatura delle zampe spurie della larva del filugello. **Verson** (1, 3). — Sull' organizzazione dei mercati dei bozzoli nel Regno. **Verson** (2). — Histologie; vorläuf. Mitteilung. **Vignou**. — Skorzonera als Futter. **Tichomirow**. — Seidenwurm-Industrie in Ontario. **Lochhead**. — Riesenzelle. **Verson** (4). — Infektionskrankheit. **Verson** (5).
- neustria L. ♀, ausserordentl. kleines Stück. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900, 11. Jan. (p. 3). — Soll in Catalonien so klein vorkommen.
- quereus in Sicilien auf Epheu, auch in Kroatien darauf beobachtet. Zeitschr. f. Entom. Breslau 1899 p. XVI. — *sicula* ♂ × *quereus* ♀, Bastard. Es fehlen die hellen Flecken auf den Vflgl., wie bei *sicula*. Dagegen sind die Rippen deutlich zu sehen, was bei *sicula* nicht der Fall ist, und die Hflgl. des Bastards tragen eine Binde, wie sie *quereus* hat. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900, 5. April (p. 15). —

var. alpina ♀ mit var. sicula ♂. Bei den mannigfach gefärbt. Tieren pflegt sich die Zeichn. der V.- u. Hflgl. nicht ein u. ders. Ursprungsform zu nähern. Es näherte sich vielmehr das Aussehen der Vflgl. der Form sicula, wenn die Hflgl. die Färbung der Alpentiere zeigten u. umgekehrt. Trugen z. B. die Vflgl. eines ♂ die breite Binde der Alpenform, so zeigte der Hflgl. sich breit gelb gesäumt wie beim sicula-♂. **Thurau**, Berlin. Entom. Zeitschr. 47. Bd. Sitz.-Ber. f. 1901 14. Nov. — Insektenbörse 18. Jhg. p. 413.

rubi. Bildung eines vollständ. Kokons, sonst frei überwintend. Zeitschr. f. Entom. Breslau 1899 p. XIX.

— Neu: *frugalis* **Lucas**, Proc. Soc. Queensland vol. XVI p. 74. — *figurata* p. 74. — *effusa* p. 75 (alle drei aus Queensland).

Boriza n. g. **Schaus** (7) p. 310. — 1 Sp; Type: *crossaea* **Druce** (1894).

Braura ligniclusula **Walk.** (Gastropacha verw., brauner Rinde ähnlich). **Biolog. Notiz etc.** **Barrett, C. G.** (2) p. 285. Besch. v. Raupe u. Puppe.

Burtia hat die Priorität vor *Gundlachia*. **Grote** (8).

Byrsia aurantiaca subsp. javana n. **Rothschild & Jordan**, Nov. Zool. Tring vol. 8 p. 422 ♀ (für jav. Form v. Mt. Gede, Java, 4000'). — *dotata* **Wlk.** p. 422 mit d. Subsp.: a) *dotata subsp. celebensis* n. p. 422 ♂ ♀ (S. Celebes). — b) *dotata subsp. dotata* p. 423 ♂ ♀ (Batjan, Amboina). — c) *subsp. papuana* p. 423 ♂ ♀ (Milne Bay, Brit. N. Guinea; Kapaur, Dutch New Guinea). — *ornata* p. 423 ♀ (am Ende steht ♂!) (Humboldt Bay, Dutch New Guinea). — *amoena* p. 423 ♂ ♀ (Isabel, Salomon Isl.).

Caeculia trilinea **Dognin**, Le Naturaliste 1901 p. 179 (Loja). — auch **Ann. Soc. Entom. Belg.** T. 45 p. 306.

Calidota similis **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III. p. 437 Taf. XLIX Fig. 12 (Bolivia).

Calledema **Butl.** Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 264. — Type: *marmorea* **Butl.** (1878). — 5 Spp., dar. neu: *jocasta* p. 264 (Rio Janeiro).

Callidota albiceps **Dognin**, Le Naturaliste 1901 p. 69 (Venezuela).

Callidrepana xanthoptera **Hmps.** (gehört zu *Hampson*-Sekt. II B Vein 10 from end of areole, 11 from cell, antenn. bipectin. in both sexes) **Swinhoe**, **Ann. Nat. Hist.** (7) vol. 8 p. 124.

Callimorpha **hera**. Serie bei **Dawlish** gefangen; eine vollständige Stufenreihe in der Färb. zwischen dem reichen Rot der Type durch die terracotta Form bis zur leuchtenden gelben var. *lutescens*. **The Entomologist**, vol. 34 p. 60. — Stücke bei **Dawlish**. Variabel von gelb durch Zwischenformen zu rot. t. c. p. 187. — in England. **Phillips, W. J. Leigh**, t. c. Sept. p. 255. — in the Exeter District sehr zahlreich. **Rowden, A. O.**, t. c. Oct. p. 296. — Erste Erwähnung 1871.

Neu: *Lecontei var. dyarii* n. **Merrick, H. D.**, **Entom. News** vol. 12 Febr. p. 45.

Callosamia promethea. L'odorat chez les Insectes. **Extr. Revue Scient.** (4) T. 16 No. 17 p. 538—539. — Insectes transportés de Cambridge, Mass. à Loggerhead, Key, Florida..

Calonotos tripunctata **Druce** (Type von Trinidad) **Lathy**, **Trans. Entom. Soc. London** 1901 p. 117.

Calybia slossoniae. **Raupe.** **Dyar** (13).

- Campimoptilum ochraceum* **Aurivillius**, Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 123 ♀ (Deutsch Ostafrika).
- Canodia* Guen. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 343. — 2 Spp.; Type: *carmelitoides* Guen. (1852). — Die 2. Sp. *difformis* H.S. vielleicht mit *carm.* identisch.
- Caprima*. **Rothschild**, Nov. Zool. Tring vol. 8 bildet, Taf. 9, ab folg. [in den Nov. Zool. Tring VI beschrieb.] Formen [die betreff. Seitenzahl ist eingeklammert]: *spectabilis* [p. 434] Fig. 13 ♀. — *obliqua* [p. 435] Fig. 14 ♂. — *albifrons* [p. 436] Fig. 15 ♂. — *fragilis* [p. 436] Fig. 16 ♂. — *dohertyi* [p. 437] Fig. 17 ♀ [orangerote Band d. Vflgl. nicht hell genug]. — *aurantiaca* [p. 435] Fig. 18 ♂.
- Caprimima* Taxonomie. Beschreib. zahlr. Varietäten. **Rothschild & Jordan**, Nov. Zool. Tring vol. 8 p. 418—422.
- Carama butleri* Baker auf Trinidad. **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 158.
- Carcinartia* n. g. **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 472. — *metamelaena* p. 472. (Ostafrika).
- Cargida* n. g. **Schaus** (7) p. 267. — 1 Sp.; Type: (*Heterocampa*?) *Pyrrha* Druce (1898).
- Caridarctia* n. g. (Type: *Arctia albicancellata* Burm.) **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 452.
- Castnia licus* Dru. auf Trinidad. **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London 1901 p. 158.
- Catarbela* n. g. *Hollandiidarum* (steht im Geäder der Gatt. *Arbela* nahe und scheint durch die bessere Entwickl. der Rippe 1c der Hflgl. die afrik. *Holl.* mit den asiat. *Arbeliden* zu verbinden. Rippe 1c d. Hflgl. geht bei vielen Schmetterlingsgruppen so ganz allmählich in eine Falte über, dass es bisweilen unmöglich ist, eine scharfe Grenze zu ziehen zwischen den Formen, bei welchen die R. 1c anwesend ist oder fehlt) **Aurivillius**, Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 127—128 Abb. Rippenbau Fig. 30 (West-Afrika, *Kuulu*).
- Caviria sericea* Moore in Wei-Hai-Wei. **Fletcher**, The Entomologist, vol. 34 p. 174.
- Cecropia*. *Kokons*. **Soule, Caroline G.**, Entom. News vol. 12 Febr. p. 45; — desgl. **Davis, Will. T.**, t. c. March p. 76—77.
- Celama flaviciliata* (21a) **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 176 ♂ (*S. Leone*). — *euphaea* (17a) p. 177 ♂ (*W.-China, Moupin*). — *socotrens* (39a) (deutl. versch. v. *C. pumilla*) p. 177 ♂ ♀ (*Sokotra, Jenaagahan; Adho Dimellus; Hadibu plain*). — *cretacea* (43a) p. 177 ♀ (*Bombay*). — *melaleuca* (46a) p. 177—178 (*Brit. E. Africa, Uganda Ry*).
- Ceramidia cuprea* **Schaus**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 42 (*Mexico*). — *chalco-viridis* (882a) **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 172 ♂ (*Brazil: Minas Geraes*).
- (*Antichloris*) *flammea* **Dognin**, Fundorte. **Therese von Bayern** p. 278—9.
- Ceranchia apollina* **Butl.** ♂ u. ♀ aus *Kokons* von *Malingo*, 10 km von *Diego-Suarez*, *Madagascar*, in *Paris* ausgeschlüpft, 7. VII. ♀ und 20. VII. ♂. **Poujade**, Bull. Soc. Entom. France 1901 p. 300.
- Ceratocampidae*. Die hierhergehörig. Gattungen siehe unter *Saturniidae*. — auf *Trinidad* vertreten durch die Gatt. *Citheronia* in 2 Spp. **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London 1901 p. 142.

- Cerura Schrank. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 288. — 10 (3 n.) Spp. Type: furcula Schr. (1865). — Neu: *argynnis* p. 288–289 ♂♀ (Castro, Parana). — *rivera* p. 289 ♂♀ (Peruvian Amazons).
- Dohertyi* **Druce**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 77 ♂ (Perak). — *ludovicæ* **Püngeler**, Deutsch. Entom. Zeitschr. 14. Bd. Iep. Hft. p. 180 Taf. II Fig. 15 (Chinesisches Turkestan).
- menciana Moore von Wei-Hai-Wei. **Fletcher**, The Entomologist vol. 34 p. 197.
- Ceryx pleurasticta* (28a¹) **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 165 ♂ (Kanara, Siddapah). — *Crawshayi* (30a) p. 166 ♂♀ (Br. E. Africa, Kikuya, Roroma).
- Chadisa Walk. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 311. — 6 (3 n.) Spp.; Type: bipars Walk. (1862). — *torresi* (Xylophasia) Dogn. möglicherweise das ♀ zu *C. perilleus* Schs. und letzt. hätte dann die Priorität. — Neu: *varona* p. 312 (Castro, Parana). — *zabena* p. 312 ♀ (Orizaba, Mexico). — *batama* (Ad. 3 u. 4 auf d. Vflgn. gesondert) p. 312–313 ♂ (Rio de Janeiro). — *sabenilla* **Dognin**, Le Naturaliste 1901 p. 250 (Paraguay).
- Chalia vigasi* **Schaus**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 45 (Mexico). — *tristis* p. 45 (Mexico). — *künckelii* **Heylaerts, F. J. M.**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 II p. 97 ♂♀ Raupe, Pappe etc. (Republica Argentina, Ceres [Prov. Santa Fé]); Raupe an *Baccharis coridifolia* D. C. est.
- Charagia. Erste Stände mehrerer Spp. **Illidge & Quail**, Proc. Soc. Queensland vol. XVI p. 65–72, hierzu Taf. IX.
- Charidea (Cyanopepla) alonzo Butl. Fundorte etc. **Therese von Bayern** p. 279.
- Chelonia plantaginis. Reihe von (16) Varietäten, die eine vollständige Reihenfolge von der extremsten Form mit rein weisser Grundfarbe und schwarz. Zeichnung zu einer viel intensiveren Form der var. *hospita* darstellen. The Entomologist vol. 34 p. 60.
- Chilena *Marshalli* **Aurivillius**, Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 123–124 ♂ Abb. Fig. 24 (Mashunaland: Salisbury).
- Chionema *saulia* **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 124 ♀ (Paitan).
- Chliara Walk. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 342. — 3 Spp.; Type: croesus Cr. (1780).
- Chlorhoda* n. g. (Type: *Idalus rufoviridis* Walk.) **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 421.
- Choorechillum* n. g. Arctiidarum **Lucas**, Proc. Soc. Queensland vol. XVI p. 72. — *distitans* p. 72 (Queensland).
- Chrysocale *corax* (732a) **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 171 ♀ (Peru, Vilcanota).
- Chrysopoloma *flaviceps* (am nächst. verw. m. *conspurecata* Aur. und *varia* Dist.) **Aurivillius**, Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 125–126 ♂ (Mashunaland, Salisbury).
- Chrysopyga spec. Illustr. Zeitschr. f. Entom. 5. Bd. No. 10 Taf. VI Fig. 4 u. 4a Raupe (interess.).
- Cibyra dorita* **Schaus**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 76. — *poltrona* p. 77. — *dormita* p. 77 (alle drei aus Brasilien). — *brunnea* p. 73 (Venezuela).
- Cilix glaucata*. Seasonal Dimorphism in . . **Bird, J. F.**, Entom. Record vol. 13 No. 10 p. 296–297.
- Cissura plumbea* **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 72 (Britisch Honduras).

¹) No. in Hampson's Catalog.

- Cleapa psecas* **Druce**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 78—79 ♂ (East Africa, Dar-es-Salaam).
- Clisiocampa disstria*. Interessante Photographie, die die forest tent caterpillars an einem Baumstamm zusammengehäuft zeigt. Sixteenth Report Injurious and other Insects, 1901. Bull. Soc. N. Y. State Mus. vol. VII No. 36, plate 16. — auch Vögel sind schädlich. 2. Bericht. **Weed**. — fragilis. Verwüstungen und Parasiten. **Cockerell, T. D. A.**, Entom. News vol. 12 Jan. p. 25—26.
- Clostera anachoreta* at Walmer, Kent. **Bloomfield, E. N.**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) Nov. p. 276. — *curtula*. Exper. in rearing in moist atmosphere. **Rydon, Arth. Hope**, Entom. Record vol. 13 No. 8 p. 253—254. — *reclusa*. Ausschlüpfen. **Carr** (1). — Zur Biologie. **Heycke, E.** Briefl. Mitteilung; Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 348. — Beobachtung eines Zuges von etwa 50 Raupen, die geradlinig vorwärts rückten. Hin- und Herschlagen mit dem Kopfe, sobald die Fühlung verloren war. Fortpflanzen derselb. Beweg. innerhalb der Reihe. Ob sie mit einander durch Fäden verbunden sind?? (!).
- Cnethocampa pinivora* Tr. zahlreich auf der Kurischen Nehrung. **Rey**, Berlin. Entom. Zeitschr. 47. Bd. Sitz.-Ber. f. 1901, 5. Sept. — cf. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 309.
- pitycampa*. (Structures in the Imago of Cn. p. by means of which it manages to escape from the Cocoon). With 1 pl. **Chapman**, Proc. South London Entom. Nat. Hist. Soc. 1900 p. 90—92.
- Une expérience sur les chenilles processionnaires du pin (Cn. p.). **de Rocquigny-Adanson, G.**, Feuille jeun. Natural. (4) 31. Ann. No. 369 p. 227—228.
- Colax* Hübn. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 333. — 2 Spp.; Type: *apulus* Cr. (1779).
- Contrebia* Walk. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 279. — 1 Sp.; Type: *extrema* Walk. (1856).
- Contheyla chara* **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 464 ♂ (Sarawak, Borneo).
- Coreura interposita* (1005a) **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 173 ♂ (Venezuela, Porto Cabello).
- Cosmosoma melathoracia* **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London. 1901 p. 115—116 Taf. V Fig. 10 (Trinidad: Tabatique). — *rubriscapulae* p. 116 Taf. V Fig. 9 (Trinidad: Morrison Valley). — *flavita* **Schaus**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 41 (Columbien).
- Cosmotriche potatoria* at Sugar? **Musham, John F.** — Eiablage. **Phillips, Hub. C.** — Var. **Glenny**.
- Cossus* als Honigdieb. **Cerva, Fr.**
- balkanicus* Ld.-Stgr. et Rbl., Cat. No. 4644. Stück von Sarajevo, bisher nur von Slivno, Ostrumelien bek.; kurze Charakt. etc. **Rebel**, Verhdlgn. zool.-bot. Ges. Wien 51. Bd. p. 804.
- eine Bulgarien eigene Form (Haberhauer bot ein Stück desselben mit 400 M. aus). Insektenbörse 18. Jhg. p. 329.
- cossus* im Kreise Berent häufig. **Treichel** p. 168.
- ligniperda*. On the Pupation of . . . Besprechung der Art u. Weise der Verpuppung in: Proc. South London Entom. a. Natural History Society

for 1900 (Hibernia Chambers, London Bridge, S. E.) p. 1—5. — Zucht. Einige Bemerk. dazu. **Andrews, T. B.**

- Costria* n. g. Cossidarum (Cossula nahe. Type: *C. abnoba* Schaus) **Schaus**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 46. — *corita* p. 46 (Columbien). — *maruga* p. 46 (Parana). — *striolata* p. 47. — *arpi* p. 47. — *elegans* p. 47. — *discopuncta* p. 48 (die letzten vier von Brasilien).
- Cottobara Walk. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 274. — 1 Sp.; Type: *concinna* Walk. (1862).
- Cremnophora* n. g. (Type: *Apina angasi* Walk.) **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III. p. 453.
- Crinodes H.-S. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 27. — 7 (2 n.) Spp.; Type: *bellatrix* Stoll (1781). — Neu: *striolata* p. 277 (Pernambuco). — *nebulosa* p. 277 (Tucuman). — spec. Illustr. Zeitschr. f. Entom. 5. Bd. No. 16 Taf. VIII Fig. 4 Raupe, Puppe.
- Ctenosia albiceps* (252a) **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 180 ♀ (Batian, Mt. Sibela, 3000').
- Ctenucha albipars* (1157a) **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 175—176 ♂ (Bolivia, San Jacinto, Locotal).
mortia **Schaus**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 44 (Parana).
- Ctianopha* n. g. **Schaus** (7) p. 272. — 1 Sp.; Type: *Tianspa argyria* Butl. (1879).
- Cyanarctia* n. g. (Type: *Eupyra dama* Druce). **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III. p. 206.
- Cyanopepla submacula Wlk. auf Trinidad. **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London. 1901 p. 119.
- Cybosia mesomella siehe Philea im vorig. Bericht.
- Cyclosia *phonia* **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 124 ♀ (Lawas).
- Cyclosodes* n. g. Lithosianarum **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 183—184. — *flavicostata* (551a) p. 184 ♀ (Borneo, Kuching).
- Cydosia submutata. Raupe. **Swainson**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 81.
- Cyllopoda *quadri radiata* Weym. **Therese von Bayern** p. 280 Taf. V Fig. 15 (Urwald bei Pozuelos am Rio de Pozuelos, unfern Babahoyo, Westecuador). — Beschr. von **Weymer**, t. c. p. 303 (von allen bekannt. Form. versch. durch die aus der Wurzel entspringenden Längsstreifen der Vflgl.). — *longicorpus* (wie *gopala* Dogn., aber grösser u. besonders ausgezeichnet durch d. Länge u. Streifen des Körpers; der Innenrand d. Hflgl. ist auch schmal schwarz. Aehnelt noch mehr ochra Druce) **Druce**, Nov. Zool. Tring vol. 8 p. 438 ♂ (Tachira, Venezuela).
- Cymatophora duplaris var. *argentea* Tutt. Färb. Abb. The Entomologist vol. 34 No. 461 Taf. I Fig. 1 u. 2. — Beschr. op. cit. vol. 27 p. 126. — or var. *gaelica* Kane, farb. Abb. tab. cit. Fig. 10, beschr. op. cit. vol. 27 p. 125. — octogesima. Eiablage. **Raynor, Gilb. H.**, Entom. Record vol. 13 No. 5 p. 154—155.
- Dalaca *tesselloides* **Schaus**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 76 (Paraguay). — *basirubra* p. 76 (Peru).
- Dalcera *necoda* (verw. m. *ampela* Druce). **Druce**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 435 ♂♀ (Colombia, Don Amo).
- Daritis howardi. Raupe. **Dyar**, Proc. Entom. Soc. Washington, vol. IV p. 407.

- Dasychira pudibunda*. ♀ am 31. Sept. 1900 ausgeschlüpftes Stück. Zeitschr. f. Entom. Breslau, 1900 p. XIX.
- (*Liparis*) *pulverea* Hmps. n. sp. Beschr. Biologisches. **Barrett, C. G.**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 194—195 (Südaf.).
- Dasylophia* Pack Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 280. — 18 Sp.: *anguina* Sm. and Abb. (1797). — Neu: *lucia* p. 281 (5 n.) ♂♀ (St. Lucia, B. W. I.). — *abbreviata* p. 281—282 ♂♀ (Castro, Parana). — *jaliscana* p. 282 ♂♀ Guadaluajara, Mexico). — *grenadensis* p. 282 (Grenada, B. W. J.). — *franzina* p. 282—283 (Sao Paulo, Brazil).
- **Barnes** beschreibt im Canad. Entomologist, vol. XXXIII *saturata* p. 53 (Colorado). — *melanopa* p. 54 (Arizona).
- **Dognin** in Le Naturaliste, 1901: *limbata* p. 249 (Tucuman).
- Deilemema* Hb. Syn. u. Charakt. **Pagenstecher**, Jahrb. nass. Ver. f. Naturk. 54. Jhg. p. 162—163.
- A. Hflgl. des ♂ ohne Falte am Innenrand. Analwinkel gerundet. Typus: *Deil. arctata* Wlk.
- B. Hflgl. des ♂ mit breiter Falte am Innenrand. Aussenwinkel vorgezogen. Typus: *Deil. carissima* Sw. (mülleri Sn. v. Voll.).
- (84). *arctata* Walk. p. 163—164 (Indien). — (85). *mülleri* Sn. v. Voll. p. 164 (Indien, Sumatra, Borneo). — (86). *albipuncta* Druce p. 164—165 (Guadalcanas). — (87). *evergista* Cram. p. 165—167. Bemerk. zu *mutabilis* ♂ u. *intercisa*. Snellen ist geneigt *evergista* Cr. als sehr veränderlich mit *aeres* Boisd., *agagles* Boisd. u. auch *mülleri* Snell. v. Voll. in eine Art zu vereinigen. (divers. Fundorte). — 88. *aeres* Boisd. p. 167—168 (Buru, Offak, Neu Guinea). — 89. *agagles* Boisd. p. 168 (Amboina, Offal). — 90. *menes* Feld. p. 168 (Amboina) wohl kaum eigne Sp. — 91. *maculata* Walk. p. 168—169 Taf. II Fig. 10 (Java, Lombok). — *contracta* Walk. p. 169 (Mysole). — 93. *uniformis* Ploetz. Ob hierher gehörig? p. 169 (West Afr.). — 94. *flavescens* Sn. v. Voll. p. 169—170 (Sumatra). Ob hierher gehörig?
- Deiopeia pulchella* in the London District **Warne, E. A.** The Entomologist, vol. 34 Aug. p. 230. — in Surrey. **Warne, Ernest**, The Entomologist, vol. 34 Oct. p. 297.
- bei Haifa (Syrien) sehr zahlreich, aber schwer rein zu erhalten. Biologisches. **Wutzdorf**, Zeitschr. f. Entom. Breslau, 1901. p. X.
- Delphyre aclytioides* (1061 a) **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7.) vol. 8 p. 174 ♀ (Cayenne). — *varians* (1061 b) p. 174 ♀ nebst *ab. 1* (Amazons). — *flaviventralis* p. 174—175 (Venezuela).
- Demolis n. g.* **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 31. — *albicostata* p. 31 (Brasilien).
- Dendrolimus pini* L. (= *Metanastris segregata* Butl.) von Wei-Hai-Wei. **Fletcher**, The Entomologist, vol. 34 p. 198—199.
- Diacrisia lubricipeda* L. ♂. Teratologisches Stück. **Hampson**, Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 12 (37) p. 118.
- Neu: *fuscitincta* **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 280 Taf. XLV Fig. 1 (Java). — *sparsipuncta* p. 282 tab. cit. Fig. 19 (Madagaskar).
- *quadrilunata* p. 293 tab. cit. Fig. 23 (Burma). — *metaxanta* p. 293 tab. cit. Fig. 14 (Burma). — *latiradiata* p. 296 tab. cit. Fig. 11 (Central-Afrika).

— *longiramia* p. 302 Taf. XLVI Fig. 1 (Java). — *melaena* p. 308 tab. cit. Fig. 11 (Java). — *phaea* p. 309 tab. cit. Fig. 17 (Bali).

Dialeucias n. g. **Hampson**, t. c. p. 97. — *pallidistriata* p. 98 (Amazonas).

Didcentria H. S. Charakt. d. Gatt.; Synon. **Schaus** (7) p. 296. — 13 (2 n.) Spp.; Type: *centralis* H.-S. (1855). — Neu: *linita* p. 296 ♂♂ (Jalapa, Mexico). — *disparilis* p. 296–297 ♂♀ (Orizaba, Mexico). — Besch. d. Raupe von *laciniosa* Edw. p. 298.

Didugua Druce. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 280. — 2 Spp.; Type: *argentina* Druce (1891).

Dimorpha versicolora. Pairing. **Butler, W. E.** Entom. Record, vol. 13 No. 11 p. 328.

Dinia mena Hb. Fundorte nebst Bemerk. **Therese von Bayern** p. 278. — auf Trinidad. **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 118.

Diospage *chrysobasis* **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 212 Taf. XLIII Fig. 13 (Columbia).

Diptilon *ater* **Schaus**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 42 (Südamerika).

Dirphia *subhorca* **Dognin**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 45 p. 305 (Ecuador). — *flavoscripta* p. 306 (beide von Ecuador).

Doelia *dohertyi* (besch. Nov. Zool. Tring VI p. 437) **Rothschild**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 407 Taf. IX Fig. 11 ♂.

Dodia n. g. Aretiidarum **Dyar**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 85. — *albertae* p. 85 (Canada).

Dognina n. g. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 301. — 1 Sp.; Type: *Lirimiris veltini* Dogn. (1890).

Dolaca *thisbe* **Druce**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 437 ♂ (Colombia, Don Amo).

Doratiphora *colligans* **Lucas**, Proc. Soc. Queensland, vol. XVI p. 76. — *quadridens* p. 77 (beide aus Queensland).

Drastoma n. g. **Schaus** (7) p. 264–265. — 1 Sp.; Type: *dardania* Druce (Tifama?) (1895).

Drepana binaria u. cultraria Unterschiede. **Oudemans, J. Th.** Entom. Tijdskr. Nederl. Entom. Vereen. 44. Deel. 1. Afl. Versl. p. 8–10. — *xanthoptera* zu *Callidrepana* gezogen. **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7.) vol. 8 p. 124.

harpagula. Zucht. **Griffiths**. — *falcula*, dunkelbraune Stücke. The Entomologist, vol. 34 p. 61. — *sicula* W. V. aus Eiern gezogen. Mehrere Stücke zeigen auf den Hflgln. die gelbe Binde stark bestäubt, so dass die Thiere dem quercus-Spinner ähnlich sehen. Berlin. Entom. Zeitschr. 47. Bd. Sitz. Ber. f. 1901. 19. Sept. — cf. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 333.

Hybriden: Die von Standfuss gezogenen Hybriden sind:

$$\begin{array}{l} \text{Drep. } \frac{\text{curvatula Bkh. } \sigma}{\text{falcataria L. } \sigma} \quad \text{Drep. } \frac{\text{falcataria L. } \sigma}{\text{curvatula Bkh. } \sigma} \\ \text{Drep. } \frac{\left(\frac{\text{curvatula } \sigma}{\text{falcataria } \sigma} \right) \sigma}{\left(\frac{\text{curvatula } \sigma}{\text{falcataria } \sigma} \right) \sigma} \end{array}$$

Drepanidae. Irregularity in Emergence. **Merrifield, F.** The Entomologist. vol. 34 March p. 98.

Drugea n. g. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 293. — 1 Sp.; Type: (*Edema*) *morona* Druce (1898) p. 293.

- Drymonia chaonia* at Bromley. **Lawrance, A. J.** Entom. Record, vol. 13 No. 7. p. 221.
- Duomitus tectorius* (ähnelt etwas [*Cossus*] *maculatus* Shell. [1878]). **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 125 (Solomon Islands).
- daphne* **Druce**, t. c. p. 435 ♂ (Colombia, Minca). — *striatus* p. 435 ♂ (Colombia, Cacagualito).
- pyracmonides* **Schaus**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 46 (Mexico). — *mathani* p. 45 (Peru). — *jamaicensis* p. 46 (Jamaica).
- Dylomia* Feld. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 327. — 4 Sp.; Type: *tortricina* Feld. (1874).
- Echedorus vitreus* **Dognin**, Le Naturaliste 1901 p. 179 u. Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 309 (Merida).
- Epantheria albiscripta* **Druce**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7, p. 74–75 ♂ (S. E. Brazil, Rio Grande).
- peruwensis* **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III. p. 374 Taf. LI Fig. 10 (Peru). spec. Illustr. Zeitschr. f. Entom. 5. Bd. No. 10. Taf. VI. Fig. 5 Raupe, 5a Puppe.
- Edema audax* **Druce**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 76–77 ♂ (Panama, Chiriqui).
- suavis* **Barnes**, Canad. Entom. vol. 33 p. 53 (Colorado).
- Egybolis dohertyi* (Vergleich m. *vallantina*; Untersch.) **Rothschild & Jordan**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 405 ♀ Taf. X Fig. 10 ♀ [das metall. Grün u. Blau tritt in der Abb. nicht genug hervor]. (Escarpment, Brit. East. Afr. 6500 bis 9000'.
- Ellida Grote*. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 323. — 1 Sp.; Type: *caniplaga* Walk. (1856) (Syn. ders.).
- Elymiotis* Walk. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 272. — 6 Spp.; Type: *notodontoides* Walk. (1857). — Bemerk. zu der vorläufig hierhergestellten *Heterocampa alector* **Druce**.
- Elysius ochrota* **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 109 Taf. XXXVIII Fig. 3 (Bolivia). — *atriceps* p. 113 tab. cit. Fig. 2 (Columbien). — *melanoplaga* p. 113 tab. cit. Fig. 16 (Ecuador).
- Elysius chrysellus* **Druce**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 434 (Colombia, Don Amo).
- Emydia striata* L. Das in Kranchers Jahrb. v. 1900 p. 281 erwähnte melanistische Stück ist als *Em. funerea* Ev. zu bezeichn. Berlin. Entom. Zeitschrift 46. Bd. Sitz.-Ber. 4. Jan. (p. 1–2). Bemerk. hierzu. — Die Uebergänge, die unter dem Namen *melanoptera* Brahm. (verdunkelte alpine Vertreter) bekannt sind, hat Thureau durch Eiszucht gewonnen, darunter 1 Stück: Vflgl.-Spitze schon ganz schwarz, im Mittelfeld nur schmal gelb gestreift, Hflgl. gänzl. verdunkelt. *ibid.*
- Endromis versicolor*. **Grützn**er brachte es nach einer Mittheilung in der Zeitschrift f. Entom. Breslau 1901 p. 29–30 dahin, dass ein eierlegendes ♀ dieser Art in 4 Std. 800 Eier absetzte, indem er es durch zeitweises Schütteln an den Flügeln aus der nach Ablage von je 20–30 Eiern folg. Lethargie aufrüttelte.
- Stück, bei dem das Mesenteron u. Gnostodeum niemals mit einander verbunden waren, also kein Durchgang vorhanden war. **Flint**, The Entomologist, vol. 34 p. 363.
- Endrosa*. Bemerk. über Fundorte usw. verschied. Spp. The Entomologist, vol. 34 p. 131–132.

- aurita*, *irrorella* etc. Bemerk. hierzu. **Chapman**, Proc. Entom. Soc. London, 1901 p. II. — *aurita* siehe *Philea* im vorig. Bericht.
- Ephialtias pseudon(i)a* Bsd. in S.-Amer. **Therese von Bayern** p. 280.
- Epichnopteryx turibulella* (grösser, mit gestreckteren Flgl., die vorderen saumwärts wenig verbreitert, dichter u. grob beschuppt, reiner u. tiefer schwarz, mit bis zur Spitze gleichgefärbten Franzen, die Hflgl. den Iwinkel der Vflgl. überragend, die Fühler des ♂ m. 18—19 lang u. sehr dicken, dicht gefranzten, gegen die Spitze schnell abnehmenden Zähnen). **Fuchs**, Jahrb. nass. Ver. f. Naturk. 54. Jhg. p. 53—54 ♂ (Lombardei. — Juli).
- Eragisa* Walk. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 276. — 1 Sp.; Type: *lanifera* Walk. (1858).
- Eriogaster lanestris* L. ♀. Teratolog. Stück. **Hampson**, Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 12 (37) p. 118.
- Eriostepta n. g.* **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 30. — *roseireta* p. 31 (Amazonas).
- Estigmene ceylonensis* **Hampson**, t. c. p. 347 Taf. XLVII Fig. 9 (Hambantota). — *gynephæa* (1860 a) **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7.) vol. 8 p. 185—186 ♂♀ (Mashonaland, Salisbury).
- Eucereon cinctum* **Schaus** u. *rosinum* Wlk. auf Trinidad. **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 119. — Neu: *hyalinum* p. 119—120 Abb. Taf. V Fig. 11 (Trinidad: Verdant Vale). — *latifascia* Wlk. u. *maia* Druce auf Trinidad p. 120.
- *Birchelli* **Druce**, Ann. Nat. Hist. (7.) vol. 7 p. 74 ♀ (Colombia, Bogota). — *marcata* **Schaus**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 43 (Paraguay). — *mathani* p. 44 (Ecuador). — *trinita* p. 44 (Trinidad). — *lerioides* p. 44 (Mexiko).
- Eucerura n. g.* **Schaus** (7) p. 294. — 1 Sp.; Type: (*Drymonia*) *pica* Butl. (1882).
- Euchelia jacobaeae ab. gilleti* n. Abb. u. Beschr. dieser Farbenspielart im Journ. des Naturalistes de Mâcon 1901.
- Euchlaenidia n. g.* (Type: *Phaeochlaena transcaisa* Walk.) **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 186.
- delphini*. Biologie. **Dyar** (7). — Ueber die weissen Eucleidae. **Dyar** (13).
- Euclea (?) punctata* **Druce**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 435 ♂ (Colombia, Bonda).
- Eucyane hermaea* **Druce**, t. c. p. 433—4 ♂♀ (Venezuela, Bolivia).
- Eucyrtia lucens* **Druce**, t. c. p. 434 (verw. mit *E. daga* Dogn.) (Colombia, Don Amo).
- Eudaemonia brachyura*. Biolog. der Raupe. **Beutenmüller**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 195.
- Eugivira* pro parte *Givirae* **Schaus**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 73. — *sabulosa* p. 74 (Brasilien). — *quadra* p. 74 (Brasilien). — *durangona* p. 74 (Colorado?). — *carisca* p. 74 (Mexiko). — *pallidicosta* p. 75 (Brasilien). — *pardana* p. 75 (Brasilien). — *nudaria* p. 75 (Venezuela). — *plagiata* p. 75 (Venezuela).
- Eugoa bilineata* (1167 a) **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 185 ♂ (Singapore).
- Euhalisidota otho*. **Barnes**, Canad. Entom. vol. 33 p. 53 (Arizona).
- Euharpysia n. g.* **Schaus** (7) p. 324. — *comita* p. 324—5 Taf. XII Fig. 4 (Chancharmayo, Peru).

- Euhyparpax* Beut. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 270. — 1 Sp.; Type: *rosea* Beut. (1893).
- Eunaduna* n. g. Notodontidarum. **Dognin**, Le Naturaliste, 1901 p. 249. — *cerurata* p. 249 (Tucuman).
- Eunotela* n. g. **Schaus** (7) p. 325. — 3 (2 n.) Sp.; Type: *pallida*. — Neu: *pallida* p. 325 Taf. XII Fig. 5 (Castro, Parana). — *collaris* p. 326 (Colombia).
- Eunystalea* Grote. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 326. — 1 Sp.; Type: *indiana* Grote (1884).
- Euprepia caja* L. var. *americana* Harr. **Gibson, Arthur**, The Life-History. Canad. Entom. vol. 32 No. 11 p. 321—325.
- Euproctis varians* Walk. (= *pusilla* Moore) in Wei-Hai-Wei. **Fletcher**, The Entomologist vol. 34 p. 174. — *flavociliata* **Swinhoe**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 (verw. m. *E. conspersa* Feld.) p. 465 ♀ (Perak).
- Eupseudosoma agramma* **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 29 (Mexico).
- Eupterote dulcinea* (einige ♂ so blass wie *E. calandra* Swinh. v. Khasia Hills, doch Antennen länger u. tiefer gekämmt) **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7.) vol. 8 p. 123 ♂♀ (Salayar Island, South of Celebes).
- Eupterotidae. Auf Trinidad vertreten durch je 1 neuen Vertreter der Gatt. *Apatelodes* u. *Tarchon*. **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 142—148.
- Eurota minerva* **Schaus**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 41 (Parana).
- Euschiropterus valkeri* **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 619 (Chili). — *discifera* p. 621 Taf. LI Fig. 9 (Brasilien).
- Eustema* n. g. **Schaus** (7) p. 285. — 1 Sp.; Type: (*Stilpnolia*?) *darra* Druce (1894).
- Eutricha quercifolia*. Occurrence at Margate. **Colthrup, C. W.** Entom. Record, vol. 13 No. 10 p. 306. — siehe *Porthesia chrysorrhoea*. **Phillips**.
- Eutrichopidia* n. g. Type: *Phalaena latinus* Don. **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 554.
- Euxoga* Möschl. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 316. — 1 Sp.; Type: *argenteopunctata* Möschl. (1878).
- Farigia* n. g. **Schaus** (7) p. 283. — 8 (3 n.) Spp.; Type: *Sagana* Druce (1894). — *musara* p. 283—284 (Castro, Parana). — *vecina* p. 284 ♀ (Orizaba, Mexico). — *hydriana* p. 284 ♂♀ (Jalapa, Mexico; Aroa, Venezuela).
- Gastropacha quercus*, A. *caja* u. A. *purpurea* auf Pfiemen neben versch. anderen Futterpflanzen. **Metzenauer**, Insektenbörse, 18. Jhg. p. 188. — Sämtliche fressen auch junge Buchenblätter, alles andere unberührt lassend.
- Gastroplakaeis* (ist mit *Gonometa* sehr nahe verwandt) *meridionalis* **Aurivillius**, Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 125 Abb. Fig. 26 (Mashunaland: Salisbury).
- Gisara* n. g. **Schaus** (7) p. 310. — 2 Sp.; Type: *Symmerista Proene* Schs. (1892).
- Givira* Wlk. Charakteristik u. Eintheilung. **Schaus**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 48. — *polybioides* l. c. (Parana). — *platea* p. 73 (Brasil.). — *watsoni* p. 73 (Brasil.).
- Glaucostola* n. g. (Type: *Leucopsumis guttipalpis* Walk.) **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 87.
- Gluphisia* Boisd. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 321—322. — 5 Sp.; Type: *crenata* Esp. (1785).
- Gnophaela latipennis* **Dyar**, Proc. Entom. Soc. Washington, vol. IV p. 408.

- Gnophria quadra* L. 1901 bei Karlsruhe zahlreich. **Gauckler**, Insektenbörse, 18. Jhg. p. 389.
- Goacampa* n. g. **Schaus** (7) p. 331. — Type: *variabilis* n. sp. p. 331 ♂♀ Abb. Taf. XII Fig. 6 (Oaxaca, Mexico).
- Goaxis* n. g. **Schaus** (7) p. 316. — *singularis* p. 316 Taf. XI Fig. 13 (Petropolis, Brazil).
- Gopha* Walk. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 290—1. — 2 Spp.; Type: *mixtipennis* Wlk. (1862) Abb. Taf. XI Fig. 7. — Neu: *albipuncta* p. 290 (São Paulo, S. E. Brazil).
- Gorgopsis bacoti* n. sp. siehe Hepialidae.
- Gymnasura taprobana* (898 a) **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 184—185 ♂ (Ceylon, Matelé)
- Gynanisa isis*. Raupe. **Packard**, Psyche, vol. 9 p. 281.
- Haemanota* n. g. **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 87. — *rubriceps* p. 87 (Brasilien),
- Halisidota tessellaris* u. *harrisii*. Charakt. **Dyar**, Canad. Entom. vol. 33 p. 30.
 Neu: **Hampson** beschreibt in Cat. Lep. Phal. III: *sthenia* p. 155 Taf. XL Fig. 6. — *endolobata* p. 157. — *cyclozonata* p. 162 Taf. XL Fig. 2. — *umbrosa* p. 163 tab. cit. Fig. 14. — *coniota* p. 164 tab. cit. Fig. 1. — *polyodonta* p. 166 tab. cit. Fig. 2. — *atrimaculata* p. 166 tab. cit. Fig. 16. — *acuta* p. 167 tab. cit. Fig. 21. — *brunneitincta* p. 169 tab. cit. Fig. 7. — *interstriata* p. 170 tab. cit. Fig. 20. — *rhoda* p. 170 tab. cit. Fig. 12 (sämtlich aus Südamerika).
- perdentata* **Schaus**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7. p. 266 ♂ ♀ (Orizaba, Mexico). — *huaco* p. 266 (Rio Janeiro, Castro, Parana). — *arenacea* p. 266—267 (Loja, Ecuador). — *pallida* p. 267 (Loja, Ecuador).
- Hapigia* Guen. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 341. — 8 (1 n.) Spp.; Type: *nodicornis* Guen. (1852).
 — Neu: *rufescens* p. 341—2 (Aroa, Venezuela).
- Haploa*. Variation. Zuchtexperimente. **Foster**, Entom. News Philad. vol. XII, p. 79—83, 97—105 nebst Taf. V.
- Haplozana* n. g. Notodontidarum (scheint *Anthena*, *Anticyra* u. *Zana* am nächsten zu stehen. Von den beiden erst. besonders versch. durch die R. 6 der Vflgl., welche frei aus der Spitze der Mittelzelle entspringt u. von *Zana* dadurch, dass d. Rippe 10 sich vor d. Rippe 7 vom gemeinsamen Stiele der Rippen 7—10 trennt. Das Radialfeld ist immer sehr klein u. fehlt bisw. gänzlich). **Aurivillius**, Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 122 ♀ Flgl.-Geäder Fig. 23 (Congo-gebiet: zwischen Kassengo u. den Stanleyfällen).
- Hardingia* n. g. **Schaus** (7) p. 293. — Type: *roberti* p. 293 Taf. XI Fig. 10 (Colombia). Hierher *Lirimiris mechanica* Dogn. p. 293.
- Harmonia pini* Kell. Schäd. an *Pinus strobus* L. **Chittenden** (p. 565 des vor. Berichts sub No. 2).
- Harpia* Ochs. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 323. — 4 Spp.; Type: *bicuspis* Borkh. (1790).
- Heliactinidia* n. g. (Type: *Bepara chiguinda* Druce) **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 205. — *caerulescens* p. 206 Taf. XLII Fig. 5 (Columbien).
- Heliozona* n. g. (Type: *Satara lianga* Semper). **Hampson**, t. c. p. 218.
- Hemiceras* Guen. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 333. — 54 (17 n.) Spp.; Type: *pallidula* Guen. (1852). — Neu: *tolula* (verw. mit *H. latula* Guen.)

- p. 335 (Castro, Parana). — *striata* p. 335 (Nova Friburgo, Brazil). — *vecina* (verw. mit *cadmia* Guen.) p. 335—336 (Aroa, Venezuela; Jalapa, Orizaba, Mexico). — *aroensis* p. 336 (Aroa, Venezuela). — *serana* p. 336 (Aroa, Venezuela). — *brunnea* p. 336—337 ♂ (Cochabamba, Bolivia). — *nigrigutta* p. 337 (Cochabamba, Bolivia). — *ovalis* p. 337 (Nova Friburgo, Brazil). — *bilinea* p. 337—338 (Jalapa, Mexico). — *pagana* (verw. mit *H. metastigma* Walk., doch dunkler, Innenrand d. Vfgl. gerader) p. 338 ♂♀ (Aroa, Venezuela). — *punctilla* p. 338—339 ♂ (Aroa, Venezuela). — *quebra* p. 339 ♂ (Fundort wie vor.). — *velva* p. 339 ♂♀ (wie vorig.). — *nigricosta* p. 339—340 ♀ Taf. XII Fig. 10 (Costa Rica). — *nigrescens* p. 340 ♂♀ Taf. XII Fig. 9 (Costa Rica). — *sericita* p. 340 (Columbia).
- Beschr. d. Raupe von *pallidula* Guen. p. 340—341.
- egregia* **Dognin**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 176 (Ecuador).
- cotula Guenée in S. Amer. **Therese von Bayern** p. 283.
- Hemihyalea* n. g. (Type: Phegoptera cornea H.-S.) **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 129. — *xanthosticta* p. 132 Taf. XXXVIII Fig. 5 (S. America).
- Hemioplisis H.-S. (= Decetiodes Warr. Nov. Zool. Tring VI p. 412). Bemerk. hierzu. **Warren**, Nov. Zool. Tring vol. VIII p. 436—437. — *maculata* p. 437 ♂ (Suapure, Caura River, Venezuela).
- Heorta Walk. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 269—270. — 1 Sp.; Type: rosealba Walk. (1858).
- Hepialidae. **Quail, Ambr.**, Life Histories in the Hepialid Group of Lepidoptera, with Description of one New Species and Notes on Imaginal Structures. With 2 pls. Trans. Entom. Soc. London, 1900 P. III p. 411—422. Neu: *Gorgopsis Bacotii* n. sp.
- Hepialus lupulinus L. **Noll, P.** in Naturaliste 1901 p. 155. Beschr. von Raupe, Puppe u. Falter; neuer Feind der Erdbeere etc. — *sylvanus* gefangen auf den Dünen bei Birling Gap, Sussex. The Entomologist vol. 34 p. 62. — im Walde bei Pogutken, Kreis Berent, West-Pr. **Treichel** p. 169.
- Neu: *protopus* (verw. m. *momus* Druce) **Druce**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 436—437 (Columbia, Bonda).
- Herbertina* n. g. **Schaus** (7) p. 329. — 1 Sp.; Type: *Lophopteryx eumena* Druce (1900).
- Herpa meeki* (beschr. ♀ Nov. Zool. Tr. III, 325; ♂ op. cit. VI, 439) Abb. Taf. IX Fig. 5 ♂, 6 ♀. — *acrita* (beschr. op. cit. VI, 440) Taf. IX Fig. 7 ♀. — *albivitta* (beschr. t. c. p. 439) Taf. IX Fig. 8 ♂, 9 ♀. — *stigma* (beschr. t. c. p. 440) Taf. IX Fig. 10 ♂.
- Heterocampa* Doubl. Synon., Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 301—302. — 55 (9 n.) Spp.; Type: *astarte* Doubl. (1855). — Neu: *tuna* (Palp. länger u. glatter, Flügel schmaler als bei typ. Formen) p. 304 (Columbia). — *semilunata* p. 304—305 (Castro Parana). — *aroensis* p. 305 ♂♀ (Aroa, Venezuela). — *isidra* p. 305—306 ♀ (Orizaba, Mexico). — *jamaicensis* p. 306 ♀ (Jamaica, B. W. I.). — *vestona* (verwandt mit *viridescens* Walk., doch verschied.) p. 306 ♀ (Orizaba, Mexico). — *discata* p. 306—307 (Castro, Parana). — *rascona* p. 307 (Orizaba, Mexico). — *divisa* p. 307 ♂ (Rio Janeiro).
- amata* **Druce**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 75 (Venezuela, Merida). — (?) *antonia* p. 76 ♂ (Borneo). — *latex* p. 76 ♂ (W. Afrika, Gambia). — *exyra* p. 76 ♂♀ (Venezuela, Merida).

- bichorda* **Hampson**, t. c. p. 251 ♀ (Nassau).
c(h)orda **Druce**, t. c. p. 436—437 ♂ (Columbia).
- Heterogynis. Bemerk. zur Eiablage, Raupen, Kokon, Puppe. **Chrétien**, Ann. Soc. Entom. France vol. 68 p. 452 sq. in den Ann.
- Hippia Moeschl. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 286. — 8 Spp.; Type: *metetes* Cr. (1875). — (*Harma*) *vittipalpis* Walk. wohl = *H. insularis* Grote.
- Histioea *meldolae* Butl. u. *cephesus* Cram. von Trinidad. **Kaye** (1) p. 117.
- Hollandella* nom. nov. für *Hollandia* Karsch nec Butl. **Gill**, Science, vol. XIII p. 949.
- Hollandiidae keine gültige Familie. **Gill**, t. c. p. 949.
- Holcocerus *volgensis* Christ. (im gross. Catal. Stgr.'s v. 1871 fehl.) u. kleinere Sp. m. dunkl. Uffgl. (vielleicht n. sp.), jetzt bei Sarepta gefunden, früher nicht (Juli flieg.). **Becker, A.**, Insektenbörse, 17. Jhg. p. 380. — In der 3. Aufl. aufgenommen (Referent).
- Holomelina *trigonifera* **Schaus**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 269 (Guadalajara, Mexico). — *cocciniceps* p. 269 (Manitou, Colorado).
metazonata **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 191 Taf. XLII Fig. 18 (Panama).
 — *tenuicincta* p. 196 tab. cit. Fig. 13 (Peru).
- Hoplojana n. g. Striphnopterygidarum *indecisa* n. sp. (durch die mit 2 Dornen bewaffneten Vtibiaen sofort von *Jana* unterschieden). **Aurivillius**, Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 120 ♂ Abb. Fig. 120 (Deutsch-Ost-Afrika: Lindi).
- Hyalarctia n. g. (Type: *H. sericea* **Schaus**). **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III. p. 143. — *sericea* (im Aussehen der *Munonia iridescens* Sch. sehr ähnlich) **Schaus**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 268 (Castro, Parana).
- Hyalencereon *lugubris* **Schaus**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 44 (Columbia).
- Hyalocca* n. g. (Type: *Lithosia diaphana* Eversm.) **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 202.
- Hydrias *subguttularis* **Dognin**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 307. — *cinerea* p. 308. — *simia* p. 308 (alle drei aus Venezuela).
- Hyleora *lacerta* **Druce**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 78 ♂ ♀ (West Australia).
- Hylesia *falcifera* Hb. (= *myops* Wlk.) in S. Amer. **Therese von Bayern** p. 282.
 Neu: *praeda* **Dognin**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 306. — *margarita* p. 307 (beide aus S. Amer.).
- Hyparpax Hübn. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 279. — 3 Spp.; Type: *aurora* Sm. a. Abb. (1797).
- Hypenodes *anticlina* (= *Rhapsa octias* Huds., N. Zeal. Lep. 37, pl. VI, 7 nec Meyr.) **Meyrick**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 566 ♂ ♀ (New Zealand, Wellington). — Bemerk. hierzu.
- Hyperaescha Butl. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 329. — 5 Spp.; Type: *pallida* Butl. (1880).
- Hyperandra* n. g. (Type: *Creatonotus appendiculatus* H.-S.). **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 69.
- Hyperthaema* n. g. (Type: *Halesidota sanguineata* Walk.). **Hampson**, t. c. p. 88.
 Neu: *albipuncta* **Schaus**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 265 (São Paulo, Brazil). — *haemacta* p. 265 (Costa Rica).
- Hyphantria *strigulosa* (1852 a) **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 185 ♂ (Natal).

- Hypidalia* n. g. (Type: *Idalus enervis* Schaus) **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 70.
- Hypocampa milhauseri*. Auffinden der Kokons. **Dadd**.
- Hypocladia restricta* (800a) **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 172 ♂ (Panama: La Chorrera).
- Hypocrisias* n. g. (Type: *Purius punctatus* Dr.) **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 216.
- Hypomolis* n. g. (Type: *Idalus evippus* Druce) **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 414.
- Hyponerita* n. g. (Type: *Idalus lavinia* Druce) **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 440.
- Hypsidæ von den Bahamas. **Hampson** (2) p. 250. — 1 Sp.
auf Trinidad, vertreten durch die Gatt.: *Laurona* (1), *Hyalurga* (1), *Phaloë* (1) u. *Pericopis* (1). **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 136.
- Ichthyosoma* Feld. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 301 — 2 Sp.; Type: *tigniferum* Feld. p. 301.
- Ichthyura rubida* **Druce**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 78 ♂ ♀ (Trobriand Islands, Kiriwini).
- Idalus xanthia* **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 17 (Venezuela). — *veneta* **Dognin**, Le Naturaliste, 1901 p. 69. — auch Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 175 (Columbien).
- Ilema punctilineata* (289a) **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 180 ♂ ♀ nebst ab. 1 (Brit. E. Africa: Masailand, E. Quaso; Uganda Ry., mile 478). — *peperita* (291a) p. 181 ♂ (Br. E. Africa, Uganda Ry., mile 478; Nakuro). — *distigmata* (304a) p. 181 ♀ (Old Calabar; Br. E. Africa: Kiknyu, Nairobi Plains). — *ceratoplaga* (310a) p. 181 ♀ (Brit. E. Africa: Uganda Ry., mile 478). — *sanguicosta* (322a) p. 181—182 ♂ ♀ (Br. E. Africa, Uganda Ry., mile 478; Mashonaland, Salisbury). — *phaeocraspis* (340a) p. 182 ♀ (Br. E. Africa, Uganda Ry., mile 478; Masailand, Quaso). — *leia* (346a) p. 182 ♂ (Br. E. Africa, Uganda Ry., mile 478).
- Immetalia eichhorni* **Rothschild & Jordan**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 406 ♂ ♀ (Isabel, Solomon Is.).
- Ichnocampa nigradorsata* **Schaus**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 268 (Peru). — *nigrivena* p. 268 (Suapi).
- Josia auriflua* Wlk. in S. Amer. **Therese von Bayern** p. 280.
- Kalkoma* n. g. **Schaus** (7) p. 279 — 3 Spp.; Type: (*Symmerista*) *alba* Druce (1898).
- Kurtia* n. g. **Schaus** (7) p. 331—332. — Type: *modesta* n. sp. p. 332 Taf. XII Fig. 7 (Aroa, Venezuela).
- Lachneida. New Names among the Lachneids. **Tutt, J. W.** Entom. Record, vol. 13 No. 11 p. 327—328.
- Lachneis lanestris. Ei. **Chapman**, Entom. Record, vol. 13 No. 7 p. 225—226. — Condition of Lachn. lan. during the Pupal State. **Chapman**, t. c. No. 10 p. 284—286. — The Development of the Imago in the Pupa. **Chapman**, t. c. No. 8 p. 243—244.
- Cocoon of Lachneis lanestris. **Chapman**, t. c. No. 8 p. 244.
- Imaginal Development in Pupae of Lachneis lanestris. — The Opening of the so-called Lid of the Cocoon. **Tutt, J. W.** t. c. No. 8 p. 244.
- The Lid of the Cocoon of Lachneis lanestris. **Chapman**, t. c. No. 10 p. 299.

- Lagoa pyxidifera*. Raupe. **Dyar** (15).
- Langsdorfia Buckleyi* **Druce**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 436 ♂ (Ecuador Sarayacu). — *rufescens* p. 436 ♂ (Colombia, Bonda).
- *coresa* **Schaus**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 8 p. 75 (Columbia).
- Lansdownia bifenestralis* **Snellen**, Tijdschr. v. Entom. vol. XLIV p. 107 (Java).
- Lasiocampide von Transvaal. Proc. Entom. Soc. London, 1901 p. IX. — Das ♀ schlüpft aus dem Kokon nicht aus, die Fühler sind verkümmert etc. Desgl. kurze Beschr. u. Bemerk. The Entomologist, vol. 34 p. 183.
- Lasiocampa bufo* **Lederer**. 2. Zucht durch **Thurau**. Berlin. Entom. Zeitschr. 47. Bd. Sitz. Ber. f. 1901. 10. Okt. — Insektenbörse 18. Jhg. p. 357.
- Eggs of fasciatella var. excellens. Eier. **Bacot, A.** Entom. Record, vol. 13 No. 10 p. 307.
- medusa **Strecker**. **Grinnell, Fordyce**. Entom. News vol. 12 Jan. p. 26.
- otus **Drury**. **Tomala, Ferd.**, Rovart. Lapok 8. köt. 9. füz. Nov. p. 188. — Ausz. Hft. 9 p. 22.
- pini*, gynandromorph. Stück, links ♂, rechts ♀ in der Farbe einer rostroth. Aberr. Fühler gekämmt, nur der linke schwächer. Theilung äusserlich vollkommen der Längsachse entsprech. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900 4. Jan. (p. 1). — im Kreise **Berent, Treichel**, p. 169.
- *potatoria*. Parthenogenese. **Reimer**, Insektenbörse, 18. Jhg. p. 68—69.
- *quercifolia* L. mit auffallend kräftiger Zeichnung. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900. 11. Jan. (p. 3).
- *quercus*. **Andrews, E.** (1). Ohne Ueberwinterung gezogen. Aufzucht aus Eiern Mitte August mit Eiche (bis 20. Sept.), den frischen Schössling einer breitblättr. Weide (bis 10. Okt.) und dann gewöhnl. Weide. Einspinnen der ersten am 15. Dez., der letzt. in der 1. Febr.-Woche. Das Ausschlüpfen begann am 23. Febr. — Eiablage im März. Wärme beschleunigte die Umwandlung zur Puppe. Das Ausschlüpfen geschah nur bei genügend hoher Temperatur. Diverse Bemerk. zur Giftigkeit der Haare u. zum Kokon. — Weitere Zuchtergebnisse. **Andrews** (2).
- Zur Aufzucht. **Blair, K. G.**, The Entomologist, vol. 34. Sept. p. 250—251
- Beobachtungen über *quercus* etc. in 1901. **Lowe, F. E.**, Entom. Record, vol. 13 No. 11 p. 375—376.
- Ueberwinternde Raupen. **Colthrup, C. W.** — Raupen von *Lasioc. querc.* u. Varr. *callunae* **Palm.**, *viburni* **Gn.**, *meridionalis* **Tutt** und *sicula* **Staud.** u. Kreuzungen zwischen diesen Rassen. **Bacot, Arthur W.**, Entom. Record, vol. 13 No. 4 p. 114—117, u. t. c. No. 11 p. 328 (Concl.), t. c. No. 5 p. 142—144.
- Varietäten. **Warburg**, Entom. Record, vol. 13 p. 237 etc.
- Hybrid. *Lasioc. querc.* ♂ and *Pachygastria trifolii* **Tutt**, t. c. No. 10 p. 298.
- hybr. *wagneri* für *Lasiocampa quercus* ♂ × *Pachygastria trifolii* ♀.
- Tutt, J. W.**
- *querc. var. meridionalis* n. **Tutt, J. W.** Entom. Record, vol. 13 No. 4 p. 113—114.
- Lauron rica* **Hb.** in **S. Amer. Therese von Bayern** p. 280. — Diopt.
- Lemonia* **Hübner**. zu den *Sabaliadae* gezogen. **Hampson**, Trans. Entom. Soc. London 1901 p. 187 sq.

Charakt. der Gatt. p. 187—188.

Sect. I. Im Vflgl. fehlt Ader 10: *sardanapalus* Staud. Abb. des ♂ Fig. p. 188.

Sect. II. Im Vflgl. Ader 10 vorhanden:

A. Vflgl. mit postmedianer Linie

(a) Vflgl. rotbraun, Fleck am Ende der Zelle gelb. *dumi* L. p. 189.

(b) Vflgl. blass, Fleck am Ende der Zelle dunkel

(a) Vflgl. mit blass. Postmedianlinie, Fleck am Ende der Zelle gross. *balcanica* H.-S. p. 189.

(b) Vflgl. m. dunkl. Postmedianlinie, Fleck am Ende d. Zelle klein.

(a) Hflgl. mit Postmediallinie. *vaillantina* Oberth. p. 189.

(b) Hflgl. ohne solche. *ballioni* Christ. p. 189.

B. Vflgl. ohne Postmediallinie.

(a) Vflgl. blass gelbbraun mit schwarz. Fleck am Ende der Zelle. *taraxaci* Esp. p. 189.

(b) Vflgl. dunkel gelbbraun (fuscous brown), Adern ohne blasse Striche. *philopalus* Donz. p. 189.

— L. (*Crateronyx*) *dumi*. Eier u. system. Stellung. **Tutt, J. W.**, Entom. Record vol. 13 No. 5 p. 167—168.

Lepasta Moeschl. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 278. — 6 (1 n.) Spp.; Type: *bracteata* Feld. (1874).

Neu: *lignistriata* p. 278 (Rio Janeiro).

Leucoma salicis L. an Schwarzpappeln, 1901 bei Berlin. Insektenbörse 18. Jhg. p. 221. — *ab. rubicunda* n. (Flgl. wie Haarbekleidung rötlich, am V.- und Irande d. Vflgl. fast rosenrot, ♂) **Strand**, Schrift. naturf. Ges. in Danzig, N. F. 10. Bd. 2./3. Hft. p. 285 (südl. Norwegen).

Leucophobetron n. g. **Dyar** (13).

Limacodidae von Central-Afrika. **Sharpe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 284; 1 Sp. v. *Chrysopoloma*. — von den Bahamas. **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 253—254. — 1 n. sp.

Liparidae. Raupen; Fundort. **Therese von Bayern** p. 239.

Liparis. Biologie (Mocurs des Liparis). **Mansion, A.**, Revue Scientif. (4) T. 15 No. 2 p. 49—51. — *chrysorrhoea* L. Trois observations de Stomatite érucique provoquée par les chenilles de Liparis chrys. **Artaut de Vavey, S.**, Compt. rend. Soc. Biol. Paris T. 53 No. 5 p. 103—104. — Die Nonne. **Eckstein, Karl**, Zeitschr. f. Forst- u. Jagdwesen, Danckelmann, 33. Jhg. Dez. p. 711—719. — Nonnen-Calamität in Schweden. **Meves, J.**, t. c. No. 9 Sept. p. 330—337.

Lirimiris Walk. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 290. — 2 Sp.; Type: *lignitecta* Walk. 1865 = (*Tifama*) *argentifera* Druce.

Lithosia argentea Mssn. Fundorte etc. **Therese von Bayern** p. 279—280. *complana* var. *sericea*. Biologie (Habits of). **Day, G. O.**, Entom. Record, vol. 13 No. 9 p. 276.

lutarella L. alpine Var. ♂ aus der Gegend von Tarasp in Unterengadin, auf deren Hflgl. das Schwarz bis auf einen kleinen Streifen am Vrande fehlt. Berlin. Entom. Zeitschr. Sitz.-Ber. f. 1900 15. März (p. 10).

muscerda. Biologie (Habits of). **Bowles, E. A.**, Entom. Record, vol. 13 No. 9 p. 277.

- quadra.** Variation in Tiefe der Färbung und Fehlen der Flecken. The Entomologist vol. 34 p. 60.
- sericea** Gregs. bon. sp. **Prout, Louis P.**, Entom. Record, vol. 13 No. 12 p. 359. — Note by **J. W. Tutt** *ibid.* p. 359.
- Lithosianae auf Trinidad vertreten durch je 1 Sp. der Gatt. *Anthona*, *Thyone* u. *Chionosia*. **Kaye** (1) p. 120.
- Lithosiidae. Raupen, Fundorte. **Therese von Bayern** p. 289.
- Litodonta* Harv. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 299. — 2 (1 n.) Sp.; Type: *hydromeli* Harv. (1876). — Neu: *nigripuncta* (Palpen ein wenig stärker entwickelt als b. d. Type) p. 299—300 Taf. XI Fig. 12 (Parana).
- Lobeza* H.-S. Charakt. **Schaus** (7) p. 320. — 5 (1 n.) Sp.; Type: *aglone* H.-S. (1854). — Neu: *dentilinea* p. 320—321 (Saõ Paulo, S. E. Brazil). — Beschr. d. Raupe v. *dukinfieldia* p. 321.
- Lobobunaea* n. g. (Type: *Bunaea phaedusa* Druce) **Packard**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 191 Abb. Taf. XII. — *phaedusa*. Erste Stände. Beschr. u. Abb. d. Raupe. **Beutenmüller**, t. c. p. 193, 194.
- Lonomia* spec. Illustr. Zeitschr. f. Entom. 5. Bd. No. 11 Taf. VII Fig. 8 Raupe u. Puppe, spec. Fig. 9 Raupe u. Puppe.
- Lophocampa flavosticta* Boisid. Illustr. Zeitschr. f. Entom. 5. Bd. No. 9 Taf. V Fig. 1 Raupe, Fig. 1a Puppe.
- Lophonotidia* n. g. **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 617. — *nocturna* p. 617 (Centralafrika).
- Lophodonta* Pack. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 330. — 1 Sp.; Type: *angulosa* Sm. a. Abb. (1797).
- Lophopteryx*. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 328—329. — 2 Spp.; Type: *capucina* L. (1758). — *camelina* Aberr. **Whittle** (8 des vor. Berichts). — *cucullia*. Ausschlüpfen im Herbst. **Adkin, R.** (11). — *cucullia* Esp. Raupe empfindlich etc. **Wendlandt** p. 77. — *carmelita* Esp. in the New Forest. **Bankes, Eust. R.**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 99.
- Luffia*. Bemerk. über dieselben, nebst Betrachtung über die Parthenogenesis. **Chapman**, Entom. Record, vol. 13 No. 5 p. 91—95, No. 5 p. 149—153, No. 6 p. 178—180.
- ferschaultella* von Cannes. Eine Spinne, *Cyclosa conica*, die auf demselben Felsen wie das Lep. lebt, zeigt in der Ruhe fast genau Form u. Färb. der Raupengehäuse. Proc. Entom. Soc. London 1901 p. VIII—IX.
- lapidella*. Larvae in September. **Chapman**, Entom. Record vol. 13. No. 10 p. 299—300.
- magiella*. **Chapman, T. A.**, t. c. vol. 13 No. 2 p. 80—81.
- Lusura* Walk. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 321. — 3 Spp.; Type: *discalis* Walk. (1855).
- Luxiaria gammaria* **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 125 ♂ (Lawas).
- Lyclene obliquilinea* (steht zwischen *L. undulosa* Walk. v. Indien u. *L. cuneigera* Walk. von Borneo) **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 467 ♂ ♀ (Jaintia Hills, Assam).
- eldola* (verw. m. *L. senara* Moore v. Java, auch mit *L. flavida* Butl. von den Salomonsinseln) p. 468 ♂ (Coomoo, Queensland).
- Lycomorpha Drucei* (1153a) **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 175 ♀ (Mexico, Durango).

- Lymantria monacha* L. (Nunnan). Bericht darüber in Schweden f. 1900. Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 1. — Statsanslag zur Bekämpfung p. 62.
- (dispar). Undersökningar rörande nunnan (*Lym. mon. L.*) å dess Härjnings-Område i Södermannlands och Östergötlands län År 1900. **Bengtsson**, Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 145—156 mit 1 Tab. Sammelzeit u. Fundorte. Verhältnis d. ♂ u. ♀ u. von Paras. heimgesuchter Individ. etc.
- für finnische Fauna neu. **Lampa**, t. c. p. 158.
- (*Liparis*) *monacha* L. Nunnan funnan i Finland. **Reuter, Enzio**, 1900. Meddel. Soc. Fauna Flora Fenn. 26. Hft. p. 41—42. — Ausz. p. 220.
- ♂ u. ♀. Teratologische Stücke. **Hampson** (4) p. 118. — siehe ferner *Liparis* (*monacha*).
- [*Liparis*] *monacha* and *Clostera curtula* in Moist Atmosphere. **Rydon, Arth. Hope**, Experiments in Rearing. Entom. Record, vol. 13 No. 8 p. 253—254.
- Lysana* Moeschl. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 273. — 2 Spp. [1 n.]; Type: *plexa* Moeschl. (1883). — Neu (?): *plusiana* (von d. Type versch. durch „smooth legs“) p. 274 ♂ ♀ (Aroa, Venezuela).
- Macrocneme lades* Cram., *thyra* Moeschl. u. *nigritarsia* Hampson, auf Trinidad **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 117.
- auripes* Wlk. Fundorte nebst Bemerk. **Therese von Bayern** p. 277—278.
- Neu: *nordina* **Schaus**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 41. — *sura* p. 42 (Brasil.).
- Macrosia chalybeata* (251a) **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 179—180 ♀ nebst *ab.* 1 (Br. E. Africa, Eb Urru; Mashonaland, Salisbury). — *polioplaga* (251b) p. 180 ♂ (Br. E. Africa; Uganda Ry., mile 478).
- Macrothylacia rubi*. Stridulation of ♂. **Prideaux** (5). — Further Notes on the Assembling. **Prideaux** (6).
- Macrurocampa* Dyar. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 323. — Sp.; Type: *marthesia* Cr.
- Maenas malayensis* **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 249 Taf. XLIII Fig. 2 (Bali). — *albescens* p. 250 tab. cit. Fig. 20 (Venezuela). — *flavata* p. 512 Taf. LI Fig. 7 (Peru).
- bilinea* **Schaus**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 269 (Castro, Parana).
- Magava* Walk. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 309. — 2 [1 n.] Sp.; Type: *multilinea* Walk. (1865). — Neu: *marginata* p. 308 (Rio Janeiro).
- Malacosoma neustria*. Stück mit kaum einer Spur von blassen Querlinien. The Entomologist, vol. 34 p. 60.
- Malocampa n. g.* **Schaus** (7) p. 307—308. — 11 [2 n.] Sp.; Type: *punctata* Cram. (1782). — *sidoides* p. 308 (Aroa, Venezuela), — *obscura* (verw. m. *danala* Druce) p. 308—309 (Columbia).
- Marecidia n. g.* Syntomidarum **Schaus**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 43. — *sanguipuncta* p. 43 (Brasilien).
- Marshalliana n. g.* Hollandiidarum (von den nahe verw. Gatt. *Metarbela* Holl. u. *Arbelodes* Karsch sofort versch. durch das Fehlen der Anhangszelle der Vflgl.) **Aurivillius**, Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 126. — *bivittata* p. 126—127 Abb. Fig. 28 (Mashonaland: Umtali).
- Marthula* Walk. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 275. — 3 Spp.; Type: *quadrata* Walk. (1856). Abb. Taf. XI Fig. 2.

- Maschane** Walk. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 317. — 2 Sp.; Type: *erraticus* Walk. (1863).
- Massagidia n. g.** (Type: *Geometra hesperaria* Cram.) **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 644.
- Megalopyge krugii**. Raupe. **Dyar**, Proc. Entom. Soc. Washington, vol. IV p. 380.
- Megasoma** (nom. praecoc., dafür zu setzen *Taragama*) *repandum*, um Cadix auf Ginster, in Algier auch auf Tamarisk., in Gefangenschaft mit Haselnussblättern gross gezogen. **Demaison** p. 23.
- Melese endopyra** **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 74 Taf. XXXVII Fig. 15. — *ocellata* p. 76 tab. cit. Fig. 2 (Brasilien).
- Menis ithrites** **Druce**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 75 ♂ (Peru).
- Meragisa n. g.** **Schaus** (7) p. 314. — 6 [3 n.] Spp.; Type: *Orthosoma valdiviesoi* Dogn. (1890). — Neu: *pallida* p. 314 (Castro Parana). — *politioides* (ist die in d. Biol. Centr.-Amer. als *C. politia* Cr. bezeichn. Sp.) p. 314—315 (Rio Janeiro u. Coatepec, Mexico). — *sidata* p. 315 (Merida, Venezuela).
- Mesothen albifrons** **Schaus**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 41 (Columbien).
- Metacrias strategica**. Bemerk. hierzu. **Howes**, Trans. New Zealand Inst. vol. XXXIII p. 188—190.
- Metacrisia n. g.** (Type: *Purinus courregesi* Dogn.) **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 431.
- Metarbela** (?) *umtaliana* (im Aeussern etwas an *stivafer* Holl. erinnernd, hat aber feinere und zahlreichere Strichelchen d. Vflgl. u. keine silbernen Zeichn. Rippe 10 der Vflgl. entspringt aus dem Stiele von 8 + 9 u. R. 8 der Hflgl. ist vor der Mitte des Vrandes der Mittelzelle mit dieser durch eine kleine Querrippe verbunden, weicht also im Geäder recht erheblich von den typ. *Metarbelen* ab) **Aurivillius**, Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 127 ♂ Abb. Fig. 29 (Mashunaland, Umtali).
- Metarctia rufescens** Walk. Biol. Notiz etc. **Barrett**, C. G. (2) p. 285.
- flavivena* (289a). **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8. p. 169 ♂ ♀ (Br. E. Africa, Machakos; Mashonaland, Salisbury). — *fusca* (289b) p. 169 ♂ (Br. E. Afr., Kikuyu, Roromo). — *sarcosoma* (p. 290a) p. 170 ♂ (Br. E. Africa, Machakos). — *fulvia* (292a) p. 170 ♂ (Br. E. Africa, Athi-yamawe). — *pallida* (292b) p. 170 ♂ (Br. E. Africa, Kikuyu, Roromo, Nairobi).
- Metuegoa melanoleuca** (708a) **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 184 ♂ (N. Guinea, Milne Bay). — *fasciosa* (hat keinen konischen Vorsprung auf der Stirn) **Rothschild & Jordan**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 424 ♂ (Isabel, Solomon).
- Metisa aurea** Butl. in Wei-Hai-Wei. **Fletcher**, The Entomologist, vol. 34 p. 174.
- Micraga ochrea** (1033a) **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 174 (Brazil, Rio Grande do Sul).
- Microtane n. g.** Lithosianarum **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 183. — *fusca* (541a) p. 183 ♂ (Ceylon, Matalé).
- Miltochrista sullia** (ähnelt etwas *M. chypsilou* Semper v. den Philippinen, doch deutl. verschieden) **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 468 ♂ (Sarawak, Borneo).
- Mimozethes n. g.** Drepanulidarum (Type: *M. (Euchera?) nana* Warr.) **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 190—191.

- Minara* Walk. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 267. — 1 Sp.; Type: (Notodonta). *histrionica* H. S. (1855) = *pardalina* Walk. (*Minara*) (1856).
- Miresa sola* **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 464—5 ♂ (Sarawak, Borneo).
- Misogada* Walk. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 300. — 1 Sp.; Type: *cinerea* Pack. (1864). Synon. ders.
- Molippa sabina* Wlk. in S. Amer. **Therese von Bayern** p. 282. — Abb. der Raupe. Illustr. Zeitschr. f. Entom. 5. Bd. No. 11 Taf. VII Fig. 4.
- Monema flavescens* Walk. Bemerk. zu den Varietäten ders. **de Joannis, J.** Bull. Soc. Entom. France, 1901, p. 251. — Ist in gewissen Gebieten China's sehr häufig. — *var. nigricans* n. p. 252 (vom colline de Zo-sè, 20—30 km v. Chang-hai).
- Monosyntaxis* nom. nov. für *Monotaxis* Hmps. (Cat. Lep. Phal. 1900) **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7.) vol. 7 p. 466. — *trimaculata* Hmps. p. 467.
- Nadata* Walk. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 266. — 1 Sp.; Type *gibbosa* Sm. and Abb. (1797).
- Nadiasa? sanguincta* (Rippe 9 d. Vflgl. mündet in die Spitze u. nicht in den Saum wie bei *Nadiasa* Aur. Wahrscheinlich n. g.). **Aurivillius**, Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 124 ♂ Fig. 25 (Mashunaland: Salisbury). — (?) *cinerea* (hier gilt dass. wie vorher) p. 124—125 ♂ (Fundort wie vorher).
- Naduna* n. g. **Schaus** (7) p. 291. — *lignea* p. 291—292 Abb. Taf. XI Fig. 8 (São Paulo, S. E. Brasil).
- Nagidusa* Walk. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 322. — 3 (1 n.) Spp.; Type: *xylocampoides* Walk. (1862) Abb. Taf. XII Fig. 2. — Neu: *cinescens* p. 322 (Orizaba, Mexico).
- Napata atricincta* (899 a) **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7.) vol. 8 p. 172 ♂ (Brazil, Bahia). — *albimaculata* (912 a) (Panama, Cana Mines). — *sanguincta* (917 a) p. 173 (Peru, Vilcanota). — *flaviceps* (917 b) p. 173 ♀ (Panama: La Chorrera).
- walkeri Druce auf Trinidad. **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 118. broodwayi **Schaus** desgl. p. 119.
- Naprepa* Walk. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 327. — 4 (1 n.) Spp.; Type: *camelinerdes* Walk. (1855). — Neu: *elongata* p. 328 (Rio de Janeiro). — Beschr. d. Raupe von *cyllota* Druce.
- Narosa concinna* (verw. m. *N. conspersa* Walk.). **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 465 ♂ (Sarawak, Borneo).
- Neaxia* n. g. (Type: *Amaxia theon* Druce). **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 30.
- Neidalia* n. g. (Type: *Idalus villacresi* Dogn.) **Hampson**, t. c. p. 13.
- Nelo veliterna* Druce in S. Amer. **Therese von Bayern**, p. 280.
- Nemeophila* Metelkana Ld. **Aigner-Abafi**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. No. 10 p. 153—154.
- (*Chelonia*) *plantaginis* in Autumn. **Crallan, G. A. J.**, The Entomologist, vol. 34 Nov. p. 312.
- russula* L. 2 ♂, bei denen die schwarze Randbinde auf den Hflgl. u. bei einem auch die schwarze Makel daselbst fehlt. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900 15. März (p. 10).
- Neomresia nesea* Stoll auf Trinidad. **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 158.

Neonerita n. g. **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 37. — *dorsipuncta* p. 37 (Brasilien).

Neosymloca nebulosa **Barrett, C. G.** (2) p. 193—194. Besch. etc.

Nerice Walk. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 267. — 1 Sp.; Type: *bidentata* Walk. (1855).

Neritos amastris **Druce. Therese von Bayern**, p. 279.

blanda (verw. m. *asana* **Druce**). **Druce**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 434 (Colombia, Don Amo).

sanguipuncta **Schaus**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 265—266 (Palandra, Ecuador).

Nola. Ueber die Gatt. **N. Brown, R.** (2). — *transecta* (65 a) **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7.) vol. 8 p. 178 (S. Leone).

Northia trista **Brem.** von Wei-Hai-Wei. **Fletcher**, The Entomologist, vol. 34 p. 174.

Notela n. g. **Schaus** (7) p. 324. — *jaiscana* p. 324 ♂♀ Taf. XII Fig. 3 (Guadalajara, Mexico).

Notodonta Ochs. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 330. — 3 Spp.; Type: *dromedarius* L. (1767). — *dromedarius* feeding upon *Corylus avellana*. **Sheldon, W. G.** Entom. Record. vol. 13 No. 3 p. 110. — *tritophus*. Die Zucht der Sommergeneration. **Breit, Jul.**, Societ. Entom. 16. Jhg. No. 13 p. 99—100. — Neu: (?) *pira* **Druce**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 77 (Central China, Hunan).

Notodontidae auf Trinidad vertreten durch die Gatt.: *Apela* (1), *Hemiceras* (1), *Nystalea* (1 + 1 n.), *Hapigia* (2), *Heterocampa* (1) u. *Rosema* (1). **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 136—138.

— Von den Bahamas **Hampson** (2) p. 251. — 1 n. sp.

Notodontidae. Revision der amerikanischen Formen. **Schaus** (7).

— Uebersicht über die Gatt. (p. 258—264). Uebersetzt und durch vorgelesen. Zahlensystem vom Ref. räumlich zusammengezogen.

1. (193) A. Ader 5 auf d. Hflgl. vorhanden.

2. (173) a. Irand d. Vflgl. ohne Schuppenbüschel.

3. (150) a¹. Areola vorhanden.

4. (10) a². Ader 5 d. Vflgl. aus dem ober. Zellwinkel.

5. (6,9) a³. Ader 8—10 gestielt

Calledema.

6. (5,9) b³. Ader 7—8 gestielt.

7. (8) a⁴. Spitze d. Vflgl. gestutzt

Drastoma.

8. (7) b⁴. Spitze d. Vflgl. nicht gestutzt

Pronerice.

9. (5,6) c³. Ader 7—8 nicht gestielt

Tagela.

10. (4) b². Ader 5 d. Vflgl. aus d. unterhalb des ob. Winkels der Zelle, oder aus d. Mitte der Discocellularen.

11. (12, 78, 94) a³. Ader 6 u. 7 aus d. ober. Winkel d. Zelle *Strophocerus*.

12. (11, 78, 94) b³. Nur Ader 6 aus d. ob. Wink. d. Zelle, aus d. Areola nahe der Zelle.

13. (16, 23, 32) a⁴. Ader 7—10 gestielt.

14. (15) a⁵. Ader 3—4 auf d. Hflgl. gestielt

Antiora.

15. (14) b⁵. Ader 3—4 auf d. Hflgl. aus ein. Punkt

Anurocampa.

16. (13, 23, 32) b⁴. Ader 8—10 gestielt.

17. (18) a⁵. Aussenrand d. Vflgl. gezähnt

Nadata.

- | | |
|---|---------------|
| 18. (17) b ⁵ . Aussenrand d. Vflgl. nicht gezähnt. | |
| 19. (20) a ⁶ . Ader 6—7 d. Hflgl. aus ein. Punkt | Cargida. |
| 20. (19) b ⁶ . Ader 6—7 d. Hflgl. gestielt. | |
| 21. (22) a ⁷ . 3. Palpenglied so lang wie das 2. | Minara. |
| 22. (21) b ⁷ . 3. Palpenglied sehr kurz | Nerice. |
| 23. (13, 16, 32) c ⁴ . Ader 7—8 gestielt. | |
| 24. (27) a ⁶ . Aussenrand d. Vflgl. schräg. | |
| 25. (26) a ⁶ . Analbusch haarig | Nystalea. |
| 26. (25) b ⁶ . Analbusch deutlich gespalten | Pentobesa. |
| 27. (24) b ⁶ . Aussenrand kaum schräg. | |
| 28. (29) a ⁶ . Ader 8 d. Hflgl. aus 7 von d. Mitte der Zelle
divergierend | Heorta. |
| 29. (28) b ⁶ . Ader 8 d. Hflgl. aus 7 vom Ende der Zelle. | |
| 30. (31) a ⁷ . Ader 3 u. 4 d. Hflgl. gesondert | Theroa. |
| 31. (30) b ⁷ . Ader 3 u. 4 d. Hflgl. aus ein. Punkt | Euhyparpax. |
| 32. (13, 16, 23) d ⁴ . Ader 7—8 nicht gestielt. | |
| 33. (62, 65) a ⁵ . Antennen „fasciculate“. | |
| 34. (43) a ⁶ . Vflgl. gezähnt. | |
| 35. (38) a ⁷ . 3. Glied d. Palpen lang. | |
| 36. (37) a ³ . Ader 6—7 d. Hflgl. gestielt. | Bardaxima. |
| 37. (36) b ⁸ . Ader 6—7 d. Hflgl. nicht gestielt | Phedosa. |
| 38. (35) b ⁷ . 3. Palpenglied kurz. | |
| 39. (42) a ⁸ . Kein Stirnbusch. | |
| 40. (41) a ⁹ . Aussenrand d. Vflgl. nicht gewinkelt | Elymiotis. |
| 41. (40) b ⁹ . Aussenrand d. Vflgl. gewinkelt | Ctianopha. |
| 42. (39) b ⁸ . Hoher Stirnbusch vorhanden | Proelymiotis. |
| 43. (34) b ⁶ . Vflgl. nicht gezähnt. | |
| 44. (55) a ⁷ . 3. Palpenglied kurz. | |
| 45. (46, 47) a ⁸ . Ein langer Haarbusch an d. Basis d. An-
tennen | Lysana. |
| 46. (45, 47) b ⁸ . Ein aufrechter Busch am Kopf | Pseudantiora. |
| 47. (45, 46) c ⁸ . Ohne aufrechten Busch. | |
| 48. (49) a ⁹ . Ader 3—4 d. Hflgl. gestielt | Gottobara. |
| 49. (48) b ⁹ . Ader 3—4 d. Hflgl. nicht gestielt. | |
| 50. (51, 54) a ¹⁰ . Abdom. m. fächerförm. Analbusch | Marthula. |
| 51. (50, 54). b ¹⁰ . Abdom. ohne fächerförm. Analbusch. | |
| 52. (53) a ¹¹ . Vbeine glatt | Antiopha. |
| 53. (52) b ¹¹ . Vbeine behaart | Eragisa. |
| 54. (50, 51) c ¹⁰ . Abdom. m. Busch spatelförm. Schuppen | Crinodes. |
| 55. (44) b ⁷ . 3. Palpenglied lang. | |
| 56. (57) a ⁸ . Flgl. breit | Poresta. |
| 57. (59) b ⁸ . Flgl. schmal. | |
| 58. (59) a ⁹ . Kopf mit aufrechtem Busch | Lepasta. |
| 59. (58) b ⁹ . Kopf ohne aufrechten Busch. | |
| 60. (61) a ¹⁰ . Spitze d. Vflgl. gerundet | Tachuda. |
| 61. (60) b ¹⁰ . Apex d. Vflgl. zugespitzt, etwas sichelf. | Contrebia. |
| 62. (33, 65) a ⁵ . Antennen bis zur Spitze gekämmt. | |
| 63. (64) a ⁶ . Ader 3—4 d. Hflgl. gesondert | Hyparpax. |

64. (63) b⁶. Ader 3—4 Hflgl. aus ein. Punkt Kalkoma.
65. (33, 62) c⁵. Antenn. gekämmt, doch nicht bis zur Spitze.
66. (69) a⁶. Kopf mit aufrechtem Busch.
67. (68) a⁷. 3. Palpenglied lang Didugua.
68. (67) b⁷. 3. Palpenglied kurz Dasylophia.
69. (66) b⁶. Kopf ohne aufrechten Busch.
70. (73) a⁷. Ader 7—8 d. Vflgl. kurz.
71. (72) a⁸. Ader 8 d. Hflgl. divergirend aus 7 am Ende d. Zelle Farigia.
72. (71) b⁸. Ader 8 d. Hflgl. divergirend aus 7 vor dem Ende d. Zelle Pesudodryas.
73. (70) b⁷. Ader 7—8 d. Vflgl. lang.
74. (75) a³. Ader 8 d. Hflgl. dicht an 7 v. Ende d. Zelle Eustema.
75. (74) b⁶. Ader 8 d. Hflgl. dicht aus 7 v. d. Mitte d. Z.
76. (77) a⁹. Ader 3 u. 4 auf d. Hflgl. gesondert Tecmessa.
77. (76) b⁹. Ader 3 u. 4 auf d. Hflgl. aus ein. Punkt Psorocampa.
78. (11, 12, 94) c³. Ader 6 aus dem Ende oder nahe d. Ende der Areola.
79. (82, 91) a⁴. Ader 7—10 gestielt.
80. (81) a⁵. 3. Palpenglied lang Hippia.
81. (80) b⁵. 3. Palpenglied kurz Synmerista.
82. (79, 91) b⁴. Ader 7—8 gestielt.
83. (88) a⁵. Ader 3 u. 4 d. Hflgl. dicht zusammen.
84. (85) a⁸. Areola lang Arhacia.
85. (84) b⁶. Areola kurz.
86. (87) a⁷. Antennen bis zur Spitze gekämmt Cerura.
87. (86) b⁷. Antennen gekämmt, doch nicht bis z. Spitze. Betola.
88. (83) b⁵. Ader 3 u. 4 d. Hflgl. gesondert.
89. (90) a⁶. Flgl. lang u. schmal Lirimiris.
90. (89) b⁶. Flgl. kurz u. breit Gopha.
91. (79, 82) c⁴. Ader 7 u. 8 nicht gestielt.
92. (93) a⁵. Flgl. lang u. schmal Naduna.
93. (92) b⁵. Flgl. kurz u. breit Pauluma.
94. (11, 12, 78) d³. Ad. 6 ungefähr aus d. Mitte der Areola oder aus d. Basis ders., sobald sie jenseits d. Zelle entspringt.
95. (96) a⁴. Ader 8—10 gestielt Drugera.
96. (95) b⁴. Ader 7—8 gestielt Hardingia.
97. (100, 121) a⁵. Antennen bis zur Spitze gekämmt.
98. (99) a⁶. Areola kurz Eucerura.
99. (98) b⁶. Areola lang Salluca.
100. (97, 121) b⁵. Antennen gekämmt, doch nicht b. zur Spitze.
101. (102) a⁶. Vbeine m. breit. gekrümmten Büscheln Skaphita.
102. (101) b⁶. Vbeine haarig.
103. (114) a⁷. Ader 8 d. Vflgl. dicht an 7 am Ende oder nahe dem Ende der Zelle.
104. (107) a⁸. Kopf mit Busch.

105. (106) a ⁹ .	Flgl. schmal, Aussenrand schräg	Dicentria.
106. (105) b ⁹ .	Flgl. breiter, Aussenrand mehr gerundet	Schizura.
107. (104) b ⁸ .	Kopf haarig kein Busch.	
108. (109) a ⁹ .	Flgl. kurz u. breit	Litodonta.
109. (108) b ⁹ .	Flgl. lang u. schmal.	
110. (111) a ¹⁰ .	Die Areole entspringt jenseits der Zelle	Psilacron.
111. (110) b ¹⁰ .	Die Areole entspringt vor dem Ende der Zelle.	
112. (113) a ¹¹ .	Ader 5 aus der Mitte der Discocellularen	Misogada.
113. (112) b ¹¹ .	Ader 5 nahe dem ober. Winkel d. Zelle	Notoplusia.
114. (103) b ⁷ .	Ader 8 d. Hflgl. divergirt aus 7 an d. Mitte d. Zelle.	
115. (116) a ⁸ .	Spitze d. Hflgl. abgestutzt	Dognina.
116. (115) b ⁸ .	Spitze d. Hflgl. gerundet.	
117. (120) a ⁹ .	Costalrand d. Hflgl. unterseits nicht sehr behaart.	
118. (119) a ¹⁰ .	Apex d. Vflgl. sehr spitz	Ichthyosoma.
119. (118) b ¹⁰ .	Apex d. Vflgl. nicht sehr spitz	Heterocampa.
120. (117) b ⁹ .	Costalr. d. Hflgl. unterseits lang behaart u. m. dick. Büscheln	Malocampa.
121. (97, 100) c ⁶ .	Antennen „fasciculate“	
122. (123) a ⁶ .	Büschel an d. Basalhälfte lang	Magava.
123. (122) b ⁶ .	Büschel an d. Basalhälfte kurz.	
124. (143) a ⁷ .	Ader 8 dicht an 7, am Ende d. Zelle.	
125. (138) a ⁸ .	Aussenrand d. Vflgl. schräg.	
126. (129) a ⁹ .	Aussenrand gezähnt.	
127. (128) a ¹⁰ .	3. Palpenglied kurz	Rhuda.
128. (127) b ¹⁰ .	3. Palpenglied lang	Gisara.
129. (126) b ⁹ .	Aussenrand nicht gezähnt.	
130. (131) a ¹⁰ .	Ader 3 u. 4 der Hflgl. gesondert	Boriza.
131. (130) b ¹⁰ .	Ader 3 u. 4 der Hflgl. aus ein. Punkt.	
132. (135) a ¹¹ .	Costalrand d. Hflgl. an d. Basis gerade.	
133. (134) a ¹² .	Apex spitz	Blera.
134. (133) b ¹² .	Apex gerundet	Chadisra.
135. (132) b ¹¹ .	Costalrand d. Hflgl. an d. Basis convex.	
136. (137) a ¹² .	Abdom. m. lang. Analbusch	Rincodes.
137. (136) b ¹² .	Abdom. ohne lang. Analbusch	Talmenia.
138. (125) b ⁸ .	Aussenrand d. Vflgl. gerundet.	
139. (140) a ⁹ .	Aussenrand gezähnt	Ophitis.
140. (139) b ⁹ .	Aussenrand nicht gezähnt.	
141. (142) a ¹⁰ .	Beine u. Palpen stark behaart	Meragisa.
142. (141) b ¹⁰ .	Beine u. Palpen nicht sehr behaart	Phastia.
143. (124) b ⁷ .	Ader 8 divergirt aus 7 in d. Mitte d. Zelle.	
144. (147) a ⁸ .	Aussenrand d. Vflgl. winklig.	
145. (146) a ⁹ .	Aussenrand unterhalb d. Spitze concav	Euxoga.
146. (145) b ⁹ .	Aussenrand unterhalb Ader 6 concav	Goaxis.
147. (144) b ⁸ .	Aussenrand der Vflg. nicht winklig.	
148. (149) a ⁹ .	Innenwinkel d. Vflgl. stark gerundet	Maschane.
149. (148) b ⁹ .	Innenwinkel d. Vflgl. nicht gerundet	Rifargia.

150. (3) b¹. Areola nicht vorhanden.
151. (172) a². Ader 6—10, oder 7—10 gestielt.
152. (159) a³. Ader 10 entspringt unterhalb 7.
153. (156) a⁴. Ader 3 u. 4 auf Hflgl. dicht zusammen.
154. (155) a⁵. Ader 8 frei Afilia.
155. (154) b⁵. Ader 8 m. 7 in d. Mitte d. Zelle durch eine
Brücke verbunden Lobeza.
156. (153) b⁴. Ader 3 u. 4 d. Hflgl. gesondert.
157. (158) a⁵. Palpen lang Lusura.
158. (157) b⁶. Palpen klein Gluphisia.
159. (152) b³. Ader 10 entspringt vor 7.
160. (165) a⁴. Ader 6 d. Vflgl. in einig. Entfern. v. d. Zelle.
161. (162) a⁵. Ader 3 u. 4 d. Hflgl. getrennt Nagidusa.
162. (161) a⁵. Ader 3 u. 4 d. Hflgl. aus ein. Punkt.
163. (164) a⁶. Antennen bis zur Spitze gekämmt Ellida.
164. (163) b⁶. Antennen nicht bis z. Spitze gekämmt Macrurocompa.
165. (160) b⁴. Ader 6 der Vflgl. in oder dicht beim Zell-
winkel.
166. (167) a⁵. Antennen bis zur Spitze gekämmt.
167. (168) a⁶. Ader 6—7 d. Hflgl. an lang. Stiel Harpyia.
168. (167) b⁶. Ader 6—7 d. Hflgl. an kurz. Stiel Notela.
169. (166) b⁵. Antennen nicht bis z. Spitze gekämmt.
170. (171) a⁶. An d. Basis d. Antennen lange Haarbüschel Euharpyia.
171. (170) b⁶. An d. Basis d. Antennen keine Haarbüschel Eunotela.
172. (151) b². Ader 6—9 gestielt Eunystalea.
173. (2) b. Innenrand d. Vflgl. mit Schuppenbüschel.
174. (188) a¹. Vflgl. mit Areola.
175. (180) a². Ader 5 aus d. ober. Winkel d. Zelle.
176. (179) a³. Innenrand ausgeschnitten u. tief gelappt.
177. (178) a⁴. Aussenrand d. Vflgl. gewinkelt Pontala.
178. (177) b⁴. Aussenrand d. Vflgl. gerundet Apela.
179. (176) b³. Innenrand d. Vflgl. gerundet Dylomia.
180. (175) b². Ader 5 aus d. unt. Winkel d. Z.
181. (187) a³. Aussenrand gezähnt.
182. (183, 186) a⁴. Ader 7—8 gestielt Naprepa.
183. (182, 186) b⁴. Ader 8—10 gestielt.
184. (185) a⁵. Ader 8 dicht aus 7 nahe dem Ende d. Zelle Lophopteryx.
185. (184) b⁵. Ader 8 divergirt aus d. Mitte d. Zelle Herbertina.
186. (182, 183) c⁴. Ader 8—10 nicht gestielt Odontosia.
187. (181) b³. Aussenrand nicht gezähnt Hyperaeschra.
188. (174) b¹. Areola fehlt.
189. (191) a². Ader 6—10 gestielt.
190. (191) a⁹. Antennen kurz gekämmt Notodonta.
191. (190) b³. Antennen einfach Lophodonta.
192. (189) b². Ader 7—10 gestielt Pheosia.
193. (1) B. Ader 5 auf d. Hflgl. fehlend.
194. (199) a. Areola vorhanden.
195. (196) a¹. Antennen bis z. Spitze gekämmt. Goacampa.

196. (195) b¹. Antennen nicht bis z. Spitze gekämmt.
 197. (198) a². Ader 8 divergirt von 7 aus d. Mitte d. Zelle Kurtia.
 198. (197) b². Ader 8 divergirt an d. Basis d. Zelle Anita.
 199. (194) b. Areola fehlt.
 200. (201) a¹. Ader 3 u. 4 d. Hflgl gesondert Colax.
 201. (200) b¹. Ader 3 u. 4 d. Hflgl. aus ein. Punkt.
 202. (203, 208) a². Antennen d. ♂ auf d. basal. Hälfte gekämmt Hemiceras.
 203. (202, 208) b². Antennen nicht gekämmt.
 204. (205) a³. Antennen an der Basis knotig Hapigia.
 205. (204) b³. Antennen an d. Basis nicht knotig.
 206. (207) a⁴. 3. Palpenglied kurz Chliara.
 207. (206) b⁴. 3. Palpenglied lang Antaea.
 208. (202, 203) c². Antennen bis z. Spitze gekämmt.
 209. (210) a³. Innenrand d. Vflgl. ausgeschnitten Pseudhapygia.
 210. (209) b³. Innenrand d. Vflgl. gerade Canodia.

Notoplusia n. g. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 300. — 1 Sp.; Type: clara Cr. (1782).

Nudaria spec. (senex nahe, aber stark perlmutterglänzend). Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900 18. Jan. (p. 3).

Nudaurelia dione. Raupe. **Packard**, Psyche vol. 9 p. 280.

Nyctalaemon zampa **Semper**, Schmetterlinge Philippinen II p. 597 Taf. LXIII Fig. 1. — *menaetius* p. 598 tab. cit. Fig. 2.

Nyctemera annulata Boisd. von Neu-Seeland. Biologie. **Quail, Ambrose**, The Entomologist, vol. 34 p. 141—145. — Ei, Raupe in verschiedenen Stadien, Puppe; hierzu 5 Fig. auf p. 141.

Neu: *onetha* (Untersch. v. *N. crescens* Walk. = *N. luctuosum* Voll.)

Swinhoe, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 466 ♂♀ (New Britain); *latemarginata* u. *alba* siehe weiter unten.

Nyctemeridae. *Nyctemera* Hübn. und Verwandte. **Pagenstecher** (1). — Geschichte unserer Kenntnis dieser Formen durch die entom. Literatur hindurch von Fabr. an bis in die neueste Zeit p. 91—104.

Es scheint daraus schwierig, eine gemeinsame Diagnose für die Familie der Nyctemeriden zu geben. Sie zeigen eine ungemein nahe Verwandtschaft mit den Hypsiden und Chalcosiden, ja selbst mit den Lipariden und grosse Aehnlichkeit mit Geometriden. Pagenstecher charakt. die Gruppe folg.: Nachtfalter von meist schlankem Bau, am Tage fliegend, bewohnen die Tropen der alten Welt. Zunge entwickelt, Nebenaugen vorhanden. Palpen vorgestreckt oder etwas aufsteigend. Fühler beim ♂ stark doppelt gekämmt, die Kammzähne gegen die Spitze abnehmend, beim ♀ mit geringer entwickelten Kammzähnen oder selbst einfach (*Atasca*). Die Flügel vorwiegend schwärzlich oder braun mit weissen Zeichnungen oder auch überwiegend weiss gefärbt mit schwarzen Zeichnungen, die Geschlechter gleich gefärbt. Auf den Vflgl. Ader 6 aus 9 oder getrennt, 7, u. 8 aus 9, die durch eine Querader mit 10 verbunden ist, so dass eine Nebenzelle entsteht. Auf den Hflgl. Ader 6 u. 7 gestielt, 8 anastomosirt mit dem Rand der Zelle. — Raupen lang cylindrisch mit Haarbüscheln. Puppe in leichtem Cocon.

Die Familie teilt sich in die beiden Gatt. *Nyctemera* Hb. u. *Deilemera* Hb. Unterschiede beider nach Hampson (von Snellen nicht anerkannt): Deil. hat eine längere Nebenzelle d. Vflgl. u. Ader 8 d. Hflgl. entspringt nahe der Zellmitte, während Nyct. eine kurze Nebenzelle d. Vflgl. hat und Ader 8 von der Zellmitte entspringt.

Verf. folgt Hampson's Fassung. — Unterschiede verwandter Formen: *Eligma* (Lithosiide) hat wie *Deilemera* eine lange Nebenzelle, ist aber durch das lange und spatelförmige dritte Palpenglied sehr verschieden. — *Dondera* hat ausgeschnittene, gelappte u. gefaltete Hflgl. des ♂. Dieser Charakter findet sich auch bei einem Teil von *Deilemera*. — *Curoba* hat sowohl eine lange Anhangzelle wie *Deilemera*, aber andere, mit dem 2. Glied den Apex nicht erreichende Palpen, u. es fehlt ihr die charakt. Flügelfärbung. — Bei der verw. Gatt. *Argina* ist im ♂-Geschlecht d. Analwinkel des mit einer Falte versehen. Hflgl.'s verlängert u. auch die Färbung wesentlich verschieden. — *Secusio* hat zwar lange Anhangzelle u. Ader 3 d. Hflgl. entspringt nahe Zellmitte, aber auch hier fehlt die charakteristische Färbung.

Nyctemera Hübn. Synonymie p. 106. — Charakt. p. 106–107. — Untergattungen:

1. Vflgl. schwärzlich oder braun mit mehr oder minder entwickelten weissen Flecken oder Binden. Hflgl. weiss mit dunkler Randbinde.

Nyctemera.

2. Vflgl. u. Hflgl. weiss mit unregelmäss. schwärzl. Flecken. Dritter Ast der Subcostalis mit dem zweiten verbunden auf kurzen Abstand von der Zelle. Subcostale d. Hflgl. von kurzer Gabel. Trypheromera.
3. Flügel breit, weiss m. schwarz. Flecken. Costalader bis zu $\frac{2}{3}$ reichend. Discocellulare gewinkelt. Obere Radialis der Vflgl. von d. Subcostalis. Subcostalis d. Hflgl. von Gabel: *Zonosoma* (*Tristania*).
4. Braun mit weissen Flecken. Subcostalis der Hflgl. vom Zellende.

Pitasila.

5. Fühler beim ♀ einfach.

Atasca.

Unterg. *Nyctemera* Hb. Synonymie, Beschreibung, Vergleich, Fundorte der folg. Spp.:

1. *anthracinum* de Haan p. 107–108 (Java). — 2. *assimile* Snell. van Vollenhov. p. 108 Taf. II Fig. 3 (Java; Sumba). — 3. *distinctum* Walk. p. 108–109 Taf. II Fig. 1 (Java). — 4. *trita* Walk. p. 109 (Java; Lombok [2000. Sapit lombokiana Fruhst. in lit.], Sumbawa). — 5. *tritoides* Heyl. p. 109–110 (Sumatra). — 6. *leucostigma* de Haan p. 110–111 (Java). — 7. *annulata* Boisd. p. 111–112 Beschr. von Raupe und Puppe (Neu-Seeland, endemisch). — 8. *conica* White p. 112–113 (Austral.). — 9. *herklotsi* Voll. p. 113–114 Taf. II Fig. 5 (Java). — 10. *quadrigruttatum* Sn. v. Voll. p. 114 Taf. II Fig. 9 (Java). — 11. *latemarginata* (mit vorig. u. mit *mesolychna* Meyr. verw.) p. 114 ♀ (Neu-Guinea). — 12. *consobrina* Hopffer p. 114–115 (Celebes). — 12a. *acceptum* Swinh. (wohl kaum von d. vorig. verschieden) p. 115 (Celebes). — 13. *obtusa* Walk. p. 115–116 (Celebes). — 14. *simulatrix* Walk. p. 116 ♂ (Celebes). — 15. *fasciata* Walk. p. 116 ♀ (Aneitum). — 16. *mesolychna* Meyr. p. 116–117 ♀ (Papua). — 17. *lacticinia* Cram. (umfangr. Synonym. Raupe, Puppe) p. 117–118 (zahlreiche Fundorte im indo-australischen Gebiet). — 18. *celsa* Walk. p. 118 (China, Cambodja). — 19. *baulus* Boisd. (darunter wohl mehrere verschiedene Spp.) p. 118–119. —

19a. *mundipicta* Walk. p. 119—120. — 19b. *integra* Walk. p. 120. — 19c. *latistriga* Snell. p. 120—121. — 19d. *picata* Butl. p. 121. — 19e. *tertiana* Meyr. p. 121. — 19f. *aluensis* Butl. p. 121—123. — 20. *tenuifascia* Snell. (Lombok, Sombalum, 4000 m). — 21. *pagenstecheri* Fruhst. i. lit. (nahe verw. m. *mundipicta*, aber ausgezeichnet durch die schmalere ganz weite, nicht durch die Adern durchbrochene diskale Querbinde der Vflgl.) p. 123—124 ♂♀ Taf. II Fig. 12 (Sambalum auf Lombok, 4000'). — 22. *separata* Walk. (hat einige Aehnlichkeit mit *Nyct. (Atasca) pellex* L. [*artemis* B.]) p. 124 (Cap York, Queensland). — 23. *luctuosum* Sn. v. Voll. p. 124—125 (Molukken, Celebes, Bismarck - Archipel, Austral., Philippinen). — 24. *galbanum* Swinh. p. 125—126 (Philippinen). — 25. *sexmaculatum* Butl. p. 126 (Salomoninseln, Alu). — 26. *quaternarium* Pag. (1900 abgebild.) (vorig. verw., wenn nicht gar Var. derselb.) p. 126—127 (Neu-Pommern). — 27. *aolaensis* (steht quatern. sehr nahe und fällt sammt dieser vielleicht mit *sexmac. zus.*) p. 127 (Guadalcanar). — 28. *horites* Druce p. 127 (Salomonins.). — 29. *extendens* Walk. p. 127—128 Taf. II Fig. 7 (Neu-Hebriden, Salomo Arch., Shortlandinseln). — 30. *kala* Swinh. p. 128 (Key Inseln). — 31. *latistriga* Walk. Litteratur p. 128—129 (Nias, Java, Lombok, Andamanen) Abweichungen. — 32. *infusata* Hopffer p. 129—130 (Celebes). — 33. *proprium* Swinh. p. 130 (Philippinen). — 34. *velans* Walk. p. 131 (Celebes). — 35. *subvelata* Walk. p. 131 (Celebes). — 36. *radiata* Walk. p. 131—132 (Philippin., Luzon, Bohol, Cebu, Mindanao); Semper glaubt, dass die Art wenig variire. — 37. *sonticum* Swinh. Semper's Abb. der Extreme der Sp. p. 132—133 (Philippin.). — 38. *alternata* Walk. p. 133 (Philippinen). — 39. *cydippe* Weymer p. 134 (Nias). Pag. besitzt eine Reihe der vollendetsten Uebergänge von typ. *sonticum* zur Form *cydippe* u. weiter zu fast völlig einfarbigen Stücken, die man als *pallens* Voll. bezeichnen könnte. — 40. *pallens* Sn. v. Voll. p. 134—135 (Java); Snell. hält sie für eine gute Sp. — 41. *alba* Pag. p. 135 (Samoa). — 42. *absurdum* Swinh. p. 135 (Salwatti). — 43. *aegrotum* Swinh. p. 135—136 (N. S. Wales). — 44. *burica* Holl. (1900) p. 136 (Buru). — 45. *clathratum* Sn. v. Voll. p. 137 Taf. II Fig. 2 (Amboina). — 46. *tripunctaria* L. Litteratur; Beschr.; wird nach Aur. vielfach m. ander. verwechselt, p. 137—138 (China etc.). — 47. *perce* Holl. p. 138—139 (Malayische Halbins.). — 48. *regularis* Snell. p. 139 Taf. II Fig. 8 (Sumatra, Borneo). — 49. *sumatrensis* Heyl. p. 139—140 Taf. II Fig. 6 (Sumatra). — 50. *kinibalina* Stand. Snell. p. 140—141 Taf. II Fig. 4 (Nord-Borneo). — 51. *apensis* Semper p. 141 (SO. Mindanao, Apo, 2060 m. Bergbewohner, wie manche andere *Nyct.*-Art). — 52. *ludekingii* Snell. v. Voll. p. 141—142 Taf. II Fig. 11 (Sumatra, N. Borneo). — 53. *dentifascia* Snell. p. 142 (Sumatra). — 54. *coleta* Cr., zahlr. Literatur-Angab. p. 142—144 (von Nias im Westen über die gross. u. klein. Sunda-Inseln, Celebes, Philippinen u. Molukken) Beschr. d. Raupe. — 55. *acraeina* Druce p. 144 (Celebes). — 56. *chromis* Druce p. 145 (W. Afr.). — 57. *?vagata* Walk. p. 145 (N. Austr.). — 58. *fulleri* Druce p. 145 (W. Afr.). — 59. *apicalis* Walk. p. 145—146 (scheint über den grössten Teil des trop. Afrikas verbreitet zu sein). Hierher dürfte auch *N. usambarae* Obth. Etud. Ent. 1893 p. 32 Taf. 21 Fig. 8 in Ostafrika zu rechnen sein. — 60. *restrictum* Butl. p. 146—147 (Ostafr.); von Snell. als Var. von *leuconoe* betrachtet. — 61. *fallax* Holl. p. 147 (Britisch Ostafr.). — 62. *insulare* Boisid. p. 147—148 (Madag., Bourbon, Mauritius). — 62a. *rasana* Mab. p. 148 (Madag.). Ein ernsthafter Unterschied von vorig. besteht wohl nicht, dasselbe gilt von

62b. *perspicua* Walk. p. 148 (Westafr.). — 63. *consors* Butl. p. 148 (Isle de Johanna). — 64. *biformis* Mab. p. 149 (Madag.). — 65. *Mabillei* Butl. p. 149—50 (Antanarivo, Madag.). — 66. *gracilis* Saalm. p. 150 (Nossi Bé). — 67. *pallescens* Oberth. p. 150 (Grosskomoran).

Untergatt. *Atasca* Swinh. — 68. *pellex* L. p. 150—151 (divers. Indo-austral. Fundorte). — 69. *quadriplaga* Walk. p. 151 (Neu-Guinea). — 70. *simplex* Walk. p. 151—152 (Neu-Guinea). — 71. *signata* Butl. p. 152 (Darnley Isl.); ob von *artemis* (*pellex*) versch.?

Untergatt. *Trypheromera* Butl. — 72. *plagifera* Walk. p. 152—153 (diverse Fundorte). — 73. *scalarium* de Haan p. 153—154 (Java). — 74. *fasciata* Auriv. p. 154 (Nyassaland). Der Name ist bereits 1856 vergeben, Pag. schlägt dafür als nom. nov. *Aurivillii* vor.

Untergatt. *Zonosoma* Butl. (dafür *Tristania* Kirby). Charakt. p. 154—155. — 75. *cenis* Cr. p. 155 (Sikkim etc.).

Untergatt. *Pitasila* Moore. Charakt. p. 155—156. — 76. *selecta* Walk. Literatur nebst Bemerk. p. 156—158. — 77. *variolora* Feld. u. Rog. p. 158—159 (Andamanen u. Nikobaren). — 78. *varians* Walk. p. 159 (diverse Fundorte). — 79. *specularis* Walk., wahrscheinlich identisch mit *confluens*, vielleicht auch mit *Macklottsi* nach Snell. p. 160 (Ceram, Amboina). — 80. *confluens* Feld. (mit *specularis* verw., vielleicht identisch). — 81. *guttulosa* Walk. p. 160—161 (Makassar, Bonthain, Balangnipa). — 82. *Vollenhovii* Snell. p. 161 (Celebes, Gilolo, Tanah Djampea, Flores). — 83. *mackloti* Snell. v. Voll. p. 162 (Celebes).

— *annulata* von New Zealand. Biologie. **Quail** (3).

Nystalea Guen. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 267—268. — 12 Spp.; Type: *ebalea* Cram. (1781). — Neu: *marmorea* p. 268 (Trinidad, B. W. I.). — *plumipes* p. 268—269 (Aroa, Venezuela). — *calophasioides* **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London 1901 p. 137 Taf. V Fig. 2 (Trinidad).

Ochrodota n. g. (Type: *Zatrephes pronapides* Druce) **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 89.

Ocneria dispar L. Wanderungen in Ungarn. von **Abafi-Aigner** (17). — *rubea* S. V. selten u. scheu. **Wendlandt** p. 77.

— von Birken auf ein mit Heidelbeeren bestand. Moos übergehend, ist ihnen nicht bekommen. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. 22. März (p. 12). — an Schilf fressend. *ibid.*

— **Aberrationen** u. s. w.: *dispar*; albinotisches Stück; wohl selten. t. c. Sitz.-Ber. f. 1900 4. Jan. (p. 2).

— ♂ ganz hell an V.- u. Hflgl., ♀ mit fast ganz verschwundenen Binden. **Schnabel**, Zeitschr. f. Entom. Breslau 1900 p. XV.

— **Experimente**: Im Finstern gezogen. Thiere meist klein (vermutlich zu trocken gehalten, weshalb wohl auch d. Bozener Thiere so klein sind) ♂ schön ausgefärbt, ♀ wie abgeschabt, ohne abgeflogen zu sein. **Nagel**, t. c. p. XVIII.

— **Fundorte**: Finland. **Sahlberg, John**, Trädgårdonunnan (*Ocneria* [Liparis] *dispar*) funnen i Finland. Meddel. Soc. Fauna Flora Fenn. op. cit. 27. Hft. p. 94—96.

— **Schaden**: Bekämpfungsmittel. (Löfskøgsnunnan). Bericht darüber in Schweden f. 1900. Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 2. — in Småland etc. p. 15

— Neues Verfahren zur Bekämpfung des Schwammspinners. **Rörig**, cf. vor.

- Bericht p. 798. — Bisherige Mittel: Abkratzen u. Verbrennen, Ueberpinseln mit dünnflüssig. Raupenleim, Betupfen mit Mischung von Holzteer u. Petroleum (4:1) u. s. w. — Verf. beschreibt einen sinnreichen Apparat (P. Altmann. Berlin) zur Vertilgung der Eierschwämme mittelst Petroleum (billig u. bequem).
- Odontosia* Hübn. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 329. — 2 Spp.; Type: *carmelita* Esp. (1790).
sieversi bei Hildesheim. cf. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 173. — *camelina* L. var. (*ab.?*) *nordlandica* n. (kleiner, Grundfarbe d. Vfogl. mehr graulich, von hellgrau bis braungrau, ohne d. rostgelbe Färbung d. Hauptform. Die Querstreifen sehr deutlich, weissl. bis schwärzl.; die Vrandsflecken (an d. Spitze) scharf weiss u. schwarz. Auch die Hfogl. ohne deutl. gelbl. Anflug). **Strand**, Schrift. naturf. Ges. in Danzig, N. F., 10. Bd. 2./3. Hft. p. 285 (Saltalen, Nordland, Norwegen)
- Odozana leucota* (744a) **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 184 ♀ (Panama, Cana Mines).
- Oenistis* (*Gnophria*) *quadra* in Dublin. **Wheeler, Wm., C. E.**, The Entomologist vol. 34 Aug. p. 230. — in Ireland. **Jackson, F. W. J.**, t. c. Nov. p. 317. — on Carlingford Mountain. **Carpenter, G. H.**, The Irish Naturalist, vol. 10 No. 8 p. 164.
- Oenochrominae. Auf Trinidad vertreten durch die Gatt.: *Ephialtias* (1), *Mecoceras* (1), *Phelliodes* (1). **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 150.
- Oiketeticus erionota* **Lower**, Trans. Roy. Soc. Austral. vol. XXV p. 63 (N. S. Wales). — *orizavae* **Schaus**, Journ. New York Entom. Soc. vol. IX p. 45 (Mexico).
- Omphaloceps n. g.* (Type: *Eusemia triangularis* Mab.) **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 628.
- Opharus flavicostata* **Dognin**, Le Naturaliste, 1901 p. 69. — auch Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 175 (Caucathal). — *flavimaculata* **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 122 Taf. XXXII Fig. 7. — *polystrigata* p. 129 Taf. XL Fig. 1 (beide aus Bolivia).
- Ophitis* Feld. Charakt. der Gatt. **Schaus** (7) p. 313–314. — 1 Sp.; Type: *magnaria* Feld. (1874).
- Ormiscodes?* *eumedide* Stoll. in S. Amer. **Therese von Bayern** p. 282. — Neu. *Orgyia antiqua* aus Puppen gezogen. 5 Wch. im Kühlraume u. dann einer mittleren Temperatur von 48 ° F. ausgesetzt. Die Thiere waren viel dunkler als die im Freien. Einige ähnelten in der Tiefe der Färbung *O. gonostigma*. The Entomologist, vol. 34 p. 322.
 — Hat nicht wie Hofmann schreibt auf d. 4., sondern auf d. 5. Sgm. Pinsel. **Prehn**, Entom. Jahrb. (Krancher) 11. Jhg. p. 90.
- Pachydota n. g.* (Type: *Phegoptera iodea* H.-S.) **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 92.
- Pachytelia villosella*. 2 Jahre im Raup.-Stad. **Cowl** No. 3 p. 568 d. vorigen u. No. 5 p. 647 dieses Berichts).
 — Erscheinen im April. **Cowl** (3).
- Pachygastria trifolii* siehe *Lasiocampa quercus*. **J. W. Tutt**.
- Palustra* u. andere Arctiiden-Raupen. Fundorte. **Therese von Bayern** p. 288.
- Paradiastema n. g.* *Notodontidarum nigrocineta* n. sp. (Erinnert durch Habitus u. Flügelform an eine Arctiide von der Gatt. *Spilosoma*, z. B. *Sp. lutescens*

- Walk.) **Aurivillius**, Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 121 Abb. Fig. 22 (Congo-gebiet, Kinschassa).
- Paraegocera n. g.* (Type: *Aegocera confluens* Weym.) **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 606.
- Paranerita n. g.* (Type: *Evius polyxenus* Druce) **Hampson**, t. c. p. 439.
- Paraplastis n. g.* (Type: *Migoplastis hampsoni* Sw.) **Hampson**, t. c. p. 507.
- Parevia n. g.* (Type: *Evius sisenna* Druce) **Hampson**, t. c. p. 38.
- Parothria n. g.* (Type: *Othria ecuadorina* Westw.) **Hampson**, t. c. p. 654.
- Parasemia* (*Nemeophila*) *plantaginis* var. *hospita*. Fundnotiz. **Wendlandt** p. 80.
- Pauluma n. g.* **Schaus** (7) p. 292. — *nubila* p. 292 Taf. XI Fig. 9 (Castro, Parana). — *minna* p. 292—293 (São Paulo, S. E. Brazil).
- Pelochyta umbrata* **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 105 (Bolivia).
- Pelosia albicostata* (166a) **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 179 ♂ (Japan).
- Penora* (*Eloria*) *spectra* Hb. (= *intacta*) u. *remota* Wlk. Fundorte nebst Bemerk. **Therese von Bayern** p. 281.
- Pentobesa n. g.* **Schaus** (7) p. 269. — 2 Spp.; Type: *Edema xylinoides* Walk. (1866). — Neu: *valta* (vor. verw.) p. 269 (Colombia).
- Pericallia conjuncta* **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 358 Taf. XLVII Fig. 11 (Lombok). — *dohertyi* p. 364 tab. cit. Fig. 14 (Sangir).
- Pericopidae, siehe Syntomidae **H. G. Dyar** (18).
- Pericopsis* (*Thebrone*) *jansonis* Butl. var. *flavopennis* n. (Stammform nach Druce auf Centr.-Am. beschränkt) **Rebel** in *Therese von Bayern* p. 279 ♂ Beschreib. p. 299 (oberhalb Garapatos am mittl. Rio Magdalena, Columbien, ca. 100 m). — Besch. **Rebel**, t. c. p. 302 (von d. Type verschieden nicht nur durch das Gelb d. Hfagl., sondern auch durch das breitere gelbe Band auf der Schlussrippe der Hfagl., wodurch der helle Fleck des Apikalthteils vom Discus vollständig getrennt wird). (Zwischen *Mediacion* u. *Ibagué*, Osthang der Central-Cordillere, Columbien, zwischen 1500 bis 2000 m).
- biformis* **Schaus**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 269—270 ♂ ♀ (Castro, Parana). Abb.: sp. Illustr. Zeitschr. f. Entom. 5. Bd. No. 9 Taf. V Fig. 4 Raupe, 4a Puppe. — spec.? Illustr. Zeitschr. f. Entom. 5. Bd. No. 9 Taf. V Fig. 5 Raupe. — spec.? Fig. 6 Raupe. — spec. No. 10 Taf. VI, Fig. 1, 1a. — spec. tab. cit. Fig. 6.
- Perophora magnapuncta* **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 157 Taf. VI Fig. 10 (Trinidad). — *producta* **Dognin**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 176 (Columbien).
- Phaegoptera *genoveva* **Dognin**, Le Naturaliste 1901 p. 31 u. Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 173 (Venezuela).
- Phaemolis n. g.* (Type: *Neritos obscurata* Butl.) **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 21.
- Phalaenoides *mutans* **Rothschild**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 220 ♂ (Aroa River, Brit. New Guinea). — Hinweis auf Abb. p. 406 Taf. IX Fig. 4 ♂.
- Phalera *bucephala*. Schädling einer Allee bei Karbitz in Aussig. Insektenbörse 18. Jhg. p. 309.
- Phasidia n. g.* (Type: *Phasis contraria* Walk.). **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 659.

- Phassus sericeus* **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 (nahe verw. mit *sinensis* Moore von China) p. 469 ♂ (Malang, Java). — *trojesa* **Schaus**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 76 (Mexico).
- Phastia* Walk. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 315. — 3 Sp.; Type: *basalis* Walk. (1862).
- Phedusia* Möschl. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 271. — 1 Sp.; Type: *turbida* Möschl. (1878).
- Phesia* Hübn. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 330—1. — 3 Spp.; Type: *tremula* Clerck. (1759).
- Philoros rubriceps* Wlk. **Therese von Bayern** p. 279.
 Neue Sp.: *obscurata* (1179 a) **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 176 ♀ (Colombia). — *perirrorata* p. 176 ♀ (Bolivia, Chaco).
- Phragmatobia fuliginosa* L. var. *flava* n. (Hfagl. u. Körper gelb statt roth) **Oberthür, Ch.**, Bull. Soc. Entom. France 1901 p. 273—4 (Lourdes). — Bemerk. zu versch. anderen Spp.
- Phryganopsis flavicosta* (231 a) **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 179 ♀ (S. Leone). — *straminea* (232 a) p. 179 ♀ (Br. E. Africa, Uganda Ry., mile 478). — *ochreatea* (232 b) p. 179 ♀ (Nyasaland, Chiromo).
- Pinara pervicax* **Lucas**, Proc. Soc. Queensland. vol. XVI p. 76 (Queensland).
- Pintia celebensis* (besch. Nov. Zool. Tring, VI p. 438) **Rothschild**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 407 Taf. IX Fig. 12 ♂.
- Platysamia*. Hybriden u. deren Benennung:
 hybr. *griffithsi* (= Pl. *cecropia* ♂ × *gloveri* ♀)
 „ *watsoni* (= Pl. *cecropia* ♂ × *ceanothi* ♀)
 „ *heyeri* (= Pl. *ceanothi* ♂ × *cecropia* ♀)
 „ *americana* (= Pl. *columbia* ♂ × *cecropia* ♀).
 Insektenbörse 18. Jhg. p. 243.
- Platysenta videns* Guen. Biologie. **Seiffert, Otto**, Journ. N. York Entom. Soc. vol. 9 No. 1 p. 12—19.
- Pleretes matronula*. Zucht leicht, aber langweilig; Ueberwinterung schwierig. Zuchtangaben. **Lehmann**, Zeitschr. f. Entom. Breslau, N. F. 25. Bd. 1900 p. XVI. — Zucht u. Resultate. **Jander**, Zeitschr. f. Entom. Breslau, 26. Hft. 1901 p. 24—25.
- Poecilnota chionobasis* (99 a) **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 178 ♂ (Kangra Valley, 4500'). — *ochritincta* (100 a) p. 178—179 ♂ (Ceylon, Haputale).
- Poliopastea plumbea* Hmps. auf Trinidad. **Kaye** (1) p. 118.
- Polacanthopoda* n. g. (Type: *Hespagarista tigrina* Druce). **Hampson**, Cat. Lep. Fal. III p. 573.
- Polypoetes deldon* Druce. Fundorte, nebst Bemerk. **Therese von Bayern** p. 280—281.
- Pontala* Wlk. Charakt. der Gatt. **Schaus** (7) p. 326. — 2 Sp.; Type: *rubrana* Wlk. (1864).
- Poresta* n. g. **Schaus** (7) p. 277. — 2 Spp.; Type: *lanassa* Druce (1890).
- Porthesia chrysoorrhoea* and *Eutricha quercifolia*. **Phillips, Hubert S.**, Entom. Record, vol. 13 No. 12 p. 374.
chrysoorrhoea 1897 im Berlin. botan. Garten in ungeheuren Mengen, im Sommer durch Epidemie vernichtet. Parallele Erscheinung im Scheitninger Park vor einigen Jahren. Zeitschr. f. Entom. Breslau, 1900 p. XIV.

- siehe ferner unter *Plusia moneta* **A. M. Swain** u. Ausbreitung der Brown-tail Moth? in Nordamerika. **Kirkland**.
- Porthetria dispar* L. Experimente bezügl. der Frage nach überzähligen Gliedern u. Gliedmassen bei den Insekten. *The Entomologist*, vol. 34 p. 30. — *Gypsy moth* u. Furcht vor ders. im New York State. In Sixteenth Report Injurious and other Insects. 1901. Bull. Soc. N. Y. State Mus. vol. VII No. 36. — color. Tafel.
- in Wei-Hei-Wei. **Fletcher**, *The Entomologist*, vol. 34 p. 174.
- Premolis* n. g. (Type: *Halesidota semirufa* Walk.) **Hampson**, *Cat. Lep. Phal.* III p. 26.
- Preparctia* n. g. (Type: *Chelonia mirifica* Oberth.) **Hampson**, t. c. p. 219.
- Problemsidis carneotincta* **Warren**, *Nov. Zool. Tring.*, vol. 8 p. 191 ♀ (Bukan, Sarawak).
- Proelymiotis* n. g. **Schaus** (7) p. 273. — 3 Spp.; Type: (*Nystalea*) *aequipars* Wlk. (1858). — Neu: *arpia* p. 273 (Rio Janeiro, Brazil).
- Procris geryon* Hübn. ♂ teratol. Stück. **Hampson**, *Entom. Monthly Mag.* (2) vol. 12 (37) p. 120.
- Pronerice* n. g. **Schaus** (7) p. 265. — 1 Sp.; Type: (*Nerice*) *disjuncta* Dogn. (1892).
- Proschaliphora* n. g. **Hampson**, *Cat. Lep. Phal.* III p. 454. — *citricostata* p. 454 (Ostafrika).
- Protomolis* n. g. (Type: *Eucereon promathides* Druce) **Hampson**, t. c. p. 182.
- Proutia betulina* Z. u. *epingella* von Epping forest, gezogen. Aeusserlich kaum verschieden, schlüpfte *betulina* 10 Tg. früher. *The Entomologist*, vol. 34 p. 29. — **Chapman** bemerkte dazu, unter der vorläufigen Annahme von Tutts Namen für die letztgenannte Sp. (um die Schwierigkeiten zu vermeiden erst noch festzustellen, ob es die *salicolella* Bruand's oder seine *anicanella* ist etc.) folgendes: er kenne nur 2 britische ♂ (1 gezogen von Prout u. 1 in Mason's Sammlung). Die ep. unterscheidet sich von *P. betulina* durch zahlr. Antennenglieder (27 statt 21—24 u. 24 statt 18—21, wenn nur die ausserhalb der Kopfbekleidung durch ihre Kammzähne sichtbaren Glieder gezählt werden) die nichtsdestoweniger kürzer sind, durch die Kürze der Vorder-tibien (21 statt 29 mm), als auch durch weniger difficile Charaktere in Färb., Grösse u. Flügelform etc.
- Prumala maculicincta* **Hampson**, *Cat. Lep. Phal.* III p. 22 Taf. XXXVI Fig. 11 (Brasilien).
- Pseudantiora* Kirby. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 274. — 1 Sp.; Type: *contingata* Moeschl. (1883).
- Pseudomodesa fuscidisca* (sehr ähnl. *plenicornis* Warr. von Rossel Isl.; aber hinreichend versch. durch die verschiedene Lage der Linien und des braunen Flecks) **Warren**, *Nov. Zool. Tring.*, vol. 8 p. 191—192 ♂ (Mysol).
- Pseudhapigia* n. g. (Type: *Ps. brunnea* n. sp. u. *Hapigia xolotl* Schaus) **Schaus** (7) p. 342—3. — 2 [1 n.] Spp.; Type: *brunnea* n. sp. p. 343 (Guadalajara, Mexico).
- Pseudoblabes* (?) *dona* (ähnelte etwas *P. oophora* Zell.) p. 467 ♂ (Coomoo, Queensland). — ?*nigrisquamata* p. 467 ♂ (Coomoo, Queensland).
- Pseudodryas* Müschl. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 284. — 1 Sp.; Type: *olivacea* Müschl. p. 284 (1878).
- Pseudometa viola* (Gespinnt weich u. dünn u. ganz ohne die für die *Gonometata*-Arten eigenthümlichen Dornen) **Aurivillius**, *Entom. Tidskr.* 22. Årg. p. 125

♂ Abb. des Rippenbaues zum Unterschiede von *Gonometa* u. *Borocera*
Fig. 27 (Mashunaland, Salisbury).

Pseudopharus n. g. (Type: *Opharus amata* Druce) **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III
p. 133.

Pseudosphex rubripalpus (307a) **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 170 ♂
(Brazil, Santos, S. Benitos).

noverca **Schaus**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 40 (Parana).

Psilacron Feld. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 300. — 1 Sp.; Type: *luteovirens*
Feld. (1894).

monacha L. im Kreise Berent 1900 ausserordentlich häufig, 3 Jahre lang zu-
vor kein Stück zu sehen. **Treichel** p. 169. — *monacha* Z. u. var.

eremita O. auf Usedom. **Riesen** p. 164, 165. — *monacha* L. sehr dunkle
Raupen. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 100. 2. Aug. (p. 23).

— Frage, ob das Thier als Ei oder Larve überwintert? **Riesen** p. 165 in Anm.

— Zum Entstehen der Aberr. **Irmscher**, Illustr. Zeitschr. f. Entom. 5. Bd.
p. 166.

Psorocampa n. g. **Schaus** (7) p. 286. — *denticulata* p. 286 Taf. XI Fig. 5 (Castro,
Parana).

Psychidae. Die zu dieser Familie gehörigen Gatt. Die javanischen Formen.

Piepers u. **Snellen**, Tijdschr. v. Entom. vol. XLIV p. 101—114.

von den Bahamas. **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 254. — *Animula* sp.

Ueber die Zucht ders. **Heckel**, Insektenbörse, 18. Jhg. No. 33 p. 261.

Psyche helix **Sienold**. Beitrag zur Biologie etc. **Dönitz**, Berlin. Entom. Zeitschr.

47. Bd. Sitz.-Ber. f. 1901. 5. Sept. — cf. Insektenbörse 18. Jhg. No. 39.
p. 309.

viadrina. Zuchtnotiz. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 201. — Ist einjährig. Unter

vielen Tausenden ein Stück darunter ab. *perpallida* **Heckel**. 1 asymm.

Stück m. ausgebild. Hflgln., Vflgl. symmetrisch unentwickelt, verkürzt,
lanzettl.

— Zuchtnotiz. Nachr. aus d. Ver. f. Schmetterlingsfreunde. Sitz.-Ber. vom

7. Aug. 1901. — cf. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 261.

graecella **Milliere**. Note on. **Tutt** (No. 35 des vorigen Berichts).

Pterostoma palpina. Double-brooded. Note by **Banks**, **Eust. R.** The Entomologist,

vol. 34 Nov. p. 310—311. — Note **Phil. J. Barraud**, by **Gerv. T. Mathew**,

ibid. p. 311 — **Lawrance [Laurance]**, A. J. desgl. t. c. Oct. p. 288.

Pterotes nom. nov. für *Pteroma* **Staud.** nec **Hamps.** **Berg**, Commun. Mus. Buenos

Aires vol. I p. 311.

Pygaera. Die von **Standfuss** gezogenen Hybriden sind:

Pyg. $\frac{\text{pygra Hfn. } \sigma}{\text{curtula L. } \varphi}$, Pyg. $\frac{\text{curtula } \sigma}{\text{pigra } \varphi}$, Pyg. $\frac{\text{curtula L } \sigma}{\text{anachoreta F. } \varphi}$,

Pyg. $\frac{\text{anachoreta } \sigma}{\text{curtula } \varphi}$,

Pyg. $\frac{\left(\frac{\text{pigra } \sigma}{\text{curtula } \varphi}\right) \sigma}{\left(\frac{\text{pigra } \sigma}{\text{curtula } \varphi}\right) \varphi}$, Pyg. $\frac{\left(\frac{\text{curtula } \sigma}{\text{pigra } \varphi}\right) \sigma}{\left(\frac{\text{curtula } \sigma}{\text{pigra } \varphi}\right) \varphi}$, Pyg. $\frac{\left(\frac{\text{curtula } \sigma}{\text{anachoreta } \varphi}\right) \sigma}{\text{anachoreta } \varphi}$,

$$\text{Pyg. } \frac{\left(\frac{\left(\frac{\text{curtula } \delta}{\text{anochoreta } \text{♀}} \right) \delta}{\text{anochoreta } \text{♀}} \right) \delta}{\text{anochoreta } \text{♀}}, \text{ Pyg. } \frac{\left(\frac{\text{anachoreta } \delta}{\text{curtula } \text{♀}} \right) \delta}{\text{curtula } \text{♀}}$$

Rhesecynthis erythrina F. Illustr. Zeitschr. f. Entom. 5. Bd. No. 10 Taf. VI Fig. 9
Raupe, 9a Puppe.

Rhinobombyx cuneata Aur. ♀ aus der Puppe gezogen. **Aurivillius**, Entom.
Tidskr. 22. Årg. p. 124.

Rhodogastria fumida **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 465—466 ♂ (Gilolo).
roseibarba **Druce**, l. c. p. 74 ♂ (Sooloo Islands).

brunnea **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III Taf. L Fig. 5. — *luteibarba* p. 502 Abb.
tab. cit. Fig. 18 (tropisches Afrika). — *albivitreata* p. 506 tab. cit. Fig. 19
(Lifu).

Rhuda Walk. Charakt. der Gatt. **Schaus** (7) p. 309—310. — 4 Sp.; Type:
focula Cr. (1782).

Rifargia Walk. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 317—17 [4 n.] Sp.: Type: xylinoides
Walk. (1862). — Neu: *felderi* p. 318 (Peru). — *collema* p. 318 (Colombia).
— *grisea* p. 318—319 ♂♀ (Columbia). — *cassandra* p. 319 (Merida, Venezuela).
— *nubila* **Druce**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 437 ♂♀ (Colombia, Don Amo).

Rincodes n. g. (Geäder wie *Talmenia* Möschl.) **Schaus** (7) p. 313. — 1 Sp.; Type:
minuta **Druce** (1900). Ist möglicherweise die von Cramer, vol. IV t. CCCC
fig. L als clara abgebildete Form; sie ist nicht dieselbe, wie die auf Tafel
CCXXI abgebild. clara.

Robinsonia polyplagia **Schaus**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 266 (Aroa, Venezuela).

Rosema dolorosa **Druce**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 77 (Brasil, Cabo).

dealbata **Dognin**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 309 (Ecuador).

Rothschildia stuarti **Rothschild & Jordan**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 404 ♂ ♀
Taf. IX Fig. 3 ♂ (La Paz, Bolivia).

Sabaliadae nov. fam. (Proboscis absent; antennae of ♂ with long drooping
branches, of ♀ with short branches. Forewing with vein 1a slender,
running into 1b; 1c absent; 5 from above angle of discocellulars; 7, 8, 9,
10 stalked, 10 from beyond 8 or absent; 11 from cell, free. Hindwing
with the frenulum absent; the base of costa lobed; vein 1a to inner margin
before tornus; 1c absent; 5 from above angle of discocellulars; 8 free from
base, connected with the cell by a bar and approximated to 7 beyond the
cell; a precostal vein. — Die Familie kann nicht *Lemoniadae* genannt
werden, da dieser Name präoccupirt ist; sie ist nicht mit den *Brahmaeiden*
nahe verwandt, bei dieser ist der Rüssel vollkommen entwickelt, auch
hat diese ein anderes Aussehen. *Lemonia* wurde von *Aurivillius* unter die
Stryphopterygidae = *Eupterotidae*, Iris VII, p. 186 (1894) gestellt, bei
dieser Fam. ist jedoch das Frenulum vorhanden u. Ader 8 d. Hflgl. weit
getrennt von 7 jenseits (beyond) der Zelle. **Hampson**, Trans. Entom. Soc.
London, 1901, p. 187.

Schlüssel zu den Gatt.:

A. Vordertarsen mit sehr gross. gesägten Endklauen

Lemonia.

B. Vordertarsen mit normalen Klauen

- a) Vordertibien mit gekrümmter Klaue am Ende der Aussenseite u. einer lang. gekrümmten Klaue am Ende des Tarsengliedes auf der Innenseite Sabalia.
 b) Vordertibien u. Tarsen ohne Klauen ausser den Endklauen der Tarsen Spiramiopsis.

Sabalia Wlk. Charakt. **Hampson**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 189—190.
 Uebersicht über die Arten:

A. Kopf schwarz

- a) Tegula weiss picarina Wlk. Abb. Fig. ♂ auf S. 191.
 b) Tegula schwarz
 a) Patagia mit weissen Flecken jacsoni E. Sharpe. p. 190.
 b) Patagia ohne weisse Flecken fulvicincta n. sp.
 a) Abdom. mit dorsal. orangefarb. Bändern.
 b) Abdom. mit leicht orangefarb. gefranzten Bändern. tippelscirchi Karsch p. 191.
(Karsch schreibt tippelskirchi)
sericaria Weym. p. 191.

B. Kopf orange

fulvitincta p. 190 ♂ (Nyasaland).

Salluca n. g. **Schaus** (7) p. 294. — 5 [4 n.] Sp.; Type: *moruma*. — *moruma* p. 294 Taf. XI Fig. 11 (Orizaba, Mexico). — *gramina* p. 294—5 (Orizaba, Mexico). — *pistacina* p. 295 (Honduras). — *tarupa* p. 295 (São Paulo, S. E. Brazil). — Hierher auch *Heterocampa podrida* Dogn.

Samia californica. Note on. **Grote, A. R.**, 1896, Journ. New York Entom. Soc. vol. 4 No. 4 p. 201.

cynthia aus Nord-Amerika bei Strassburg im Elsass u. bei Laibach eingeführt. Berlin. Entom. Zeitschr. 47. Bd. Sitz. - Ber. f. 1901. 31. Okt. — Insektenbörse, 18. Jhg. p. 389.

Sarosa connotata (379b) **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 171 ♀ (Peru, R. Linimbare, St. Domingo; 4200'). — *lutibasis* (382a) p. 171 ♂ (Panama, La Chorrera).

Sarrothrips revayana Sc. 2. Generation? **Wendlandt** p. 80.

Saurita. **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London 1901 p. 116—117 zählt von Trinidad auf: *cassandra* L., *lacteata* Butl. u. *temenus* Stoll.

Saturniidae u. Ceratocampidae. Gatt. derselben. **Packard**, Psyche, vol. 9 p. 279—282. — Saturniidae. Ueber Grote's Bemerkungen. **Dyar** (11).

Saturniidae. Auf Trinidad vertreten durch die Gatt.: *Arseneura* (1), *Attacus* (2), *Automeris* (4), *Molippa* (1), *Dirphia* (1), *Ormiscodes* (2). **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 140—141.

Saturnia apollonia. Biologisches etc. **Barrett, C. G.** (2) p. 192—193. Puppe etc. *caecigena* Kup. **Abafi-Aigner, L.** Rovart Lapok, 8. köt. 1. füz. p. 7—9.

pavonia L. Warum Zimmerzucht so schwer? Anfrage. **Shibabigk** p. 202. ♂. Teratologisches Stück. **Hampson**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 118.

pyri. Verbreitung. cf. p. 806 des vorig. Berichts u. p. 623 sub No. 6 des Ber. f. 1899. Auch von **Chr. Schröder**, Allgem. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 263. — *pyri ab. Abafi n. Wagner, J.*

spini als Schädling etc. **Weissmantel** (1), (2).

— Hybriden. Namen ders. **Tutt, J.** (9); auch Insektenbörse, 18. Jhg. p. 243—244.

hybr. bornemanni (= Sat. pavonia ♂ × spini ♀).

„ hybrida (= Sat. spini ♂ × pavonia ♀).

„ emiliae (= Sat. pavonia ♂ × pyri ♀).

hybrida-media (= Sat. pyri ♂ × pavonia ♀).

„ hybrida-maior (= Sat. spini ♂ × pyri ♀).

„ schaufussi (= Sat. bornemanni ♂ × pavonia ♀).

„ standfussi (= Sat. emiliae ♂ × pavonia ♀).

„ risii (= Sat. emiliae ♂ × pyri ♀).

„ schlumbergeri (= Sat. bornemanni ♂ × pyri ♀).

„ dixeyi (= Sat. bornemanni ♂ × spini ♀).

„ complexa (= Sat. standfussi ♂ × pavonia ♀).

— kürzere Schreibweise für Hybriden. **Chapman** (10).

Scepsis discopuncta (1149 a) **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 175 ♀ (Bolivia, Chaco). — *subhyalina* (1149 b) p. 175 ♂ (Bolivia, Tanamapaya).

Schalifrontia n. g. **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 654. — *furcifer* p. 654 (Brasilien).

Schizura Doubl. Charakt. der Gatt. **Schaus** (7) p. 298—299. — 10 Sp.; — Type: ipomeae Db. (1841).

Seirocastnia panamensis **Hampson**, t. c. p. 657 Abb. Taf. LIII Fig. 16 (Chiriqui). *Sericaria mori*. Osservazioni sopra gli stigmi. Con 1 tav. e 5 fig. nel testo.

Petri, L. Bull. Soc. Entom. Ital. An. 33. 2. Trim. p. 89—103, 104.

Semyra bella H. S. auf Trinidad. **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 158.

Sibine. Beschr. der nordamerikan. Spp. **Dyar**, Proc. Entom. Soc. Washington, vol. IV p. 422—427. — Ueber einen Unterschied d. Arten ders. **Dyar** (21).

Neu: *apicalis* **Dognin**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 424 (Mexico). — *pallescens* p. 309 (Venezuela).

Siculodopsis grisea (breitflüglicher als die typ. Sp. flaviceps Warr.) **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 437 ♂ (Cayanuma, Loja).

Sisyrosea albimarginata **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 158 Taf. VI Fig. 22 (Trinidad: Tabaquita).

Staphita n. g. **Schaus** (7) p. 295—296. — 1 Sp.; Type: salona Druce (1894).

Spatalia (Notodonta) argentina Schiff. bei St. Goarsbausen. **Wendlandt** p. 81.

Sphecosoma nigricornis **Rebel** in Therese von Bayern p. 278 ♂. Beschr. t. c. p. 302 (aus naher Verwandtschaft von *Sphecos. cognatum* Wlk. abweich. im Geäder etc.)

Sphingicampa Walsh. ist *Adelocephala* u. *Syssphinx*. **Dyar**, Proc. Entom. Soc. Washington, vol. 4 p. 427.

Spilosoma congrua and a few other Types in the British Museum. Notes on Walker's Types of. **Lyman, Henry H.** Canad. Entom. vol. 33 No. 4 p. 93—98.

fuliginosa. Albino mit hell kaffeebraunen Vfögn. **Schnabel**, Zeitschr. für Entom. Breslau, 1900 p. XV. — Notes on Spil. (Arctia) *fuliginosa*. **Crallan, G. E. J.** The Entomologist vol. 34 Dec, p. 353. — Aus Zucht 2 var. borealis.

radiata, ein Stück mit schwarzen Fransen. The Entomologist, vol. 34 p. 62.

Spiramiopsis n. g. Sabaliadarum (Untersch. von Verw. siehe unter Sabaliadae).
Charakt. **Hampson**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 191. — *comma*
p. 191—192 ♂ Abb. p. 192 (C. Colony, Kowie R., Grahamstown).

Stauropus alternans. Raupe. **Koningsberger**, Med. Plantentuin Java XLIV, 2.
Stenophaea n. g. (Type: *Ctenucha pollinia* Bois.) **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III
p. 215.

Stenucha n. g. (*Ctenucha dolens* Druce) **Hampson**, t. c. p. 450.

Sterrhopterix (Psyche) *hirsutella* Hb. bei St. Goarshausen. **Wendlandt** p. 84.

Stesichora inquinata (nahe verw. mit *S. parvidentata*) **Warren**, Nov. Zool. Tring,
vol. 8 p. 192 ♂ ♀ (Mysol).

puellaria subsp. multiguttata n. **Warren**, t. c. p. 21.

Stictane junctilinea (542a) **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 183 ♀
(Singapore).

Stilpnolia salicis on Hackney Marsh. **Image, Selwyn**, Entom. Monthly Mag. (2).
vol. 11 (36) p. 62.

Strophocerus Moeschl. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (7) p. 265—266. — 1 Sp.;
Type: *flocciferus* Moeschl. (1884). — Ob Notodontide?

Symmerista Hübn. Charakt. d. Gatt. **Schaus** (8) p. 287. — 3 Spp.; Type: *albi-*
frons Sm. a. Abb. (1797).

Neu: *fulgens* **Druce**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 75 ♂ (Venezuela,
Merida).

Syntarctia n. g. (Type: *Halesidota testacea* Möschl.) **Hampson**, Cat. Lep. Phal.
III p. 98.

Syntomidae u. Pericopidae. Parallele Entw. zwischen dens. **Dyar** (18).

Syntomidae von den Bahamas. **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 246—247.
4 Spp.

Synthomis phegea L. var. *nigricornis* von Wei-Hai-Wei. **Fletcher**, The Ento-
mologist, vol. 34 p. 174.

phegea. ♀ in der Gefangenschaft Eier abgelegt, die Raupen nahmen kein
frisches, sondern nur trockenes Futter an u. zwar Maisblätter. Zeit-
schr. f. Entom. Breslau, 1901, p. V.

— Stück vom Guardasee, bei dem das rechte Flgl.-Paar bedeutend kleiner
und abweichend gezeichnet ist. Recht. Oflgl. fleckenlos (var. *iphimedia*).
recht. Uflgl. hat nur einen gröss. weissen Centralfleck (var. *cloelia*).
Linkes Flgl.-Paar trägt normale Zeichn. von *phegea*. Oben u. unten
ist die Zeichn. die gleiche, Zwitter scheint wohl nicht vorzuliegen.
Berlin, Entom. Zeitschr. 47. Bd. Sitz.-Ber. f. 1901. 18. März — cf. auch
Insektenbörse, 18. Jhg. p. 108.

Kulweini u. *fulvescens*. Biologisches. **Barrett, C. G.** (2) p. 193.

tomasina Butl. in Somaliland. The Entomologist, vol. 34 Suppl. p. 7.

Neu sind: *borguensis* (80a) **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 166 ♂
(Nigeria, Borgu, Yelwa Lake). — *madurensis* (80b) p. 166 ♂ (S. India,
Madura, Ammanayanahramir). — *melaproctis* (96a) p. 166—167 ♂
(Philippinen, Samboangan). — *clementsi* (96b) p. 167 ♂ ♀ (W. Australia,
Sherlock River). — *attenuata* (96c) p. 167 ♂ ♀ (N. Australia, S. Hey-
wood Island, Bathurst Island, Queen's Island). — *consimilis* (111a)
p. 167—168 ♂ ♀ (Br. E. Afrika, Nairobi, Kikuyu, Roromo, Fort

Smith). — *cuprizonata* (112a) p. 168 ♀ (Br. E. Africa, Roromo, Kikuyu). — *chloroscia* (164a) p. 168 ♀ (Br. E. Africa, Athi-ya-Mawe). — *congener* (175a) p. 168—169 (Br. E. Africa, Kikuyu, Ruarka River, 5500').

lucta Lucas, Proc. Soc. Queensland, vol. XVI p. 73 (Queensland).

Syssphinx. Raupen. Dyar, Proc. Entom. Soc. Washington, vol. 4 p. 423—430.

Tachuda n. g. Schaus (7) p. 278. — 1 Sp.; Type: (Lochmaeus) albosigma Druce (1887).

Tagela n. g. Schaus (7) p. 265. — 1 Sp.; Type: (Symmerista) dentata Schaus (1892) Abb. Taf. XI Fig. 1.

Talmenia Möschl. Charakt. d. Gatt. Schaus (7) p. 313. — 1 Sp.; Type: arsilonchoides Möschl. (1883).

Taragama polydora Feld. Besch. von Raupe, Puppe, Kokon. Barrett, C. G. (2) p. 289.

Tarchon *cuprea* Kaye, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 142—143 Taf. VI Fig. 11 (Trinidad).

Teara contraria. Biologie d. Raupe. Froggatt, Agric. Gaz. N. S. Wales, vol. XII p. 803 nebst Taf.

Tecmessa Burm. Charakt. d. Gatt. Schaus (7) p. 285. — 2 Spp. [1 n.]; Type: annulipes Berg (1878). — Neu: *elegans* p. 285 Taf. XI Fig. 4 (Castro, Parana).

Telea polyphemus double-brooded. Moffat, J. Alston, A Surpise; Canad. Entom. vol. 33 No. 10 p. 288. — not suprised. Stevenson, Charl., Canad. Entom. vol. 33 No. 10 p. 316.

Teracotona *subterminata* Hampson, Cat. Lep. Phal. III p. 471 Taf. L Fig. 16. (Ostafrika).

Tessellartia n. g. (Type: Halesidota semivaria Walk.) Hampson, t. c. p. 90.

Tessellota n. g. (Type: Halesidota cancellata Burm.) Hampson, t. c. p. 430.

Theroa n. g. Schaus (7) p. 270. — 1 Sp.; Type: (Dasylophia) zethus Druce 1898.

Thiridopteryx ephemeraeformis. Zahl der Eier. Girault, Entom. News Philad. vol. XII p. 304.

Thosea *bhaga* Swinhoe, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 463—464 ♂ (Sarawak, Borneo).

Thyrarctia n. g. (Type: Bombyx cedo-nulli) Hampson, Cat. Lep. Phal. III p. 9.

Thyretes caffra. Biologisches. Barrett, C. G. (2) p. 193.

Thyromolis n. g. (Type: Idalus pythia Druce) Hampson, t. c. p. 68.

Trichura cerberus Pall. auf Trinidad. Lathy, Trans. Entom. Soc. London 1901 p. 118.

Tritonaclia *erubescens* (255a) Hampson, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 169 ♂ (Br. E. Africa, Uganda Ry., mile 478).

Trypanus (= Cossus = Xylentes) vicarius Walk. von Wei-Hai-Wei. Fletcher, The Entomologist vol. 34 p. 199.

Tuerta *transiens* Hampson, Cat. Lep. Phal. III p. 624 Taf. LIII Fig. 15 (Old Calabar).

Trypheromera Butl. siehe Nyctemera.

Turuptiana *obscura* Schaus, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 268 (Peru).

Uraga *rubricollis* (1018a) Hampson, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 173—174 ♀ (Colombia).

Urolasia brodea Schaus auf Trinidad. Kaye (1) p. 118.

- Urota sinope*. Raupe. **Packard**, Psyche vol. IX p. 282.
- Virbia sanguicollis* **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 199 Taf. XLII Fig. 22. — *hypophaea* p. 201 tab. cit. Fig. 20 (Costa Rica).
- Xanthopheina* n. g. (Type: *Phegoptera levis* Druce) **Hampson**, t. c. p. 82.
mons-lunensis **Hampson**, Cat. Lep. Phal. III p. 570 Taf. LIII Fig. 10 (Ostafri).
 — *melanosoma* **Druce**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 433 ♂ (East Africa).
- Zenuzera pyrina* massenhaft in den Zweigen der amerikanischen Eiche des Südparks zu Breslau. Zeitschr. f. Entom. Breslau 1901 p. VI.
 Neu: *aetes* **Druce**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 436 ♂ (Colombia, Bonda). — *coscinopa* **Lower**, Trans. Roy. Soc. S. Austral. vol. XXV p. 63 (Westaustral.).
- Zonosoma* Butl. (*Tristania* Kirby) siehe *Nyctemera*.
- Zygaenidae von den Bahamas. **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 254. — 1 Sp.
- Zygaena* ♀ in copula mit 2 ♂♂. **Nagel**, Zeitschr. f. Entom. Breslau 1900 p. XX. *angelicae* O. ab. *confluens* mihi. **Dziurzyński, Clemens**, 11. Jahresber. Wien. Entom. Ver. 1900 p. 117. Mit 1 Fig.
- exulans* Hoch cum var. *Vanadis* Dalm. (*ab. confluens* n.) (Stück, bei dem die 2 hintersten Flecke zu einer horizontal. Längsbinde zusammengeflossen sind) **Strand**, Nyt Mag. etc. 39. Bd. 1901 p. 52.
- (*Anthrocera*) *filipendulae* L. in Ranffshire. **Brown, H. H.**, The Entomologist vol. 34 Oct. p. 296.
 — 3 ♂, 3 ♀. Teratologische Stücke. **Hampson**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 120.
- hippocrepidis*. **Lelièvre, Ern.**, Feuille jeun. Natural. (4) An. 31 No. 363 p. 97.
- Zygaenopsis* Swinh. Synon. u. Bemerk. zum Geäder. **Rothschild & Jordan**, Nov. Zool. Tring vol. 8 p. 411.
- fuscimarginalis* Swinh. p. 411 (Kapaur, Dutch New Guinea).
- fumosa* (Body above black, underside blackish or more or less yellow. Wings uniformly smoky black, slightly transparent, with an olivaceous brown tint. Clasper (♂) sinuate, lobes short, lower lobe narrow, triangular, not acute, upper one broad, rounded) p. 411 ♂♀.
- a) *fumosa subsp. fumosa* n. (underside of body a. legs dirty wood brown, smoky black, where the scaling is intact) p. 411 ♂♀ (Suer, Mefor, Geelvink Bay).
- b) *fumosa subsp. flaviventris* n. (abdom. beneath, clasper excepted, ochre yellow) p. 411 ♂ (Biak, Geelvink Bay).
- c) *fumosa subsp. inferna* n. (frons, 1 st. antenn. sgm., legs and underside of body ochre yellow, tibia partly blackish above) p. 412 ♀ (Laiwui, Obi).
- salomonis* p. 412 m. den Subsp. a) *salomonis salomonis* p. 412 ♂♀ (Guadalcanar, Solomon Islds.). — b) *salomonis isabella* (= *Machaerophora spec.* Pagenstecher in Chun 1900) p. 412 ♂ ♀ (Isabel, Solomon Islds.); Shortland Islds.).
- fumigata* Pag. [in Chun, Zool. XII (1900)] p. 412 (N. Pommern).
- basalis* p. 412—413 ♂ (Fergusson, d'Entrecasteaux Islds.; Milne Bay, Brit. New Guin.).
- assimilis* (Untersch. v. *basalis*) p. 413 ♀ (Salawatti).

flavibasis Swinh. Variabilität p. 413.

a) flavibasis *subsp. abdominalis* p. 413—414 ♂ (Milne Bay, Mailu, Brit. N. Guinea, Fergusson Isl., d'Entrecasteaux Islds.).

b) flavibasis *subsp. flavibasis* n. p. 414 ♂♀ (Little Key).

papua (Oberth.) von Hampson als aberr. Form v. flavibasis betrachtet, ist aber deutl. versch. p. 414 ♂♀ (Dorey).

medioplaga p. 414 ♂ (Batjan).

flaviceps n. sp. p. 415 ♂♀ mit den Subsp. *flav. subsp. flaviceps* n. p. 415 ♂ (Batjan). — *flav. subsp. cingutala* n. p. 415 ♂ (Ternate).

lata p. 415 ♀ (Fergusson Isl., d'Entrecasteaux Isl.).

meekei p. 415 ♂♀ (Milne Bay, Brit. N. Guinea).

Zygaenopsis. Uebersicht der meist neuen Spp. Rothschild & Jordan, Nov. Zool. Tring vol. 8 p. 416.

- a. Vflgl. ohne gelben Fleck an der Basis oder in der Mitte des Innenrandes. b.
 Vflgl. mit gelben Fleck an der Basis oder in der Mitte des Innenrandes. d.
- b. Vflgl. mit ein. gross. weiss. hyal. Fleck in der Mitte. 1. *Z. fuscimarginalis*.
 Vflgl. ohne ein. gross. weiss. hyal. Fleck in der Mitte. c.
- c. Vflgl. in Färb. einförmig, fast hyalin, Abd. oben schwarz. 2. *Z. fumosa* n.
 Vflgl. hyal., Adern u. Ränder schwarz, Thorax oben schwarz, Abd. in der Mitte gelb. 3. *Z. flavibasis* subsp. *immaculata* n.
 Vflgl. hyal., Thorax gelb. 4. *Z. salomonis* n.
- d. Vflgl. mit einem gelben Fleck. e.
 Vflgl. mit zwei gelben Flecken. i.
- e. Der Fleck liegt in der Mitte des Innenrandes. 5. *Z. medioplaga*.
 Der Fleck liegt an der Basis. f.
- f. Kopf u. Hals gelb. 6. *Z. flaviceps* n.
 Kopf u. Hals wenigstens theilw. schwarz. g.
- g. 1. Abdom.-Tergit gelb, Pleuren schwarz. 8. *Z. basalis* n.
 1. Abdom.-Tergit schwarz, distalwärts m. od. ohne gelbe Schuppen. h.
- h. Vflgl. oben m. gelbem Strich an d. Basis d. Zelle, Schuppen auf den Queradern kein Stigma bildend. 9. *Z. assimilis* n.
 Zelle der Vflgl. ohne gelb. Strich, Stigma auf den Queradern vorh. 10. *Z. flavibasis*.
 Zelle der Vflgl. ohne gelb. Strich, kein Stigma auf den Queradern. 7. *Z. fumigata*.
- i. Der schwarze Zwischenraum zwischen den beiden gelb. Flecken viel kleiner als der basale Fleck.
 Der schwarze Zwischenraum zwischen den beiden gelb. Flecken viel grösser als der basale Fleck. 13. *Z. meeki* n.
- j. Thorax oben u. 1. Abd.-Tergit schwarz. 11. *Z. papua*.
 Thorax oben u. 1. Abd.-Tergit gelb. 12. *Z. lata* n.

Noctuidae

(einschliesslich Cymatophoridae u. Sarrothripinae).

Agaristidae siehe Bombyces.

Autoren: Barnes, Beutenmüller, Cappel, Chittenden, Distant, Druce, Dyar, Grote, Hampson, Hoyningen-Huene, Kaye, Kusnezow, Lampa, Lucas, Lyman, Meyrick, Poling, Püngeler, Rebel, N. Rothschild, Schaus, Semper, Smith, Swinhoe, Teich.

Noctuen des Vesuv-Gebietes: Cannaviello (5).

Noctuidae von Central-Afrika. **Sharpe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 284—285; 7 Spp.— von den Bahamas. **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7.) vol. 7 p. 247—250. — 26 Spp.

— auf Trinidad vertreten durch Spp. der folg. Gatt.: *Euplexia* (2), *Jun-caria* (1 n.), *Thyria* (1), *Phrygonis* (1 n.), *Droboda* (1 n.), *Aedia* (1 n.), *Homoptera* (1), *Xylis* (1 n.), *Coenipeta* (1), *Noctua* (1), *Letis* (4), *Syrnia* (1), *Erebus* (1), *Barydia* (1 n.), *Blosyris* (1), *Peosina* (1), *Dys-sonia* (1 n.), *Melipotis* (1), *Herminodes* (1 + 1 n.), *Catamelas* (1 n.), *Acantholipes* (1 n.), *Remigia* (1), *Celiptera* (1 + 1 n.), *Apistis* (3), *Pleonectiptera* (1), *Bendis* (1), *Amphigonia* (1), *Marthama* (1), *Parvapenna* n. g. (1 n.), *Dagassa* (1), *Orsa* (3 n.), *Capnodes* (2), *Massala* (1), *Homopyralis* (1 + 1 n.), *Yrias* (1), *Macrodes* (3). **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 122—131.

— von New York. Part I. *Thyatira* — *Hadena*. **Beutenmüller**, Bull. Amer. Mus. vol. XIV p. 229—312 pls. XXXV—XXXVIII.

— spec. Raupe, desgl. Raupen der subfam. Ophiussinae. Fundorte. **Therese von Bayern** p. 289.

— Lage des postspiracularen Höckers bei den verschied. Gruppen. **Dyar** (16).

Abrostola (*Plusia*) *asclepiadis* Schiff. bei St. Goarshausen. **Wendlandt** p. 83.*Acantholipes circumdata* (Wlk.) Aegypt.: Shendi. **Rothschild, N.**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 431.

Neu: *incisura* **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 127 Taf. V Fig. 18 (Trinidad: Tabaquite).

Achaea melicerte. Raupe u. Puppe. **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 554 Abb. Taf. 5 Fig. 1, 2.

Neu: *argilla* (*A. melicerte* nahest.) **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 6 p. 132 (Towranna Plains, W. Austral.).

Lienardi Bdv. **Barrett, Frances**, Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 11 (36.) p. 142.

Acharya costalis Moore zu *Egnasia* gezogen. **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7.) vol. 7 p. 498.*Acontia intersepta* **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 523 Taf. Q Fig. 10, 12.*Acosmetia caliginosa* Hübn. für die Umgebung von Berlin (Finkenkrug) neu, 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900. 2. Aug. (p. 23).*Actebia praecox* and *Crambus pinetellus* near *Frodingham*. **Corbett, H. H.** Entom. Record vol. 13 No. 9 p. 278.

- Acronycta. Amerikanische Arten, Synonymie u. Typen. **Grote**, Canad. Entom. vol. 33 No. 9 p. 242—245.
- alni in Warwickshire. **Kiss, W.**, The Entomologist, vol. 34 Sept. p. 255. — taken at Rest. **McLeod, R. A.**, The Entomologist, vol. 34 Aug. p. 230.
- brumosa u. hamamelis. Synonymie. **Dyar**, Canad. Entom. vol. 33 p. 122; **Smith**, t. c. p. 147; **Dyar**, t. c. p. 191; **Smith**, t. c. p. 232.
- ligustri V. ab. *troni* n. (ein Thier, das in alter Zeit viel Staub aufgewirbelt hat. — Die Aberr. zeigt, dass sehr helle ligustri eine flüchtige Aehnlichkeit mit dunklem ludifica haben können, aber auch nur auf den Vflgl. Grundfarbe der Aberrr. weiss mit normal. schwarz. Zeichn.). **von Hoyningen-Huene**, Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. p. 310—311.
- menyanthidis, fast schwarzes Stück von Skipwith Common, bei Selby, auch bei Strensall Common, in der Nähe von York, vergl. mit Stücken aus anderen Gebieten. Proc. Entom. Soc. London, 1901 p. VII. — Dito nebst Bemerk. **Porritt**, The Entomologist, vol. 34 p. 162. — Ausschlüpfen im Herbst. **Adkin, R.** (11).
- Adisura ionola **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 128 ♂♀ (Towrana Plains, W. Austral.).
- Aedia acronyctoides. Raupe. **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 551 Taf. R Fig. 12. — longiquaa p. 551 Abb. Taf. LX Fig. 18, Raupe u. Puppe Taf. R Fig. 14, 15.
Neu: *pruna* **Semper**, t. c. p. 552 Taf. LX Fig. 17, Raupe Taf. R Fig. 13 (Philippinen).
- trinidadensis **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 123 Taf. V Fig. 3 (Trinidad: Verdant Vale, Tabaquite).
- Agonista morio **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 547 (Philippinen).
- Agronoma. Correction of the Type and Note of Laspeyria. **Grote, A. Radcliffe**, 1896. Journ. New York Entom. Soc. vol. 4 No. 2 p. 85—86.
- Agrophila trabealis. Abnormal Length of Pupal Life. **Ash, C. D.**, Entom. Record, t. c. No. 12 p. 373.
- Agrotis. Dornen an den Vordertibien einiger nordamerikanischen Spp. **Cappel de Vos to Nederveen**.
— Biologie verschiedener Arten. v. **Aigner-Abafi** (16): polygona F., signum F., janthina Esp., obscura Brahm., orbona Hufn., comes Hb., xanthographa F., margaritacea Vill., depuncta L., multangula Hb., rectangula F., fugax Tr., putris L., fimbriola Esp., forcipula Hb., tritici L., var. eruba Hb., obelisca Hb., vestigialis Rott. u. praecox L.
- agathina. Ei. **Chapman, T. A.**, Entom. Record, vol. 13 No. 5 p. 160.
- Ashworthii. Foreign. **Tait, Rob.**, The Entomologist, vol. 34 Febr. p. 30—41.
- biconica Kollar. Aegypten: Wadi Halfa; Cairo — frisst „lettuce“ Lattich. **Rothschild, N.**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 429.
- chardinyi var. *Fuchsii* n. (Vrand von der Wurzel bis zur Mitte in ziemlich breiter Ausdehnung weiss, nicht von der hellgelben Grundfarbe wie bei asiatisch. Form. Sie ist grösser als die Stammform, alle Flgl. sind länger u. schmaler). **Wendlandt**, Jahrb. nass. Ver. f. Naturk. 54. Jhg. p. 85—87 (Ostpreussen bei Tapiau).

- comes u. *Aberr.* **Gauckler** (4). — Raupe, Nahrung, Aufsuchen u. Treiben ders. Hofmann's Abb. d. comes-Raupe ist nicht korrekt. Beschr. der Puppe u. des Schmetterl. (letzt. fliegt rasch u. stösst leicht die Fransen ab. Die Abarten u. ihre Beschr. 1. c. ab. adsequa Tr. p. 194—195. — 2. ab. prosequa Tr. p. 195. — 3. c. aberratio p. 195 (bei der Zucht aus den mehr aschgrauen Raupen, nicht selten). — 4. c. ab. *niger* n. Gkler. (Grundf. d. Ofgl. sattes schwarzbraun m. dunkelviolett. Schimmer. Von der sonstig. comes-Zeichn. bis auf die ganz schwach angedeutete Nierenmakel nichts vorh. Ofgl. nahezu zeichnungslos. Ufgl. nicht mehr gelb, sondern rauchgrau m. schwach. gelbl. Schimmer. Schwarze Saumbinde etwas dunkl. hervortretend. mondform. Fleck in d. Flgl. Mitte kaum sichtbar. Thorax u. Leib schwarzbraun. Useite aller Flgl. der Oseite entsprech. stark verdunkelt, schwarzgrau (p. 195—196). — siehe ferner pronuba.
- var. *bergensis* **Schneider**, Bergens Mus. Aarbog, 1901 p. 155 Abb. auf Taf. Fig. 2.
- conflua* gef. an Polygonum bistorta am Tage. Zeitschr. f. Entom. Breslau, 1900 p. XVIII.
- cuprea* wie *conflua* am Tage fliegend, Glatzer Gebirge, für Schlesien neu. Zeitschr. f. Entom. Breslau, 1899 p. XV.
- cursoria* dunkelbraune Formen von Tongue, Sutherlandshire. The Entomologist, vol. 34 p. 362.
- lucipeta* F. Mant., *saucia* ab. *Phillipsi* Casp. bei St. Goarhausen. **Wendlandt**, p. 82.
- nigricans* siehe unter *tritici*, weiter unten.
- ochrogaster*. Nomenclatur. **Grote**, Canad. Entom. vol. 33 p. 177.
- pronuba* L. ♂ u. comes Hübn. ♂. Teratologische Stücke. **Hampson** (4) p. 118.
- saucia* Hübn. at Poyntzpass, Ireland. **Johnson, W. F.**, Entom. Monthly Mag. (2.) vol. (12) 37 p. 45.
- segetum* L. (Sädesbroddflyet) in Schweden, 1900. Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 38—39; — W. V. Schädling. Abb. von Schmetterl. u. Raupe. Fig. 1, 1 a. Schrift. naturf. Ges. in Danzig. N. F. 10. Bd. p. 70, Text p. 69; — Schiff. Ueber eine auf den Raupen dieser Sp. lebende Milbe. Sur un Acarien (Uropoda sp.) vivant sur les chenilles. **Giard, Alfr.**, Bull. Soc. Entom. France, 1901 p. 205—206.
- spec.* (weder im Mus. Brit., Wien, Münch., Berlin, nach Druce vielleicht neu). **Rebel** in Therese von Bayern p. 283 ♀ (Las Cruzes am Quindiu-pass, Osthang der Centralcordillere, Columbien, Dept. Tolima 2680 m) Abb. Taf. V Fig. 16. Beschr. p. 303—304 (Benennung unterlassen, weil zu defekt).
- subrosea* Stph. var. *subcaerulea* Stgr. ab. *latefasciata* n. von **Hoyningen-Huene**, Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. p. 311—312.
- tritici* u. *nigricans*. Neue Unterschiede. **Thompson, Bern., Blydes**. Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 12 (37) p. 13—14. — Verschiedenheit der Stigmata (Flügelmakel). **Rothschild, N.**, Nov. Zool. Tring. vol. 8.
- zeta* Rott. Staudinger u. Rebel citiren irrthümlich vol. XI statt IX.

- Neu: *funkei* **Püngeler**, Deutsch. Entom. Zeitschr. Iep. Hft. 14. Bd. p. 181
Abb. Taf. II Fig. 1, 2 (Sarawschan).
- Alaria florida*. Raupe. **Beutenmüller**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 90.
- Amilaga* nom. nov. für *Lucia* Walk. praeocc. (Untersch. von *Badiza*, *Adrapsa*,
Bocana u. *Asthala*) **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 16. — geometroides
Walk. p. 16. — Type der Gatt.: *ablualis* Walk.
- Ammoconia senex* (*vetula*) var. *mediorhenana* Fuchs. Fang von ♀ am Köder
selten, Zucht etc. **Wendlandt**, p. 77—78.
- Amphypira* (od. *Amphipyra*?) *tragopogonis* (L.) **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7)
vol. 8 p. 129 (Kulu, bisher von Indien nicht erwähnt) — Stück mit blassen
Randflecken auf den Vflgl. The Entomologist, vol. 34 p. 30.
- Anarta cordigera*. **Schneider**, Bergens Mus. Aarborg 1901 p. 172 Taf. Fig. 5.
melanopa Thbg. für finnische Fauna neu. **Lampa**, Entom. Tidskr. 22. Årg.
p. 158. — *melaleuca* Thbg. bei Lödigen u. Hadsel. **Strand**, Nyt Mag.
etc. 39. Bd. 1901 p. 53. — *Myrtilli* ab. *Alpina* Raetzer in Kärnthen,
Thörl-Alm (Anfang Juli) für Oesterreich neu. **Preisseecker**, Verhldgn.
zool.-bot. Ges. Wien, 51. Bd. Sitz.-Ber. f. 1901 4. Okt. p. 625.
- Anuga constricta*. Raupe u. Puppe. **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 532
Taf. R. Fig. 1—3.
- Apatela*. Liste der nordamerikanischen Arten. **Grote**, Proc. Entom. Soc. Was-
hington, vol. 4 p. 365—368.
- Apharetra* n. g. (Type: „*A. dentata* Grote“). **Grote**, t. c. p. 368.
- Aphypena* n. g. *Hypeninarum* Type: *A. (Hypena) dissimulans* Hmps. (1898).
Swinhoe, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 21—22 (Type von *Khasia Hills*; *Pulo*
Laut, *Borneo*).
- Aplecta nebulosa* Tr. schwarze Var. mit weissen Cilien. Proc. Entom. Soc.
London, 1901 p. III, auch The Entomologist, vol. 34 p. 132.
occulta siehe *Heliothis scutosa*. Auch **Hanbury, Fred.**, p. 833 des vorig.
Berichts.
- Aporophyla lutulenta* Bkh. Nährpflanze. **Abafi-Aigner** (p. 547 sub. No. 2 des
vor. Berichts) p. 281.
nigra Hw. var. *Seileri* n. (Vflgl. gleichmässig rein u. tiefschwarz, ohne kupfrigen
Glanz, mit reicherer tiefschwarzer Zeichnung). **Fuchs**, Stettin. Entom.
Zeit. 62. Jhg. p. 128—130 (Coswig bei Dresden, Anfangs Sept.). —
Wir müssen bei *A. nigr.* 2 Formen unterscheiden: 1. eine mehr südl.,
von Heinemann gut charakt. u. die neue, mehr nördl. — Charakt. des
Fundorts der neuen Form. — Raupe polyphag.
- Araeognatha albodentata* **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 583 Taf. LXII Fig. 2.
- Arcilasia plagiata*. Raupe u. Puppe. **Semper**, t. c. p. 520 Taf. Q Fig. 6, 7.
- Argidia subapicata* (verw. m. *A. palmipes* Gn.). **Schaus**, Ann. Nat. Hist. (7)
vol. 8 p. 87 (Rio Janeiro).
- Attata vegalis*. Raupe u. Puppe. **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 566
Taf. I Fig. 3—5.
- Aucha vesta* **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 493 ♂ (Coomoo, Queensland).
- Baniana ypita* (verw. mit *veluticollis* Hamps.). **Schaus**, Ann. Nat. Hist. (7.)
vol. 8 p. 82 (Aroa, Venezuela). — ? *veluta* p. 81 (Trinidad) ♂ u. ♀ ähnl., ♀
mit einfach. Antenn.

- Barydia bicristata* **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 125 Taf. VI Fig. 12 (Trinidad: Tabaquite).
- tremula* **Schaus**, Ann. Nat. Hist. (7.) vol. 8 p. 39—40 (Aroa, Venezuela).
- Bendis panmisca* **Schaus**, Ann. Nat. Hist. (7.) vol. 8 p. 90 (Castro, Parana).
- Blenina effusa* **Swinhoe**, op. cit. vol. 7 p. 490 ♀ (Pulo Laut, Lewas).
- puloa* (ähnelt sehr *Charocoma albulalis* Walk. von Sarawak von Semper in s. Schmett. Philipp. Inseln nicht aufgeführt). **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7.) vol. 8 p. 130 ♂ (Luzon, Philippinen).
- Bleptina apicalis* ♂ **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 590 Taf. LXII Fig. 11.
— *confusalis* Guén. in S. Amer. **Therese von Bayern**, p. 284—285.
- Boletobia fulginaria* at Hale End. **Robbins, R. W.**, Entom. Record, vol. 13 No. 10 p. 306. — at Walthamstow. **Robbins, R. W.**, The Entomologist, vol. 34 Oct. p. 297—298.
- Bocula erota* (verw. m. *B. punctilineata* Hmps.). **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 496 ♀ (Port Blair, Andamans).
- Bomolocha molpusalis*. Raupe u. Puppe. **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 593 Taf. U Fig. 1, 2. — *herpa* (oberfl. einer *Harita rectilinea* Moore ähnl.). **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7.) vol. 8 p. 20 (Port Blair, Andamans). — *tuma* p. 21 ♂ (Jaintia Hills).
- Brephos notha* in Worcestershire with some Notes on the Habits of the Imagines. **Woodforde, F. C.**, Entom. Record vol. 13 No. 6 p. 195—196. — Habits. **Moberly, J. C.**, t. c. No. 7 p. 220.
- Brujas festonata* Feld. in S.-Amer. **Therese von Bayern** p. 283—284.
- Bryophila muralis* (glandifera) von Dawlish. Eine Serie von dunkl. Formen, viele reichlich goldbraun, die meisten m. deutlich schwarz. Zeichn., bei allen die Hfgl. dunkel, bei einigen sogar sehr dunkel. The Entomologist vol. 34 p. 60. — Stück von Folkestone mit „cottage-loaf“ Zeichnung, die durch einen breiten schwarzen Strich geteilt war, p. 60. — *muralis* var. impar Warr. farb. Abb. The Entomologist vol. 34 Taf. IV Fig. 4 u. 5. — beschr. op. cit. vol. 27 p. 209.
- Bemerk. zur Färb. einer Serie ders. Proc. Entom. Soc. London, 1901 p. IV, auch: The Entomologist vol. 34 p. 133.
- Note on. **Colthrop, C. W.**, Proc. South London Entom. Nat. Hist. Soc. 1900 p. 98—99.
- postochrea*. Raupe u. Puppe. **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 521 Abb. Taf. Q Fig. 8, 9.
- perla* var. *robusta* n. **Favre, Em.** (Titel p. 575 des vorig. Berichts) p. 127 (Wallis).
- Neu: *lamia* **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 129 ♂ (Beeling, Burma). — *vegetata* **Lucas**, Proc. Soc. Queensland vol. XVI p. 82 (Queensland).
- Cacyparis ceira* (verw. m. *C. elegans* Butl., doch diese hat ein breites weissl. Band auf d. Vfgln., vor der Mitte der Costa bis zum Hinterwinkel). **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 18.
- Callyna figurans* **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 526 Taf. LX Fig. 4. — *villiana* p. 526 Fig. 5.
- Calamia phragmitis* Hb. in Deutschl. selten, in England an manchen Stellen der Meeresküste. Eine bisher unbenannte Var. ders. ebenfalls aus England

zeichnet sich durch zart ockergelbe Färbung der Vflgl. u. verdunkelte Hflgl. aus. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. 25. Okt. (p. 26).

- Calocampa solidaginis* Hb. für den Bezirk von Wiesbaden neu. **Wendlandt** p. 84. *exoleta* L. at Poynzpass, Ireland. **Johnson**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 45.
- Calogramma festiva*, Raupe. **Semper**, Schmetterl. Philipp. II. p. 516 Taf. Q Fig. 4, 5.
- Calydia norduca* **Schaus**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 38 (Jalapa, Mexico).
- Campometra mascara* **Schaus**, t. c. p. 42—43 (Aroa, Venezuela). — *caminata* p. 43—44 (Aroa, Venezuela). — *obscura* p. 44 (Chiriqui).
- Canthylidia canusina* **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 127 ♂♀. — *cistella* p. 127 ♂ (beide von Towranna Plains, W. Australia).
- Capnodes senilis* Butl. in S. Amer. **Therese von Bayern** p. 284.
 Neu: *incurvata* **Schaus**, Ann. Nat. Hist. (7.) vol. 8 p. 93—94 (Casa Branca, Brazil). — *quarima* (verw. mit *C. laranda* Druce) p. 94 (Rio Janeiro). — *marita* p. 94 (Aroa, Venezuela). — *undilla* p. 95 (Aroa, Venezuela). — *stelligera* p. 95 (Petropolis, Brazil). — *vacca* p. 95—96 (Jalapa, Mexico). — *diffidens* p. 96 (Castro, Parana). — *palindra* p. 96 (Castro, Parana). — *borrega* p. 97 (Coatepec, Jalapa, Mexico). — *lola* p. 97 (Trinidad: Aroa, Venezuela). — *parmadia* p. 97—98 (Peru; Castro, Parana). — (?) *sabulosa* p. 98 (Orizaba).
- snelleni* **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 587 Taf. LXII Fig. 8.
albopunctata p. 587 tab. cit. Fig. 9 (beide von den Philippinen).
- Capotena elaina* **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7.) vol. 7 p. 492 ♂♀ (Queensland).
- Caradrina ambigua* in Hampshire. **Fowler, J. Hy.**, The Entomologist, vol. 34 Febr. p. 45—46. — at Ringwood. **Fowler, J. H.**, t. c. Nov. p. 317. — *lenta* Tr. für die Schweiz neu.
- gilva*, gefang. am elektr. Licht in Sulden, Schlesien. **Stertz**, Zeitschr. f. Entom. Breslau 1899 p. XV.
- **de Rougemont, F.** 1899. Bull. Soc. Neuchat. Sci. Nat. T. 27 p. 290.
- sericea* Speyer ist nicht leicht von *superstes* Ochs. zu unterscheiden u. daher mit letzt. öfter verwechselt. Beschränkt sich auf Süd- u. Mitteldeutschland. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900 27. Sept. (p. 23). — *superstes* Tr. häufig bei St. Goarshausen. **Wendlandt**, p. 78.
- Neu: *hemia* **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 495 (Sarawak, Calcutta, Borneo).
- Carea tarika* (steht zwischen *C. ocyra* Swinh. von Singapore u. *C. nitida* Hmps.) **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. 7 vol. 7 p. 492—493 ♂ (Gilolo).
- Catamelas fusco-purpurea* **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 127 Taf. V Fig. 20 (Trinidad).
- Catocala*. Revision, Bemerk. zu den nordamerik. Arten. **French**, Canad. Entom. vol. 33 No. 1 p. 12—14. — more about the red-winged *Catocalae*. t. c. No. 7 p. 205—207.
- Some recent Work in the Genus *Catocala*. **Poling, Otho C.**, Canad. Entom. vol. 33 No. 5 p. 125—129.
- Notes of the early Stages. **Dodge, G. M.** and **E. A.**, Canad. Entom. vol. 33 No. 8 p. 221—226. Forts. No. 11 p. 298—300. Die Bemerk.

- betreffen die ersten Stände von *clintonii*, *minuta*, *judith*, *obscura*, *epione*, *habilis* p. 221—226. — *retracta* p. 298. — *piatrix* u. *neogama*, p. 299.
- fraxini* in Suffolk. **Bower, B. A.**, Entom. Record, vol. 13 No. 10 p. 306. — at Norwood. **Swain, A. M.** t. c. No. 11 p. 333. — in Suffolk. **Frohawk, F. W.**, The Entomologist, vol. 34 Dec. p. 352.
- Temperaturexperimente mit *Catocala fraxini* L. **Kusnezow, N.** (3). Färbung der Hinterflügel. — Ausz. von Chr. Schröder. Allg. Zeitschr. f. Entom. 7. Bd. No. 6 p. 124. — 1 n. var. siehe weiter unten. — *illecta*. Raupe. **Beutenmüller**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 189.
- nupta* in north-west London. **Douglas, J. W.**, Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 12 (37) p. 258. — in London. **Hodge, Dorrien**, The Entomologist, vol. 34 Oct. p. 296.
- promissa* Esp. mit blass. Oberflgl., Hinterflgl. mit schmalen u. geraden medianen Bande. The Entomologist, vol. 34 p. 60.
- für finnische Fauna neu. **Lampa, Sven**, Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 158 u. **Sahlberg, J.** 1900 (3).
- sponsa* linker Oberflgl. ganz mit umbrabraun untermischt. The Entomologist, vol. 34 p. 61. — Lebt die Raupe nur von Eiche oder auch von anderen Bäumen. **M. A.**, Entom. Zeitschr. (internat. Vereinigung) 14. Jhg. No. 4 p. 29—30.
- Raupen. Gruppierung derselben. **Beutenmüller**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 195. — *illecta* Raupe. **Beutenmüller**, t. c. p. 189.
- Neu sind die beiden Spp.: *frenchii* **Poling**, Canad. Entom., vol. 33 p. 125 u. *chiricahua* p. 127 (beide aus Nordamerika).
- desgl. die beiden Varr. *fraxini* var. *maculata* n. **Kusnezow**, Rev. Russe d'Entom. vol. I p. 230 u. *fratercula* var. *owwah* n. **Poling**, Canad. Entom. vol. 33 p. 128.
- Cauninda archesia*. Raupe. **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 564 Taf. T Fig. 1.
- Celiptera fuscilineata* **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 127—128 Taf. V Fig. 5 (Trinidad: Tabaquite).
- Cerastis ligula* Esp. at Poyntzpass, Ireland. **Johnson, W. F.**, Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 12 (37.) Febr. p. 45.
- Cerapteryx graminis* **Prout**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 36.
- Cerynea morma* (ähnelt *C. Semilux* Walk., leicht unterscheidb. durch das quere doppelte gelbe Diskalband). — Ist die Art, auf welche Semper in Schmett. Philipp. Het. 1900 p. 524 von Luzon hinweist). **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 472—473 ♂♀ (Sarawak, Borneo).
- Chalcidoptera incomitata* (Swinh.). Berichtig. Bemerk. **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 25—26.
- Chariclea umbra* (*marginata*) at Sugar. **Laurance, A. J.**, The Entomologist, vol. 34 Aug. p. 229.
- Charaeas graminis* L. Schädling in Schweden. Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 46—47. — (Gräsflyet). **Lampa, Sven**, t. c. p. 136.
- Cirrhoedia xerampelina* in North Wales. **Hicklin, B.**, The Entomologist, vol. 34 Oct. p. 296. — and var. *unicolor* in Notts. **Simmons, A.**, t. c. Jan. p. 22.
- Cletthara iphida* (verw. mit *C. albonata* Hmps.), doch diese hat weisse Flecke am Aussenrande). **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 490 ♂ (Jaintia

- Hills). — *floccifera* Hmps. ♂. Bemerk. zu Typ. etc. p. 490 (Tenasserim, Nagas, Khasia Hills).
- Cloantha radiosa*. Biologische Angaben. **Abafi-Aigner** (Titel p. 547 sub. No. 2 des vorig. Berichts) p. 299. — *perspicillaris*. An unrecorded example of. from the new Forest. **Dale, C. W.**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) Jan. p. 13.
- Caenipeta nubila* **Schaus**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 81 (Peruvian Amazons). — *fragilis* (Aroa, Venezuela).
- Cophanta* (= *Toxophleps* Hamps.) *funestalis* Walk. (Sarawak). **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 469. — *optiva* (Swinh.) beide ähnl. gefärbt. Unterschiede p. 470.
- Crypsotidia* n. g. **Rothschild**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 432. — *wollastoni* p. 432 ♂ (Shendi).
- Cucullia umbratica* L. Wanderungen in Ungarn. von **Abafi-Aigner** (17). *xeranthemi* B. bei St. Goarshausen. **Wendlandt** p. 82. — Raupe auf *Aster linosyris* auf der Höhe der Loreley, scheint 2 Generationen zu haben. Neu: *graeseri* **Püngeler**, Deutsche Entom. Zeitschr. lep. Hft. 14. Bd. p. 186 Taf. III Fig. 9. — *resecta* p. 187 Taf. II Fig. 10.
- Cultripalpa partita* ♂ ♀. **Semper**, Schmetterl. Philipp. II. p. 586 Taf. LXII Fig. 6, 7.
- Cymatophora octogesima* var. *caucasica* n. **Krulikowsky**, Revue Russe Entom. vol. I p. 173.
— siehe auch unter Geometridae.
- Daona mansueta* Walk. zu Rhesala gezogen, eine gute Sp. **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 500.
- Dasyampa rubiginea* in Berkshire. **Garrett, Henry, E.**, The Entomologist, vol. 34 Jan. p. 22. — at Torquay. **Crocker, M.**, t. c. May p. 160.
- Dasythorax anartinus* **Püngeler**, Deutsche Entom. Zeitschr. lep. Hft. 14. Bd. p. 185 Taf. II Fig. 8, 9 (Chinesische Türkei).
- Daxata lintona* (verw. mit *D. bijungens* Walk.) **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 16—17 ♂ (S. E. Borneo).
- Deltoidinae. Vertreten auf Trinidad durch Spp. der folg. Gatt.: *Renia* (3), *Megatomis* (1 + 1 n.), *Atopomorpha* (1), *Megachyta* (1), *Hipoepa* (1), *Bibacta* (1), *Hydrillodes* (1 n.), *Zanclognatha* (1 n.), *Bleptina* (1), *Tortricodes* (1 + 1 n.), *Hypena* (1), *Paramimetica* (1 + 1 n.), *Physula* (1 n.), *Sandasa* (1 n.), *Mastigophora* (1), *Palthis* (1). **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London 1901 p. 132—136.
- Demas coryli* L. *ab. avellanae* n. (die Art neigt wenig zum Variiren, wo es jedoch der Fall ist, betrifft es meist die aschgraue Binde. — siehe Esp. Bd. III p. 254 Taf. L Fig. 4, 5. — Ein Stück (♂) aus Esthland ist von der Wurzel bis zum Aussenrande gleichmässig gefärbt. Das Nussbraun der Wurzelhälfte fehlt gänzlich) von **Hoyningen-Huene**, Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. p. 309—310. — bei Hildesheim. Insektenbörse 18. Jhg. p. 173.
- Dianthoecia capsophila* var. *argentea*, farb. Abb. The Entomologist, vol. 34 Taf. IV Fig. 3. — Besch. op. cit. vol. 29 p. 19.
conspersa. Ueberliegen (2 Jahre). **Sheldon** (Titel p. 630 sub No. 5 des vor. Berichts).

- luteago v. *Seibelii*, Fuchs. Selten; scheint an Köder nicht zu gehen.
Wendlandt p. 77.
- Dichromia sextalis* ♂. **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 592 Taf. LXII Fig. 12.
 — Neu: *otiata* (verw. mit *leucotaenia* Snell. [1880] von Celebes) **Swinhoe**,
 Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 134—135.
- Diethusa insularis* Butl. (steht nicht in Hampson's Moths of India, scheint aber
 doch weit verbreitet zu sein. — Zahlr. Fundorte) **Swinhoe**, t. c. p. 129.
- Diloba caeruleocephala*. Stück, bei dem die 8-Zeichnung auf 2 kleine Flecke
 reduziert ist. The Entomologist vol. 34 p. 60.
 — Aberration. **Bird, J. F.**, Entom. Record, vol. 13 No. 12 p. 358.
- Diomea orsilla* ♂ **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 588 Taf. LXII Fig. 10.
diffusifascia **Swinhoe**. Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 499 ♂ (Sarawak, Borneo).
 — *amana* (*lichenosa* Hmps. hat „a similarly smeared space on fore
 wings“, aber die Zeichn. ist eine ganz andere) p. 499 ♀ (Sarawak,
 Borneo).
- Drobeta subrufescens* **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London 1901 p. 123 Taf. V
 Fig. 14 (Trinidad: St. Verdant Vale).
- Drynobia melagona*. Raupe. **Uffeln**, Deutsch. Entom. Zeitschr. lep. Hft. Bd. 14
 p. 147.
- Dyomyx placida* **Schaus**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8. p. 39 (Orizaba, Mexico).
- Dysgonia purpurata* **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901. p. 126 Taf. V
 Fig. 15 (Trinidad: Verdant Vale).
- Eacles imperialis* Dru. Schädli. an *Pinus strobus* L. **Chittenden** (p. 565 sub No. 2
 des vor. Berichts, — lies daselbst Dru. (statt Drux).
- Eccrita ludicra* Hb. Aufsuchen. v. **Abafi-Aiguer** (sub 2 p. 541 des vor. Berichts)
 p. 384.
- Egnasia costalis* (Moore) Beschr. des ♀ v. Port Blair, Andaman Isl. **Swinhoe**,
 Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7. p. 498.
- Eligma narcissus* Cram. von Wei-Hai-Wei. **Fletcher**, The Entomologist, vol. 34
 p. 200.
- Elusa semipecten* (oberfl. ähnlich *Penza puncticeps* Walk.) **Swinhoe**, Ann. Nat.
 Hist. (7) vol. 7. p. 494—495 ♂ ♀ (Queensland). — Bemerk. zur Gatt.
- Entomogramma subcostalis* ♂, ♀. **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 569
 Taf. LXI Fig. 1, 2.
- Episema glaucina* Esp. Briefliche Mittheilung. **Aigner-Abafi, L.** Briefl. Mit-
 theilung v. 15. III 1901 in Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 233. Zucht-
 notizen. — *glaucina* var. *dentimacula* bei St. Goarshausen. **Wendlandt**, p. 82.
- Epunda lutulenta* am Köder in Wyre Forest gefangen, alle dunkel, doch nicht
 schwarz. The Entomologist vol. 34 p. 137. — Var. **Burrows** (Titel p. 561
 sub No. 2 des vor. Berichts).
 Neu: *bacheri* **Püngeler**, Deutsch. Entom. Zeitschr. lep. Hft. 14. Bd. p. 332
 (Palästina).
- Erastria umbrifera* Butl. (Khasia Hills). — Type von Dharmasala) **Swinhoe**,
 Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8. p. 129. — *venustula* Hb. bei St. Goarshausen.
Wendlandt, p. 83.
- Ercheia dubia* **Semper**, Schmetterl. Philipp. V p. 540 Taf. LX Fig. 13.
- Erebus odora* L. in S. Amer. **Therese von Bayern**, p. 284.

- Erizada semifervens* (Walk.) Synom. (= *Tinosoma hypererythrum* Hamps.) (Andamanen, Naga Hills, Sarawak, Borneo). **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7. p. 493.
- Eublemma nigridiscata* **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 471—472 ♂ (Coomoo, Queensland). — *demba* p. 472 ♂ (Sarawak, Borneo). — *radda* p. 472 ♂ ♀ (Sarawak, Borneo). — *wollastoni* (verw. mit der Gruppe, zu der foedosa Guen. u. uninotata Hmps. v. S. Afr. u. bulla Swinh. von Indien gehört. Die Type von uninotata ist der n. sp. sehr ähnlich, doch mehr als doppelt so gross) p. 430 ♂ (Shendi).
- Euclidia glyphica* L. cum *forma obsoleta* n. u. *forma lata* n. **Strand**, Nyt Mag. etc. 39. Bd. p. 54—55 (bezügl. d. Färb. d. Oseite d. Flgl. weichen Strand's Exemplare alle von den bekannten Zeichnungen darin ab, dass der dunkle Vrandsfleck im äuss. Mittelfeld hinten nicht zugespitzt, sondern quer abgeschnitten ist, also eine 4-eckige statt 3-eckige Figur bildet. Ausserdem ist er nicht wie in Hübn.'s Fig. (No. 347) angedeutet, von Weiss begrenzt, indem das äussere Mittelfeld dieselbe Farbe am V. u. Hrand hat. Falls dies richtig, so ist die mitteldeutsche Form als *var. meridionalis* zu bezeichnen p. 55. Bei *f. obsoleta* n. sind die beiden dunkl. quergehenden Mittelbinden auf den beiden Flgl.-Paaren ganz verwischt, oder nur die innere ist unendlich, während die äussere auffall. dunkel u. breit ist, besonders deutl. auf den Hflgl. *ab. lata* n. (Norwegen).
mi in Norwegen bei Skien u. Ulefos. p. 55.
- Eucosmocara* n. g. Hypeninarum. **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 22. — *plumifera* p. 22—23 ♂ ♀ (Sarawak, Borneo).
- Euplexia orophora* (nahe verw. m. *E. albidisca* Moore, von Bengal, aber mehr weissl.) **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8. p. 128 ♂ (Tasmania). — *albo-maculata* **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 515 Taf. LX Fig. 2.
- Euplexia lucipara* im Febr. **Barraud** (4). Titel p. 556 sub No. 1 des vorig. Berichts).
- Eutelia callichroma* **Distant**, The Entomologist, vol. 34 p. 284—285 (Lydenburg district). — Abb. soll folg. in Ins. Transv. — *multia* (verw. m. *E. deleta* Hmps.) **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8. p. 130 (Goping, Perak; Port Blair; Andaman Isles).
- Euthermisia distincta* **Schaus**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 90—91 (Castro, Parana).
- Euthisanotia timais* **Raupe**. **Swainson**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 81.
- Euthyatira superba* **Barnes**, Canad. Entom. vol. 32 p. 55 (Arizona).
- Feralia brillians* **Barnes**, t. c. p. 56 (Arizona).
- Fodina cuneigera*. **Raupe**. **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 566 Taf. I Fig. 6.
- Gadirtha pulchra*. **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 528 Taf. LX Fig. 7. — Neu: *exacta* **Semper**, t. c. p. 527 Taf. LX Fig. 6 (Philippinen). — *cristata* **Druce**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 79 ♂ ♀ (Venezuela, Merida). — *similis* p. 79 ♀ (Venezuela, Merida). — *sara* **Swinhoe**, t. c. p. 489 ♂ (Talaut).
- Glottula dominica*. Erste Stände. **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 513 Taf. P. Fig. 12—14.
- Gonodonta incurva*. Beschr. d. **Raupe**. **Swainson**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 81.

- Neu: *mexicana* **Schaus**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 90 (Jalapa, Mexico). — Bei holosericea Gn. sind die Ränder der Hflgl. hinten breit schwarz.
- Gortyna aerata* und Bemerk. zur Gatt. **Lymon**; Canad. Entom. vol. 33 p. 319 (Canada).
- Grammesia trigrammica* bei Budapest. Raupe nur aus Eiern zu erhalten. **Abaffigner** (Titel p. 547 sub No. 2 des vor. Berichts) p. 329.
- Grammodes quaesita* (ähnelt oberflächlich einer Miniaturform von *G. geometrica* Fabr.) **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 132—133 ♂♀ (Coomoo, Queensland). — *Clementi* (nahe verwandt mit *G. oculata* Snell.) p. 133 ♂ (Towranna Plains, W. Austral.).
- Gyrtona nama* (1 Stück im Mus. Brit. m. Stictoptera albodentata Moore zus. von Bhutan) **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 492 ♂ (Jaintia Hills).
- Hadena adusta*, sehr dunkles, schwarzes Stück von Davos. **Stertz**, Zeitschr. f. Entom. Breslau 1900 p. XVIII. — *alpigena et Meissonnieri*. Bemerk. hierzu. **Oberthür, Chr.**, Bull. Soc. Entom. France, 1901 No. 6 p. 139—141. — Geschichte der Beschreib. etc. — *anilis* selten, in der Schweiz am Licht gefangen. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900 27. Sept. (p. 23). — *basilinea* W. V. Schrift. d. naturf. Ges. in Danzig, N. F. 10. Bd. p. 70 Fig. 2 Schmetterl., 2 b beschädigte Weizenähre, c angefress. Weizenkorn, d angefress. Roggenkorn, Text p. 71. — *devastatrix*. Raupe. **Beutenmüller**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 90. — *gemma* Tr. in Norwegen. **Strand**, Nyt Mag. etc. 39. Bd. 1901 p. 53; bei Hildesheim selten. **Seidler**, cf. p. 740 dieses Berichts in Anm. — *genistae* at Chichester. **Anderson, Jos.**, The Entomologist vol. 34 Nov. p. 317. — *lateritia* Huf., a *Noctua* new to Britain, taken in South Wales. **Barrett, C. G.**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) May p. 115—116. — *Maillardi* var. *Kuusamoënsis* Staud. Mit 3 Fig. **Aro, J. E.**, Meddel. Soc. Fauna Flora Fenn. 27. Hft. p. 46—49. — *monoglypha* Hufn. var. *obscura* (var. *aethiops* Stdgr.) bei Zinnowitz auf Usedom. **Riesen** p. 165—166. — *ophiogramma* bei St. Goarshausen. **Wendlandt** p. 82. — *platinea* Tr. u. *furva* Hb., für den Bezirk von Wiesbaden neu. **Wendlandt** p. 84. — *secalis* L. (Hvitaxflyet) in Schweden, 1900. Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 39—40. — *basilinea* F. (Slökornflyet) p. 41—42. — *tritici* L. (Slökornflyet) (*basilinea* F. auf d. Taf.). Besch., Biologie, Schäden, Bekämpfungsmittel. **Lampa Sven**, t. c. p. 129—133 Taf. I Fig. 1a—d. Raupe am Halm, Schmetterl., Puppe. — *secalis* Lin. (Hvitaxflyet) Besch., Lebensweise etc. p. 133—136 Taf. I Fig. 2a—f. Raupe am Halm, Puppe, Schmetterl.
- Neu: *amanda* (leicht erkennl. an „the double pinkish spots beyond the stigma“) **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 494 ♂ (Perak).
- Hecatera serena* larvae not on Goat's beard. **Arkle, J.** The Entomologist, vol. 34. April, p. 126—127.
- Heliocheilus osmidus* **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 126 ♂♀ (Towranna Plains, W. Australia). — *cladotus* p. 126—127 ♀♂ (Fundort wie vorher).
- Heliophobus lolii*. Raupe. **Chrétien** (p. 566 sub No. 2 des vorig. Berichts).
- Heliothis peltigera* Schiff. Dunkle Aberr. **Bankes, E. R.**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) May p. 127. — *separata* ♀ **Semper**, Schmetterl. Philipp. II

- p. 514 Taf. LX Fig. 1. — Neu: *neuroides* Swinhoe, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 128 ♂ ♀ (Towranna Plains, W. Austral.).
armigera etc. in South Devon. Porritt, Geo. T. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) Jan. p. 11—12.
- Helotropia leucostigma* at Reading. Butler, W. E. Entom. Record, vol. 13 No. 3 p. 110.
- Hermionodes xanthipterygia* Kaye, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 126 Taf. V Fig. 6 (Trinidad: Tabaquite).
- Heteropygas filena* Schaus, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 86—87 (Castro, Parana).
Heterormista n. gen. Hypeninarum Swinhoe, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 19.
 — *modesta* p. 19—20 ♂ ♀ (Dawson, Queensland).
- Hiptelia Apfelbecki* (in Folge ganz verschiedener Flgl.-Form u. auffallend heller Färb. nicht mit ochreago zu verwechseln). Rebel, Verhdlg. zool.-bot. Ges. Wien, 51. Bd. p. 798—799 ♂ (Ivan planina, 900 m., wahrsch. durch Köderfang erbeutet.)
- Homoptera edusa. Raupe. Beutenmüller, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 192. — *terrosa* Guen. in S. Amer. Therese von Bayern, p. 283.
 Neu: *janisca* Schaus, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 40 (Rio Janeiro). — *dukinfieldia* p. 40—41 (Castro, Parana). — *divaricata* p. 41—42 (San Paulo). — *sabena* p. 42 (Jalapa, Mexico).
- Homopyralis parviquadrata* Kaye, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 131 Taf. V Fig. 13 (Trinidad: Tabaquite).
- Hoporina croceago* ab. latericolor n. aberr. Raynor, G. H. Entom. Record, vol. 13 No. 6 p. 186.
- Hyblaea puera*. Raupe u. Puppe. Semper, Schmetterl. Philipp. II p. 529 Taf. Q Fig. 15—17.
- Hydrilla palustris* beim Ködern „sugaring“ gefangen bei Carlisle. Routledge, Proc. Entom. Soc. London, 1901 p. VI. — Early appearance at Carlisle. Thwaytes, J. E., The Entomologist, vol. 34. June, p. 102. — pal. (?) ♂ bei Carlisle. t. c. p. 185.
- Hydrillodes totafusca* Kaye, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 133 Taf. V Fig. 4 (Trinidad).
- Hydroecia micacea* Esp. bei St. Goarshausen. Wendlandt p. 82. — Hydr. mic. Esp. (Potatisflyet) in Schweden. Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 50. Beschr. v. Raupe u. Puppe.
inquaesita. Biologie. Bird, Canad. Entom. vol. 33 No. 3 p. 61—64. — *limpida* desgl. p. 64—68.
- Hypaetra includens*. Raupe u. Puppe. Semper, Schmetterl. Philipp. II p. 562 Taf. s Fig. 14, 15.
- Hypena caerulealis* ♂. Semper, Schmetterl. Philipp. II p. 593 Taf. LXII Fig. 13. — *rectivittalis* ♀ p. 593 Taf. LXII Fig. 14.
lividalis Hübn. in Somaliland: Biji. The Entomologist, Suppl. p. 7.
 (proboscidalis L. ?) schlecht erhaltenes Stück von Laerdal. Strand, Nyt Mag. etc. 39. Bd. 1901 p. 55.
 Neu: *divergens* Druce, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 438 ♂ (Bolivia). — *vitula* p. 438—439 ♂ (Ecuador, Sarayacu). — *leucoptera* p. 439 ♂ (Peru). — *lyse* p. 439 ♂ (Ecuador, Chiguenda). — *melaleuca* p. 439 ♂ (Bolivia).

- Hyphenodes anticlea* **Meyrick**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 566 (New Zealand).
- Hyperdasis insularis* zu *Diethusa* gezogen. Verbreit. **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 129.
- Hypocala holcona* **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 541 Taf. LX Fig. 14. — violacea p. 541 tab. cit. Fig. 15.
- Imitator palpangularis* **Merv. Püngeler**, Deutsche Entom. Zeitschr. lep. Hft. 14. Bd. p. 187 Taf. III Fig. 12.
- Imleanga* n. g. Plusiidarum. **Lucas**, Proc. Soc. Queensland vol. XVI p. 83. — *fluviatilis* p. 83 (Queensland).
- Ingura burserae* **Dyar**, Proc. Entom. Soc. Washington vol. 4 p. 455 (Florida). — *tripartita* **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 532 Abb. d. Imago Taf. LX Fig. 8, der Raupe u. Puppe Taf. R Fig. 4 (Philippinen).
- Isochlora albivitta* var. *longivitta* n. **Püngeler**, Deutsch. Entom. Zeitschr. lep. Hft. 14. Bd. p. 187 Taf. III Fig. 10.
- Jaspidea celsia* L. Aberrationen. **Schultz, O.** nebst 6 Figg. Fig. 1 typisch. — Fig. 2 asymmetr. — Fig. 3 *ab. invittata* n. (wegen des Fehlens der Querbinde [Gleissner'sche Sammlung in Berlin]). — Fig. 4 *ab. tridentifera* n. (die Querbinde erreicht den Flügelrand nicht, endet vorher zugespitzt). — Fig. 5 *ab. eximia* n. (unter 530 gezog. Stücken nur 3. — Binde nur vorn vorhanden, von der Mitte ab fehlend). — Fig. 6 aberr. Stück mit einseitig. Binde. — Bemerk. zu aberr. Stücken aus der Sammlung von Gleissner, Bernard (Danzig) u. Daub (Karlsruhe).
- Juncaria unicolorata* **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London 1901 p. 122 Taf. V Fig. 21 (Trinidad: Tabaquite; Colombia, Sta Martha).
- Lacera alope.* **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 554 Taf. R Fig. 18.
- Laphygma exigua* **Hüb.** Aegypten: Wadi Halfa u. Shendi. **Rothschild, N.**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 429. — frugiperda = Fall army Worm. Biologie u. schädliche Gewohnheiten. **Chittenden** (1). — in South Devon. **Porritt, Geo. T.**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) Jan. p. 11—12.
- Laspeyria* siehe *Agronoma* **A. R. Grote** (1).
- Leucania albipuncta* in South Devon. **Porritt, Geo. T.**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 11—12. — conigera F. Mant. bei St. Goarshausen. **Wendlandt**, p. 82.
- extranea* at Torquay. **Crocker, M.**, The Entomologist, vol. 34 May p. 160. — at Boscombe. **Robertson. R. B.**, Entom. Record, vol. 13 No. 10 p. 372—373.
- insueta.* Nomenclatur. **Grote**, Canad. Entom. vol. 33 p. 177.
- L. album* at Sandown. **Bell, S. J.**, Entom. Record, vol. 13 No. 11 p. 332—333. — reported Tunbrige Wells. **Shepherd-Walwyn, H. W.**, Entom. Record, vol. 13 No. 12 p. 376. — Note by **J. W. Tutt**, ibid. p. 376—377.
- scirpi* **Dup.** Erscheinungszeit, Fang am Köder. **Wendlandt** p. 78. — *unipunctata* in Australien. **Tryon**.
- vitellina* **Hb. Adkin, R.**, The Entomologist, vol. 34 Jan. p. 16. — für den Bezirk von Wiesbaden neu. **Wendlandt** p. 84.

- in South Devon. **Porritt, Geo. T.**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) Jan. p. 11—12. — at Boscombe. **Robertson, R. B.**, Entom. Record. vol. 13 No. 12 p. 372—373.
- at St. Margaret's Bay. **Dannatt, W.**, t. c. No. 12 p. 373.
- Neu: lythargyrea Esp. *ab. amota* n. (Vfögl. einfarbig rothbraun ohne andere Zeichn. als den weissl. Diskoidalfleck. Hfögl. schwärzlich grau. Oevrebö im südl. Norwegen). **Strand**, Schrift. naturf. Ges. in Danzig, N. F. 10. Bd. 2/3. Hft. p. 285.
- toroneura* (gut unterscheidbare Sp.) **Meyrick**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 565 ♂ (New Zealand, Mount Cook, 2500').
- Leucanitis stolidus* F. in Budapest. **Gabrielli, G.**
- Lineopalpa fulvida*. Raupe u. Puppe. **Semper**, Schmetterl. Philipp. II, Raupe u. Puppe Taf. R Fig. 7, 8.
- Luperina acharis* **Püngeler**, Deutsch. Entom. Zeitschr. lep. Hft. 14. Bd. p. 183 Taf. II Fig. 5 (Chinesisches Turkestan).
- Lyncestia amphix* **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 551 Abb. d. Raupe Taf. R Fig. 11 (Philippinen).
- Macaldenia palumba* **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 561 Taf. 5 Fig. 3, 4.
- Mamestra albeata* Romford. **Claxton, W.**, The Entomologist, vol. 34 Dec. p. 353.
- brassicae* L. ♀ u. *myrtilli* L. ♀. Teratologische Stücke. **Hampson** (4) p. 118. — *brassicae* L. Reihe von Formen, die von der gewönl. Farbe u. Zeichn., immer blasser werdend, einen Uebergang bilden bis zu einem Typus, der fast eintönig hellgraugelb ist. Auf den Vföglern stehen nur schwache Randflecken, die beiden hellen Makeln sind bloss angedeutet u. die 3. untere dunkle Makel ist bis auf einen kleinen Basaltheil des Ringes verschwunden. **Gaul**, Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900 19. April (p. 17). — Stück mit einförmig glänzender (shiny) ledergrauer Färb. The Entomologist, vol. 34 p. 61.
- glaucæ*. Hb. Biologie. **Uffel.** — *olivacea*. Notes on ol. Morr. and its allies. With 1 pl. **Smith, John, B.**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 No. 3 p. 230—240. — 14 Sp., dar. 6 neue, siehe unten. (Verbessere *divacea* p. 695 sub No. 4 dieses Berichts in *olivacea*.)
- Persicariae* L. für finnische Fauna neu. **Lampa**, Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 158.
- tincta* Brahm u. *thalassina ab. achates* Hb. bei St. Goarshausen. **Wendlandt** p. 82.
- Neu sind: *anydra* **Püngeler**, Deutsch. Entom. Zeitschr. lep. Hft. 14. Bd. p. 182 Taf. II Fig. 4 (Chinesisches Turkestan).
- **Smith** beschreibt in den Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 folg. Formen: *lucina* p. 236. — *altua* p. 236. — *megarena* p. 236. — *davena* p. 237. *obnigra* p. 238. — *petita* p. 239 (alle 6 aus Nordamerika).
- Mania maura*. Aus Eiern von Aug. 1899 frisch geschlüpft. Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. 4. Jan. (p. 1).
- Marapana juga* **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 19 ♂♀ (Sarawak, Borneo).
- Matigramma stunia* **Schaus**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 42 (Jalapa, Mexico).
- Megalodes watersi* **Rothschild, N.**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 430—431 ♂ (Shendi).

- Megatomis cyanolepia** **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 132 Taf. V Fig. 19 (Trinidad: Verdant Vale).
- Mellinia ocellaris** in North Kent. **Newman, L. W.**, Entom. Record, vol. 13 No. 12 p. 376.
- Mesagona axalina** Hb. bei St. Goarshausen. **Wendlandt** p. 82.
- Mestleta abrupta** Wlk. Aegypten: Shendi. **Rothschild, N.**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 429. — *gayneri* p. 429—430 ♂ (Assouan) (steht silicula Swinh. von Karachi am nächst., doch diese ist viel grauer u. weniger deutl. gezeichnet.).
- Metachrostis pulla** (Swinh.). Aegypten: Shendi. **Rothschild, N.**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 430.
- Neu: *caenia*. **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7. p. 471 ♀ (Jaintia Hills; Khasia Hills, Sikkim).
- Miselia oxyacanthae**. Note on keeping Cocoons. **Henderson, J.**, Entom. Record, vol. 13 No. 12 p. 374.
- Neu: *cortex var. corticula* n. **Püngeler**, Deutsch. Entom. Zeitschr. lep. Hft. 14. Bd. p. 185 Taf. II Fig. 16.
- Mocis griscescens** **Schaus**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 85—86 ♀♂ (Jalapa, Mexico). — *valina* p. 86 (Guadalajara, Mexico).
- Moscha variabilis** (sehr variabel in d. Färb., etwas ähnl. gezeichnet wie *Prolophota trigonifera* Hmspn., Färb. ders. rein weiss). **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 23 ♂ (Queensland).
- Motina shumara** **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 496 ♂♀ (Sarawak, Borneo).
- Mycteroplus puniceago var. viridicolor** n. **Krulikowsky**, Revue Russe Entom. I p. 237.
- Neuria saponariae** für Wyre Forest neu. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 11 (36.) p. 48.
- Neuronia cespitis** F. Monstrosität mit Abb.: ♂, Fühler mit kurzen Kammzähnen. Linke Flügel. normal., grösser als die rechte. Recht. Vflgl. ein wenig schmaler als d. linke Vflgl.; recht. Hflgl. mit theilweise anormaler Beschuppung u. theilweiser Zeichn. des Vflgls. **Schultz, O.** — Bemerk. zu sonstig. Abnorm. — *saponariae*. Nährpflanzen. **Day, Geo. O.**, Entom. Record vol. 13. No. 9 p. 277.
- Niguza oculita** (steht *N. spiramioides* Walk. nahe) **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 133—134 ♀ (Towranna Plains, W. Austral.).
- Noctua castanea** Esp. *var. xanthe* n. (Färb. d. Vflgl. statt des Roth (castanea, Type) oder Grau (*var. neglecta* Hb.) reich gelb. Nach der Basis wird sie dunkler, nach den Hinter- u. Innenrändern etwas auffallend. Thorax dunkler, fast orangegelb. Franzen der Hflgl. blasser, fast lehmgelb etc.). **Woodforde, F. C.**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 116—117 (wohl eine Lokalform von North Staffordshire). — ferner Rep. North Staffordsh. Club vol. XXXV p. 64—67 nebst Taf.
- neglecta*. Rothe Form. The Entomologist, vol. 34 p. 61.
- popularis* Fabr. Nomenclatur der Gatt. **Prout**. Prioritätsfragen. Ist *popularis* congenerisch mit *cespitis* Fab., so ist der Gattungsname *Tholera* Hb., oder besser *Charaeas* Steph. Prout befürchtet aber, dass dies nicht der Fall, dann wäre ein neuer Gattungsname nöthig. — *subrosea* in England wohl eine erloschene Sp. **Oberthür.**

- Nodaria araealis* **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 249 ♂ (Nassau). — *brachypalpia* (oder *pachypalpia*?) p. 250 ♂, das ♀ möglicherw. eine besond. Sp. angehörend (Nassau).
- Nonagria arundinis* F. Zucht. **Maurer** (2).
neurica at Lincoln. **Musham, J. F.**, Entom. Record, vol. 13 No. 11 p. 332.
 — *neurica* var. *dissoluta* Treitschke. **Mathew, Gerv. F.**, The Entomologist, vol. 34 Febr. p. 56.
- Notolophus obsoletus* Klug bei Luxor häufig, bei Shendi selten. **Rothschild, N.**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 428.
- Ophideres cocalus*. Raupe. **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 579 Taf. T Fig. 11, 12. — *dividens* Abb. des ♀, Taf. LXII Fig. 1. — *fullonica*. Raupe u. Puppe. p. 277 Taf. T Fig. 9, 10.
- Odontocheilopteryx acaciae* (Klug) aus Larven auf Akazien oder Sont trees gezog.; Klug's Abb. vorzüglich. **Rothschild, N.**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 423.
- Ophisma detrahens* Wlk. in S. Amer. **Therese von Bayern** p. 284.
 Neu: *sinuata* **Schaus**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 88—89 (Aroa, Venezuela; Coatepec, Mexico). — *variata* p. 89 (Aroa, Venezuela: Castro, Parana).
- Ophiusa* Raupen und Puppen von *torrida* **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 558 Taf. s Fig. 5—7. — *simillima* p. 558 tab. cit. Fig. 8—9. — Neu: *swinhoei* p. 557 (Philippinen).
- Orrhodia ligula* var. *conspadicea* n. u. var. *glabroides* n. **Fuchs**, Stettin. Entom. Zeitschr. 62. Jhg. p. 130. — *eriophora* **Püngeler**, Deutsch. Entom. Zeitschr. lep. Hft. p. 186 Taf. III Fig. 16 (Chinesisches Turkestan). — Esp. *ab. conspadicea* Tetens i. litt. (Vfgl. rotbraun, getrübt, mit 2 schwarz. Querstreifen, der zweite am Vorderrande erweitert. — Parallelform zu der bek. *Vaccinii*-Abänd. *Spadicea*). **Fuchs**, Stettin. Ent. Zeit. 62. Jhg. p. 130—131. — *ab. glabroides* n. (lebhaft rotbraun, bläulich getönt, am Vrande lichter, mit licht. ledergelbl. Makeln u. breiter, ledergelb. Wasserbinde vor dem Saume. — Trägt den Charakter der bek. *erythrocephala*-Aberr. *glabra*) p. 131 (beide von Bornich; erstere sehr selten).
- Orsa perusta* **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London 1901 p. 129—130. Taf. V Fig. 22 (Amazons-Trinidad). — *multusta* p. 130 Taf. 5 Fig. 16 (Trinidad: Tabaquite). — *tenuata* p. 130 Taf. VI Fig. 26 (Trinidad).
- Orthosia fortis* Butl. (sofort erkennbar unter allen Neuseeländischen Arten der Caradr. durch „the peculiar black subbasal mark of the forewings, consisting of a small black triangular spot in disc near base, connected by anterior angle with a black triangular dilation of the lower end of subbasal line“ (Neuseeland) **Meyrick**, Trans. Ent. Soc. London, 1901, p. 565. — *litura* **Schneider**, Bergens Mus. Aarbog 1901 f. 167 Abb. auf Taf. Fig. 4. — *rectivitta* Moore zu Xanthoptera gezogen. **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 470. — *rufina* flying by Day. **Cockayne, E. A.**, the Entomologist, vol. 34, Nov. p. 312.
- Oruzoa astona* (verw. m. *hydrocampata* Guen., sofort unterscheidbar durch die Längsreihe von 4 schwarzen Flecken auf den Vfgln.) **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 473 ♂♀ (Sarawak, Borneo).
- Osericana* Walk. = (*Pinacia* Walk. u. *Mixtila* Swinh.). — *alvistella* Walk. = (*P. pupillalis* Snell.). (Sumatra, Celebes, Philippinen) **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 134.
- Pachetra leucophaea*. Helle u. dunkle Stücke. The Entomologist, vol. 34 p. 61.

- Pachnobia leucographa* Hb., bei St. Goarshausen. **Wendlandt**, p. 82.
- Pagyra* n. g. Noctuid. **Schaus**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 91. — *calgia* p. 91—92 (Castro, Parana).
- Palindia merta* **Schaus**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 38—39 (Rio Janeiro).
- Pandesma pagana* gehört zu Hampson's Sekt. 1 A. b.¹ u. ist m. *costalis* Moore verw.) **Swinhoe**, op. cit. vol. 7 p. 495—496 ♂.
- Parachabora triangulifera* **Hampson**, t. c. p. 248—249 ♂ (Nassau).
- Paramimetica fuscireticulata* **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 135 Taf. VI Fig. 5 (Trinidad: Tabaquite).
- Parthenos nubilis* var. *apache* n. **Poling**, Canad. Entom. vol. 33 p. 129.
- Parvapenna* n. g. Noctuid. **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 129. — *scutalis* p. 129 Taf. VI Fig. 7 (Trinidad: Tabaquite).
- Paudesina quenavadi* Guen. Aegypt.: Shendi. **Rothschild, N.**, Nov. Zool. Tring., vol. 8 p. 431.
- Penicillaria jocosatrix* Raupe u. Puppe. **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 533 Taf. R Fig. 5, 6. — *maculata* Raupe tab. cit. Fig. 7. — Neu: *vitalba* p. 534 Taf. 44 Fig. 9 (Philippinen).
- (*Peridroma saucia*) A. The variegated cutworm. Biologie, Schaden. **Doane, R. W. and D. A. Brodie**. With 5 figs. Agr. Stat. Washington. Bull. 47. (16 p.). — Abstr. Exper. Stat. Record, vol. 13 No. 5 p. 470.
- Peteroma* n. g. Noct. **Schaus**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 78. — *jarinta* p. 78 ♀♂. (Rio Janeiro, Petropolis). — *carilla* p. 78 (Aroa, Venezuela). — *conita* p. 79—80 (Arsa, Venezuela). — *dastona* p. 80—81 (Oaxaca, Mexico). — *albilinea* p. 81 (Rio Janeiro).
- Petilampa* (*Hydrilla*) *arcuosa* Hed. bei St. Goarshausen. **Wendlandt** p. 82.
- Phaetra menyanthidis* at Sugar. **Day, G. O.**, Entom. Record, vol. 13 No. 9 p. 277.
- Phialta* n. g. Noctuidarum **Schaus**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 44. — *duomita* p. 44—45 (Aroa, Venezuela).
- Phibalapteryx aquata* of the Ingwell collection. **Moberly** (Titel p. 608 sub No. 3 des vor. Berichts).
- Phlogophora meticulosa* in December. **Arkle** (p. 550 sub No. 3 des vor. Berichts). — in winter. **Miller, J.** The Entomologist, vol. 34 April p. 131. — **Carr, F. M. B.** ibid. — in November. Notes by **Waldegrave and J. Arkle**. The Entomologist vol. 32 p. 19—20.
- Phrygonis quadrilinea* **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 123 Taf. V Fig. 17 (Trinidad: Verdant Vale, Tabaquite. — Amazons, Gurupa).
- Phurys jaliscana* (verw. m. *flexa* Gn.) **Schaus**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 83 (Guadalajara, Mexico). — *monaxa* p. 84 (Orizaba, Mexico). — *escondida* p. 84 (Castro, Parana). — *bigutta* p. 84 ♀ (Jalapa, Mexico). — *navilla* p. 84 (Jalapa, Mexico). — *dentilinea* p. 85 (Orizaba, Mexico).
- Phyllalia concolor* Walk. Biolog. Notiz etc. **Barrett, C. G.** (2) p. 287—288.
- Phyllodes cerasifera* ♀. **Semper**, Schmetterl. Philipp. V p. 576 Taf. LXI Fig. 4. — Neu: *staudingeri* p. 576 Taf. LXI Fig. 5 (Philippinen).
- Physula novitata* **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London 1901, p. 135 Taf. VI Fig. 8 (Trinidad: Tabaquite).
- Placonia demera* (verw. m. *Pl. simplicior* Walk.). **Schaus**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 45. (Chiriqui). — *pascuala* p. 45—46 (Orizaba, Mexico).

- Platylena scabra*. Entwicklung, erste Stände u. s. w. **Chittenden**, Bull. U. S. Depart. Agric. Entom. vol. 30 p. 45—50 nebst Holzschnitten.
- Platysenta videns* Biologie. **Seifert**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 12 — 14.
- Platyja minutipuncta*. **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 497—498 ♂ (Singapore) ♀ (Jaintia Hills). — *flavimacula*. **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 572 Taf. IX Fig. 3 (Philippinen).
- Pleretes bellatrix* Dalm. Biolog. Notiz etc. Beschreibung der Raupen etc. **Barrett**, C. G. (2) p. 284—285.
- Plastenis retusa* L. och dess förekomst i Finland. **Sahlberg**, **John**, Meddel. Soc. Fauna Flora Fenn., 24. Hft. p. 48—49.
- Plotheia celtis*. Raupe u. Puppe. **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 529 Taf. Q. Fig. 12—14.
- Plusia agramma* Raupe u. Puppe. **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 581 Taf. T. Fig. 13, 14. — bractea in Scotland. **Carter**, **W. M. A.** The Entomologist, vol. 34 Oct. p. 297.
- chrysis*. Die beiden Formen ders. **Speiser**, Entom. Jahrb. (Krancher) 11. Jhg. p. 186—192. — Linné hat die von Schultz als ab. *disjuncta* aufgeführte Form vor sich gehabt. Demnach ist die Benennung der beiden im europ. Gebiet untermischt fliegenden Formen.
- Plusia chrysis* (L.) (typus) (= ab. *disjuncta* Schultz).
- Plusia chrysis* (L.) ab. *iuncta* Tutt.
- Unter normalen Stücken eins gezogen, mit grünl., statt goldgelb. Flecken. Zeitschr. f. Entom. Breslau. 1899 p. XIV.
- eriosoma*. Raupe u. Puppe. **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 581 Taf. T. Fig. 15—17. — Raupe. **Swainson**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 81.
- gamma*. **Gervase**, **Mathew**, **Gervase F.** The Entomologist, vol. 34. Jan. p. 22—23. — interrogationis. Neue Aberr. u. Varr. siehe unten.
- moneta* F. bei St. Goarshausen gefangen. **Wendlandt**, p. 83. — in North London. **Shaw**, **V. E.** The Entomologist, vol. 34. June, p. 182. — Larvae and pupae of . . in Kent. **Shepherd-Walwyn**, **H. W.**, t. c. July p. 208. — in Sussex. (Miss) **Gladys Tedden-Fisher**, t. c. p. 208. — at Bromley, Kent. **Laurance**, **Alfr. J.**, t. c. p. 229. — in Hampshire. **Russell**, **G. M.**, t. c. p. 229. — at Bickley, Kent. **Lawrance**, **A. J.**, t. c. Sept. p. 255. — at Reading. **Butler**, **W. E.**, t. c. p. 255. — at Bromley, Kent. **Hill**, **L. F.**, Oct. p. 297. — at Cambridge. **Kidner**, **A. R.**, t. c. Nov. p. 317. — at Eltham. **Jones**, **A. H.**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 258. — at Wandsworth. **Cowl**, **Mrs. M. E.**, Entom. Record vol. 13. No. 3 p. 111. — at larvae. **Bower**, **B. A.**, t. c. No. 7 p. 220. — Larvae and Cocoons at Bidborough. **Shepherd-Walwyn**, **H. Ad.**, t. c. No. 7 p. 222. — Plus. mon. and *Porthesia chrysothorax* at Norwood. **Swain**, **A. M.**, t. c. No. 10 p. 304. — in Middlesex. **Brown**, **H. Rowland**, t. c. No. 11 p. 333. — at Bexley and Neighborhood. **Newman**, **L. W.**, t. c. No. 12 p. 376. — siehe *Cyaniris argiolus* **H. R. Brown**.
- pulchrina* Hw, Stück v. Tysfjorden, Norwegen. **Strand**, Nyt Mag. etc. 39. Bd. 1901 f. 53. — *gamma* L. Novität für arktische Fauna: Stück

- von Löödingen p. 53. — *parilis* Hb., sehr seltene Art: Stück von Tysfjorden. Sonstige bisher bek. Fundorte p. 54. — Neue Var. siehe unten.
- *ni* (Hb.) Luxor in Aegypt. **Rothschild, N.**, Nov. Zool. Tring vol. 8 p. 431. — *limbirena* Guen. p. 431.
- Neu: *interrogationis* L. *ab. flammifera* n. (Treitschke hat im 5. Bd. seiner Schmetterl. von Europa p. 192 drei Formen zusammengefasst: *iota* L., *percontationis* Tr. u. *inscripta* Esp. — Verf. stellt den neuen Namen auf für die Form mit dem zusammengefloßenen Silberzeichen, Treitschke „flammenähnlich“) von **Hoyningen-Huene**, Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. p. 313 (im Juli mit der Stammart in Esthland gefangen). — *chrysis* L. *ab. aurea* n. (für die rein goldigen Stücke) p. 313—314 (Schwarzen in Estland). — Hw. (v. *aureum* Gn.) *var. ypsilon* n. (Die Y-Zeichn. vollkommen). **Riesen**, p. 166—167 (Usedom). — *arachnoides*. **Distant**, The Entomologist, vol. 34 p. 285 (Pretoria). — Abb. soll folgen in Ins. Transv.
- Poesula gorima*. **Schaus**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 83 (Rio Janeiro).
- Polia chi* L. bei Tysfjorden. **Strand**, Nyt Mag. etc. 39. Bd. 1901 p. 53 (auf steilen lichtgrauen Steinen, zu denen ihre Färbung gut passte). — mit dunkl. Hflgl. von Tongue, Sutherlandshire. The Entomologist, vol. 34 p. 362.
- Polydesma umbricola* (Boisd.) Aegypt.: Gebel Margel bei Shendi. **Rothschild**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 431.
- Polyplocia korbi*. **Rebel**, Annal. Hofmus. Wien. 16. Bd. p. 167 (Anatolien).
- Praxis selecta*. **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 131—132 ♂♀ (Towranna Plains, W. Austral.).
- Prodenia ornithogale* Guén. bred in Gloucestershire. **Watkins**, (p. 647 sub. No. 2 des vorig. Berichts).
- littoralis* (Boisd.) Shendi, am Licht, nach Marsden (in Alexandrina) ist sie in Unterägypten den Baumwollenernten schädlich. **Rothschild**, N. Nov. Zool. Tring vol. 8 p. 428. — Raupe u. Puppe. **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 515 Taf. Q Fig. 1—3.
- *commelinae*, *ornithogalli* u. *endiopla*. Naturgeschichte. **Chittenden**, Bull. U. S. Departm. Agric. Entom. vol. 27 p. 59—72 Taf. IV u. Holzschnitte.
- Prornaca harmonica*. **Distant**, The Entomologist, vol. 34 p. 284 (Pretoria). — Abb. soll folgen in „Insecta Transvaaliensia“.
- Psaphidia thaxterianus*. Raupe. **Dyar**, Journ. New York Entom. Soc. vol. IX p. 84.
- Pseudanthracra* *corvus*. **Schaus**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 78 (Orizaba).
- Pseudocraspedia* (?) *addescens* (Gestalt wie eine *Craspedia*). **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 17 ♂ (Coomoo, Queensland). — *longipalpis* (Vfogl. länger als sonst, Hrand fast so lang wie die Costa) p. 18 ♂ (Sarawak, Borneo).
- Pseudohadena sergia*. **Püngeler**, Deutsch. Entom. Zeitschr. lep. Hft. 14. Bd. p. 184 Taf. III Fig. 1. (Chinesisches Turkestan). — *idumaca*. **Püngeler**. t. c. p. 331 (Palästina).
- Pseudophia illunaris* für Schlesien neu (als Raupe gefunden, mit Löwenzahn und Gras gefüttert), sonst nur in Frankreich u. Spanien; wohl eingeschleppt.

- Schnabel**, Zeitschr. f. Entom. Breslau 1900 p. XVII. — Neu: *wiskotti*.
- Püngeler**, Deutsch. Entom. Zeitschr. lep. Hft. 14. Bd. p. 332 (Palästina).
- Pterocyclophora hamponi*. **Semper**, Schmetterl. Philipp. II Taf. LX Fig. 16 (Philippinen).
- Remigia frugalis* Raupe u. Puppe. **Semper**, t. c. p. 564 Taf. T Fig. 2.
- Rhenodes chacma*. **Schaus**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8. p. 91 (Rio Janeiro).
- Rhesala* Walk. Syn. der Gatt. **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 500. — *mansueta* (Walk.) p. 500 (Sarawak, Borneo; Nilgiri Hills). — *asphalta* (verw. m. *R. imparata* Walk., doch hat diese ein dunkelbraunes Band hinter d. Collum) p. 500 ♂ (Dawson, Queensland). — *iada* p. 500—1 (verw. m. *ochreipennis* Moore u. *transversa* Moore) ♂♀ (Sarawak, Borneo). — *laevis* p. 501 ♂ (Coomoo, Queensland).
- Rhododipsa miniana* Grote, ein 250 Jahre altes Stück in einem Dokument aus Mexico. **Frowhawk**, F. W., The Entomologist, vol. 34 p. 42—43.
- Rhosologia tripuncta*. **Schaus**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 98 (São Paulo, S. E. Brazil). — *brunnea* p. 98—99 (Aroa, Venezuela). — *discata* p. 99 (Rio Janeiro). — *pantina* p. 99 (Trinidad).
- Rhynchina revolutalis* Zell. Aegypten: Luxor (gewöhnl. Garteninsekt). **Rothschild**, N., Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 433.
- Risoba obstructa*. Raupe u. Puppe. **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 535 Taf. R. Fig. 8—10.
- Rivula everta* (Körper kräftiger als es sonst bei dieser Gatt. der Fall ist). **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 471 ♂ (Coomoo, Queensland).
- Safia minta* **Schaus**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 46 (Rio Janeiro, Aroa, Venezuela). — *eminens* p. 46—47 (Aroa, Venezuela). — *bruma* p. 47 (Orizaba, Mexico). — *picturata* p. 47—48 (Petropolis, Brazil).
- Sandasa micrastigma* **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 135 Taf. VI Fig. 21 (Trinidad: Tabaquite. — Panama).
- Sansy evanescens* (verw. mit *S. irrosea* Gn. = *Thermesia lara* Schaus). **Schaus**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 88 (Aroa, Venezuela). — *capsicata* p. 88 (Aroa, Venezuela).
- Sarothripa morena* (verw. mit *chlorana* Hmspn.) **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 490—491 ♀ (Sarawak, Borneo).
- Scoliopteryx libatrix* in a mine. **Marloff**, Fred, Entom. News vol. 12. March, p. 91.
- Scopelosoma satellitia* L. at Poyntzpass, Ireland. **Johnson**, W. F., p. 45. — L. *ab. trabanta* n. (Form mit weisser Nierenmakel). **von Huene**, Stettin. Entom. Zeit. 62. Jhg. p. 153 (Estland).
- Semiophora eriza* (verw. mit *S. carnipennis* Butl. von Japan). **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 494 ♀ (Kulu).
- Senta maritima*. Winter Habitat, with some Notes on the Larval Habits. **Dadd**, E. M., t. c., No. 5 p. 159—160.
- Sesamia nonagrioides* (Lef.) Shendi. Raupen im Stamme der dhurra, worin sie sich verpuppen. **Rothschild**, N., Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 428.
- Serrodos inara*. **Barrett**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 11 (36) p. 143.
- Silacida apicifascia* **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 535 Taf. LX Fig. 10 (Philippinen).

- Simplicia rectalis* Ev. liebt die Höhen. **Wendlandt** p. 78—79. — Massenhaftes Auftreten. **Cerva, Fr.** Rovart. Lapok 8. füz. Oct. p. 156—159. — Ausz. Hft. 8 p. 19—20.
- Simyra nervosa* O. Biol. Daten. Bei Zucht ein in viele Falten gelegt. Fetzen in d. Kästen zu hängen, sond. zernagen sie den Florüberzug um ihn mit zu verweben. **Abafi-Aigner** (2) p. 251.
- Sphingomorpha monteironis* Butl. **Sharpe**, The Entomologist, vol. 34 Suppl. p. 7. — *chlorea monteironis* Butl. (Assouan). **Rothschild, N.**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 431.
- Spiramia simplicior* Butl. von Wei-Hai-Wei. **Fletcher**, The Entomologist, vol. 34 p. 199—200.
- Stenopaltis* n. g. Hypeninarum **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 23. — *lithina* (Oberflächl. ein. austral. Araeoptorum canescens Walk. ähnl., diese hat jedoch kurze aufrechte Palpen) p. 23 ♂♀ (Coomoo, Queensland).
- Stictoptera cucullioides* **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 536 Taf. IX Fig. 11. — *ferrifera* p. 536 Taf. IX Fig. 12.
 Neu: *creta* p. 438 ♂ (Colombia, Don Amo). **Druce**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7.
- Stilbia anomala*. Nächtl. Fang etc. **Wendlandt** p. 78.
- Sundwarda* n. g. (steht neben *Trisuloides*, am Anfang der Quadrifidae) **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 131. — *efulgida* (ähnl. gezeichnet wie *Pr. dirigenis* Walk., doch fehlt die blassrothe Zeichn.) p. 131 ♂ (Sarawak).
- Sylectra congemmalis* Hb. in S. Amer. **Therese von Bayern** p. 284.
- Synedoidea gentilis* Stögr. Aegypten: Pyramiden von Meroe. **Rothschild, N.**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 429.
- Taeniocampa gracilis* rothe, dunkle u. helle Stücke. The Entomologist, vol. 34 p. 61. (*Taenio.*) Eiablage in einem Stück Schwamm. **Mathew, Gerv. F.** The Entomologist, vol. 34 March, p. 97—98.
- Tapinostola* var. *fluxa* Tr. nebst *ab. nigropicta* von **Huene**, Stettin. Entom. Zeit. 62. Jhg. p. 157—158 (Estland).
- Tarache optiva* Swinh. zu *Cophanta* gezogen. **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 470.
- Thalpochares pannonica*. Erste Stände. Kokon. **Aigner-Abafi** (12).
- Thargelia margiana* **Püngeler**, Deutsch. Ent. Zeitschr. lep. Hft. 14. Bd. p. 182 Taf. II Fig. 14 (Chinesisch-Turkestan).
- Thermesia pallescens* **Schaus**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 87—88 (São Paulo, S. E. Brazil).
- Thyas honesta* **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 560. Raupe. Taf. s Fig. 12, 13. — *indiscriminata* p. 560 Taf. s Fig. 10, 11.
- Tiliacea aurago* in Devonshire. **Studd**, (Titel p. 638 sub No. 2 des vor. Berichts).
- Tiruvaca* n. g. Ophiusinarum (Type: [*Thermesia*] *subcostalis* Walk.) **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 496—497 (Kiriwini, Trobriand Isl.).
- Tortricodes leucorabdota* **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 134 Taf. VI Fig. 3 (Trinidad: Tabaquite).
- Toxocampa fortis* Butl. zu *Orthosia* gestellt. **Meyrick**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 565.
limosa Tr. in 3 Gener. in Ungarn. Biol. Daten von **Abafi-Aigner** (2) p. 384.
- Trigonodes hypparia* (Cram.) Aegypt.: Shendi. **Rothschild, N.**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 431.

- Triomatodes madrina* **Schaus**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 92 (Orizaba, Mexico).
 — *padrina* p. 92—93 (Casa Branca). — *subrita* p. 93 (Casa Branca, Brazil).
- Triphaena fimbria* m. schwarz. Bande der Hflgl. am Innenrande entlang erstreckend. The Entomologist, vol. 34 p. 60; von der Insel Wight eine sehr variable Serie. p. 361. — *orbona* von Deal. Rothe Formen in variabler Intensität. t. c. p. 361.
- Tringilburra* n. g. Caradrinarum **Lucas**, Proc. Soc. Queensland, vol. XVI p. 81. — *lugens* p. 81 (Queensland).
- Urias acharia* Cram. in S. Amer. **Therese von Bayern** p. 283.
- Valeria oleagina* F. második ivadéka. **Sedlaczek, St.** Rovart. Lapok 8. köt. 9. füz. Nov. p. 189—190. — Ausz. Hft 9 p. 22.
- Vizaga* n. g. Stictopteridarum (Type: V. [Ophiusa?] cyanea Snell, zeigt viele Verwandtschaft m. Maceda Walk.) **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 491.
- Xanthoptera maculata **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 522 Abb. d. Imago. Taf. LX Fig. 3. Raupe u. Puppe. Taf. R Fig. 16, 17.
 Neu: *carcaroda* **Distant**, The Entomologist, vol. 34 p. 284 (Lydenburg district). — Abb. soll folg. in Ins. Transv. — *nicea* (sehr variabel in der Farbenschattirung, kaum 2 Stücke gleich). **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 470 ♂♀ (Port Blair, Andaman Islds.; Great Nikobars). — *rectivitta* (Moore) von den Jaintia Hills ♂ von ♀ in Färb. gleich, nur der Aussensaum der Vflgl. beim ♂ „prominently crenulate“ p. 470.
- Xanthia gilvago* in the Bromley District. **Lawrence, A. J.** The Entomologist, vol. 34. Jan. p. 22. — at Tooting **Sparke, E. G. J.** t. c. Oct. p. 296. — at Balham. **Goulton, E. C.** t. c. Dec. p. 353.
- Xylina* Revision. **Smith.** Titel p. 632 sub No. 7 u. p. 850 des vor. Ber. Ref. **Chr. Schröder**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 267.
- bethunei* G. u. R. Biologie **Lyman, Henry H.** Canad. Entom. vol. 33 No. 1 p. 1—3.
- ingrica* H. S. *ab. lucida* n. von **Hoyningen-Huene**, Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. p. 312—313. — Nach den Ausführungen des Verf.'s haben wir zu unterscheiden:
1. Die Stammart *ingrica* H.-S. in denjen. Stücken, die sein. Fig. 573 entsprechen. Ist die Mittelform.
 2. Die var. et aberr. *obscura* Carad. in den dunkelsten Exemplaren, wo die graue Grundfarbe durch tiefes Schwarzbraun fast gänzlich verdrüstert ist.
 3. Die *ab. lucida* n., die H.-S. Fig. 507 darstellt, in allen hell asch- oder weissgrauen, mit lichtem Braun gezeichneten Stücken. Im Estland die seltenste Form.
- semibruncea*. Ueberwinterung. Bemerk. dazu. **Thornhill, L. H.** Entom. Record, vol. 13 No. 8 p. 249.
- Xylis bidens* **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 124 Abb. Taf. V Fig. 1 (Trinidad: Tabaquite).
- Xylocampa areola* var. farb. Abb. The Entomologist, vol. 34 No. 461 Taf. IV Fig. 11, beschr. vol. 29 p. 160.
- Xylomiges conspicillaris* in Somersetshire. **A. Reid, Percy, C.** t. c. May p. 157. — in Somersetshire. **Tetley, Alfred, C.** Bemerk. t. c. vol. 34. May p. 160. — **Doidge Harris.** t. c. Dec. p. 332. — at Castle Moreton. **Fox, E. C. Dobrée.** Entom. Record, vol. 13 No. 9 p. 277.

- Xylophasia* (*polyodon*) *monoglypha*. Schwarze Aberr. at Ely. **Cross** (3). (Titel p. 568 sub No. 3 des vorig. Berichts).
polyodon. Aberr. **Freer**, (Titel p. 578 sub No. 1 des vorig. Berichts).
Ypsora n. g. Noctuid. **Schaus**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 77. — *santaris* p. 77 — 78 (Brazil).
Yrias zora **Schaus**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 48 (Orizaba, Mexico). — *barata* p. 48–49 (Aroa, Venezuela). — *noctar* p. 49 (Paso de San Juan, Jalapa, Mexico). — *albidiscata* p. 49–50 ♀. (Die ♂ waren zur Beschr. nicht gut genug erhalten). (Paso de San Juan, Mexico). — *corvita* p. 50 (Rinconado, Mexico). — *brunca* p. 51 (Demerara).
Yerongponga n. g. Plusiidarum **Lucas**, Proc. Soc. Queensland vol. XVI p. 82. — *aequalis* p. 83 (Queensland).
Zanclognatha moloalis (Walk.) Syn. etc., zu Bocana gestellt, gute Sp. **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 17. Untersch. d. ♂. — Neu: *bipunctata* **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 133–4 Taf. VI Fig. 1 (Trinidad, Tabaguite).
Zethes pictipennis ♂ **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 584 Abb. Taf. LXIII Fig. 4. — Neu: *halcon*. **Semper**, t. c. p. 585 Abb. Taf. LXIII Fig. 5. (Philippinen). — *multiplaga* **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 498 ♀ (Jaintia Hills).

Geometridae.

Autoren: Beutenmüller, Dietze, Dognin, Dyar, Favre, Fuchs, Hampson, von Hoyningen-Huene, Joutel, Kaye, Koningsberger & Zimmermann, Kusnezow, Lower, Lucas, Perkins, Püngeler, Rebel, N. Rothschild, W. Rothschild, Rothschild & Jordan, Schaus, Schröder¹⁾, Semper, Swinhoe u. Warren.

Biologie diverser Geometridae: Dyar (29 sq.).

Geometridae von Central-Afrika. **Sharpe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 285 — 286. — 3 Sp.: *Gonodela*: 2, *Nemoria*: 1. — von den Bahamas. **Hampson** (2) p. 251–253. 22 Spp.

Geometrinae. Auf Trinidad vertreten durch d. Gatt.: *Chlorinthia* (1), *Gelasma* (1), *Oenospila* (1 n.), *Dichorda* (1 n.), *Racheospila* (2+1 n.) u. *Heterephyra* (1 n.), **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 147–148.

Abraxas grossulariata L. nach Hofmann auf Stachelbeere, selten auf *Prunus padus*. **Prehn** fand sie auch auf Schlehe. (*Prunus spinosa* L.). Entom. Jahrb. (Krancher) 11. Jhg. p. 90. — *aequimargo* (Swinh. M. S.). **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 615 Taf. LXIV Fig. 7, 8. — *grossul.* L. *ab. flavofasciata* n. gross, spärlich schwarz gefleckt, Fleckenreihe des Saumes aus klein. Fleck. besteh., Franzen ungefleckt, reinweiss, auch von **Hoyningen-Huene**, Stettin. Entom. Zeit. 62. Jhg. p. 158–159 (Estland) auch Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. p. 319 Taf. VI Fig. 10. — *sylvata*. Dark Aberrations. **Ash, C. D.**, Entom. Record, vol. 13. No. 10. p. 297. — *ulmata* bei Brighton,

¹⁾ **Schröder, C.** Experimentelle Untersuchungen zur Vererbung von Charakteren im Larvenzustande. 1. *Tephroclystia* (*Eupithecia*) *vulgata* Hw. Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 255–258.

lokal u. nur in grossen Zeiträumen gefunden. The Entomologist, vol. 34 p. 185. — *ultima*. Variation von rauchfarbig bis fast weiss. The Entomologist, vol. 34 p. 60.

Neu: *marginata* L. 1) *ab. mediofasciata* n. Abb. Taf. VI Fig. 1, 2, *ab. staphyleata* n. Abb. Taf. VI Fig. 2. Spur einer schwarzgrauen Saumbinde, die zweite gelbgrau angefliegen, wie angeräuchert, erstere rein weiss, mit schwarzgrauen Franzen aller Flgl., von **Hoyningen-Huene**, Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. p. 314—315 (erstere aus dem Waldpark zu Lechts, Estland).

latifasciata (steht A. [Craspedosis] *sibilla* Warr. Nov. Zool. VI u. einig. der Formen von *munda* am nächst., diese gehören nicht zur Gatt. *Craspedosis*, sondern in die *Potera*-Gruppe der Gatt. *Abraxas*, keine *Fovea* b. ♂ vorh. wie bei echten *Craspedosis*). **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7. p. 463 ♀ (Fergusson Isl.).

Acanthoscelis n. g. *Ennominarum* (charakt. durch spinous clawed tarsi) **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 215. — *tarsispina* (oberflächlich *Microgonia munda* Guen. von Amerika ähnl.) p. 215 ♂ (Second Kedong, Brit. Ostafri.)

Acidalianae. Auf Trinidad vertreten durch die Gatt.: *Jorrhoea* (1), *Hyria* (1) u. *Apicia* (1) [diese wurde aber schon p. 145 sub *Boarmiinae* erwähnt]. **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 146—147.

Acidalia aversata. Bemerk. **Adkin** (3). — *circellata* in England wohl eine erloschene Sp. **Oberthür**. — (*Craspedia*) *compensata* Wlk. in S. Amer. **Therese von Bayern**, p. 286. — *contiguaria* Hb. at *Criccieth*. **Nevinson, E. B.**, The Entomologist, vol. 34. Jan. p. 23. — Hb. *ab. dirutaria* (hellste aller cont. Formen). **Fuchs** (2) p. 131—132 (bei Rüdesheim). Die System. dies. veränderl. Sp. ist folg.: Hb. (*eburnata* Wk.): Strohgelb (Heinemann's Beschr. ist ungenügend), fein braun bestäubt m. dunkl., am gelb. Vrande verdickt. Querlinien, dunkelgefleckt. Wellenlinien, schwarz. Mittelpunkten u. schwarz. Saumstrichen. — *ab. dirutaria* Fs.: Strohgelb., sehr fein u. spars. braun bestäubt, ohne Querlin., aber am Vrande d. Vflgl. mit 2 od. 3 braun. Flecken, ein. fein. schwarz. Mittelpunkte aller Flgl. u. schwarz. Saumstrichen, die Wellenlinie durch zack., braune Flecke wurzelwärts bezeichnet. — *ab. obscura* Fs. (1875): strohgelb, mit dichter Bestäubung, in welcher die Rudimente der Querlinien verschwinden, bis zur Wellenlinie verdunkelt. Diese fleckig hell, der Vrand der Vflgl. an d. Wurzel oft in ein. feinen Linie schwarz. (im Rheingau u. d. Loreleygegend die gewöhnl. Form). — *ab. fuscata* (Stett. Ent. Zeit.): graubraun, schwach gelbl. getönt, braun bestäubt, alle Zeichn. durch die dunkl. Färb. aller Flgl. nur schattenhaft. — Durch Veränderung der Grundfarbe in ein gelbl. getöntes Braungrau entstanden. In Färb. an *asellaria* erinn. (**Bornich**). — *remutata ab. exstirpata* (sehr bleich strohgelb, sehr fein u. dünn dunkler bestäubt, zeichnungslos) **Fuchs** (2) p. 133—134 (St. Goarshausen u. **Bornich**).

deversaria H.-S. var. *diffuata* H.-S. **Herkulesbad**. **Hirschke**, Verhdlgn. zool.-bot. Ges. Wien, 51. Bd. Sitz.-Ber. 4. Okt. 1901 p. 625.

italicata Mill. 1885 ist eine Aberration von *Minoa murinata* Sc. Beschr. **Rebel**, Bull. Soc. Entom. France, 1901 p. 192—193. — *virgularia* Hb. siehe *Eupithecia* im neuen Stgr.'schen Cat. No. 3183 a.

- imitaria. Ueberwinterungsstadium: **Prideaux**, Entom. Record, vol. 13 No. 5 p. 164. — at Reading, t. c. No. 3 p. 110—111.
- laevigaria Sc. bei St. Goarshausen. **Wendlandt**, p. 83.
- subsericeata Hw., rusticata S. V. u. bilinearia Fuchs Durch Zucht bezw. Fang 2. u. 3. Generation festgestellt. **Wendlandt**, p. 79.
- virgularia. Bemerk. bei der Aufzucht. Zeitschr. f. Entom. Breslau, 1899 p. XX. — 4 Generationen.
- ♂ von totem ♀ angezogen. **Ash, C. D.**, Entom. Record, vol. 13. No. 12. p. 373.
- Neu: deversaria H.-S. *ab. laureata* n. (die Wellenlinie wurzelwärts schwarzgrau angelegt, auf den Hinterflgl. oft beiderseits). **Fuchs**, Stettin. Entom. Zeit. 62. Jhg. p. 373—375 Abb. in H.-S. Syst. Bearb. Taf. 51 Fig. 314 (aus den Rheinbergen bei Bornich, von den südl. geneigten Abhängen des oberen Wisperthales um Geroldstein; St. Goarshausen). — Bemerk. zu Schaeffer's Abb. in Anm.
- accretata* (vom Aussehen einer mächtigen ochrata Scop. — Unterschiede). **Fuchs**, Entom. Zeitung. 62. Jhg. 1901 p. 119—120 ♂. — *faillata* (steht in d. Nähe von nitidata H.-S.) p. 120—121. — *inornata* Hw. (suffusata Tr.)? *ab. amoenata* p. 121—122. — *geministrigata* (bei deversaria einzureihen) p. 122—123. — *marginepunctata* Göze (immutata Bkh.) *var. madoniata* p. 123—124 (sämtlich aus Sicilien). — cf. ferner vor. Seite.
- subcincta*. **Dognin**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 179 (Colombia).
- Acrodrepaxis* n. g. Geom. (Unterschiede von Scotorythia nebst Verw.). **Perkins**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 251—252. — *nesiotes* p. 252 ♂ (Mountains of Oahu).
- Acrosemia tigrata*. **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 173. — *molpina* p. 173. — *naranja* p. 173 (alle drei von Mexico).
- Acrotomia trilva*. **Schaus**, t. c. p. 174 (Mexico).
- Acrotomodes chiriquensis*. **Schaus**, t. c. p. 244 (Chiriqui). — *hielaria*. **Schaus**, p. 174 (Südamerika). — *borumata* p. 175 (Südamerika).
- Aeschropteryx ansorgei ab. subrufa* n. u. *ab. diffusa* n. (die Sp. scheint sehr variabel zu sein) p. 215 ♂ (Rau, Nandi Country). — *atomaria* (offenbar verw. mit tabitha Warr. beschr. als eine Epigynopteryx, die aber wohl besser unter Aeschr. steht). **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8. p. 216 ♂ (Rau, Nandi Country).
- ansorgei* **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 17 18 ♂ (2 Tagereisen von Fort Beni, Congo Free State).
- Alcis ansorgei* **Warren**, t. c. p. 15—16 ♂ (15 Tagereisen von Fort Beni, Congo Free State). — *argillacea* Warr. (1900) kurze Besch. d. ♀ ebendaher p. 16. — *remotata* (sehr ähnl. A. simulatrix v. Kampala) p. 16 ♂ (Nakabimba, Toru). — *invenustaria ab. suffusaria* n. **Warren**, t. c. p. 32 (China). — *molata* (ähnelte *Serraea infixaria* Wlk.). p. 32—33 ♂ (Yokohama). — *junctilinea* (ähnelte A. (Iridopsis) *perstrigata* Warr., doch kleiner; kein schwarzes Band zwischen Mittel- u. Aussenlinie, Useite weiss, nicht strohgelb) **Warren**, t. c. p. 477 ♂ (Tucuman). — *nigrifumata* **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 199—200 ♂ (Oyama, Nippon).
- Almodes terraria* Du. (= *Ergavia calvina* Dr.) **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 275.

- Alsophila pometaria*. Biologie. **Dyar**, Psyche, vol. 9 p. 262 u. **Hinds**, Canad. Entom. vol. 33 p. 185—190 Abb. Taf. IV.
- Amaurinia peruviensis* **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 262 (Peru).
- Amblychia rotundata* **Semper**, Schmettenl. Philipp. II p. 611 Taf. LXIV Fig. 1, 2 (Philippinen).
- Amelora heteropa* **Lower**, Trans. Roy. Soc. S. Austral. vol. XXV p. 64. — *platydesma* p. 65 (beide von New S. Wales).
- Amoebotricha* n. g. Hydriomeninarum (stimmt mit Amoebe Hübn. im Bau u. Aussehen etc. — Type: *A. grataria* Leech [Anticlea]). **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 26. — *correlata* p. 26 ♂♀ (Gifu).
- Amphidasys betularia*. Zuchtbermerk. The Entomologist, vol. 34 p. 322. — Zuchtnotiz. **Oldaker**, F. A. t. c. Dec. p. 354; **Littlewood** (2) mit 3+8 Fig. — Fast schwarzes Stück von Camberwell t. c. p. 231. — gynandromorphe Stücke (6) t. c. p. 232, ferner **Harrison**, A. and **H. Main**, t. c. July, p. 203. ♀ bei Paul's Cray, Kent gefangen mit abortirt. u. kaum entwickelten Hflgl. Proc. Entom. Soc. London, 1901 p. VII auch in The Entomologist, vol. 34. — ab. doubledayaria ist nach **Thurau**, Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. 10. Mai (p. 19) bis nach Berlin noch nicht vorgedrungen, in Görlitz wurde ein Stück vor 8 Jahren gefangen. **Hill**, H. **Ainslie**, — The Buff Variety. **Pierce**, F. N., The Entomologist, vol. 34 June p. 180, ferner t. c. p. 203—204. — Bemerk. dazu The Entomologist, vol. 34 p. 324. — Buff coloured. **Mason**, Philip, B. The Entomologist, vol. 34, Aug. p. 228.
- Angerona prunaria*. Resultat 4 jähriger Inzucht. Die Färb. variirt bei den ♀ von hellgelb ohne Bänder bis sehr dunkel mit tief chocoladenbraunen Bändern, bei den ♂ von intensiv orange ohne Bänder bis tief chocoladenbraun mit Bändern; 1 ♂ zeigte die Färb. des ♀. The Entomologist, vol. 34 p. 322.
- Anisodes argenticristata* **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 452 ♂♀ (Sao Paulo, Brazil). — *aspera* (lancearia Feld. am nächst.) p. 452 ♂ (Popayan, Colombia). — *plenistigma* (verw. mit bipartita Warr., aber offenbar versch.; Htibien mit 3 Sporen wie bei Pisoraca) p. 452—453 ♀ (Chiriqui, Panama).
- aequalipunctata* **Dognin**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45. p. 176 (Ecuador). — **Schaus** beschreibt in den Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 *stollaria* p. 189 (Mexico). — *monera* p. 189 (Mexico), sowie aus Südamerika: *jonaria* p. 190. — *fantomaria* p. 190. — *tolinta* p. 190. — *excavaria* p. 190. — *castraria* u. *obliquaria* p. 191.
- Anisoperas albimacula* **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 482—3 ♀ (zw. Chimborazo . Chimbo, Ecuador).
- Anisopteryx aescularia* „in the city boundaries near Cannon Hill“ (Birmingham) The Entomologist, vol. 34 p. 232.
- Ansilis plagiata* **Federley**, H. 1900. Meddel. Soc. Fauna Flora, Fenn. 25. Hft. p. 8. — Für Finland neu.
- Anomoneura* n. g. Trichopteryginarum. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 470. — Type: *A. (Cidaria) cirrhiata* Feld. — *hymenata* Feld. ist das andere Geschlecht dazu.
- Anteia cadaverosa* **Lucas**, Proc. Soc. Queensland, vol. XVI p. 80 (Queensland).
- Anteois croceofimbriata* **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 453 ♂ (Lita, Ecuador, 3000). — *pygmaea* (ähnelte *A. demissaria* Hübn. en Miniature) p. 453 ♂ (Ciudad, Bolivar, Venezuela).

- Anthalma* n. g. *Hydriomeninarum* **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 460. — *latifasciata* p. 460—461 ♀ (Chiriqui, Panama).
- Antharmostes* (?) *albisticta* (stimmt nicht ganz m. der Type der Gatt.; Palpen lang, wohl entwickelt, Antennen voll gekämmt, Ader 3 u. 4 entspringen beide aus den unteren Winkel der Zelle). **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 205 ♂ (Rau, Nandi Country).
- Anticlea sinuata* in Devon. **Mathew, Gervase, F.** Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 45—46. — at Reading. **Butler, W. E.**, Entom. Record, vol. 13 No. 3 p. 111.
- Apicia maldama* **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 175. — *calcaria* p. 175 (beide aus Süd-America).
- Apleria* n. g. *Trichopteryginarum* (verw. mit *Aloba* Warr.) **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 469 (Type: *Apleria* (*Cidaria*) *setaria* Feld.).
- Apodroma* n. g. *Heterusinarum* (von *Heterusia* versch. 1. Areole der Vflgl. doppelt, 2. Antennen des ♂ thickened and flattened, strongly serrate below and rasped above) **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 471. — *subcoerulea* p. 471—472 ♂ (Vilcanota, Cuzco, Peru, 3000').
- Ardonis olivata* (versch. von der Type *A. chlorophilata* Wlk. in being dull olive-green instead of clear grass-green). **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 196 ♂ (Sevan mally, a tea estate 40 miles east from Quilon, on the western side of the Cardamom Hills, South India).
- Argyrotome moxicaria* **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 166 (Jalapa).
- Arhostia klagesi* (zeigt Aehnlichkeit m. *Ptychop. longipedata* Warr., aber die Lage der Medianlinie d. Vflgl. ist ganz versch.). **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 453—454 ♀ (Suapure, Venezuela). — *pulverata* p. 454 ♀ (Carobas, Peru, 2500').
- Arima* n. g. *Larentianarum* **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 149. — *isolata* p. 149 Taf. VI Fig. 25. (Trinidad).
- Aseliodes vitraria*. **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 194 (Ecuador).
- Aspilates citraria*, rein gelbe Var. ohne Linien. The Entomologist vol. 34 p. 61. — *gilvaria* ab. *sublataria* Fs. (1900) bereits abgebildet in Herr.-Sch., doch ohne Namen. **Fuchs**, Stett. Entom. Zeit. 62. Jhg. p. 378 in Ann. — *maeviararia* Guen. zu *Paracrocota* gezogen. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. p. 217. — Neu: *macaria*. **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 170. — *aluma* p. 170 (Parana).
- Asthenasylvata*. Habits of. Biologie. **Woodforde, F. C.**, t. c. No. 9 p. 276.
- Asthenotricha semidivisa*. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 11 ♂ (Kiwilogauna, Uganda).
- inutilis*. **Warren**, t. c. p. 209 ♂ (Rau, Nandi Country. — Zusammen mit einer *A. flavicoma* u. *lophopterata*).
- Auzeodes uniformis* (Untersch. von *A. chalybeata* Wlk. von Sumatra). **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 200 ♀ (Poeh Mts., Sarawak, 3500').
- Azelina fusca* (unscheinbares Thier). **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 483 ♀ (Parana, Entre Rios, Argentina).
- **Schaus** beschreibt in den Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 folg. neue Arten: *ligeria* p. 180 (Parana, Amer.). — *vecina* p. 180 (Mexico). — *lessema* p. 181 (Mexico). — *corata* p. 181 (Mexico). — *jamaicensis* p. 181 (Jamaica). — *curuma* p. 182 (Mexico).

- Bapta. **Schaus** beschreibt in den Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 folgende neue Formen: a) aus Südamerika: *innomina* p. 166 — *fidrata* p. 166. — *griseata* p. 166. — b) aus Mexico: *pomina* p. 166. — *testacea* p. 167.
- Biston *graecarius* Stgr. bei Triest (Opčina). Diese bleichere u. schwächere Form wurde von Rebel in Staud.'s Cat. 3. Aufl. als var. *Istrianus* abgetrennt. Vergl. auch Verhdlgn. zool.-bot. Ges. Wien. 51. Bd. 1901. Sitz.-Ber. vom 4. Jänner 1901 p. 8. — Neu: *hirtaria* Cl. var. *istriana* n. (grössere [38—45 mm] u. mehr weiss gefärbte Lokalform) **Galvagni**, Verhdlgn. zool.-bot. Ges. Wien, 57. Bd. Sitz.-Ber. 4. Okt. 1901. p. 625 (Monte Spaccato, Umgebung von Padrich, Basowitz u. Triest, im April). — *bloeckeri*. **Kusnezow**, Horae Soc. Entom. Ross. Tome 35 p. 42. — *hypoleucos* p. 45. Holz-schnitte dazu p. 47 (beide aus dem Amurland).
- Boarmiinae. Auf Trinidad vertreten durch die Gatt.: *Oenothalia* (1), *Chrysocestis* (1), *Phrygonis* (1), *Semiothisa* (4), *Flavinia* (1), *Syrroida* (1), *Drepanodes* (1), *Parachoreutes* (1), *Patalene* (1 n.), *Apicia* (1), *Mucronodes* (1), *Azelina* (1), *Thysanopyga* (2), *Biston* (1), *Gazena* (1 n.) u. *Melanchroia* (1). **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 143—146.
- Boarmia *angulifera* Butl. zu *repandata* L. als japanische Form derselben zu ziehen, wie Barrett dies in Lep. of the Brit. Islds. thut, ist nach den Herausgebern des Entomologist, vol. 34 p. 300 ein Irrthum. — Desgl. Bemerk. zu *B. admissaria* Guen. u. *B. gemmaria* Brahm. — *consortaria* von **Abbots Wood**. Seltenheit ders. in den Jahren 1900—1901. The Entomologist, vol. 34 p. 361. — *roboraria* Schiff. ♂ u. *cinctaria* Schiff. ♂ Teratolog. Stück. **Hampson**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 42 (37) p. 118.
- Neu: *Boarmia cinctaria* Schiff. ab. *pascuarina* n. (für die Form mit sehr hellgrauem bis weissem Mittelfelde der Vflgl. u. bisweilen auch lichterem Wurzelhälfte der Hflgl.). von **Hoyningen-Huene**, Berlin, Entom. Zeitschr. 46. Bd. p. 316 Taf. VI Fig. 4 (Estland).
- **Semper** beschreibt in Schmetterl. Philipp. II: *exelisia* p. 614 Abb. d. Imago Taf. LXIV Fig. 5, 6, Abb. der Raupe u. Puppe: Taf. U Fig. 7, 8.
- **Schaus** charakterisiert in den Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 folgende neue Formen: a) aus Südamerika: *atilla* p. 183. — *caumata* p. 183. — *amberia* p. 183. — *grosica* p. 184. — b) aus Brasilien: *gitanaria* p. 247 (Brasilien). — c) aus Mexico: *synchroma* p. 184. — *giacria* p. 248. — *sonicaria* p. 248.
- Bordeta hypocala*. **Rothschild**, Nov. Zool. Tring vol. 8 p. 220 ♂. Hinweis auf Abb. p. 405, Taf. 8 Fig. 9 ♂ (Aroa River, Brit. New Guinea).
- Brachycola paucinotata*, **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 22 ♂ (S. Celebes — ♀ v. Austral.?).
- Brachysema viridirufa*. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 483 ♀ (Chiriqui, Parana).
- Bryoptera *colita*. **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 182. — *subpallida* p. 183 (beide aus Parana).
- Bupalus pinarius* L. Schwärme in Leipzig, um elektr. Lampen u. Laternen. Entom. Jahrb. (Krancher) 11. Jhg. p. 70. — *pinarius* L. ab. ♂ *anomaliarius* n. (♂, bei denen die weisse Grundfarbe durch dunkl. Staub verdüstert, die fast schwarzbraunen Zeichn., an den Spitzen u. Säumen der Flgl. mehr oder weniger verblasst u. auch die Useite weniger bunt u. bleicher ist.) von

- Hoyningen-Huene.** Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. p. 317 Taf. VI Fig. 5 (Estland). — pin. L. *ab. unicolora* n. ♀. (Alle Flgl. ganz einfarbig, tief ockergelb. — Sowohl von der schwärztl. var. *nigricaria* Backhaus als der für ♂ aufgestellt. var. *mughusaria* Gump. leicht zu unterscheiden). **Strand**, Schrift. naturf. Ges. in Danzig, N. F. 10. Bd. 2./3. Hft. p. 285. — *pinaria* 1 Stück von Kent. Färb. rechts ♀, links ♂. The Entomologist, vol. 34 p. 61.
- Bursada percurrens* (wie *quadripartita* Wlk.; Unterschiede). **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 32 ♀ (Teoor). — *ampliflava* (Swinh. M. S.). **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 621 (Philippinen).
- Bursadopsis apicipuncta* (steht B. *basalis* Warr. von Obi nahe, aber an der Basis der Hflgl. nicht schwarz). **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 198 ♂ (Stephansort, German New Guinea).
- Byssodes bimacula*. **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 166 (Peru).
- Cabera pusaria* L. cum *ab. ablataria* Fuchs u. *ab. monotonica* n. **Strand**, Nyt Mag. etc. 39. Bd. 1901 p. 55—56 (alle Querlinien geschwunden [nicht abgeflogen], alle Flgl. mit besonders deutl. Mittelpunkt) (Norwegen).
- Cacorista rufimixta*. **Warren**, Nov. Zool. Tring vol. 8 p. 207 ♂ (Ogrugu, Amambara River, Lower Niger).
- Cacostegania* n. g. Deiliniinarum (wahrsch. die im vor. Bande der Nov. Zool. Tring als *Parasyntegia rufigrisea* von Old Calabar beschrieb. Sp. hierhergehörig). **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 211. — *australis* p. 211—212 ♂ (Longa River, Angola).
- Callidapteryx dryopterata*. Biologie. **Dyar**, Proc. Entom. Soc. Washington vol. 4 p. 414—418.
- Callopsiodes* n. g. Ennominarum (verw. m. *Chloroclydon* Warr.). **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 483—484. — *colorata* p. 484 ♂ (Chiriqui). — Wohl auch *Biston mexicanaria* Wlk. (= *Synopsisia hedemanni* Feld.) hierher. — *cautama*. **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 178 (Mexico).
- Calluga consobrina* (sehr nahe verw. m. *modesta* Warr.) **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 11—12 ♂♀ (Island of St. Thomé).
- Calospila siderata* **Dognin**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 184 (Bolivia).
- Cambogia cervina* (sofort unterscheidbar durch das Fehlen jeder gelben Färbung) **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 457 ♀ (Lita, Ecuador, 3000'). — *fasciata* p. 458 ♂ (Chiriqui, Panama). — *nigrosticta* (vielleicht eine Dunkelform von *C. undulosata*) p. 458 ♀ (Colombia). — *plumbeofusa* p. 458 ♂ (Chiriqui, Panama). — *restrictata* p. 458—459 ♂ (Chiriqui, Panama). — *transsecta* p. 459 ♂ (Chiriqui, Panama). — *undulosata* p. 459 ♀ (Colombia).
- **Schaus** beschreibt in den Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 folg. n. sp.: a. aus Südamerika: *platearia* p. 263. — *singularia* p. 263. — *hermosaria* p. 263. — *olivaria* p. 264. — *signaria* p. 265. — *reticulata* p. 265. — *deulerata* p. 265. — *noctilaria* p. 265. — *nacara* p. 263. — *haltima* p. 263. — *isabella*, *toporata* p. 264. b. aus Mexico: *coloraria* p. 262. — *costalaria* p. 262. —
- Camptogramma bilineata* var. *isolata* Kane, farb. Abb. The Entomologist vol. 34 Taf. IV Fig. 12, beschr. op. cit. vol. 31 p. 85. — bilin. var. *infusca* Kane tab. cit. Fig. 13, beschr. op. cit. vol. 31 p. 85. — *fluviata* at Rhyl, Flintshire **Perkins, A., Steele**. The Entomologist, vol. 34. Apr. p. 130—131. — *fluviata*. Zucht. **Mera** (Titel p. 607 des vor. Berichts).

- Cannagara sagiva* **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 245 (Mexico). — *bogada* p. 179 (Parana).
- Cargolia* n. g. Boarmiinarum. **Schaus**, t. c. p. 249. — *albipuncta* p. 250 (Mexico).
Carpella interrupta **Schaus**, t. c. p. 188 (Bolivia).
- Cataspilates quadrilinea* **Schaus**, t. c. p. 170 (Mexico).
- Certima eximia* **Warren**, Nov. Zool. Tring. vol. 8 p. 484 ♂ (La Merced, Chanchamayo, Peru). — *nummifera* p. 485 ♀ (Paramba, Ecuador). — *chiqua* **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 177 (Mexico).
- Charommataea marginata* **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 191 (Mexico).
- Theimatobia brumata* L. (Frostjährlin) in Schweden. Entom. Tidskr. 22 Årg. p. 52—53. — Futterpflanzen in Norwegen, wo Obstbäume nicht mehr existiren. Ausz.: Insektenböse, 18. Jhrg. p. 57. — *ab. hyemata* n. (Querlinien zu dunklen Binden zusammengefloßen) von **Hoyningen-Huene**, Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. p. 315—316 Taf. VI Fig. 3 (Estland). **L. H.** Societ. Entom. 14. Jhg. 1899 No. 8 p. 59—60.
- Chesias spartiata* Füssli. Beitrag zur Lebensweise. **Gauckler**, Entom. Jahrb. (Krancher) 11. Jhg. p. 199—200.
- Chiasmia connexa* (nahe verw. m. *C. strigata* Warr.) **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 34 ♀ (Khasia Hills).
- Chlaenias heteromorpha* **Lower**, Trans. R. Soc. S. Austral. vol. 25 p. 65 (N. S. Wales).
- Chloroclysta fulminea* **Dognin**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 310 (Südamerika).
- Chlorodrepana angustimargo*. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 7—8 ♀ (Sierra Leone).
- Chloroteras* n. g. Geometrinarum (steht der indisch. Gatt. *Chlorostrota* Warr. sehr nahe. Geäder wie die afrik. *Archichlora* Warr., aber andere Flgl.-Gestalt). — Type: *Chl.* (*Comibaena*) *devoluta* **Wlk.** **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 8.
- Chogada subvincta* (fast wie *C. subspurcata* Warr.) **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 16 ♀ (Island of St. Thomé).
- Choregia lucasseni* **Snellen**, Tijdschr. v. Entom. 44. D. p. 74 Abb. Taf. V Fig. 9 (Java).
- Cidaria**. Bemerkungen zu bekannten Arten:
anseraria für schlesische Fauna neu. Kurze Charakteristik. **Wocke**, Zeitschr. f. Entom. Breslau. 1899. p. XI. — *calligrapharia* H. S. Zucht durch G. L. Schulz. Berlin. Entom. Zeitschr. 47. Bd. Sitz.-Ber. f. 1901. 10. Okt. — Insektenböse 18. Jhg. p. 357. — *cambrica* **Curt**. bei Millstatt in Kärnten, der zahlr. Stücke, bei welch. der linke oder rechte Hflgl. bis auf ein. ganz kurzen Lappen vollständig verkümmert geblieben ist. Beobachtung dreiflügliger Exemplare auch öfters im Hochschwabgebiet. **Schima**, Verhdlgn. zool.-bot. Ges. Wien, 51. Bd. Sitz.-Ber. 4. Okt. 1901 p. 625. — *frustata* Glatzer Gebirge, für Schlesien selten; neuer Fundort. Zeitschr. f. Entom. Breslau, 1899 p. XV. — *inmanata* schöne Stücke, eins mit schwarz. M. von **Tongue**, Sutherlandshire. The Entomologist, vol. 34 p. 362. — *literata* **Schneider**, Bergens Mus. Aarborg, 1901, p. 190 Abb. Taf. Fig. 6. — (*Laurentia*) *tristata* L. var. ? *continuata* [*funerata* Hein. l. c.] (Bleicher graubraun, ohne Schwarz, mit einer auf allen Flgln. zusammenhängenden zackigen, weissen Wellenlinie u. regelmässig weiss durchschnittenen Franzen) **Fuchs**, Jahrb. nass. Ver. f. Naturk. 54. Jhg. p. 56—57 (bei Bornich selten).

Neue Varietäten: **Fuchs**, beschreibt die folg.:

trifasciata ab. *fulvo-undata* (ein Stück, welches innerhalb der Grenzen der Species *trifasciata* den Charakter der bekannt. nordischen *sordidata*-*Aberr. fusco-undata* Stdgr. nachbildet) **Fuchs**, Stettin. Entom. Zeit. 62. Jhg. p. 381 in Anm. (Klavimoen, Vefzen in Norwegen).

molluginata Hb. var. *poecilata* (bunter als die Stammform, alle Zeichnung. beiderseits schärfer). p. 135—136 (gezogen von ein. ♀ gefangen im Gerstruben bei Oberstdorf in Ober-Baiern).

quadrifasciaria L. var. *contrastaria* (Vfogl. m. auffall. Contraste der 3 Felder; das Wurzelfeld licht veilgrau, gelbl. getönt, Mittelfeld schwarz, Saumfeld nach ein. licht. Doppelstreif. eintönig rostbräunlich, ohne Wellenlinie) p. 378—379 (Krassnojarsk. — ob Lokalform oder ausschliessl. in Sibirien vorkommende Form ist fraglich).

trifasciata var. *fulvoundata* n. t. c. p. 381.

— **Strand** beschreibt a. in der Schrift. naturf. Ges. in Danzig N. F. 10. Bd. 2./3. Hft.

viridaria F. ab. *deviridata* (Grundfarbe d. Vfogl. ockergelblich, nur m. grünl. Anfluge; Zeichnungen scharf, Grösse bedeutend) p. 285. — *corylata* Thbg. *forma defracta* n. (die Mittelbinde [am Irande] abgeschnürt [vergl. Hübner Fig. 295] p. 285. — *bicolorata* Hufn. var. *maritima* n. (unter gewöhnl. Grösse; Saumbinde der beid. Flgl.-Paare sehr dunkel, schwarzgrau, selbst auf den Vfogl. nicht oder nur höchst unvollständig unterbrochen; sie stimmt ziemlich gut mit der bei Ramann gegeb. Abb. (Fig. 183) von *bicolorata*. Vfogl. ohne Irandsfleck) p. 286 (mehrere Stücke, besonders aus den Küstengegenden Norwegens).

— b. in Nyt Mag. etc. 39. Bd. 1901:

bicolorata Hufn. Stück aus Laerdal, steht einer von Hormuzaki aus d. Bukovina beschr. Lokalrasse nahe, hat jedoch deutl. Innenrandsfleck, was nur selten bei dieser der Fall ist. p. 58. — *montanata* Borkh. nebst var. *lapponica* Staud. u. *forma albicans* (Flgl. weisslich u. nur ganz schwacher Andeutung. Der gewöhnl. Zeichn., nur der Diskalpunkt ist deutlich. Sehr kleine Stücke, doch nicht unter 27 mm.). p. 59 (nördl. Norwegen). — *cambrica* Curt nebst ab. *pygmaea* Tengstr. Uebergangsstücke zwischen beiden. Das direkte Gegentheil hierzu ist ab. *latefasciata* n. (Mittelfeld sehr breit, indem die Querlinien ungefähr 2 mal so weit als gewöhnlich voneinander entfernt sind; dazu kommt, dass sie parallel verlaufen [sonst sich nähernd od. zusammenstossend: ab. *pygmaea*] Farbe d. Hflgl. u. Grösse wie an norm. Stücken) p. 59—60 (nördl. Norwegen). — *juniperata* L. nebst *forma divisa* n. (Mittelfeld in seiner inneren Hälfte zu ein. oder mehr ovalen Flecken abgeschnürt. Folgt weitere Beschr.) p. 60 (beide Formen im nördl. Norwegen häufig). *silaceata* Hb. bisher im nördl. Norwegen von Saltdalen u. Vefzen bekannt. Neue Nordgrenze: Tysfjorden p. 61. — *autumnalis* Ström (*trifasciata* Bkh.) nebst ab. *constricta* Strand (helles Mittelfeld hinten in Flecken aufgelöst) p. 61 (Lödingen u. Tysfjorden). — ab. *cinerascens* n. (Vfogl. gleichförmig dunkel aschgrau m. bräunlichem Anfluge, alle Querlinien kaum erkennbar) p. 61 (Langöen). — Abweichende Stücke von Tysfjorden u. Ulefos. — *truncata* Hufn.

mit verschied. Varr. u. Aberr. a) var. *Schneideri* von Tysfjorden p. 61—62 Besch. — b) *ab. tysfjordensis* (steht vorig. Varr. am nächst.; aber die Zwischenfelder sind rostroth u. die Mittelbinde, welche in ihrem äusseren u. vordersten Theile tief schwarz ist, hat am Vrande einen lichtgrauen ovalen Fleck u. ein. ähnl., aber kleineren am Irande) p. 62 (Tysfjorden). — c) *ab. perfuscata* Hw. p. 62 (divers. Fundorte im nördl. Norwegen). — d) var. *immanata* Hw. (Bergen u. Laerdal). — e) *forma principalis* (Tysfjorden, Lavik, Laerdal u. Aal in verschied. Farbenänderungen). — *dilutata* Bkh. in mehreren nicht klassifizierbaren Farbenänderungen u. folg. Formen: a) *ab. tectata* Fuchs (für die Fauna Norwegens neu, Grundfarbe hell graubraun m. stark. gelbl. Anfluge u. alle Zeichn. ganz undeutlich; nur am Vrande wird die Mittelbinde von einem dunkleren Fleck angedeutet) p. 63. — b) *ab. Sandbergi* Lpa. (weissgraue Grundfarbe, sehr distinkt. obschon nicht eben schwärzl. Querbinden) p. 63 auch ein Uebergangsstück dazu. — c) *ab. Schneideri* Lpa. (dunkel m. undentl. Querbinden). — d) *ab. obscurata* Staud. (dunkel m. deutl. Querbinden). — e) *ab. uniceinctata* n. (Vfgl. sehr dunkel m. einer sehr distinkten, weissgrauen Querbinde über das Mittelfeld; die and. Zeichn. undeutlich. — *ab. bicinctata* Fuchs hat 2 helle Querbinden u. graubraunes Wurzel- u. Mittelfeld) p. 63. — *subhastata* Nolck. Bemerk. hierzu nebst *ab. undulata* n. (die Wellenlinie der Vfgl. ist nicht in Punkte aufgelöst, sondern ganz zusammenhängend, kein deutl. Keilfleck, Saum d. Vfgl. mit zahlr. weissen Punkten) p. 64 (Langöen). — *ferrugata* Cl. nebst Bemerk. (*spadicearia*, *tromsoensis* Fuchs) u. *ab. corculata* Hufn. p. 64 (Lödingen, Hammerö). — *taeniata* Steph. Tysfjorden bis auf weiteres die Nordgrenze ders. p. 64.

- von **Hoyningen-Huene** charakterisiert in der Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd.: *bicolorata* Hfn. *ab. guttata* n. (ohne rostrothen Vrandfleck d. Vfgl. u. mit grossen schwarzen Tupfen in der Mitte) p. 318 (Abb. Taf. VI Fig. 7 (Lechts, Estland); *fluctuata* L. *ab. semifasciata* n. (Vfgl. weissgrau, ohne Spur von Querlinien; Wurzel dunkelbraun, dann bräunlicher Schatten etc.; Hfgl. normal gefärbt u. gezeichnet). p. 318 Taf. VI Fig. 8 (Estland). — *montanata* *ab. lapponica* Stgr. Stück mit gering. Spuren der Mittelbinde von Lechts, Estland p. 319 Taf. VI Fig. 9.

Neue Arten sind: *niveonotata* (Anordn. d. Zeichn. wie *C. perpulchra* Butl.). **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 26—27 ♂♀ (Sikkim). — *luteola*. **Dognin**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 183 (Paraguay). — *yerba*. **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 270. — *adexitata* p. 270 (beide aus S. America).

Cidariophanes guaparia. **Schaus**, t. c. p. 186 (Parana). — *duarina* p. 187 (Parana). — *incaria* p. 187 (Peru). — *psittacaria* p. 187 (Peru).

Cingilia catenaria. Biologie. **Dyar**, Psyche, vol. 9 p. 250.

Cirsodes meridaria. **Dognin**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 185 (Venezuela).

Cleora glabraria in Scotland. The Entomologist, vol. 34. Jan. p. 21. — dito **Nix**, J. t. c. Febr. p. 56.

— Neu: *bianquita*. **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 182 (Mexico).

- Cleta sericearia*. **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 241 (S. Amer.). — *albipunctaria* p. 241 (S. Amer.). — *faragita* p. 242 (Trinidad).
- Cnemodes pertumna*. **Schaus**, t. c. p. 191 (Peru). — *mizteca* p. 192. — *plerta* p. 192. — *sabuloides* p. 192. — *dudisca* p. 192. — *cantona* p. 192 (alle 5 aus Mexico).
- Coenocalpe pallidicosta* (hat oberfl. Aehnlichkeit mit *Scotosia pallidivittata* Snell. v. S. Amer.). **Warren**, Nov. Zool. Tring. vol. 8 p. 461 ♂♀ (Jamaica).
- Collix sparsata* Tr. bei St. Goarshausen. **Wendlandt**, p. 84. — Zwei Generationen. **Barrett, J. P.** The Entomologist, vol. 34, Jan. p. 21.
 Neu: *flavipuncta* (Hrand d. Hflgl. stark gezähnt, Zahn 4 u. 6 besonders deutlich). **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 13 ♂ (Bourbon Isl.).
- Comibaena magnifica* **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 252 (Brasilien).
- Cophocerotis sobria* (v. *C. jaspideata* Dogn. versch. durch dunkle Unterseite) **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 470 ♂ (Pallasco, Peru, beim Beginn der Regenzeit, 3200').
- Cortixa* n. g. Orthostixinarum. **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 200. — *aurudaria* p. 200 (Peru).
- Coremia munitata* auf Schiehallion, Rannoch. **Walker, J. J.**, p. 28.
propugnata (designata) mit sehr schmalem, braunem Querbund, 1 anderes Stück ohne Spur flammiger Färbung. The Entomologist, vol. 34 p. 60. — *quadrifasciaria* in Essex. **Mathew, Gerv. F.**, t. c. Jan. p. 22.
- Corycia temerata*. Erste Stände. **Chretien**, (Titel p. 566 sub No. 2 des vor. Berichts).
- Cosymbia jarata*. **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 193 (Rio de Janeiro).
- Craspedia consentanea* (Wlk.) Aegypt.: Luxor. **Rothschild, N.**, Nov. Zool. Tring, vol. 8. p. 433.
impunctulata (subperlaria Warr. am nächst., doch grösser, charakt. das Fehlen jeder Randzeihn.). **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 9 ♂ (Sierra Leone). — *ocellicincta* (mögl. nemorivagata Wlgrn ähnl., vielleicht das andere Geschlecht dazu) p. 9 ♂ (Athi-ya-Mawe, Br. East Afr.). — *umbratilinea* (verw. mit cinerascens Butler) p. 9—10 ♀ (Mamba, Kilimanjaro).
- ignobilis* (sehr unscheinbares Thier). **Warren**, t. c. p. 22 ♀ (Japan). — *imbella* p. 22—23 ♂ (Japan). — *parallelaria* p. 23 ♂ (West China).
- collata* (Untersch. durch „approximation of inner a. median lines towards inner margin. Aehnelt *gracilineata* Zell. von Spanien). **Warren**, t. c. p. 193 ♂ (Beyrut, Syrien). — *crurata* p. 194 ♂ (Stephansort, German New Guinea). — *habenata* (verw. mit *corrivalaria* Kretsch., doch schwacher gebaut) p. 194 ♂ (Beyrut, Syria).
- crassipuncta*. **Warren**, t. c. p. 207 ♀ (Benguela). — *fuscobrunnea* (Gestalt wie *hectata* Guen., doch kleiner u. viel dunkler). p. 207—208 ♂ (Rau, Nandi Country). — *sanguinisecta* Warr. (Nov. Zool. Tring IV). Beschr. d. ♂ p. 208 (Grahamstone, Angola). — *sincera* p. 208 ♂ (Cubal River, Angola).
- crenatilinea* (umbilicata sehr ähnlich). **Warren**, t. c. p. 454 ♀ (Huamachuco, Peru, 3200', dry interval). — *falcataria* p. 454—455 ♀ (Carobas, Peru,

- 2500'). — *olivacea* (hat eine oberflächl. Aehnlichkeit mit dunklen Stücken von *Calyptocome*) p. 455 ♀ (Suapure, Venezuela).
- **Schaus** beschreibt in den Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27: a) aus Mexico: *cugia* p. 253. — *bilinearia* p. 253. — *vittora* p. 253. — *enucloides* p. 255. — b) aus Südamerika: *arthura* p. 254. — *conotaria* p. 254. — *gosina* p. 254. — *micara* p. 255. — *anaisaria* p. 255. — *donaria* p. 255.
- **Dognin** beschreibt in Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 aus Ecuador: *nacida* p. 177. — *alargata* p. 177. — *dehortata* p. 178. — *puerca* p. 178. — *sencilla* p. 178.
- Cretheis cymatodes** Meyr. Besch. d. ♂. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 196. Antennen des ♂ genau wie bei *Psilocambogia* Hmps., *Cretheis* hat Priorität. — *sanguilineata* p. 195 ♂ ♀ (Mysol).
- Crocallis elinguaris** L. *aberr. insolitaria* n. (beiderseits mit 2, die Hflgl. m. nur einem hellgelb. Querstreif u. beiderseits hellgelben Franzen). **Fuchs**, Jahrb. nass. Ver. f. Naturk. 54. Jhg. p. 55 (♂, gezogen aus Raupe von Heidelbeere zu Oberursel im Taunus). — *tusciaria* Bkh. Biol. Daten. Abends mit Laterne zu suchen. von **Abafi-Aigner** (2) p. 384.
- Cyclomia fidoniata** (verw. m. *C. vinosa* Dognin, doch grösser u. dunkler). **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 485 ♂ (Chanchamayo, Peru).
- ocana*. **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 241 (Mexico). *magnipalpata*. **Dognin**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 184 (Ecuador).
- Cyclophora (Zonosoma) pendularis** Cl. Rapidity of Wing-Growth. **Prout**, L. B. Entom. Record, vol. 13, No. 6 p. 184.
- Cylopoa longicornis**. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 438 (Venezuela). — siehe auch unter *Bombyces*.
- Cymatophora robusta**. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 477—478 ♀ (Parana, Entre Rios, Argentina).
- Darna regia**. **Warren**, t. c. p. 438 ♀ (Paramba, Ecuador).
- Dasypteryx** n. g. Selidoseminarum (Flügelform wie *Ischnopteryx* Hübn., versch. durch Geäder u. einfachere Zeichn.). **Warren**, Nov. Zool. Tring. vol. 8 p. 481. — Type: *D. (Ischnopteryx?) polymenes* Druce.
- Dasymacaria** n. g. Ennominarum. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 18. — *ansorgei* p. 18—19 (4 Tagereisen von Beni, Congo Free State).
- Decetia pallidaria** ♂. **Semper**, Schmetterl. Philipp II p. 594 Taf. LXII Fig. 15.
- Deilinia pusaria** L. ♂. Teratologisches Stück. **Hampson**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 118.
- Neu: *dubitaria*. **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 167 (Bolivia).
- Deptalia atomaria**. **Schaus**, t. c. p. 193 (Mexico). — *obscurior* p. 193 (Mexico). — *minuta* p. 193 (Florida).
- Diastictis paulensis**. **Schaus**, t. c. p. 167 (S. Amer.).
- Dichorda uricha**. **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 147 Taf. VI Fig. 6 (Trinidad: Tabaquite).
- Dichroma alternata**. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 209—210 ♂ ♀ (Cubal River, Angola).
- Dichromatopodia oaxacana**. **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 189 (Mexico). — *zova* p. 189 (Mexico). — *naltona* p. 189 (S. Amer.). — *paulena* p. 189 (S. Amer.).

- Didymoctenia* n. gen. Ascontinarum. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 33. — Type D. (Boarmia) exsuperata Wlk.
- Digonodes malama*. **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 176 (Mexico).
- Dioptis pellucida*. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 438—439 ♀ (R. Dagua, Colombia). — *restricta* (wahrsch. wenigstens im ♀ mit areolata Wlk. wechselt, areol. ist aber kleiner u. tiefer schwarz) p. 439 ♀ (Rio Janeiro, Petropolis). — *uniguttata* (steht cheledonis Druce nahe) p. 439 ♂ (Bogota).
- Diphacelophora* nom. nov. Phacelophora Staud. nec Brandt. **Berg**, Comun. Mus. Buenos Aires vol. I p. 311.
- Drynobia melagona* Bkh. Beitrag zur Kenntnis ders. **Uffeln**, Deutsch. Entom. Zeitschr. 1. lep. Hft., 1901, p. 145—148.
- Dysphania remota* Wlk. Beschr. des ♀. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 192—193 ♀ (Mysol). Bisher nur ♂ bek.
Neu: *centralis*. **Rothschild**, Nov. Zool. Tring. vol. 8 p. 219 ♂ (Aroa River, Brit. New Guinea). — Hinweis p. 405 Taf. X Fig. 6 ♂ auf Abb.
- Dyspteris vecinaria*. **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 253 (Chiriqui). — *mexicaria* p. 253 (Orizaba).
- Ectropis plumosa* (Swinhoe M. S.). **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 613 Taf. LXIV Fig. 3. — (?) *praepicta* (vorläufig hierher; palpi porrect a. acutely rostriform, rough-haired above a. beneath). **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 33—34 ♀ (Yokohama).
- Ellopia distincta*. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 485 ♀ (Chiriqui, Panama).
- Ematurga atomaria* L. Neue Varietäten. **Fuchs**, Stett. Entom. Zeitschr. 62. Jhg. p. 134—135. — ab. ♂ *ustaria* (ockergelb, durch Häufung der braunen Strichel besonders auf den Vflgl. verdunkelt, so dass die Zeichnung nur noch schattenhaft auftritt). **Fuchs**, Stett. Entom. Zeit 62. Jhg. p. 135 (Bornich). — Die Systematik der atomaria-Formen ist bis jetzt folg.: atomaria L. ockergelb (♂) oder weisslich (♀), dichtbraun gesprenkelt, die Vflgl. m. 4, die Hflgl. mit 3 braunen Querbinden. — ab. ♂ *ustaria* Fs. Beschr. siehe oben. — var. *Krassnojarscensis* Fs. (1899) (kleiner, mit schmäl. Flgl., die vord. spitzer, licht graugelb, schmutzig, fein u. braun bestäubt, am Saume nicht verdunkelt, Vflgl. m. 4, Hflgl. m. 3 deutl. u. fein. Querstreifen) p. 135. — var. *orientaria* H.-S.: lebhaft ockergelb fein braun bestäubt, am Saume gebräunt, Vflgl. m. 2—3, Hflgl. nur m. 1 licht braun. Querstreifen, alle Flgl. mit dickem braun. Mittelfleck (♂) od. licht weissl.-gelbgrau, fein u. dünn bestäubt, Vflgl. mit 4, Hflgl. mit 2 bräunl. Querstreifen (♀). — ab. *unicolorana* Stgr.: ockergelb fein u. dünn braun bestäubt, zeichnungslos, nur die Vflgl. m. dick. braun. Mittelrand. p. 135.
- Emmelesia blandiata* u. *ericetata* at Rannock. **Walker, J. J.**, p. 28. (Titel p. 644 des vor. Berichts).
- Neu: *trappa*. **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 271 (Parana).
- Emmiltis* Hübn. Die Hübn.'schen Spp. nebst Syn. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 23.
Neu: *cosmadelpha*. **Lower**, Trans. R. Soc. N. S. Wales, vol. 25 p. 66 (N. S. Wales).
- Endropia guatama* **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 179. — *mattearia* p. 180 (Mexico).

- Ennomos alniaria**. 1. Stück von $2\frac{1}{8}$, 2. Stück $1\frac{5}{8}$ engl. Zoll Spannweite. The Entomologist, vol. 34 p. 61.
- autumnaria**, at Reading. **Barnes, Will.**, Entom. Record, vol. 13 No. 9 p. 278; desgl. **Butler, W. E.**, t. c. No. 11. p. 334; desgl. **Barnes, W.**, t. c. No. 12. p. 376. — (*Eugonia*) **fuscantaria**. Dunkle Formen. The Entomologist, vol. 34 p. 61.
- Entomopepla vorda** **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc., vol. 27 p. 174. — **grisea** p. 174 (S. Amer.).
- Eois inducta**. Biologie. **Dyar**, Psyche, vol. 9 p. 239.
- Neu: **multistrigaria** **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 459—460 ♂ (Chiriqui).
- **Schaus** beschreibt in den Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27:
- a) aus Mexico: **malvina** p. 258. — **cumana** p. 258. — **basinta** p. 258. — **cocaria** p. 258. — **ellima** p. 259.
- b) aus S.-Amerika: **complexaria** p. 257. — **cosymbiata** p. 257. — **ochraria** p. 257. — **incanata** p. 257. — **macouma** p. 258. — **fenesta** p. 258.
- c) aus Jamaica: **borunta** p. 258.
- **Dognin** beschreibt von Ecuador: **pararussearia** in Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 179.
- Ephialtias adiante** eine gute Sp. (*Josia adiante* Wlk.) ist als Syn. zu *E. vittula* Hübn. gestellt. **Warren** beschreibt in Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 439 ein ♂ von Papayan, Colombia, das mit der Walk'schen Beschr. stimmt, mit *vittula* aber sicher nicht identisch ist. — **aequivoca** (erinnert sehr an *E. consueta* Wlk., Untersch.) **Warren**, t. c. p. 440 ♀ (Suapure, Venezuela). — **constricta** (ein wenig kleiner als *E. vittula*) p. 440 ♂♀ (Bahia). — **lativitta** (Analbüschel sehr stark entwickelt. Steht *E. ena* Boisd. sehr nahe) p. 440 ♂ (Cachabi, low country). — *vittula* Hübn. ab. **carneata** n. (leicht versch. durch versch. Färb. der Striche) p. 440 ♂ (Rio Janeiro).
- Ephyra pendularis** in Surrey, zahlr. **Goss, H.** Entom. Monthly Mag. (2) vol. 11 (36) p. 208.
- punctaria** Stoll. (= *Zonosoma caecaria* Hb.) in S. Amer. **Therese von Bayern** p. 286. — **pendularia** reichgebändert. The Entomologist, vol. 34 p. 60. — Neu: **alicia**. **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 191 (Brasilien).
- Epiblema** siehe *Epiplema*.
- Epidesmia ophiosema** **Lower**, Trans. Roy. Soc. S. Austral. vol. XXV p. 64 (West-Austral.).
- Epigynopteryx abbreviata** **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 19 ♂ (St. Emina, Busiro). — **tabitha** p. 19 ♂ (Mondo, Uganda). — **commixta** **Warren**, Nov. Zool. Tring. vol. 8 p. 216 ♂ (Rau, Nandi Country).
- Epione vespertaria**. Gynandromorphes Stück. **Walker** (1).
- Epiplatymetra alidaria** **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 176 (Mexico). — **costimacula** (anscheinend zw. *E. coloradaria* Gr. u. *Rob. u. trianguliferata* Pack.). **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 486 ♀ (Platte Cañon, Colorado).
- Epiplema quadricaudata** **Semper**, Schmetterl. Philipp. II. p. 596 Abb. von Raupe u. Puppe Taf. U Fig. 3, 4. — **desistaria** Raupe u. Puppe p. 596 tab. cit. Fig. 5, 6.
- Neu: **flavistriga** **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 21—22 ♂ (Khasia Hills).

- *aphrias* (verw. mit *fugitivana* Meyr.) **Meyrick**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 578 ♂ (New Zealand: Invercargill). — Die Gatt. *Protithona* ist wohl mit *Epiblema* zu verschmelzen).
- ansorgei* **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 203—204 ♀ (Rau, Nandi Country). *negro* p. 204 ♂ (Fundort wie vorher). — *nigrodorsata* p. 204 ♀ (Kuhiriri River, Angola).
- planilinea* (Swinh.) **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 595 Taf. LXII Fig. 16 (Philippinen).
- Epirranthis alectoraria*. Raupe. **Marriner**, Trans. New Zealand Instit. vol. XXXIII p. 147 Taf. VI.
- Epirrhoe prasinaria* (offenbar verw. mit *E. smaragdinata* Wlk. v. S. Afr., dunkler gezeichnet u. ohne „strong pale edges to the lines“) **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 13 ♀ (Mamba, Kilimanjaro). — *clathrata* (Vfgl. ähnl. wie *catenaria* Moore) **Warren**, t. c. p. 27 ♂ (Khasia Hills). — *batis* **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 461—462 ♂ (Petropolis). — *disconnexa* (ausgezeichnet durch die ockergelbe Färb. u. den ganz dunklen Randsaum d. Useite) p. 462 ♀ (Chimbo). — (?) *discors* (bei Vergleich des ♂ vielleicht eine *Xanthorboë*) p. 462—463 ♀ (Chasica, Peru, 8500'). — *heteroptila* p. 463 ♂♀ (Novo Friburgo). — *pauperata* p. 463—464 ♂ (Loja, Ecuador) ♀ (Castro, Parana). — *planilineata* (ähnelt *heteroptila*) p. 464 ♂ (Petropolis). — *subpulverata* (ausgezeichn. durch die sandfarb., statt weiss. Useite) p. 464—465 ♂ (Petropolis).
- niveigutta* **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 271. — *calentaria* p. 272. — *albidaria* p. 272 (alle drei aus Brasilien).
- Episcea* n. g. Cyllopodinarum (von *Scea* versch.: Antennen des ♀ fast ebenso stark gekämmt, wie beim ♂) **Warren**, Nov. Zool. Tring vol. 8 p. 440. — *extravagans* (Untersch. von *Scea auriflamma* Hübn.) p. 441 ♀ (Rio Janeiro u. Petropolis). — *sancta* (ahmt ebenfalls *auriflamma* nach, Untersch.) p. 441 ♀ (Santa Catherina).
- Erateina monophthalma* **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 472 ♂ (Vilcanota, Cuzco, Peru, 3000').
- cachara* **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 262 (Mexico).
- Erebochlora chamaeleonis* **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 271 (Bolivia).
- Ergasia drucei* **Schaus**, t. c. p. 275 (Central-America). — *obliterata* p. 275 (Peru).
- Euangerona umbrosa* **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 486 ♂ (Vilcanota, Cuzco, Peru, 3000').
- Eubyja robustum* Butl. *ab. albicollis* n. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 199 (Yokohama).
- Euchloris* (*Phorodesma*) *pustulata* Var. **Churchill, J. Aylward**, The Entomologist, vol. 34, Aug. p. 231.
- Neu: *tetraspila* **Lower**, Trans. R. Soc. South Austral. vol. XXV p. 66 (Tasmanien).
- Eucosmia palpata* **Dognin**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 181 (Ecuador).
- Eucrostis viridipennata*. Biologie. **Dyar**, Psyche, vol. 9 p. 287.
- Neu: *semitaria* **Püngeler**, Deutsch. Entom. Zeitschr. lep. Hft. 14. Bd. p. 333 (Palästina). — *innotata* **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 205 ♂ (Benguela).

- Eudule mendica*. Biologie. **Dyar**, Psyche, vol. 9 p. 189. — Neu: *aperta* (von bicentraria H. S. versch. durch das Fehlen des Schwarz am Innenrande der Vflgl.) **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 473 ♂ (S.-Amer.).
- Eugonia autumnaria* at Dovercourt. **Mathew, F. Gervase**. The Entomologist vol. 34. Nov. p. 317. — *quercinaria* mit dunkelbraun. Flecken u. breiteren Binden, zwischen denen sich braune Adern befinden; die Hflgl. sind zieml. dunkelbraun. **Schnabel**, Zeitschr. f. Entom. Breslau, 1900 p. XV. — siehe ferner unter *Ennomos*.
- Eulype nondescripta* (sehr merkwürdiges Insekt: Bau u. Geäder von Eulype, in der Zeichnung die Gattung *Dioptis* nachahmend). **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 465 ♂ (Petropolis).
- Eupisteria heparata* in Surrey, zahlr. **Goss, H.**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 11 (36) p. 208. Ref. Allg. Zeitschr. 6. Bd. p. 63.
- Eupithecia*. Beiträge zur Kenntniss der Eupitheciien. **Dietze**. — Ergebnisse eines mehrwöchentl. Studiums bei dem wegen seiner Seltenheiten berühmten Digne. Im besondern wurde gefunden *Röderaria* Stdfs., *Schiefereri* Boh. und *gueneata* Mill., letztere beide auch als Raupe. Die gegebenen Bemerk. betreffen ausser anderen Spp.: *distinctaria* H.-S. var. *sextiata* Mill., *Mayeri* Mann var., *abbreviata* Steph., *oxycedrata* Ramb., *venosata* var. *caeruleata* Favre, *denotata* Hb., spec. nov.?, *breviculata* Donzel, *alliaria* Stgr., *pulchellata* Steph. var. *pygrenaeeata* Mab., *succenturiata* var. *ligusticata*. Die gut gelungene Farbentafel stellt 12 Raupen-Sp. in Rücken- u. Seitenansicht dar. — Vorläufige interessante Bemerk. über experimentelle Untersuchungen (Fütterungsversuche) über die Gruppe *innotata* — *tamarisciata* — *fraxinata*. — Vergl. hierzu das Ref. von Chr. Schröder, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 261.
- Neue Studie über die Eupitheciien von Valois. **Favre, E.** Mittheil. Schweiz. Entom. Ges. 10. Bd. 8. Hft. p. 360—364. — *conterminata* Z. Die Raupe. **Draudt, M.** Deutsch. Entom. Zeitschr. 1900. 2. lepid. Hft. (Iris, Bd. 13 2. Hft.) p. 328—331.
- abietaria* Goeze der Tannapfelspanner [(= *togata* Hb. Snell. Heinem. Boisid. Guen Westw. Harpe =? *strobilata* Bkh. Treitschk. = *strobilata* Dietze u. Eup. *strobilata* Hb. (Heinem.)]. Nach Dietze Iris 1901 1. Hft. haben wir darunter, wie schon Speyer 1883 erkannt hat, zwei verschiedene Thiere vor uns. *E. strobilata* lebt in den Chermes-Gallen der Fichte, *E. abietaria* entwickelt sich in den Fichtenzapfen. **Dietze**.
- Eupithecia cossurata* Mill. 1875. ist eine sehr dunkle Aberr. von *Acidalia virgularia* Hb. Im neuen Stgr.'schen Cat. = No. 2983 a. **Rebel**, Bull. Soc. Entom. France, 1901, p. 193. — *Gueneata* Mill. Mittheilungen über diese für die Wiener Gegend neue Spannerart. **Metzner**, Verhdlgn. zool.-bot. Ges. Wien 51. Bd. 1901 Sitz.-Ber. v. 3. Mai 1901. p. 309—310. — Nach Viertel entwickelt sich der Falter erst im 2. od. 3 Jahre aus d. Puppe. Raupe lebt an *Pimpinella Saxifraga*. — *nanata*. Dunkle Aberr. zu Shirley, Surrey. **Bankes, Gust. R.** Ent. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 99—100. — *rectangulata* L. für die arktische Fauna neu. **Strand**, Nyt Mag. etc. 39. Bd. 1901 p. 65. — *satyrata* Hb. die arktischen Stücke durchgehends heller gefärbt als südliche Stücke, viele ders. gehören wahrsch. zur var. *callunaria* Doublt.

- strobilata siehe abietaria. — subfulvata. Notes on the larva. **Thornewill, Chas. F.** The Entomologist, vol. 34. Dec. p. 349—350.
- venosata from Oban. **Sheldon** (sub p. 630 No. 6 des vor. Berichts).
- virgaureata stark verdunkelte Var. aus dem County of Glamorgan. The Entomologist, vol. 34 p. 183. — auch: Proc. Entom. Soc. London. 1901, p. IX.
- Neue Varitäten: denotata Hb. (campanularia H. S.) var. ? *ferreata* = atraria Püngeler i. litt. von H. S. fig. 154 et 155 (die Flgl. ein wenig schmaler, eisengrau, die vorderen mit kräftigem, schwarzen Mittelstrich, etwas deutlicherer Zeichn. besser begrenzt. Mittelfelde u. ob. kräftiger, unten garnicht beschatteter Wellenlinie) **Fuchs**, Jahrb. nass. Ver. f. Naturk. 54. Jhg. p. 57—58 (von Trafoi auf Campanulata, erzogen).
- gratiosata H.-H. var. *lavata* (wenig grösser, weiss m. verwaschener Zeichn. d. Vflgl. im Mittelfelde u. am Saum, die Hinterflgl. nur am Hinterwinkel wenig u. verwaschen gezeichnet) **Fuchs**, Stettin. Entom. Zeitung 62. Jhg. p. 124—125 (Sicilien — ob. sicilian. Lokalform). — Raupe wohl auf Nadelholzpflanzen des Mittelmeergebiets).
- Neue Arten: *Tedaldicata* (unserer pusillata verwandt, mit tantillaria B. wohl nicht zusammenfallend) **Fuchs**, t. c. p. 125—126 (Sicilien).
- satyrata Hb. ab. *Strandi* (ausgezeichnete, dem hohen Norden angehörige Form) **Fuchs**, Stettin. Entom. Zeit. 62. Jhg. p. 379—381 ♀ (Klavimoen, Vefsen in Norwegen).
- ? *penicillata* **Dognin**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 180 (Ecuador).
- Eurytaphria *lilacina* (stimmt mit d. Gatt. E., abgesehen von der Kämmung der Antennen; diese statt weak a. distant, are quite as strongly built as in the ♀ of Omiza, Hypochrosis and allies; in Vflgl. anastom. v. 11 mit 12. u. v. 10 ist frei) **Warren**, Nov. Zool. Tring., vol. 8 p. 36 ♀ (Kuching, Borneo).
- Eurythecodes *maculosata* **Warren**, Nov. Zool. Tring., vol. 8 p. 216—217 ♂ (Kassai u. Loange Rivers, Congo).
- Eusarca *guadaria* **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 243 (Mexico).
- Eusenea *parva* **Schaus**, t. c. p. 244 (Brasilien).
- Fidonia atomaria L. asymmetr. ♀ Var. Proc. Entom. Soc. London, 1901 p. III. auch The Entomologist, vol. 34 p. 132. — Ungewöhnlich grosses u. blasses Männchen von Oxshott. The Entomologist, vol. 34 p. 361. — piniaria. Zur Biologie des Kiefernspanners. **Eckstein, Karl.** Allg. Forst- u. Jagdz. 1901, Jan. (4 p.) — Ausz. v. **L. Reh**, Allgem. Zeitschr. f. Entom. 7. Bd. No. 1 p. 27—28.
- Neu: *ansorgei* **Warren**, Nov. Zool. Tring., vol. 8 p. 16—17 ♀ (Wemi River, Toru).
- *tristata* **Warren**, t. c. p. 479 ♀ (Pallasco, Peru, Beginn der Regenzeit).
- Gazena *hypomelas* **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 146 Taf. VI Fig. 18 (Trinidad: Verdant Vale).
- Gathynia *auratiplaga* **Warren**, Nov. Zool. Tring., vol. 8 p. 7 ♂ (Fort Johnston, Nyassaland).
- Gelasma *nordicaria* **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 253 (Mexico).
- Glaucopteryx *discolorata* **Warren**, Nov. Zool. Tring., vol. 8 p. 13—14 ♂♀ (Cape Town).

- Gnophos dumetata** var. *scopulata* Fuchs. Ob mit Recht im Stgr'schen Cat. als Syn. zu v. *daubearia* B gestellt? Fangnotizen. **Wendlandt**, p. 80. — *pullata* var. *nubilata* Fuchs bei St. Goarshausen sehr selten. **Wendlandt**, p. 84. *serotinaria* u. *dilucidaria*. Charakt. **Kroulikowsky**, Societ. entom. vol. XV p. 163. Neue Varitäten: *caelebaria* H.-S. var. *selinaria* (♂) (kleiner, sehr licht bläulich aschgrau etc.) **Fuchs**, Stettin. Entom. Zeit. 62. Jhg. p. 375—377 (vom Nebelhorn, wohl Lokalform des oberbaierischen Hochgebirges). — var. *jugicolaria* p. 377 in Anm. (Stilfser Joch).
- Neue Arten: *Pentheri* (Bau der ♂-Fühler u. Beine wie bei Gn. *ambiguata* Dup., diese ist aber viel grösser u. dunkler etc.) **Rebel**, Verh. zool.-bot. Gesellsch. Wien 51. Bd. p. 801—802 ♂♀ (Hercegovina, Plasa, ca. 1300 m, Sarajevo, Trebević).
- lineolaria* **Püngeler**, Deutsch. Entom. Zeitschr. lep. Hft. 14. Bd. p. 188 Taf. III Fig. 3 (Centralasien). — *evanidaria* p. 188 Taf. III Fig. 4, 5. — *tholeraria* p. 189 Abb. tab. cit. Fig. 14 (Chinesisches Turkestan). — *fractifasciada* p. 189 tab. cit. Fig. 13 (Centralasien). — *croesaria* **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 185 (Chiriqui).
- Gonodela mundipennis** (*crassilembaria* Mab. wohl ähnlich, doch wird nur eine Grösse von 27 mm angegeben; bei der n. sp. 40 mm). **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 213 (Calwella River, Angola).
- Graphidipus abraxaria** (schönes, gut charakt. Insekt) **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 d. 470—471 ♀ (Chiriqui, Panama).
- Gubaria biflava** (von allen and. Sp. versch. durch den orange-gelb. Costalfleck d. Useite etc.) **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 35 ♂ (Great Banda).
- Gymnoscelis picta** **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 30 (Khasia Hills). — *crassata* (möglicherw. ein Iramba) **Warren**, t. c. p. 208—209 ♀ (Island of St. Thomé). — *tenera* p. 209 ♂♀ (Ogrugu, Amambara River, Lower Niger).
- Haemalea simplex** (gehört zur Gruppe *ustaria* Guen., *micaceata* Wlk. u. *botydaria* Wlk., doch deutlich von allen versch.) **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 455—456 ♀ (Minas Geraes).
- **Schaus** beschreibt in den Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 folg. neue Arten: a. von Südamerika: *narogena* p. 256. — *rotundata* p. 256. — *astota* p. 256. — *caporia* p. 256. — *damaria* t. c. p. 194. — *vizaria* p. 194. — b. aus Jamaica: *virgota* p. 256.
- Haematopsis grataria**. Biologie. **Dyar**, Psyche, vol. 9 p. 155.
- Halia brunneata** Thbg. *ab. uncinata* n. (auf d. Vflgl. findet sich nur die mittlere [nächst äussere] der gewöhnl. 4 Querlinien; dieselbe ist aber scharf u. deutlich u. setzt sich auf d. Hflgl. ebenso deutlich fort. Sonst alle Flgl. ganz zeichnungslos). **Strand**, Schrift. naturf. Ges. in Danzig. N. F. 10. Bd. 2./3. Hft. p. 285. — *loricaria* Ev. *ab. cinerosaria* n. (Für die Stücke, die statt des hinteren Querstreifs u. sein. Fortsatz. auf den Hflgl., allenfalls nur noch einzelne Punkte auf den Rippen u. ausser dem schwachen Mittelmonde der Vflgl. nur noch ein braunes Feldchen in Zelle 3 ders. aufzuweisen haben, also nahezu einfarbig u. zeichnungslos sind. — Steht in demselb. Verhältnis zu *loricaria* wie die *ab. unicoloria* Stgr. zu deren Stammart *atomaria* L.). **von Hoyningen-Huene**, Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. p. 317—318 Taf. VI Fig. 6 (Estland).

- Hammaptera semiobliterata Warr. (Nov. Zool. Tring vol. 2) gehört zu Rhopalista.
- Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 468. — *trochilarioides*. **Dognin**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 182 (Ecuador, Brasilien).
- congener* (äusserst ähnlich strenuaria Walk., ausgezeichnet durch das völlige Fehlen der grünen Färb. auf der Oberseite etc.) **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 465—466 ♂♀ (Ibarra, Ecuador). — *constricta* (äusserst ähnl. einigen Formen von Epirrhoë emberizata Guen.) p. 466 ♂ (La Soledad, Entre Rios, Argentina). — *subguttaria ab. rufibasatis* n. p. 467 ♂♀ (Colombia).
- **Schaus** beschreibt in den Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27: a) aus Mexico: *trujillaria* p. 268. — *subrosea* p. 268. b) von Trinidad: *trinitaria* p. 268. c) aus Südamerika: *crocaria* p. 269. — *palisma* p. 269. — *cocama* p. 269. — *genurma* p. 270.
- Heliomata cycladata. Biologie. **Dyar**, Psyche, vol. 9 p. 177.
- Hemerophila abruptaria Puppenstadium während des Winters. **Colthrup**, C. W., Entom. Record vol. 13 No. 5 p. 165. — *nycthemeraria* Hb. für die Umgebung von Paris neu. **Dumont**, C., Bull. Soc. Entom. France, 1901 p. 362—363. — Angaben von Dupouchel, Millière u. Favre.
- Hempigon *fuscicosta*. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 194—195 ♂ (Teoor Isl., Watoebela Isl.).
- Hesperomiza *dusa*. **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 175 (Brasilien).
- Heterophya *neximargo* (nahe verw. m. H. lunifera Warr. von Colombia u. H. commaculata Warr. von Rio Demerara). **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 457 ♂ (Perené River, Peru). — *subrubra*. **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 148 Taf. VI Fig. 19 (Trinidad: Tabaquite).
- Heterocrita* n. g. Geometrinarum (Bau der Antennen trennt sie von Racheospila u. das Fehlen der Abdominal-crests von Lophocrita Warr.). **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 445. — Type: H. (Racheospila) araria Guen.
- Heterolocha *conspersata*. **Dognin**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 44 p. 232 ♀ (Parapanema, province de Saint-Paul, Brésil). — *tomisa*. **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 177 (Mexico). — *apricoides* p. 177 (Bolivia).
- Heterostegane *pleninotata*. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 15 ♀ (Sierra Leone). — *gammata*. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 197 ♀ (Poeh Mts., Sarawak, 3500').
- Heteromiza obliquaria Leech, ♂. Teratologisches Stück. **Hampson**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 118.
- Heterusia *funesta*. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 472—473 ♂ (Vilcanota, Cuzco, Peru, 3000'). — *tumiáicosta* (sofort unterscheidbar durch die verbreiterte Costalschulter u. die gelbl. Costalflecken) p. 473 ♂ (Bolivia). — *brumalis*. **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 261 (S. America). — *úcothysta* p. 261 (beide von S. America). — *jamaicensis* p. 262 (Jamaica).
- aurantiaria Hb. Biol. Daten. 1892 an mehreren Orten des Komitats Krassó-Szürény m. Bombyx neustria in grosser Menge an Eichen, ohne jedoch erhebl. zu schaden. v. **Abaff-Aigner** (2) p. 384. — Ankeraria Stgr. Auffinden; stellt sich tot, läuft schnell fort. p. 384.
- Hibernia rubicapraria an Schlehen. Nachtfang. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 108. — *pennaria* L. at Poyntzpass, Ireland. **Johnson**, W. P., Entom. Monthly

Mag. (2) vol. 12 (37) p. 45. — Für Finnland neu. **Reuter-Enzio**, Meddel. Soc. Fauna Flora Fenn., 25. Hft. p. 3—6.

- Hiptelia apfelbecki*. **Rebel**, Verhdlgn. zool.-bot. Ges. Wien, 51. Bd. p. 798 (Bosnien).
- Homochlodes parita*. **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 169. — *orina* p. 169. — *sartina* p. 170 (alle 3 aus Mexico).
- Hybernia defoliaria* sehr dunkles Stück. The Entomologist, vol. 34 p. 61. — *marginaria* Zwischenformen u. var. *fuscata*. t. c. p. 61.
leucophaearia am 11. Febr. 1900 in Oswitz, Schlesien gefangen. Zeitschr. f. Entom. Breslau, 1900 p. XIII. — *pilosaria* in December. **Baker, Charles**, The Entomologist, vol. 34 March p. 99. — *ruficapraria*. Lebenszähigkeit. **Howe**, t. c. April, p. 131. — im Eise eingebettet. **Howe, T. L.**, Entom. Record, vol. 13 No. 4 p. 137.
- Hydata felderi*. **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 250. — *povera* p. 250 (beide aus Mexico). — *sordida* p. 250 (Brasilien).
- Hydriomene musga*. **Schaus**, t. c. p. 271. — *caralpa* p. 271 (beide aus Mexico).
- Hyochoera syringaria* L. ♀. Teratologisches Stück. **Hampson**, Entom. Monthly Mag. (2.) vol. 12 (37) p. 118.
- Hymenomima subsordida*. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 478 ♂ (Parana, Entre Rios, Argentina).
- Hypochlora papayanaria*. **Dognin**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 310 (Columbien).
- Hypedyle cascaria*. **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 275 (Mexico). — *paularia* p. 275. — *albida* p. 275 (beide aus S. Amer.).
- Hypochroma purpurissata*. **Lucas**, Proc. Soc. Queensland, vol. XVI p. 77. — *munita* p. 78. — *assidens* p. 79 (alle drei aus Queensland).
- Hypochrosis lycoraria* Guen. Besch. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 200—201. — Neu: *hiresia*. **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7.) vol. 8 p. 125—126 ♂ (Flores).
- Hyposidra ruptifascia*. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 201 ♀ (North Borneo).
- Hyria*. **Schaus** beschreibt in den Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 folg. neue Arten: *lilliana* p. 260 (Mexico). — *gemma* p. 260 (Mexico). — *maudina* p. 260 (Trinidad). — *dividaria* p. 260. — *ellisca* p. 261. — *afroda* p. 261 (die letzten drei aus S. Amer.). — *violescens* p. 261. — *radaria* p. 261 (beide aus Mexico).
- Ira olivata*. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 486—487 ♂♀ (Paramba, Ecuador).
- Ischnopteryx aurudaria*. **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 249 (Brasilien).
- Isochromodes dispar* zu *Paracomistis* gezogen. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 489.
- Janarda flamingo*. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8. p. 208 ♂♀ (Luacinga River, Angola).
- Josia banana*. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 441 ♂♀ (woher?). — *fustula* p. 441 ♀ (ausgez. durch den gekrümmten Strich d. Hflgl., Chimbo, 1000'). — *interrupta* (steht *frigida* Druce am nächsten) p. 441—442 ♂♀ (Cali, Co-

- lombia) — *striata* Druce *ab. attenuata* n. p. 442 ♀ (woher?) — *ab. ampli-flava* n. p. 442 ♀ (Pichinde, Colombia).
- Kuldscha *cometifera*. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 27 ♂ (vom Amurgebiet).
- Larentianae. **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 148—149. Auf Trinidad vertreten durch *Psaliodes* (1 n.) u. *Arima* n. g. (1 n.).
- Larentia cheimatobiata (Guen.) Bemerk. zum Geäder etc. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 27—28. — *corydalaria* Graeb.; Stgr. u. Reb. Cat. Nr. 3453. Besch. etc., für Europa neu. **Rebel**, Verhdlgn. zool.-bot. Ges. Wien, 51. Bd. p. 803—4 (auf dem Wege von Jaice nach Banjaluka unweit Bocac; oberhalb Vlasenica in Ostbosnien, bei Jaraca woda, Velebit. Kurze Charakt. — *flavicinctata*. Bemerk. über Vorkommen etc. **Kane, W. F. de Vismes**, The Entomologist, vol. 34 p. 85.
- (*Cidaria*) *molluginata* Hb. u. *testacea* Don. Beide wohl ausserordentlich selten. **Wendlandt**, p. 83.
- multistrigaria*. Melanismus bei ders. **Prout**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 149.
- picata* durch Zucht 2. Generation festgestellt. **Wendlandt**, p. 79. — *viridaria* (double-brooded) 2. Gener. **Butler, W. E.**, Entom. Record, vol. 13 No. 3 p. 110.
- Neue Varietät: *aqueata* Hb. *var. hercegovinensis* n. (anfangs für die fast verschollene *senectaria* H.-S. gehalten). **Rebel**, Verhdlgn. zool.-bot. Ges. Wien, 51. Bd. p. 799—800 ♂♀ (Prenjgebirge, ca. 1300 m; Süd-bosnien auf der Bjelasnica, ca. 1800 m; auf der Plasa). — *senectaria* H.-S. hat keine kammzähnigen, sondern blos kurz gewimperte Fühler des ♂, hellbräunlich graue Färb. d. Vflgl., ein anders gestaltetes schmäleres Mittelfeld ders. etc. p. 800.
- Neue Arten: *omphacina*. **Dognin**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 179. — *cruziata* p. 180 (Brasilien).
- Leptoctenopsis murina*. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 437—438 ♂ (Suapure, Venezuela).
- Leucobursada* n. g. **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 619. — *latimargo* p. 619 Taf. LXIV Fig. 10, 11. — *biplagiata* p. 620 tab. cit. Fig. 12 (beide von den Philippinen). — Hierher gehörig auch *Bursada rotundimacula* Warren Abb. Taf. LXIV Fig. 13—14.
- Leucomicra fuscaria*. **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 178 (Parana). *Leucula nephodia* Hüb. Abb. der Raupe Fig. 6, der Puppe Fig. 6a in **Peters**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. Hft. 10 Taf. X.
- petrovna*. **Schaus**, t. c. p. 178 (Brasilien). — *rasa*. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 475 ♂ (Petropolis).
- Leuculopsis* n. g. *Nephodiinarum* (oberfl. Aehnlichkeit mit *Metrocampa*). **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 475. — *colorata* (*Myrteta coanaria* Schaus ist nahe verw. mit d. n. sp., hat aber eine deutl. Innenlinie, die hier fehlt) p. 476 ♂ (Chiriqui, Panama).
- Ligdia adustata*. **Prout** (Titel l. c. sub No. 2 des vor. Berichts).
- Lignyopectera fumidaria* Hb. Weiterer Beitrag zur Zucht. **Nauffock, Alb.**, 1900. 10. Jahresber. Wien. Entom. Verein. 1899 p. 73—75.

- Neu: *thaumastaria* (gross u. lebhaft gefärbt u. wesentl. Bau der bisher für monotyp gehaltenen Gatt. Lign. Allerdings bestehen einige Differenzen, die aber nicht zur Aufstellung eines n. g. berechtigen. Die Fühler (♂) des n. Sp. sind näml. mit kürz. Zähnen versehen als bei der letzt., diese wie die Stirn fast glatt beschuppt; nur die Brust zeigt einzelne längere Haare, die an die zottige Bekleidung von fumidaria erinnern. Der schlanke Körper, Bau der Beine, Geäder wie bei fumidaria). **Rebel**, Verhdlgn. zool.-bot. Ges. Wien, 51. Bd. p. 800–801 ♂ (in einem höheren Gebirgszuge südl. von Zepce in Nordbosnien, Okt.).
- Lipomelia nubilata*. **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 194 (Peru).
- Lobopola transoma*. **Schaus**, t. c. p. 246 (Mexico).
- Lygris cicatriculata* Berg = *Pelurga straminea* Warr. (Nov. Zool. Tring, vol. 4).
Warren, Nov. Zool. Tring, vol. 8. p. 467. — *pyropata*. **Linde, A.**, Societ. Entom. 16. Jhg. No. 15 p. 115–116.
- Lygris reticulata* (S. V.). Das seltene Thier hat wohl auch in manchen Jahren 2 Generationen. **Wendlandt**, p. 79. — in Finnland. **Poppius, B.** 1900. Meddel. Soc. Fauna Flora Fenn. 25. Hft. p. 8.
- Neu: *populata* L. nebst ab. *musauraria* Frr. u. ab. *circumscripta* n. (dadurch ausgezeichnet, dass das innere Mittelfeld sowohl am V.- als am Hrande abgeschnürt u. so auf allen Seiten von der dunkleren Farbe des Mittelfeldes umgeben ist. Basal- u. Mittelfeld sind gleich dunkel. Das innere Mittelfeld bildet in dieser Weise eine schmale halbmondförmige Figur). **Strand**, Nyt. Mag. etc. 39. Bd. 1901 p. 57–58 (Norwegen).
- prunata* L. var. *arctica* n. Die arktischen Stücke sind gewöhnl. kleiner, mit schwächeren Zeichn., aber dunklerem Saumfelde, als gewöhnl. südl. Stücke) p. 58 (Südvaranger u. nördl.). — ab. *constricta* n. (Mittelfeld d. Vflgl. im inneren Viertel zu einem ovalen Fleck abgeschnürt) p. 58 (Stück von Trondenes).
- Lythria purpuraria* L. *abstinentaria* n. (Vflgl. schwärzl.-olivengrün [gen. I] oder grünl.-olivengelb [gen. II], zeichnungslos, mit roten Franzen). **Fuchs**, Stettin. Entom. Zeit. 62. Jhg. p. 377–378 (in den Rheinbergen bei Bornich; die ausgebildete Aberr. selten, die Uebergänge häufiger).
- Lythria? sarruncaria*. **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 241 (Mexico).
- Macaria notata* L. aberr. *innotata* n. (Vflgl. ohne rostbraunen Fleck vor dem Saume in Zelle 3). **Fuchs**, Jahrb. nass. Ver. f. Naturk. 54. Jhg. p. 54–55 (Newiges bei Elberfeld).
- Mecoceras nitocris* Cram. = *Amestris nitocritaria* Hb. in S. Amer. **Therese von Bayern**, p. 286.
- Megatheca dentosa*. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 31 ♀ (Mackay, Queensl.).
- Melanippe fluctuata*. Var. des central. Bandes. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 11 (36) p. 270. — von Red Hill u. Southern Alps fast identisch p. 270.
- galiata*. Das Band variiert in Breite und Intensität. The Entomologist, vol. 34 p. 60. — Varietäten. **Adkin** (5).
- procellata* in Essex. **Mathew, Gerv. F.**, The Entomologist, vol. 34 Jan. p. 22.
- Melinodes conspicua*. **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 178 (Brasilien).
- Melinoessa pauper*. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 210–211 ♂ (Rau, Nandi Country).

- Melochlora* n. g. (verw. mit *Dichorda* Warr. u. *Tachyphyle* Butl., von beid. unterscheidbar durch Aussenrand der Flgl.). **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 445. — *trimaculata* (nahe verw. m. *Melochlora* neis Druce, vielleicht eine weniger markierte Form ders.?). p. 445—446 ♂ (Chiriqui). — *virida* (ähnelt *opaca* Butl., versch. durch „elbowed“ Hflgl. u. Fehlen der Zeichn. auf d. Useite. *Nemoria nigro-apicalis* Dogn. v. Colombia ist vielleicht damit verw., doch ist diese grösser u. die Gestalt d. Hflgl. nicht angegeben) p. 446 ♂ (Ciudad Bolivar, Venezuela).
- Merocasta vinosaria*. **Hampson** (2), p. 251—252 ♂ (Nassau).
- Mesocolpia* n. g. *Tephroclystiinarum* (Seitenspross vom *Chloroclystis*). **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 12. — *subcomosa* p. 12 ♂ ♀ (Island of St. Thomé)
- Mesothea* n. g. *Geometrinarum* (für *Nemoria incertata* [= *oporaria* Zell.]. Bemerk. hierzu. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 446.
- Metanema margica*. **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 176. — *santella* p. 176. — *excavaria* p. 245 (alle drei aus Mexico).
- Meticulodes* spec. Beschr. in S. Amerika. **Therese von Bayern**, p. 285—6. — Neu: *algerna*. **Schaus**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 182.
- Miantonota* Warr. Bericht. zu den Antennen. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 447. — *Racheospila remota* (Nov. Zool. Tring, vol. 7) wohl hierherzustellen.
- Microgonia cariaris* (= *Oxydia cariaris* Wlk.). **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 487. — *rufaria* (Gestalt u. Flügelzeichn. der vor. nahe, doch versch. durch Färb. u. den gross. schwarz. rosig schattierten Analfleck der Vflgl.) p. 487—488 ♂ (Paramba, Ecuador).
- castraria*. **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 172. — *incata* p. 172. — *bertha* p. 172. — *rotara* p. 172. — *umbrosa* p. 172 (sämtlich aus S. Amerika).
- Microloxia pulverata*. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 193 ♂ (Beyrut, Syrien).
- Myroxydia pulveraria*. **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 243 (Mexico).
- Micrulia crassitibia*. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 31 ♂ (Dammara Island). — Die in Nov. Zool. Tring, III zu *Micrulia* gezogenen *recensitaria* Walk. u. *emarginaria* Hmps. stehen besser unter *Dasimatia*) p. 32.
- Milionia weiskei*. **Rothschild**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 220 ♀ (Aroa River, Brit. New Guinea); Hinweis auf Abb., p. 405 Taf. X Fig. 7 ♀. — *everetti* Beschr. in Nov. Zool. Tring, vol. 3 [1896] Abb. Taf. X Fig. 8 ♀. — *coalescens* Swinh. **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 621 Taf. LXV Fig. 1. — *stellata* (Swinh.) p. 622 Abb. tab. cit. Fig. 2. — *coronifera* (Sw.) p. 622 tab. cit. Fig. 3, 4.
- Mimoclystia* n. gen. *Hydriomeninarum*. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8. p. 14. — *undulosata* p. 14 ♂ (Knysna, S. Afr.).
- Mimophyle* n. g. *Fidoniinarum* (in Beschuppung u. Aussehen ähneln die typischen Stücke kleinen Noctuen). **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 480. — *noctuata* p. 480 ♂ (Parana, Entre Rios, Argentina).
- Mimosema* n. g. *Ennominarum*. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 488. — *imitans* (oberfl. viel Aehnlichkeit mit 1—2 Spp. der Gatt. *Dichromatopodia* einerseits u. *Syrrhizodes deludens* Warr. andererseits. Untersch.) p. 488 ♂ (Chiriqui, Panama).
- Mixocera* n. g. *Geometrinarum* (für einige von *Nemoria* einers. u. *Microloxia* Warr. andererseits abweich. Spp. — Type: *M. indecretata* Walk., *latilineata* Wlk.

- von Austral. u. serraticornis Warr. v. Afrika). **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 206. — *albmargo* p. 206 ♂ (Ogrugu, Amambara River, Lower Niger).
- Mnesiloba* n. g. Tephroclystinarum (Type: Phibalapteryx eupitheciata Walk.) von Austral.). **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 196—197.
- Mochlona phasmatis* Meyr. Raupe u. ♂. **Kershaw**, Victorian Naturalist, vol. XVII p. 204—206.
- Monochyria* n. g. Hydriomeninarum (Type: *M. viridicinctata* Guen. (? = *poseata* Hüb. — Geäder wie *Tephroclystia* Hüb.). **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 28.
- Mucronodes inopia*. **Dognin**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 186 (Venezuela).
- Myrtela coanaria*. **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 167 (Mexico).
- Narragodes psychidia* (stimmt mit d. Type in der ungewöhl. Anastomosis der Costale u. Subcost. d. Hflgl. Auf den Vflgl. Ader 10 u. 11 coincident, nur in ein. Punkt. m. 12 anastomos.; Palp. dick beschuppt u. im Verhältnis zur Grösse des Insekts gross). **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 480—1 ♂ (Parana, Entre Rios, Argentina).
- Neagathia semilucida*. **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 250 (Rio Janeiro).
- Nelo divisa ab. radiata* **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 474 ♂ (zw. Celica u. Sagratillo, Ecuador, 1800'—800').
raptimargo (Die Useite trägt eine merkwürdige Aehnlichkeit mit einigen *Emplocia* spp.) p. 475 ♂ (Quebrada Secca, Cumana).
- Nematocampa benescripta* **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 488—489 ♂ ♀ (Chiriqui, Panama). — *evanidaria* **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27. p. 178 (Peru).
- Nemoria silena* **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27. p. 252 (Brasilien).
- Neocrasis* n. gen. Geometrinarum **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 447. — *obscurata* p. 447 ♂ (Colombia). Mit keinem südamerik. Insekt dieser Subfam. ähnlich.
- Neodora cretacea* **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 489 ♂ (Callanga, Cuzco, Peru 1500').
- Neosterrha thetis* Warr. in S. Amer. **Therese von Bayern**, p. 286.
- Nesochlide* n. g. Geom. (Abkömmling von *Scotorhythra*, anscheinend von gleichem Werth wie *Sisyrophyta*) **Perkins**, Ent. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 215—216. — *epixantha* p. 216 ♂ (Oahu, in den Bergen).
- Neuropolodes fulvata* **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 19—20 ♀ (Sierra Leone).
- Nipteria claribrunnea* (diese u. die folg. gut geschiedene Sp. unterscheiden sich von all. and. der Gruppe durch das gänzl. Fehlen der Zeichnung unten u. oben) **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 476 ♂ (Vilcanota, Cuzco, Peru, 3000'). — *clarigrisea* p. 476 ♂ (Vilcanota, Cuzco, Peru, 3000'). — *curvifascia* (kleiner als *N. favaria* Guen., dunkler; die Zellflecke fehlen; die Linien sind dicker u. anders geordnet) p. 476—477 ♂ ♀ (Rosario, Argentina, Castro, Parana).
- virginata* **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 188. — *claudaria* p. 188 (beide aus Parana).
- Numia axanaria* **Schaus**, t. c. p. 242 (Mexico). — *lermia* p. 242 (Brasilien).
- Nyssia lapponaria*. Larvae of. **Cockayne, E. A.** The Entomologist, vol. 34 Sept. p. 245—256. — in Perthshire. Entom. Record, vol. 13. No. 10 p. 304.

- Obeidia diversicolor* **Warren**, Nov. Zool. Tring. vol. 8 p. 198—199 ♀ (Cuddapah [Kadapa], Residency of Madras).
- Ochyria trientata* (leicht unterscheidbar durch die beiden Farben der Unters.) **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 210 ♂ (Rau, Nandi Country).
(?) *sicyata* **Dognin**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 183 (Brasilien).
- Odontopera bidentata von der Insel Lewis, gezogen. Sehr sonderbares Stück mit durchsichtigen Flgl. der dunkl. Var. The Entomologist, vol. 34 p. 364.
— — Eiablage an Arundo phragmites. **Reid, Percy, C.**, Entom. Record vol. 13 No. 7 p. 221.
- Odontoptila siculodaria **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 189 (Mexico).
- Oenoptila recessa **Dognin**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 185 (Venezuela).
- Oenospila tenuilinea **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 147 Taf. VI Fig. 16 (Trinidad: Tabaquite).
- Oenothalia perrubra **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 143 Taf. V Fig. 8 (Trinidad, Verdant Vale).
- Oligochroa gayneri **Rothschild, N.**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 434 (Assouan).
- Oospila ruptimacula (Grösse wie albicoma Feld., in der Zeichnung mehr concinna Warr. ähnlich) **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 448 ♂ (Paramba, Ecuador).
- Ophthalmophora farantes **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 200. — *croesaria* p. 200. — *dora* p. 200 (alle drei aus S. America).
- Opisthoxia claudiararia **Schaus**, t. c. p. 165 (Rio Janeiro).
- Oporabia autumnaria in Delamere Forest. **Arkle, J.**, The Entomologist, vol. 34, June, p. 182.
autumnata. Biologie. **Allen, J. E. R.**, The Entomologist, vol. 34 Febr. p. 43—45. — dilutata Bkh. u. O. autumnata Bkh. Bemerk. hierzu. **Kane, W. F. de Vismes**, Bemerk. üb. Vorkommen etc. The Entomologist, vol. 34 p. 85.
- Oxydia Abb. der Raupen zweier spec.? **Peters**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. Hft. 10 Taf. X Fig. 5 Raupe, 5a Puppe. — Fig. 7 Raupe.
vitiligata Feld. et Rog. in S. Amer. **Therese von Bayern**, p. 285.
Neu: *subalbescens* **Dognin**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 186 (Bolivia). — *coectura* p. 186 (Merida).
- Pachynemia hippocastanaria Hb. Late Brood. The Entomologist, vol. 34. Oct. p. 288. — Note by **R. South**, *ibid.* — Double-brooded. Notes by **Rob. Adkin**, by **Fred. C. Bellamy**, by **Alfr. E. Tonge**, The Entomologist, vol. 34. Nov. p. 311. — Verfrühte Frühjahrsgeneration. Zeitschr. f. Entom. Breslau, 1899 p. XIX. — für Berlin's Umgebung neu. Berlin. Entom. Zeitschr. 47. Bd. Sitz.-Ber. f. 1901. 19. Sept. — cf. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 333.
- Panthera pumaria **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 188 (Mexico).
- Paracomistis dispar (= Isochromodes dispar Warr. Nov. Zool. Tring, vol. 7 p. 217 ♀) Beschr. d. ♂ **Warren**, Nov. Zool. Tring vol. 8 p. 489 (Chiriqui, Panama). — Paracomistis hat keine fovea, wie irrthüml. in d. Originalbeschr. steht. — *nebulosa* (Oberseits Flgl.-Grösse u. Zeichn. wie dispar, doch dunkler etc.) p. 489—490 ♂ (Chiriqui, Panama). — *punctata* (kann Sabulodes granula Dogn. sein, das nur noch ein ♀ beschr. ist) p. 490.

- Paracrocosta semirufa* Warren, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 20 ♂ (3 Tagereisen von Fort Beni, Congo Free State).
maeviaria (Guen.) Warren stellt in Nov. Zool. Tring vol. 8 p. 217 die *Aspilates maeviaria* in diese Gatt. u. giebt eine Neubeschreibung der Species.
- Parrhesia nebula* Schaus, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 188 (Parana).
- Patalene acuta* Kaye, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 145 Taf. VI Fig. 13 (Trinidad).
- Pelurga cicatriculata* (Berg) (= *Lygris cicatr.*) Warren, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 467.
- Periclina inornata* Warren, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 490 ♀ (Chiriqui, Panama).
 — *daidama* Schaus, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 178 (Mexico).
- Perixera rufidorsata* = *rufannularia*, zu *Phissosceles* gestellt. Warren, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 24.
- Perizoma coustricta* (leicht erkenntl. am schmal. central. Bande mit schwärzl. Geäder etc.) Warren, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 28 ♀ ♂ (Dalhousia). — *verticata* (im Aussehen *P. unifasciata* von Europa nahe) p. 29 ♂ (W. China).
- Pero bicurvata* Warren, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 490—491 ♂ (Tucuman). — *ochriplaga* (in Folge des bloss. subcostal. Centralstrichs trägt das Thier oberflächl. Aehnlichkeit m. *A. habenaria* Guen.) p. 491 ♂ (Marca, Peru, 3000', Regenzeit).
- Petelia nigriplaga* Warren, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 246 (Mexico).
- Phaeochlaena crypsispila* (verw. mit *obtusa* Wlk. u. *nubilosa* Warr.) Warren, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 442 ♂ (Chiriqui, Panama). — *longipalpis* p. 442—443 ♂ ♀ (Chiriqui, Panama). — *circumfumata* p. 443 ♂ (Cucuta, Venezuela).
- Phalacothyrus subviridis* Charakt. Warren, t. c. p. 202.
- Phaludia* n. g. Boarmiinarum. Schaus, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 242.
 — *janeira* p. 243 (Brasilien).
- Phasiane clathrata* L. trans. ad ab. *cancellaria* Hb. auf Hammerö. Strand, Nyt Mag. etc. 39. Bd. 1901 p. 57.
glarearia. Erste Stände. Habich, Verhdlgn. zool.-bot. Ges. Wien, 51. Bd. p. 646.
- Pherotesia* n. gen. Boarmiinarum Schaus, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 246.
 — *malinaria* p. 247 (Mexico).
aquata a British Sp. Tutt (3) (p. 642 sub No. 31 des vor. Berichts).
- Phibalapteryx fusconotata*. Dognin, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45. p. 180 (Ecuador). — *vittulata* Schaus, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 200 (Bolivia). — *cincta* p. 200 (Mexico).
- Phissosceles rufidorsata* (Warr.) von *Perixera* hierherzustellen. Beschr. Fundorte. Warren, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 24.
- Phrudocentra pupillata ab. submaculata* Warren, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 448 ♂ (Colombia). — *olivia* Schaus, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 253 (Parana).
- Phigalia pedaria (pilosaria)* Feather, W. The Entomologist, vol. 34. Febr. p. 58. — dunkle Var. t. c. p. 61. — am 11. Febr. 1900 in Oswitz, Schlesien gefangen. Zeitschr. f. Entom. Breslau, 1900 p. XIII.
- Phorodesma smaragdaria* Fab. Nährpflanzen. Burrows, C. R. N. Entom. Record, vol. 13 No. 7 p. 197—198.
- Phyletis sticticata* Warren, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 10 ♂ (Kaboia, [Buekulla], Uganda).

- Phylodonta druciata* **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 173. — *indeterminata* p. 173 (beide aus Centralamerika). — *songaria* **Dognin**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 187 (Bolivia). — *anca* p. 187 (Chili).
- Physocleora caprigna* **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 186. — *martena* p. 186. — *dardusa* p. 186 (alle drei aus Brasilien).
- Pingasa interrupta* **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 204—205 ♂ (Rau, Nandi Country, zugleich mit einer Serie von *rhadamaria* Guen, doch davon deutlich versch.).
- Pisoraca variospila* (für die Sp., die im Mus. Brit. fälschlich als *monetaria* Guen. bezeichnet ist) **Bemerk. etc. Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 24.
- Pityjea histrionaria* H.-Sch. in S.-Amer. **Therese von Bayern** p. 286.
- Plemyria paranensis* **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 273 (Parana).
- Plemyriopsis variegata* **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 467 ♂ (Chiriqui, Panama).
- Pogonogya adaueta* (Untersch. v. *rufulata*) **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 456 ♂ (Rio Demerara, British Guiana).
- Polla voraria* **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 174 (Brasilien). — *optimaria*. **Dognin**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 188 (Bolivia).
- Polyphasia schistacea* **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 468 ♀ (Boulder, Colorado).
- Polysema brunnea* **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 276 (Peru).
- Porona* n. g. Boarmiinarum **Schaus**, t. c. p. 170. — *dissimilis* p. 171 (Parana).
- Prasinocyma absimilis* (Zeichn. d. Flgl. wie *Thal. leucospilota* Moore von Indien, aber Hrand d. Hfl. voll gerundet statt in der Mitte gewinkelt. Gesicht u. Palpen olivengrün) **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 193 ♀ (Etna Bay, Dutch New Guinea).
- Prionia albifusa* (wie *P. contractaria* Wlk. = *intexta* Swinh., doch sofort unterscheidbar durch die reichl. gelbl. braune (foulvous) Zeichn.; Hflgl. „notched beyond cell“) **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 36—37 ♀ (Kuching, Borneo), ♂ (Penang).
- Problepsis ochripicta* (Untersch. von *latonaria* Guen.) **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 10 ♂ (Island of S. Thomé, Sierra Leone). — *subviridata* (verw. m. *P. latonaria* Guen.) p. 10—11 ♂ (Sierra Leone).
- Prochoerodes cristata* **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 491—492 ♂ (Rio Tanampaya, Bolivia).
- Prohydata* n. g. Geometrinarum. **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 251. — *apicata* p. 251. — *vitrea* p. 251 (beide aus Südamerika).
- Proteostrenia leda ab. occulta* n. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 200 ♂ (Karinyama, Nippon).
- Psaliodes acidalioides* **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 148—149 Taf. VI Fig. 9 (Trinidad). — *trossula* **Dognin**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 183 (Ecuador).
- **Schaus** beschreibt in den Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27: a) aus Mexico: *hieroglyphica* p. 273. — *vasiplaga* p. 274. — *muscona* p. 274. — b) aus Südamerika: *variegata* p. 273. — *purpurea* p. 274. — *pallida* p. 274. — *multilinea* p. 274.
- Pseudapicia* n. g. (*Apicia* nahest.) **Schaus**, t. c. p. 243. — *basivirida* p. 244 (Amazonas). — *pallidaria* p. 244 (Mexico).

- Pseudocollis ovata* Warren, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 29 ♂ (Khasias).
- Pseudosterrha gayneri* (steht *P. paulula* Swinh. v. Indien nahe in Gestalt der Flgl. u. Undeutlichkeit der Zeichn. u. ist ganz versch. von irgend einer der zahlr. *sacraria*-Formen L.) Rothschild, N., Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 433 ♀ (Aegypt.: Shendi).
- Psilalcis inceptaria* Semper, Schmetterl. Philipp. II p. 613 Taf. LXIV Fig. 4.
- Psodos noricana* Wagner in Oesterreich (Kärnten u. Niederösterreich) Preissecker, Verhdlg. zool.-bot. Ges. Wien, 51. Bd. Sitz.-Ber. f. 1901 4. Okt. p. 625. — *noricana* u. *coracina*. Fleischmann, Friedr., 1900. Zur Kenntniss von *P. nor.* Wagner und *cor.* Esp. Mit 6 Fig. auf Taf. 1 u. 2. 10. Jahresber. Wien. Entom. Ver. 1899. p. 83—88. — a) Vorbemerkung p. 83. — b) Beschreibung der Genitalorgane.
- Pterocypha juanaria* Schaus, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 266. — *rufomarginata* p. 266. — *chama* p. 266 (alle drei aus S. Amer.). — *tabascanana* p. 266 (Mexico).
- Ptychopoda. Warren beschreibt in den Nov. Zool. Tring, vol. 8: *rufulata* (gehört zur *actiosaria*-Gruppe, doch Vflgl. schmaler, mehr zugespitzt (p. 11 ♀ (Island of St. Thomé).
- delicatula* (oberflächl. der *Crasp. propinquaria* Leech von China ähnl.) p. 24—25 ♀ (Dalhousie, N.-W.-Indien). — *indeterminata* (gehört zur *actiosaria*-Gruppe) p. 25 ♀ (Simla). — *lauta* p. 25 ♂ (Japan). — *punctatissima* p. 25 (Queensland).
- gracilipennis* p. 195 ♂ (Beirut, Syria). — *piperrata* p. 456 ♂♀ (Sao Paulo). — *subexcisata* (verw. mit *P. monogrammata* Guen. von S. Domingo) p. 456 (Sao Paulo).
- Schaus charakterisirt in den Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 folg. neue Arten: a) aus Mexico: *grasuta* p. 192. — *canthema* p. 193. — *celtima* p. 259. — *jalapata* p. 259. — (?) *jugaria* p. 259. — von Orizaba: *iridaria* t. c. p. 260. — b) aus S. America: *lumaria* p. 259. — *paranaria* p. 250.
- Pygmaena fusca* Thbg. in Norwegen. Biolog. Notiz. Strand, Nyt Mag. etc. 39. Bd. 1901 p. 57.
- Pycnodontia* n. g. Geometrinarum (charakt. durch den Bau der ♂-Antennen)
- Warren, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 206. — *apicata* p. 206 ♂ (Mpwapwa, German East Africa).
- Pyrinia*. Schaus beschreibt folgende neue Arten in den Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 200: *aroaria*, *bertularia*, *pescoria*, *discata* (alle drei aus S. Amer.). — *sanitaria* (Mexico).
- Racheospila*. Warren beschreibt in den Nov. Zool. Tring, vol. 8 folg. neue Arten: *astraeoides* (W. war anfangs geneigt sie für eine zwerghafte *R. astraea* zu halten) p. 448—449 ♂ (Chimbo, Ecuador, 1000'). — *bidentifera* (sehr distinkte Sp.) p. 449 ♂ (Colombia). — *decorata* p. 449 ♂ (Chimbo, Ecuador, 1000'). — *draphana* (verw. mit *mustela* Druce) p. 450 ♀ (Surco, Peru, dry season, 2000' u. Marca Peru, wet season, 3000'). — *semiornata* p. 450 ♂ (Chiriqui, Panama). — *vinocincta* p. 450—451 ♀ (Chiriqui, Panama).
- Dognin beschreibt *luteifimbria* in Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 309 (Columbien).

- **Schaus** charakterisiert in den Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27: a) von Mexico: *capysoides* p. 251. — b) von S. Amer.: *pulveraria* p. 251. — *viridicincta* p. 252. — *gortaria* p. 252.
- **Kaye** in den Trans. Entom. Soc. London 1901: *undulosa* p. 148 Taf. VI Fig. 23 (Trinidad, Tabaquite).
- Rhodochlora rothschildi* (sehr schönes Insekt; nahe verw. mit *gaujoniarina* Dogn.) t. c. p. 451 ♂ (Chiriqui).
- Rhomboptila intermedia*. **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 174 (Peru).
- Rhomborista palliata* Warr. u. *ustipennis* Warr. (beide in Nov. Zool. Tring vol. 5 beschr.). Bemerk. hierzu. Sind die Geschlechtsformen einer u. ders. Art. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 206—207.
- Rhopalista finitima*. **Dognin**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 182 (Brasilien). — *improbaria*. **Schaus**, Trans. Amer. Ent. Soc. vol. 27 p. 268 (Mexico). — *vanonaria* p. 268 (Mexico). — *repandaria* p. 268 (Südamerika). — Siehe ferner *Hammaptera*.
- Rumia crataegata* L. Protective resemblance. **Imms**, A. D., Entom. Monthly Mag. (2) vol. 11 (36) p. 159. — An der Useite eines Blattes v. *Crataegus oxyacantha* hängend. — *luteolata* in Sept. **Swain**, (p. 638 sub No. 3 des vor. Berichts). — **Watkins**, p. 647 (sub. No. 1 des vor. Berichts).
- Sabulodes transversata*. Biologie. **Dyar**, Psyche, vol. 9 p. 273.
- Scea servula*. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 443 ♀ (Colombia: River, Dagna, Pichinde).
- Sciagraphia heliothidata*. Biologie. **Dyar**, Psyche, vol. 9 p. 203.
- Scionomia* n. g. Selidoseminarum (Type: Sc. [Cidaria] mendica Butl.) **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 35.
- Scoria infumata*. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 481 ♂ (Cajamarca, Peru, 2800' u. Paramo, Peru, Trockenzeit.), ♀ vielleicht flügellos.
- Scotopteryx* (?) *subnigrata* (in forewings veins 10 a. 11 are coincident, short stalked with 7, 8, 9 and anastomosing at a point with 12). **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 34 ♀ (Cachar). — *insolita*. **Warren**, t. c. p. 479 ♀ (San Marco, Peru, Regenzeit, 3200').
- Scotosia zona*. **Dognin**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 45 p. 181 (Brasilien). — *albifasciata* p. 181 (Paraguay).
- Selenia bilunaria* Esp. 2. Gener. in Schottland. **Morton**, K. J., Ann. Scott. Nat. Hist. 1901. Apr. p. 119—120.
- Esp. (= *illunaria* Hb.) offenbar eine 2. Generation in Schottland. **Evans**, **Wm.**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) May, p. 126—127. — ab. *jularia*. Biologisches aus der Zucht. **Gauckler** p. 581 des vor. Berichts sub. No. 19.) — Neue Varietäten siehe unten. — Bericht. id. (p. 581 des vor. Berichts sub. No. 22).
- illustraria*. 3 Generationen in einem Jahre. **Garratt**, **Rieh.**, The Entomologist, vol. 34. Oct. p. 288—289. — Generationen ders. **Merrifield**, t. c. Dec. p. 341—342. — Bemerk. zur 3. Gener. **Gilles**, **W. S.**, t. c. May, p. 157.
- tetralunaria* (*illustraria*) in Scotland. **Woodbridge**, **Francis**, C. The Entomologist, vol. 34 June, p. 179.

Neue Varietäten: *bilunaria* Esp. Variabilität ders. 1. Eine grössere, ca. 40 mm Exp., mit zieml. dunklen u. deutl. Zeichn.: *forma principalis*. — 2. kleinere (35 mm) mit bleicheren, undeutlicheren, mehr graulichen Zeichn.: *forma juliarum* Hw. — 3. noch kleinere, wahrsch. für die arktischen Gegend. eigenthüml. Form (bisw. nicht mehr als 28 mm: *forma minima* n. [Fgl. sehr distinkt u. dunkel gezeichnet; der mittl. der 3 Querstreifen (Schattenstreif) in der Mitte stark nach aussen gebogen, so dass er beinahe den äussersten der Querstreifen berührt. (keine Aberr.)] p. 56. — *ab. fuscata* n. Der Mittelraum zwischen dem Schattenstrich u. dem äusseren Querstreif von Braun ausgefüllt, so dass eine breite Querbinde gebildet wird, womit die genannten Querstreifen zusammengeflossen sind, indem es denselb. an einer deutlichen inneren Begrenzung fehlt. 41 mm, für ein arktisch. Stück sehr gross p. 56 (Norwegen).

Neue Art: *ablinearia*. **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 180 (Mexico).

Semiothisa bisignata Walk. Schädli. an *Pinus strobus* L. **Chittenden**, sub. No. 2 (l. c. des vor. Berichts).

Neu: *majestica*. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 213—214 ♂♀ (Longa River, Angola).

— **Schaus** beschreibt in den Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 folg. neue Arten:

a) aus Südamerika: *ramparia* p. 168. — *poltronaria* p. 168. — *finaria* p. 169. — *tristaria* p. 169.

b) aus Brasilien: *evanaria* p. 167.

c) aus Mexico: *dentilaria* p. 167. — *muyana* p. 167. — *jozefaria* p. 168. — *valmonaria* p. 168.

d) aus Columbien: *grisearia* p. 243.

e) aus Costa Rica: *discata* p. 168.

f) aus Jalapa: *falconaria* p. 169.

Senelys enucleata. Biologie. **Dyar**, Psyche, vol. 9 p. 165.

Sicya vigasia. **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 175 (Mexico).

Simena umbrifera. **Schaus**, t. c. p. 188 (Mexico).

Somathina fusaria. **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 253 (Bahamas).

Spargania bellipicta. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 468—469 ♀ (Chimney Gulch, Golden, Colorado). — *subcuprea* p. 469 ♂ (Chiriqui, Panama).

Spilocraspida aroaria. **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 187. — *umbrilinea* p. 187 (Mexico).

Spododes nubilata. **Schaus**, t. c. p. 176 (Peru). — *flamina* p. 177 (Columbien).

Stannoctenis n. g. Eucestinarum. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 471 (Xanthorhöe volucer Hulst. Auch *Marmopteryx* spp. hierher).

Stenalcidia cindica var. *occidentalis* n. **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 185. — *occulta* p. 185 (Brasilien). — *arthura* p. 185 (Brasilien). — *sincera* t. c. p. 249 (Peru). — *tristaria* p. 249 (Brasilien). — *pergriseata* (brotes Druce am nächst.; versch. durch gleichmäss. braune Färb. ohne braune od. ockergelbe Schattierung). **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 473—479 ♂ (Callanga, Cuzco, Peru, 1500').

- Sterrhia sacraria* in Worcestershire. **Day, A.**, The Entomologist, vol. 34. Oct. p. 296.
- Sumatina fusaria*. **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 253 ♂ (Nassau).
- Susica sinensis* ♂♀ von Sarawak. Besch. d. ♀. **Warren**, t. c. p. 463.
- Synchlora louisa* var? *var. hulstiana* n. **Dyar**, Proc. Entom. Soc. Washington vol. 4 p. 457.
- Synnomos? narangia*. **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 180 (Mexico),
Synopsia sociaria Hb. (nach Stdgr. im S. O. u. N. W. von Deutschl.) **Riesen**,
 p. 167—168 fing das Thier im Grunewald bei Berlin [für Fauna neu],
 Zinnowitz, Rügen.
- Syrrhoedia curvilinea*. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 482 ♂ (Palma Sola,
 Venezuela).
- Tachyphyle occulta* (undilineata Warr. am nächsten, vielleicht weniger markierte
 Form ders.). **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 450—451 ♂ (Colombia).
- Tephrinopsis illineata* (möglicherweise das ♂ zu alternata von der Delagoa Bay,
 das fälschlicher Weise in Nov. Zool. Tring vol. 6 als eine Gonodela be-
 schrieben ist). **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 214 ♂ (Benguela). —
ochriciliata p. 214 ♂ (Cubal River, Angola). — *brunneofusa* (anschein. vari-
 abel in Grösse u. Zeichn.) **Warren**, t. c. p. 482 ♂ (Chiriqui, Panama).
- Tephroclystia virgaureata* Dbld. Zur Lebensgeschichte. **Klos, Rudolf**,
 Verhdlgn. zool.-bot. Ges. Wien, 51. Bd. p. 785. — Bemerk. zur Färb., zu
 den Raupen etc. — (Eupithecia) vulgata Hw. Experimentelle Untersuchung
 zur Vererbung von Charakteren an ders. **Schröder**, Allg. Zeitschr. f. Entom.
 6. Bd. p. 255—258. — Verteidigung gegen gewisse Ausführungen Pieper's.
 Bezeichnungsweise der Linien auf den Segmenten. Sorgfältige Fütterungs-
 methode etc.
- Neue Arten: *druentiata*. **Dietze**, Deutsch. Entom. Zeitschr. lep. Hft.
 14. Bd. p. 254 Abb. v. Raupe u. Puppe Taf. IV (Untere Alpen). —
vermiculata. **Warren**, t. c. p. 12 ♀ (Nakabimba). — *foedatipennis*.
Warren, t. c., vol. 8 p. 32 ♀ (Padang Rengas, Malay Peninsula). —
bialbata (sehr charakt. Insekt.). **Warren**, t. c. p. 474 ♀ (Sao Paulo,
 Santos). — *perciliata* (antenn. subservate, ciliated) p. 474 ♂ (Cucuta,
 Venezuela).
- Tephrosia bistortata* u. *T. crepuscularia*. **Prout** (p. 618 sub No. 6 des vorig.
 Berichts).
- **Schaus** beschreibt in den Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 folg. neue
 Arten: a. aus Mexico: *sadrina* p. 184. — *giatoma* p. 184. — *humid-
 aria* p. 185. — *pagonaria* p. 245. — b. aus Parana: (?) *centrosa*
 p. 185. — c. aus Brasilien: *immarcata* p. 248.
- Thalera ostracites* **Karsch**, Entom. Nachr. (Karsch) 26. Jhg. p. 370 (W. Madagasc.).
- Therina athasiaria* u. *pellucidaria*. Biologie. **Dyar**, IX u. X p. 573 sub No. 34
 des vor. Berichts.
- Neu sind: *punctillaria* **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 179
 (Mexico). — *templataria* p. 179 (Mexico). — *atomaria* p. 179 (Costa
 Rica). — *pardiria* p. 245 (Chiriqui).
- Thysanopyga subalba* **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 17 ♂ (Island of St.
 Thomé). — *nigricornata* **Warren**, t. c. p. 481—482 ♂ (Chiriqui, Panama).
marosa **Schaus**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. 27 p. 246 (Brasilien).

lollia p. 246 (Brasilien).

Tigridoptera cuneiplena. Besch. d. ♂. **Semper**, Schmetterl. Philipp. II p. 618
Abb. Taf. LXIV Fig. 9.

Tithraustes *albifera* **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 443 ♂ (S. José, Costa
Rica). — *approximans* (sehr ähnl. d. ♂ von *subcoerulea*. Untersch.) p. 443
— 444 ♀ (Chiriqui, Panama). — *quinquepunctata* p. 444 ♂ (Chiriqui Panama).
— *seminigrata* (Unterschiede von vor.) p. 444 ♂ (Chiriqui, Panama). —
subcoerulea p. 444—445 ♂ (Chiriqui, Panama).

Urepione *epona* **Dognin**, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 35 p. 189 (Ecuador).

Urapteryx *sambucaria* L. Lebensweise. **Gauckler**, (p. 581 sub 207 des vor.
Berichts). — Verspinnen der Raupen. **Schultz**, O. (p. 629 sub No 12 des
vor. Berichts).

Venelia maculata **Aberr. Abbott** (p. 547 sub No. 4 des vor. Berichts).

Victoria ansorgei (steht *V. pulveriplaga* Warr. von Warri sehr nahe. Unterschiede)
Warren, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. ♂♀ (Nakabimba, Toru).

Xanthorhoë castanea (oberfl. wie *E. subangulata* Kollar, die jedoch von Hamp.
in seine Gruppe der *Cidaria* mit einfach. Antennen gestellt ist; v. 6 stalked
with 7, 8, 9). **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 30 ♂ (Gourais Valley,
Kashmir).

Xanthotype cecataria. Biologie. **Dyar**, Psyche, vol. 9 p. 226.

Yashmakia n. g. *Deiliniarum*. **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 197. —
veneris (sehr merkwürdiges Insekt., mit kein. beschr. verwandt) p. 197
— 198 ♂ (Poeh Mts., Sarawak).

Zamarada pulverosa Warr. (1895). Aegypt.: Shendi. **Rothschild**, N., Nov. Zool.
Tring, vol. 8 p. 433.

— Neu: *angustimargo* (schmaler dunkler Saum). **Warren**, Nov. Zool. Tring,
vol. 8 p. 212 ♂ (Luacinga River, Angola). — (?) *confusa* (von d. Type
versch. durch 10 u. 11 coincident anastomose with 12; Ader 3 in beiden
Flgn. „from some little space before lower angle of cell“) p. 212 ♂. —
flavicaput p. 212 ♀ (Fundorte beider wie vorher).

Zanclopera subusta **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 37 ♂ (Nias Island).

Zonosoma alodia **Dog.** zu den *Uraniden* als *Aorista* n. g. gezogen, siehe dort. —
Genitalanhänge; **Bastelberger** (p. 557 sub No. 3 des vorig. Berichts). —
annulata var. *obsoleta*. **Riding** (p. 622 sub No. 3 des vor. Berichts). — *annu-*
lata u. *porata* parallele Farben-Varitäten. **Riding** (No. 7 p. 622 des vor.
Berichts).

orbicularia var. vel. *spec. nov. ianthinarivum* **Stich**. (Stück, das in d. Sitz. des
Berlin. Ver. 1899, 6. April von **Thurau** als *Z. pendularia* aberr. ange-
sprochen war. Mit bleigrauer, etwas röthlich abgetönter Grundfärbung).
Stichel, Berlin. Entom. Zeitschr. 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900 5. Juli
p. (19)—(21). Bemerk. zu verschiedenen andern *Zon.-Spp.* (**Thurau's**
Stück von **Arneburg** in der Mark von **Birke**. — **Snellen's** in **Namur**
an **Weide** gezogen).

linearia gebänderte Form. **The Entomologist**, vol. 34 p. 60.

lenigiaria **Fuchs**. Beziehung zu *albiocellaria* **Hb. Bastelberger**, (p. 557 sub
No. 4 des vor. Berichts).

linearia var. *strabonaria* n. **Fuchs**, **Stettin. Entom. Zeit.** 62. Jhg. p. 136. —
Arch. f. Naturgesch. 68. Jahrg. 1902. Bd. II. H. 2

— *linearia* Hb. *ab. nigrosparsaria* (alle Flgl. bis zum Mittelschatten fein, aber dicht schwarz bestäubt, am reichlichst. im Mittelfeld, das letztere mit fein., weissl. Mittelmonde). **Fuchs**, Stettin. Entom. Zeit. 62. Jhg. p. 136—137 (von Newiges).

linearium Hübn. Stück, das allein auf seiner linken Seite eine Ocelle zeigte, wie solche für andere Zonosoma-Arten charakteristisch ist. Berlin. Entom. Zeitschr. 47. Bd. Sitz.-Ber. f. 1901, Apr. — cf. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 157. — *pendularia* in October. **Woodbridge, Francis, C.** The Entomologist, vol. 34, June p. 179. — pend. Variation. **Woodforde, F. C.** t. c. vol. 13 No. 10 p. 296. — *porata* Aberration. **Bower, H.** (p. 560 sub No. 3 des vor. Berichts). — Frühes Auftreten in der Gefangenschaft. **Hill, H. Ainslie**, Entom. Record, vol. 13 No. 5 p. 165. — Gezogen aus ein. ♀ von Oxshott, dar. Stücke mit ungewöhl. brauner Färb. The Entomologist, vol. 34 p. 259. — *punctaria*, reizende Var., die Punkte ziemlich zu Strichen ausgezogen. **Nagel**, Zeitschr. f. Entom. Breslau, 1900 p. XVII. — *punctaria* L. u. *Z. ruficiliaria* H. S. **Gauckler** (p. 581 sub No. 25 des vor. Bericht).

Uraniidae.

Uraniidae. Auf Trinidad vertreten durch die Subf. *Epicopeiinae* mit *Mania* (2) u. Subf. *Epipleminae* mit *Schidax* (1) u. *Epiplema* (1). **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 150.

— von den Bahamas. **Hampson** (2) p. 253. — 1 Sp.

Aorista n. gen. Uraniidarum (verw. mit *Meleaba* (*theclaria*) Wlk., aber im Geäder beträchtlich versch.) **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 436. — Type: *Aorista* (*Zonosoma*) *alodia* Dogn.

Stesichora puellaria subsp. multiguttata n. (Randflecke noch zahlr. als bei der Type von Timor) **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 21 ♂ (Aru).

Urania fulgens Wlk. in S. Amer. **Therese von Bayern**, p. 285.

Pyralidae und Thyrididae.

Autoren: Beutenmüller, Chittenden, Disqué, Dyar, Fernald, Hampson, Hering, Kaye, Koningsberger, Leech & South, Lower, Meyrick, Ragonot, Snellen, Sorhagen, Swinhoe, Warren.

Monographie: Phycitinae u. Galleriinae: Ragonot.

letzt. syst. Ordn. der britischen (nach Sir Geo. F. Hampson): The Entomologist vol. 32 p. 301—304.

Pyralidae von China, Japan u. Corea. Leech (2) u. South. Neubeschr. vom letzt.) — von den Bahamas. **Hampson** (2) p. 254. — 57 Spp. dar. div. nn. gg. u. nn. spp.

von Central-Afrika: **Sharpe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 286: 1 sp. von Filodes.

Auf Trinidad vertreten durch die Subf. *Crambinae* (Gatt.: *Diatroea* [2], *Platytes* [1]), Subf. *Schoenobianae* (Gatt. *Scirpophaga* [1]), Subf. *Phycitinae* (Gatt.: *Hypsipila* [1]), *Chrysauginae* (Gatt. *Salobrena* [1],

Carcha [1], Microzancla [1], Caphys [1], Bonchis [1], Galasa [1], Epitamyra [1], Chrysaugae [1], Subfam. Pyralinae (Gatt. Pyralis [1 n], Mapeta [1], Aulacodes [1], Diathrausta [1], Stenia [1], Subf. Pyraustinae (Gatt.: Neurophyseta [1 n.], Desmia [1], Leucochroma [1], Syngamia [3], Samea [1], Piloerocis [1 n. + 3], Conchylodes [1], Phryganodes [1], Mesocoondyla [1], Nacoleia [1], Sylepta [2 + 1 n.], Lygropia [1], Leiopasia [1], Glyphodes [2], Leucinodes [1], Pachyzancla [1 n.], Pionea [3], Pyrausta [1]). **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 151—157.

Raupen. Bemerk. zu einer grösseren Zahl ders.: Sorhagen. Kurze Beschreibung zahlr. nordamerik.: **Dyar**⁴²).

Thyrididae von den Bahamas: **Hampson** (2) p. 254. — 1 sp.

Schädlinge in Japan. **Matsumura**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 21 sq. — Forts. zu p. 896 des vor. Berichts.

Species:	jap. Trivialname:	Futterpflanzen:	Verbreitung:
Glyphodes pilocalis Wk.	Kuwa-no-suki-mushi	Maulbeere	Japan, China, Ind., Ceylon, Burma.
— indica	Wata-no-ōhamaki	Baumwolle, Hibiscus	Japan, Ind., China, Austral.
Marnca testulalis Geyer	Azukino-saya-mushi	Phaseolus vulgaris, P. mungo	Japan, Ind., China, Austral.
Pionea forficalis L.	Hoshi-aomushi	Rhaphanus-, Brassi-ca-Arten	Japan, Europa.
Botys nubilalis	Awa-no-zuimushi	Indigo, Panicum frumentaceum, Setaria italica. (Staudenbohrer, sehr schädlich).	Japan, Europa, China.

Achroia *obscurivitella* **Ragonot**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 498 Taf. XLIII Fig. 24 (Japan). — (Japan) **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 387—388.

Acrobasis *crassisquamella* **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 520 Taf. LI Fig. 15 (Mexico).

consociella H., tumidana Schiff., rubrotibiella F. R. Biolog. etc. **Sorhagen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 297.

Acropentias aureus Butl. Liter., Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 400—401.

Acyperus n. g. Galleriinarum **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 427 Taf. LIII Fig. 15. — *aurantiacella* p. 427 (Fergusson Isl.).

Addye *ardentella* **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 532 Taf. LVI Fig. 13 (Australia).

Aetholix flavibasalis Gn. von Sumatra. **Hering**, p. 319.

Agathodes ostensalis Hb. nebst var. *pallidior* n. **Hering**, Stettin, Entom. Zeit. 62. Jhg. p. 313. — *nodicalis* Gn. p. 313—314. — *caliginosalis* Snell. p. 314.

Aglossa dimidiata (Haw.) Syn., Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 421—422.

- Agrotera effertalis* Walk. von Sumatra. **Hering**, p. 319—320. — *nemoralis* (Scop.) u. *leucostola* Hmps. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 451. — *nemoralis* Scop. Biologisches u. Beschr. d. Raupe. **Sorhagen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 276—277.
- Alamosa* n. g. *Anerastin*. **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. — *piperatella* p. Taf. LI Fig. 25.
- Alypia octomaculata* Fab. u. *langtonii* Coup. Unterschiede. **Dyar**, Proc. Entom. Soc. Washington, vol. 4 p. 495.
- Anartula melanophia* Stgr. Beschr. des Stückes von Soekar. **Hering**, p. 19.
- Ancova endoleucella* **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII Taf. LVI Fig. 1 (Assam).
- Ancylolomia chrysographella* Koll. Liter., Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 399.
- palpella* Schiff. Note on. **Chrétien**, Bull. Soc. Entom. France, 1901, p. 300—301. — Für Frankreich neu: Veynies (Hautes Alpes); Digne. Biolog. Bemerk.
- Ancylosis turaniella*. **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII Taf. XXXI Fig. 3. — *cephella* p. 215 Fig. 5 (Centralasien). — *imitella* tab. cit. Fig. 1 (Algier).
- Anerastria lotella* H. Biologisches. **Sorhagen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 298. — *leucotaeniella* Rag. Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 404—405.
- Neu: *biseriella*. **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 397 Taf. LII Fig. 18 (Queensland). — *taliella* p. 397 Fig. 17 (Queensland). — *hemirhodella* p. 402 tab. cit. Fig. 12. — *conspersella*. **Ragonot**, p. 404 Taf. XL Fig. 13 (Colorado).
- Anerastidia* n. g. *Galleriinarum*. **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 500. — *albititella* p. 500 Taf. LIV Fig. 22 (Pulo Laut).
- Antigastra catalaunalis* (Dup.). Syn., Verbr. **Leech** (2) p. 487—488.
- Aphytoceros* Meyr. Bemerk. z. Gatt. **Hering**, p. 226. — *tapsusalis* Walk. p. 227—228. Bemerk. z. Beschr. (für Sumatra wohl neu).
- Archernis humilis* (Swinh.). Verbr. **Leech** (2) p. 477.
- Arenipsex* n. g. *Galleriinarum*. **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 501. — *sabella* p. 501 Taf. XXIV Fig. 1 (Persisch. Golf).
- Aripa lactiferalis* Walk., *glaucias* Meyr., *aeriferalis* Moore, *marginalis* Snell., *cribrata* F., *meritalis* Walk. Sumatra, Bemerk. **Hering**, p. 331—335.
- Arnatura melanophia* Staud. Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 414.
- Arthroschista hilaralis* Walk. (scheint in Sumatra besonders häufig zu sein). **Hering**, p. 258—259.
- Aulacodes peribocalis* (Walk.), *sinensis* Hamps. Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 436—437. — *luninalis* Hampson p. 437 (Centr. u. W. China: Chang-yang, Kiukiang u. Ichang).
- Autocharis* Swinh. Stell. d. Gatt. **Hering**, p. 274—275. — *amethystina* Swinh. p. 275—276. — *nigropunctalis* u. *egenula* p. 276—277 ♂ (Nord Celebes, Toli-Toli).
- Barbifrontia* n. g. (*Oryctometopia* nahe). **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 525. — *hemileucella* p. 525 Taf. LVI Fig. 2 (Austral).
- Baroda flammella*. **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 348 Taf. LI Fig. 12 (Westafrika).

- Blepharomastix* Led. [Schreibweise: styx ist ein Druckfehler]. **Hering**, p. 316.
 — *tampiusalis* Walk. Vergleich etc. p. 316—317.
- Bocchoris* Moore. Umfang der Gatt. **Hering**, p. 327. — *inspersalis* Z., *danalis* Hamps. p. 326—327.
onychinalis (Guen.), *adipalis* (Led.), *aptalis* Walk., *inspersalis* (Zell.). **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 454—455.
- Bostra marginata* (Walk.). Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 431.
 — Walk., *eogenalis* Snell., *vibicalis* Led. von Sumatra. Bemerk., ergänz. Beschr. etc. **Hering**, p. 42—44 (Sumatra).
- Botyodes principalis* Leech, *aurealis* Leech u. *caldusalis* (Walk.) Fundorte. **Leech**, (2) p. 463—464.
 — Gn. **Hering**, p. 225. — *principalis* Leech (Sumatra. — Bisher nur von Japan u. Assam bekannt) p. 225.
- Botys porphyralis* Schiff., *aerealis* H., *repandalis* Schiff., *nubilalis* H., *sambucalis* Schiff., *ruralis* Sep. u. *verticalis* Schiff. Biolog. Notiz, Raupen-Beschr. etc. **Sorhagen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 243—244. — *nubilalis* Biologie u. s. w. **Hampson**, Tijdschr. v. Entom. 44. D. Verslag, p. 2.
- tridentalis* Snell. Berichtigung zur Abh. in Snell. Tijd. p. 97 Pl. 7 Fig. 6 u. 7 u. 14, 15. **Hering**, p. 47 in Anm.
- (*Pyrausta*) *flavalis* S. V. u. *B. citralis* H. S. (*lutealis* Dup.). Ueber die spezif. Unterschiede ders. **Fuchs**, Jahrb. nass. Ver. f. Naturk. 54. Jhg. p. 61—63. — Abweichungen in verschiedenen Punkten. — *citralis* var. *albarracinensis* n. (Vflgl. gestreckter, trüb gelb, grau getönt, alle Flgl. m. breit. grauem Saum, dieser auf den vord. lichter u. verwaschener als auf den Hflgl. Besondere Lokalform bildend).
- purpuralis* L. nebst forma *ostrinalis* Hb. von Kristiania u. Skien. **Strand**, Nyt Mag. etc. 39. Bd. 1901 p. 65. — *ab. conjunctalis* n. (die 3 äusseren Flecken [Irand; Mittel- u. Vrand-Fleck] der Vflgl. zusammengeflossen) p. 65 (Skien, Ulefos). — *ab. demarginalis* n. (der lichte Saumstreif der Vflgl. fehlt ganz) p. 65 (Kr. ania).
- Bradina atropalis* (Walk.), *megealis* Wlk. u. *admixtalis* Walk. Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 439—440. — Neu: *rectilinealis* (*translinealis* Hampson nahe) p. 440 Taf. XV Fig. 1 (Central- u. W. China: Moupin, Chang-yang, Ichang). — *nigripunctalis* p. 440—1 ♀ Taf. XV Fig. 15 (W. China: Chia-ting-fu).
- Cactoblastis* n. g. (Type: *Z. cactorum* Berg). **Ragonot**, Romanoff Mém., vol. VIII p. 15.
- Calamochrous acutellus* Ev. Syn., Verbr. **Leech** (2) p. 488. — *tranquillalis* Led. **Hering**, p. 237—238 (Sumatra).
- Camptomastix* Warr. [nicht *Camptomastyx* Hmps.]. Warr.'s Type: *pacalis* Leech; Hmps.'s Type: *hisbonalis* Walk. beide sind identisch. **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 135.
- Camptomastyx hisbonalis* (Walk.). Liter., Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 443.
- Cangetta rectilinea* Moore (= *Paraponyx hartoghialis* Snell. [nach Snell.'s Angabe = *Parap. griseolalis* Hmps.]). **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 135 Syn. Bemerk.

- Cangetta tenellalis* Snell. Charakt. etc. **Hering**, p. 46—47.
- Canipsa pyraliata* Moore. Abweich. von der Beschreib. **Hampson's**. **Hering**, p. 26—27. — *suspensalis* Walk. ♂ (Sumatra, bisher nur von Borneo bekannt) p. 27.
- Caprinia* Walk. Bemerk. z. Syn., Umfang etc. **Hering**, p. 239—240. — *Felderi* Led. p. 240.
- Cataclysta blandialis* Walk. u. *midas* Butl. Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 435. — *lemnata* L. Biologisches. **Sorhagen**, Allg. Zeitschr. 6. Bd. p. 277.
- Cataprosopus monstrosus* Butl. Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 419—420.
- Cathayia* n. g. Galleriinarum. **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 451. — *obliquella* p. 452 Taf. LI Fig. 6 (China). — *obliquella* Hamps. (östl. China). **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 387.
- Ceroprepes patriciella* Zell. u. *pulvilella* (Zell.). Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 413.
- Cerostoma nemorella* L. für finnische Fauna neu. **Lampa**, Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 158.
- Chabula accamasalis* Walk., *telphusalis* Walk., *reniferalis* Snell., *sphenocosma* **Meyr.**, *appensalis* Snell., *castoralis* Walk. Bemerk. etc. **Hering**, p. 281—282.
- Chalcidoptera emissalis* Walk. (Sumatra etc.). **Hering**, p. 287.
- Charema noctescens* Moore. Verbr. **Leech** (2), p. 457.
- Chilo demotellus* Walk. Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 397. — Desgl. v. *luteellus* (Motsch.), *simplex* Butl., *gensanellus* **Leech** u. *supressalis* **Walk.** p. 397—398.
- phragmitellus* H. u. *cicatricellus* H. Biologisches u. ergänz. Bemerk. **Sorhagen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 277.
- Neu: *funerellus*. **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 254 ♂ (Nassau).
- Chloanges suralis* Led., Fundorte. **Hering**, p. 259.
- Chobera* Moore. Wert der Gatt. **Hering**, p. 308. — *pallida* Moore p. 308.
- Cirrhochrista brizoalis* (Walk.). Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 403.
- Cledeobia bombycalis* Schiff. von Wei-Hai-Wei. **Fletcher**, The Entomologist, vol. 34 p. 200.
- Clupeosoma* = *Hydrorybina* gehören zu den Hydrocampidae; *Hemiscopsis polusalis* gehört nach Untersuchung der Stücke von Sarawak nicht zu dies. Fam. Charakt. **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 139.
- pyeri* (Butl.). Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 444.
- Cnaphalocrocis medinalis* Gn. von Sumatra. **Hering**, p. 339.
- (Guen.). Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 452—453.
- Coenostola* Led. Umfang d. Gatt. **Hering**, p. 292. — *maculicostalis* Hamps., *dispilotalis* Walk., *palliventralis* Snell., *origoalis* Walk. **Hering**, p. 292—294.
- Commotria laticostella*. **Hampson**, Romanoff. Mém. vol. VIII p. 343 Taf. LII Fig. 14 (Amazonas).
- Conchylodes* Gn. Umfang, Stellung. **Hering**, p. 328—330. — *rigidalis* Snell. p. 330—331.
- Conogethes evaxalis* Walk. u. *punctiferalis* Gu., **Hering** p. 96—98 (Sumatra). — Bemerk. zu den Stücken.

- Coptobasis* Led. Umfang der Gatt. **Hering** p. 295—296. — *sulcialis* Walk., *mesopsectralis* Hamps., *fraterna* Moore, *ridopalis* Swinh., *cohaesalis* Walk., *lunalis* Gn., *ogooalis* Walk., *textalis* Led., *adductalis* Walk., *luctuosalis* Gn. Bemerk. usw. p. 296—300.
- Coreyra translineella* **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 492 Taf. LI Fig. 26 (Réunion).
- Cotachena* Moore. System. Stell. **Hering** p. 47. — *histricalis* Walk. Variation etc. — *histricalis* (Walk.) Verbr. etc. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 421.
- Crambidae von Central-Afrika. **Sharpe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 286. — 1 Sp. von Crambus.
- Crambus dumetellus*. Von den Saalwiesen bei Breslau. Stück, das in der Färb. dunkler als sie sonst bei Breslau fliegen. Zeitschr. f. Entom., Breslau, 1900, p. XVIII.
- falsellus* Schiff. u. *fascelinellus* H. Biologisches u. Besch. der Raupe. **Sorhagen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 277.
- hortuellus* Hb. Fundorte im nördl. Norwegen. **Strand**, Nyt Mag. etc. 39. Bd. 1901 p. 65. — *pratellus* Cl. desgl. p. 66.
- pinetellus* siehe *Actebia praecox*. **H. H. Corbett**. — *salinellus* Tutt u. *conchellus* Schiff., für Schwedens Fauna neu. **Hofgren, Gottfr.**, Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 241—242. — bei Frodingham siehe *Actebia* unter Noctuidae.
- Crambus*. **Leech** giebt in den Trans. Entom. Soc. London, 1901. Fundorte, Verbreit. zu folg. Spp., dar. von R. South beschr. einige neue; *infixellus* Walk., *diplogrammus* Zell. p. 388. — *textellus* Christ. (nicht mit *C. diplogrammus* Zell. zu verwechseln, die grösser, dunkler u. eine quere mediane Linie auf d. Vflgln. hat) p. 388—389. — *striatellus* Leech p. 389. — *aridellus* R. S. p. 389 Taf. XIV Fig. 1 (Central China: Chang-yang). — *geniculeus* (Haw.). *atrisquamalis* Hamps. p. 389—390. — *columbinellus* R. S. (verw. mit *atrisquamalis*) p. 390 ♀ Abb. Taf. XIII Fig. 25 (Centr. China: Chang-yang). — *fractellus* R. S. p. 390 Taf. XIV Fig. 5 (W. China: Omei-shan). — *myellus* Hübn., *furciferalis* Hamps., *mixtalis* Walk., *obliterans* Walk., *hortuellus* Hübn., *lucellus* H.-S., *ornatellus* Leech, *yokohamae* Butl., *splendidellus* Christ., *argyrophorus* Butl. p. 391—392. — *nigriscryptellus* R. S. (ähnelt einer Form von *C. argyrophorus* Butl., die in Sikhim u. zu Ningpo vorkommt, doch ist nigr. grösser u. die Vflgl. verhältnissmässig breiter) p. 392 ♀ (W. China: Wa-shan). — *procellanellus* Motch. p. 392. — *picturatellus* R. S. p. 393 ♂♀ Taf. XIV Fig. 4. — *distinctellus* Leech, *perlellus* Scop. p. 393. — *bipartellus* R. S. (verw. mit *C. nivellus*, aber ohne weisse Zeichn. um Irande) p. 393 ♂ Taf. XIV Fig. 9 (W. China: Moupin). — *purellus* Leech, *latellus* Snell. p. 394. — *brevilinellus* R. S. (verw. mit *latellus* Snell.) p. 394 Taf. XIV Fig. 3 (Centr. u. W. China: Omei-shan, Chang-yang). — *nigrociliellus* Zell. p. 394—395. — *fuliginosellus* R. S. p. 395 ♂ Taf. XIV Fig. 6 ♂ (Chow-pin-sa). — *atrosignatus* Zell., *humidellus* Zell. p. 395. — *antimorus* (gehört zur Gruppe des *aethonellus*, aber deutlich verschieden durch die weiss. Hflgl.) **Meyrick**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 567—568 ♂ (New Zealand: Mount Cook, 2500'). — *heteranthes*

(ebenfalls mit aeth. verw., doch versch. durch „the dark fuscous intermixture of the forewings, which in aeth. are uniform golden-bronzy-ochreous“ p. 568 ♀ (Mount Cook, 2500').

- Craneophora haraldusalis* Walk. Bemerk. zur Besch. **Hering** p. 25. — *sumatрана* (Unterschiede von vor.) p. 25—26 ♂ (Sumatra).
- Crocalia aglossalis* Rag. Aegypt.: Wadi Halfa. **Rothschild, N. Nov. Zool. Tring**, vol. 8 p. 433.
- Crociodolomia* Z. System. Bemerk. zur Gatt. **Hering** p. 99. — *binotalis* Z. p. 99—100.
- Crocidophora evenoralis* (Walk.) Verbr. **Leech** (2) p. 479. — *heterogenalis* Brem. p. 479—480. — *nycterina* (Butl.) p. 480. — *aurimargo* Warr. p. 480. — *butleri* (verw. mit der vor.) p. 480 Taf. XV Fig. 12. — *pallida* (Moore), *gladialis* (Leech), *limbolalis* (Moore) p. 480—481. — *obscuralis* p. 481 ♂ W. China: Moupin). — (?) *gensanalis* p. 481—482 Taf. XV Fig. 9 (Gensan).
ptyophora. Besch. d. Sumatra-Stücke. **Hering** p. 308—309. — *grisifusa* Swinh. p. 309.
- Culladia admigratella* (Walk.) Verbreit. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 388.
- Curena externalis* Walk. bish. nur von Austral. bek. **Hering** p. 35 (Sumatra).
- Cydalima laticostalis* Gn. (stichhalt. Unterschiede von *conchylalis* nicht zu finden, daher identisch). Besch. etc. **Hering** p. 240—241. — *diaphanalalis* Walk. p. 242. — *cirrhalis* Swinh., *Pfeifferae* Led., *ophicalis* Walk. (für Sumatra neu) p. 242—246. — *violalis* p. 246—247 ♀ (Sumatra).
- Dausara* Walk. **Hering** p. 277—278. — *talliusalis* Walk. p. 278. Hampson citirt nicht das Snellen'sche Citat von *Enyocera*.
- Diasemia accalis* Walk. Vergleich etc. **Hering** p. 315. — *Ramburialis* Dup. p. 316.
- Diasemia litterata* (Scop.) u. *accalis* (Walk.) Syn. u. Verbr. **Leech** (2) p. 487.
- Diatraea neuricella* Druce in S. Amer. **Therese von Bayern** p. 287.
venosatus Walk. Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 397.
- Diathrausta plumbealis* Warr. u. *picata* Butl. Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 441—442.
- Diathraustodes fulvofusa* Hampson. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 442 (Central China: Ichang).
- Dichoerocis* Led. Bemerk. zum Umfang der Gatt. **Hering** p. 94. — *bicodula* p. 94—95 ♂♀ Taf. I Fig. 18 (Sumatra). — *nigrofimbrialis* Snell., *grosse-punctalis* Snell. i. litt.
surusalis Walk., *punctiferalis* (Guen.), *nelusalis* (Walk.) u. *definita* (Butl.) Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 456—457.
- Doryctria abietella* Zek. u. *splendidella*. Biologie u. Besch. der Raupe. **Sorhagen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 278—279.
splendidella Herr.-Schäff. für Schwedens Fauna neu. **Hofgren, Gottfr.**, Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 245.
Neu: *rubella* **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 533 Taf. LVI Fig. 15 (China).
- Discofrontia* n. g. *Anerastinarum*. **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 350
normella p. 350 Taf. LII Fig. 20 (Natal).

- Dysodia binocolata* (scheint deutlich von beiden, von Walk. von Natal beschr. Formen, *intermedia* u. *crassa* versch. zu sein. Stimmt mit der amerik. *oculatana* im hyal. Fleck beider Flgl. überein) **Warren** (4) p. 203 ♂ (Namaqualand).
 Neu: *angulata* (von allen andern durch Flgl.-Kontur versch.) **Warren**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 6 ♂ (Sierra Leone).
- Doloessa plumbolineella* **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 480 Taf. LIV Fig. 10 (Queensland).
- Eclipsiodes crypserythra* **Lower**, Trans. R. Soc. S. Austral. vol. XXV p. 68 (New South Wales).
- Edulica* n. g. (Type *compedella* Zell.) **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 122. *rufalis* p. 123 Taf. XLVIII Fig. 8 (Madagascar).
- Elasmopalpus bipartitellus* Leech. Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 411.
- Eleusina* n. g. Phycitinarum (Type: *guttella* Snell.) **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 210. — *homocoesomella* p. 211 Taf. LI Fig. 1 (Natal).
- Ematheudes tunesiella* **Ragonot**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 335 Taf. XLII Fig. 22 (Tunis).
- Emmalocera gensanalis* R. S. (verw. mit *A. strigosa* Staud. von Syrien u. Amurland). **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 405 ♂ Taf. XIV Fig. 30 (Gensan). — *umbricostella* Rag. p. 405.
radiatella **Hampson**, **Ragonot**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 315 Taf. LII Fig. 21 (Australien). — *longiramella* p. 315 Taf. LII Fig. 16 (Australien). — *laminella* p. 318 Taf. LI Fig. 8 (Afrika).
- Enchoenemidia* Led. Bemerk. zur Gatt. **Hering** p. 248–249. — *squamopedalis* Gn. Bemerk. dazu p. 249–252. — *bracata* (Untersch. v. *squamopedalis*). p. 252–254 ♂ Taf. I Fig. 23, 23a, 23b (Sumatra).
- Encystia* n. g. Phycitinarum. **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 256. — *Bonhoti* p. 256–257 ♂♀ (Nassau).
- Endocrossis* Meyr. (als eigene Gatt.) **Hering**, p. 226. — *flavibasalis* Moore p. 226.
- Endommasis* n. g. **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 124. — *nigritella* p. 124 Taf. XLIX Fig. 20 (Brasilien).
- Endotricha theonalis* (Walk.), *portialis* Walk., *costaemaculalis* Christ., *ardentalis* Hampsn., *consocia* (Butl.) u. *icelusalis* (Walk.) Synon., Verbreit. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 417–419.
 Neu: *affinialis* R. S. (versch. von *E. flammealis* Schiff. u. nächst. Verw. durch die gekrümmte Submarginallinie) p. 418 Taf. XIV Fig. 22 (Tsuruga).
- Endotricha sondaicalis* Snell., *approximalis* Snell. (Sumatra). **Hering** p. 45. — *affinitalis* p. 45–46 ♀ (Soekaranda, Sum. u. Hiogo, Japan).
- Enosima* n. g. Anerastinarum **Ragonot**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 389.
necsimella p. 389 Taf. XLIII Fig. 22 (China). — *flavescentella* **Hampson**, t. c. p. 390 Taf. XL Fig. 18 (China). — *venella* p. 391 Taf. XL Fig. 19. — *vectiferella* **Ragonot**, p. 391 Taf. XLII Fig. 24 (China).
 — Rag. u. *flavescentella* Rag. Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 404.
- Entephria jaguaralis* (Guen. Fundorte); nebst var. *chinensis* n. R. S. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 446 ♀ (Washan). — *caberalis* Guen. Syn., p. 447. — *lactiferalis* (Walk.), *aeriferalis* (Moore) Verbr., *radiata*

- (Warr.), pantherata Butl., tylostegalis Hamps. Verbr. p. 447—448. — *pulchralis Swinhoe*, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 135—136 ♂ (Rangoon). — *callidalis Hampson*, op. cit. vol. 7 p. 259 ♀ (Nassau).
- Ephestia cautella* (Walk.) Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 406. — *figulilella* Gregson für Schwedens Fauna neu. **Hofgren, Gottfr.** Entom. Tidskr. 22 Årg. p. 243.
- bipunctella Hampson*, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 255—256 ♂ (Nassau).
- Neu: *inductella Ragonot*, Romanoff Mém. vol. VIII p. 283 Taf. XXXV Fig. 3 (Amasia). — *interfusella Hampson*, t. c. p. 290 Taf. XXXIV Fig. 17 (Hadjin). — *rectivittella Ragonot*, t. c. p. 293 Taf. XLII Fig. 17 (Madagascar). — *micaceella Hampson*, t. c. p. 298 Taf. XLIX Fig. 17 (Mexico). — *disparella* p. 298 Taf. XXXIV Fig. 25 (Broussa). — *suffusella* p. 304 Taf. XLIX Fig. 18 (Algier).
- Ephesiodes gilvescentella*. Raupe. **Coquillett**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 86.
- Neu: *uniformella* p. 256 ♂ (Nassau). — **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7. *granulella* p. 256 ♂♀ (Nassau).
- Epicrocis aegnusalis* (Walk.) u. *hilarella* Rag. Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 409.
- Epidauria* n. g. (Type: *Anerostia transversariella* Zell. (**Ragonot**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 405. — *phoeniciella* p. 405 Taf. LII Fig. 5 (Syrien). — *discella Hampson*, t. c. p. 407 Taf. XL Fig. 14 (Mardin).
- Epichidia* n. g. (Type: *fulvostrigella* Ev.) **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 113.
- Ercta ornatalis* Dup., *elutalis* Walk. (Sumatra) Bemerk. **Hering** p. 325—326.
- Eromene expansa* Butl. u. *superbella* Zell. Verbreit. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 396. — *ocellea* (Haw, Lep. Brit. III p. 486 [1812], suburbus of London!) von Cairo bis Shendi häufig. **Rothschild**, N. Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 434. — Am Fusse des Tempels von Ambu Simbel zu Tausenden über dem dort wachsend. Grase.
- Erythphlebia* n. g. *Anerastinarum Hampson*, Romanoff Mém. vol. VIII p. 393. — *enervella* p. 394 Taf. XXXIX Fig. 24 (Queensland).
- Eschata chrysargyria* Walk. Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 398.
- Etiella zinckenella* Tr. Biolog. u. Beschr. der Raupe. **Sorhagen**, Allg. Zeitschr. Entom. 6. Bd. p. 297. — Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 413.
- Neu: *melanella Hampson*, Romanoff Mém. vol. VIII p. 558 Taf. LVII Fig. 24 (Nord-Austral.).
- Eucallionyma* nom. nov. für *Callionyma* Meyr. **Ragonot**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 430.
- Euclasta splendidalis* H. S. Verbr. **Leech** (2) p. 475.
- Endiotes* Hb. Benennung der Gatt. **Hering**, p. 259. — *indica* Saund. p. 260. — (Phakellura) *lucidalis* Hb. in S. Amer. **Therese von Bayern**, p. 287.
- Eurrhyncha urticata* L. Grabow bildet Raupe u. Puppe ab. **Sorhagen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 243. — *urticata* mit zusammengeflossenen Flecken; zu Balham gefangen. The Entomologist, vol. 34 p. 259. — *urticata* (L.) Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 444—445.

- Eurrhyarodes bracteolatis* Z., *tricoloralis* Z. Besch. etc. **Hering** p. 321—322.
 — *bracteolalis* Zell. Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 449—450. — Neu: *leechi* R. S. p. 450 Taf. XV Fig. 15 (Divers. Fundorte in Centr. u. W. China).
- Eurycreon sticticalis* L. u. *palealis* Schiff., Biol. Notizen Grabow's. **Sorhagen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 244.
 Neu: *oculifera* **Hering** p. 98—99 ♂ Taf. I Fig. 20 (Sumatra).
- Euzophera bigella* (Zell.) u. *diminutella* Rag. (beide von Japan) **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 407. — *pinguis* Haw. für Schwedens Fauna neu. **Hofgren, Gottfr.** Entom. Tidskr. 22 Årg. p. 243—244. — *terebrella* Zck. Biologisches. **Sorhagen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6 Bd. p. 298.
 Neu: *depauperatella* **Ragonot**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 41 Taf. XXIV Fig. 23 (Beyrout). — *diminutella* p. 45 Taf. XLIII Fig. 45 (Japan). — *nilghirisella* p. 47 Taf. VI Fig. 18 (Indien) *arcuatella* p. 49 Taf. XXXII Fig. 2 (Sicilien). — *immundella* p. 65 Taf. XXXII Fig. 8 (Europa).
- Euzopherodes* n. g. **Hampson**, Romanoff Mém. vol. 8 p. 79. — Type: **Ragonot**, t. c. p. 79 Taf. XXXI Fig. 23 (Calcutta).
- Evergestis junctalis* (Warr.) Verbr. **Leech** (2) p. 478. — *extimalis* p. 478—479.
 Neu: *dyaralis* **Fernald**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 49 (Florida).
- Filodes* Gn. Bemerk. dazu. **Hering** p. 232. — *fulvidorsalis* Hb. Bemerk. z. Besch. etc., *decoloralis* p. 233—234.
- Fossifrontia* n. g. *Anerastinarum* **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 338. — *leuconeurella* p. 339 Taf. LII Fig. 19 (Queensland).
- Galleria mellonella* L. Biologisches. **Sorhagen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 298.
 — L. Verbreitung. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 386.
 — Eine Beobachtung an ders. **Rudow**, Insektenbörse, 18. Jhg. p. 139—140.
 — In Feigen (vermuthlich aus Smyrna).
- Galasa rubidana* Wlk. auf Trinidad (vielleicht von *rubid.* Wlk. versch., da die Randflecken der Vflgl. gelb, bei *rubid.* dagegen schwarz). **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 152, Taf. VI Fig. 24.
- Getulia fulviplagella* **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 556 Taf. LVII Fig. 22 (Südafrika).
- Glyphodes actorionalis* Walk., *principalis* Walk., *conjunctales* Walk., *bicolor* Swains., *ernalis* Swinh. u. *Westermann* Snell. u. *itysalis* Walk. (Sumatra) Bemerk. etc. **Hering** p. 260—265. — *Hageni* p. 265—267 (letz. sehr nahe Untersch.) Taf. I Fig. 24. — *zelimalis* Walk., *bivitalis* Gn., *pyloalis* Walk., *agathalis* Walk., *caesalis* Walk., *dysallactalis* Hamps., *pulverulentalis* Hamps., *zangisalis* Walk., *stolalis* Gn. u. *canthusalis* Walk. (Sumatra). Bemerk. Besch. etc. p. 267—272.
- indica* (Saunders), *perspectalis* (Walk.), *albifusalis* Hamps., *nigropunctalis* (Brem.), *celsalis* Walk., *pomonalis* Guen., *quadrimalis* Brem., *pryeri* Butl., *pyloalis* Walk., *bipunctalis* **Leech**, *crithealis* (Walk.) Synon.; Fundorte. **Leech** (2) p. 471—475. — Neu: *hageni* **Hering** p. 265 (Sumatra).
- Goniorhynchus butyrosa* (Butl.) u. *exemplaris* **Hampson**. Fundorte: an error. **Leech** (2) p. 462—463.
- Gyptitia ochracealis* Walk. Bemerk. hiezu. **Hering** p. 64.

- Harpagoneura hepialivora* Hampson, Romanoff Mém. vol. VIII p. 464 Abb. Taf. LIII Fig. 19 (Queensland).
- Hedylepta* Led. Bemerk. zur Gatt. — Rattenkönig von synonymen Arten wie *Pachyzancla* Meyr. **Hering**, p. 301—302 — *poenalis* Walk. p. 302. — *annubilata* Swinh. p. 302—303. — *tristrialis* Brem., *ochrifuscalis* Warr., *Korndorfferi* Snell., *diemenalis* Gn., *indicata* F. Bemerk. etc. p. 303—306.
Neu: *trizonalis* p. 303 (Lombok).
- Heliothela nigralbata* Lech. Syn., *Lerbr.* **Leech** (2) p. 513.
- Hellula undalis* (Fabr.) weit verbreitet. **Leech** (2) p. 476—477.
- Hemiloba* n. g. Nymphulidurum. **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 24. — *excisa* (ähnelt etwas *Anacodes polydora* Meyrick, doch die „exaggerated lobes“ der Hflgl. unterscheiden sie sofort) p. 24—25 ♂ (Jaintia Hills).
- Hemiscopsis* Warr. (gut begründete Gatt. verw. mit Noorda bez. *Autocharis*, weiter auch mit *Glyphodes*). **Hering**, p. 278. — *suffusalis* Walk. p. 278—279. — *cinerea* Warr. Syn.; *Verbr.* **Leech** (2) p. 488. — *polusalis* (Walk.) siehe *Clupeosoma*.
- Hendecasis apiciferalis* (Walk.). **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 421.
- Heortia vitessoides* Moore (Sumatra). **Hering**, p. 283. — Besch. eines abweich. Stück des Mus. Stettin.
- Heosphora polyactinia*. **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 384 Taf. LII Fig. 2 (Natal).
- Herculia nannodes* (Butl.), *placens* (Butl.), *japenica* (Warr.), *ignifualis* Wlk., *pelasgalis* Walk. *Verbr.* etc. **Leech**, p. 426—427. — Neu: *bilinealis*. **South**, p. 427—428 Taf. XIV Fig. 20 (Centr. China: Chang-yang).
- nigrivitta* Walk. (wohl weit verbreitet). **Hering**, p. 35—36. — *nitidicitalis* p. 36—37 Taf. I Fig. 7 (Sumatra). — *Hampsonialis* Snell. Besch. p. 37. — *marthalis* Walk., *productalis* Walk. Bemerk. zuletzt. p. 38. (letzt. Sp. nach Hampson, bisher nur von Borneo bek.)
- Heterocnephes lubricosa* (Warr.) *Verbr.* **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 451.
- Heterocrasa expansalis* Warr. (Sumatra, bisher nur Assam). **Hering**, p. 39.
- Heteromicta ochraceella*. **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 445 Taf. LIV Fig. 1. — *nigricostella* p. 455 tab. cit. Fig. 3 (beide aus Queensland).
- Hellula undalis* F. Hb. (Allerweltsthier). **Hering**, p. 49.
- Heterocnephes* Led. Ueber den Umfang des Gattungsbegriffes. **Hering**, p. 279—280. — *scapularis* Led. (äusserst düsteres, melanes Thier) p. 280—281.
- Heterographis nivicostella*. **Ragonot**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 149 Taf. XIX Fig. 7 (Askhabad). — *umbrilimbella* p. 151 Taf. VI Fig. 19 (Ostindien). — *decolorella* p. 158 Taf. XLII Fig. 14 (Margelan). — *aegyptiacella* p. 160 Taf. XXX Fig. 19 (Rothes Meer). — *ignistrigella* p. 166 Taf. XXX Fig. 8 (Texas). — *ustocapitella* p. 172 Taf. XXX Fig. 12. — *ocellella* p. 173 Taf. XLVIII Fig. 13 (Südafrika).
- Heteromicta ochraceella*. **Hampson**, t. c. p. 455 Taf. LIV Fig. 1. — *nigricostella* p. 455 tab. cit. Fig. 3 (beide von Queensland).
- Homoeosoma mucidellum*. **Coquillett**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 85. — *suberetacella* Rag. *Verbr.* **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 406. — *osakiella* Rag. u. *niponella* Rag. p. 406—407.

- Als neu werden beschrieben in den Romanoff Mém. vol. VIII: *terminella*. **Hampson**, p. 234 Taf. XLIX Fig. 6 (Natal). — *fuscella* p. 237 Taf. XXXIV Fig. 3 (Bombay). — *inustella*. **Ragonot**, p. 242 Taf. XXXII Fig. 16 (Frankreich). — *subcretacella* p. 246 Taf. XLIII Fig. 18 (Japan). — *subolivacella*. **Hampson**, p. 250 Taf. XLII Fig. 18 (Amur). — *nipponella* p. 252 Taf. XLIII Fig. 20. — *osakiella*. **Ragonot**, t. c. p. 254 Taf. XLIII Fig. 19 (Japan). — *triangulella*. **Hampson**, p. 256 Taf. XXXIII Fig. 10 (Centralasien). — *clongatella* p. 257 Taf. XXXIV Fig. 4 (Bengal).
- anaspila* (steht H. vagella sehr nahe, aber ist „entirely without the discal spot and second line [always distinct in vagella], usually without the first line also“). **Meyrick**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 566 — 567 ♀ (New Zealand: Waipukurau [North Island], Christchurch).
- Hoplisa xipharesalis* Walk. **Hering**, p. 238—239 (Sumatra).
- Hosidia* n. g. *Anerastinarum*. **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 408. — *ochrineurella* p. 409 Taf. XLV Fig. 1 (Natal).
- Hulstia* n. g. (Type: *Neph. undulatella* Clem.) **Hampson**, Romanoff Mém., vol. VIII p. 127.
- Hydrocampa nymphaeata*. **Sorhagen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 277. — var. **Kaye**, Proc. Entom. Soc. London, 1900 p. XVIII. — Besch. des männl. Geschlechtsapparates. **Stitz, H.**, p. 143—147. — *stagnalis* Stück, bei dem einige der transvers. Zeichn. stark geschwunden oder obsolet sind. The Entomologist, vol. 34 p. 61.
- Hymenia* (*Zinkenia*) *perspectalis* Hb. in S. Amer. **Therese von Bayern**, p. 287.
- Hyphantidium tunerellum* Rag. (Japan). **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 405.
- Neu: *funerellum*. **Ragonot**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 75 Taf. XLIII Fig. 16. — *vinaceellum* p. 77 Taf. XLVIII Fig. 1 (Syrien). — *subclutellum* p. 78 Taf. XXVI Fig. 11 (Madagaskar).
- Hypogryphia rufifasciella*. **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII Taf. XLVIII Fig. 26 (Australien). — *atrissparsella* p. 193 Taf. LV Fig. 7 (Australien).
- Hyporatasia* n. g. (Type: *allotriella* H.-S.) **Ragonot**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 5.
- Hypsopygia lucillalis* (Walk.) u. *regina* (Butl.) Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 422. — *mauritalis* Boisdu. (Sumatra weit verbr. Sp., auch Nova Britannia). **Hering**, p. 34.
- Hypsotropa solipunctella* Rag. u. *syriacella* Rag. Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 404.
- Neu: *infumatella*. **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 377 Abb. XXXIX. Fig. 8 (Natal). — *solipunctella* p. 377 Taf. XLIII Fig. 23 (Japan).
- Ischnurges gratiosalis* (Walk.) Verbr. **Leech** (2) p. 479.
- Lamacha bilineolata* Walk. Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 428. — *tortricalis* Walk. Sumatra, bisher nur Java. **Hering**, p. 38—39.
- Lamoria anella* (Schiff.) u. *inostentalis* Walk., Verbreit. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 387.
- Neu: *jordanis*. **Ragonot**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 435 Taf. XLVI Fig. 5 (Indien). — *pachylepidalis* p. 441 Taf. LIII Fig. 3 (Queensland).

- Laodamia griseosparsella* Rag., *mikadella* Rag., *mundellalis* (Walk.) u. *furvirostella* Rag. Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 410—411. Neu: *argenteilavella*. **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 552 Taf. LVII Fig. 15 (Queensland).
- Leechia* n. g. *Schoenobiinarum* R. S. (Palpi porrect, 2nd a. 3d joints conically scaled; maxillary palpi well developed a. dilated at the extremity. Antennae thickened a. flattened. Tibia slightly hairy, outer spurs 2/3 length of inner. Neuration similar to that of *Niphopyralis* Hmps., but all the wings have veins 4, 5 stalked). **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 400. — *sinuosalis* R. S. p. 400 Taf. XIV Fig. 15 (Centr. China: Chang-yang). — *bilinealis* p. 400 (Fundort wie vor.)
- Lepidoneura longipalpis* Swinh. Bemerk. etc. **Hering**, p. 338.
- Lepidoplaga flavicinctalis* (Snell.) (= *longicornis* Warr. + *elongalis* Warr.). **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 138.
- Lepyrodes* Gn. Bemerk. **Hering**, p. 234. — *geometralis* Gn. p. 235; Verbr. **Leech** (2) p. 476.
- Leucinodes orbonalis* Gn. von Sumatra. **Hering**, p. 326; Verbr. **Leech** (2) p. 476.
- Locastra muscosalis* (Walk.) Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 415—416.
- Lomotropa costiflexalis* Gn. (Sumatra) **Hering**, p. 284.
- Lophopalpia pauperalis* (Leech) Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 428.
- Lophothoracia* n. g. (*Cremnophila* nahest.) **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 537. — *omphalella* p. 537 Taf. LVI Fig. 20 (Queensland).
- Loryma recusata* Walk. **Hering**, p. 44—45 (Sumatra; bish. Indien, Ceylon, Borneo).
- Loxostege oblitalis*. Biologie. **Chittenden**, Bull. U. S. Depart. Agric. vol. XXVII p. 102—107 mit Holzschnitten.
- Luma ornatalis* Leech u. *sericea* (Butl.) Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 441.
- Lygropia quaternalis* (Zell.), *euryclealis* Walk. u. *poltisalis* Walk. Verbr. **Leech**, (2) p. 471.
- Lympha* n. g. (Type: *chalybella* Ev.) **Ragonot**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 10.
- Mabillia zambeziella* **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 512 Taf. LV Fig. 9 (Afrika).
- Mabra charonialis* (Walk.) Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 445.
- Macalla inimica* (Butl.) u. *amica* (Butl.) beide von Japan. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 414. — *moncusalis* (Walk.), *nigrescens* (Warr.) u. *margarita* Butl. Syn. u. Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 414—415.
- Macalla margarita* Butl. u. *laevivitta* Moore Bemerk. zu letzt. **Hering**, p. 19—20. — *exrufescens* Hamps. Hamps.'sche Originalbeschr. sehr gut, Ergänzung. dazu.
- Macaretaera hesperis* Meyrick für Sumatra neu, bish. nur Khasis u. Fidji. **Hering**.

- Macna* Walk. Bemerk. zur Gatt. **Hering**, p. 17. — *platychoralis* Walk. p. 18 (Soekar). In der Besch. der Sp. ist zu ergänzen die sehr deutliche gezackte Submarginallinie der Hinterflügel.
- Marasmia* Led. Unterscheidung der Arten. **Hering**, p. 339. — *venialis* Walk., *rectistrigosa* Snell., *trebusalis* Walk., *bilinealis* Hamps. u. *sanitalis* Snell. Bemerk. Fundorte (Sumatra). p. 339—343. — *exigua* (Butl.) Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 453.
 Neu: *floridalis* **Fernald**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 49 (Palm Beach).
- Margaronia* nilgirica Hamps. (für Sumatra neu) **Hering**, p. 254—255. — *glaucaulis* Gn., *amphitritalis* Gn., *annulata* F., *fraterna* Moore, *picticostalis* Hmps. p. 255—258.
 Neu: *lucretia* **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 137—138 ♂ (Solomon Islands).
- Maruca* testulalis (Hüb.) Verbr. **Leech** (2) p. 482.
 — Hb. u. *amboinalis* F. et R. **Hering**, p. 310.
- Mecyna* prunipennis Butl. (Japan). **Leech** (2) p. 488.
- Megasia barettae* **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 557 Taf. LVII Fig. 17 (Südafrika).
- Melissoblaptes bipunctatus* Curt. (Europa-Yesso) **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 385.
 Neu: *fuscolumbella* **Ragonot**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 485 Taf. XLVI Fig. 11 (Nordamerika). — *variegatella* **Hampson**, t. c. p. 486 Taf. LIV Fig. 19 (Borneo).
- Melitene bifidella* **Leech** (Japan) **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 411—412.
- Meroctena tullalis* Walk. Bemerk. für Sumatra bislang nicht bekannt. **Hering**, p. 223—225.
- Mescinia* n. g. **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 83. — *discella* p. 84 Taf. XLIX Fig. 1 (Jalapa).
- Mesciniadia* n. g. (Type: *infractalis* Walk.) **Hampson**, Romanoff Mém., vol. VIII p. 121 Taf. XLVIII Fig. 7.
- Mesciniodes* n. g. Phycitinarum **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 27. — *subinfractalis* p. 27 Taf. XLVIII Fig. 6 (Borneo).
- Mesolia tenebrella* Hmps. Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 398—399.
- Metachrysis* n. g. Galleriinarum **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 504 Taf. LIII Fig. 17 (Fergusson Isl.).
- Metallosticha* n. g. (Type: *Myelois argyrogrammos*) **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 69.
- Metaraphia* n. g. Galleriinarum **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 494. — *postluteella* p. 495 Taf. LV Fig. 2 (Borneo).
- Metasia hodiusalis* (Walk.) Syn., Verbr. **Leech** (2) p. 489. — *paganalis* p. 489 Taf. XV Fig. 6 (W. China: Ta-chie-lu, Pu-tsu-fong). — *vicanalis* **South, R.** p. 489—490 ♂ Taf. XV Fig. 8 (Centr. u. W. China, Moupin, Ichang). — *morbidalis* **Leech** p. 490 ♂ (W. China, Ta-chien-lu).
- Metasiodes heliaula* Meyr. Syn. Bemerk. **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 137 (Burma, Shan States).

- Metephestia* n. g. (Type: *simplicula* Zell.) **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 87.
- Meyrickia* n. g. (Type: *Heteromicta latro* Zell.) **Ragonot**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 456 Taf. XLVI Fig. 8.
- Meyrickiella* n. g. (Type: *Hypophana homosema* Meyr.) **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 86 Taf. XXVI Fig. 15.
- Microchlora* n. g. *Galleriinarum* **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 468. — *eariasella* p. 468 Taf. LIV Fig. 13 (Celebes).
- Mimorista* Warr. Bemerk. z. Gatt. Ergänzt zur Beschr. **Hering**, p. 109—110. — *miltocrystalis* Hampson für Sunda-Fauna neu p. 110.
- Moodna bisinuella* **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 268 Taf. XLIX Fig. 13 (Orizaba). — *olivella* p. 268 tab. cit. Fig. 12. — *elongatella* p. 269 tab. cit. Fig. 14 (Orizaba).
- Musotima nubilalis* **South, R.**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 435 Taf. XIV Fig. 27 (Centr. China: Changyang)
- Myelois cribrella* Hübn. Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 409—410.
rosella. à Rocheford, für Belgien neu, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 44 p. 260.
cribrum Schiff. Biologisches. **Sorhagen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 297.
- Nacoleia* **Leech** (2) giebt. Syn. u. Fundorte folg. Sp.: *paeonialis* (Walk.), *tristri-*
alis (Brem.), *pallidinotalis* Hampson, *vulgalis* (Guen.), *diemenalis* (Guen.),
fusalis (Warr.), *tampiusalis* (Walk.), *marionalis* (Walk.), *commixta* (Butl.)
u. *subargentalis* (Snellen) p. 458—4.
Neu sind: *immundalis* **South, R.**, p. 460 Taf. XV Fig. 4 (Chang-yang, Ichang).
— *ochrimaculalis* p. 460—461 Taf. XV Fig. 28 ♀ (Ichang). — *satsumalis*
p. 461 (Kiu-schiu, South Japan). — *maculalis* (nahe verw. m. *commixta*,
haupts. versch. durch die Form der Querlinien d. Vfgl. u. die
centraleu Linien d. Hfgl.) p. 462 ♂ ♀ Taf. XIV Fig. 7 (Chang-yang,
Omei-shan u. Moupin).
- Nacoleia gratalis* **Synon. Bemerk. Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 137 (Java).
- Nagia incomitata* zu Chalcidoptera gezogen. **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 25.
- Nephoteryx bicolorella* **Leech**, *hostilis* Steph., *rubrizonella* Rag., *semirubella* (Scop.) u. *ocelliferella* Rag. Liter. Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 407—408. — *similella* Zuck. für Schwedens Fauna neu. **Lampa, Sven**, Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 248. — *spissicella* F. u. ? *rhenella* Zck. *Biolog. Notiz, nebst Beschreib. der Raupe der letzt.* **Sorhagen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 279. — *hostilis* Stph. u. *albicella* H.-S. *Biolog. u. Raupen-Beschr.* p. 296—297.
Neu: *ephestiella* **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 257 ♂ (Nassau).
- Neurophyseta calla*. **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 153 Taf. VI Fig. 14 (Trinidad: Tabaquite).
- Nevrina procopia* Cram. weit verbreitet u. konstant, auf Sumatra anscheinend selten. **Hering**, p. 234.
- Nistra* Walk. Stellung. **Hering**, p. 320. — *barcealis* Walk. u. *caelatalis* Walk. p. 320—321.

- Nomophila noctuella (Schiff.) Synon.; Verbr. (Kosmopolit). **Leech** (2) p. 483. — von Wei-Hai-Wei. **Fletcher**, The Entomologist, vol. 34 p. 200. — noctuella S. V. in S. Amer. **Therese von Bayern**, p. 287.
- Nonia* n. g. (Type: *Homoeosoma exiguella* Rag.). **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 260 Taf. XLIX Fig. 7.
- Nosophera semitritalis* (Led.) Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 455. — *scotaula* Meyr., *triguttalis* Warr. Abweich. der Stücke von der Beschr. **Hering**, p. 285–286. Letzt. Stücke gehören nach Swinhoe's Cat. East. Heter. 1900 wohl zu *Nos. chironalis* Walk.
- Numonia homoeosomidia*. **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 511 Taf. LII Fig. 24 (Malayische Halbinsel).
- Nyctegretis triangulella*. **Ragonot**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 29 Taf. XLIII Fig. 17 (Japan). — *triang. Rag.* Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 405. — *achatinella* H. Biologisches. **Sorhagen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 297.
- Nymphula*. **Leech** bringt in den Trans. Entom. Soc. London, 1901 Liter., Fundorte u. s. w. zu folg. Spp.: *interruptalis* (Pryer), *fengwhanal* (Pryer), *floralis* (Leech), *foedalis* (Guen.), *turbata* (Butl.), *sinicalis* Hamps., *crisonalis* Walk., *responsalis* Walk. u. *vitalis* (Brem.) p. 432–434. — Neu: *incurvalis* R. S. (verw. m. *diminutalis* Snell.) **South**, t. c. p. 434 ♂ (Ichang).
rivulalis Desp. für Schwedens Fauna neu. **Hofgren, Gottfr.**, Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 245–246.
- Odontarthria subfuscella*. **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 522 Taf. LV Fig. 24 (Queensland).
- Oligochroa atrisquamella*. **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 551 Taf. LVII Fig. 19 (Queensland).
Neu: *gaymeri* (O. terrella u. subterrella Rag. von Natal u. Senegambien am nächsten, doch blasser, zarter etc.). **Rothschild, N.**, Nov. Zool. Tring, vol. 8 p. 434 ♂ (Assouan).
- Oligostigma corculina* Butl., insectale Pryer u. bifurcale (Pryer). **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 436. — *eromenalis*: Synonymie. **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 135.
eromenalis Snell. (Celebes, Philippinen; Queensl.) Austral. (Hmps. stellt diese Sp. zu *Ambia ptoleucalis* Wlk., was zu korrigiren ist). **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8. p. 135.
Neu: *sanguinisecta* (sehr schönes kleines Lepid.). **Swinhoe**, t. c. p. 25 ♂ (Sarawak, Borneo).
- Omiodes* Gn. Stell. der Gatt. **Hering**, p. 290. — *analis* Snell. nebst var. *albociliata* Moore, *crithonalis* Walk. u. *schediusalis* Walk. p. 291–292.
- Omphalocera hirta*. **South** in **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 428 — 429 Taf. XV Fig. 11 (Chow-pin-sa, Omeishan, Kiukiang, Gensan).
- Omphalophora* n. g. Galleriinarum. **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 427. — *rubrella* p. 428 Taf. LIII Fig. 13 (Java).
- Omphisa anastomosalis* (Guen.) Verbr. **Leech** (2) p. 478; Beschr. etc. **Hering**, p. 311–312.
- Orobena extimalis* Sc. u. *straminalis* H. Biolog. Notiz Grabow's, resp. Beschr. d. letzt. Sp. **Sorhagen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 244–245. —

- externalis (margaritalis) in Suffolk. **Sparke, E. G. J.**, The Entomologist, vol. 34 Oct. p. 296.
- Orocrambus thymiastes*. **Meyrick**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 567 ♀ (West Plains, Invercargill, New Zealand).
- Orthaga icarusalis* Wlk. Beschreib. **Hering**, p. 29—30 (Sumatra). — *olivacea* (Warr.), *achatina* (Butl.), *onerata* (Butl.), Verbr. etc. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 416—417. — Neu: *basalis* R. S. p. 417 (Japan; Kiushiu; Corea).
- Orybina regalis* (Leech) Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 432.
- Osakia* n. g. *Anerastinarum*. **Ragonot**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 318. — *lineolella* p. 319 Taf. XLIII Fig. 21 (Japan). — *lineolella* Rom. Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 403.
- Oxybia* n. g. (Type: *Tinea transversella* Dup.). **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 110.
- Oxydista* n. g. (*Sandrabatis nahe*). **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 535. — *hyperythrella* p. 535 Taf. LVI Fig. 18 (Australien).
- Ozamia* n. g. (Type: *Trachonitis* Walk.). **Ragonot**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 34 Abb. Taf. XXXII Fig. 11.
- Pachyarches marinata* F. (Sumatra). **Hering**, p. 247—248. — Eine Anzahl von Stücken von Fergusson, St. Aignan, Austral., Queensland, Neu Guinea, Stephansort weicht ab, falls neu so: *advena* n. sp. p. 248.
- Pachyzancla* Meyr. Bemerk. über Wert u. Umfang d. Gatt. **Hering**, p. 102. — *licarisalis* Walk. p. 102—104. — *stultalis* Walk. p. 104—105, *basistrigalis* Walk. nach Hering's Ansicht nur eine unwesentlich verschiedene Form ders. — *philealis* Walk., *deformalis* Snell., *mutualis* Z., *cynaralis* Walk. Bemerk. dazu, Vergleiche etc. p. 105—108. — *mimeticalis* p. 108—109 ♂ ♀ Taf. I Fig. 21 (Sumatra, Sinabong, ca. 5000'). — *distincta*. **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 156—157 Taf. VI Fig. 20 (Trinidad: Tabaquite).
- licarsisalis* (Walk.). Verbr. **Leech** (2) p. 483. — *aegrotalis* (Zell.), *marginalis* Warr., *indistincta* (Warr.) u. *stultalis* (Walk.) p. 484.
- submarginalis* (von *hipponalis* Walk. ganz verschieden). **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 26 ♂ (Sarawak, Borneo).
- Pagyda* Walk. Bemerk. zur Gatt. **Hering**, p. 219. — *salvalis* Walk. p. 219—220. — *amphisalis* Walk. scheint weit verbreitet zu sein p. 220. — *quadrilineata* Butl. ist wohl nur eine unerhebliche Var. von *amphisalis*, geringfügige Unterschiede p. 221. — *paesalis* Walk. (von Riesen vor dem Erscheinen der Swinhoe'schen Arbeit als *metallifera* n. sp. beschrieben) p. 221—222. — *botydalis* Snell. p. 223. — *auroralis* Moore p. 223 (für Sumatra bislang nicht bek.). — *pulverulenta*. **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 136 ♂ (Khasia Hills). — *salvalis* Walk., *amphisalis* Wlk. u. *quadrilineata* Butl. Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 451—452.
- Paliga* (Scopula) *inclusalis* Wlk. Fundorte etc. **Therese von Bayern**, p. 287.
- Pannucha subbasalis* (zur Abt. B der Hampson'schen Klassifik. Tr. 1896 p. 476. Unterabth. b). **Hering**, p. 30—31 Taf. I Fig. 5 (Borneo; Sumatra). — *fumida* (mit *O. basalis* Moore vergleichbar etc. — Gehört in Hamps. Sect. I. B Unterabth. b). p. 32—33 Taf. I Fig. 6 (Sumatra).
- Paralipsa decolorella*. **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 474 Taf. LV Fig. 3. — *erubella* p. 475 Taf. LIII Fig. 20 (beide von Fergusson Island).

- Paramatta* n. g. (Type: *ensiferella* Meyr.) **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 366 Taf. XXXIX Fig. 2.
- Paraphomia* n. g. Galleriinarum. **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 501. — *vinctella* p. 502 Taf. LV Fig. 1 (Australien etc.). — *natalensis* p. 502 Taf. LV Fig. 5.
- Paraphycita* n. g. Galleriinarum. **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 451. — *epiperckiella* p. 451 Taf. LIII Fig. 9 (Timor).
- Parazanclodes* n. g. Galleriinarum. **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 490. — *chrysaugella* p. 490 Taf. LIII Fig. 18 (Neu Guinea).
- Parbattia latifascialis*. **Leech** (2) p. 482—3 Abb. Taf. XV Fig. 17 (Pu-tsu-fong, Omeishan).
- Paroxyptera* n. g. (Type: *Achraea fliella* Saalm.) **Ragonot**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 503 Taf. XLV Fig. 24.
- Paracme racilialis* (Walk.) Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 424.
- Paralipsa modesta* Butl. (Japan, W. China) u. *gularis* Zell. (Bhutàn; Japan). **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 386.
- Parapoynx stratiotata* L. Biologisches u. Beschr. d. Raupe. **Sorhagen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 277.
- Paratalanta ussuralis* (Brem.) Syn., Verbr. **Leech** (2) p. 497.
- Parthenodes prodigialis* (Leech), *distinctalis* (Leech), *sutschana* Hampsn., *stellata* Warr. Verbr. etc. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 438—439. — Neu: *triangularis* p. 438 ♂ Taf. XIV Fig. 26 (W. China: Moupin). — *pallidalis* p. 439 ♀ Taf. XIV Fig. 29 (Centr.-China: Ichang).
- Patagonia* n. g. (Type: *Hom. magellanella* Rag.) **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 226 Taf. XXXIII Fig. 25.
- Patania floccosa* **Hering** p. 100—102 ♂♀ Taf. I Fig. 19, 19a (Sumatra).
- Patissa fulvosparsa* Butl. Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 401.
- Pectinigera nigritella* **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 353 Taf. XXXVII Fig. 13 (Westafrika). — *paranensis* p. 355 Taf. LV Fig. 6 (Brasil).
- Pempelia obductella* F. R., VIII, im Popradthal. **Schille** (1).
- Peribona venosa* Butl. Snellen hat sie als *Peribona* beschr., die er zu *Ulopeza* stellt. **Hering** p. 230.
- Perophora magnapuncta* **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 157 Taf. VI Fig. 10 (Trinidad: Tabaquita).
- Phalangiodes pueritia* Cram. Benennung etc. **Hering** p. 235—236. — *euroalis* Swinb. p. 236.
- Phlyctaenia rubigalis*. Biologie. Schaden. **Chittenden**, Bull. U. S. Departm. Agric. Entom. vol. XXVII p. 7—19. — *ferrugalis*. Biologie. **Fletcher & Gibson**, Canad. Entom. vol. 33 p. 140—144.
- Phlyctaenodes* Hb. (Eurycreon Ld.) *sticticalis* L. Beitrag zur Biologie. **Schille, Fr.**, Societ. Entom. 16. Jhg. No. 14 p. 105.
- sticticalis* L. für die man bisher nur *Artemisia campestris* als Futterpflanze kannte, hat nach *Raciborski* im östl. Theile von Galizien grossen Schaden in Kleefeldern, Luzerne, Erbsen, Zuckerrüben u. Tabak angerichtet. Nach Insektenbörse, 18. Jhg. p. 338.
- **Leech** (2) giebt Fundorte nebst Verbr. an von folg. Sp.: *palealis* (Schiff.), *verticalis* Linn., *inornatalis* (Leech), *sticticalis* L., *turbidalis* (Treit.)

- u. umbrosalis (Warr.) Syn. u. Verbr. **Leech** (2) p. 485—486. — Neu: *confusalis* **South** in **Leech** p. 486 Taf. XV Fig. 2 (W. China: Chia-ting-fu, Chia-kou-ho u. Ta-chien-lu).
- Phycidicera Snell. Bemerk. zu Gatt. **Hering** p. 287—288. — *manicalis* Snell. p. 288—289. — *surrectalis* auf Sumatra bisher noch nicht gef., bek. von Assam, Ceylon, Java, Celebes.
- Phycita abietella (Schiff.), rubella (Hmps.) u. pryeri (Rag.) Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 410.
- Phycitopsis hemileucella Hmps. (Japan) **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 410.
- Pileocera sodalis (Leech), aegimiusalis Walk. u. chrysorycta Meyr. Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 442—443.
- Pilocrocis (Botys) imbrexalis Wlk. in S. Amer. **Therese von Bayern** p. 287. Neu: *Dohrmialis* **Hering** p. 289—290 Abb. Taf. I Fig. 26 (Sumatra). — *plumbilinea* **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 154 Taf. VI Fig. 4 (Trinidad, Tabaquita).
- Pionea forficalis L. Biolog. Bemerk. Grabow's. **Sorhagen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 244. — *flavofimbriata* Moore. Syn. Bemerk. usw. **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 138. — *aureolalis* (Led.) Syn. Bemerk. p. 138—139.
- **Leech** (2) bringt die Synom. u. Verbr. folg. Spp.: *albopedalis* (Motsch), *pandalis* (Hüb.), *inornata* (Butl.), *ferrugalis* (Hüb.), *verbascalis* (Schiff.), *genialis* (Leech), *albifimbrialis* (Walk.), *minnehaha* (Pryer), *lugubralis* (Leech), *orbicentralis* (Christ), *aurorina* (Butl.), *fentoni* (Butl.), *auratalis* (Warr.), *forficalis* L., *rubiginalis* (Hüb.), (?) *tritalis* (Christ.), *thyalis* (Walk.), u. (?) *tesselalis* (Motsch) p. 490—497. — Als neu beschreibt **South, R.**, t. c.: *pallidalis* (verw. m. *albopedalis* Motsch) p. 490—491 Taf. XV Fig. 22 (Omei-shan, Pu-tsu-fong). — *planalis* (verw. m. *prunalis* von Europa) p. 492 (W. China: Pu-tsu-fong). — *pseudocrocealis* (ähnelt *P. crocealis* Hüb., aber ist kräftiger, dunkler u. die Querlinien anders verlaufend) p. 492 Taf. XV Fig. 14 (Japan, Fushiki). — *puralis* (verw. mit *P. aureolalis* Led.) p. 493 Taf. XV Fig. 16 (Centr. China: Ichang). — *punctiferalis* p. 494 Taf. XV Fig. 23 (Centr. China: Ta-chien-lu). — *mendicalis* p. 494—495 Taf. XV Fig. 10 (W. China: Pu-tsu-fong).
- Neu ist ferner: *acutangulata* (versch. von *P. ochrealis* Moore, mit der sie in einzeln. Samml. verwechselt ist) **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 26—27 ♂ (Jaintia Hills).
- Platytes *sinuosellus* R. S. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 395—396 ♂ Taf. XIV Fig. 8 (W. China: Chow-pin-sa). — *interruptella* (Walk.) Bemerk. zu den Typen p. 396.
- Plodia interpunctella Hüb., für Schwedens Fauna neu. **Hofgren, Gottfr.**, Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 242—243.
- Polyocha *flagrantella* **Ragonot**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 323 Taf. XLIV Fig. 24 (Madagascar).

- Polythlipta liquidalis* Leech Verbr. **Leech** (2) p. 475. — *maculalis* p. 475—476 ♂ Taf. XV Fig. 3 (C. China: Ichang). — *ossealis* Led. Fundorte. **Hering** p. 236.
- Poujadia verecundella* **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 347 Taf. XXXVII Fig. 2 (Columbien).
- Prasinoxena bilineella* **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 500 Taf. LIV Fig. 17 (Amboyna).
- Prionopteryx marmorellus* **South** in Leech, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 399 ♀ Taf. XIV Fig. 24 (Ta-chien-lu).
- Pristarthria caustella* **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 548 Taf. LVII Fig. 13 (Südafrika).
- Proboscidophora tritonialis* Walk. Charakt. der Palpen etc. **Hering** p. 33—34. (Sumatra — bisher nur Borneo).
- Proceratia* n. g. Phycitinarum **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 197. — *caesariella* p. 197 Taf. XLII Fig. 15 (Syrien).
- Prooedema incisalis* Walk. (Khasis; Sumatra) **Hering** p. 236—237.
- Propachys nigrivena* Walk. Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 431.
- Prorodes mimica* Swinh. (Sumatra). **Hering** p. 294—295.
- Prosthenia* n. g. Galleriinarum **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 450. — *psitacolella* p. 450 Taf. LIV Fig. 11 (Singapore).
- Protithona* wohl mit *Epiblemma* zu verschmelzen. **Meyrick**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 578.
- Psammotis lancealis* (Schiff.) Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 444.
- Psorosa myrmidonella* **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 103 Taf. XLIV Fig. 7 (Accra). — *albunculella* p. 106 Taf. XIX Fig. 4 (Amasia). — *flavifasciella* p. 106 Taf. XXIX Fig. 2 (Cintra). — *tergestella* p. 107 Taf. L Fig. 2 (Triest).
- Ptyonocera* n. g. (Piesmopoda nahe). **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 526. — *atrifusella* p. 526 Taf. LI Fig. 16 (Gambien).
- Pycnarmon jaguaralis* Gn. (Sumatra). **Hering** p. 331.
- Pyralis pictalis* Curt. (scheint in Grösse u. Färb. zu variiren. — Fundorte) **Hering** p. 34—35. — *revolalis* Walk., *manihotalis* Gn., *regalis* Schiff. (letz. mutmassl. an die Reiskultur gebunden u. bisher noch nicht von Sumatra bek.) p. 35. Bemerk. dazu.
- farinalis* L., *pictalis* Curtis, *manihotalis* Guen. u. *regalis* Schiff. Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 422—424. — Neu: *moupinialis* p. 413 Taf. XIV Fig. 19 (W. China: Moupin).
- Verwüstungen einer Pyralide in Beaujolais. **Gastine, G. et V. Vermorel**. Vertilgungsmittel durch Acethylengas. Compt. rend. Acad. Sci. Paris, T. 133. No. 13 p. 488—491. — Extr. Revue Scientif. (4) T. 16. No. 14. p. 438—439.
- Neu: *nigrapuncta* **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 152 Taf. VI Fig. 15 (Trinidad, Tabaquite).

Pyrausta. Schrank. Syst. Bemer. **Hering** p. 49. — *abruptalis* Walk. p. 49—50. — *ruoralis* Warr. p. 50 (bisher nur von Indien). — *fracidalis* p. 50—51 Taf. I Fig. 9 ♀ (Sumatra). — *aureolalis* Led. Besch. p. 51—52 (von Sum. bisher nicht bek.). — *ochrealis* Moore Besch. p. 51. — *subcrocealis* Snell., *celatalis* Walk., *ferrifusalis* Hmps. Bemer. dazu p. 52. — *quadrigalis* p. 53—54 ♂♀ (bildet gewissermassen mit *celat.*, *ferrif.* u. *subcroc.* ein Viergespann). Taf. I Fig. 12 (Sumatra). — *retostalis* p. 54—56 ♂♀ Taf. I Fig. 13 (Sumatra). — *coclesalis* Walk., *fuscicostalis* Swinh. p. 56—57. — *abdicatrix* p. 57—58 ♂ Taf. I Fig. 10 (Sumatra). — *byrrhalis* (zur *celatalis* Gruppe) p. 58 ♂ (Sumatra). — *profusalis* Warr. p. 60—61. — *coorumba* Hamps. p. 61. — *ravalis* p. 59—60 ♂♀ (Sumatra u. Malacca, Perak). — *amboinalis* Pagenst. p. 60. — *occulitilinea* Walk. Bemer. (Sumatra, bish. nur Nordindien u. Borneo). — *eripisalis* Walk., *erratalis* Snell. Bemer. p. 61. — *ablactalis* Walk. u. *ausonialis* Snell. p. 62—63. — *ciniferalis* Walk. p. 63—64.

— **Leech** giebt in den Trans. Entom. Soc. London, 1901, Syn. u. Verbr. für folg. Spp.: *coclesalis* (Walk.), *diniasalis* (Walk.), *luctualis* (Hüb.), *suffusalis* (Warr.), *ocellalis* (Warr.), *varialis* (Brem.), *moderatalis* (Christ.), *gracilis* (Butl.), *flavalis* (Schiff.), *sanguinealis* (Warr.), *damoalis* (Walk.), *nubilalis* (Hüb.), *indistans* (Moore), *signatalis* (Walk.), *curvalis* (Leech), *memnalis* (Walk.), *cespitalis* (Schiff.), *syfanialis* (Oberth.), *sanguinalis* (Linn.), *tithonialis* (Zell.), *phoenicealis* (Hüb.), *discimaculalis* Hamps., *tibethalis* Oberth., *sikkima* (Moore), *bieti* Oberth., *chrysis* Butl., *unipunctata* Butl., *limbata* (Butl.), *assimilis* (Butl.), *astrifera* (Butl.), *pullatalis* (Christ), (?) *maenialis* (Oberth.) u. (?) *lineolalis* (Motsch.) p. 498—512. — Als neu beschreibt **South, R.** t. c.:

fuscobrunnealis (verw. m. *fuscalis* Schiff.) p. 498 Taf. XV Fig. 7 ♀ (C. China: Chang-yang). — *hampsoni* p. 498—499 Taf. XV Fig. 21 (W. China: Ta-chien-lu, Pu-tsu-fong). — *delicatalis* p. 499 Taf. XV Fig. 27 (W. China: Moupin, Omeishan, Ta-chien-lu). — *leechi* p. 501 Abb. Taf. XV Fig. 29 (W. China: Wa-shan). — *genialis* p. 501 Taf. XIV Fig. 16 (W. China: Chia-kon-ho, Pu-tsu-fong u. Wa-shan). — *griseocitialis* p. 501—2 Taf. XV Fig. 5 (W. China: Ta-chien-lu, Chia-ting-fu, Pu-tsu-fong, Chow-pin-sa). — *vicinalis* p. 502 Taf. XV Fig. 30 (Nagasaki; Chang-yang). — *moupinalis* p. 504 ♂ (W. China: Moupin). — *obstipalis* p. 504 Taf. XIV Fig. 10 (W. China: Ta-chien-lu). — *pygmaealis* (verw. m. *machaeralis* Walk.) p. 505 (Centr. China: Ichang). — *contigualis* Taf. XIV Fig. 23 (nahe verw.; mit *sanguinalis* L., doch grösser; die Binden der Vflgl. sind breiter, die Ränder in der Kontur unregelmässiger; die Aussenbinde weiter vom Rande entfernt) p. 506 (W. China: Moupin). — *rufalis* p. 507 Taf. XIV Fig. 12 (W. China: Ta-chien-lu). — *quadrimaculalis* (möglicherweise eine Form von *rufalis*) p. 507—508 Taf. XIV Fig. 13 (W. China: Chia-kou-ho). — *oberthuri* (von *tibethalis* Oberth. versch. durch blässere u. schmalere Querlinien) p. 508 Taf. XIV Fig. 11 (W. China: Ta-chien-lu). — *mandarinalis* (steht *sikkima* sehr nahe, doch das Abdom. nicht orange geringelt u. die postmediale Zeichn. verschieden) p. 509 Taf. XIV Fig. 18 (W. China: Ta-chien-lu). — *tortualis* p. 509—510 Taf. XIV Fig. 17 (W. China: Chow-pin-sa, Ta-chien-lu). — *punctilinealis* p. 510 Taf. XIV Fig. 14 (W. China:

Ta-chien-lu). — *mundalis* p. 511—512 Taf. XV Fig. 19 (Centr.-China: Chang-yang). — *postalbalis* p. 512 Taf. XV Fig. 13 (W. China: Ta-chien-lu, Chia-kou-ho).

terrealis Treitsch. u. *commixtalis* Walk. für Schwedens Fauna neu. Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 247—248.

Neu ausser den vorerwähnten Arten noch:

costimaculalis Fernald, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 50 (Florida).

Ravanoa xiphialis Walk. Hering, p. 328 (Sumatra).

Rehimena striolalis Snell. Hering, p. 230. — *pallidicostalis* Warr. p. 231. — *phrynealis* Walk. p. 231—232.

Rehimena phrynealis (Walk.) Verbr. Leech, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 448—449. — *straminealis* R. South in Leech, t. c. p. 449 Taf. XIV Fig. 21 ♂ (Central-China: Chang-yang).

Rhacodia sp. in Laerdal, für Westlandet neu. Strand, Nyt Mag. etc. 39. Bd. 1901 p. 66.

Rhimpalea. Bemerk. z. Gatt. Hering, p. 335—336. — *ommatalis* Snell., *heranialis* Walk. von Sumatra. Bemerk. etc. p. 336—338.

Rhodochrysa n. g. Hampson, Romanoff Mém. vol. VIII p. 387. — *superbella* p. 387 Taf. XXXIX Fig. 25 (Natal).

Rhodophaea encaustella (Rag.), *scabrilineella* (Rag.), *tokiella* (Rag.), *dichromella* (Rag.), *bellulella* (Rag.), *holandella* (Rag.) Liter., Verbr. Leech, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 412—413.

semiustella Hampson, Romanoff Mém. vol. VIII p. 518 Taf. LV Fig. 16 (Madagascar). — *melanoplaga* p. 519 tab. cit. Fig. 18 (Brasilien).

Sacada Walk. Bemerk. zur Synonymie. Hering, p. 39—40. — *decora* Walk. Besch. p. 40. — *flexuosa* Snell. p. 40—41 (Sumatra, bisher nur aus dem nordöstl. Indien bek.) — *pusilla* p. 41—42 Taf. I Fig. 8 (Sumatra).

approximans (Leech), *fasciata* Butl. Verbr. Leech, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 429—430. — Neu: *contigua* (nahe verw. mit *discinota* Moore, versch. durch bandähnl. Charakter des centralen Feldes der Vflgl. u. die dunkl. Hflgl. mit scharf gezeichneter Postmediallinie) p. 430 Taf. XV Fig. 20 (W. China: Pu-tsu-fong, Moupin).

Neu: *ceroprepiella* Hampson, Romanoff Mém. vol. VIII p. 550 Taf. LVII Fig. 16 (Queensland).

Salebria semirubella Scop. var. *sanguinella* Hübn. Hofgren, Gottfr., Entom. Tidskr. 22 Årg. p. 244—245, für Schwedens Fauna neu.

Salinaria n. g. (Type diffusella Chr.) Ragonot, Romanoff Mém. vol. VIII p. 11.

Saluria tripartitella Hampson, Romanoff Mém. vol. VIII p. 359 Taf. XXXIX Fig. 19 (Natal). — *dichroelia* p. 363 Taf. XXXIX Fig. 1 (Australien).

Samaria ardentella Rag. Verbr. Leech, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 409. Neu: *micaceella* Hampson, Romanoff Mém. vol. VIII p. 516 Taf. LV Fig. 12 (Borneo).

Samea (?) *fumidalis* Leech (Kiuschiu). Leech, Trans. Entom. Soc. London 1901, p. 453.

Sameodes bistigmalis (Pryer) Verbr. Leech (2) p. 477. — *cancellalis* Z. Hering, p. 109 (weitverbreitet — auch auf Sumatra).

- Schoenobius dodatellus* (Walk.), *gigantellus* (Schiff.), *lineatus* (Butl.), *bipunctifera* (Wlk.) Litter. u. Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 402—403.
- forficellus* Thub. Biologisches u. Beschr. d. Raupe. **Sorhagen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 277.
- Scirpophaga chrysoorhoa* Zell. Syn., Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 401. — *auriflua* Zell. u. *excerptalis* desgl. p. 401—402.
- Scopariinae*, von Sumatra noch keine bekannt. **Hering**, p. 48. Liegt wohl an der Fangweise; Erbstorfer hat von West Java mehr als 12 versch. (u. wohl neue) Sp. erbetet.
- Scoparia dubitalis ab. alba* n. Bemerk. **Knaggs**. — **Tutt** (Titel p. 641 sub No. 4 des vor. Berichts).
- ambigualis* (Treit.), *truncicolella* (Staint.), *murificalis* Walk., *congestalis* Walk. u. *vinotinctalis* Hampson Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 445—446.
- cerubrae* Haw. u. *murana* Curt. var. *tuoniana* Hoffm. für Schwedens Fauna neu. **Hofgren, Gottfr.**, Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 246—247.
- crataegella* H. Beschr. d. Raupe. **Sorhagen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 243.
- Neu: *torodes* (offenbar am nächsten verw. mit *S. philetaera* u. *S. periphanes*, doch deutlich verschied.) **Meyrick**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 568—569 ♂ (New Zealand: Mount Cook). — *parachalca* (sehr eigenartig, wahrsch. mit *S. organaea* verw.) p. 569 ♂ (Mount Cook, 2500'). — *organaea* (wahrsch. verw. mit *S. epicremna* durch die Form der Linien, aber bei org. sind sie stark u. schwarz, bei ep. ist d. 2. Linie weiss, ohne schwarzen Saum) p. 569—570 ♂ (Mount Cook, 2500'). — *alopezias* (offenbar verw. m. *S. axena*, doch gut unterscheidbar) p. 570 ♂ ♀ (Mount Cook). — *chalara* (nahe verw. m. *octophora*, mit der sie verwechselt werden könnte, doch verschieden durch die bleiche Färb., viel geradere 2. Linie d. Vflgl. und Fehlen des terminalen Anflugs d. Hflgl. *S. legnota* ist viel kleiner, weisser u. deutlich gezeichnet) p. 570—571 ♂ ♀ (Mount Cook).
- anisophragna* **Lower**, Trans. Roy. Soc. S. Austral. vol. XXV p. 67 (N. S. Wales).
- Scotomera wollastoni* (scheint *tacapealis* Rag. von Gabes, Tunis, ursprüngl. als *Stemmatophora* beschr., am nächsten zu stehen, kann eventl. das ♀ ders. sein) **Rothschild, N.**, Nov. Zool. Tring vol. 8 p. 433—434 ♀ (Shendi).
- Selagia argyrella* (S. V.) für Schwedens Fauna neu. **Hofgren, Gottfr.**, Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 244. — *argyrella* (F.) u. *janthinella* (Hübner). Verbreit. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London 1901 p. 408—409.
- Setiostoma* siehe *Tineidae*.
- Siculodes rufifimbria* **Warren**, Nov. Zool. Tring vol. 8 p. 435—436 ♀ (Chiriqui, Panama).
- Simaethistis leechi* **South, R.** in **Leech** (2) p. 513 Abb. Taf. XV Fig. 24 (W.-China: Wa-shan, Ta-chien-lu).
- Spilodes palealis* at Folkestone. **Hills, Stuart S.**, Entom. Record vol. 13 No. 11 p. 334.

- at Romford. **Claxton, W.**, The Entomologist vol. 34 Dec. p. 353.
- in North-west Kent. **Bower, B. A.**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) Febr. p. 45.
- Statia* n. g. Galleriinarum **Ragonot**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 443. — *chlorella* p. 444 Taf. XLV Fig. 14 (Peru).
- Statina punctilineella* **Hampson**, t. c. p. 416 Taf. LII Fig. 13 (Brasilien). — *bifasciella* p. 416 tab. cit. Fig. 8 (Texas)
- Staudingeria calcariella* **Ragonot**, t. c. p. 135 Taf. XXVIII Fig. 13 (Nordafrika). — *myosella* p. 137 Taf. XXVIII (Rotes Meer).
- Stemmatophora albigitata* (Warr.), *bicoloralis* (Leech), *valida* Butl. Verbreit. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 424—425. — Neu: *bilinealis* **South** in **Leech** p. 424 ♂ (Centr.-Chin.: Ichang).
- Steniodes* Snell. **Stell. Hering** p. 317. — *marionalis* Walk. p. 318.
- Stericta carneotincta* Hmps. Sumatra, bish. nur Sikkim u. Pulo Laut. Bemerk. zur Beschr. **Hering** p. 27. — *Dohrni* (vor. verwandt) p. 27—29 Taf. I Fig. 4 (Sumatra).
- divitalis* Gn. Beschr. **Hering** p. 20. — *sectilis* (sehr ausgezeichnete Sp.) p. 21—22 ♂ ♀ Taf. I Fig. 2 (Sumatra; Pulo Laut). — *ambifaria* (? *asopialis* Snell. Tr. 1890) p. 22—25 ♀ (Sumatra).
- haraldusalis* Walk. Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London 1901 p. 416.
- Stylobasis* n. g. Phycitinarum **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 163. — *rubripurpurea* p. 168 Taf. XLIX Fig. 19 (tropisches Amerika).
- Stylopalpia* n. g. Phycitinarum **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 257—258. — *luniferella* p. 258 ♀ (Jamaica, Bahamas, Nassau).
- Sudania* n. g. Anerastinarum **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 380. — *subcostella* p. 381 Taf. LI Fig. 11 (Westafrika).
- Sufetula* Walk. Stellung der Gatt. **Hering** p. 343. — *melanophthalma* p. 343 Taf. I Fig. 27 ♂ ♀ (Sumatra).
- Sylepta* Hb. **Hering's** Fass. der Gruppe in der Led.'schen Bedeut. Coptobasis. **Hering** p. 65. — *scinisalis* Walk. p. 65—66. — *sellalis* Gn., *fabiussalis* Walk., *imbecilis* Moore, *unitalis* Gn. Bemerk. u. s. w. p. 66—68. — *satanas* p. 69—70 ♂ ♀ Taf. I Fig. 14 (Sumatra, S. Japan). — *derogata* F., *ultimalis* Walk., *ruricolalis* Snell. (Bemerk.) p. 71—73. Vergl. mit *sublitalis* Walk., *imbutalis* Walk. etc, wonach sich die Unterscheidung der fragl. Arten so gestaltet:
- | | | |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1. <i>ruralis</i> Scop. Snell. | 2. <i>imbutalis</i> Walk. | 4. <i>ruricolalis</i> Snell. |
| var. <i>dubia</i> Hmps. | 3. <i>sublitalis</i> Walk. | ? <i>sabinusalis</i> Walk. |
- ruralis* Scop., *mysisalis* Walk., *Renidata* F. u. *atemptalis* Snell. Charakt., Vergleiche etc. p. 73—77. — *distinguenda* (nächst verw. m. *atemptalis* Snell.) p. 77—78 Taf. I Fig. 1b (Sumatra, Philippinen, Luzon). — *xuthusalis* Walk., *megillalis* Walk., *surusalis* Walk., *iopasalis* Walk., *orobenalis* Snell., *leopardalis* Moore, *fatualis* Led., *dissipatalis* Led., *violata* F. Bemerk. etc. p. 79—85. — *amyntusalis* Walk. var. (an spec. propria?) *aenigmatica* n. p. 85—88 ♂ ♀ Taf. I Fig. 17 (Sumatra u. Nord Borneo, Lawas). — *pyrantes* Meyr., *quaternalis* Zett., *recurrens* Moore, *pyrrhalis* Walk., *nigrilinealis*

- Walk., plutusalis Walk. Besch. etc. p. 88—91. — crocalis Hmps. Abweich. der Stücke von Sumatra, falls neu, dafür *iridescens* p. 91—93 ♂ (Sumatra). — *phalangioidalis* p. 93—94 ♂ Taf. I Fig. 15 (Sumatra).
- flavipennis* **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 155 Taf. V Fig. 7 (Trinidad: Tabaquite).
- Synclera traducalis* Z. (Sumatra). Bemerk. **Hering** p. 318—319.
- Syngamia* Gn. Umfang der Gatt. **Hering** p. 326. — *floridalis* Z. p. 327.
- falcidicalis* (Walk.) Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London 1901 p. 453—454.
- Syria agraphella* **Ragonot**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 203 Taf. XXXI Fig. 24 (Biskra). — *arenicola* p. 203 Taf. XXIII Fig. 10 (Marocco).
- Tabidia insanalis* Snell. Besch., Vergl. etc. **Hering** p. 322—323. — *craterodes* **Meyr.** p. 323.
- (?) *inconsequens* (Warr.) [1896] (= *Orphnophanes inconsequens* Hmps.) (Dawson, Queensland). Bemerk. z. Stellung. **Swinhoe**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 8 p. 136.
- Tachyptilia populella* Cl. sehr gemein im arkt. Norwegen: Aal. *ab. atra n.* hat einfarbig schwarze Vflgl. u. schwarzen Thorax; auch die Hflgl. ungemein dunkel. **Strand**, Nyt Mag. etc. 39. Bd. 1901 p. 71.
- Talanga* Moore. Stellung. **Hering** p. 273. — *sexpunctalis* Moore, *sabacusalis* Walk. Besch. etc. p. 273—274.
- Tamraca torridalis* (Led.). Verbreit. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 426.
- Tasenia* n. g. (Conchylodes nahestehend) **Snellen**, Tijdschr. Entom. vol. XLIV p. 63. — *nigromaculalis* p. 64 (Java u. Philippinen).
- Tegulifera faviusalis* (Walk.). Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 424.
- Terastia egialealis* Walk., *meticulosalis* Gn. Bemerk. etc. **Hering** p. 312—313. *minor* **Koningsberger & Zimmermann**, Med. Plantentuin Java, 44. D. 2 p. 56 Taf. II Fig. 21, 22 (Java).
- Teratauxta* n. g. Hmps. (nom. i. lit.) *paradoxa* (höchst merkwürdig; habituelle Aehnlichkeit mit *Cataclysta*). **Hering** p. 345—348 ♂ Taf. I Fig. 28 (Sumatra).
- Teratomorpha darabatis* Snell. Beschreibung der Abweichungen von der Abb. **Snell's.** **Hering** p. 18—19 (Soekar).
- Terias hastiana* sehr variabel. Berlin. Entom. Zeitschr. 47. Bd. Sitz.-Ber. f. 1901. 26. Sept. — cf. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 341.
- Tetridia caletoralis* Walk. Besch. etc. **Hering** p. 310—311.
- Thliptoceras cascale* (Swinhoe). Verbr. **Leech** (2) p. 477.
- Thylacoptila cavifrontella* **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 547 Taf. LVII Fig. 11 (Malasia).
- Thyridopyralis* n. g. **Dyar**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 23. — *gallaerandialis* p. 23 (Florida).
- Thyris fenestrella*. „Hildesheimer Schmetterling“. Fundorte bei Hildesheim. Insektenbörse, 18. Jhg. p. 173.

- Tinerastia* n. g. (Type: *Menuthia fissirella* Hmps.) **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 414 Taf. LII Fig. 9.
- Tirathaba irrufatella* Rag. (Japan) **Leech**, Trans. Entom. Soc. London 1901. p. 387.
irrufatella **Ragonot**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 462 Taf. XLIII Fig. 26 (Japan). — *haematella* p. 463 Taf. LIV Fig. 21 (Aru).
- Tocolosida subolivalis* Snell. **Hering** p. 39.
rubriceps Walk. Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 429.
- Trachonitis capensis* **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 536 Taf. LVI Fig. 19 (Südafrika).
- Trachypteryx rubripictella* **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 558 Taf. LVII Fig. 23 (Südafrika).
- Trebania flavifrontalis* (Leech) u. *muricolor* Hmps. Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 430—431.
- Trichophysetis cretacea* Butl. Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 420. — *hampsoni* **South** in **Leech**, p. 420, ♀ Taf. XIV Fig. 28 (verw. m. *T. nigricincta* Hmps.) (Centr.-China: Ichang; Khásis).
- Tridesmodes ansorgei* (Untersch. von *ramiculata* Warr.) **Warren**, Nov. Zool. Tring. vol. 8 p. 6 ♂ (Mondo, Uganda).
- Tylostega* Meyr. Stellung etc. **Hering** p. 306—307. — *chrysanthes* Meyr. Vergleich etc. p. 307.
- Tyspanodes exathesalis* Walk. Diskussion. **Hering** p. 228—230. — *hypsalis* Warr. u. *striata* (Butl.). Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 455.
- Ulopeza idyalis* (Sumatra). **Hering**, p. 284—285.
- Unadilla stictella* **Hampson**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 255 ♂♀ (Nassau). — *latercula* (Zell. M. S.) p. 255 ♀ (Bonhote).
- Urbania* n. g. **Hampson**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 81. — *lophopterella* **Ragonot**, t. c. p. 81 Abb. Taf. XLVIII Fig. 81 (Natal).
- Yosemitia* n. g. (Type *S. graciella* Hulst) **Ragonot**, Romanoff Mém. vol. VIII p. 17.
- Zinckenia fascialis* (Cram.) Syn. Verbr. **Leech**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 449. — *perspectalis* Hb. u. *recurvalis* F. **Hering**, p. 324—325.

Tortricidae.

Autoren: Beutenmüller, Cecconi, Clark, Crombrugge de Picquendaele, Druce, Dyar, Fernald, Lower, Malloch, Meyrick, Schütze, Snellen.

Katalog: Staudinger & Rebel.

Anatomie des weiblichen Geschlechtsapparates: Stitz.

Microlepidoptera von Rumänien: Caradja.

Raupen zahlreicher Tortriciden Brandenburgs: Sorhagen.

Tortricidae u. Tineidae von Parish of Bonhill, Dumbartonshire;
Liste: Malloch.

Tortricidae von Asien. Walsingham (Fortsetz.).

Tortricidae siehe Pyralidae. **C. H. Fernald.**

Schädlinge in Japan. **Matsumura**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 21 sq. japan. Trivial-

Art:	name:	Futterpflanzen:	Verbreitung:
<i>Cacoecia rosaceana</i> Harris	Ringo-no-hamaki.	Apfel, Birne, Pfirsich, Kirsche, Rose, Crataegus	Japan, Nordamerika.
<i>Cacoecia sorbiana</i> Hüb.	Ohamaki	Apfel, (Maulbeere?), Birne, Crataegus.	Japan, Europa.
<i>Cacoecia podana</i> Scop.	Ato-kibane-hamaki	Apfel, Birne, Kirsche, Pflaume	Japan, Amur, Wladivostok, Askold, Europa.
<i>Cacoecia crataegana</i> Hüb.	Kuwa-ito-hiki-hamaki	Maulbeere	Japan, Europa.
<i>Cacoecia xylostean</i> L.	Kakumon-hamaki	Apfel, Birne, Pflaume	Japan, Europa.
<i>Pandemis heparana</i> Schiff	Sakura-no-hamaki	Apfel, Birne, Pflaume, Kirsche	Japan, Europa.
<i>Pandemis sinapina</i> Bufl.	Kimadara-hamaki	Apfel, Birne, Pflaume, Kirsche	Japan (Sapporo, Hakodate).
<i>Ptycholoma circumclusana</i> Christ.	Oginsuzi-hamaki	Kirsche, Apfel	Japan, Amur.
<i>Loxotaenia Ishidaii</i> Mats.	Itohiki-memushi	Maulbeere	Japan (Sapporo, Tokyo)
<i>Choristoneura diversana</i> Hüb.	Sumomo-hahakimushi	Maulbeere, Pflaume, Thee	Japan, Europa.
<i>Choristoneura lirata</i> Christ.	Ringo-hime-hamaki	Apfel, Kirsche, Pflaume, Birne	Japan, Amur.
<i>Argyrotoxa 5-fasciana</i> Mats.	Ginsuzi-hamaki	Kirsche	Japan, Sapporo.
<i>Retinia margarotana</i> H.-S.	Matsu-no-tsuzurimushi	Kiefer	Japan (Gifu), Europa.
<i>Grapholitha glycinivorella</i> Mats.	Mameno-sayamushi	<i>Glycine hispida</i> (sehr schädlich)	Japan (Sapporo, Tokio).
<i>Semasia phaseoli</i> Mats.	Sasage-tanemushi	<i>Phaseolus mungo</i> , <i>P. vulgaris</i> .	Japan (Sapporo, Tokio, Gifu).
<i>Sericoris morivora</i> Mats.	Kuwa-hoshi, memushi	Maulbeere, (sehr schädlich.)	Japan, Sapporo.
<i>Carpocapsa pomonella</i> L.	Ringo-ōshinkui	Apfel	Japan, Europa, N. Amerika.
<i>Tmetocera ocellana</i> Schiff.	Ringo-no-memushi	Apfel, Birne, Kirsche	Japan, Europa, N. Amerika.
<i>Exartema mori</i> Mats.	Kuwa-aomemushi	Maulbeere (sehr schädlich.)	Japan (Sapporo, Iwate).
<i>Ablebia osseana</i> Sc.	nebst <i>forma impunctana</i> n. (bei letzt. Stücken wird der deutlich dunkle Querastfleck vermisst.) Strand , Nyt Mag. etc. 39. Bd. 1901 p. 67 (im arktischen Gebiet überall häufig, auch in Tysfjorden).		
(<i>Sisona</i>) <i>albitibiana</i> .	Snellen , Tijdschr. v. Entom. 44 D. p. 69 Taf. V Fig. 2. — <i>delectana</i> tab. cit. p. 72 Fig. 1 (beide von Java).		

Acalla ferrugana Fr. in Spring (Broods). **Morton, K. J.**, Ann. Scott. Nat. Hist. 1901. Apr. p. 119.

(*Peronea*) *cristana* Fab. ist mit zahlreichen Synon., Aberr. u. Synon. zu denselben bedacht, Abb. von 24 Farben-Aberr. mit Litteratur u. Anzahl neuer Namen (jetzt 62 Aberr.) **J. A. Clark**, Entom. Record, vol. 13.

Adoxophyes trichroa **Meyrick**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 578 ♀ (Whangarei).

Anchyloptera myrtillana Tr. ziemlich variabel hinsichtl. Grösse u. Zeichn., weniger hinsichtl. Farbe. Kleinste Stücke 6 mm, grösste 9 mm. Die dunkle schräg-stehende Querbinde ist von höchst verschiedener Form, bald zusammenhängend, bald in Flecke aufgelöst Immer hat sie einen gegen den Apex gerichteten, im allgemeinen langen u. zugespitzten Zahn; zwischen diesem u. dem Irande geht bisw. ein anderer, kleinerer mehr gerundeter, gegen den Saum gerichteter Zahn aus, während dieser in and. Fällen fehlt, so dass die Binde in diesem Falle von einer geraden, auf dem Innenrande lotrecht stehenden Linie begrenzt wird. Diese letztere oder unidentate Form: *forma unidentata* n. scheint häufiger als die bidentate *forma bidentata* zu sein. Beide gehen gleichförmig in einander über, sodass viele Stücke mit gleichem Recht zu der einen oder zu der andern gerechnet werden können. — Bei *ab. distracta* n. ist der runde hervorspringende Zahn an d. Vseite des basal. Irandsflecks an einem Stück beinahe abgeschnürt: *ab. distracta* n. **Strand**, Nyt Magaz. etc. 39. Bd. p. 69.

Aspis udmanniana L. Grabow's Biol. u. Abb. derselben vortrefflich. **Sorhagen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 330.

Atteria Buckleyi. **Druce**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7. p. 439 - 440 ♂ (Ecuador, Intaj). — *maon* p. 440 ♂ (Ecuador, Chiguinda). — *splendens* (verw. mit *mimica* Feld. & Rog. u. A. violacea Butl.) p. 440 ♂ (Ecuador, Sarayacu). — *lydia* p. 440 ♂ (Ecuador, Chiguinda).

Byrsoptera n. g. (Dipterina nahest.) **Lower**, Trans. Roy. Soc. South Austral. vol. XXV p. 77. — *xylistis* p. 77 (Queensland).

Cacoecia piceana L. ♂. Teratolog. Stück. **Hampson**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 120.

postvittana Wlk. aus Raupen von importierten Aepfeln gezogen. Auch in Wellington importiert. **Meyrick**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 579.

Neu: *fervida* p. 572-573 ♂ (Kaitoka). — *orthopsis* p. 573 ♂ (New Zealand: Nelson a. Dunedin, Wellington). — *astrologana* Meyr. zu Wellington, ob importiert oder einheimisch?

Capua leptospila. **Lower**, Trans. Roy. Soc. S.-Austral. vol. XXV p. 74. — *pentazona* p. 75. — *panxantha* p. 75 (alle drei aus Australien).

Carpocapsa pomonella L. (Codling Moth). **Froggatt, Walt. W.**, Agric. Gaz. N. S. Wales vol. 12 P. 11. p. 1354-1363, with 1 pl.; **Fletcher, J.**, Canad. Entom. vol. 33 p. 216.

— Kurze Bemerk. z. Raupe. **Sorhagen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 330. — *splendana* H. Berichtig. eines früheren Irrtums bezügl. d. Verwechslung von *C. amplana* H. u. *splendana* H. Besch. d. Raupe. p. 331. — mehrjähr. Generation. Nachsehen der gegen sie angelegten Fallen in d. 2. Hälfte des Juli. **Goethe** in Bericht der Königl. Lehranstalt für Obst-, Wein- u. Gartenbau zu Geisenheim a. Rh. 12 Fig.

- Wiesbaden. 1900. — (Äpfeleckenlarven) in Schweden. Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 53. — Resultate der Experimente beziügl. des Schutzes der Äpfel gegen die 2. Generation. Mit 1 Fig. **Webster, E. M.**, 31. Ann. Rep. Entom. Soc. Ontario, 1900 p. 37—38.
- Cheimatophila tortricella* H. Grabow's Bemerk. Beschr. d. Raupe. **Sorhagen**, Allgem. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 314.
- Cochylis*, Intorno alla. Boll. Entom. Agrar. Patol. Veget. Ann. 8. 1901. No. 2. p. 36—37. — *ambiguella*. Un mezzo di lotta razionale contro la Coch. ambig. **Berlese, A.**, Boll. Entom. Agrar. Patol. Veget. Ann. 8 No. 7 p. 162—165. — *Metodo di lotta razionale contro la Cochylis ambiguella ed altri insetti*. **Berlese, A.**, Con 1 fig. t. c. No. 9 p. 205—210.
- Conchylis elongana* F. R. Biologie, Zuchtnotiz, Beschr. d. Raupe. **Sorhagen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 327. — *Smeathmanniana* F. Futterpfl., Bemerk. z. Raupe p. 327. — *roseana* Hw. Futterpfl. Beschr. d. Raupe p. 327. — *Geyeriana* H.-S. Futterpfl., Beschr. d. R. p. 327—328. — *Muschliana* Tr. Biol. Bemerk., Beschr. d. R. p. 328. — *posterana* Biol. u. Beschr. d. R. p. 328-
- Coptoloma janthinana* Dup. Bemerk. **Sorhagen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 331.
- Dichelopa* n. g. **Lower**, Trans. Roy. Soc. S.-Austral. vol. XXV p. 76 (Australien).
- Dichrorhampha alpinana* Tr. Ergänzt. Bemerk. Grabow's zur Biologie. **Sorhagen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 345—346.
- Epiblema perplexana*. **Fernald**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 52. — *ochraceana* p. 52 (beide aus Florida). — *aphrias*. **Meyrick**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 578 (New Zealand).
- Eucosma lineana*. **Fernald**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 50 (Florida).
- Euxanthlis* (*Conchylis*) *hamana* L. Abb. des Copulationsapparates. **Petersen, W.**, p. 324 Fig. 4.
- Grapholi* ha. **Sorhagen** giebt in d. Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 330. Bemerk. zu Grabow's Abb. ev. Beschr. d. Raupen folg. Sp.: *cyrostana* F., *roborana* Tr., *cirsiana* Z., *foenella* L., *incana* Z., *hypericana* H., *nebritana* Tr., *funebrana* Tr., u. *Woerberiana* Schiff.
- tedella* Cl. Forte invasione in Italia. **Cecconi, Giacom.** Bull. Soc. Entom. Ital. An. 33. 2. Trim. p. 67—74.
- Neu: *dorsana* F. var. *Strandiana* n. (fast schwärzl. Färb. — Untersch. von unserer *dorsana*). **Fuchs**, Stettin. Entom. Zeit. 62. Jhg. p. 382—383 (Krania u. Ulifos in Norwegen, die Lokalform des europäischen Nordens).
- Harmologa petrius*. **Meyrick**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 572 ♂ (New Zealand: Invercargill). — *achrosta* p. 572 ♂ (Mount Arthur, 2800').
- Heusimene* Steph. Revision der Nomenklatur. **Walsingham & Durrant**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 189.
- Lioptycha maculana*. **Fernald**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 51 (Florida).
- Lomaschiza* n. g. **Lower**, Trans. R. Soc. S.-Austral. vol. XXV p. 68. — *physophora* p. 69 (Queensland).
- Lophoderus ministranus* L. nebst *ab. infuscatus* n. (sehr dunkel gefärbt, die Hflgl. einfarbig schwarzgrau u. auch die Vflgl. sehr verdunkelt). **Strand**, Nyt Mag. etc. 39. Bd. 1901. p. 66—67 (Tysfjorden u. Hammerö). — Neu: *amatana*. **Dyar**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 p. 24 (Florida).

- Loxopera deaurana* Peyr. u. *ferruginea* Wlsm. **Synon.** Besch. Wiederentdeckung etc. **Chapman & Durrant**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 169—170.
- Lyonetia Clerckella* L. nebst var. *aereella* Tr. im arkt. Norwegen nebst Bemerk. **Strand**, Nyt Mag. etc. 39. Bd. 1901 p. 71.
- Paedisca subocellana* Don. in der arktischen Region weit verbreitet, aber weniger zahlreich. Bisher nur je 1 Stück von Gröto, Tromsö u. Südvaranger bek. **Strand**, Nyt Mag. etc. 39. Bd. 1901. p. 68, erbeutete 4 Stück bei Lödingen u. eins bei Hammerö. 3 dies. arkt. Stücke sind nicht unerheblich heller, als südlichere, besonders am Vrande d. Vfgl., indem die schwarze Binde, welche an gewöhnl. Stücken vom Analwinkel bis z. Mitte des Vrandes geht, in ihrer vordersten Hälfte mehr oder weniger verwischt u. von der hellen Farbe des Mittelfeldes verdrängt ist. Ausserdem sind die den Spiegel begrenzenden schwarzen Flecke ungewöhnl. klein u. durch graue Färbung ersetzt. Wohl keine ausgeprägte Lokalform, daher *forma arctica* n. p. 68. — *Penkleriana* Schiff. sehr zahlreich in den Erlenwäldern in Lavik u. Laerdal, ebenso bei Trondhjem. Variirt nicht unerheblich. Am auffallendsten sind 1. Vfgl. einfarbig rotgelb ohne andere Zeichn. Als die lichten Vrandflecke u. Bleieinfassung des Spiegels: *forma aurantiana* n. p. 68. — 2. Der halbe Vrandfleck setzt sich als eine weissl. in d. Mitte winkelförmig gebrochenen Querbinde bis z. Vrande fort: *forma fasciatana* n. p. 68—69. Beide Formen nicht selten zusammen mit normalen fliegend. — *tetraquetra* Hw. Von dieser Art wimmelte es auf Langoën. Auffallende Variationen wurden nicht gefunden. Bemerkenswert ist nur *forma umbratana* (Vfgl. gleichförmig dunkelbräunlich ohne deutl. Zeichnungen) p. 69.
- Pandemis ribeana* Hb., β *ribeana* Hb. + *cerasana* Hb., *heparana* Schiff. Fundorte. **Walsingham**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 5 p. 386.
- Pamene* Hb. Revision der Nomenklatur. **Walsingham & Durrant**. Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 189—190. Die einzelnen Spp.
- Penthima nimbata* u. *cyana*. Biologie etc. **Chittenden**, Bull. U. S. Departm. Agric. Entom. vol. XXVII p. 83—87 Fig. 23.
- Penthina*. **Sorhagen** bringt in d. Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. biol. Bemerk. Beschreib. d. Raupen u. s. w. von *salicella* L. p. 328. — *betulaetana* Hw. p. 328—329. — *dimidiana* Sod., *Dalecarliana* Gn., *pyrolana* Wck., *lacunana* Dp. u. *achatana* F. p. 329.
- Peronea cristana*. Variation ders. **Clarke**, Entom. Record vol. 13 p. 227—229, 261—265, 287—293, 327. Taf. VI.
- Phoxopteryx*. **Sorhagen** bringt in d. Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. Biolog. Bemerk., Futterpfl., Besch. d. Raupen folg. Spp.: *inornatana* H.-S. p. 344—345. — *biarcuana* Stph., *siculana* H. u. ? *myrtillana* Tr. p. 345.
- Phtheochroa* Stph. siehe *Hysterosia* im vorig. Bericht.
— Biologie. **Hinneberg, Karl**. Rovart. Lapok, 8. köt. 1. füz. p. 1—3. — Auch ausführliche Beschreib. d. Raupe. Allgem. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. No. 6. p. 83—84.
- Phthoroblatis R(h)ediella* Cl. Biolog. Notizen u. Besch. d. Raupe. **Sorhagen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 331—332.
- Polylopha* n. g. (*Palaeotoma* nahest.) **Lower**, Trans. Roy. Soc. S. Austral. vol. XXV p. 71. — *epidesma* p. 71 (Queensland).

- Proselena emphanes* **Meyrick**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 571—572 ♀ (New Zealand, Mount Peel, 5400').
- Pyrgotis* ? *callizyga* **Lower**, Trans. Roy. Soc. S. Austral. vol. XXV p. 73 (S. Austral.).
- Retinia* **Sorhagen** bringt kurze Bemerk. zu den Abb. von *turionana* H., *Buoliana* Schiff. u. *resinella* L. Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 328. — *Buoliana* Schiff., (Tallskottvecklaren) in Schweden. Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 64.
- Sciaphila* *Wahlbomiana* L. Grabow's Abb. d. Raupe etc. **Sorhagen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 314. — *nubilana* H. Besch. d. Raupe p. 314. — (*Wahlboms* vecklarefjäril) Entom. Tidskr. 22 Årg. p. 54. — *wahlbomian(e)a* L. var. *obscurana* (minor, obscurior, fasciis transversis indistinctis, fere obsoletis) **Reuter** p. 922 des vor. Berichts.
- Semasia* *woeberiana* **Kanc, Wm. Fracs. de V.** Destruction of Cherry Trees. The Irish Naturalist, vol. 10 No. 7 p. 146.
- Sericoris* *lacunana* Schiff. im arkt. Norden (Tysfjorden sehr häufig). Variirt sehr, doch sind die Aenderungen meist gering u. schwer beschreibbar. Am leichtest. bemerkbar sind die Farbenänderungen des Saumfeldes, indem dies bald weisslich nur mit einer schwachen graulichen Schattirung in d. Mitte u. graulichen Vrandpunkten, bald z. grösst. Theile schwärzlich überzogen wird, wodurch die Art Aehnlichkeit mit *bipunctata* bekommt. *forma fuscoapicalis* n. **Strand**, Nyt Mag. etc. 39. Bd. 1901 p. 67. — *Schulziana* Fabr. im arkt. Norwegen p. 67—68.
- Sorolopha* n. g. (Arotrophora nahest.) **Lower**, Trans. Roy. Soc. S. Austral. vol. XXV p. 73. — *cyclotoma* p. 73 (Queensland).
- Stegaeoptycha* *nigromaculana* Hw. Biolog. Bemerk. u. s. w. u. Besch. d. Raupe. **Sorhagen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 344. — *minutana* H. Biol. Bemerk. p. 344.
- Strepsicrates* *emplasta* **Meyrick**, Trans. Entom. Soc. London, 1901, p. 571 ♀ (New Zealand, Invercargill).
- Syntozyga* n. g. (Palaeotoma nahest.) **Lower**, Trans. Roy. Soc. S. Austral. vol. XXV p. 70. — *psummetalla* p. 70 (Queensland).
- Temnolopha* n. g. (Arotrophora nahest.) **Lower**, Trans. Roy. Soc. S. Austral. vol. XXV p. 72. — *mosaicæ* p. 73. — *metallota* p. 73 (Queensland).
- Teras*. **Sorhagen** behandelt in d. Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. die Raupen u. s. w. folg. Spp.: *mixtana* H. p. 311. — *comariana* Z.; *ferrugana* Tr. var. *tripunctana* H. u. *Holmiana* L. p. 342. — *comparanum* Hb. var. *cinereanum* (alis anticis cinereis, macula triangulari magna) **Reuter**, p. 922 des vor. Ber.
- Tmetocera* *ocellana* F. u. var. *obscurana* n. **Sorhagen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 343.
- Tortrix*. Abb. des Copulationsapparates verschiedener Species. **Petersen W.** u. zwar: *T. xylostoma* L. Fig. 1, *heparana* Schiff. Fig. 2 u. *rusticana* Tr. Fig. 3. — **Sorhagen** behandelt in d. Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. die Raupen u. s. w. folg. Spp.: *piceana* L., *Podana* Lip. p. 342, *decretana* Tr. p. 342—343. — *rosana* L., *heparana* Schiff., *strigana* H., *ministrana* L., *Bergmanniana* L., *Forsterana* L., p. 343. — *angustiorana* Hw. p. 343—344.
- ambiguella* Hb. die erste Gener. des 1899 u. 1900 ungemein schädlich auftretenden Traubenwicklers legt die Eier in die Gescheine (Rappen, Blütenknospen, Vorblätter), die 2. auf den Fruchtstand (Rappen, Beerenstiele, Beeren). Puppen wurden nur über der Erde angetroffen. Sie ertrugen unbeschadet bis — 26° C. Natürlicher Feind: Ohrwurm:

- Forficula auricularia L. **Goethe, R.** Bericht der Königl. Lehranstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau zu Geisenheim a. Rh. Wiesbaden, 1900. paleana Hb. Eingehende Besprechung von Raupe u. Lebensweise. **Reuter**, p. 621 sub No. 2 des vor. Berichts. — pronubana in Guernsey. **Lowe, Frank, F.** Entom. Record, vol. 12 No. 12 p. 316—317. — viridana L. (Gröna Ekvecklaren). Bericht darüber in Schweden. 1900. Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 13.
- pinicolana. Schädling in Ital. **Cecconi**, Bull. Soc. Entom. Ital. vol. 33 p. 162—168. Neu: (Loxotaenia) musculana Hb. nebst forma *obsoletana* n. (hat sehr undeutl. Zeichn.) u. (Heterognomon) rusticana Tr. (Bisherige Fundorte im nördl. Norwegen, dazu neu: Hadsel) **Strand**, Nyt Mag. etc. 39. Bd. 1901. p. 66.
- pullatana* **Snellen**, Tidschr. voor Entom. vol XLIV p. 68 Taf. V Fig. 3, 3a (Java). — *ivana* **Fernald**, Journ. New York Ent. Soc. vol. 9 p. 51 (Florida). Schädlinge in Japan. **Matsumura**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 21 sq.:
- Art: Japan. Trivial- Futterpflanzen: Verbreitung:
name: Nahrung:
- | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|
| Blabophanes rusti-
cella Hüb. | Kikui-mushi-tcho | Holz, Utensilien,
Tonnen, Kisten | Japan, Europa. |
| Tinea granella L. | Kokuga | Reis, Weizen-Mehl | Japan, Europa,
Amerika. |
| — (Trichophaga)
tapezella L. | Mosenga | Tapeten, Pelz | Europa, N.-Ame-
rika, Japan. |
| pellionella L. | Iga | Kleidungsstoff, Pelz,
Naturaliensamm-
lungen | Europa, N.-Ame-
rika, Japan. |
| Tineola biselliella
Hum. | Ko-iga | Kleidungsstoff, Ta-
peten, Pelz,
Naturaliensamml. | Europa, N.-Ame-
rika, Japan. |
| Hyponomeuta mali-
nella Zell. | Ringo-no-somushi | Apfel, Pflaume | Japan, N.-Amer.,
Europa. |
| Argyrhestia conju-
gella Zell. | Ringo-no-himeshin-
kui | Apfel (Fruchtbohrer,
sehr schädlich) | Japan (Sapporo), N.
Amer., Europ. |
| Plutella crucifera-
rum Zell. | Undai-no-aomushi | Rhaphanus-Arten | Japan (Tokio),
Europa. |
| Sitotroga cerea-
lella Oliv. | Bakuga | Weizen, Gerste
(sehr schädli.) | Japan, Eur.,
N.-Amer. |
| Ceratophora trian-
nulella H.-S. | Satsumaimo-no-
hamaki | Süßkartoffel (Ipo-
moea batatas), Con-
volvulus sepium | Japan, Europa. |
| Carposina Sasakii
Mats. | Momono-hime-
shinkui | Pfirsich (Frucht-
bohrer, sehr
schädli.) | Japan (Tokio,
Sendai). |
| Oecophora inopise-
ma Butl. | Wata-aka-
mimushi | Baumwolle (Kapsel-
bohrer) | Japan (Tokio). |
| Coleophora nigri-
cella Steph. | Tsutsu-minomushi | Apfel | Japan (Sapporo),
Europ. |
| Coleophora mali-
vorella Riley | Pistol-minomushi | Apfel, Pflaume | Japan, N.-Amer. |
| Lyonetia clerkella
? L. | Ringo-no-moguri-
tcho. | Apfel | Europa, Japan. |

Tineidae.

Autoren: Beutenmüller, Busck, Chrétien, Crombrugghe, Dietz, Druce, Dyar, Fuchs, Hilgendorf¹⁾, Koningsberger & Zimmermann, Lower, Lucas, Malloch, Meyrick, Quail, Rebel, Snellen, Stitz, Walsingham.

Tineina von Parish of Bonhill, Dumbartonshire. **Malloch.**

— von Süd-Italien. **Canaviello** (4).

Acompsia epileuca **Lower**, Trans. Roy. Soc. S. Austral. vol. XXV p. 94 (Queensland).

Acrolophus linus **Druce**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 441 ♂ (Mexico, Orizaba).
— *Boucardi* p. 441 ♂♀ (Mexico, Orizaba). — (?) *Underwoodi* p. 442 ♂ (Costa Rica, Candelaria Mts.).

Adela sythoffi **Snellen**, Tijdschr. v. Entom. 44 D. p. 77 Taf. V Fig. 4 (Java).

Amphixystis n. g. Tineidarum (eigenartige Gatt., vielleicht der austral. *Hieroxestis* nahe, doch sehr eigenartig u. offenbar isolirt stehend) **Meyrick**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 576. — *hopsimacha* p. 577 ♀ (Wellington).

Anacampsis lupinella **Busck**, Canad. Entom. vol. 33 p. 14 (Canada). — Beschr. der Raupe. **Jas. Fletcher**, t. c. p. 15.

Anaphora numidia **Druce**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 442 ♂ (Mexico, Orizaba; Guatemala). — *Arcéi* p. 442 ♂♀ (Panama, Chiriqui). — *libitina* p. 442 ♂♀ (Guatemala, 5000'). — *punctata* p. 443 ♂ (Costa Rica, Candelaria Mts.). — *Whitelyi* p. 443 ♂ (British Guiana, Essequibo River). — *Perrensi* p. 443 ♂♀ (Brazil, Goya).

Anesychia (*Psecadia*) *bipunctella*. **Fountain, J. T.** The Entomologist, vol. 34 Oct. p. 298.

Ankistrophorus giganteus **Druce**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 441 (Mexico, Orizaba).

Apilectria acutipennis Wlsm.? od. n. sp.? „waited to be caught“ etc. Beschr. **Barrett, Frances**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 11 (36) p. 146.

Antiopila Petryi Martini für schlesische Fauna neu; Martini hat sie gezogen von Scheitnig, an *Cornus sanguinea*. **Wocke**, Zeitschr. f. Entom. Breslau, 1900 p. VII—VIII.

Argyresthia conjugella Zell. (rönnbarmalen) **Lampa, Sven**, Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 169.

Neu: *pygmaeella* Hb. *var. capilella* n. Ausser einigen ganz normal gefärbt. Stücken aus Tysfjorden erbeutete **Strand**, Nyt Mag. etc. 39. Bd. 1901 p. 70, einige Stücke, die sich durch ockergelbe Kopphaare u. praktisch gesprochen einfarbige, stark glänzende Vflgl. auszeichnen, dafür *var. n.*

Prenjella (nur mit submontana zu vergleichen; sofort verschieden durch bedeutendere Grösse, schneeweisse Grundfarbe der etwas breiteren, viel weniger gezeichn. Vflgl., gleiche Breite der Mittelbinden, den fast geraden (nicht nach aussen gerichteten) Verlauf der äusseren Binde

¹⁾ **Hilgendorf, F. W.** Life history of *Plutella cruciferarum* Zeller. Trans. New Zealand Instit. vol. XXXIII p. 145—146.

eingegitterten Vorderrandtheil etc.). **Rebel**, Verhdlgn. zool.-bot. Ges. Wien. 51. Bd. 1901 p. 802—803 ♂♀ (Herzegowina am Prenj, unweit der Schutzhütte in ca 1300 m Höhe, ♂ 9. Juli, ♀ 29. Juli).

Atteva modesta **Snellen**, Tijdschr. v. Entom. 44 D. p. 79 Taf. V Fig. 5 (Assam).

Bactrolopha n. g. Gelechiadarum **Lower**, Trans. Roy. Soc. South Austral. vol. XXV p. 79. — *orthodesma* p. 79 (New South Wales).

Banksia conspurcatella. Bemerk. dazu. **Chapmann**, Entom. Record No. 6 p. 173—174. — **Durrant**, dito t. c. p. 174.

Batrachedra tristicta **Meyrick**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 579 ♂♀ (New Zealand: Makatoku). — *agaura* p. 579 ♂♀ (New Zealand: Whangarei u. Mount Arthur).

Neu: *coriaccella* **Snellen**, Tijdschr. v. Entom. 44 D. p. 95 Taf. VI Fig. 7 (Java).

Blastobasis (?) *evanescens* (2302. 2) (etwas abnorme Form, stimmt mit Blast. im Besitz von nur 7 Adern im Hflgl., unterscheidet sich aber durch den entfernt. Ursprung der 5 von 3 + 4. Da das ♂ fehlt, ist die Beschr. eines n. g. nicht angebracht). **Walsingham**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 182 ♀ (Corsica, Vizzavona).

Borkhausenia subgilvida (2261. 2) **Walsingham**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 180 ♂♀ (Corsica, Corté). — *lavandulae* Mn. (2264) nov. syn. = *ardosiella* Cnst.; = *pulverisquamis* Wlsm.) p. 180—181. Richtigstellung zur Synon. — *fuscifrontella* Cnst. (2264. 1) p. 181 (Corsica, Corté, Vizzavona). zu beachten ist: 1. *fuscifr.* Cnst. ist eine gute unterschiedene Sp. u. nicht zu verwechseln mit 2. *B. lavandulae* Mn., die synonym. ist mit *Oecophora ardosiiella* Cnst. = *Borkh. pulverisquamis* Wls. — 3. Die n. sp. *subgilvida*. — *reducta* (2280. 2) (kleiner als die ähnl. *ragonotella* Cnst.) p. 181—182 ♂ (Corsica, Vizzavona, Corté).

(*Oecophora*) *actinias* **Meyrick**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 574 ♂ (Wellington). — *hoplodesma* Meyr. variabel (bei einzelnen Stück. sind die grauen Binden ganz absolut oder ersetzt durch eine vague grey irroration. — Bleibt aber doch gut kenntlich) p. 574—575.

Bryotropha peterseni **Teich**, Korrespondenzblatt des Naturforscher Vereins zu Riga. 44. Bd. p. 13 (baltisches Gebiet).

Butalis Schützei **Fuchs, J.**, Stettin. Entom. Zeit. 62. Jhg. p. 383 ♂♀ (Rachlau. gezogen; an *Hypnum* (*Hylocomium squarrosum*). Beschr. der Raupe nach Schütze. Bemerk. zu Heinemann's *palustris*. — Ist zwischen *Paullella* H.-S. u. *Palustris* Z. einzureihen.

Caesyra miltozona **Lower**, Trans. R. Soc. S. Austral. vol. XXV p. 93 (West-Australien).

Ceratophora phutelliformis **Snellen**, Tijdschr. v. Entom. 44 D. p. 84 Taf. VI Fig. 4. — *tristella* p. 85 tab. cit. Fig. 2 (Java).

Chrysoclista bimaculata (*bimaculella*) in North Cornwall. **Rothschild, N.**, (sub **Rothschild** [2]).

Choreutis Müllerana Fabr. in Lavik, arkt. Norwegen wimmelte es von dieser Art. **Strand**, Nyt Mag. etc. 39. Bd. 1901 p. 70.

Clerarcha procellosa **Lucas**, Proc. Soc. Queensland, vol. XVI p. 85 (Queensland).

- Coleophora calcariella* **Chrétien**, Le Naturaliste, 1901 p. 18 (Frankreich). — *dianthivora* (2528. 1) (odorariella Mulg. u. Frey nahest.) **Walsingham**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 184 ♂♀ (S. Frankreich, Vernet. Raupe auf Dianthus).
- Cryptolechia* (?) *nigricostella* **Snellen**, Tijdschr. v. Entom. 44. D. p. 80 Taf. VI Fig. 3 (Sumatra).
- Crypsynarthra* n. g. (Atelosticha nahest.) **Lower**, Trans. Roy. Soc. S. Austral. vol. XXV p. 85. — *chysias* p. 85 (Queensland).
- Cryptophaga hyalinopa* **Lower**, t. c. p. 82. — *panleuca* p. 83 (Queensland). — *phycidioides* **Lucas**, Proc. Soc. Queensland, vol. XVI p. 84. — *cannea* p. 85 (beide ebenfalls von Queensland).
- Cyclogona* n. g. (Eulechoia nahest.) **Lower**, Trans. Roy. Soc. S. Austral. vol. XXV p. 87. — *orthoptila* p. 87 (Melbourne).
- Dorycnopa* n. g. Gelechiadarum **Lower**, t. c. p. 77. — *acroxantha* p. 78 (S. Austral.).
- Dryadaula pactolia* **Meyrick**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 577 ♂♀ (New Zealand: Nelson a. Bealey River; Wellington).
- Dryope occidentella* **Dietz**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. XXVII p. 115. — *tenebrella* p. 116. — *minicella* p. 116. — *grisella* p. 116. — *fuscusuffusella* p. 117. — *cunariella* p. 118. — *discopunctella* p. 118. — *fenyesselia* p. 119 (sämtlich aus Nordamerika).
- Elachista atricomella* Stt. auf Mooren in Tysfjorden nebst Fundorte. Bemerk. über andere Spp. **Strand**, Nyt Mag. etc. 39. Bd. 1901. p. 71.
- Epigritia* n. g. **Dietz**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. XXVII p. 110. — *pallidotinctella* p. 111. — *heidemannella* p. 111 (beide aus Nordamerika).
- Eretmocera laetissima* Wlsm. (fliegt wohl nur bei Tage etc.) **Barrett, Frances**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 11 (36) p. 146.
- Ereunetis exospila* **Meyrick**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 577 ♂ (Whangarei).
- Eucryptogona* n. g. Plutellidarum **Lower**, Trans. Roy. Soc. S. Austral. vol. XXV p. 97. — *trichobathra* p. 97 (N. S. Wales).
- Eulechria mitescens* **Lucas**, Proc. Soc. Queensland, vol. XVI p. 91 (Queensland).
- Eulepiste cockerelli* n. sp. **Dyar** (Titel p. 573 sub No. 31 des vorig. Berichts).
- Felderia echinon* **Druce**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 443 ♂ (Mexico, Orizaba). — *Garleppi* p. 444 ♂ (Bolivia).
- Gelechia malvella*. Wiederauftreten im District London. **Bower, B. A.**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 45.
- operculella*. The Potato worm in California. **Clarke, W. T.**, Californ. Agr. Stat. Bull. 135 (30 p., 15 figs.). — Abstr.: Exper. Stat. Rec. vol. 13 No. 8 p. 765—766.
- Neu: *nigricans* var. *brunnea* n. **Teich**, Korrespondenzbl. naturf. Ver. Riga 44. Bd. p. 13. — *viridella* **Snellen**, Tijdschr. v. Entom. 44. D. p. 86 Taf. V Fig. 10 (Java). — *hippeis* **Meyrick**, Trans. Entom. Soc. London 1901 p. 573—574 ♂♀ (New Zealand, Christchurch).
- Glyphidocera floridanella* **Busck**, Proc. Entom. Soc. Washington vol. 4 p. 475 (Florida).
- Gomphoscopa* n. g. Oecophoridarum (Type: *Pachycera catoryctopsis* Low.). **Lower**, Trans. Roy. Soc. S. Austral. vol. XXV p. 86.

- Gracilaria populetorum* var. *nolckenella* n. **Krulikowsky**, Revue Russe Entom. vol. I p. 174. — *coffeifoliella*. Raupe. **Koningsberger**, Med. Plantentuin 44. D. 2. p. 54 (Java).
- Guestia actinipha* **Lower**, Trans. Roy. Soc. S. Austral. vol. XXV p. 95 (New South Wales).
- Gymnobathra thetodes* (dunkelste Sp. der Gatt.) **Meyrick**, Trans. Entom. Soc. London 1901 p. 574 ♂ (New Zealand, Akaroa, Oakley).
- Hapsifera corticella* **Snellen**, Tijdschr. v. Entom. 44. D. p. 75 Taf. V Fig. 7 (Java).
- Heterobathra* n. g. (Nephogenes nahest.) **Lower**, Trans. Roy. Soc. S. Austral. vol. XXV p. 89. — *xiphosoma* p. 90. — *bimacula* p. 90. — ? *semnostola* p. 90 (alle drei aus Australien).
- Hoplitica pseudota* **Lower**, t. c. p. 85 (Queensland).
- Hyponomeuta malinella* Zell. und *H. padella* Zell. Die Capside *Atractotomus mali* Meyer ist ein grimmiger Feind der in einem u. dems. Neste lebenden Raupen beider Spp. **Pommerol, F.**
- Iconisma* ? *anthophaga* Stgr. α) *anthophaga* Stgr. + *anthophaga* Stgr. nov. syn. *staechadella* Cnst. (2304). **Walsingham**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 182—183. — β) *anthophaga* Stgr. + *rosmarinella* var. n. p. 183—184 ♂♀ (2 Stücke von *Rosmarinus officinalis* aus der Umgebung von Beaulieu).
- Ideostoma miraculosa* u. *bigemina*. Bemerk. dazu. **Snellen**, Tijdschr. v. Entom. 44. D. p. 96.
- Joongoora* n. g. *Oecophoridarum*. **Lucas**, Proc. S. Queensland vol. XVI p. 91. — *tricollata* p. 92. — *cunctilineata* p. 92 (beide von Queensland).
- Lichenaula ombrolata* **Lower**, Trans. Roy. Soc. S. Austral. vol. XXV p. 84 (Victoria). — *sternoides* **Lucas**, Proc. Soc. Queensland vol. XVI p. 86. — *appropinquans* p. 87 (beide aus Queensland).
- Limnaecia xylinella* **Snellen**, Tijdschr. v. Entom. 44. D. p. 90 Taf. VI Fig. 5 (Java).
- Linosticha euadelpha* **Lower**, Trans. Roy. Soc. S. Austral. vol. XXV p. 86 (N. S. Wales).
- Lita scriptella* u. *Symmoca signatella*. Synonymie. **Chrétien**, Bull. Soc. Entom. France 1901 p. 12 u. 27.
 Neu: *atriplicella* F.-R. var. *infumatella* **Fuchs**, Stettin. Entom. Zeit. 62. Jhg. p. 333 (Krania in Norwegen). — *infatella* (*vicinella* Dougl. nahe). **Chrétien**, Le Naturaliste 1901 p. 17 (auf *Silene inflata*).
- Lysiphragma howesi* **Quail**, Trans. New Zealand Instit. vol. XXXIII p. 154 Taf. VIII (New Zealand). — Besch. der ersten Stände.
- Macrobathra lunarescens* **Lucas**, Proc. Soc. Queensland Vol. XVI p. 89. — *definitiva* p. 89. — *veccillariata* p. 90. — *obliquata* p. 90 (sämmtl. aus Queensland). — *drosera* **Lower**, Trans. Roy. Soc. N. S. Wales vol. XXV p. 96 (N. S. Wales).
- Maroga paragypsa* **Lower**, t. c. p. 96 (W. Austral.).
- Metzneria littorella* Dgl. Notes on. **Bankes, E. R.**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 121—124. — Biologisches; Ausschlüpfen, Beschreib. etc. — Bemerk. zum Verbleib von Stevens' Stücken. **Webb, Sydney**, t. c. Juni p. 149—150. — Note on. **Bankes, Eust. R.**, t. c. Aug. p. 200—201.

- Micropteryx aureatella* Sc. sehr häufig in Tysfjorden; sehr träge, leicht zu erbeuten. Scheint sich schlecht vor dem Regen zu hüten. **Strand**, *Nyt Mag. etc.* 39. Bd. 1901 p. 72. — *jacobella* *nom. nov.* für Herr.-Sch.'s Abb. (n. Schm. Fig. 113) u. Stgr.'s Beschr. von imperfectella 2. **Walsingham**, *Entom. Monthly Mag.* (2) vol. 12 (37) p. 238.
- Mimodoxa* n. g. (*Macrothra* nabest.) **Lower**, *Trans. R. Soc. South Austral.* vol. XXV p. 96. — *dryina* p. 97 (N. S. Wales).
- Nannodia eppelsheimeri*. Raupe. **Chrétien**, *Le Naturaliste* 1901 p. 17.
- Nephogenes centrotherma* **Lower**, *Trans. Roy. Soc. S. Austral.* vol. XXV p. 88. — *perigyrsa* p. 88. — *petrinodes* p. 89. — *xipholeuca* p. 89 (sämtlich aus Australien).
- Nepticula*. In der Mark Brandenburg etwa 40 Arten. Lebensweise. **Brasch**, *Berlin. Entom. Zeitschr.* 46. Bd. Sitz.-Ber. f. 1900 12. Apr. (p. 16). — *pomivorella*. Beschreib. **Ball**, *Canad. Entom.* vol. 33 p. 52. — sp. Ei. **Sich, Alfr.** *Entom. Record* vol. 13 No. 12 p. 362—363.
- Oecophora stipella* L. *forma indistincta* n. Bei zwei Stücken der im arktisch-Norden erbeuteten Stammart sind die gelben Zeichn. beinahe ganz von der braunen Grundfarbe verdrängt; innerhalb des Analwinkels sieht man nur einen hellgrauen sehr undeutl. Fleck statt des gewöhnl. gelb. Dorsalflecks; der Costalfleck ist an dem einen Stück wie ein gelbgrauer Wisch, an dem andern fehlt er ganz und gar. Basalstreif angedeutet, aber sehr undeutl. und nur wenig heller als die Grundfarbe. Hermann erwähnt ein gleiches Stück aus dem Engadin. **Strand**, *Nyt Mag. etc.* 39. Bd. 1901 p. 71. — Str.'s Exemplare von *Oe. similella* wurden sämtlich in Häusern gefangen. *iodes* **Lower**, *Trans. Roy. Soc. S. Austral.* vol. XXV p. 94 (S. Austral.).
- Ornix Eppelsheimeri* (steht *Anglicella* zunächst, ist etwas grösser etc., steht vor *Anglicella*, unmittelbar nach den Arten d. *Fagivora*-Gruppe, nicht zwischen *Angl.* u. *Finitimella* Z.) **Fuchs**, *Stettin. Entom. Zeit.* 62. Jhg. p. 386—387 (Von *Acer platanoides* aus Puppen gezogen, bis jetzt nur 1. Generation, — aus dem Heidesheimer Park).
- Orthotaelia sparganella* Thnbg. (für Finland neu) **Reuter** (1).
- Pauronota* n. g. (*Guestia* nabest.) **Lower**, *Trans. Roy. Soc. S. Austral.* vol. XXV p. 95. — *thermaloma* p. 95 (N. S. Wales).
- Peltophora phaedropa* **Lower**, t. c. p. 92 (W. Austral.).
- Phibalocera quercana* attacking rhododendrons. **Johnson, W. F.**, *Entom. Monthly Mag.* (2) vol. 12 (37) p. 277.
- Philobota diffusa*. **Lucas**, *Proc. Soc. Queensland*, vol. XVI p. 89 (Queensland). — *isozona*. **Lower**, *Trans. Roy. Soc. S.-Austral.* vol. XXV p. 93 (W. Austral.).
- Phyllocnistis*. Bemerk. zu Unterschieden etc. im Anschluss an die Besprechung der Monogr. dieser Gatt. von Lüders. *Zeitschr. f. Entom.* Breslau 1901. p. VII u. IX.
- Pigritia*. **Dietz** beschreibt in den *Trans. Amer. Entom. Soc.* vol. XXVIII eine Reihe neuer Arten aus Nordamerika: *confusella* p. 104. — *purpurella* p. 105. — *basilarella* p. 105. — *mediofasciella* p. 107. — *ornatella* p. 107. — *angustipennella* p. 108. — *tristella* p. 108. — *arizonella* p. 109. — *spoliatella* p. 110. — *obscurella* p. 110.
- Pilostibes serpta*. **Lucas**, *Proc. Soc. Queensland*, vol. XVI p. 84 (Queensland).

- Plectophila sarculata*. **Lucas**, Proc. Soc. Queensland, vol. XVI p. 88. — *ascripta* p. 88 (beide aus Queensland).
- Pleurota Schlaegeriella* Z. var. *tristriga* n. (der verschmälerte weisse Mittellängsstreif d. Vflgl. zweimal braungetheilt). **Fuchs**, Jahrbh. nass. Ver. f. Naturk. 54. Jhg. p. 67—68 (bei Biebrich, Dotzheim u. im Rheinthale nicht selten).
- Ploiophora* n. g. (Pigrita nahest.). **Dietz**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. XXVII p. 102. — *ampla* p. 102 Taf. VI Fig. 1. — *fidelia* p. 102 Taf. VI Fig. 2 (beide aus den Vereinigten Staaten von Nordamerika).
- Plutella annulatella*, deutlich u. gut gezeichnete Stücke von den Orkneys. The Entomologist, vol. 34 p. 186.
- cruciferarum. Biologie, in New Zealand. **Hilgendorf**, Trans. New Zealand Instit. vol. XXXIII p. 145.
- Neu: *antiphona*. **Meyrick**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 576 ♀ (Wellington).
- Poecilia nivea* Han. verursacht Gallen an *Quercus sessiliflora* Sm. des Schmetterl. **Rübsaamen**, Schrift. d. naturw. Ges. in Danzig. N. F. 10. Bd. 2./3. Hft. p. 126 Fig. 15. Abb. d. Deform. p. 127 Fig. 16 (neu für Westpreussen, Tuchelerhaide, Paradies am Schwarzwasser).
- Protia salicolella* (Auct.) = *Anicanella* Bruand. **Chapman**, p. 564 sub. No. 10 des vor. Berichts.
- Psammeces zehntneri*. **Snellen**, Tijdschr. v. Entom. 44. D. p. 91 Taf. VI Fig. 6 (Java).
- Psecadia eborinella*. **Snellen**, Tijdschr. v. Entom. 44. D. p. 81 Taf. VI Fig. 1 (Java).
- Pseudopigritia* n. g. **Dietz**, Trans. Amer. Entom. Soc. vol. XXVII p. 112. — *dorsomaculella* p. 112. — *equitella* p. 112. — *fraternella* p. 113. — *argyreella* p. 113 (sämmtlich aus Nordamerika).
- Psorosticha* n. g. (Trachypepla nahest.). **Lower**, Trans. Roy. Soc. S. Austral. vol. XXV p. 91. — *acrolopha* p. 92 (Queensland).
- Pycnobathra* n. g. Gelechiadarum. **Lower**, t. c. p. 80. — *achroa* p. 80 (N.-S. Wales).
- Pyroderces leucateella*. **Snellen**, Tijdschr. v. Entom. 44. D. p. 93 Taf. VI Fig. 9. — *bicolorella* p. 94 tab. cit. Fig. 8 (beide aus Java).
- Scardia boleti* F. Besch. d. Raupe u. Puppe. **Sorhagen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 346.
- Seythris* (Butalis) *orbidella* (eine der grösst. Sp. ihrer Gatt., *Sc. gurdella* Christ u. *tangerensis* Sta. sehr nahe). **Chrétien**, P. Bull. Soc. Entom. France, 1901, p. 333—334 (Juni, Juli. — Dans l'Herault).
- Setiostoma fernaldella* Raupe. **Coquillett**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9. p. 86.
- Simaethis pariana* Cl. kurze biol. Bemerk. etc. **Sorhagen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 346.
- (Bredvingade Äpplemlen) in Schweden. Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 53.
- Snellenia fuscedinella*. **Snellen**, Tijdschr. v. Entom. 44. D. p. 88 Taf. V Fig. 8 (Java).
- Solenobia triquetrella*. Kritisches. **Tutt**, (Titel p. 641 No. 6 des vor. Berichts).

- Stathmopoda aposema*. **Meyrick**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 575 ♂ (New Zealand: Auckland). — *mysteriastis* p. 575 ♂ (Auckland).
- Stenopherna* n. g. (Paltodora nahe). **Lower**, Trans. Roy. Soc. S. Austral. vol. XXV p. 78. — *chionocephala* p. 79 (N. S. Wales).
- Symnoca rosmarinella* (2228. 2). (Untersch. von *signatella* H. S.). **Walsingham**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 177—178 ♂♀ (S. France: Beaulieu. Raupe an *Rosmarinus officinalis*). — *ochreopicta* (2228. 4). (ähnelt *quadri-fariella* Mn.) p. 178 ♂ (Corsica, Corté). — *delicatella* (2228. 6). (verw. mit *oxybiella* Mill., doch andere Anordn. d. Flecken) p. 179 ♂ (Corsica). — *perpygmaella* (sehr klein, schon dadurch von allen and. Sp. ausgezeichnet) p. 179—180 ♂ (Corsica, Punta Parata).
- albidella*. **Snellen**, Tijdschr. v. Entom. 44. D. p. 82 Taf. VI Fig. 6 (Java).
- Swammerdamia griseocapitella* Stt. nebst var. obscurior. Letztere, zu der die meist im arkt. Norwegen erbeuteten Individuen gehören, zeichnet sich dadurch aus, dass die Grundfarbe d. Flgl. so verdunkelt ist, dass die dunkle Querbinde selbst am Irlande undeutlich wird. **Strand**, Nyt Mag. etc. 39. Bd. 1901 p. 70.
- Teerakna* n. g. Oecophoridarum. **Lucas**, Proc. Soc. Queensland, vol. XVI p. 93. — *regifica* p. 93 (Queensland).
- Teleia scriptella* Hb. Ergänzende Notiz. **Chrétien P.**, Bull. Soc. Entom. France, 1901. No. 2 p. 27. — Neu: *thomeriella*. **Chrétien, Pierre**, t. c. No. 1 p. 10—12. (Frankreich).
- Thysansosedes Salvini*. **Druce**, Ann. Nat. Hist. (7) vol. 7 p. 441 ♂ (Panama, Obispo).
- Tinea arcella* F. Schütze's Beitrag., Biol. Bemerk. etc. **Sorhagen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 346—347. — *cloacella*. Dem Kork schädlich. **Mingand**, Bull. Soc. Nimes vol. XXVIII p. 137. — *galeatella*, eine gute Art. Beschreib. **Snellen**, Tijdschr. v. Entom. 44. D. p. 46.
- granella* L. Schädling 3a Raupe 3b. Roggenähre m. Eiern. **Rehberg A.**, Schrift d. naturf. Ges. in Danzig. N. F. 10. Bd. 4. Hft. Abh. Text p. 70—72. — *pellionella* Lin. (Pälsmalen) in Schweden. Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 26. Beschr. etc. p. 28. Abb. d. Raupen nebst Sack Fig. a, 1900. — *sarcitella* W. V. p. 26. — *vastella* Zell. greift nur die Hörner toter Thiere an. (Ref.)
- Tineola bisselliella* Hummel (Tjädermalen) in Schweden, 1900. Entom. Tidskr. 22. Årg. p. 26. — Beschr. p. 28—29 Abb. d. Raupe nebst Sack. Fig. 6.
- Trachyntis argocentra*. **Lower**, Trans. Roy. Soc. S. Austral. vol. XXV p. 86 (New South Wales).
- Woorda* n. g. Oecophoridarum. **Lucas**, Proc. Soc. Queensland, vol. XVI p. 93. — *aguosa* p. 94 (Queensland).
- Willaburra* n. g. Oecophoridarum. **Lucas**, Proc. Soc. Queensland vol. XVI p. 94 — *nigromedia* p. 94 (Queensland).
- Xenolechia aethiops* Westw. in Scotland (Bonhill, Dumbartonshire in April). **Banks, Eust R.**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 11 (36) p. 132. — in Scotland. **Morton, K. J.**, t. c. p. 159. — desgl. **Evaus, William**, t. c. p. 159.
- Xyloryeta pentachroa*. **Lower**, Trans. Roy. Soc. S. Austral. vol. XXV p. 83. — *tetrazona* p. 84 (Australien).

- corticana*. Lucas, Proc. Soc. Queensland, vol. XVI p. 86 (Queensland).
Yponomeuta cuprea (Gatt. bisher von Neu Zealand nicht bek. Vorlieg. Sp. im Bau normal, doch oberflächlich weitgehende Abweichungen zeigend) **Meyrick**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 575—576 ♂ (New Zealand: Christchurch).
Ysopolophus pometellus Harris. typisches Beispiel für plötzl. massenhafte Auftreten u. alsbaldige Verschwinden eines Insekts. **Slingerland**, (cf. p. 632 sub No. 2 des vorig. Berichts) — Ref. siehe Chr. Schröder, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 108. — Schmarotzer: *Apantelus perplexus* Ashm. — „Palmer worm“ in Sixteenth Report Injurious and other Insects. 1901. Bull. Soc. N. Y. States Mus. vol. VII. No. 36. — color. Tafel.
 Neu: *ochroloma*. **Lower**, Trans. Roy. Soc. S. Austral. vol. XXV p. 80. — *argonota* p. 81. — *thanatopsis* p. 82 (Australien).
Zelleria Phillyrella Mill. Fundorte in Irland: Verwandtschaft etc. **Kane, W. F. de Vismes**, The Entomologist, vol. 34 p. 87—88.

Pterophoridae. Orneodidae.

- Aciptilia galactodactyla*, Larvae of, Raupen am letzt. Juni. **Clutton, W. E.** Entom. Record, vol. 13. No. 6. p. 195.
pentadactyla L. Beschr. v. Raupe u. Puppe. **Sorhagen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 243.
xanthodactyla Tr. var. *sicula* n. (grösser. mit breiteren Federn u. kurzen breiteren Zipfeln der Vflgl., die letzt. m. lichtem Vrand bis zu $\frac{2}{3}$ u. reichlicher braunen Beschuppung des Mittelraumes u. der Wurzel) **Fuchs**, Jahrb. nass. Ver. f. Naturk. 54. Jhg. p. 72 (Sicilien. — Form des Mittelmeergebietes).
Alucita hexadactyla L. kurze Bemerk zu d. von Grabow abgebild. Raupen. **Sorhagen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 243.
Cnemidophorus rhododactylus F. Biolog. Notiz, Beschr. von Raupe u. Puppe. **Sorhagen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 242. — *serotinus* Z. desgl., p. 242. — *pterodactylus* L., desgl., p. 242.
Platyptilia Bertrami Roessl. sehr häufig bei Trondhjem, auffallend die späte Flugzeit. Mitte Juli von Schöyen, in Deutschl. Juni u. Anfang Juli nach Hofmann. **Strand**, Nyt Mag. etc. 39. Bd. 1901. p. 72. Literatur über norweg. arktische Schmetterlinge auch Schweiz. in Anmerk. — *Bertrami* Roessl. var. *foculella* n. (Färbung des ganzen Falters beraucht) **Fuchs**, Jahrb. nass. Ver. f. Naturk. 54. Jhg. p. 71—72 (Trondheim). — *tesseradactyla* L. Fundorte in Irland. **Kane, W. F. de Visme**, The Entomologist, vol. 34. p. 87; farb. Abb. The Entomologist, vol. 34 Taf. IV Fig. 14 ♂ u. 15 ♀ beschr. op. cit. vol. 31 p. 209.
Pterophorus monodactylus L. Biol., Beschr. v. Raupe u. Puppe. **Sorhagen**, Allg. Zeitschr. f. Entom. 6. Bd. p. 242—243.


Nachtrag.

- Anisota consularis* n. sp. 1896. **Dyar** (2).
- Arachnis zuni*. Eier. **Cockerell, Wilm. Porter**. Entom. News, vol. 12 Sept. 209.
- Calybia slossoniae*. Biologie. Titel p. 572 sub No. 7 des vorig. Berichts. Siehe Eucleidae.
- Cauthetia Grotei* H. Edw. Biologie. Entwickl. **Dyar** (3).
- Ceratocampidae. Ueber die Larven einiger C.-Formen. **Packard, A. S.** Psyche, vol. 9 No. 308 p. 279—282.
- Ceratomyia amyntor*. **Beutenmüller** (7).
- Ceroicala illustrata* Holl. in Somaliland: The Entomologist, vol. 34 Suppl. p. 7.
- Chionea Dalman* in Italien. **Bezzi** (Titel p. 558 des vorig. Berichts).
- Diaphora capensis* Herr.-Sch. Biolog. Notiz etc. **Barrett, C. G.** (2) Raupe. Puppe. p. 285.
- Dichogama Redtenbacheri* Led. Biologie. **Dyar** (Titel p. 573 sub No. 29 des vor. Berichts).
- „Dog's Head Butterfly“ on Staten Island. Journ. New York Entom. Soc. vol. 4 No. 4 p. 200.
- Drasteria erectea* (Cram.) Note on developm. **Webster** (Titel p. 647 sub No. 1 des vor. Berichts).
- Drepanopteryx phalaenoides* à Uccle, Belg. Ann. Soc. Entom. Belg. T. 44 p. 260.
- Drymonia chaonia*. Eiablage. **Studd** (Titel p. 638 sub No. 3 des vor. Berichts).
- Ellema harrisii* Mem., coniferana S. u. A. u. pineum Lint. Schäd. an Pinus strobus L. **Chittenden** (2).
- Enaemia crassinervella* Zell. (*Mieza igninix* Walk.) 1896. Bemerk. **Dyar**, Journ. New York. Entom. Soc. vol. 4 No. 2 p. 86—87.
- Enodia hyperanthus*. Aberration of. **Russel, G. J. C.** Entom. Record, vol. 13 No. 12 p. 360.
- Eucheira socialis* Westw. Raupe. **Dyar** (20).
- Euchromia amoena*. Biolog. etc. **Barrett, C. G.** (2) p. 193.
- Eudaemonia*. Ueber 2 Spp. der Gatt. **Beutenmüller** (4). — brachyura. Biologie. **Beutenmüller** (15).
- Euphoeades troilus* L. Bemerk. **Durand**. (Titel p. 572 des vor. Berichts).
- Eustixia pupula*. Hübn. Raupe. **Dyar** (Titel p. 573 sub No. 25 des vorig. Berichts).
- Exomis* (Antennen wie Sphingidae etc.) **Barrett, Frances**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 11 (36) p. 146. Wird vielleicht einmal gänzl. v. and. Gatt. absorbiert.
- Feniseca tarquinius*. Ueber die Entwickl. **Good, A. J.**, Canad. Entom. vol. 33 No. 8 p. 228.
- Gluphisia severa* in New Jersey. **Dyar** (12).
- Henucha smilax*. Biologisches etc. **Barrett, C. G.** (2) p. 191—192. Beschr. von Imago, Raupe, Puppe.
- Heterochroa californica*. **Cockerell, T. D. A.** Entom. News, vol. 12 March, p. 90. — Verbreitung derselben.

- Hylophila bicolorana*, Zucht. **Atmore, E. A.** Entom. Record, vol. 13. No. 12. p. 373. — Notes by **E. F. C. Studd** and **J. C. Moberly** *ibid.* p. 373.
- Hypsoropha hormos*. Hübn. **Dyar** (Titel p. 573 sub No. 23 des vorig. Berichts).
- Isochaetes Beutenmülleri* auf Staten Island. **Joutel, Louis H.**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 9 No. 4 p. 190.
- Leiopasia dorsalis* Hmps. auf Trinidad u. West-Ind. **Kaye**, Trans. Entom. Soc. London, 1901 p. 156 Taf. VI Fig. 2.
- Lenodora montana* Stoll. Biolog. Notiz, etc. **Barrett, C. G.** (2) p. 286. — Beschr. von Raupe u. Puppe.
- Leucaloe eugraphica* Walk. Biol. Notiz etc. **Barrett, C. G.** (2) p. 285 Raupe, Puppe etc.
- Lophopteryx carmelita* Esp. in the New Forest. **Bankes, E. R.**, Entom. Monthly Mag. (2) vol. 12 (37) p. 99.
- Margarodes phlegia*. Biologie. **Dyar**. (Titel p. 573 sub 27 des vor. Berichts).
- Meskea* nicht identisch m. *Zeuzerodes* siehe vor. Bericht.
- Melampias epiphroa*. Raupe u. Puppe. **Beadle** (Titel p. 558 sub 2 des vorig. Berichts).
- Minoa murinata* Sc. siehe *Acidalia italicata* Mill.
- Neophasia Terlooti* Behr. Synon. **Skinner** (Titel p. 631 sub No. 3 des vorig. Berichts). — von Arizona nebst Beschr. einer *var. princetonia* n. **Poling** (2).
- Noropsis elegans* Hübn. The correct Title: **Grote, A. Radcl.** 1897 t. c. No. 1 p. 31—32.
- Nudaurelia arabella*. Biologisches etc. **Barrett, C. G.** (2) p. 193. Puppe etc.
- Odontocheilopteryx sobria* Walk. Biologisches; Raupe, Puppe, Kokon. **Barrett, C. G.** (2) p. 289.
- Oenetus mirabilis* Rothsch. Beschr. des bisher unbek. ♀. **Rothschild**, Nov. Zool. Tring vol. 7 p. 24 (gezogen. Townsville, North Queensland).
- Oeketicus omnivorus* Fereday. Raupe. **Quail** (6).
- Oeta floridana* Neumoegen. Bemerk. zur Puppe. Mit 1 Taf. **Chapmann**, Journ. New York Entom. Soc. vol. 5 No. 3 p. 127—129. — Note by **H. G. Dyar** *ibid.* p. 129. — **Dyar** (10).
- Oporabia*. Hybriden. **Mera, A. W.** Entom. Record, vol. 13 No. 12 p. 360.
- Paronia pulchra*. Dimorphismus u. Mimetismus. **Oberthür, Ch.** (1).
- Peridroma saucia* Hübn. (= variegated Cutworm) Biologie. **Chittenden, F. H.** (1).
- Perophora melsheimeri*. Bemerk. zu Kopfborsten u. Anhängen. **Dyar** (1).
- Petasia nubeculosa*. Ausgedehnte Dauer des Puppenstadiums. **Day** (2).
- Pinipestis Zimmermanni* Grote. Schädl. an *Pinus strobus* L. **Chittenden** (Titel p. 565 sub 2 des vor. Berichts).
- Platycerura furcilla* Pack. Schädl. an *Pinus strobus* L. **Chittenden** (Titel p. 565 sub 2 des vor. Berichts).
- Psaphidia thaxterianus*. Raupe. **Dyar** (45).
- Pyrrosia aurea* in Rom. **Alessandrini** (Titel p. 550 des vor. Berichts).
- Sannina exitiosa* (peach-tree-borer). Experimente. **Slingerland**.
- Sanninoidea exitiosa* u. *opalescens* H. Edw. Pflaumenschädl. **Cordley**.
- Sibine fusca*. Biologie. **Dyar** (Titel p. 573 sub No. 19 des vor. Berichts).
- Siona* Dup. Ueber den Gattungsnamen. **Prout** (Titel p. 618 sub No. 11 des vor. Berichts).

- Stenopteryx hybridalis* in North Devon. **Longstaff, G. B.** (Titel p. 601 des vor. Berichts).
- Syntomeida epilais* Walk. Raupe. **Dyar** (9).
- Tephрина disputaria* (Guen.), gemein auf sonnig, unkultiv. Boden. Aegypten: Luxor, Shendi. **Rothschild**, Nov. Zool. Tring vol. 8 p. 433.
- Thyridopteryx ephemeraeformis*. Ei. **Girault, A.**, Entom. News vol. 12 No. 10 p. 304—305.
- Thyreus Abbottii* (Swains.). Entom. News vol. 10. 1899 p. 1.
- Trabala ochroleuca* Feld. Biolog. Notiz etc. Beschr. v. Raupe, Puppe u. Kokon. **Barrett, C. G.** (2) p. 287.
- Utetheisa pulchella* L. in den Kulturgebieten südl. v. Luxor. **Rothschild, N.**, Nov. Zool. Tring vol. 8 p. 428.
-





MBL WHOI Library - Serials



5 WHSE 02871

